



AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
PUSA

ANNALES

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

DE FRANCE

ARTICLE 56 DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT. — *Les opinions émises dans les Annales sont entièrement propres à leurs auteurs; la Société n'entend aucunement en assumer la responsabilité.*

ANNALES

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832
RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE
PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878

*Natura marime miranda
in minimis.*

ANNÉE 1900. — VOLUME LXIX

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, rue Serpente, 28

—
1900

ANNALES

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

CATALOGUS TEMNOCHILIDUM

(seu Trogositidum)

inter annos 1758—1900 editorum

AUCTORE A. LÉVEILLÉ.

NEMOSOMATINI.

EGOLIA.

ERICHSON, Wieg. Arch., 1842, p. 150.

variegata ER., loc. cit., p. 151, t. 5, f. 6. — LAC.,
Gen. Col., t. 49, f. 4 *Tasmania.*

ACALANTHIS.

ERICHSON, Germ. Zeits., 1844, p. 446.

mirabilis REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 40. *Chili.*

quadrisignata ER., loc. cit., p. 446. — LAC., Gen.
Col., t. 49, f. 2. *Chili.*

quadrinotata BLANCH., Gay, Hist. Chile, V, p. 436,
t. 26, fig. 7 (1851) (*Psoa*). *Chili.*

CALANTHOSOMA.

REITTER, Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 40.

flavo-maculatum REITT., loc. cit., p. 44. *Antillae.*

NEMOSOMIA.

REITTER, Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 11.

- picta** LÉV., Ann. Fr., 1889, p. 251. *Brasilia*.
 var. *bipunctata* LÉV., loc. cit., 1899, p. 653. *Brasilia*.
 Simoni LÉV., Bull. Fr., 1889, p. VIII. *Venezuela*.
 vorax REITT., loc. cit., p. 12. *Colombia*.

NEMOSOMA.

LATREILLE, Nouv. Dict. Hist. nat., éd. 4, XXIV, Tab. méth.,
 p. 157 (1804). — STURM, Deutsch. Insekt., XXII,
 p. 26, pl. CCCXCVII (1853).

- caucasicum** MÉN., Cat. rais., p. 224 (1832). *Caucasus*.
 fascicolle HAMPE, Wien. ent. Monat., VIII, 1864,
 p. 193. *Kasan*.
 cylindricum LEC., New Sp. Col., I, p. 63 (1863). *Amer. bor.*
 elongatum LINN., Fn. Suec., p. 141 (1761). —
 STURM, Deutsch. Insekt., XXII; p. 26, pl. CCCXCVII
 (1853). — J. DUV., Gen., II, t. 42, f. 206. — [*Larva*]
 Cf. RUPERTSB., Biol. Käf. Eur., p. 130 (1880). *Europa*.
 fuscium PANZ., Fn. Germ., 31, 22 (1796). — HERBST,
 Käf., VII, p. 281, t. 112, f. 12 (1797). *Europa*.
 var. *corsicum* REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1876,
 p. 13. — Cf. LÉV., Bull. Fr., 1889, p. VIII. *Corsica*.
 Gounellei LÉV., Bull. Fr., 1894, p. CXLIV. *Brasilia*.
 parallelum MELS., Proc. Ac. Phil., 1844, p. 108. *Amer. bor.*
 punctatum LÉV., Ann. Fr., 1888, p. 411 (1889). *Brasilia*.
 siculum RAG., Nat. Sic., XI, p. 193, note (1892). *Sicilia*.
 signatum SHARP, Biol. Centr.-Am., Col., II, 4, p. 388,
 pl. 12, f. 22 (1891). *Guatemala*.

Subg. MONESOMA LÉV., Bull. Fr., 1894, p. CXLIV.

Sturmia ≠ RAG., Nat. Sic., XI, p. 149 (1892). —

Cf. LÉV., loc. cit.

- brasiliense** LÉV., Ann. Fr., 1899, p. 644. *Brasilia*.
 cornutum STURM, Cat. Ins., p. 77, t. 4, f. 32 (1826).
 — Cf. HAMPE, loc. cit., p. 193. *Tauria, Caucasus*.
 nigripenne REITT., Verh. nat. Ver. Brünn., 1876,
 p. 13. — Cf. LÉV., loc. cit. *Colombia*.

CYLIDRELLA.

SHARP, Biol. Centr.-Am., Col., II, 1, p. 389 (1891).

mollis SHARP, loc. cit., p. 389, pl. 12, fig. 23. *Guatemala.*

DUPONTIELLA.

SPINOLA, Ess. Mon. Clér., II, p. 168 (1844).

fasciatella SPIN., loc. cit., p. 172, t. 8, f. 5. *Caracas.*

ichneumonoides SPIN., loc. cit., p. 170, t. 12, f. 4. *Caracas.*

TEMNOCHILINI.

CORTICOTOMUS.

SHARP, Biol. Centr.-Am., Col., II, 1, p. 390 (1891).

basalis SHARP, loc. cit., p. 390, pl. 12, fig. 24. *Guatemala.*

gracilis SHARP, loc. cit., p. 391. *Panama.*

AIRORA.

REITTER, Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 18.

Aira CHEVROLAT (*in litt.*).

apicalis REITT., loc. cit., p. 20. *Colombia.*

bicolor LÉV., Act. Soc. Scient. Chili, 1895, p. 76 . . . *Bolivia.*

canescens REITT., loc. cit., p. 20. *Amér. mer.*

centralis SHARP, Biol. Centr.-Am., Col., II, 1,
p. 392, pl. 13, fig. 2 (1891). *Mexico, Guatemala, Panama.*

cylindrica SERV., Enc. méth., X, p. 719 (1825). *Amer. bor.*

decipiens LÉV., Ann. Fr., 1899, p. 644. *Mexico.*

Grouvellet LÉV., Ann. Fr., 1888, p. 411 (1889). . . *Colombia.*

humeralis LÉV., Bull. Fr., 1894, p. cxlvi. *Brasilia.*

longicollis GUÉR., Ic. Règn. anim., p. 200 (1846).

— SHARP, loc. cit., p. 392. — Cf. LÉV., Bull.

Fr., 1889, p. xlv. *Amer. mer. centr.*

clivinoides REITT., loc. cit., p. 19. *Mexico, Bogota.*

Mathant LÉV., Bull. Fr., 1878, p. 99 (LXXIX). — Cf.

loc. cit., 1899, p. 160. *Para, Bolivia.*

parallelcollis LÉV., loc. cit., 1894, p. cxliv. . .

. *Brasilia, Venezuela.*

pollens SHARP, loc. cit., p. 392. *Mexico.*

procera REITT., loc. cit., p. 19, t. 1, f. 10. . . . *Bolivia, Paraguay.*

- quadrinaculata** LÉV., loc. cit., 1894, p. cxlvi. *Brasilia.*
striato-punctata REITT., loc. cit., p. 20. *Antillae, Minas-Geraes.*
suturata LÉV., loc. cit., 1891, p. lxi. — Cf. Ann.
 Fr., 1899, p. 653. *Brasilia.*
teres MELS., Proc. Ac. Phil., 1846, p. 64. *Pennsylvania.*
aequalis REITT., Verh. z. b. Ver. Wien, 1877, p. 172. *California.*
yucatanica SHARP, loc. cit., p. 394, pl. XIII, fig. 4. *Mexico.*

PARALLELODERA.

FAIRMAIRE, Le Naturaliste, 1881, p. 340.

- luteicornis** FAIRM., Ann. Fr., 1881, p. 256. *Ins. Viti.*
quadraticollis FAIRM., Le Naturaliste, 1881, p. 340. *Ins. Viti.*

ALINDRIA.

ERICHSON, Germ. Zeits., V, p. 451 (1844).

- Alluandi** LÉV., Bull. Fr., 1894, p. cxliii. *Madagascar.*
alutacea MURR., Ann. nat. Hist., ser. 3, XIX, 1867,
 p. 334. *Old Calabar*
angusta LÉV., loc. cit., 1898, p. 365. *Madagascar*
australis PÉRINGUEY, Trans. S. Afr. Soc., 1885, p. 86
 (16). *Cap. Bon.-Sp., Transvaal*
Bouvieri LÉV., loc. cit., 1898, p. 364. *Madagascar.*
Chevrolati REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1876,
 p. 22. *Senegal.*
cribrosicollis LÉV., Ann. Mus. civ. Gen., ser. 2,
 VI, p. 605 (1888). *Tenasserim.*
cyaneicornis FAIRM., Le Naturaliste, 1887, p. 86,
 fig. 5. *Madagascar*
elongata GUÉR., Ic. Règn. anim., p. 200. *Guinea.*
oblonga WESTWOOD (*in litt.*) sec. REITTER.
grandis SERV., Enc. méth., X, p. 719 (1825). —
 REITT., loc. cit., p. 22, t. 1, fig. 11-13. *Senegal., Cap. Bon.-Sp.*
major GUÉR., Ic. Règn. anim., p. 200. *Senegal.*
 ? *cylindrica* OL., Journ. Hist. nat., I, p. 266, tab. 14,
 f. 5 (1792). — Cf. LÉV., Ann. Fr., 1899, p. 657.
orientalis REDT., Hügel. Reis. Kaschm., IV, 2,
 p. 549 (1842). *Kaschmir.*
ornata LÉV., Bull. Fr., 1898, p. 158. *Benito (Congo-gall.).*
parallela LÉV., Ann. Fr., 1888, p. 411 (1) (1889). .
 *Ins. Andaman, India.*

- sedilloti** LÉV., Bull. Fr., 1884, p. 68 (LVI). *Madagascar.*
Sikorai KUW., D. Ent. Zeit., 1891, p. 340. — Cf.
 LÉV. loc. cit., 1892, p. CVIII. *Madagascar.*
sericea LÉV., loc. cit., 1898, p. 363. *Madagascar.*
spectabilis KLUG, Abh. Ak. Wiss. Berl., 1832,
 p. 204. (p. 146), t. 5. fig. 4 (1833). *Madagascar.*

MELAMBIA.

ERICHSON, Germ. Zeits., V, p. 450 (1844).

- cardicollis** REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1876,
 p. 25, t. 1, f. 46. *Ins. Philipp., Birmania.*
crenicollis GUÉR., Ic. Règn. anim., p. 499, t. 41,
 f. 42. — Cf. LÉV., Bull. Fr., 1889, p. LXII. *Bengalia.*
funebria PASCOE, Journ. of Ent., I, p. 320 (1862). *Cambodia.*
Gautardi TOURN., Mitth. Schw. Ges., III, p. 444
 (1872). — REITT., loc. cit., t. 1, f. 45. *Egyptus sup.*
gigas FABR., Suppl. Ent. Syst., p. 54 (1798). — LAC.,
 Gen. Col., t. 49, f. 4. — REITT., loc. cit., t. 1, f. 46. *Guinea.*
maura PASCOE, Journ. of Ent., I, p. 349 (1862). *Senegal.*
memnonia PASCOE, loc. cit., p. 320. *N'Gami.*
opaca REITT., loc. cit., p. 25. *Ceylan.*
pumila LÉV., Ann. Mus. civ. Gen., ser. 2, II, p. 200,
 (1885). *Cap. Bon.-Sp.*
striata OL., Ent., II, 49, p. 7, t. 1, f. 4 (1790). *Birmania.*
subcyanea GERST., Wieg. Arch., 37, 1, p. 349
 (1871). — Deeken's Reise, p. 307 (1873). *Senegal.*
coeruleata FAIRM., Revoil, Fn. Fl. Comal., p. 14 (1882). *Zanzibar.*
tekkensis KOENIG, Hor. Soc. Ent. Ross., XXIII,
 p. 304 (1889). *Comalis.*
Transcaspia.

TEMNOCHILODES.

LÉV., Bull. Fr., 1890, p. CLXXXIII.

- Dugesi** LÉV., loc. cit., 1890, p. CLXXXIII. *Mexico.*

TEMNOCHILA.

WESTWOOD, Zool. Journ., V, p. 234, tab. suppl. XLVII, f. 6 (1835).

Trogosita OLIVIER (*pars*). — *Synopsis*: REITTER,
 Verh. naturf. Ver. Brünn, 1875, p. 1.

- acuta** LEC., Proc. Ac. Phil., 1858, p. 63. *Texas.*

- aenea** OL., Ent., II, 49, p. 7, t. 4, f. 3 (1790). *Brasilia, Porto-Rico.*
- acrea** LEC., loc. cit., p. 63. *S.-Francisco.*
- alticola** SHARP, Biol. Centr.-Am., Col., II, 4, p. 405
(1894) *Guatemala.*
- aurcola** REITT., loc. cit., p. 38. — SHARP, loc. cit.,
p. 414. *Mexico.*
- aurora** REITT., loc. cit., p. 36. *Brasilia.*
dives DUPONT (*in litt.*).
- barbata** LEC., New Sp. Col., I, p. 65 (1863). . . . *Cap. S.-Lucas.*
- Bedeli** LÉV., Ann. Fr., 1888, p. 414 (4) (1889). . . . *Venezuela.*
- Beldi** SHARP, loc. cit., p. 415. *Nicaragua.*
- boboensis** SHARP, loc. cit., p. 409. *Mexico.*
- Borrei** REITT., loc. cit., p. 37 *Antillae, Colombia.*
- brevior** LÉV., loc. cit., p. 414 (4) 1889). *Colombia.*
- chalcea** KIRSCH, Berl. ent. Zeits., 1873, p. 149. —
SHARP, loc. cit., p. 397. *Peru, Amer. centr.*
- Championi** SHARP, loc. cit., p. 410, t. 13, fig. 40.
. *Nicaragua, Costa-Rica, Panama.*
- Chevrolati** REITT., loc. cit., p. 42. — SHARP, loc.
cit., p. 395 *Amer. centr., Cayennae, Brasilia.*
- chiriquensis** SHARP, loc. cit., p. 412, t. 13, fig. 41. *Panama.*
- chrysosterna** REITT., loc. cit., p. 19. *Cayennae.*
- coerulea** OL., Ent., II, 49, p. 6, t. 4, f. 4 (1790). —
[*Métam.*] PERRIS, Ann. Fr., 1853, p. 604, t. 18, f. 93-
400; 1862, p. 489, t. 5, f. 534. *Eur. mer. Asia occid. Barbaria.*
virescens ROSSI, Mant., I, p. 5 (1792).
var. *pini* BRULLÉ, Webb et Berth., Ins. Can., p. 70
(1838). — Cf. LÉV., Bull. Fr., 1877, p. cxii. . . . *Ins. Canar.*
- colossus** SERV., Enc. méth., X, p. 749 (1825). —
BLANCH., Voy. d'Orb., Col., p. 205, t. 19, f. 6. —
LAC., Gen. Col., t. 19, f. 3. *Colombia, Cayennae.*
- corinthia** REITT., loc. cit., p. 33. — SHARP, loc. cit.,
p. 413. *Mexico.*
- costaricensis** SHARP, loc. cit., p. 410. *Costa-Rica.*
- curta** LÉV., Not. Leyd. Mus., XI, p. 439 (1889). . . *Cayennae.*
- Davidi** LÉV., Bull. Fr., 1898, p. 366. *Ecuador.*
- derasa** SHARP, loc. cit., p. 406. *Mexico.*
- diffinis** SHARP, loc. cit., p. 407. *Mexico, Guatemala.*
- digitata** SHARP, loc. cit., p. 393, t. 13, f. 3.
. *Honduras Br., Nicaragua, Panama.*
- Doumerci** SERV., Enc. méth., X, p. 749 (1825). . . *Cayennae.*

- dryadis** REITT., loc. cit., p. 28. — SHARP, loc. cit., p. 400. *Mexico.*
- ebenina** BLANCH., Voy. d'Orhigny, Col., p. 205, t. 49, f. 7. *Bolivia, Uruguay.*
- exarata** SHARP, loc. cit., p. 406. *Mexico.*
- festiva** SERV., Enc. méth., X, p. 179 (1825). . . . *Brasilia.*
- splendens* GRAY., in Griff., Anim. Kind., II, p. 93, t. 60, f. 1.
- foveicollis** REITT., loc. cit., p. 26. *Cayennae, Para.*
- fraudulenta** SHARP, loc. cit., p. 401. *Mexico.*
- fulgido-vittata** BLANCH., loc. cit., p. 203, t. 49, f. 8. *Bolivia.*
- geminata** SHARP, loc. cit., p. 398. *Panama.*
- gigantea** REITT., loc. cit., p. 9. *Brasilia.*
- gloriosa** REITT., loc. cit., p. 34. *Colombia.*
- grandis** SHARP, loc. cit., p. 405. *Guatemala.*
- Grouvellei** LÉV., Ann. Fr., 1888, p. 415 (5) (1889).
— SHARP, loc. cit., p. 412. *Amer. centr., Chiriqui.*
- guatemalana** SHARP, loc. cit., p. 396. *Mexico, Guatemala, Panama.*
- Hubbardi** LÉV., loc. cit., p. 417 (7) (1889). *Florida.*
- insignis** REITT., loc. cit., p. 40. *Colombia. Bogota.*
- Iris** REITT., loc. cit., p. 42. — SHARP, loc. cit., p. 411. *Mexico, Guatemala, Costa-Ric.*
- Jansonii** LÉV., loc. cit., p. 412 (2) (1889). *Minas-Geraes?*
- japonica** REITT., loc. cit., p. 20. *Japonia.*
- Jekeli** REITT., loc. cit., p. 43. *Colombia.*
- Sennerillei* LÉV., Bull. Fr., 1878, p. 98 (LXXIX). —
 Cf. LÉV., op. cit., 1889, p. xxii. *Colombia.*
- Kirschi** REITT., loc. cit., p. 24. *Bogota.*
- laevicollis** REITT., loc. cit., p. 14. *Cayennae?*
- laticollis** REITT., loc. cit., p. 39. *Mexico.*
- Lebasi** REITT., loc. cit., p. 17. *Colombia.*
- Leveillei** SHARP, loc. cit., p. 394, t. 43, f. 4. . . . *Panama.*
- lucens** REITT., loc. cit., p. 15. *Brasilia.*
- metallica** PERCH., Gen. Ins., fasc. IV, Col., t. 14. . *Mexico.*
- mexicana* REITT., loc. cit., p. 32. — Cf. LÉV., Bull. Fr., 1889, p. xlv. *Mexico.*
- mirabilis** REITT., loc. cit., p. 41. *Colombia.*
- miranda** SHARP, loc. cit., p. 404, t. 43, f. 7. . . . *Mexico.*
- nigritarsis** LÉV., Ann. Fr., 1888, p. 415 (5) (1889). *Brasilia.*
- obscura** REITT., loc. cit., p. 48. *Amer. bor.*
- obsoleta** REITT., loc. cit., p. 28. — SHARP, loc. cit., p. 404. *Mexico.*

- obtusicollis** REITT., loc. cit., p. 43. *Venezuela.*
- olivacea** REITT., loc. cit., p. 26. *Colombia, Bogota.*
- olivicolor** LÉV., loc. cit., p. 413 (3) (1889). *Ecuador, Loja.*
- parva** LÉV., loc. cit., p. 417 (7) (1889). *S.-Domingo.*
- Patricioi** KARSCH, Sitzb. Ges. Nat. Berl., 1881, p. 56. *Ins. S. Thome.*
- planicollis** SHARP., loc. cit., p. 401. *Guatemala.*
- planipennis** LÉV., Bull. Fr., 1889, p. XLIV. — SHARP, loc. cit., p. 403. *Mexico.*
- metallica* ‡ REITT., loc. cit., p. 26. *Mexico.*
- polita** CHEVR., Col. Mex. centr., 1, 66 (1833). — SHARP, loc. cit., p. 408. *Amer. centr.*
- pollens** SHARP, loc. cit., p. 392. *Mexico.*
- polygonalis** LÉV., Ann. Fr., 1899, p. 654. *Brasilia.*
- practerita** SHARP, loc. cit., p. 400. *Mexico.*
- punctatissima** REITT., loc. cit., p. 22. *Brasilia.*
- punicea** REITT., loc. cit., p. 40. *Brasilia.*
- quadriceollis** REITT., loc. cit., p. 45. — SHARP, loc. cit., p. 396, t. 13, f. 5. *Amer. centr.*
- querula** SHARP, loc. cit., p. 408. *Guatemala.*
- Reitteri** KIRSCH., Berl. ent. Zeit., 1885, p. 207. *Colombia.*
- reversa** SHARP, loc. cit., p. 409. *Mexico.*
- Rogenhoferi** REITT., loc. cit., p. 19. *India or J.*
- rugulosa** KIRSCH, Berl. ent. Zeit., 1873, p. 149. *Peru.*
- Sallei** LÉV., Ann. Fr., 1888, p. 416 (6) (1889). — SHARP, loc. cit., p. 411. *Yucatan, Guatemala.*
- Salvini** SHARP, loc. cit., p. 399, t. 13, f. 6. *Panama.*
- sculpturata** REITT., loc. cit., p. 40. *Colombia, Bogota.*
- Sharpi** LÉV., loc. cit., 1894, p. CXLVII. *Bogota.*
- Smithi** SHARP, loc. cit., p. 407, t. 13, f. 9. *Mexico.*
- splendida** GORY, Mag. Zool., 1831, p. 38, t. 38. *Cayennae.*
- Steinhelli** REITT., loc. cit., p. 12. *Colombia.*
- stipes** SHARP, loc. cit., p. 413. *Mexico.*
- sulcifrons** SHARP, loc. cit., p. 406, t. 13, f. 8. *Mexico, Honduras Br., Guatemala.*
- sulcisternum** LÉV., loc. cit., p. 412 (2) (1889). *Jamaica.*
- suturata** REITT., loc. cit., p. 39. — SHARP, loc. cit., p. 414. *Mexico, Brasilia.*
- telemanensis** SHARP, loc. cit., p. 412. *Guatemala.*
- tristis** MCLs. REY, Ann. Soc. linn. Lyon, 1853, p. 8. — Opusc., II, p. 10 (1853). — Cf. LÉV., Bull. Fr.,

- 1889, p. XXII. *Rep. Argent.*
cribricollis REITT., loc. cit., p. 14. *Colombia, Brasilia.*
urbensis SHARP, loc. cit., p. 404. *Mexico.*
varians GUÉR., Ic. Règn. anim., p. 200. *Brasilia, Cayennae.*
varicolor LÉV., Ann. Fr., 1888, p. 413 (3) (1889). *Colombia, Bogota.*
virescens FABR., Syst. Ent., p. 817 (1775) (sub *Lucanus*). — SHARP, loc. cit., p. 402. *Amer. bor., centr., Cayennae.*
chloroïda MANH., Bull. Mosc., 1843, II, p. 301. —
 SHARP, loc. cit., p. 399. *California, Mexico.*
cyanea REITT., loc. cit., p. 28. *Amer. bor.*
viridi-cyanea MANH., loc. cit., p. 302. *California, Mexico.*
yuccae CROTCH, Trans. Am. Soc., V, p. 75 (1874). *California.*

MARNIA.

LÉVEILLÉ, Bull. Soc. ent. Fr., 1889, p. XXI.

- Grouvellet* LÉV., Ann. Fr., 1899, p. 644. *Brasilia.*
Sallet LÉV., Bull. Fr., 1889, p. CXL. *Venezuela.*
sipollis LÉV., loc. cit., 1889, p. XXI. *Minas-Geraes.*

LIPASPIS.

WOLLASTON, Trans. ent. Soc. Lond., ser. 3, I, 1862, p. 140.

- caulicola* WOLL., loc. cit., p. 142, t. 7. *Teneriffa.*
lauricola WOLL., loc. cit., p. 142, note. *Teneriffa.*
pinicola WOLL., loc. cit., p. 143, note. *Teneriffa.*

ASANA.

S. OLLIFF, Proc. Linn. Soc. N. S. W., 1885, p. 71.

- rhizophagoides* WALK., Ann. Nat. Hist., ser. 3, III,
 p. 53 (1859). *Ceylan.*

EUPYCINUS.

SHARP, Biol. Centr.-Am., Col., II, 1, p. 415 (1891).

- lentus* SHARP, loc. cit., p. 416, t. 13, f. 12. *Mexico.*

TENEBROIDES.

PILLER, It. Poscg., p. 87, t. 9, f. 9 (1783). — *Synopsis* : REITTER,
 Verh. nat. Ver. Brünn, 1875, p. 65.

Trogosita OLIVIER, Ent., II, 19, p. 5 (1790).

- aenelpennis* REITT., loc. cit., p. 76 (12). *Brasilia.*

- aeneus** REITT., loc. cit., p. 77 (13). *Colombia.*
- affinis** WHITE, Voy. Ereb. Terr., Zool., Ins., p. 47 (1846). — FAIRM., Rev. Zool., 1848, p. 415. *Nov.-Zeland.*
- albo-maculatus** REITT., loc. cit., p. 78 (14). — SHARP, loc. cit., p. 435. *Honduras Br., Guatemala, Colombia.*
- albo-notatus** REITT., loc. cit., p. 79 (15). *Cayennae.*
- alticola** SHARP, Biol. Centr.-Am., Col., II, 4, p. 425 (1891). *Guatemala.*
- americanus** KIRBY, Faun. Bor. Amer., IV, p. 466 (1837). *Amer. bor.*
- castaneus* MELS., Proc. Ac. Phil., 1844, p. 409. — HORN, Proc. Ac. Phil., 1862, p. 86. *Amer. bor.*
- brevicollis* DEJ. (Cat., éd. 3, p. 339). *Amer. bor.*
- cinnamomeus* SAY (*in litt.*).
- var. *nigritus* HORN, loc. cit., p. 86. *Kansas.*
- anceps** LÉV., Ann. Fr., 1888, p. 424 (3) (1889). — SHARP, loc. cit., p. 424. *Mexico, Guatemala.*
- antennalis** REITT., loc. cit., p. 76 (12). *Bogota.*
- auriculatus** SHARP, loc. cit., p. 429. *Guatemala.*
- australis** BOISD., Voy. Astrol., p. 463 (1835). *Van-Diemen.*
- bimaculatus** MELS., loc. cit., p. 410. — HORN, loc. cit., p. 87. *Pennsylvania.*
- fasciatus* KNOCH (*in litt.*).
- dipustulatus** FABR., Syst. El., I, p. 452 (1801). — SHARP, loc. cit., p. 422. *Amer. mer., Cayennae.*
- var. *impressifrons* REITT., loc. cit., p. 66 (2). — Cf. LÉV., Bull. Fr., 1889, p. VII. *Amer. mer.*
- Bonvouloiri** LÉV., Ann. Fr., 1888, p. 424 (14) (1889). *Mexico.*
- var. *chontalensis* SHARP, loc. cit., p. 429. *Nicaragua.*
- brevis** LÉV., Ann. Fr., 1899, p. 645. *Brasilia.*
- breviusculus** REITT., loc. cit., p. 72 (8). — SHARP, loc. cit., p. 447. *Mexico, Guatemala, Brasilia.*
- brunneo-vittatus** LÉV., Bull. Fr., 1894, p. CXLV. *Brasilia.*
- brunneus** LÉV., Ann. Fr., 1888, p. 449 (9) (1888). *Cayennae.*
- carbonarius** LÉV., Ann. Fr., p. 422 (12) (1889). *Cayennae.*
- carinatus** LÉV., Bull. Fr. (1894), p. CXLV. *Brasilia.*
- celatus** SHARP, loc. cit., p. 448, t. 43, f. 43.
- *Mexico, Guatemala, Nicaragua.*
- Chevrolati** REITT., loc. cit., p. 72 (8). — SHARP, loc. cit., p. 449. *Mexico.*

- circumcinctus** LÉV., Ann. Fr., p. 419 (9) (1889). —
 SHARP, loc. cit., p. 420. Amer. centr.
- collaris** STURM, Ins. Deuts., II, p. 246, t. 48, f. o O. Georgia Amer.
nigripennis DEL. (Cat., éd. 3, p. 339). Amer. bor.
- complicatus** SHARP, loc. cit., p. 433, t. 43, f. 23.
 Honduras, Guatemala.
- cordicollis** LÉV., loc. cit., p. 420 (10) (1889). Brasilia.
- corticalis** MELS., loc. cit., p. 409. — HORN, loc. cit.,
 p. 84. Amer. bor.
conformis DEL. (Cat., éd. 3, p. 339). Amer. bor.
- crassicornis** HORN, loc. cit., p. 83. California.
- cribratus** LÉV., loc. cit. (1894), p. CXLVII. Mexico.
- cucujiformis** HORN, loc. cit., p. 86. Pennsylvania.
- cucujoides** REITT., loc. cit., p. 68 (4). Colombia.
plagiatus REICHE (*in litt.*).
- delicatus** LÉV., Ann. Fr., 1899, p. 655. Brasilia.
- depressus** GUÉR., Ic. Règn. anim., p. 201. — SHARP,
 loc. cit., p. 417. Brasilia, Amer. centr.
- depressior** PAL. BEAUV., Ins. Afr. et Amer., p. 426,
 t. 32, f. 7 (1814) (*sp. dub.*). Amer. bor.
- difficilis** LÉV., loc. cit., p. 421 (11) (1889). — SHARP,
 loc. cit., p. 424. Honduras Br.
- dilatatus** ER., Wieg., Arch., I, p. 93 (1847). Peru.
- dubius** MELS., loc. cit., p. 110. — HORN, loc. cit.,
 p. 85. Pennsylvania.
- elongatulus** J. DUV., Hist. Cuba, p. 251 (1857). Cuba.
- excellens** SHARP, loc. cit., p. 430. Panama.
- explanatus** REITT., loc. cit., p. 73 (9). — SHARP, loc.
 cit., p. 433, t. 43, f. 20. Panama, Colombia.
- facilis** SHARP, loc. cit., p. 420. Mexico.
- Fairmairei** LÉV., loc. cit., p. 418 (8) (1889). Tonga-Tabu.
- fenestratus** LÉV., loc. cit., p. 425 (15) (1889). —
 SHARP, loc. cit., p. 433. Mexico.
- naviclavus** REITT., loc. cit., p. 78 (14). Cuba.
- fossulatus** LÉV., Ann. Fr., 1899, p. 645. Bolivia.
- Fryi** LÉV., Bull. Fr., p. 367 (1898). Brasilia.
- fulgens** SHARP, loc. cit., p. 436, t. 43, f. 24. Panama.
- fulvo-lineatus** LÉV., Ann. Fr., 1888, p. 419 (9)
 (1889). Brasilia.
- Germani** LÉV., Act. Soc. sc. Chili. V, p. 77 (1895). Bolivia.
- Godmani** SHARP, loc. cit., p. 431, t. 43, f. 17. Panama.

- Gounellei** LÉV., Ann. Fr., 1888, p. 425 (15) (1889). *Minas-Geraes.*
gracillipes SHARP, loc. cit., p. 433, t. 13, f. 21 . . . *Panama.*
harpaloides LÉV., loc. cit., p. 423 (13) (1889). —
 SHARP, loc. cit., p. 425 . . . *Mexico.*
helophorus SHARP, loc. cit., p. 432, t. 13, f. 18 . . *Mexico.*
humeralis LÉV., loc. cit., p. 426 (16) (1889). . . . *Colombia.*
incertus LÉV., loc. cit., p. 423 (13) (1889). — SHARP,
 loc. cit., p. 427 . . . *Mexico.*
insinuans WALKER, Ann. nat. Hist., ser. 3, II, p. 206
 (1858) . . . *Ceylan.*
instabilis SHARP, loc. cit., p. 427 . . . *Mexico.*
intermedius HORN, Proc. Ac. Phil., 1862, p. 84. . . *Kansas.*
iteratus SHARP, loc. cit., p. 428. . . . *Mexico.*
latens WOLL., Trans. ent. Soc. Lond., 1862, p. 143. *Teneriffa.*
laticollis HORN, loc. cit., p. 86. . . . *Amer. bor.*
Latreillei LÉV., Bull. Fr., 1889, p. LXII. . . . *Amer. aequin.*
marginatus [LATR., Voy. Humb. Bonpl., Zool., II,
 p. 19, t. 31, f. 7 (1833) . . .
latus LÉV., loc. cit., p. 423 (13) (1889). — (CHEVR. *in*
litt.). — SHARP, loc. cit., p. 424 . . . *Mexico.*
limballis MELS., loc. cit., p. 409. — HORN, loc. cit.,
 p. 84. . . . *Pennsylvania.*
lineolatus REITT., Verh. z. b. Ges. Wien., 1877.
 p. 172. . . . *Colombia.*
litigiosus REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1875, p. 71
 (7). . . . *Brasilia.*
longicornis LÉV., Ann. Fr. (1889), p. 253. . . . *Brasilia.*
longulus SHARP, loc. cit., p. 428. . . . *Guatemala.*
lucidus SHARP, loc. cit., p. 429. . . . *Panama.*
marginatus PAL. BEAUV., Ins. Afr. et Amer., p. 425,
 t. 32, f. 3 (1844). — HORN, loc. cit., p. 187. . . *Amer. bor.*
marginicollis SHARP, loc. cit., p. 427, t. 13, f. 16. *Guatemala.*
maroccanus REITT., Deuts. ent. Zeit., 1884, p. 254.
 . . . *Barbaria, Corsica.*
Marseuli REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1875, p. 75
 (11). . . . *S^a Catharina.*
mauritanicus LINN., Syst. Nat., ed. X, I, p. 417
 (1758). — J. DUV., Gen., II, t. 42, f. 208. — [Larva]
 Cf. RUPERTSBERGER, Biol. Käf. Eur., p. 130. —
 [Métam.] XAMBEU, Ann. Soc. linn. Lyon, XXXIX,
 p. 153 (1892) . . . *cosmopolit.*

- bucephalus* HERBST, Arch., p. 141, t. 29, f. 16 (1784).
caraboides† FAHR., Syst. Ent., p. 256 (1775). — STURM.
 Ins., II, p. 242, t. 48. Europa.
complanatus PILLER, It. Poseg., p. 87, t. 9, f. 9 (1783).
dubius SCRIBA, Journ., p. 42, 6 (1790). Germania.
fuscus GOEZE, Ent. Beytr., I, p. 125 (1777). — GEOFFR.
 (*Platycerus* n° 5), Hist. Ins., I, p. 64. — PREYSSL.
 Verz. böhm. Ins., I, p. 6, t. 1, f. 1 (1790).
piceus SCHALLER, Act. Hall., I, p. 319 (1783) America.
planus QUESNEL, Diss. inaug., p. 19 (1790) Barbaria.
striatus FOURCROY, Ent. par., I, p. 3 (1785) Gallia.
 var. *nitidus* HORN, loc. cit., p. 83. — Cf. REITT., loc.
 cit., p. 79 (16) Philadelphia.
metallescens REITT., loc. cit., p. 77 (13) Brasilia.
mocrens SHARP, loc. cit., p. 436. Panama.
mordax SHARP, loc. cit., p. 423 Costa-Rica.
murinus REITT., loc. cit., p. 71 (7) Colombia.
muticus PAL. BEAUV., Ins. Afr. et Amer., p. 126,
 t. 32, f. 6 (1841). Amer. bor.
punctatus Dej. (Cat., éd. 3, p. 339). Amer. bor.
nanus MELS., loc. cit., p. 110. — HORN, loc. cit., p. 85. Pennsylvania.
nigro-viridis LÉV., Ann. Fr., 1888, p. 427 (17)
 (1889). — (E. DUGÈS, *in litt.*). — SHARP, loc. cit.,
 p. 432. Mexico.
oblongus SHARP, loc. cit., p. 423. Mexico, Panama.
obscurus HORN, loc. cit., p. 87 Illinois.
obtus HORN, loc. cit., p. 87. Pennsylvania.
ocularis LEWIS, Ent. month. Mag., XXX, p. 34 (1894). Japonia.
opacus REITT., loc. cit., p. 69 (5). Colombia, Amer. bor.
ornatus LÉV., Ann. Fr., 1889, p. 252 Brasilia.
parallelus FAIRM., Rev. et Mag. Zool., 1850, p. 55.
 Nor.-Caledon., Taïti, Nuka-Hiva.
patruella REITT., loc. cit., p. 70 (6) Brasilia, Carol. merid.
pleuralis HORN, loc. cit., p. 84. California.
politus SHARP, loc. cit., p. 435 Guatemala.
pollens SHARP, loc. cit., p. 432, t. 43, f. 19
 Mexico, Honduras Br., Nicaragua.
pulchellus REITT., loc. cit., p. 78 (14) Nor.-Grenada.
pumilus LÉV., loc. cit., 1888, p. 426 (16) (1889). Colombia.
punctato-lineatus FAIRM., Rev. et Mag. Zool.,
 1850, p. 56 Polynesia.

- punctulatus** REITT., loc. cit., p. 74 (10). *Cuba, Porto-Rico.*
- pusillimus** MANH., Bull. Mosc., 1843, II, p. 303. —
(*Lathropus?* sec. LECONTE, Proc. Ac. Phil., 1866,
p. 379) *Sitkha.*
- quadridens** PAL. BEAUV., Ins. Afr. et Amer., p. 126,
t. 32, f. 8 (1811) *Oware.*
- quadriguttatus** REITT., loc. cit., p. 69 (5). *Brasilia, Rep. Argent.*
- rectus** WOLL., Trans. ent. Soc. Lond., 1862, p. 144. *Lanzarote.*
- reflexus** REITT., loc. cit., p. 74 (10) *Bogota.*
- Reitteri** LÉV., loc. cit. (1889), p. 420 (10). — SHARP,
loc. cit., p. 431. *Panama, Brasilia.*
- repetitus** SHARP, loc. cit., p. 246 *Mexico, Guatemala.*
- Ritzemae** LÉV., Not. Leyd. Mus., XI, p. 139 (1889). *Bogota, Colombia.*
- ruber** REITT., loc. cit., p. 73 (9). — SHARP, loc. cit.,
p. 419. *Guatemala, Nicaragua, Brasilia.*
- rubro-marginatus** REITT., loc. cit., p. 78 (14) . . . *Brasilia.*
- rusticollis** REITT., loc. cit., p. 67 (3) *Bogota.*
- rustipes** LÉV., Ann. Fr., 1889, p. 254. *Brasilia.*
- rustiventris** REITT., loc. cit., p. 67 (3) *Colombia, Rep. Argent.*
- rufo-limbatus** LÉV., Ann. Fr., 1888, p. 424 (14)
(1889). — (REITT. *in litt.* — SHARP, loc. cit., p. 428. *Mexico.*
- rugosipennis** HORN, loc. cit., p. 87. *Pennsylvania.*
- Sallei** SHARP, loc. cit., p. 430. *Mexico.*
- Schaufussi** REITT., loc. cit., p. 71 (7) *Caracas.*
- sculpturatus** REITT., loc. cit., p. 75 (11) *Brasilia.*
- semicylindricus** HORN, loc. cit., p. 85 *Georgia Amer.*
- Sennevillei** LÉV., loc. cit., p. 425 (15) (1889). —
SHARP, loc. cit., p. 434 *Amer. centr.*
- sericatus** SHARP, loc. cit., p. 434 *Guatemala.*
- serratus** WOLL., Ins. Mad., p. 155 (1854) *Madera.*
- Sharpi** LÉV., Bull. Fr., 1891, p. cxvii *Panama.*
- bimaculatus* || SHARP, loc. cit., p. 434, t. 13, f. 22. .
- sinuatus** LEG., Proc. Ac. Phil., 1861, p. 344. —
HORN, loc. cit., p. 86 *California.*
- var. *californicus* HORN, Proc. Ac. Phil., 1862, p. 83.
— Cf. CROUCH, Ch. List. Col. Am., 1874, p. 47. . . *California.*
- sonorensis** SHARP, loc. cit., p. 418, t. 13, f. 14, ♀. . *Mexico.*
- soror** J. DUV., Hist. Cuba, p. 252 (1857). — REITT., loc.
cit., p. 66 (2) *Cuba.*
- spectator** SHARP, loc. cit., p. 421 *Guatemala.*
- Steinhelli** REITT., loc. cit., p. 75 (11). *Colombia.*

- subaeneus** REITT., loc. cit., p. 77 (13). *Amer. bor.*
sublaevis PAL. BEAUV., Ins. Afr. et Amer., p. 126,
t. 32, f. 5 (1811) *Ocare.*
subniger PAL. BEAUV., loc. cit., p. 127, t. 32, f. 9
(1811) (*sp. dub.*) *Amer. bor.*
subplanus REITT., loc. cit., p. 70 (6). — SHARP, loc.
cit., p. 418 *Mexico.*
subruber LÉV., Ann. Fr., 1899, p. 656 *Brasilia.*
subvirescens LÉV., Ann. Fr., 1889, p. 252. *Brasilia.*
sulcifrons J. DUV., loc. cit., p. 253. — REITT., loc.
cit., p. 66 (2). — SHARP, loc. cit., p. 422 *Cuba.*
transversicollis J. DUV., loc. cit., p. 255, t. 9, f. 14.
— REITT., loc. cit., p. 74 (10). *Cuba.*
turkestanicus BALLION, Bull. Nat. Mosc., 1870, II,
p. 330. *Chodsent.*
undulatus SHARP, loc. cit., p. 424, t. 13, f. 15 *Guatemala.*
viridescens LÉV., loc. cit., 1889, p. 253. *Brasilia.*
yucatanicus LÉV., loc. cit., p. 421 (11) (1889). —
SHARP, loc. cit., p. 421. *Yucatan, Honduras Br.*
zapotensis SHARP, loc. cit., p. 436, t. 13, f. 25 *Guatemala.*
zunilensis SHARP, loc. cit., p. 426. *Guatemala.*

COLYDOBIUS.

SHARP, Biol. Centr.-Am., Col. II, 4, p. 437 (1894).

- divisus** SHARP, loc. cit., p. 437, t. 12, f. 25. *Panama.*
signatus SHARP, loc. cit., p. 437 *Guatemala.*

LEPERININI.

ELESTORA.

PASCOE, Proc. ent. Soc. Lond., 1868, p. xi.

- fulgurata** PASC., loc. cit., p. xi *Penang.*

CYMBA.

SEIDLITZ, Faun. balt., ed. 1, Gatt., p. 34 (1872).

- moniflata** PASCOE, Ann. nat. Hist., ser. 4, p. 318
(1872). *Australia.*
procera KRAATZ, Berl. ent. Zeit., 1858, p. 136. *Graecia, Cyprus.*

PHANODESTA.

REITTER, Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 31..

- brevipennis** REITT., loc. cit., p. 33 *Chili.*
cribraria BLANCH., Gay, Hist. Chile, V, p. 441 (1851)
 (*Toricum*). *Chili.*
picea GERMAIN, Ann. Univ. Chile, 1855, p. 406.
cordaticollis REITT., loc. cit., p. 33. — Cf. Lév., Bull.
 Fr., 1888, p. CCVII.
cribrata GERMAIN, loc. cit., p. 407. *Chili.*
angulata REITT., loc. cit., p. 33. — Cf. Lév., Bull.
 Fr., 1878, p. LXXXI (100).
variegata GERMAIN, loc. cit., p. 406. *Chili.*
costipennis REITT., loc. cit., p. 34. — Cf. Lév., loc.
 cit., 1888, p. CCVII.

LEPERINA.

ERICHSON, Germ. Zeits., V, p. 453 (1844).

- adusta** PASCOE, Journ. of Ent., I, p. 400 (1860) . . . *Melbourne.*
ambigua BROUX, Man. New Zeal., Col., I, p. 479
 (1880). *Nor.-Zeland.*
argentea MONTR., Ann. Fr., 1860, p. 946 . . . *Nor.-Caledon.*
Brouni PASCOE, Ann. nat. Hist., ser. 4, 48, p. 57
 (1880). *Nor.-Zeland.*
burnettensis MAC LEAY, Trans. ent. Soc. N. S. W.,
 1874, p. 464. *Gayndah.*
cineta LÉV., Ann. Fr., 1888, p. 427. (17) (1889). —
 (FAUV. *in litt.*) *Nor.-Caledon.*
cirrosa PASCOE, Journ. of Ent., I, p. 400 (1860). . . *Moreton-Bay.*
conspicua S. OLLIFF, Proc. linn. Soc. N. S. W.,
 X, p. 704 *Australia.*
decorata ER., Wieg. Arch., 1842, p. 450. — LAC.,
 Gen. Col., Atl., tab. 49, f. 5 *Tasmania.*
gayndahensis MAC LEAY, Trans. ent. Soc. N. S. W.,
 1874, p. 464. — Cf. S. OLLIFF, Trans. ent. Soc. N.
 S. W., X, p. 702. *Gayndah.*
farinosa SHARP, Ent. month. Mag., XIII, p. 266
 (1877). *Nor.-Zeland.*
fraterna S. OLLIFF, loc. cit., p. 707 *Australia.*
Guerini MONTR., Ann. Fr., 1860, p. 946 *Nor.-Caledon.*

- Iacera** PASCOE, Journ. of Ent., 1860, I, p. 401 *Melbourne.*
Signoreti † REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1876,
p. 36. — Cf. LÉV., Bull. Fr., 1899, p. 657.
Lichenea FAUVEL, Bull. Soc. linn. Norm., sér. 2, I,
p. 180 (1866) (*Soronia*). *Nor.-Caledon.*
Lorise LÉV., Ann. Mus. civ. Gen., XXXIII, p. 248
(1893). *Nor.-Guinea mer.*
Masterei MAC LEAY, Trans. ent. Soc. N. S. W., 1871,
p. 463. *Gayndah.*
nigro-sparsa WHITE, Voy. Ereb. Terr., Ins., p. 47
(1846). *Nor. Zeland.*
opatroides LÉV., Ann. Mus. civ. Gen., ser. 2, I,
p. 637 (1884). *Nor.-Guinea.*
seposita S. OLLIFF, loc. cit., p. 702 *Australia.*
Signoreti MONTR., Ann. Fr., 1860, p. 915 *Nor.-Caledon.*
sobrina WHITE, Voy. Ereb. Terr., Ins., p. 47 (1846).
— LAC., Gen. Col., p. 346, note 4 *Nor.-Zeland.*
fasciculata BLANCH., Voy. Pôle Sud, IV, tab. XI, f. 4
(1853) (*Opatrum*). *Nor.-Zeland.*
nigro-sparsa † BLANCH., loc. cit., p. 257 *Nor.-Zeland.*
spercheoides LÉV., Bull. Fr., 1878, p. 400 (LXXX). *Nor.-Caledon.*
squamulosa GERL., Ledeb. Reis., II, p. II, p. 97
(1830). *Sibiria or., Mongolia. Amur.*
tipialia REITT., Wien. ent. Zeit., VIII, 217 (1889) . . . *Japonia.*
turbata PASCOE, Journ. of Ent., II, p. 29 (1863). . . . *Australia.*
fasciculata REDT., Reise Novara, II, p. 37, t. 2, f. 3. —
Cf. REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 36. —
Cf. LÉV., Bull. Fr., 1899, p. 657
Wakefieldi SHARP, Ent. month. Mag., XIII, p. 491
(1877). *Nor.-Zeland.*

GYMNOCHILA.

ERICHSON, Germ. Zeits., V, p. 454 (1844).

- lepidoptera** REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1876
p. 39. *Abyssinia.*
quadrisignata MANH., Bull. Nat. Mosc., 1852, IV,
p. 303 *Mongolia.*
rugosa THUNB., in Sch., Syn. Ins., p. 433 et 434, notes
(1808). — LAC., Gen. Col., II, p. 347, note 2 . . . *Guinea.*
sparsuta J. THOMS., Arch. ent., II, p. 44 (1858) . . . *Gabon.*

- angulicollis* J. THOMS., loc. cit., p. 45. — Cf. LÉV.,
Bull. Fr., 1888, p. CXCIII *Gabon.*
subfasciata J. THOMS., loc. cit., p. 44 (1858). *Gabon.*
varia FABR., Syst. El., I, p. 151 (1801). — Cf. LÉV.,
loc. cit., p. CXCIII *Guinea.*
♀ *adpersa* BOH., Ins. Caffr., I, 2, p. 579 (1848). *Caffraria.*
♂ *laticollis* BOH., loc. cit., p. 578. *Caffraria.*
squamosa GRAY, in Griff., An. Kingd. Ins. (*sin. descr.*),
t. 60, f. 3, t. 73, f. 4, *aq.* — MURRAY, Ann. Mag. nat.
Hist., ser. 3, XIX, p. 334 (1867). *Cap. Bon.-Sp.*
restita DEJ., Cat., éd. 3, p. 339 (1837). — GRIFF., An.
Kingd., XIV, t. 40, f. 4. — Cf. ER., Germ. Zeits.,
V, p. 43, p. 455 (1844). *Cap. Bon.-Sp., Afr. mer.*

XENOGLÉNA.

REITTER, Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 40.

LÉVEILLÉ, Bull. Fr., 1897, p. 203.

- chrysobothroides* LÉV., loc. cit., p. 203 *Malacca.*
Deyrollei REITT., loc. cit., p. 41. *Java.*
Fryi LÉV., loc. cit., 1899, p. 158. — Ann. Fr., 1889,
p. 646 *Pérak.*
tetrastigma LÉV., Bull. Fr., 1878, p. 100 (LXXX). *Malacca.*
vicina LÉV., loc. cit., 1897, p. 202. *Malacca.*

ACROPS.

DALMAN, Eph. Ent., 1824, p. 15.

Anacypta ILLIG., Mag., VI, p. 338, 1807 (*inedit.*).

ERICHSON, in Germ. Zeits., V, p. 435 (1844). — Wiegman.

Arch., p. 102 (1846).

- birmanica* LÉV., Ann. Mus. civ. Gen., 1888 (VI),
p. 607. *Bhamo.*
cicatricosa REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1880,
p. 29 *Himalaya.*
var. *rugosa* LÉV., Ann. Mus. civ. Gen., 1888 (VI),
p. 606. *Bhamo.*
cyanea LÉV., Bull. Fr., 1899, p. 158. — Ann. Fr.,
1899, p. 647. *Pérak.*
Feae LÉV., Ann. Mus. civ. Gen., 1888 (VI), p. 606 *Tenasserim.*
Gambeyi LÉV., Bull. Fr., 1890, p. CVII *Cochinchina.*

- nigonia** LEWIS, Entom., XXI, p. 220 (1888). Japonia.
punctata FABR., Syst. El., I, p. 331 (1801). Sumatra, Molucca.,
buprestoides WEBER, Obs. ent., p. 48 (1801).
metallica DALMAN, Eph. Ent., p. 15 (1824).
 var. *Dohrni* REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 42.
 — Cf. LÉV., Bull. Fr., 1899, p. 160. Borneo..
Weyersi LÉV., Ann. Belg., 1900, p. Sumatra.,

NARCISA.

- PASCOE, Journ. of Ent., II, 1863, p. 28.
bimaculata GESTRO, Ann. Mus. civ. Gen., XV, p. 59
 (1879-80). Sumatra.
decidua PASCOE, Journ. of Ent., II, p. 28, t. 3, f. 5
 (1863). Batchian.
Lynceus S. OLLIFF, Trans. ent. Soc. Lond., 1883,
 p. 178. — WATERH., Aid to Ident., tab. 134, f. 3. Borneo.

CALITYS.

- THOMSON, Skand. Col., I, p. 71 (1839); — IV, p. 191 (1852).
Nosodes LEC., Class. Col. N. Amer., I, p. 88 (1861).
africana BOH., Ins. Caffr., I, p. 580 (1848). Caffraria.
scabra THUNB., N. Act. Ups., IV, p. 15, t. 1, f. 6 (1784). Europa.
dentata FABR., Mant., I, p. 50 (1787). Amer. bor.
serrata LEC., Proc. Ac. Phil., 1859, p. 84. Amer. bor.
silphides NEWM., Ent. Mag., V, p. 378. Canada.
spinifera REITT., Verh. z. b. Ges. Wien, 1877, p. 175. Cap. Bon.-Sp.

THYMALINI.

PELTONYXA.

- REITTER, Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 46.
australis BLACKB., Tr. R. Soc. S. Austr., XIV, p. 113
 (1891). Australia mer.
Deyrollei REITT., loc. cit., p. 46. Australia.
pubescens BLACKB., loc. cit., p. 113. Victoria.

GRYNOCHARINA.

- REITTER, Mitth. Münch. ent. Ver., 1877, p. 131.
peltiformis REITT., loc. cit., p. 132. India or.

NEASPIS.

PASCOE, Ann. Mag. nat. Hist., ser. 4, X, p. 317 (1872).

- pusilla** BLACKB., Tr. R. Soc. S. Austr., XIV, p. 442 (1891). *Australia mer.*
sculpturata REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 48, t. 2, f. 29. *Australia.*
squamata ESCH., Entom., p. 47 (1822), *sub Nitidula* (*gen. dub.*). *Luzon.*
variegata MAC LEAY, Trans. ent. Soc. N. S. W., II, p. 461 (1873) (*Soronina*). *Australia.*
subtrifasciata REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 47. — Cf. S. OLLIFF, Proc. linn. Soc. N. S. W., X, p. 4. *Australia.*
villosa PASCOE, loc. cit., p. 317 (1872). *Australia.*

LATOLAEVA.

REITTER, Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 49.

- brasillica** PERTY, Del. Anim., p. 34, t. VII, f. 44 (1830) (*gen. dub.*). *Minas-Geraes.*
cassidoides REITT., loc. cit., p. 50. *Malacca.*
Ferrarii REITT., loc. cit., p. 50. *Batavian.*
incensa S. OLLIFF, Not. Leyd. Mus., VI, 5, p. 76 (1883). *Malacca.*
ovalis MAC LEAY, Annul. Jav., p. 39 (1825). *Java, Borneo.*
quadrimaculata REITT., Mitth. Münch., 1877, p. 431. *Malacca.*

ANCYRONA.

REITTER, Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 51.

Gaurambopsis KRAATZ, Deutsch. ent. Zeit., 1878, p. 238.

Cf. REITT., Verh. z. b. Ges. Wien, 1879, p. 508.

- aegra** S. OLLIFF, Proc. linn. Soc. N. S. Wales, X, p. 744. *N. S. Wales*
amica S. OLLIFF, loc. cit., p. 743. *Austral. mer.*
aurora LÉV., Bull. Fr., 1899, p. 458. — Ann. Fr., 1899, p. 647. *Benito (Congo Fr.).*
bivittata LÉV., loc. cit., p. 227. — loc. cit., p. 632. *Cameroun.*
caffa REITT., loc. cit., p. 52. *Cap. Bon.-Sp.*
ciliata MURR., Ann. Mag. nat. Hist., ser. 3, XIX, p. 337 (1867) (*inc. sed.*). *Old Calabar.*

- crenata** Murr., loc. cit., p. 336 (*inc. sed.*). Old Calabar.
extensa Reitt., Verh. z. b. Ges. Wien, 1877, p. 173. Bogota.
Fryi Lév., loc. cit., p. 159. — loc. cit., p. 648. Assam, Perak, Sumatra.
gabonica Lév., loc. cit., p. 159. — loc. cit., p. 651. Congo Fr.
Gestroi Reitt., Ann. Mus. civ. Gen., XV, p. 459
 (1880). Somerset Yule.
Grouvellei Lév., loc. cit., p. 159. — loc. cit., p. 650. Detr. Torrès.
Haroldi Reitt., Deutsch. ent. Zeit., 1877, p. 375. Japonia.
lanuginosa Motsch., Bull. Nat. Mosc., 1863, II, p. 506. Ceylan. ✓
latebrosa S. OLIFF, loc. cit., p. 712. Queensland.
laticeps S. OLIFF, loc. cit., p. 710. Queensland, N. S. Wales.
Lewisii Reitt., Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 52. Japonia.
maculipennis Kr., Deutsch. ent. Zeit., 1878, p. 239. Africa austr.
Martini Lév., loc. cit., p. 226. — loc. cit., p. 651. Natal.
nigrita J. Thoms., Arch. ent., II, p. 45 (1858) (*inc. sed.*). Gabon.
obscura Lév., loc. cit., p. 159. — loc. cit., p. 649. Sumatra, Ternate.
orbicularis Lév., loc. cit., 1894, cxlvii. Ternate.
Pryeri S. OLIFF, Trans. ent. Soc. Lond., 1883, p. 173
 et 186. — WATERH., Aid to ident., 1880-82, t. 134,
 f. 4. Borneo. ✓
Reitteri S. OLIFF, Not. Leyd. Mus., vi, p. 77, 1883.
 — Cf. Lév., Ann. Mus. civ. Gen., xxxiii, p. 250
 (1893). Ins. Ara, Nov. Guinea.
rufolineata Lév., Bull. Fr., 1899, p. 227. — Ann.
 Fr., 1899, p. 652. Cameroun.
Simoni Reitt., Deutsch. ent. Zeit., 1880, p. 163. Ashantee.
subrotundata Motsch., Bull. Nat. Mosc., 1863, II,
 p. 507 (*inc. sed.*). Ceylan. ✓
vesca S. OLIFF, Proc. linn. Soc. N. S. W., X,
 p. 713. Australia.
vicina Lév., loc. cit., 1899, p. 227. Cameroun.

LEPTONYXA.

REITTER, Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 54.

— Cf. LÉVEILLÉ, Act. Soc. Sc. Chili, V, p. 80 (1895).

- boliviensis** Lév., loc. cit., p. 79. Bolivia.
brevicollis Reitt., loc. cit., p. 54. Colombia.
costipennis Reitt., loc. cit., p. 55. Brasilia.
Fairmairei Lév., Bull. Fr., 1892, p. xcv, ♀. — ♂
 Lév., loc. cit., 1894, p. cxlix. Brasilia.

- Germaini** LÉV., Act. Soc. Sc. Chili, V, p. 79 (1895). *Bolivia.*
Grouvellei LÉV., loc. cit., p. 78. *Bolivia.*
ornata LÉV., loc. cit., p. 77. *Bahia.*
Sedilloti LÉV., Ann. Fr., 1888, p. 428 (18) (1889). . . *Colombia.*

HOLOPLEURIDIA.

REITTER, Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 56.

- maculosa** REITT., loc. cit., p. 57. *Colombia.*

LOPHOCATERES.

S. OLLIFF, Trans. ent. Soc. Lond., 1883, p. 180. — Cf. S. OLLIFF,
 Cist. ent., III, p. 58 (1883).

- americanus** MOTSCH., Bull. Nat. Mosc., 1863, II, p. 508.

Cf. LÉV., Bull. Fr., 1889, p. XLIV. *Georgia Amer.*

- nanus** S. OLLIFF, Trans. ent. Soc. Lond., 1883, p. 181. *Borneo.*

- pilosus** S. OLLIFF, Cist. ent., III, p. 59 (1883). . . *Penang.*

- pustillus** KLUG, Abh. Akad. Wiss. Berl., 1832, p. 459

(71). *Madagascar.*

- africanus** MOTSCH., Bull. Nat. Mosc., 1863, II, p. 508. *Algiria.*

- Yeani** ALLIB., Rev. Zool., 1847, p. 42. — [Larva] REV,

Bull. Fr., 1888, p. XXXVIII. *cosmopol.*

DIONTOLOBUS.

SOLIER, in Gay, Hist. Chile, IV, p. 367 (1849).

- Micropeltis** REDTENBACHER, Reise Novara, II, p. 38 (1867). —

Cf. LÉV., Bull. Fr., 1899, p. 460.

- costulata** REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 60. *Chili.*

- flavo-limbata** REITT., Mitth. Münch. ent. Ver., 1877,
 p. 22. *Chili.*

- incostata** REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 59. *Chili.*

- inaequalis** REITT., Verh. z. b. Ges. Wien, 1877, p. 175. *Chili.*

- lanuginosa** LÉV., Act. Soc. Sc. Chili, V, p. 80 (1895). *Chili.*

- punctipennis** SOL., loc. cit., p. 368, t. 8, f. 4. . . *Chili.*

- serraticollis** REDT., loc. cit., p. 39, t. 2, f. 4. . . . *Chili.*

- var. **lateritius** FAIRM., Ann. Fr., 1883, p. 488. — Cf.

LÉV., loc. cit., 1899, p. 460 *Punta Arena.*

DECAMERUS.

SOLIER, in Gay, Hist. Chile, IV, p. 369 (1849).

Peltostoma REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1877, p. 173. —

Cf. LÉV., Bull. Fr., 1899, p. 160.

haemorrhoidalis SOL., loc. cit., p. 371, t. 8, f. 5. *Chili.*

unguicularis REITT., loc. cit., p. 174. *Chili.*

OSTOMODES.

REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1877, p. 174.

Eronyxa REITTER, Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 57. —

Cf. LÉVEILLÉ, Bull. Fr., 1889, p. xlv.

pallida MOTSCH., Bull. Nat. Mosc., 1863, II, p. 508. *California.*

pilosula CROUCH, Trans. Amer. ent. Soc., 1874, p. 77.

— Cf. HOPPING, Ent. News, X, 6, p. 163 (1899). *Oregon.*

lagrioides REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 58. *California.*

Dohrni REITT., Verh. z. b. Ges. Wien, 1877, p. 174. *California.*

PELTASTICA.

MANNERHEIM, Bull. Nat. Mosc., 1852, II, p. 334.

— Cf. LEWIS, Ent. month. Mag., XXV, p. 432 (1889).

amurensis REITT., Deutsch. ent. Zeit., 1879, p. 220. *Amur.*

Reitteri LEWIS, Ent. month. Mag., 1884, p. 79. *Japonia.*

tuberculata MANNH., Bull. Nat. Mosc., 1852, II, p. 334. *Sitkha.*

PELTOSCHEMA.

REITTER, Verh. nat. Ver. Brünn, 1880, p. 4.

Allicorne REITT., loc. cit., p. 5. *Australia.*

GRYNOMA.

SHARP, Ent. month. Mag., 1877, p. 267.

diluta SHARP, loc. cit., p. 267. *Nov.-Zeland.*

fusca SHARP, loc. cit., p. 267. *Nov.-Zeland.*

regularis SHARP, Trans. ent. Soc. Lond., 1882, p. 78.

— Man. New Zeal. Col., V, p. 1079 (1893). *Nov.-Zeland.*

viridescens BROUN, Man. New Zeal. Col., IV, p. 893
(1886). *Nov.-Zeland.*

PROMANUS.

SHARP, Ent. month. Mag., 1877, p. 266.

- auripilis** BROUX, Man. New Zeal. Col., V, p. 4079
(1893). *Nov.-Zeland.*
depressus SHARP, loc. cit., p. 266. *Nov.-Zeland.*

GAURAMBE.

THOMSON, Skand. Col., I, p. 70 (1859); — IV, p. 489 (1862).

Ostoma LAICH., Verz. Tyr. Ins., p. 102 (1781) (*pars*).

REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1876, p. 61.

Boleticola AND., in Hope, Ent. Taschen., p. 466 (1797) (*sine descr.*).

Peltis † KUGEL., in Schneid. Mag., p. 508.

Subg. Zimloma DES GOZIS, Rech. esp. typ., p. 11.

CL. SEMENOW, Hor. Soc. Ent. Ross., XXXII, 4-2, p. 286 (1898).

- gigantea** REITT., Verh. nat. Ver. Brünn, 1882, p. 147
(35). *Sibiria. Amur.*
grossa LINN., Syst. Nat., ed. X, p. 361 (1758). —
[*Metam.*] ASSMANN, Stett. ent. Zeit., 1852, t. III. . . *Europa.*
lunata FABR., Mant., I, p. 49 (1787). — OLIV., Ent., II,
II, p. 11, t. I, f. 2. *Europa.*
Jakowlew SEMEN., loc. cit., p. 288. *Russia (Jaroslavl).*
valida LEWIS, Ent. month. Mag., XXX, p. 34 (1894). *Japonia.*

Subg. Gaurambe s. str.

- ferruginea** LINN., Syst. Nat., ed. X, p. 361 (1758).
. *Europa, Sibiria.*
fraterna RAND., Bost. Journ. nat. Hist., II, p. 17. . . *Amer. bor.*
rubicunda LAICH., Tyr. Ins., I, I, p. 102 (1781). . . *Germania.*
septentrionalis RAND., loc. cit., p. 17. *Amer. bor.*
Pippingskoldi MANH., Bull. Nat. Mosc., 1852, II,
p. 333. *Amer. bor.*
colobocoides FAURM., Ann. Fr., 1868, p. 777. — Op.
cit., 1886, t. 2, f. 2. *Madagascar.*

Subg. Grynnocharis THOMSON.

Skand. Col., I, p. 71 (1859); — IV, p. 490 (1862).

- caucasica** MORS., Bull. Nat. Mosc., 1863, II, p. 508. *Caucasus.*
japonica REITT., Wien. Ent. Zeit., VIII, 217 (1889). *Japonia.*

- oblonga** LINN., Syst. Nat., ed. X, p. 362 (1758). *Europa.*
oregonensis CROUCH (*in litt.?*). — Cf. CROUCH, Check
 List Col. Amer., p. 47 (1873). *Amer. bor.*
pubescens ER., Germ. Zeits., V, p. 437 (1844). *Tauria.*
quadrilineata MELS., Proc. Ac. Phil., 1844, p. 104. *Amer. bor.*
marginata MELS., loc. cit., p. 104. *Amer. bor.*

Species incertae sedis.

- australis** BOISD., Voy. Astr., p. 145 (1835). *Australia.*
higonia LEWIS, Ent. month. Mag., XXX, p. 34 (1894). *Japonia.*
pubescens ESCH., Entom., p. 49 (1822). *Luzon.*
pudica S. OLLIF, Austr. Mus. (Mem. 2) L. Howe Ins.
 fauna, p. 82, t. VI (1889). *L. Howe Isl.*

THYMALUS.

LATREILLE, Hist. nat. Crust. Ins., III, p. 133 (1802).

Peltis † PAYKULL.

Cf. REITTER, Deutsche Ent. Zeits., XXXIII, p. 277 (1889).

- Aubei** LÉV., Bull. Fr., 1877, p. 155 (cx). *Batum.*
chinensis FAIRM., Ann. Fr., 1899, p. 616. *China.*
laticeps LEWIS, Ent. month. Mag., XXX, p. 33 (1894). *Japonia.*
umbatus FABR., Mant. Ins., I, p. 63 (1787) (*sub*
Cassida). — [*Larva*] CHAPUIS, Mém. Liège, 1853,
 p. 417, t. 2, f. 6. *Europa, Barbaria, Asia occid.*
brunneus THUNB., Ins. Suec., p. 104 (1794). *Suecia.*
rubiginosus GMEL. (1788), Linn. Syst. nat., ed. XIII,
 p. 1643. *Europa.*
marginicollis CHEVR., in Guér., Icon. Règn. anim.,
 p. 62 (1842), t. 18, f. 2 (1834). — Cf. GUÉR., Icon.
 Règn. anim., I, Avis (1842). *Amer. bor.*
americanus STURM, Cat., 1826, p. 202. *Amer. bor.*
fulgidus ER., Germ. Zeits., V, p. 438 (1844). —
 [*Larva*] BEUTENMÜLLER, Am. Ent., VI, p. 57 (1890). *Amer. bor.*
oblongus REITT., Deutsche Ent. Zeit., 1889, p. 278. *Siber. or.*
parviceps LEWIS, loc. cit., p. 33. *Japonia.*
punctidorsum LEWIS, loc. cit., p. 33. *Japonia.*
subtilis REITT., loc. cit., p. 278. *Caucasus.*

Genus incertae sedis.

LYCOPTIS.

CASEY, Ann. N. York Acad., V, pp. 344 et 494 (1890)
(Coleop. Not., II).

villosa CASEY, loc. cit., p. 342. *Carol. mer.*

(Le total des espèces est de 476.)

ÉTUDES ARACHNOLOGIQUES

30^e Mémoire (1)

XLVII

Descriptions d'espèces nouvelles de la famille des Attidae

PAR EUGÈNE SIMON.

Lyssomanes quadrinotatus sp. nov. — ♂ Long. 6 mill. — Albido-testaceus, laevis, parte cephalica utrinque maculis ocularibus nigris binis (antica subtriquetra, altera minore subrotunda), abdomine angusto et longo, supra utrinque maculis fuscis binis (antica subrotunda, altera longa) notato, pedum tarsi, praesertim anticis, infuscatis et olivaceis, oculis pilis albo-nitidis paucis cinctis, clypeo ad marginem anguste coccineo-piloso. Chelae mediocres, haud porrectae sed divaricatae, extus ad apicem setis spiniformibus inordinatis paucis armatae, margine inferiore sulci dentibus trinis, inter se aequis et aequidistantibus, instructo. Pedes simpliciter et parce pilosi, haud fasciculati, metatarsis anticis curvatis. Pedes-maxillares mediocres, tibia mutica patella paulo longiore et graciliore curvata, tarso angusto, processu apicali cylindraceo, bulbo circiter aequilongo.

Venezuela : Colonia Tovar!

Pandisus (2) **scalaris** sp. nov. — ♂ Long. 5 mill. — Cephalothorax obscure fulvus, fusco-marginatus, regione oculorum utrinque late nigro marginata, pilis albido-viridi-micantibus laete vestita. Clypeus oculis anticis saltem duplo angustior, micanti-pilosus. Abdomen angustum, luteum, supra vitta lata, maculas binas testaceas includente, subtus utrinque macula fusca longa notatum, supra pilis albo-micantibus, in lateribus, saltem postice, pilis coccineis, laete vestitum. Chelae, partes oris, sternum coxaeque lutea. Pedes obscure fulvi, femoribus anticis subtus late infuscatis et vittatis, aculeis nigris longis et numerosis armati. Pedes-maxillares fulvi, femore subtus ad apicem nigro et minute

(1) Voir pour les mémoires 1 à 29, n^{os} 1 à XLVI, *Annales* de 1873 à 1897.

(2) **Pandisus** nov. gen. — Ab *Asamonea* differt area oculorum dorsalium, superne visa, vix 1/3 latiore quam longiore, oculis anticis et posticis maximis, intermediis minutissimis, cephalothorace alto, mamillis superioribus articulo apicali brevi munitis. — Typus *P. scalaris* E. Sim.

mucronato, patella brevi, nodosa, subtus, ad marginem inferiorem apophysi nigra lamellosa, ad basin ampliata, ad apicem acuta et uncatata armata, tibia patella paulo longiore, extus ad basin, fere supra, apophysi parva et obtusa, ad marginem inferiorem apophysi majore lamellosa nigra et antice subacuta instructa.

Madagascar : Tamatave (Camboué).

Epicharmus ⁽¹⁾ **Ernsti** sp. nov. — ♂ Long. 5 mill. — Cephalothorax humilis, longus, postice leviter ampliatus, fusco-testaceus, opacus, parte cephalica utrinque maculis ocularibus nigris notata et pilis flavidis ornata. Abdomen angustum, teretiusculum, obscure fulvum, supra fusco-bilineatum, mamillae fuscae. Sternum fusco-testaceum opacum, subtilissime coriaceum. Chelae breves, verticales et parallelae, margine inferiore sulci dentibus minutissimis seriatis (5-6) armato. Pedes longissimi et gracillimi, lutei, femoribus quatuor anticis subtus ad basin fusco-vittatis. Pedes-maxillares fusco-testacei, tibia patella paulo brevior, extus ad apicem apophysi valida, recta et obtusa armata, tarso angusto attenuato, subacuminato et recto.

Venezuela : Caracas!

Orthrus ⁽²⁾ **bicolor** sp. nov. — ♂ Long. 4 mill. — Cephalothorax laevis, fusco-rufescens, parce et tenuiter flavido-pubescent, parte cephalica utrinque, prope oculos, late nigro-marginata, thoracica macula media dilutius notata. Pili oculorum utrinque et subtus albido-flavidi, supra et in medio aurantiaci. Clypeus angustus, nudus. Abdomen angustum et longum, albidum, supra flavo-tinctum. Mamillae albae. Chelae longissimae, porrectae et attenuatae, extus deplanatae et tenuiter carinatae, nigro-aeeneae, nitentes, margine superiore subdente submedio longo et acuto, inferiore, prope medium dentibus binis subaequis, 1^o curvato, atque ad basin dentibus minoribus 2 vel 3, armato, ungue longissimo et sinuoso. Partes oris fuscae. Sternum pedesque lutea, patellis cunctis parvis et muticis, tibiis anticis aculeis inferioribus tenuibus et longis et utrinque aculeis minoribus binis armatis, metatarsis tibiis multo brevioribus, subtus aculeis longioribus

(1) **Epicharmus** nov. gen. — A *Lyssomant* differt cephalothorace humili et longo, area oculorum dorsalium multo latiore quam longiore, parte labiali haud longiore quam latiore, metatarsis pedum parcissime aculeatis, plerumque aculeo parvo basali tantum munitis. — Typus *E. gracilis* Taczan.

(2) **Orthrus** nov. gen. — Ab *Asamonea* differt oculis intermediis minutissimis pone oculos dorsales anticos (haud intus) sitis et cum oculis posticis aream parallelam formantibus. — Typus *O. bicolor* E. Sim.

3-3 munitis. Pedes postici parcellissime et minutissime aculeati. Pedes-maxillares sat longi; femore valde curvato, pilis crassis nigris, cristam longam designantibus ornato, patella tibiaque et supra et subtus crista nigra brevioris ornatis; tibia patella paulo longioris, extus ad apicem apophysi brevi, infra oblique directa, armata; tarso angusto, tibia vix longioris; bulbo ovato simplici.

♀ Long. 5 mill. — Omnino albo-testacea, parte cephalica utrinque late nigra. Chelae verticales, margine inferiore sulci dentibus acquis et subcontiguus 6 vel 7 armato.

Ins. Philippinae : Antipolo!

Onomastus ⁽¹⁾ **nigricanda** sp. nov. — ♂ Long. 4 mill. — Cephalothorax luteo-rufescens, parte cephalica testacea, pilis simplicibus pallide-flavidis crebre vestita et utrinque maculis ocularibus nigris binis notata. Pili oculorum flavidi. Pili clypei albo-argentei, fimbriam designantes. Abdomen albidum, mamillis nigris. Chelae, partes oris, sternum pedesque pallide lutea. Pedes-maxillares fulvi, supra olivacei, tarso infuscato; patella sat brevi valde convexa, extus, ad marginem inferiorem, apophysi fusca, valida et obtusa armata; tibia mutica patella brevioris et angustioris; tarso magno, acuminato.

Ins. Taprobane : Galle!

O. quinquenotatus sp. nov. — ♀ Long. 4 mill. — Cephalothorax luteo-rufescens, parte cephalica albidioris, flavido-pilosa et utrinque maculis ocularibus nigris binis notata. Pili oculorum flavidi. Pili clypei longi, albedo-argentei, fimbriam designantes. Abdomen ovatum, albidum, superne maculis nigris parvis quinque (quatuor anticis rectangulum designantibus, apicali paulo majore media), mamillis luteis. Chelae, partes oris, sternum pedesque albida, tibiis cunctis utrinque ad apicem nigro-notatis, subannulatis, femoribus patellisque anticis intus ad apicem minute nigro-punctatis.

Ins. Taprobane : Kandy ! Colombo !

O. patellaris sp. nov. — ♂ Long. 4 mill. — Cephalothorax luteo-rufescens, parte cephalica pilis simplicibus albis crasse vestita et utrinque maculis ocularibus nigris binis (antica subtriangula, altera minore subrotunda) notata. Pili oculorum et clypei pauci, albidis. Abdomen ma-

(1) **Onomastus** nov. gen. — Ab *Orthro* differt oculis intermediis minutissimis (pone oculos dorsales anticos sitis) cum oculis posticis aream anticam quam postice latioris occupantibus. — Typus *O. nigricanda* E. Sim.

millaeque albae, concoloriae. Chelae, partes oris, sternum pedesque pallide lutea. Pedes aculeis gracilibus longis et numerosis armati. Pedes-maxillares robusti; patella maxima, apicem versus ampliata et extus apophysi apicali nigra, depressa et obtusa armata; tibia mutica, patella angustiore et duplo brevior; tarso longe ovato, ciliato; bulbo valde complicato, ad marginem anteriorem apophysi longa, gracili et apice uncinata instructo.

India merid. : M^{tes} Kodeikanel.

Nealces ⁽¹⁾ **striatipes** sp. nov. — ♂ Long. 7,5 mill. — Cephalothorax fusco castaneus, utrinque et prope oculos niger, pilis pronis sat brevibus et obtusis obscure fulvis vestitus. Oculi antici pilis fulvis longis paucis cincti. Abdomen angustum et longum, supra nigricans et obscure fulvo-pubescent, ad marginem anticum setis albis paucis ornatum, subtus paulo dilutius et albido-pilosum. Chelae, partes oris sternumque nigricantia. Pedes longi et graciles, obscure fulvo-olivacei, coxis femoribusque dilutioribus sed femoribus utrinque nigricantilineatis, anticis nigro-punctatis, tibiis anticis apicem versus nigricantipunctatis, metatarsis valde infuscatis, tibiis posticis utrinque nigricantilineatis. Pedes-maxillares robusti, fusi, patella mutica, longiore quam latiore; tibia multo brevior, crassior, supra ad apicem dilatata et compressa, extus excavata et apophysi lamellosa armata; tarso magno, late ovato sed acuminato et bulbum superante; bulbo simplici, ovato et convexo.

Java merid. : Palabuan (Fruhstorfer).

N. caligatus sp. nov. — ♀ Long. 6 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, parte cephalica utrinque nigra, in medio aeneo-tincta, pilis brevibus pronis et obtusis, obscure fulvis vestitus. Oculi antici pilis longis, superne et extus fulvis, intus albidis, cincti. Abdomen longe ovatum, fulvum, supra parce fusco-punctatum sed postice punctis majoribus paucis subtriquetris notatum, subtus vitta lata nigricanti ornatum, fulvo-pubescent et supra maculis inordinatis albido-pilosis notatum, mamillis inferioribus nigris, superioribus testaceis, articulo basali extus nigro-vittato. Chelae nigricantes, laeves. Sternum fulvum, postice infuscatum. Pedes lutei, metatarsis anticis apice late infuscatis, tibiis posticis apice anguste fusco-annulatis, metatarsis latius biannu-

(1) **Nealces** nov. gen. — A *Bretto* differt oculis anticis apicibus in lineam subrectam, pedibus anticis gracilibus, haud umbriatis, metatarsis tibiis brevioribus. — Typus *N. striatipes* E. Sim.

latis, tarsis prope apicem anguste annulatis. Pedum-maxillarium femur patellaque fulva, tibia tarsusque nigri, hic apice fulvus. Area vulvae nigra, plana, magna, semicircularis, septo medio striato divisa.

Ins. Taprobane : Galle!

Brettus Martini sp. nov. — ♀ Long. 5 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, subniger, regione oculorum utrinque late nigra, cinereo-rufulo-pubescent. Abdomen oblongum, atrum, supra antice sensim dilutius, cinereo-rufulo-pubescent, subtus parcius albido-pilosum. Sternum nigrum. Pedes nigri, rufulo-pubescentes, tarsis cunctis metatarsisque sex posterioribus luteis, metatarsis 4ⁱ paris nigro-biannulatis, femoribus 1ⁱ paris subtus ad apicem, tibiis 1ⁱ paris a basi ad apicem longe et crasse nigro-fimbriatis. Plaga genitalis fovea media ovata, longiore quam latiore, carinula tenui divisa, impressa. Pedes-maxillares albi, niveo-pilosi.

Natal, Zululand (D^r C. Martin).

B. albolimbatus sp. nov. — ♀ Long. 4,5 mill. — Cephalothorax niger, antice in medio cinereo-micanti-pubescent, dein subglaber sed vitta latissima niveo-pilosa cinctus. Pili oculorum et clypei cinerei. Abdomen breviter ovatum, subrotundum, nigrum, micanti-pubescent (viridi roseoque tinctum), maculis mediis parvis albis, vittaque marginali lata, antice alba postice flavido-tincta et leviter retro-arcuata ornatum, subtus albo-pubescent sed vitta nigra, linea media alba exili secta, notatum. Chelae fusco-rufescentes, crebre fulvo alboque hirsutae. Sternum, coxae, femoraque nigra vel subnigra, albo-pilosa, tibiae quatuor anticae tibiaeque 4ⁱ paris fusco-castaneae, anticae subtus crasse nigro-fimbriatae, patellae tibiaeque 3ⁱ paris, metatarsi tarsisque cuncti lutei, apice fusco-annulati. Pedes-maxillares graciles, albi, niveo-pilosi.

India merid. : Trichinopoly (R. P. Malat).

B. semifimbriatus sp. nov. — ♀ Long. 5 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, vitta lata albo-pilosa cinctus, parte cephalica utrinque late nigro-plagiata. Pili oculorum breves, supra, oculos fulvo-rufuli, subtus albi. Clypeus parce albo-pilosus. Abdomen sat late ovatum, fusco-testaceum, supra parce nigricanti, punctatum et albido-pilosum, subtus vitta lata, nigra, linea media albo-pilosa secta, notatum. Chelae sternumque fusco-rufula, parce albo-pilosa. Pedes quatuor antici fusco-rufuli, metatarsis tarsisque luteis, tibiis subtus crasse nigro-fimbriatis. Pedes postici pallide ravid, metatarsis tarsisque luteis, cuncti numerose aculeati. Pedes-maxillares pallide lutei, albo-pilosi.

Plaga vulvae magna, subrotunda, rufula et pilosa, leviter depressa et carinula nigro-nitida parallela secta.

India merid. : Trichinopoly (R. P. Malat).

B. Adonis sp. nov. — ♀ Long. 4 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens flavido-pubescent, parte cephalica utrinque, prope oculos, late nigra, praesertim antice coccineo-pilosa. Pili oculorum breves, albid, pili clypei in medio rufuli, utrinque in genis nivei. Abdomen teretiusculum, pallide testaceum, flavido-pubescent, antice macula magna triquetra, in medio vitta transversa utrinque interrupta pallide fuscis maculae apicali majore nigra, cunctis pilis pronis splendide violaceo-micantibus vestitis supra ornatum, subtus vitta fusca integra notatum. Chelae, partes oris sternumque fulvo-rufescentia. Pedes lutei. femoribus tibiisque 1ⁱ paris fusco-castaneis, femoribus 2ⁱ paris subtus fusco-vittatis. Pedes-maxillares albid. longe et crebre albo-hirsuti. Plaga genitalis magna, ovata, longior quam latior, fulva, antice foveolata.

Ins. Taprobane : Galle !

Cocalodes papuanus sp. nov. — ♂ Long. 6 mill. — Cephalothorax obscure fulvo-rufescens, parte cephalica utrinque, prope oculos, late nigra et maculis mediis binis obscurioribus confusis notata, pilis longis simplicibus albis vestitus et vittis binis, oculos includentibus et postice convergentibus, rubro-pilosis, ornatus. Pili oculorum inter oculos et intus albi, extus rubri. Clypeus oculis anticis plus duplo angustior, niger, breviter et parce albo-pilosus. Abdomen angustum et longum (fere omnino depile), atrum, vitta dorsali dilutiore notatum. Chelae cephalothorace paulo breviores, porrectae, fusco-rufulae, nitidae, leviter micanti-tinctae. Partes oris, sternum pedesque fulva, femoribus anticis subtus late nigro-cyaneo-vittatis, femoribus patellisque 4ⁱ paris late nigricanti-plagiatis et subannulatis, aculeis longis ordinariis armati. Pedes-maxillares graciles et longi, lutei, tibia tereti, subtus in parte apicali minutissime dentata; tarso tibia longiore, extus crasse marginato, supra ad basin apophysi nigra, parva, erecta et minutissime bifida armato; bulbo valde complicato.

Nov. Guinea : Dorey (A. Raffray).

Phaeacius ⁽¹⁾ **ambriatus** sp. nov. — Long. 7 mill. — Cephalo-

(1) **Phaeacius** nov. gen. — A *Cocalo* imprimis differt stria thoracica longa, mamillarum superiorum articulo apicali basali multo minore et conico. — Typus *P. ambriatus* E. Sim.

thorax fulvo-rufescens, parte cephalica antice et utrinque, prope oculos, late nigra, crasse et crebre albido-pubescent. Pili oculorum et clypei longissimi, albi. Abdomen supra fulvo-testaceum, tenuiter reticulatum, late et confuse fusco-marginatum, subtus pallide luteum, omnino crebre albo-pubescent. Chelae robustae, convexae, fusco-rufulae, crebre et longe albo-hirsutae, margine inferiore sulci dentibus quatuor, inter se aequidistantibus. 1° et ultimo minutissimis, armato. Partes oris fuscae, late fulvo-marginatae. Sternum, pedes-maxillares pedesque lutea. Pedes longissime albo-hirsuti, valde et numerose nigro-aculeati, patellis, tibiis metatarsisque leviter fusco-variegatis. Plaga genitalis magna, rufula, latior quam longior, trapezoidalis, utrinque foveolata atque in medio septo angusto divisa.

Java : Mons Gede (Fruhstorfer).

Linus albimanus sp. nov. — ♂ Long. 7 mill. — A *L. fimbriato* Dolesch., cui affinis et subsimilis est, differt imprimis tibiis 4ⁱ paris fimbria inferiore longiore, nigro-cinerea non rufula, tibiis sex posticis haud fimbriatis, pedibus-maxillaribus maris nigricantibus, supra albo-pilosis (in *L. fimbriato* fulvis et fulvo-pilosis), apophysi tibiali longiore et divaricata, gracili sed obtusa.

India sept. : Dehra-Dun.

Codeta (1) **argenteo-limbata** sp. nov. — ♂ Long. 5 mill. — Cephalothorax fusco-piceus, utrinque fulvo-rufulo-pubescent et vitta submarginale alba sat angusta, antice evanescente ornatus, parte cephalica squamulis pronis viridi violaceoque micantibus vestita. Pili oculorum supra fulvi, subtus albidii. Clypeus fere nudus. Abdomen angustum, supra vitta nigricanti, squamulis micantibus vestita, antice latissima sed postice acuminata et utrinque vitta albo-argenteo-squamulata, postice sensim ampliata ornatum, subtus atrum, simpliciter albido-pubescent. Sternum fuscum, parce albo-pilosum. Chelae sat longae, angustae, marginibus sulci duabus subcontiguus, superiore dentibus binis inter se remotis, dente 1° obliquo, margine inferiore dentibus remotioribus trinis subcontiguus, 1° majore armatis. Pedes fulvo-rufescentes, numerosissime aculeati. Pedes-maxillares sat breves, fusci, femore crasso, subtus compresso sed versus apicem sensim ampliato et processu obtuso, apice truncato et mucrone parvo serrato ornato, insigniter mu-

(1) **Codeta** nov. gen. — A *Lino* differt oculis ser. 2^a minutissimis et pedibus haud fimbriatis, ab *Amyco* differt oculorum linea antica procurva (haud recurva) et pedibus 4ⁱ paris multo longioribus quam pedibus 3ⁱ paris. — Typus *C. argenteo-limbata* E. Sim.

Ann. Soc. Ent. Fr., LXXI, 1900.

nito, patella sat brevi, convexa supra ad apicem breviter acuminata; tibia patella brevior et angustior, subtus, ad angulum anteriorem, apophysi longa et acuta recta, secundum marginem tarsi oblique directa, apophysique media brevi sed crassa, apice truncata et minute bilobata, instructa; tarso sat late ovato, extus ad basin incisura obtusa alte marginata impresso; bulbo late ovato, apice emarginato, stylo brevi munito.

Singapore !

Amycus Pertyi sp. nov. — ♂ Long. 8,5 mill. — Cephalothorax altissimus (fere omnino depilis) laete rufescens, parte cephalica castanea, prope oculos nigra, clypeo nigro-aeneo, nudo, depresso, oculis magnis latiore. Abdomen angustum, postice acuminatum, nigricans, vitta longitudinali postice evanescente vittisque latis transversis trinis, testaceis et niveo-pilosis supra ornatum, subtus nigricans, utrinque testaceum. Mamillae nigricantes. Sternum fulvum. Partes oris castaneae, apice dilutiores, laminae longae et angustae, ad apicem divaricatae et extus dilatatae sed obtusae. Chelae longae, angustae et parallelae, oblique porrectae, ad basin nigro-aeneae, ad apicem sensim rufescentes, subtiliter coriaceae et transversim striolatae, in parte apicali extus tenuiter carinatae, margine superiore sulci, prope radicem unguis, obtuse dilatato, dein dentibus binis acutis, inter se remotis (1^o altero duplo majore) armato, margine inferiore dentibus tribus subcontiguis, 1^o reliquis majore, armato, ungue sat brevi, sed ad basin crassissimo, nec carinato nec dentato. Pedes longi, fulvo-rufescentes, femoribus sex anticis apice fusco nigrove annulatis, patella tibiaque 1^a parvis nigris, 2^a et 3^a parvis infuscatissimis sed tibiis ad basin dilutioribus, metatarsis apice fuscis. Pedes-maxillares fulvo-ravidi; femore dilutiore, sat longo et leviter curvato, superne 1-1 aculeato; patella fere duplo longior quam latior, leviter ovata, subtus ad marginem anteriorem apophysi valida, subacuta et leviter arcuata, diametro articulo brevior, armata; tibia patella saltem 1/2 brevior, multo angustior et tereti, extus ad apicem apophysi nigra sat parva, depressa, lunata et acuta armata; tarso tibia cum patella circiter aequilongo, ad basin sat lato et extus, prope apophysem tibialem, scopulam setarum nigrarum gerente, versus apicem longe attenuato; bulbo disciformi, subrotundo, antice et extus stylo libero sat valido circumdato.

Peruvia : Rio Iça (Marañon sup.).

A. igneo Perty affinis.

A. ectypus sp. nov. — ♂ Long. 8,5-7 mill. — Cephalothorax altis-

simus, fusco-rufescens, subniger, prope oculos niger, parce aurantiaco-pubescentibus, parte thoracica utrinque atque in medio longius miniaceo-pilosa. Pili oculorum pauci, rufuli. Clypeus altissimus, nudus et glaber, in medio transversim subtiliter carinatus. Abdomen angustum, postice acuminatum, supra obscure testaceum et confuse biseriatim fusco-maculatum sed omnino crebre miniaceo-pubescentibus, linea marginali alba exili et sinuosa utrinque cinctum, subtus testaceum et parce albidopilosum. Sternum obscure fulvum. Partes oris nigrae, laminae longae et angustae, apice divaricatae, extus dilatatae sed obtusae. Chelae longae, angustae et parallelae, plus minus proclives, nigro-nitidae, subtiliter coriaceae et transversim subtilissime striolatae, in parte apicali extus leviter carinatae, margine superiore sulci, prope radicem unguis, obtuse dilatato, dein dentibus binis acutis inter se remotis instructo, margine inferiore dentibus quatuor contiguos sat validis, sed basilari reliquis minore munito, ungue compresso, supra in medio carinato et minutissime dentato. Pedes longi, antici fusci, fere nigri, sed femore (apice excepto) metatarso tarsoque ad basin fulvis, reliqui pedes obscure lutei, femoribus ad apicem, patellisque saepissime leviter infuscatis. Pedes-maxillares fusco-olivacei; femore fulvo, sat longo et leviter curvato, superne 1-1 aculeato; patella circiter duplo longiore quam latiore, teretiuscula, subtus, ad marginem anteriorem, apophysi valida, compressa et subacuta, apice depressa et leviter divaricata, diametro articulo brevior, armata; tibia patella plus 1/3 brevior, multo angustior, et tereti, extus apophysi apicali nigra, gracili, depressa et acuta, articulo non multo brevior, secundum tarsum directa, instructa; tarso ad basin sat lato et extus, prope apophyse tibialem, fasciculo setarum munito, sed apicem versus longe attenuato; bulbo disciformi subrotundo, antice et extus stylo libero valido circumdato.

Brasilia : Fonteboa, S. Paulo de Olivença (prov. Amazonas); Peruvia : Pebas, Yquitos (Marañon) (de Mathan).

A. rufifrons sp. nov. — ♂ Long. 7-8,5 mill. — *Amyco ectypo* affinis. Cephalothorax niger, parte cephalica et thoracica antice laete miniaceo-pubescentibus. Pili oculorum pauci, cinerei. Clypeus altissimus, aeneotinctus et pilis albis paucis ornatus, in medio transversim subtiliter carinatus. Abdomen nigrum, parce testaceo-punctatum et vitta media integra, postice attenuata, laete flavido-pilosa supra ornatum, subtus vitta media latissima nigra obtectum. Sternum fulvo-olivaceum, ad marginem leviter infuscatum. Chelae longae, angustae, plus minus proclives, nigro-cyaneo nitidae, evidenter transversim striatae, margine superiore sulci, prope unguem, haud dilatato, dentibus binis,

1° altero duplo majore, instructo, margine inferiore dentibus quatuor contiguis, basilari minore, munito. Partes oris nigrae. Pedes longi, fulvi, femoribus ad apicem, praesertim anticis, fusco-annulatis, patellis tibiisque cunctis fuscis (posticis dilutioribus), metatarsis tarsisque 1° paris apice late fuscis. Pedes-maxillares fusci, femore fulvo, ut in praecedenti sed apophysi tibiali paulo minore, tarso paulo latiore et praesertim longiore.

Brasilia : le Para, Teffe (prov. Amazonas) ; Peruvia : Chamlireyacu (Paranapura) (de Mathan).

A. equulus sp. nov. — ♂ Long. 6,2 mill. — *Amyco ectypo* affinis. Cephalothorax niger, utrinque, prope oculos, parce rufulo-pilosus, et macula media longa pallide flavido-pilosa ornatus. Pili oculorum pauci, flavo-coccinei. Clypeus angustior, glaber. Chelae breviores, transversim distinctius striolatae, margine superiore sulci, prope radicem unguis, vix dilatato, dein dentibus binis remotis, 1° altero plus duplo majore, armato, ungue teretiusculo, haud carinato. Abdomen nigricans, antice arcu transverso albo-piloso, dein maculis mediis seriatis arcuatis et utrinque maculis majoribus binis obscure testaceis, anticis flavido, posticis albido-pubescentibus supra ornatum, subtus in medio cinereo- in lateribus albido-pilosum. Sternum fusco-olivaceum. Partes oris nigrae. Pedes antiqui nigricantes, metatarsis tarsisque ad basin fulvis, reliqui pedes castanei (postici dilutiores), femoribus obscure fuscis ad basin cum coxis anguste luteis, metatarsis tarsisque luteis. Pedes-maxillares fusci, ut in *A. ectypo* sed apophysi patellari paulo graciliore, extus leviter arcuata, tibia brevior, tarso ad basin latiore.

Brasilia : le Para ; Peruvia : Yquitos (de Mathan).

A. annulatus sp. nov. — Long. 6,2-8 mill. — *Amyco equulo* affinis et subsimilis, differt parte thoracica macula media obscure rufa et flavido-pilosa notata, chelarum ungue supra in medio alte carinato, abdomine nigricanti, vitta media paulo dilutior secto, antice macula magna semi-circulari flavido-pilosa, dein maculis longis paucis niveo-pilosis quadriseriatis supra notato, sterno fuvo-olivaceo, pedum femoribus sex posticis ad basin fulvis, ad apicem subnigris, tibiis ad apicem anguste fuscis, pedibus-maxillaribus subsimilibus sed tarso ad basin latiore.

Brasilia : le Para, Teffe, São Paulo de Olivença (de Mathan).

A. flavicomis sp. nov. — ♂ Long. 6,3 mill. — *Amyco equulo* affinis. Cephalothorax niger, parte thoracica in medio dilutior et rufescenti,

cephalica macula latissima flavo-pilosa ornata. Pili oculorum pauci, nigro-cinerei. Clypeus glaber. Abdomen intense nigrum, vitta media integra, postice sensim attenuata, albo vel flavido-pilosa supra ornatum, subtus nigrum, parce albo-pilosum, utrinque dilutius et crebrius albo-pilosum. Sternum, partes oris chelaeque ut in *A. equulo*. Pedes lutei, femoribus ad apicem (praesertim anticis) anguste fuscis, patellis tibiisque 1^a paris fusco-castaneis, reliquis leviter infuscatis. Pedes-maxillares fere ut in *A. equulo* sed apophysi patellari paulo longiore, paulo magis divaricata (superne visa) et ad basin leviter incrassata, apophysi tibiali paulo longiore et arcuata, tarso paulo angustiore.

Brasilia : le Para (de Mathan).

Maenola (1) **Starkei** sp. nov. — ♂ Long. 4 mill. — Cephalothorax castaneus, maculis ocularibus nigris notatus, parte cephalica utrinque et antice coccineo-pilosa, parte thoracica macula media luteo-pilosa ornata. Pili oculorum coccinei. Clypeus nudus, oculis mediis plus duplo angustior. Abdomen oblongum, fulvo-testaceum, supra fusco-punctatum et variegatum sed vitta media dilutiore lata et dentata, subtus vitta lata fusca, postice attenuata, notatum. Chelae latae, rufescentes, antice deplanatae et subtiliter coriaceae. Sternum pedesque lutea, femoribus anticis apice fusco-annulatis, patellis tibiisque anticis castaneis, tibiis metatarsisque posticis ad basin atque ad apicem minute fuscis. Pedes-maxillares breves et robusti, lutei, apice infuscati; patella vix longiore quam latiore; tibia multo brevior, latiore quam longiore, extus apophysibus binis : superiore angusta, longa, acuminata, apice intus uncata, inferiore lata, depressa, apice leviter ampliata et recte secta, armata; tarso sat longe-oblongo; bulbo ovato ad basin convexo, stylo robusto intus marginato.

Venezuela : San Esteban !

Acragas (2) **longimanus** sp. nov. — ♂ Long 8,5 mill. — Cephalothorax laete fulvo-rufescens, parte cephalica castanea maculis ocularibus nigris notata, antice pilis nigris longis et erectis munita, utrinque, prope oculos, miniacco-pilosa et inter oculos macula magna

(1) **Maenola** nov. gen. — Ab *Amyco* differt clypeo oculis mediis plus duplo angustiore, tibiis anticis aculeis lateralibus interioribus plurimis armatis, pedum-maxillarium maris patella mutica. — Typus *M. Starkei* E. Sim.

(2) **Acragas** nov. gen. — Ab *Amyco* differt chelarum margine inferiore sulci dentibus 5, rarius 6, inter se distantibus armato, tibiis anticis aculeis lateralibus interioribus plurimis munitis, oculis parvis ser. 2^{ae} longe ante medium sitis. — Typus *A. longimanus* E. Sim.

obliqua niveo-pilosa ornata, parte thoracica glabra sed macula media parva triquetra niveo-pilosa notata. Pili oculorum pauci, miniacei. Clypeus altissimus, nigricans, macula media late ovata, niveo-pilosa decoratus. Abdomen angustum, obscure testaceum, parce fulvo-pilosum, postice maculis nigris sex biseriatis notatum, antice arcu transverso, postice linea media nodosa, inter maculas nigras ducta, et utrinque maculis binis arcuatis niveo-pilosis supra decoratum, subtus vitta media olivacea seu nigricanti munitum. Sternum luteum. Partes oris castaneae, laminae longae, extus ad apicem dilatatae sed obtusae. Chelae fuscae, violaceo-tinctae, nitidae, longae, subparallelae et valde proclives, in parte apicali carina obliqua, apice (supra unguem) minute dentata atque ad marginem superiorem sulci dente nigro valido conico et acuto instructae, margine inferiore dentibus subaequalibus quinque armato, ungue valde curvato, supra incrassato, subtus valde compresso, utrinque sulcato. Pedes longi, pallide castanei, maculis niveo-pilosis supra ornati, femoribus, apice excepto, fulvis, tarsis luteis. Pedes-maxillares pallide flavidi, gracillimi et longissimi (cephalothorace multo longiores); patella femore haud brevior et tibia pedum anteorum longior; tibia patella paulo brevior, tereti, extus apophysi apicali nigra, parva, sinuosa et acuta armata; tarso tibia multo brevior, angusto et tereti; bulbo parvo, breviter ovato, dimidium tarsum haud superante, intus ad apicem stylo brevi sat gracili et acuto munito.

Brasilia : Teffe (de Mathan).

A. leucaspis sp. nov. — ♂ Long. 8 mill. — Cephalothorax laete fulvo-rufescens, maculis ocularibus nigris notatus, parte cephalica coccineopilosa, ad marginem anticum vitta transversa longius nigro-pilosa, cristam formante, dein macula subquadrata laete niveo-pilosa ornata, parte thoracica glabra sed macula media parva niveo-pilosa ornata. Pili oculorum laete coccinei. Clypeus altissimus, sub oculis rufo-castaneus et macula vittiformi abbreviata niveo-pilosa ornatus, praeterea niger et glaber. Abdomen angustum, albido-testaceum, superne leviter fusco-reticulatum et postice maculis nigris quatuor, inter se subcontiguus notatum, antice vitta marginali arcuata, postice, inter maculas, vitta longitudinali niveo-pilosis decoratum, subtus omnino albo-testaceum. Sternum et partes oris luteae, laminae longae, extus ad apicem dilatatae et subangulosae. Chelae fulvo-rufescentes, nitidae, extus ad apicem minutissime carinatae, haud dentatae sed ad marginem superiorem sulci dente nigro, maximo, compresso et obtuso armatae, margine inferiore dentibus minutissimis sex, ultimis binis reliquis paulo majoribus armato, ungue supra in parte apicali lamelloso-carinato. Pedes longi,

fulvo-rufescentes, femoribus tarsisque luteis. Pedes-maxillares pallide flavi, fere praecedentis, tibia apophysi apicali nigra, recta et acuta, sed ad basin incrassata munita.

Venezuela : San Esteban!

A. procalvus sp. nov. — ♂ Long. 8 mill. — *Acraga longimanui* affinis. Cephalothoracis pars cephalica antice et in lateribus minus pilosa, maculis lateralibus niveis ornata sed crista nigra carens, clypei macula alba paulo angustiore, parallela atque ad marginem breviter acuminata. Abdomen subsimile sed subtus vittâ obscuriore distinctiore. Sternum et partes oris luteo-nitida. Chelae fere ut in *A. longimanu* sed dente apicali carinae paulo majore et uncato, dente marginis latiore et compresso, ungue crassiore, carina lamellosa, apice oblique secta et angulosa, supra munito. Pedes paulo breviores, castanei, antici posticis obscuriores, superne maculis albo-pilosis ornati, femoribus, apice excepto, tarsisque dilutioribus et fulvis. Pedes-maxillares fere ut in *A. longimanu* sed apophysi tibiali ad basin paulo crassiore ad apicem leviter divaricata, stylo bulbi paulo crassiore sed acuto, extus angulatum inflexo.

Peruvia : Pebas (Marañon) (de Mathan).

A. castaneiceps sp. nov. — ♂ Long. 7,5 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, parte cephalica castanea, maculis ocularibus nigris latis notata, obscure rufulo-pubescenti, prope oculos et in medio parce niveo-pilosa et utrinque, pone oculos anticos, fasciculis nigris ornata, parte thoracica subglabra, latissime nigro-marginata. Pili oculorum mediorum rufuli, lateralium albi. Clypeus altissimus, niger, subglaber, sed in medio pilis rufulis paucis, vittam designantibus, ornatus. Abdomen angustum, supra nigricans, parce rufulo-pubescenti et vitta media integra fulva et flavido-pilosa ornatum, subtus testaceum, vitta media lata nigricanti notatum. Chelae longae, parallelae, nigro-violaceae, apice dilutiores, subtiliter transversim striolatae, dente apicali carinae vix ulla, dente marginali valida, compressa atque acuta, margine inferiore dentibus 4-5 aequis armato, ungue valido, supra, in medio, carina lamellosa humili munito. Sternum pedesque omnino fulvo-rufescentia. Partes oris nigrae. Pedes-maxillares lutei, tarso infuscato, apice tibiae albo-piloso; femore patellaque fere praecedentis; tibia patella fere duplo brevior, apophysi apicali nigra longior, valde depressa et acuta atque apophysi inferiore fulva, crassa et obtusa instructa; tarso tibia longior et latior, longe producto; bulbo subrotundo,

dimidium tarsum tantum occupante, stylo libero sat gracili fere omnino circumdato.

Brasilia : le Para (de Mathan).

A. phasianinus sp. nov. — ♂ Long. 7,5 mill. — *Acraga longimanui* affinis. Cephalothorax laete fulvo-rufescens, parte cephalica rufo-castanea et maculis ocularibus nigris notata, ad marginem anticum et prope oculos miniaceo-pilosa, utrinque, inter oculos, macula obliqua atque macula media subrotunda niveo-pilosis decorata, parte thoracica glabra. Clypeus altissimus, nigricans, glaber. Abdomen testaceum, supra late nigricans, antice arcu transverso, prope medium punctis binis, postice vitta media et utrinque vittis obliquis abbreviatis niveo-pilosis decoratum, subtus testaceum, postice, prope mamillas, macula parva olivacea notatum. Sternum luteum, nitidum. Partes oris fulvo-rufulae. Chelae fere ut in *A. longimanu*, fusco-violaceae, subtiliter coriaceae, nitidae, dente apicali carinae paulo longiore, erecto et uncato, dente marginis valido, compresso et acuto, margine inferiore dentibus subaequis 4-5 armato, ungue crasso, supra, prope medium, valde compresso et lamelloso, apice oblique et sinuoso secto. Pedes fusco-castanei, supra niveo-pilosi, femoribus, apice excepto, flavo-ravidis, tarsis luteis. Pedes-maxillares fere ut in *A. longimanu* sed apophysi tibiali multo longiore, gracili, depressa et apice oblique truncata; bulbo ovato, dimidium tarsum vix attingente, stylo crasso, sinuoso et subanguloso, apice abrupte angustiore et extus inflexo munito.

Brasilia : Tijuca prope Rio (E. Gounelle).

A. miniaceus sp. nov. — ♂ Long. 7,7 mill. — *A. longimanui* affinis. Pars cephalica obscure castanea, antice et prope oculos miniaceo-pilosa, utrinque, inter oculos, macula magna pallide flavo-pilosa ornata, antice haud cristata, pars thoracica macula media flavida notata. Clypeus macula alba angusta, attenuata, marginem haud attingente ornatus. Abdomen fere *A. longimanus* sed obscurius, arcu transverso maculisque lateralibus flavidis munitum sed vitta postica carens, subtus fulvo-testaceum, haud vittatum. Sternum luteum. Partes oris fuscae. Chelae fere *A. longimanus* sed in parte apicali fortius coriaceae, dente apicali carinae minutissimo, vix ullo, sed dente marginali lato, valde compresso et leviter lanceolato, margine inferiore dentibus quinque, apicem versus sensim minoribus munito, ungue minus dilatato, compresso, haud sulcato, supra in parte basali leviter depresso et minutissime mucronato. Pedes paulo breviores et crassiores, fusco-castanei, maculis parvis niveo-pilosis supra ornati, femoribus in parte

basali tarsisque fulvis. Pedes-maxillares fere ut in *A. longimanu* sed tibia paulo brevior, apophysi ad basin latiore et depressa, tarso paulo majore, nigricanti, bulbo majore, dimidium tarsum superante, stylo crasso et obtuso munito.

Var. — Pili cephalothoracis et macularum abdominis nivei, pedes pallidiores.

Brasilia : Rio Tocantins ; Peruvia : Tarapoto (Rio Mayo) (de Mathan).

A. erythraeus sp. nov. — ♂ Long. 6,5 mill. — *A. longimanui* affinis. Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica castaneo-tincta, ad marginem anticum et prope oculos posticos coccineo-pilosa, utrinque, inter oculos, macula magna flavo-pilosa et pone oculos anticos pilis nigris longis, erectis et fasciculatis ornata, parte thoracica macula media flavo-pilosa decorata. Pili oculorum pauci, miniacei. Clypeus fuscus, glaber. Abdomen fere praecedentis sed vitta media flavida supra notatum, subtus omnino testaceum. Sternum luteum. Partes oris infuscae. Chelae fere *A. miniacei*. Pedes fusco-olivacei, supra maculis niveo-pilosis decorati, postici anticis dilutiores, coxis, femoribus (apice excepto), metatarsis tarsisque pallide luteis. Pedes-maxillares fere praecedentis sed apophysi tibiali ad basin lata, apicem versus valde acuminata et acuta, bulbo ovato, dimidium tarsum superante, stylo sat crasso, tereti et obtuso munito.

Brasilia : Terra Nova prope Bahia (E. Gounelle).

A. humilis sp. nov. — ♂ Long. 6 mill. — *A. longimanui* affinis. Cephalothorax humilior, parte cephalica ad marginem anticum et prope oculos dorsales aurantiaco-pilosa, utrinque, inter oculos, late niveo-maculata sed crista nigra carente. Clypeus paulo humilior, macula media niveo-pilosa, late ovata ornatus. Abdomen fere ut in *A. longimanu* sed supra obscurius, fere nigrum et vitta media nivea, antice ampliata ornatum, subtus luteum, sed postice vittis nigris binis abbreviatis ornatum. Sternum luteum. Partes oris infuscae. Chelae distinctius coriaceae, dente apicali vix ullo, dente marginali valido compresso, apice oblique truncato et leviter exciso, margine inferiore dentibus quinque sat validis et subcontiguis, versus apicem sensim minoribus armato, ungue minus dilatato, compresso, supra leviter carinato, in parte basali leviter depresso et minute mucronato. Pedes fusco-castanei, supra maculis niveo-pilosis ornati, postici dilutiores, femoribus, metatarsis (apice excepto) tarsisque luteis. Pedes-maxillares fere ut in *A. longimanu* sed breviores, apophysi tibiali supra ad basin paulu-

lum dilatata dein gracillima et acuta, bulbo ovato, dimidium tarsum paulo superante, stylo crasso et obtuso munito.

Brasilia : Rio Salobro (E. Gounelle).

Hypaeus ⁽¹⁾ **tenuimanus** sp. nov. — ♂ Long. 7 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica infuscata, utrinque late nigra, pilis fulvo-coccineis, antice longioribus crebre vestita et utrinque, prope oculos posticos, macula niveo-pilosa ornata. Pili oculorum pauci, fulvi. Clypeus subglaber, oculis mediis latior. Abdomen supra fusco-aeneum, confuse nigro-plagiatum, antice maculis binis, dein macula media subtriquetra et postice maculis minoribus binis niveo-pilosis decoratum, subtus fusco-testaceum. Sternum luteum. Partes oris fuscae. Chelae longae, nigrae, sublaeves, antice, prope medium, dentibus binis subgeminatis, exteriore altero duplo majore insigniter instructis, margine inferiore sulci dentibus parvis trinis, ab apice longe remotis, sed inter se contiguis armato, ungue longo simplici sat gracili. Pedes longi, antici fusco-castanei, metatarsis tarsisque dilutioribus, reliqui pedes lutei, patella tibiaque 2^a paris leviter castaneis. Pedes-maxillares graciles et longi; femore longo, tereti, intus prope apicem minutissime tuberculato; patella plus quadruplo longiore quam latiore, tereti; tibia patella vix brevior, angustior, extus ad apicem apophysi superiore fusca, brevi sed crassa, apophysique inferiore fere aequilonga sed gracillima instructa; tarso parvo, simplici, disciformi, dimidium tarsum haud superante.

Brasilia : S. Paulo de Olivença (de Mathan).

H. vividus sp. nov. — ♂ Long. 6-8 mill. — Cephalothorax nigellus parte thoracica antice dilutior et rufula, cephalica, praesertim antice fulvo-ravido-pubescenti, utrinque macula obliqua et postice, inter oculos, macula media acute triquetra pallide flavido-pilosis ornata. Pili oculorum pauci, fulvo-rufuli. Clypeus glaber, oculis magnis paulo angustior. Abdomen angustum, supra fusco-aeneum, parce fulvo-pilosum, antice punctis binis, dein lineis marginalibus abbreviatis albo-pilosis ornatum, subtus fusco-testaceum, vitta nigro-cyanea notatum. Chelae sat longae et divaricatae, nigro-nitidae, subtiliter et parce striatae, margine superiore sulci dentibus quatuor, inferiore dentibus

(1) **Hypaeus** nov. gen. — Ab *Amyco* differt chelarum margine superiore dentibus seriatis 4, 5 vel 6 subcontiguis, angulari (3^o vel 4^o) reliquis paulo majore armato. — Typus *H. porcatus* Taczan.

tribus subaequis, inter se remotis armatis, ungue simplici, tereti. Sternum et partes oris fusco-olivaceae. Pedes longi, antici nigri vel fusci, metatarsis tarsisque dilutioribus, interdum fulvis, reliqui pedes lutei, apice femorum patellisque vix infuscat. Pedes-maxillares fusci, sat graciles; patella tereti, plus triplo longiore quam latiore; tibia patella saltem $\frac{1}{4}$ brevior, angustior et tereti, extus ad apicem leviter dilatata et apophysibus binis nigris brevibus armata; superiore depressa, antice directa et breviter lanceolata, inferiore minore, conica et divaricata; tarso mediocri, tibia cum patella paulo brevior, ad basin paulo latior; bulbo disciformi, subrotundo, apice leviter depresso, intus stylo valido marginato.

Brasilia : Tefte, S. Paulo de Olivença; Peruvia : Pebas, Yquitos (de Mathan).

H. triplagiatus sp. nov. — ♂ Long. 7 mill. — Cephalothorax pallide fusco-castaneus, maculis ocularibus nigris notatus, parte cephalica parce coccinco-pilosa, utrinque, inter oculos, macula obliqua, et postice, fere inter oculos posticos, macula laete flavo-pilosis ornata. Clypeus glaber, oculis magnis circiter $\frac{1}{3}$ angustior. Abdomen supra nigrum, vitta media integra et utrinque vitta marginali angustior et sinuosa testaceis et flavo-pilosis ornatum, subtus obscure testaceum, vitta media lata nigricanti notatum. Sternum olivaceum. Partes oris nigricantes. Chelae fusco-nitidae, aeneo-tinctae, laeves et nitidae, vix distincte striatae, haud carinatae, margine superiore sulci dentibus quatuor, 3^o reliquis majore, inferiore dentibus trinis aequis armatis. Pedes lutei, femoribus, patellis tibiisque 4ⁱ paris, praesertim in lateribus valde infuscat. Pedes-maxillares fulvi; patella saltem duplo longior quam latior, subtereti; tibia patella fere $\frac{1}{3}$ brevior, paulo angustior, teretiuscula, extus apophysi apicali nigra, brevi et bifida (ramulo superiore crasso, depresso, antice directo et apice truncato cum angulo superiore breviter et acute producto, ramulo inferiore divaricato atque acuto); tarso patella cum tibia brevior, sat late ovato, intus crasse piloso; bulbo disciformi, subrotundo, stylo apicali valido sed acuto munito.

Brasilia : Rio Tocantins, Fonteboa; Peruvia : Cavallo Cocho (de Mathan).

H. venezuelanus sp. nov. — ♂ Long. 6,5 mill. — Cephalothorax fusco-castaneus, regione oculari utrinque nigra, parte cephalica fulvo-aurantiaco-pilosa et utrinque antice, pone oculos, pilis longioribus erectis nigro-sericeis, aream obliquam occupantibus ornata, parte

thoracica vitta media luteo-pilosa ornata. Pili oculorum coccinei. Clypeus nudus, oculis mediis latior. Abdomen supra nigrum, vitta lata valde flexuoso-dentata, testaceo-albida omnino marginatum et maculis parvis obliquis quatuor luteo-pilosis, aream quadratam designantibus ornatum, subtus vitta lata nigra, testaceo-marginata notatum. Mamillae superiores nigrae, inferiores olivaceae. Chelae longae, nigricantes, transversim subtiliter striatae sed area apicali rufula nitida, intus tenuiter carinata, extus dente mediocri acuta et uncata armata, notata, margine superiore sulci dentibus quatuor (2° et 3° majoribus), margine inferiore dentibus parvis aequis 5 vel 6 armatis, ungue robusto, supra, prope medium, leviter dilatato. Sternum fusco-rufulum. Pedes antici fusco-castanei, femoribus nigris, metatarsis tarsisque luteis. Pedes quatuor postici omnino lutei. Pedes-maxillares longissimi et gracillimi, corpore toto haud breviores, albo-testacei; femore ad basin plus minus infuscato; patella tenui, longissima (femore non brevior); tibia tenui, patella brevior, apice leviter incrassata, extus ad angulum inferiorem apophysi recta, depressa, obtusa et longissime crinita, ad angulum superiorem apophysi longiore gracili, leviter curvata apice minute uncata munita; tarso angusto et tereti, multo brevior sed bulbum ovatum multo superante.

Venezuela : San Esteban ! Valencia !

H. estebanensis sp. nov. — ♂ Long. 6 mill. — A praecedenti, cui valde affinis et subsimilis est, differt abdomine supra fulvo, vitta marginali maculisque quatuor obliquis flavido-pilosis supra ornato, subtus omnino testaceo, haud vittato, chelarum maris calcare subapicali longiore, graciliore et valde uncato.

Venezuela : San Esteban !

H. quadrinotatus sp. nov. — ♂ Long. 5 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica maculis ocularibus nigris notata, pilis lacte coccineis, versus medium sensim flavido-tinctis, ad marginem anticum longioribus et cristam formantibus crebre vestita. Pili oculorum pauci, coccinei, sub oculis mediis nigri. Clypeus oculis mediis circiter $\frac{1}{4}$ angustior, subglaber, setis fulvis paucis conspersus. Abdomen fulvo-testaceum, punctis fuscis biseriatis sex notatum, antice flavo-nitido-pilosum, utrinque maculis obliquis niveo-pilosis ornatum, subtus luteum. Sternum et partes oris lutea. Chelae breves, fuscae, coriaceae, extus nec carinatae nec dentatae, sed intus ad basin tuberculo obtuso munitae, margine superiore sulci sat profunde emarginato dein dilatato et dentibus subaequalibus 7 munito, margine inferiore

dentibus minoribus aequis et contiguis 5 armato, ungue prope medium carina lamellosa, alte lobata munito. Pedes lutei, femoribus (quatuor anticis fere usque ad basin, reliquis tantum ad apicem) infuscatis, subnigris seu olivaceis. Pedes-maxillares lutei, tarso infuscato; patella plus duplo longiore quam latiore, tereti; tibia patella fere $\frac{1}{3}$ brevior, angustior, apophysi apicali nigra, gracili et acuta, sat longa, antice directa et leviter curvata armata; tarso patella cum tibia haud brevior, latiore, attenuato et leviter curvato; bulbo disciformi, stylo libero fere omnino marginato.

Brasilia : Teffe, Fonteboa (de Mathan).

H. porcatus Taczanowski, *Hor. Soc. ent. Ross.*, 1872 (*Attus*). — ♂ Long. 7 mill. — Cephalothorax niger, parte cephalica utrinque, inter oculos, albo-pilosa, ad marginem frontalem setis longis et erectis nigro-sericeis, cristam (in medio quam ad laterales paulo brevior) formantibus ornata, parte thoracica antice paulo dilutior et macula albo-pilosa ornata. Pili oculorum pauci, albidus. Clypeus glaber, oculis anticis non multo angustior. Abdomen angustum, testaceum, supra, praesertim postice, fusco-variatum, maculis biserialis 4-4, anticis parvis reliquis majoribus et longis, et utrinque serie macularum minorum niveo-pilosus decoratum, subtus luteum. Sternum fulvo-olivaceum. Chelae parum longae, latae, antice deplanatae, apice paululum depressae et extus apophysi marginali maxima, obtusa et oblique truncata armatae, margine inferiore sulci dentibus quatuor (1 et 2 reliquis majoribus) instructo, ungue simplici. Pedes 1ⁱ paris fere nigri, femore ad basin metatarsoque ad apicem fulvis, patella superne tibiaque ad basin albo-pilosis, reliqui pedes lutei, femoribus ad apicem patellis tibiisque ad basin atque ad apicem leviter infuscatis. Pedes-maxillares medio-cres, flavii, tarso infuscato; femore gracili et curvato; patella plus duplo longiore quam latiore; tibia patella multo brevior, apophysi superiore nigra, acuta, valde hamata et supra sulcata apophysique inferiore maxima, depressa, truncata et subquadrata extus armata; tarso medio-cris, subparallelo; bulbo simplici, disciformi, stylo libero, intus marginato.

Cayenne.

H. flavipes sp. nov. — ♂ Long. 6,7 mill. — Cephalothorax niger, parte thoracica vix dilutior, cephalica utrinque pilis coccineis, in medio pilis obscuris olivaceis, ad marginem frontalem pilis nigro-sericeis longissimis, cristam magnam erectam designantibus vestita. Pili oculorum pauci, cinerei, secundum oculos laterales coccinei. Clypeus

glaber, oculis magnis haud angustior. Abdomen angustum, testaceum, flavo-nitido-pubescent, vitta fusco-castanea, postice sensim attenuata, vittaque ventrali lata sed vix expressa notatum. Sternum et partes oris castanea. Chelae fuscae vel nigrae, coriaceae, leviter striatae, prope apicem longitudinaliter impressae, atque ad marginem exteriorem, paulo pone medium, dente parvo et obtuso munitae, margine superiore sulci dentibus quinque, 4^o majore, inferiore dentibus parvis subaequis quatuor armatis, ungue ad basin crasso et cylindrato, dein elevato et acute bicarinato. Pedes flavi, coxis et apice tibiæ 4ⁱ paris infuscat. Pedes-maxillares flavi, tarso leviter infuscat; femore robusto, fusiformi, versus basin attenuato; patella femore angustiore, tereți, plus duplo longiore quam latiore; tibia patella brevior, versus basin angustior, extus ad apicem truncata, ad angulum superiorem apophysi gracili, simplici et acuta, ad angulum inferiorem leviter producta et subacuta; tarso parvo et angusto, tibia cum patella brevior; bulbo nigro, simplici et disciformi.

Brasilia : le Para, Cameta (de Mathan).

H. miles sp. nov. — ♂ Long. 7,5 mill. — Ab *H. flavipedi* valde affinis. Cephalothorax subsimilis, sed parte thoracica macula media dilutior, albo-pilosa ornata et crista frontali nigra, longa et erecta munita. Abdomen supra pallide fusco-testaceum, vitta media dilutior, parce fulvo-pubescenti et maculis parvis biseriatis albo-pilosis ornatum, subtus testaceum, vitta media latissima nigra notatum. Sternum fulvo-olivaceum. Partes oris obscure fuscae, fere nigrae. Chelae nigro-cyaneae, versus apicem dilutiores et rufescentes, extus in parte apicali validissime dilatatae et turbinato-productae, margine inferiore sulci dentibus validis contiguis tribus armato, ungue simplici, haud carinato. Pedes lutei, apice femoris, patella tibiaque 4ⁱ paris nigro-castaneis sed tibia inferne et in medio paulo dilutior, pilis albis annulati. Pedes-maxillares lutei, fere ut in *H. flavipedi*, sed tibia extus ad apicem haud calcarata, leviter dilatata et carina obtusa nigra simpliciter munita.

Brasilia : S. Paulo de Olivença (prov. Amazonas) (de Mathan).

H. annulifer sp. nov. — ♂ Long. 7,5 mill. — *H. flavipedi* affinis. Crista frontralis cinereo-nigra, longa et erecta, postice pilis brevioribus fulvis mixta, partis cephalicae macula lateralis interocularis et partis thoracicae macula media pallidissime flavo-pilosae. Pili oculorum pauci, flavidi. Clypeus oculis mediis haud vel non multo angustior, ad marginem pilis albis longis munitus. Abdomen pallide testaceum, supra infuscatum et vittis binis dilutioribus notatum, antice arcu transverso

dein lineis binis parallelis pallide flavo-pilosis decoratum, subtus concolor. Chelae fere ut in *H. flavipedi*, sed fusco-rufulae, dente exteriori paulo validiore et subacuto, margine inferiore sulci dentibus validioribus quatuor contiguis munito, ungue simplici, haud elevato, vix distincte carinato. Sternum luteum. Pedes longiores lutei, femore, patella, basi apiceque tibiae 1^a paris valde infuscat, interdum subnigris. Pedes-maxillares lutei, albo-pilosi, femore patellaque ut in *H. flavipedi*; tibia brevior, intus ad apicem producta, extus apophysi superiore fusca, parva, obtusa et valde uncata, apophysique inferiore multo majore, antice oblique directa, apicem versus leviter incrassata, rotunda vel obtuse truncata armata; bulbo stylo validiore sed acuto munito.

Brasilia : Fonteboa (de Mathan).

H. ignicomis sp. nov. — ♂ Long 7 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica obscuriore et prope oculos nigra, crista frontali longa, lata et erecta, laete coccinea, utrinque inter oculos macula lata et postice macula media parva albo-pilosis ornata, parte thoracica macula media majore alba notata. Pili oculorum coccinei. Clypeus subglaber, oculis medijs latior. Abdomen angustum, fusco-testaceum, maculis magnis albo flavidove pilosis biserialis 3-3 supra ornatum, subtus vitta media obscuriore parum expressa notatum. Sternum fulvo-rufescens. Partes oris castaneae. Chelae fusco-rufulae, apice dilutiores, sublaeves, in parte apicali late impressae et dente exteriori magno lato, obtuso et leviter uncato instructae, margine superiore sulci dentibus 4 vel 5, 3^o angulari reliquis majore, margine inferiore dentibus 4 aequis armatis, ungue simplici, leviter carinato. Pedes longi, lutei, femoribus ad apicem, patellis cunctis, tibiis ad basin atque ad apicem (praesertim anticis) late fusco-annulatis. Pedes-maxillares lutei, albo-pilosi, tibia tarsoque castaneis, fere ut in *H. flavipedi* sed tibia longiore, apophysi superiore majore, crassa, depressa, apice rotunda, apophysi inferiore obtusissima et lobiformi.

Brasilia : S. Paulo de Olivença (de Mathan).

H. frontosus sp. nov. — ♂ Long. 6,5 mill. — *H. ignicomi* valde affinis. Cephalothoracis pars cephalica antice rubro-cristata, sed inacula frontali-media albido-pilosa ornata, utrinque, inter oculos, aurantiaco (haud albo) pilosa et macula media triquetra flavida notata, macula media thoracica flavido-pilosa. Pili oculorum pallide flavi. Clypeus paulo angustior. Chelarum dens exterior brevior, valde depressus, obtuse triqueter, margo inferior dentibus contiguis trinis, 1^o majore, tantum armatus. Pedes, praesertim postici, minus distincte annulati. Pedes

maxillares fere ut in *H. ignicomi* sed fere omnino lutei, apophysi tibiali superiore minore, recta et subacuta, inferiore fere obsoleta.

Brasilia : Le Para, S. Paulo de Olivença (de Mathan).

H. luridomaculatus sp. nov. — ♂ Long. 7 mill. — *H. ignicomi* affinis. Pars cephalica crista frontali obscure fulvo-coccinea, maculis lateralibus maculaque media postica albido-flavidis ornata. Pili oculorum supra et in medio coccinei, extus et subtus albi. Abdomen, chelae pedesque ut in *H. ignicomi*. Pedes-maxillares subsimiles sed tibia patella evidentius brevior, haud infuscata, apophysi tibiali superiore nigra, ad basin lata sed acute triquetra, inferiore fere obsoleta.

Brasilia : Fonteboa (de Mathan).

H. furcifer sp. nov. — ♂ Long. 5,7 mill. — Cephalothorax fulvofuscus, parte cephalica maculis ocularibus nigris notata, crista frontali coccinea longa ornata, utrinque parce flavido-pilosa et postice, prope oculos, pilis coccineis ornata. Pili oculorum coccinei. Clypeus oculis mediis paulo angustior, infuscatus, ad marginem pilis longis paucis albis munitus. Abdomen angustum, fulvum, maculis fuscis maculisque niveo-pilosis arcuatis biserialis (3-3) supra ornatum, subtus concolor. Sternum luteum. Partes oris castaneae, apice dilutiores. Chelae longae, subparallelae, muticae, haud carinatae, subtiliter coriaceae, margine superiore sulci dentibus minutissimis 7 vel 8 (6° angulari, reliquis majore), inferiore dentibus 5 vel 6, inter se subcontiguis et radicem unguis fere attingentibus armatis, ungue simplici, haud carinato. Pedes sat longi, lutei, femoribus ad apicem, patellis tibiisque quatuor anticis, metatarsis tarsisque 4ⁱ paris fusco-castaneis. Pedes-maxillares lutei, tarso fusco; femore sat longo, tereti, ad basin leviter attenuato; patella tereti, plus triplo longior quam latior; tibia patella plus 1/3 brevior et ad basin angustior, supra ad apicem obtuse prominula, extus apophysi apicali nigra, ad basin convexa, ad apicem truncata et minute bifida instructa; tarso mediocri, attenuato, tibia cum patella brevior; bulbo late ovato, disciformi, intus stylo robusto sed acuto, ad apicem lamina nigra depressa, obtusa et curvata munito.

Brasilia : le Para (de Mathan).

H. concinnus sp. nov. — ♂ Long. 5,7 mill. — Ab *H. furcifero*, cui valde affinis est, differt parte cephalica crista frontali ex pilis longis coccineis flavisque mixtis, et utrinque, inter oculos, macula magna flavescens-pilosa ornata, clypeo angustior, in medio, sub oculis, macula vel vitta lata, longe et crebre niveo-pilosa decorato. — Chelae

subsimiles, sed margine inferiore sulci, dentibus trinis, 1^o minore tantum armato. Pedes-maxillares subsimiles, sed apophysi tibiali apice simpliciter truncata cum angulo superiore minute dentato; bulbo stylo validiore, depresso sed acuto munito.

Brasilia : Teffe (de Mathan).

H. nigrocomosus sp. nov. — ♂ Long. 6,7 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica leviter obscuriore et prope oculos nigra, antice fulvo, utrinque, inter oculos, flavido-pubescenti et pone marginem frontalem pilis erectis nigro-sericeis, aream transversim ovatam occupantibus ornata. Pili oculorum fulvi, inter oculos medios albi. Clypeus oculis anticis non multo angustior, utrinque glaber, in medio longe et creberrime niveo-pilosus. Abdomen angustum, fulvo-testaceum, punctis nigris sex biseriatis maculisque parvis niveo-pilosis et utrinque maculis binis (2^a minore) albis decoratum, subtus vitta latissima obscuriore notatum. Sternum luteum. Partes oris castaneae. Chelae fusco-rufulae, nitidae, apice sublaeves, ad basin subtiliter striolatae, extus prope medium paululum convexae, margine superiore sulci dentibus 5, medio paulo majore, inferiore dentibus trinis, 1^o subapicali, obtuso, reliquis binis validioribus, acutis et subgeminatis, armatis, ungue simplici, apice compresso. Pedes longi, antichi fusco-castanei, femoribus ad basin, metatarsis tarsisque fulvis, reliqui pedes lutei, femoribus ad apicem, patellis tibiisque plus minus castaneo-tinctis. Pedes-maxillares lutei, apice infuscati; patella haud duplo longiore quam latiore; tibia patella vix brevior, apophysibus longis binis extus armata, apophysi superiore angulum occupante, longa et recta sed apice leviter uncata, inferiore valde arcuata, gracili sed depressa et leviter lamellosa; tarso sat longo, leviter curvato, intus crasse piloso; bulbo brevi, apice obtuse truncato et subquadrato, stylo obliquo, simplici, gracili et longo intus atque ad apicem marginato.

Brasilia : Teffe (de Mathan).

H. cucullatus sp. nov. — ♂ Long. 6,5 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, versus marginem sensim infuscatus, maculis ocularibus nigris notatus, parte cephalica utrinque late albo-pilosa antice, supra oculos, vitta transversa longe et crebre nigro-pilosa ornata, parte thoracica macula media magna, subtriquetra, albo-pilosa ornata, clypeo, saltem in medio, longe et crebre albo-barbato. Abdomen angustum, fulvo-testaceum, supra antice vitta transversa, dein maculis seriatis trinis et utrinque vittis obliquis arcuatis binis niveis ornatum, mamillis saltem inferioribus olivaceis. Sternum luteum. Chelae fere praecedentes.

tis, sed margine superiore sulci dentibus trinis, medio paulo majore armato, ungue supra obtuse tuberculato. Pedes longi et robusti, lutei, femoribus ad apicem anguste fusco-annulatis, patellis tibiisque, praesertim in lateribus, valde infuscatis. Pedes-maxillares lutei; patella haud duplo longiore quam latiore; tibia patella saltem duplo brevior, extus ad apicem apophysi lata, apice truncata, cum angulo inferiore obtuso, superiore longe producto, gracili, apice subacuto et valde uncato armata; tarso sat lato; bulbo disciformi, rubro, stylo longissimo, circulos binos formante circumdato.

Ecuador merid. : Loja (Gaujon).

Noegus ⁽¹⁾ **transversalis** sp. nov. — ♂ Long. 5,8 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica obscuriore, prope oculos nigra, pilis coccineis, antice longioribus et cristam formantibus, crebre vestita, utrinque, inter oculos, macula lata pallide flavo-pilosa, ornata, parte thoracica subglabra, area media flavido-pilosa ornata. Pili oculorum supra coccinei, infra oculos pallide flavi. Clypeus depressus, oculis mediis circiter $\frac{1}{3}$ angustior, utrinque glaber, in medio creberrime pallide flavo-pilosus. Abdomen angustum, luteo-testaceum, supra maculis albis sex biserialis ornatum, subtus leviter infuscatum. Sternum fulvum, nitidum. Chelae mediocres, parallelae, fusco-violaceae, in parte apicali dente exteriori acuto munitae. Pedes longi, lutei, quatuor antici obscuriores et rufescentes, femoribus tibiisque utrinque late fusco-vittatis, femoribus posticis apice fusco-annulatis, patellis tibiisque utrinque plus minus fusco-lineatis. Pedes-maxillares lutei; femore gracili; patella tereti, plus duplo longiore quam latiore; tibia patella saltem $\frac{1}{3}$ brevior et paulo crassior, supra apice leviter prominula et minute bifida; ramulo superiore brevissimo et obtuso, ramulo exteriori longiore, divaricato atque obtuso; tarso tibia cum patella longiore, sat late ovato, leviter curvato et longe attenuato; bulbo magno, disciformi, stylo spirali omnino circumdato.

Brasilia : le Para, Cameta (Rio Tocantins), Teffe (de Mathan).

N. fulvocristatus sp. nov. — ♂ Long. 5,5 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica nigra, ad marginem frontalem vitta transversa lata, longe fulvo-pilosa et utrinque, prope oculos posticos, macula parva lunata, niveo-pilosa ornata, parte thoracica versus marginem sensim obscurior sed macula media albo-pilosa ornata. Pili

(1) **Noegus** nov. gen. — Ab *Hypaeo* differt chelarum margine superiore dente angulari sat valido, remoto, tantum armato. — Typus *N. vulpio* E. Sim.

oculorum supra aurantiaci, infra oculos flavidi. Clypeus depressus, nigricans, parce albo-pilosus, oculis magnis saltem 1,3 angustior. Abdomen angustum, luteo-testaceum, antice infuscatum, antice vittis duabus abbreviatis, postice punctis binis niveo-pilosis supra ornatum, subtus vitta media obscuriore vix expressa notatum. Sternum olivaceum. Partes oris fuscae. Chelae longae, nigrae, subtiliter rugosae et parce rugatae, extus, pone medium, dente parvo et acuto armatae, margine superiore sulci dentibus binis, 1^o majore, inferiore dentibus quatuor contiguis, 1^o et 2^o paulo majoribus instructis, ungue simplici, haud carinato. Pedes lutei, antichi, metatarsis tarsisque exceptis, fusco-olivacei. Pedes-maxillares obscure fulvi, ad basin dilutiores; femore longo et gracili; patella plus triplo longiore quam latiore, versus basin leviter attenuata; tibia patella saltem 1/3 brevior, ad basin angustior, supra ad apicem obtuse prominula et extus apophysi brevi, gracili, valde curvata et apice oblique truncata armata; tarso angusto, longo, longe producto; bulbo breviter ovato, subrotundo, dimidium tarsum haud superante, stylo libero gracillimo munito.

Brasilia : le Para.

N. rufus sp. nov. — ♂ Long. 5,7 mill. — *N. transversali* affinis. Cephalothoracis pars cephalica ad marginem anticum longe coccineo-cristata, praeterea laete flavo-aurantiaco pubescens, pars thoracica subglabra, pilis flavidis paucis conspersa. Clypeus in medio, usque ad marginem, crebre flavido-pilosus. Abdomen luteo-testaceum, antice maculis subcontiguis atris supra notatum. Pedes quatuor antichi fusco-castanei, tarsis 1ⁱ paris, metatarsis, tarsis basique femorum 2ⁱ paris dilutioribus et luteis, pedes postici lutei, femoribus ad apicem vix infuscatis. Pedes-maxillares graciles, obscure fulvi; patella teretiuscula, plus quadruplo longiore quam latiore; tibia patella fere duplo brevior, apice obtuse truncata atque ad angulum anteriorem apophysi divaricata, brevi, gracili sed obtusa instructa; tarso tibia cum patella vix brevior, tereti, angusto et leviter curvato; bulbo breviter ovato vel obtuse cordiformi, dimidium tarsum haud superante, intus stylo brevi marginato.

Brasilia : Rio Tocantins; Peruvia : Rio Iça.

N. niveomarginatus sp. nov. — ♂ Long. 5,8 mill. — A *N. transversali*, cui valde affinis et subsimilis est, differt parte thoracica versus marginem infuscata, parte cephalica utrinque niveo (haud flavido) pilosa, clypeo latiore et linea transversa angusta, albo-barbata ornatò, chelis paulo longioribus, dente anteriore minore armatis, tibia pedum-

maxillarium supra ad apicem late truncata atque ad angulum anteriorem apophysi longa, gracillima et styliformi, antice directa munita.

Brasilia : Cameta (Rio Tocantins).

N. coccineus sp. nov. — ♂ Long. 5,7 mill. — A *N. niveomarginato*, cui affinis est, differt cephalothorace latiore, parte cephalica antice et in lateribus, usque ad oculos posticos, coccineo-pubescenti, in medio (?) parce flavido-pilosa, clypeo subglabro, pilis longis, albis, paucis tantum consperso, abdomine supra fusco, maculis anticis duabus utrinque subcontiguas et vittam formantibus notato, chelis latioribus, dente anteriore validiore et in parte basali sito munitis, pedibus luteis, anticis, tarso excepto, fusco-rufulis. Pedes-maxillares longi et tenues, fusco-rufuli, apice dilutiores; femore gracili; patella plus quadruplo longiore quam latiore, tereti sed versus basin leviter attenuata; tibia patella circiter $\frac{1}{3}$ brevior, sed multo longior quam latior, versus basin angustior, supra apice obtuse truncata atque, ad angulum anteriorem, apophysi parva, gracili et infra directa munita; tarso gracillimo, tereti, tibia cum patella brevior et vix latior; bulbo dimidium tarsum haud vel vix superante, sat anguste ovato, intus stylo, apice libero, marginato.

Brasilia : Fonteboa (Amazonas).

N. fuscimanus sp. nov. — ♂ Long. 6,2 mill. — A *N. transversali*, cui valde affinis est, differt parte cephalica maculis lateralibus latis vittaque media, marginem frontalem attingente, niveo-pilosis decorata, pedibus obscurioribus, annulis niveo-pilosis ornatis, pedibus-maxillaribus multo longioribus et gracilioribus; tibia longior, versus basin attenuata, apophysi gracili acuta et antice directa extus armata; tarso multo minore et angustior; bulbo longe ovato, intus stylo brevior marginato.

Brasilia : le Para, Tefle.

N. comatulus sp. nov. — ♂ Long. 5,8 mill. — *N. transversali* affinis. Pars cephalica coccineo-pilosa, utrinque macula interoculari et in medio vitta longitudinali, frontem haud attingente, pallide flavo-pilosis ornata, pars thoracica late fusco-marginata et macula media, subtriquetra, flavido-pilosa notata. Clypeus in medio crebre flavido-pilosus. Abdomen luteo-testaceum, antice maculis quatuor transversim seriatis, postice maculis similibus binis flavo-pilosis decoratum. Chelae sublaeves, nigricantes, nitidae, apice leviter dilutiores, dente anteriore valido, acuto et paulo ante medium sito armatae. Pedes 4^1 paris fusco-castanei,

femoribus utrinque late nigris, tarsis luteis, reliqui pedes pallide-lutei. Pedes-maxillares pallide fusco-castanei; patella saltem triplo longiore quam latiore; tibia apice obtuse truncata, et extus apophysi sat brevi, antice oblique directa, gracili sed obtusa munita; tarso tibia cum patella haud longiore, saepius brevior, angusto et subtereti, longe producto; bulbo breviter ovato vel rotundo, intus stylo, apice libero, marginato.

Brasilia : Terra Nova prope Bahia (E. Gounelle).

N. actinosus sp. nov. — ♂ Long. 5,7 mill. — *N. transversali* affinis, cephalothoracis pars cephalica pilis coccineis, antice longis et supra oculos pilis flavidis mixtis vestita, utrinque inter oculos macula magna pallide flava notata sed oculis posticiis anguste coccineo-cinctis, pars thoracica ad marginem infuscata et macula media, subrotunda, pallide flavo-pilosa ornata. Clypeus in medio, usque ad marginem, creberrime flavido-barbatus. Abdomen luteo-testaceum, supra leviter infuscatum, macula anteriore parva et utrinque maculis binis, 1^a longa et curvata, altera subrotunda, niveo-pilosis decoratum, mamillis infuscatis. Chelae nigro-nitidae, coriaceae, apicem versus leviter ampliatae, transversim carinulatae, abrupte depressae et laeviores, extus calcare longo, cylindrico, acuto et valde incurvo armatae. Pedes quatuor antici fusco-brunnei, metatarsis tarsisque paulo dilutioribus, femoribus 2ⁱ paris ad basin luteis, pedes quatuor postici lutei, femoribus ad apicem confuse fusco-annulatis. Pedes-maxillares mediocres, lutei, femore ad basin, tibia tarsoque infuscatis; patella tereti, plus duplo longiore quam latiore, intus leviter depressa; tibia patella fere duplo brevior, apice obtuse truncata, angulo exteriori breviter et acute producto; tarso tibia cum patella paulo longiore, sat angusto et longe producto; bulbo breviter ovato et obliquo, stylo, apice libero, marginato.

Brasilia : S. Paulo de Olivença; Peruvia : Cavallo-Cocho.

N. vulpio sp. nov. — ♂ Long. 5,4-4,5 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica prope oculos nigra, aurantiaco-pilosa, utrinque inter oculos late pallide flava et vitta media, postice ampliata, flavido-pilosa ornata, parte thoracica infuscata, subglabra, in medio parce albido-pilosa. Pili oculorum coccinei. Clypeus nigricans, glaber, depressus, oculis magnis saltem $\frac{1}{3}$ angustior. Abdomen luteum, supra saepe olivaceum, lineis binis parallelis et postice maculis parvis binis niveo-pilosis ornatum, subtus vitta media, olivacea, rarius nigricanti notatum. Partes oris fuscae. Chelae nigrae, apice rufescentes, extus, vix pone medium, dente parvo et acuto armatae. Pedes 1ⁱ paris fusco-

castanei, femore subnigro, tarso luteo, tibia saepe luteo-annulata, reliqui pedes omnino lutei. Pedes-maxillares fusco-ravidi; patella circiter triplo longiore quam latiore (interdum brevior); tibia patella saltem $\frac{1}{3}$ brevior, supra ad apicem obtuse acuminata, extus apophysi styli-formi sat longa oblique directa munita; tarso tibia cum patella multo brevior, angusto, teretiusculo et longe producto; bulbo breviter ovato seu subrotundo, intus stylo, apice libero, marginato.

Brasilia : Rio, Tijuca prope Rio; Terra Nova prope Bahia; Matushnos (prov. Minas) (E. Gounelle).

N. niveogularis sp. nov. — ♂ Long. 6,5 mill. — Cephalothorax laete fulvo-rufescens, parte cephalica maculis ocularibus nigris notata, aurantiaco flavoque pubescenti et utrinque albo-maculata, parte thoracica vitta marginali et postice vitta abbreviata, subtriquetra pallide fuscis et maculis oblique divaricatis laete niveo-pilosis ornata. Pili oculorum laete coccinei. Clypeus oculos medios vix aequans, sub oculis glaber, ad marginem vitta lata, crebre niveo-pilosa ornatus. Abdomen angustum, fulvo-testaceum, lineis binis fuscis notatum, antice arcu transverso, dein utrinque maculis obliquis, biseriatis, niveo-pilosis ornatum, subtus vitta nigra notatum. Sternum luteum. Partes oris castaneae. Chelae fusco-rufescentes, coriaceae, haud striatae, extus, prope basin, calcare longissimo, tereti et acuto, antice directo, apice intus leviter curvato, et prope apicem dente parvo, nigro, insigniter armatae, margine superiore dentibus minutissimis binis denteque paulo majore angulari, inferiore dentibus parvis quinque, ultimis binis paulo majoribus armatis. Pedes robusti, quatuor anteriores pallide castanei, metatarsis tarsisque luteis, femoribus utrinque nigricanti-vittatis, pedes postici omnino lutei. Pedes-maxillares lutei, albo-pilosi, tibia tarsoque leviter rufescentibus, bulbo nigro; patella vix duplo longiore quam latiore; tibia patella vix brevior, multo angustior, apophysi subbasilari longa et divaricata, apice obtusa, apophysique apicali nigra et minuta armata; tarso tibia cum patella paulo longiore; bulbo maximo, disciformi, stylo crasso spirali bicircumdato.

Brasilia : Tijuca prope Rio (E. Gounelle).

N. bidens sp. nov. — ♂ Long. 7 mill. — Cephalothorax laete fulvo-rufescens, parte cephalica maculis ocularibus nigris, posticis valde ampliatis notata, aurantiaco-pubescenti, parte thoracica tenuiter nigro-marginata, pilis niveis conspersa. Pili oculorum flavidi. Clypeus oculos medios vix aequans, sub oculis glaber, praeterea crasse albo-pilosus. Abdomen angustum, supra fulvo-testaceum, prope medium maculis

fuscis binis notatum, maculis lineisque niveo-pilosis decoratum, subtus vitta lata nigra notatum. Sternum luteum. Partes oris chelaeque fusco-rufescentes. Chelae subtiliter coriaceae, haud striatae, antice, prope basin, dentibus binis transversim dispositis, depressis et apice uncatis, interiore altero saltem duplo majore armatae, marginibus sulci fere praecedentis sed inferiore dentibus trinis aequis tantum munito. Pedes longi, sat robusti, quatuor antici pallide castanei, metatarsis tarsisque luteis, femoribus utrinque late nigricanti-vittatis, tibiis annulo medio lato luteo notatis, metatarsis ad basin atque ad apicem anguste rufulo-annulatis. Pedes postici lutei. Pedes-maxillares fere praecedentis sed apophysi tibiali apice truncata, leviter ampliata et malleiformi.

Brasilia : Tijuca prope Rio ; Minas : Matushinos, Caraça (E. Gounelle).

N. arator sp. nov. — ♂ Long. 6 mill. — Cephalothorax fulvo-rufescens, parte cephalica maculis ocularibus nigris notata, pilis coccineis, ad marginem frontalem longioribus et cristam latam formantibus vestita, utrinque, inter oculos, late luteo-pilosa et postice macula parva lutea notata, parte thoracica fere glabra. Pili oculorum flavo-aurantiaci. Clypeus depressus, oculis magnis vix $\frac{1}{3}$ angustior, in medio crebre luteo-pilosus. Abdomen angustum, luteum, supra leviter infuscatum et maculis albo-pilosis decoratum. Sternum fulvo-rufescens. Partes oris infuscatae. Chelae fulvo-rufescentes, nitidae, antice deplanatae, versus apicem sensim ampliatae atque extus calcare subapicali magno, robusto sed acuto et valde uncato armatae, margine superiore sulci longo, dentibus remotissimis binis, 1^o angulari majore, margine inferiore dentibus subaequis et acutis quinque armatis, ungue longo, simplici. Pedes fusco-rufescentes, femoribus, saltem ad basin, late dilutioribus, annulis albo-pilosis ornati. Pedes-maxillares fulvo-rufuli, apice infuscati; femore longo; patella fere triplo longiore quam latiore, versus basin leviter attenuata; tibia patella plus duplo brevior et paulo latiore, intus longe crinita, extus breviter producta et conica; tarso tibia cum patella multo longiore, apice longe producto et teretiusculo; bulbo medium tarsum tantum occupante, sat parvo, disciformi, sed stylo longissimo, circulos tres formante marginato.

Brasilia : Manaos (Hauxwell).

N. uncatus sp. nov. — ♂ Long. 6 mill. — *N. aratori* affinis. Cephalothorax fusco-rufescens, parte cephalica nigra, ad marginem anticum pilis coccineis longis et erectis, cristam latam formantibus ornata, et utrinque, inter oculos, luteo-pilosa, parte thoracica fere gla-

bra. Pili oculorum flavo-aurantiaci. Clypeus glaber, leviter depressus, oculis magnis vix $1/4$ angustior. Abdomen angustum, luteum, maculis longis sex biseriatis pallide luteo-pilosis supra ornatum. Sternum fulvum. Partes oris fuscae. Chelae longae, parallelae, nigricantes, transversim rugatae, apice dilutiores, laeviores et depressae, extus in parte apicali calcare longo sed gracili et incurvo armatae, margine superiore sulci longo, dentibus remotissimis binis, 1° angulari majore, margine inferiore dentibus contiguis sex, 1° et 2° reliquis paulo majoribus instructis. Pedes antici fusco-rufuli, metatarsis tarsisque dilutioribus, quatuor postici lutei. Pedes-maxillares fulvi; patella tereti, saltem triplo longiore quam latiore; tibia patella paulo brevior, ad basin paulo angustiore, ad apicem sensim ampliata, intus longe crinita, extus leviter angulosa; tarso longo, angusto, teretiusculo; bulbo parvo, basin tarsi tantum occupante, breviter ovato, intus stylo gracillimo munito.

Brasilia : Sao Paulo de Olivença (de Mathan).

Mago acutidens sp. nov. — ♂ Long 7 mill. — Cephalothorax crassus et brevis, fusco-rufescens, parte cephalica prope oculos nigra, macula frontali parva et utrinque macula magna niveo-pilosis ornata, parte thoracica in medio dilutior et macula niveo-pilosa, antice, inter oculos, paululum producta notata. Pili oculorum pauci, rufuli, inter oculos medios albi. Clypeus oculis anticis fere duplo angustior, parce et longe albo-pilosus. Abdomen fusco-testaceum, vitta media lata lutea notatum, parce et longe luteo-pilosum, antice arcu transverso, dein maculis parvis seriatis niveo-pilosis supra ornatum, subtus vitta media lata fusca notatum. Sternum luteum. Partes oris nigrae. Chelae sat breves et latae, nigrae, leviter aeneo-tinctae, coriaceae et transversim striolatae, extus, pone medium, dente conico armatae, margine superiore sulci minute dentato atque ad angulum dentibus majoribus (praesertim medio), margine inferiore dentibus quinque, 1° et ultimo minoribus instructis, ungue simplici. Pedes robusti, antici fusco-castanei, subnigri, metatarsis tarsisque vix dilutioribus, reliqui pedes lutei, femoribus ad apicem, patellis tibiisque cunctis pallide castaneis. Pedes-maxillares fusci, albo-pilosi, interdum pallide flavi; patella circiter $1/3$ longiore quam latiore, subtereti; tibia patella duplo brevior, ad basin paulo angustiore, extus apophysi apicali nigra, crassa et striolata, apice obtusa, supra ad basin breviter et acute dentata; tarso mediocri, tibia cum patella circiter aequilongo, paulo latiore; bulbo breviter ovato, stylo libero, sat longo, gracili et subrecto intus munito.

Brasilia : le Para, Cameta (Rio Tocantins), Teffe vel Ega.

M. longidens sp. nov. — ♂ Long. 7 mill. — A *M. acutidentis*, cui affinis est, differt chelis magis coriaceis, dente exteriore longiore, gracili sed apice obtusa et infra directa instructis, pedibus-maxillaribus obscurioribus, albo-pilosis, apophysi tibiali obtusiore, supra lobo obtusissimo, antice truncato munita. Caetera ut in *M. acutidentis*.

Brasilia : Teffe vel Ega (de Mathan).

M. vicanus sp. nov. — ♂ Long. 8 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, parte cephalica obscuriore et prope oculos nigra, parce miniaceo-pubescenti, utrinque, inter oculos, macula magna flavo-pilosa ornata, parte thoracica subglabra sed macula media longa, flavido-pilosa ornata. Pili oculorum coccinei. Clypeus subglaber, oculis anticis saltem $\frac{4}{3}$ angustior. Abdomen fusco-testaceum, vitta media lata binodosa notatum, supra parce et longe fulvo-pilosum et maculis parvis brevius niveo-pilosis ornatum, subtus vitta media lata nigricanti notatum. Sternum obscure fulvum. Partes oris nigrae. Chelae robustae, sat longae et subparallelae, nigro-opaceae, crebre coriaceae et transversim rugatae, margine superiore sulci dentibus parvis 5 vel 6, inferiore dentibus 5, paulo majoribus et inter se contiguis armatis. Pedes sat longi, antici nigricantes, femoribus cyaneo-tinctis, patellis metatarsis tarsisque ad basin, tibiis in medio leviter rufescentibus et albo-pilosis, reliqui pedes obscure fulvi, femoribus ad apicem patellis tibiisque cunctis obscure olivaceis, parce albo-pilosis. Pedes-maxillares subnigri, patella dilutior; patella plus duplo longiore quam latiore, tereti; tibia patella brevior, leviter incrassata, extus ad apicem truncata atque apophysibus brevibus binis, superiore crassa, obtusa et subrotunda, inferiore acute turbinata instructa; tarso angusto, subparallelo, tibia cum patella brevior; bulbo sat longe ovato, apicem versus longe attenuato et stylo brevi, recto, valido sed acuto munito.

Brasilia : Rio Tocantins, S. Paulo de Olivença (de Mathan).

M. pexus sp. nov. — ♂ Long. 5,7 mill. — *M. vicani* affinis. Cephalothorax angustior, macula frontali, macula media thoracica et utrinque macula interoculari albo-pilosis ornatus. Pili oculorum coccinei, sed supra oculos medios albi. Clypeus glaber, oculis magnis fere duplo angustior. Chelae fere ut in *M. vicano* sed laeviores et nitidiores, extus in parte media carinula mutica, rarius minute dentata munitae, margine superiore sulci dentibus binis, 1^o majore et bifido, margine inferiore serie dentium 6-7, versus apicem sensim minorum instructis, ungue supra, prope medium, acute dentato. Abdomen pedesque fere *M. vicani*. Pedes-maxillares fusco-castanei; patella plus duplo

longiore quam latiore, tereti; tibia patella non multo brevior sed, praesertim ad basin, angustior, extus ad apicem abrupte depressa, recte secta et subacuta, cum angulo superiore acute producto et erecto; tarso angusto, attenuato, tibia cum patella paulo brevior; bulbo anguste ovato, apice sensim attenuato et stylo brevi, gracili et simplici munito.

Brasilia : Fonteboa, S. Paulo de Olivença; Peruvia : Yquitos (Marañon), Chamlireyacu (Paranepura).

M. opiparis sp. nov. — ♂ Long 7,6 mill. — *M. pexo* affinis. Cephalothorax crassior, parte cephalica coccineo-pilosa, utrinque macula lata, macula frontali, maculisque mediis binis parvis, parte thoracica macula media, ovata, pallide flavo-pilosis notatis. Pili oculorum coccinei. Abdomen fuscum, supra testaceo-punctatum et vitta media lata, flexuosa, testacea ornatum, subtus vitta latissima nigricanti notatum. Sternum obscure fulvum. Chelae fere ut in *M. vicano*, margine superiore sulci dentibus quatuor, 3^o majore, inferiore dentibus subaequis et contiguis quatuor armatis, ungue simplici, haud dentato. Pedes praecedentis. Pedes-maxillares castanei, breviores et robustiores; patella vix $\frac{1}{3}$ longior quam latior; tibia brevior et paulo latior, apophysibus binis, superiore nigra, lamellosa, apice truncata cum angulis, praesertim superiore, acute productis, inferiore fulva, longior, obliqua et subacuta extus ad apicem instructa; tarso latior; bulbo breviter ovato, stylo nigro, in parte basali crasso, compresso et contorto, in parte apicali gracillimo, recto atque obliquo.

Brasilia : le Para.

M. saperda sp. nov. — ♂ Long. 8,5 mill. — *M. vicano* affinis. Cephalothoracis pars cephalica parce aurantiaco-pilosa, utrinque, inter oculos, macula magna albo-pilosa ornata. Pili oculorum pauci, flavidi. Abdomen obscure testaceum, lineis binis parallelis fuscis atque antice arcu transverso albo-piloso supra ornatum, subtus luteum, concolor. Chelae fere *M. vicani* sed laeviores et nitidiores, extus leviter carinatae, margine superiore dentibus parvis quinque, 4^o reliquis duplo majore, inferiore dentibus contiguis 3, 1^o reliquis minore armatis. Pedes antici castanei, reliqui lutei, femoribus metatarsisque ad apicem, patellis tibiisque cunctis pallide castaneis. Pedes-maxillares obscure fulvi, albo-pilosi; patella circiter duplo longior quam latior, teretiuscula; tibia patella circiter $\frac{1}{3}$ brevior, haud angustior, tereti, extus ad apicem recte truncata cum angulo inferiore breviter producto:

tarso tibia cum patella circiter longitudine aequo, paulo latiore; bulbo breviter ovato, stylo libero, sat longo et gracili intus munito.

Brasilia : le Para, Teffe, Fonteboa.

M. proca sp. nov. — ♂ Long. 8-10 mill. — Cephalothorax fusco-rufescens, parte cephalica castanea, utrinque prope oculos nigra et albo-pilosa, parte thoracica macula media albo-pilosa ornata. Pili oculorum pauci, supra flavidi, subtus albidii. Clypeus oculis mediis saltem duplo angustior, pilis longis albis paucis munitus. Abdomen fusco-testaceum, antice arcu transverso, in medio maculis longis quatuor biseriatis et utrinque maculis trinis arcuatis niveo-pilosis supra ornatum, subtus testaceum, postice paululum infuscatum. Sternum fulvum. Partes oris castaneae. Chelae crassae, paululum divaricatae, fusco-aeneae, nitidae, rugatae, extus obtuse carinatae, margine superiore sulci dentibus sex, quatuor anticis parvis, 5° angulari, valido, ultimo mediocri, inferiore dentibus quatuor subcontiguis instructis, ungue valido, compresso, supra, prope basin, minute et obtuse tuberculato. Pedes robusti, quatuor antiqui fusco-castanei, femore tarsoque 2ⁱ paris luteis, pedes postici lutei, femoribus ad apicem, patellis tibiisque plus minus castaneo-tinctis. Pedes-maxillares lutei, albo-pilosi, tarso infuscato; patella tereti, plus duplo longiore quam latiore; tibia patella fere 1/3 brevior, tereti, apophysi sat longa, gracili et acuta, antice recte directa, extus ad apicem armata; tarso parvo, tibia cum patella multo brevior; bulbo breviter disciformi, ad basin sat convexo, stylo gracili intus marginato.

Peruvia : Tarapoto (Rio Mayo).

Encolpius (1) **albobarbatus** sp. nov. — ♂ Long. 4,2 mill. — Cephalothorax nigro-rufescens, subtiliter coriaceus, parte cephalica antice rufulo praeterea fulvo-pubescenti, thoracica ad marginem albo-pilosa. Pili oculorum obscure rufi. Clypeus oculis mediis plus 1/3 angustior, vitta crasse niveo-pilosa marginatus. Abdomen supra nigrum, obscure testaceo-variatum, parce fulvo-pubescent, supra mamillas fasciculo parvo setarum albarum ornatum, subtus atro-testaceum. Mamillae fuscae, superiores nigrae. Sternum olivaceum. Partes oris nigrae. Chelae nigrae, nitidae, apicem versus sensim ampliatae et

(1) **Encolpius** nov. gen. — A *Magone* differt oculis parvis ser. 2^{ae} longe ante medium sitis, oculis quatuor anticis in lineam valde recurvam, clypeo sub oculis glabro ad marginem vitta crebre barbata ornato. — Typus *E. albobarbatus* E. Sim.

abrupte truncatae, cum angulo superiore calcare valido acuto et uncato instructo, margine superiore dentibus trinis, medio paulo majore, inferiore dentibus 4-5 subaequis et contiguis armatis, ungue simplici, supra acute carinato. Pedes fusci vel olivacei, metatarsis, tarsis cunctis femoribusque posticis ad basin late luteo-annulatis. Pedes-maxillares lutei, ad basin atque ad apicem infuscati, pilis albis longissimis et divaricatis insigniter plumosi; patella tereti, saltem triplo longiore quam latiore; tibia patella vix $\frac{1}{4}$ brevior, apophysi superiore parva, nigra et conica, apophysique exterior longissima, articulo vix brevior, arcuata, gracili et oblique divaricata armata; tarso tibia cum patella haud brevior, ad basin latior, sed valde attenuato; bulbo simplici, disciformi, stylo gracillimo, apice libero circumdato.

Brasilia : le Para.

Amphidraus ⁽¹⁾ **auriga** sp. nov. — ♂ long. 3 mill. — Cephalothoracis pars cephalica nigra, pilis rufulis incurvis vestita, ad marginem frontalem pilis longioribus, erectis, albido-luteis cristata, pars thoracica glabra, fulvo-rufula, subtiliter reticulata et tenuiter nigro-cincta. Pili oculorum albido-lutei. Clypeus parce albo-pilosus, et setis longioribus binis erectis in medio munitus. Abdomen breve, supra luteum et albo-pubescent, in parte basali utrinque late et flexuose nigricanti-marginatum, utrinque prope medium macula magna transversa, postice arcubus parvis duobus nigricantibus supra ornatum. Chelae fulvo-rufulae. Pars labialis fusca. Laminae, sternum pedesque lutea, metatarso 2ⁱ paris ad apicem tarsoque ad basin nigricantibus. Pedes-maxillares lutei, femore patellaque crasse albo-hirsutis; femore brevi, curvato, subtus leviter et obtuse emarginato; tibia patella saltem aequilonga, supra ad basin apophysi nigra, longa, gracili et flagelliformi, antice recurva, subtus apophysi submedia gracili, paulo brevior, subrecta, sed apice minute uncata armata; tarso bulboque magnis; bulbo simplici, ad basin anguloso.

Bolivia : Espiritu-Santo (Garlepp).

A. nigritarsis sp. nov. — ♂ Long. 3 mill. — Cephalothorax niger, parte cephalica obscure rufo-pubescenti, in medio et utrinque, prope

(1) **Amphidraus** nov. gen. — Ab *Amyco* et *Magone* differt oculis parvis ser. 2^{ae} paulo pone medium sitis, ab oculis posticis spatio oculo (postico) non latiore distantibus, quadrangulo oculorum dorsalium postice quam antice multo angustiore, clypeo reclinato, oculis mediis plus duplo angustiore, pedibus anticis brevibus. — Typus *A. auriga* E. Sim.

oculos, albido-pilosa, thoracica fere glabra. Pili oculorum rufuli. Clypeus subglaber. Abdomen breviter ovatum, nigrum, albo-pilosum, supra vitta latissima et dentata dilutior, antice vittam angustiore in lanceolatam, postice lineas transversas nigricantes includente, supra notatum, subtus atrum, utrinque paulo dilutius, parce albo-pilosum. Chelae fuscae. Sternum et partes oris nigro-nitida, laminae ad marginem dilutiores. Pedes obscure fulvi, valde nigricanti-annulati, tarsi 4ⁱ paris nigerrimis. Pedes-maxillares breves et robusti, lutei, crasse et longe albo-hirsuti, tarso rufulo, apice nigro et nigro-piloso; femore compresso, leviter curvato; patella crassa et convexa; tibia patella multo brevior, latior quam longior, fere annuliformi, apophysi exteriori apicali mediocri et acuta armata; tarso longo, depressiusculo et longe attenuato; bulbo magno, simplici.

Venezuela : Fracatal (Caroni) (L. de Bertier).

Letoia ⁽¹⁾ **ephippiata** sp. nov. — ♀ Long. 3, 5 mill. — Cephalothorax subtilissime coriaceus, niger, opacus, fere glaber, parte cephalica, prope oculos, pilis rufulis paucis munita et utrinque in declivitate longe albo-pilosa. Pili oculorum rufuli. Pili clypei albi, longissimi, in medio erecti, in lateribus decumbentes. Abdomen breve, antice obtuse et late truncatum, flavo-nitido-pubescent, in parte basali pallide testaceum sed antice in declivitate nigro-marginatum, in parte altera nigricans et macula maxima, ovato-transversa, ephippiformi ornatum, subtus antice testaceum, postice sensim infuscatum, regione epigasteris rufula et nitida. Chelae fusco-castaneae, glabrae et nitidae. Sternum et partes oris fusco-castanea, parte labiali apice membranacea et albida. Pedes lutei, femoribus 4ⁱ paris metatarsisque quatuor posticis ad apicem leviter infuscatibus et olivaceis.

Venezuela : San Esteban !

(1) **Letoia** nov. gen. — Ab *Amyco* et *Magone* differt oculis anticis (antice visis) inter se contiguis, apicibus lineam leviter procurvam (non recurvam) designantibus, clypeo angusto, crebre barbato, pedibus anticis brevibus. — Typus *L. ephippata* E. Sim.

VOYAGE DE M. E. SIMON AU VENEZUELA (décembre 1887-août 1888)

30^e Mémoire (1).

LAMPYRIDES.

PAR ERNEST OLIVIER.

CLADODES PROTEUS Ern. Oliv., Ann. Soc. Ent. Fr., 1894, p. 23.

San Esteban (♂).

Les élytres de cet exemplaire sont entièrement testacés, sauf la bande noire qui les traverse à leur tiers apical et qui est large et dentelée; la suture est finement noire, sauf à l'angle apical et en approchant de l'écusson.

J'ai décrit cette espèce sur des individus provenant aussi du Venezuela.

PSILOCLADUS CAPILLATUS Ern. Oliv., Ann. Soc. Ent. Fr., 1888, p. 88.

San Esteban (♂).

Aussi au Brésil : Santa-Rita.

Lucidota Simoni nov. sp.

San Esteban.

Long. 7 mill. — *Ovalis, parva, brunnea, nitida; antennis compressis, brunneis, duobus ultimis articulis albis; prothorace pubescente, punctato, testaceo, vitta mediana nigra; elytris prothorace latioribus, nigris, vitta submarginali testacea; coxis, femoribus et duobus ultimis ventris segmentis testaceis.*

Cette petite espèce se distingue facilement de celles du même groupe par sa coloration : le pronotum est testacé avec une bande longitudinale médiane noire; les élytres sont noirs avec chacun une bande flave

(1) Voir pour le 25^e mémoire (*Isopodes terrestres*, par A. Dollfus) Annales, 1893, p. 340. On y trouvera la liste des vingt-quatre mémoires qui précèdent. — Le 26^e mémoire (*Buprestides* par Ch. Kerremans), paru dans les Annales, 1896, p. 23, n'a pas été numéroté, par inadvertance. — Voir pour le 27^e mémoire (*Myriapodes*, par H.-W. Brolemann), Annales, 1898, p. 241. — Pour le 28^e mémoire (*Lycides*, par J. Bourgeois), Annales, 1899, p. 90. — Pour le 29^e mémoire (*Onychophores*, par P.-L. Bouvier), Annales, 1899, p. 406.

qui part de l'épaule et s'étend le long de la marge externe, sans l'atteindre, jusqu'au-dessus de l'angle apical qui reste noir. Les antennes, presque aussi longues que le corps, ont leurs articles comprimés, d'un brun de poix, sauf les deux derniers qui sont blancs. Le dessous du corps est d'un brun de poix, à l'exception des hanches, des fémurs et des deux derniers segments du ventre qui sont testacés. La partie testacée des élytres est translucide et laisse très bien voir les pattes au travers.

Je suis heureux de dédier cette espèce à M. E. Simon, l'infatigable voyageur qui a fait tant de découvertes intéressantes.

CRATOMORPHUS SIGNATIVENTRIS Ern. Oliv., Nov. Zool., 1895, p. 34.

San Esteban ♂.

Les bandes longitudinales brunes des élytres sont indistinctes chez cet exemplaire. Se trouve aussi à Mexico et au Chiriqui.

ASPIDOSOMA IGNITUM L., Syst. nat. I, p. 645. — var. *polyzonum* Chevrl.

Col. Mex. Cent. I, fasc. III, n° 54.

La Guayra.

L'*Asp. ignitum* typique est répandu dans tout le Nord de l'Amérique méridionale. L'*Asp. polyzonum* qui n'en diffère qu'en ce que les lignes et les taches flaves des élytres sont plus distinctes est surtout commun au Mexique.

ASPIDOSOMA PALLIDUM Oliv., Ent. II, 28, p. 46, t. 2, f. 10.

Corosal, San Esteban.

Le prothorax est finement taché d'orangé à sa base.

Aussi à Cayenne, à Pernambouc.

ASPIDOSOMA PHYSONOTUM Gorh., Biol. Centr.-Am. Malac., p. 272, t. XII, f. 7.

Valencia.

Les individus de cette espèce, quand ils sont frais, sont d'un beau vert avec une tache flave à la base du prothorax. Mais bien souvent cette couleur se rembrunit après la mort de l'insecte ou passe au blanc grisâtre et il devient alors assez difficile de les distinguer de *Asp. pallidum*. Peut-être y aurait-il lieu de réunir les deux espèces?

L'*Asp. physonotum* a un habitat étendu : Nicaragua, Panama, Colombie, Amazone, Brésil.

ASPIDOSOMA AEGROTUM Gorh., Ent. Soc. Lond. 1880, p. 84. — Biol. Centr.-Amer. Malac., t. III, f. 46.

Colonie Tovar.

La tache brune subhumérale des élytres est indistincte et manque même chez un individu. Cette espèce a de grands rapports avec *Asp. diaphanum* et *depictum* du même auteur.

Aussi dans toute l'Amérique centrale (Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama).

PHOTINUS PARVULUS Gorh., Biol. Centr.-Amer. Malac., p. 47.

Petare près Caracas.

Cette espèce rentre dans le genre *Pyropyga* de Leconte : elle ressemble beaucoup à *P. minuta* Lec.

Aussi au Mexique et au Guatemala.

PHOTINUS MARGINIPENNIS Luc., Voy. Cast., p. 88.

Corosal près Caracas ; San-Esteban ♂ ♀.

Chez le ♂, la poitrine est brun de poix, les quatre premiers segments du ventre sont bruns, finement bordés de testacé en arrière, les derniers sont d'un blanc rosé brillant, les cinquième et sixième sont marqués de deux petits points noirs brillants entourés d'un étroit cercle d'un flave luisant. Chez la ♀, la poitrine et l'abdomen entier sont flaves.

Aussi au Brésil.

PHOTINUS GLISCENS Gorh., Biol. Centr.-Amer. Malac., p. 39, t. VI, f. 43.

San Esteban ♂.

La bande longitudinale testacée du milieu des élytres est rembrunie.

Aussi au Mexique.

Photinus ineptus nov. sp.

San Esteban (♂).

Long. 10 mill. — *Elongatus, parallelus; capite et quatuor primis ventris segmentis cereis; elytris piceis, pubescentibus; prothorace antice rotundato et leviter dilatato, marginato, crebre punctato, basi recte truncato, testaceo, macula quadrata nigra sulcata; scutello testaceo, obconico, truncato; elytris elongatis, parallelis, villosis, sat crebre punctatis, fuscis, sutura tenuiter, et margine laterali, latius, testaceis;*

pectore et tarsis piceis, femoribus testaceis; ♂ quinto et sexto ventris segmentis cereis, postice emarginatis; ♀ ignota.

Cette espèce se distingue facilement des autres du même groupe par son prothorax sensiblement élargi en avant, ou au moins nullement atténué, et de couleur testacée avec une large tache triangulaire noire, creusée d'une impression longitudinale, mais sans lignes ou points rouges.

PHOTURIS LINEOLA Blanch., Voy. d'Orb. Ent. p. 117. — *Photuris lurida* Kirsch, Berl. Ent. Zeit., 1865, p. 76. — Ern. Oliv., Ann. Soc. Ent. Fr. 1886, p. 244, pl. 3, f. 17.

Colonie Tovar, San Esteban ♂ ♀.

Aussi à Bogota (Kirsch) et à Parana (d'Orbigny).

PHOTURIS ANNULICORNIS Boh., Res. Eugen. 1858, p. 76. — Ern. Oliv., Ann. Soc. Ent. Fr. 1886, p. 232. — *Photuris didyma* Kirsch, Berl. Ent. Zeit. 1865, p. 75. — *Photuris annulata* Kirsch, loc. cit., p. 76.

San Esteban ♂ ♀.

Cette espèce est très répandue dans tout le Nord de l'Amérique méridionale où elle paraît remplacer le *Ph. pensylvanica* des États-Unis et le *trilineata* de l'Amérique centrale.

NOTES SUR CERTAINES CÉTOINES (CRÉMASTOCHILIDES)

RENCONTRÉES DANS DES FOURMILIÈRES OU TERMITIÈRES AVEC DESCRIPTION D'ESPÈCES NOUVELLES

PAR L. PÉRINGUEY.

Beaucoup, sinon la plupart, des Coléoptères vivant en compagnie avec les Fourmis ou les Termites subissent des changements de caractères morphologiques qui leur donnent un aspect particulier. Il arrive souvent aussi que les organes de locomotion et de manducation se sont fortement modifiés, sont en partie oblitérés, et, voire même, sont quelquefois complètement atrophiés. Tel est le cas pour certains genres de Cétoines appartenant à la tribu des Crémastochilides et qui se trouvent dans l'Afrique australe.

Dans le genre *Scaptobius*, le mentum s'est développé à tel point sous forme de lame presque carrée où en écusson héraldique, qu'il obture complètement la cavité buccale; la languette est complètement soudée contre lui, mais à la base d'une rainure latérale on aperçoit les palpes labiaux qui sont extrêmement courts et dont les trois articles semblent être complètement soudés; la pointe terminant l'écusson s'engage dans une cavité profonde, à bords verticaux, qui se trouve à la partie antérieure du prosternum, mais je ne crois pas que la cavité buccale puisse s'ouvrir complètement, et bien que les mâchoires soient armées d'un ou deux onglets acérés, parfois falciformes et aussi quelquefois bifides, variant dans les différentes espèces, leur gracilité, jointe au peu de développement des palpes maxillaires, semblerait dénoter une diète spéciale, peut-être même l'impossibilité pour l'insecte adulte de prendre de la nourriture, ainsi qu'il arrive pour certaines espèces de Coléoptères myrmécobies. Ces caractères sont encore plus tranchés dans un nouveau genre, *Placodideus*, ne contenant encore qu'une espèce, et qui bien que très voisin de *Scaptobius* en diffère surtout par la forme du métasternum et l'extrême aplatissement du corps, et où la plaque mentionnée est encore plus développée que dans *Scaptobius*. Cette espèce, pour laquelle je propose le nom de *P. compransor*, a été rencontrée dans une fourmilière dont malheureusement je n'ai pu obtenir un exemplaire, mais qui me paraît être le *Plagiolepis fullax* Mayr. Il est donc probable que les *Scaptobius*, dont les mœurs ne sont pas encore connues, mais que l'on rencontre sous des pierres, et générale-

ment recouverts d'un enduit terreux, passent une partie de leur existence dans les galeries des Fourmis.

Cette forme singulière du grand développement de la plaque buccale, qu'accompagne toujours une atrophie plus ou moins complète des articles des tarse, se modifie un peu chez les *Trichoplus* qui, au lieu d'une cavité prosternale, possèdent un très gros tubercule contre lequel vient s'appliquer le chaperon ; les palpes labiaux et maxillaires sont aussi un peu plus développés. Or j'ai trouvé un exemplaire du rarissime *T. Schaumi* Westw. dans une termitière en partie abandonnée par ses habitants et dont s'était emparée une colonie considérable de *Plagiolepis fallax* qui occupait du reste tout le voisinage, et dans les galeries de laquelle je capturai plus de 100 exemplaires du curieux Pausside *Pentaplatarthrus paussoides* Westw. La contiguïté des Termites et des *Plagiolepis* m'empêche de décider si c'est avec les premières ou avec les secondes qu'habitait *Trichoplus*, car mon coup d'écorçoir avait brisé la paroi qui séparait les deux insectes sociaux, mais je suis porté à croire que c'est avec la Fourmi.

Dans le genre *Lissogenius*, qui se distingue par la forme singulière des tarse antérieurs, la bouche n'est pas complètement obturée par la plaque buccale, et l'on aperçoit l'extrémité des palpes labiaux et maxillaires. Cette même plaque est très réduite dans le genre *Nyassinus* Westw. qui forme un passage avec *Coenochilus*, dont deux espèces que je décris ci-après ont été trouvées dans des termitières. Je tiens également de notre collègue, M. A. Raffray, qu'il avait capturé le *C. argyrsibanus* Raffr. dans une Termitière construite sur ou contre un arbre.

Il ne s'ensuit pas cependant que le *Coenochilus*, dont les tarse ne sont pas atrophiés, ne vit que dans les termitières, mais il est assez probable qu'à l'état larvaire il y passe son existence, soit dans les galeries, soit peut-être dans les résidus accumulés, en dehors, mais à côté de ces mêmes galeries ; mais il n'a pas été, que je sache, trouvé dans la champignonnière que cultivent avec tant de soin certaines espèces de *Termes*.

C'est qu'en effet la Termitière joue un rôle considérable dans l'économie des Coléoptères de l'Afrique australe, et le nombre d'espèces et de genres rencontrés soit dans l'édifice, la galerie ou le voisinage immédiat et contigu, s'accroît tous les jours. Je ne veux point parler ici d'espèces absolument adaptées à ce milieu, tels que le singulier Aphodiide *Corythoderus Marshalli*, espèce nouvelle du P. H. Brauns qui l'a rencontré dans la cellule royale, ou bien de Staphylins, etc., mais de formes communes que l'on rencontre ailleurs et dans d'autres circons-

tances. Dans les petits tas de matières granuleuses fécales accumulés en dehors des galeries par le Termité souterrain *Hodotermes Havilandi* Sharp. se trouvent deux Histéridés à faciès particulier, *Monoplius inflatus* Mars. et *M. pinguis* Lew., dont la larve niche et se développe à l'entrée de ces ouvertures de débarras. J'y ai aussi trouvé un *Saprinus* très particulier dont le faciès rappelle de très près celui de certaines espèces de l'Inde, où se rencontre aussi l'*Hodotermes Havilandi*, mais où *Monoplius* est inconnu. Dans ces mêmes tas depuis longtemps accumulés se rencontrent les Dynastides, *Phyllognathus Corydon* Ol. et *Syrichthus verus* Burm.; les autres espèces sud-africaines de ce dernier genre se rencontrent dans les troncs d'arbres pourris. Je soupçonne fortement *Oryctes Boas* Fabr. d'habiter à l'état larvaire les fonds des termitières comme le font *Cyphonistes vallatus* ainsi que la Cétoine *Trichostetha capensis* Linn. La seconde espèce d'*Oryctes* qui s'avance jusqu'au Sud du continent africain et qui se retrouve au Natal, *O. monoceros* Ol., ne se rencontre là que dans le bois pourri ou en décomposition. Je me suis assuré que la larve de *Cyphonistes vallatus*, ainsi que celle de *Trichostetha capensis* se nourrissent des matériaux mêmes dont est construite la termitière.

Je suis aussi d'autant plus porté à croire que le genre de vie de *Coenochilus* doit se rapprocher de celui des espèces de Dynastides précités que, comme eux, il est souvent couvert d'un Gamase rappelant beaucoup, bien que n'étant pas la même espèce, le *Gamassus coleoptratorum*.

En revanche *Scaptobius*, *Lissogenius*, *Trichopus* et *Placodidus* me semblent s'être adaptés à une vie myrmécophile à l'état adulte.

Placodidus, gen. nov.

Corpus planum; clypeus latus, valde deflexus, apice rectus; antennarum articulus primus validissimus, auriculatus; mentum latum, quadratum, sed margine apicali in medio aculeata, os inferne exacte claudens; maxillarum galea dente longissima, falcata armata, mandibula acute dentatus; palpi labiales brevissimi, vix distincti, oculi angusti, haud prominuli; prothorax lateraliter angulatim ampliatus, basi utroque sinuatus; elytra oblongo-quadrata, apice abrupte rotundata; prosternum processu subtriangulo, apice transverso, ante coxas sito instructum, mesosternum angustatum, inter coxas breviter productum; metasternum latissimum, a mesosterno sutura brevi divisum; pedes ut in Scaptobio, sed tarsi brevioribus connatisque.

Scaptobio affinis, differt corpore planissimo, haud crasso, metasterno latiore, pygidio a medio subhorizontali.

P. compransor, n. sp.

Niger, opacus, in interstitiis sparsim dilute luteo squamosus; capite distincte striolato, clypeo antice valde declivi, utrinque atque apice carinato, a capite sulco transverso in medio oblitterato disjuncto, genis ad perpendicularum exactis, anguste triangulis; antennis articulo primo latissimo, a genis usque ad prothoracis marginem anticum extenso, ceteris brevibus, clava ovali, vix convexa; prothorace longitudinaliter striolato, cicatricoso, lateribus ad medium triangulatim dilatatis, post medium distincte emarginatis, basi utrinque excisa, angulis acutis; scutello acutissimo, striolato; elytris oblongo-quadratis, costis tribus modice elevatis in singulo notatis, disco costisque longitudinaliter striolatis, lateribus apiceque cicatricosis; subtilus striolato, abdominis segmentis apicalibus duobus distincte cicatricosis atque reliquis altioribus; pygidio dense cicatricoso, pagina inferiore valde extensa, subhorizontali medioque profunde transverse impressa; pedibus rugosis, tarsis crassis, transversis, connatis, anticis brevissimis, posticis intermediisque tibiis dimidio brevioribus. — Long. 11, lat. 4 1/4 mill.

Hab. : Cap Bonne-Esp. : Cérès.

Trichoplus Burm.

Les espèces connues de ce genre singulier s'élèvent à 4 et j'en fais connaître 2 autres. Elles ont un faciès spécial qui les fait aisément reconnaître; les élytres ont une côte dorsale, et l'espace qui sépare cette côte de la suture est obliquement striolé presque dans les deux sens, sauf chez *T. incisus* Pér. où il y a trois fortes stries longitudinales. Dans toutes les espèces, sauf *T. laevis* G. et P., le corselet est fortement cordiforme et excavé au milieu avec les rebords de l'excavation formant un bourrelet qui devient carinulé près de la base, mais *T. laevis* a un faciès très différent dû surtout à la forme de son prothorax qui est large, plan et non excavé. Cette espèce est si rare apparemment dans les collections que Westwood lui-même, faute d'autre exemplaire, a dû se servir pour la figure qu'il en a donné dans son « Thesaurus entomologicus Oxoniensis » du dessin de l'insecte qui a servi à Gory et à Burmeister, et moi-même je n'ai pu encore me procurer qu'un seul spécimen. Seul des autres espèces, *T. Schaumi* a une carène pygidiale transversale très développée et garnie des deux côtés de poils jaunes, courts et peut-être glandulaires.

Le tableau suivant facilitera l'identification des six espèces dont se compose le genre jusqu'à ce jour.

A³ — *Prothorax deplanatus, haud excavatus, elytrorum striolae juxta-suturales fere obsoletae*..... **laevis** G.-P.

A² — *Prothorax cordatus, haud lateraliter incisus.*

B² — *Pygidium transversim carinatum.*

Prothoracis cavea profunda, ab apice pone medium rotundatim striolata..... **Schaumi** Westw.

B¹ — *Pygidium haud transversim carinatum.*

Prothoracis cavea profunda, antice striolata, striolis in medio interruptis..... **spectabilis**, n. sp.

Prothoracis cavea profunda, antice confertim punctata, postice subfoveolata..... **vicinus**, n. sp.

Prothoracis cavea haud profunda, punctis foveolatis fere aequalibus obsita..... **cordicollis** Waterh.

A¹ — *Prothorax cordatus, lateraliter incisus.*

Prothoracis cavea profunda, impunctata.... **incisus** Péring.

T. spectabilis, n. sp.

Niger, subopacus, antennis piceis, clava piceo-rufa; capite confertim punctato, vertice distincte arcuatim carinato; prothorace cordato, lateraliter ante medium valde dilatato, a medio basi attenuato, profunde lateque excavato, marginibus elevatis, subrotundatis, ad basin carinulatis basinque attingentibus, lateribus foveis elongatis, subconfluentibus obsitis, cavea antrosum rotundatim striolata, a medio elongato-foveolato, medio area elongata laevi; scutello in medio longitudinaliter carinato, subcicatricos; elytris suboblongis, pone humeros sensim sinuatis, planis, in disco utrinque acute carinatis, a sutura ad carinam dorsalem oblique denseque striolatis, ultra carinam longitudinaliter striatis, ad latera elongato-foveolatis; pygidio declivi, impunctato; subtilus pectore striolato, abdominis lateribus cicatricoso-striolatis; pedes vix punctatis, femoribus intermediis posticisque in medio late profundeque incis; tibiis margine inferiore, anticis exceptis, obtuse serrata. — Long. 12 mill., lat. 5 1/4 mill.

Hab. Natal : Maritzburg.

Cette espèce est la plus grande de la section à corselet excavé.

T. vicinus, n. sp.

Niger, subopacus, interdum brevissime pilosus, clava elytrorum ru-

fescens; capite antice confertim punctulato, postice foveolato-punctulato, in medio impresso, vertice arcuatim carinato; prothorace cordato, lateraliter a basi ultra medium rotundato-ampliato, deinde valde attenuato, supra profunde excavato, marginibus caveae rotundato-costatis, postice carinulatis basimque attingentibus, lateribus confertim foveolatis, cavea antice punctis profundis in medio posticeque foveolatis obsita; scutello in medio longitudinaliter carinato, longitudinaliter cicatricoso; elytris ab humeros subparallelis, planis in disco, utrinque carinatis, in medio oblique denseque striolatis, ultra carinam dorsalem longitudinaliter striatis atque ad latera striolatis, vix punctatis; subtus ut in specie praecedenti; pedibus striolatis, femoribus intermediis posticisque subtus leviter emarginatis. — Long. 8-9 mill., lat. 3 3/4-4 mill.

Hab. Cap Bonne-Esp. : Kimberley, Namaqua; Rhodesia : Salisbury.

Cette espèce est fort voisine de *T. cordicollis* Waterh., mais l'excavation du corselet est beaucoup plus profonde, les rebords en sont un peu plus arrondis et atteignent tout à fait la base, ce qu'ils ne font pas dans *T. cordicollis*.

Gen. **Coenochilus** Schaum.

C. hospes, n. sp.

Rufo-piceus, elytris dilutioribus, supra dense sed brevissime, pectore longe fulvo-pilosis; capite confertim granuloso, basi crebre punctato, ad medium utroque impresso, vertice transverse arcuatim carinato; prothorace lateribus antice modice ampliatis, a medio magis dilatatis, angulis posticis valde rotundatis, basi utroque leviter sinuata atque bi-impressa, reflexo-marginato, antice tuberculo marginali parvo in medio instructo, fere plano, crebre foveolato, foveis ad latera apiceque confluentibus; elytris elongatis, pone humeros sensim emarginatis, postice rotundatis, vix convexis, sutura a scutello fere ad apicem ubi carinata depressa, singulo prope suturam bistriato, costis obtusis tribus calloque supra-apicali instructo, interstitio laterali caeteris magis profundo, brevi, disco confertim punctato, lateribus rugosulis; pygidio leviter convexo, crebre punctulato, pube lutea sat breve dense vestito; corpore subtus pedibusque creberrime punctulatis; abdominis stigmata penultimo operto, subtubulato, — Long. 22 mill., lat. 8 1/2 mill.

Hab. British Bechuana : Kanya.

C. intrusus, n. sp.

Niger, subnitidus, glaber; capite simplice, crebre punctato, clypeo

apice emarginato, utrinque leviter impresso; prothorace anticé sensim attenuato, deinde fere parallelo, angulis posticis acutis, basi fere recta, utroque modice impressa, disco crebre punctato, lateribus subscrobiculatis; scutello longitudinaliter circutricoso; elytris elongatis, pone humeros sensim sinuatis, dein parallelis, postice bicallosis apiceque rotundatis, singulo striis geminatis quatuor angustis externa fere oblitterata notato, interstitiis subconvexis, crebre punctatis; pygidio transverse striolato, medio in tuberculo valido rotundato marginem apicis superante producto; abdominis segmento penultimo dente acuta haud aperta munito; subtus fere glaber, crebre punctatus, pedibus striolatis. — Long. 9-10 mill., lat. 3 1/2 mill.

Hab. Rhodesia : Salisbury.

Cette espèce se distingue aisément de ses congénères par la forme très fortement renflée de la partie médiane du pygidium. Elle a été, comme la précédente, rencontrée dans une termitière.

MYRIAPODES CAVERNICOLES

DESCRIPTIONS D'ESPÈCES NOUVELLES

PAR HENRY-W. BRÖLEMANN.

En rendant compte récemment (*Bull. Soc. Zool. France*, XXV, 1900, n° 2, p. 59) des dernières observations du Dr Verhoeff sur les « Doppelmännchen », c'est-à-dire sur ce stade intermédiaire que présentent les mâles de certaines espèces d'Iulides, nous signalions, sans nous prononcer, les deux hypothèses qui se trouvent en présence, savoir :

1°) ou bien il faut considérer la forme commune, pourvue d'un nombre de segments moindre, et ne comportant pas de stade intermédiaire (*forma typica* de Verhoeff), comme la forme d'origine d'où serait dérivée l'autre;

2°) ou bien il faut accorder la priorité à la forme rare, pourvue d'un plus grand nombre de segments et comportant un stade intermédiaire (*forma elongata* de Verhoeff), et considérer la première comme d'apparition plus récente.

Or aujourd'hui il nous est donné de relater une observation dont le sens nous paraît si précis, que nous n'hésitons pas à nous prononcer en faveur de la seconde hypothèse. Voici l'observation.

Parmi les Myriapodes cavernicoles dont le Dr Viré a bien voulu nous confier la détermination, il s'en trouve un qui est particulièrement instructif. C'est une forme nouvelle de *Polydesmus*, dont le mâle a 19 segments et dont la femelle en a 20, c'est une forme en voie de transformation, intermédiaire entre le genre *Polydesmus* et le genre *Brachydesmus*; nous en donnons plus loin la description sous le nom de *Polydesmus progressus*.

Il y a lieu de remarquer ici que les genres *Polydesmus* et *Brachydesmus* ont de grandes affinités l'un avec l'autre : même habitat, même faciès, même type de sculpture des téguments et, jusque dans les organes de reproduction, c'est-à-dire dans les pattes copulatrices, même disposition des éléments et du réservoir séminal si caractéristique. C'est à ce point que le Dr Attems, dans son magnifique travail « System der Polydesmiden » (*Denkschr. K. Akad. Wiss., Math.-Nat. Classe*, 1^{re} Theil, 1898, p. 241) ne reconnaît d'autre caractère générique distinctif que le nombre différent des somites.

R.-J. Pocock (Myriapoda from Funafuti and Rotuma. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 7 th. ser., I, n° 4, avril 1898, p. 328) nous a fait connaître un

cas analogue à celui du *P. progressus* (*Cylindrodesmus hirsutus*); mais, comme il s'agit d'une espèce exotique, dont les affinités sont encore imparfaitement connues, il n'est guère possible d'en tirer profit en cette occurrence. Il est toutefois évident aujourd'hui pour nous qu'elle n'est qu'une forme de passage, au même titre que le *progressus*, mais entre des formes différentes, probablement entre les *Strongylosoma* et d'autres genres peut être inconnus encore. Nous n'en tenons pas compte ici.

Le rapport du *P. progressus* aux Polydesmes typiques à 20 segments est donc bien le même que celui de la *forma typica* à la *forma elongata* du *Tachypodoiulus albipes*; et résoudre la question de philogénie pour les *Polydesmus* sera la résoudre également pour les Iulides.

Le cas du *progressus* nous enseigne premièrement qu'il n'y a pas passage simultané des deux sexes d'une forme à l'autre et que, au contraire, l'un des deux sexes se modifie avant l'autre. Mais quel est celui chez lequel se manifeste le premier changement, et dans quel sens se produit ce changement? dans le sens d'une augmentation ou dans celui d'une diminution du nombre de segments?

Quatre propositions se présentent :

- 1) Tendance du mâle à perdre un somite;
- 2) tendance du mâle à gagner un somite;
- 3) tendance de la femelle à perdre un somite;
- 4) tendance de la femelle à gagner un somite.

Mais le *progressus* nous enseigne encore que les propositions 2 et 3 ne sont pas admissibles, étant en antagonisme évident avec l'existence simultanée d'un nombre de somites moindre chez le mâle que chez la femelle.

Restent les propositions 1 et 4, qui peuvent également bien s'appliquer au *progressus*. Nous ne connaissons pas de raisonnement pouvant s'appliquer au mâle qui ne puisse s'appliquer inversement à la femelle; par conséquent la question devient celle de savoir auquel des deux sexes est dévolue l'initiative de la transformation.

L'hypothèse en faveur de laquelle nous nous sommes prononcé, dès le début, implique que c'est au sexe mâle qu'appartient cette initiative; et deux observations parlent en ce sens.

La première porte sur le nombre des somites des Myriapodes chez lesquels ce nombre est variable dans les limites mêmes de l'espèce. Toujours le mâle présente un nombre de somites moindre que la femelle. Cette observation est trop connue pour nécessiter un commentaire.

La seconde observation, que l'on peut présenter comme une loi, est

celle relative à la priorité des mâles, si répandue chez les Diplopodes en général, et incontestable, en tous cas, pour les Polydesmides en particulier; c'est la *proterandrie* de Verhoeff. — Nous avons eu souvent à signaler, et d'autres de nos collègues avec nous, que les mâles sont les premiers à apparaître au printemps sous leur forme adulte, les femelles n'arrivant à maturité que quelques jours plus tard (environ 8 à 10 jours après). Étant donné cette prédisposition des mâles à devancer les femelles dans l'état adulte, il nous paraît juste d'admettre que, dans certaines conditions données, des mâles puissent arriver à atteindre leur maturité avant d'avoir accompli dans son entier le cycle normal de leurs mues, avant d'avoir réalisé leur complet développement.

C'est sur cette prédisposition que nous nous appuyons pour admettre que c'est chez le mâle que doivent se manifester les premières modifications relatives au nombre des somites, et que, par conséquent, ce sont les espèces à nombre de somites moindre (*Brachydesmus*) qui doivent dériver des espèces à nombre de somites plus élevés (*Polydesmus*).

Tel est aussi l'avis du Dr Attems qui, dans son travail précité (p. 105), dit à propos du genre *Haplosoma* :

« Dass *Brachydesmus* ein Vorläufer von *Polydesmus* und *Haplosoma* ein solcher von *Strongylosoma* sei, wäre noch zu beweisen. Ich glaube eher, dass beide Genera, sowie die anderen mit 19 Segmenten, z. b. *Oligodesmus* mihi und *Icosidesmus* Humb. et Sauss. umgekehrt aus Gattungen mit 20 Rumpfsegmenten entstanden sind, dadurch, dass bei Arten mit ursprünglich 20 Rumpfsegmenten das vorletzte Entwicklungsstadium bereits geschlechtsreif wurde. »

Appliqué au *Tachypodoiulus albipes*, ce raisonnement nous amène à conclure que c'est la *forma elongata* qui a précédé la *forma typica*.

La répartition de la *forma elongata* est du reste en concordance parfaite avec l'opinion émise. Si nous nous reportons aux indications de Verhoeff, nous constatons avec lui que c'est précisément dans les zones froides qu'on la rencontre de préférence; c'est en Suisse et à de grandes altitudes qu'elle est plus abondante; c'est également sur le point culminant de la région rhénane visitée par Verhoeff qu'elle a été recueillie par lui-même. Si cette observation se confirme, elle expliquera parfaitement, par une croissance lente dans un milieu peu favorable, le phénomène de conservation de la forme d'origine. Au contraire, on comprend aisément que les représentants de l'espèce, qui se sont trouvés placés, par suite de leur répartition dans les zones plus chaudes, dans des conditions plus favorables à un développement rapide, aient évolué dans le sens d'une réduction du nombre des somites.

En ce qui concerne les Polydesmides, la répartition géographique des formes ne nous fournit pas de données assez précises pour permettre d'en tirer des conclusions analogues. *Polydesmus* aussi bien que *Brachydesmus* sont abondants dans les Alpes autrichiennes, dans les Balkans, dans la Région méditerranéenne, etc. ; et s'il est vrai que nous connaissons des espèces de *Polydesmus* distribués dans la partie septentrionale de l'Europe, nous connaissons également une espèce de *Brachydesmus* dans des conditions identiques. Il est toutefois bon de remarquer que, par suite de l'habitat spécial du *progressus*, celui-ci se trouve dans des conditions climatiques éminemment favorables à son développement.

D'ailleurs l'opinion que nous soutenons est si conforme aux constatations faites chez les Arthropodes, desquelles il ressort que le nombre des somites diminue à mesure que les organismes se perfectionnent, que nous ne doutons pas que l'avenir ne nous apporte la confirmation de notre hypothèse.

DESCRIPTIONS D'ESPÈCES NOUVELLES.

Blaniulus Virei, n. sp.

♂ adulte : longueur 33 mill. ; largeur 1,30 mill. ; hauteur 1,50 mill. ; 54 segments ; 99 paires de pattes ; 2 segments apodes.

♀ jeune : longueur 26 mill. ; largeur 1,20 mill. ; hauteur 1,40 mill. ; 46 segments ; 81 paires de pattes ; 3 segments apodes.

Corps allongé, comprimé latéralement, rétréci antérieurement, lisse et brillant. Chez les femelles, le 5^e somite est plus développé que ses voisins, d'où une apparence gibbeuse, qu'accentue encore le fait que les quatre segments antérieurs et la tête sont coudés inférieurement à angle droit dans la mort ; c'est le même phénomène qui se présente pour le *concolor* mihi, auquel l'espèce en question ressemble beaucoup. Chez le mâle, ce caractère est beaucoup moins sensible et ne peut servir à reconnaître l'espèce.

Coloration (?) jaune d'ocre tirant sur le fauve dans les extrémités ; membres plus clairs.

2 + 2 soies sur la lèvre supérieure ; une paire plus longue sur le vertex, dans de faibles sillons transversaux ; sillon longitudinal obsolète. Les ocelles font entièrement défaut. Les antennes sont longues ; rabattues en arrière, elles atteignent et dépassent même le bord postérieur du 4^e segment ; elles sont plantées de soies longues et rigides ; le 7^e article est assez dégagé, il représente la moitié de la longueur du 6^e.

Le premier segment est très long, convexe; le bord antérieur n'est pas échancré; l'angle latéral est droit, mais un peu replié sous la tête, présentant ainsi, sur la face inférieure, une petite facette subtriangulaire sillonnée de 4 ou 5 stries très marquées, qu'on ne peut voir nettement que lorsque l'animal est à peu près sur le dos. Près du bord postérieur se dresse, comme d'ailleurs sur tous les segments du tronc, une série transversale de soies grêles et souples. Sur les segments du tronc, les stries, qui sont accusées antérieurement, perdent en profondeur vers l'arrière du corps et se limitent à la portion ventrale du somite, c'est-à-dire qu'elles s'arrêtent loin de la ligne des pores. L'étranglement sutural est lisse. Les pores ne présentent rien de particulier. Le dernier segment est médiocrement allongé; son bord postérieur est complètement arrondi. Les valves anales, peu globuleuses, sont lisses jusqu'au bord libre qui se présente comme un très faible bourrelet un peu plissé. L'écaille ventrale est grande, large à la base, à pointe complètement arrondie et accolée aux valves.

Pattes longues, grêles, armées d'un ongle grêle et très long, atteignant la moitié de la longueur du 3^e tarse.

Chez le mâle, les joues portent les deux prolongements usuels en bec de perroquet. Première paire de pattes de 5 articles, la hanche étant soudée avec la lame ventrale; le quatrième article, le plus long, est dilaté intérieurement près de la pointe et porte en cet endroit un ou



Fig. 1. — *B. Virei*, n. sp. — Une patte de la 1^{re} paire.




Fig. 2. — *B. Virei*, n. sp. — Pattes copulatrices antérieures.



Fig. 3.



Fig. 4. — *B. Virei*, n. sp. — Extrémité d'une patte copulatrice postérieure.

deux appendices chitineux courts, coniques ou subrectangulaires; le cinquième article est triangulaire et garni de spinules et d'un lambeau chitineux arrondi près de la pointe. Pénis très long, subcylindrique, surmonté d'une tigelle plus grêle, non bifurquée à l'extrémité. Les pattes ambulatories portent de nombreuses soies lancéolées, disposées en deux séries longitudinales, visibles principalement sur le tibia et sur le premier tarse où elles sont isolées.

Pattes copulatrices du type *guttulatus*. Prolongement coxal de la première paire grêle et très long, arqué, à pointe arrondie; il est accompagné de chaque côté de la base d'un lambeau triangulaire à pointe émoussée, dans la concavité duquel s'insèrent les lames latérales (derniers vestiges de la patte); celles-ci représentent un quart environ de la longueur du prolongement coxal. Les pattes postérieures sont très longues, flagelliformes jusque près de la pointe; l'extrémité est accompagnée d'un rameau découpé en trois lanières; au-dessous de ce rameau, six lanières devenant graduellement plus courtes vers la base de l'organe; entre le rameau et la pointe de l'organe, deux lanières, les plus longues.

Cette intéressante espèce a été recueillie dans la « grotte des Demoiselles », près Ganges (Hérault), par mon collègue, le Dr A. Viré, à qui j'ai plaisir à la dédier.

***Polydesmus progressus*, n. sp.**

♂ Longueur 5,20 mill.; largeur 0,70 mill.; 19 segments et 28 paires de pattes.

♀ Longueur 7 mill.; largeur 0,90 mill.; 20 segments et 31 paires de pattes.

Formule des pores : 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, (19).

Corps très faiblement aminci dans les premiers segments, d'ailleurs à côtés parallèles. Entièrement décoloré.

Tête très finement curieuse, parsemée de soies courtes sur la lèvre et dans les côtés. Le vertex est glabre et divisé par un fin sillon. Antennes assez longues, claviformes, grêles à la base, très épaissies dans les articles 5, 6 et 7, qui sont abondamment pourvus de bâtonnets tactiles; le sixième article est le plus long de tous; le septième est très dégagé, beaucoup plus que de coutume (chez les *Polydesmus lucicoles*); le huitième, représenté par les quatre mamelons porteurs de bâtonnets, est également bien dégagé. Ces caractères ne sont d'ail-

leurs pas pour surprendre chez un animal cavernicole, puisqu'ils correspondent à un développement du sens du toucher.

Premier écusson moins large que la tête; bord antérieur faiblement cintré; angles antérieurs arrondis; angles postérieurs droits; bord postérieur échancré sur la ligne médiane; surface lisse, avec une ride médiane en arc de cercle irrégulier, d'où rayonnent des rides moins marquées que la première.

Premier écusson à sculpture encore en partie effacée; carène subrectangulaire à trois dentelures petites mais aiguës. Sur les autres écussons, on compte quatre dentelures sur les carènes percées d'un pore, et cinq sur les autres. Sur le tronc, les mamelons des écussons sont bien développés; les paires du premier rang sont bien séparées l'une de l'autre, mais les mamelons de chaque paire sont mal délimités; le premier sillon transversal est profond; les mamelons des séries médiane et postérieure sont bien nets, mais le sillon qui les sépare est faible. Le mamelon de la base de la carène est divisé en deux par une prolongation du sillon antérieur. Carènes subrectangulaires, à angle antérieur toujours représenté par une petite dentelure aiguë; l'angle postérieur est faiblement rétréci et étiré en pointe, mais ce n'est que sur le 4^e et le 3^e avant-dernier que la pointe dépasse notablement le niveau du bord posté-




Fig. 5.

P. progressus, n. sp.
Écussons 1 et 2.




Fig. 6.

P. progressus, n.
sp.
Patte copulatrice.

rieur de l'écusson. Dernier écusson triangulaire, à extrémité tronquée, à surface ornée de granules piligères. Les flancs et la région ventrale des prozonites sont densément couverts de fortes punctuations. Lames ventrales, lisses, inermes.

Pattes assez longues, parsemées de soies qui, sur les deux ou trois derniers articles sont longues et rigides. Le dernier article est plus long que le troisième. La griffe est courte.

Pattes copulatrices se rapprochant plus de celles des *Polydesmus* que de celles des *Brachydesmus*. Hanche beaucoup plus large que longue, en contact avec sa voisine sur la ligne médiane, évidée sur la face interne où s'insère le fémur. Celui-ci est très développé, gibbeux intérieurement. Le fémur est

dilaté extérieurement dans sa partie supérieure, puis, immédiatement au-dessus, il se divise en deux feuillets qui restent intimement accolés l'un à l'autre. Le feuillet interne est très court, à pointe obtuse ornée seulement de deux dentelures, et porte un peu avant l'extrémité la touffe de soies qui dissimule l'ouverture des canaux; dans l'épaisseur de ce feuillet on reconnaît facilement la présence de l'ampoule et de la rainure séminale. Le feuillet externe est beaucoup plus long, plus effilé; il se termine en pointe effilée, recourbée, accompagnée d'un crochet au bord externe.

Recueilli par M. le Dr Viré dans la grotte de Lombrive (Ariège), dans celle de Lautaret (Ardèche) et dans celle de Betharram (Basses-Pyrénées).

Polydesmus niveus, n. sp.

♀ adulte : longueur environ 7 mill.; largeur du 11^e segment (pronote) 0,50 mill.; (avec carènes) 0,80 mill.

La surface de la tête, ainsi que celle de tous les segments, est couverte de granulations lisses, grandes et petites, irrégulières de forme, parfois indépendantes, souvent confluentes, toutes contiguës en tous cas, qui permettent de distinguer à première vue cette espèce. Ces granulations paraissent un peu plus planes sur la tête, un peu plus petites sur le premier écusson, elles semblent former des côtes longitudinales sur les somites antérieurs; mais aucune de ces remarques n'est absolue, et la plus grande irrégularité semble régner dans la sculpture des écussons. Ce n'est que sur les trois derniers segments qu'on reconnaît nettement une disposition en séries transversales, correspondant aux séries usuelles de mamelons des *Polydesmes* normaux.

L'animal est entièrement décoloré. Les antennes et les pattes sont brisées sur l'unique échantillon examiné.

Le premier écusson est un peu moins large que la tête, en demi-cercle, l'angle postérieur est droit, à pointe aiguë, le bord postérieur est très faiblement sinueux. Les carènes du tronc sont subrectangulaires; l'angle antérieur est atténué; le bord latéral est interrompu par trois ou quatre dentelures médiocrement développées; l'angle postérieur n'est aigu que parce que le bord postérieur est échancré dans son voisinage, mais à partir du 16^e segment il s'allonge un peu et dépasse alors le niveau du bord postérieur. Le dernier écusson est triangulaire à pointe tronquée, et porte, entre la base et la pointe,

une couronne de six tubercules isolés aigus. L'écaille sous-anale est large et arrondie.

Grotte de Betharram (Basses-Pyrénées).

***Lysiopetalum* sp. (an *foetidissimum* Savi).**

♀ 53 segments. — Longueur 30 mill. Largeur 2 mill. Hauteur 2,30 mill. — Un exemplaire à corps un peu ramassé, de coloration pâle, à sculpture analogue à celle du *foetidissimum*, d'ailleurs sans particularité saillante. Un second exemplaire est plus élancé, avec le même nombre de segments.

L'étiquette portant « catacombes », nous avons cru à une erreur ; mais M. Viré précise, ses souvenirs sont très nets. Il a recueilli l'un de ces échantillons en mars 1897 dans les galeries qui s'étendent sous la place Saint-Jacques, sur de vieux boisages et des myceliums de champignons ; et l'autre le 6 juin 1900, sous la rue N.-D.-des-Champs, sur des champignons. Il est intéressant de retrouver dans de semblables conditions une forme dont les représentants sont localisés dans la province méditerranéenne. Il y a tout lieu de supposer qu'elle a été transportée avec des bois de provenance méridionale, dans les catacombes, où elle ne semble toutefois pas s'acclimater facilement, car elle y est rare et de taille chétive.

ÉTUDES ZOOLOGIQUES EXPÉRIMENTALES SUR LES LÉPIDOPTÈRES

RÉSULTATS PRINCIPAUX OBTENUS JUSQU'A LA FIN DE 1898 ⁽¹⁾

avec les planches 1-3,

PAR LE D^r MAX STANDFUSS,

Directeur du Musée entomologique au Polytechnikum de Zurich.

RÉDACTION FRANÇAISE PAR H.-F. DECKERT.

Ce travail traite des expériences de température et d'hybridation ⁽²⁾ que j'ai poursuivies pendant douze années pour les premières et vingt-cinq années pour les deuxièmes.

Les expériences de température ont été opérées sur plus de 42.000 individus de 60 espèces différentes; celles d'hybridation sur environ 38.000 individus appartenant à 30 espèces différentes.

Les Lépidoptères se prêtent tout particulièrement à ce genre d'études. Il est en effet facile de se les procurer à l'état naturel et libre, et en nombre d'espèces différentes. Ajoutez à cela que le développement de ces insectes s'opère souvent très vite pour beaucoup d'espèces, dans nos contrées, même deux fois dans le courant d'une année; enfin les différentes phases de la métamorphose, très changeante par suite des marques caractéristiques, nous donnent la clef permettant de se livrer à toute une série d'observations biologiques physionomiques et physiologiques.

I. — EXPÉRIENCES DE TEMPÉRATURE.

Les expériences de température qui nous préoccupent ici ⁽³⁾ furent faites uniquement sur la chrysalide, et sont une continuation et une généralisation de celles poursuivies méthodiquement jadis par G. Dorfmeister, Aug. Weismann et W.-H. Edwards vers 1860 et 1870.

(1) En 1898, 4.500 individus furent employés pour les expériences de température, et 3.200 pour celles d'hybridation.

(2) Un ensemble d'expériences de température poursuivies dans une autre direction, ont été décrites dans mon Manuel sur les Macrolépidoptères paléarctiques, p. 137-153.

(3) Les expériences d'hybridation feront l'objet d'une étude qui sera publiée dans un prochain fascicule des *Annales*.

A ces essais, entrepris dans un sens, viennent s'ajouter les miens, entrepris dans une tout autre direction, et concernant la transmission de formes nouvelles, obtenues à la suite des expériences.

Les études des trois naturalistes cités plus haut, ont pour origine l'apparition dans la nature, à l'état libre, du dimorphisme saisonnier (ce nom est de Wallace).

Qu'est-ce que le dimorphisme saisonnier? — Le fait que des espèces qui se reproduisent deux fois dans le courant d'une année présentent alors, le plus souvent, des différences très marquées de taille, de forme et de coloration, chez les deux générations. L'exemple le plus frappant est celui de *Van. levana* L. dont le type, provenant de la chrysalide qui a hiverné, est si différent de la génération d'été, qu'on a longtemps regardé les deux Papillons comme deux espèces différentes. Les expériences faites autrefois par Dorfmeister et Weissmann se rapportent à ce Lépidoptère. Weissmann, à qui nous devons le meilleur travail sur ce sujet (paru en 1875), opéra de la manière suivante : il mit des chrysalides d'été de *Van. levana* de 2 à 4 semaines dans une glacière, et la chrysalide d'hiver dans une serre chaude de $+ 15^{\circ}$ à $+ 40^{\circ}$ C. Par ce procédé, la forme de la saison d'été fut transformée directement en forme de printemps, alors que l'inverse, la transformation de la forme de printemps en celle d'été, se fit plus difficilement, échoua même la plupart du temps. Weissmann en conclut que l'espèce était de provenance septentrionale, que la forme de printemps, *Van. levana*, était la plus vieille, par suite la plus invariable, alors que la forme d'été, un produit plus récent, était aussi nouvellement apparue dans les phases de développement de l'espèce. Cette acception est certainement juste, car l'espèce pourrait bien provenir de l'Asie septentrionale. On y trouve quatre formes proches parentes, tout ce que l'on en connaît dans le monde, puis également le type, *Van. levana*, et sur certains points en une seule génération, celle d'hiver, comme à Nicolajefsk et à Chabarofka. *Van. prorsa* est donc bien une forme nouvelle que l'on peut ramener à la forme primitive, *Van. levana*, par l'abaissement de la température à laquelle est soumise la chrysalide. La forme « phylogénétiquement » la plus jeune peut être ramenée à la forme « phylogénétiquement » la plus vieille. D'autres essais avec *Pap. Ajax* L., *Pieris napi* L., *Polyom. phlaeas* L., *Pararge Aegeria* L., espèces présentant chacune un dimorphisme saisonnier, conduisirent à une conclusion analogue. Dorfmeister, Weissmann et Edwards en étaient arrivés là jusqu'en 1875. Tous les trois attribuent à l'influence de certains degrés de température sur la chrysalide les modifications d'aspect du Lépidoptère, l'espèce étant considérée comme type isolé, n'ayant par

conséquent aucune arrière-pensée sur leurs rapports de parenté avec d'autres espèces ; et en effet les espèces jusqu'alors soumises à ces expériences ne semblaient point de nature à ouvrir dans la suite une perspective phylogénétique. Dix ans plus tard juste, je me livrai à de semblables expériences ; à partir de 1893, sur une plus large échelle, parce que les expériences d'hybridation menées dès 1873, de pair avec celles de température, avaient, jusqu'en 1893, nécessité un emploi de temps considérable. A partir de 1888, le distingué lépidoptériste anglais Merrifield fit des expériences analogues, et depuis a publié toute une série de communications à ce sujet, dans les *Trans. ent. Soc. Lond.* Weissmann également continua ces expériences auxquelles finirent par se livrer un grand nombre de jeunes entomologistes. Les expériences de température entreprises par moi se divisent, d'après leur nature, en deux groupes : d'une part, on employa des températures constantes, soit modérément élevées de $+ 37^{\circ}$ à $+ 39^{\circ}$ C. où les chrysalides séjournaient trois ou plusieurs jours, soit modérément abaissées de $+ 4^{\circ}$ à $+ 6^{\circ}$ C. où elles séjournaient de 4 à 8 semaines. — Nous appellerons ces expériences « expériences de chaud et de froid ». Les premières furent entreprises dans l'appareil de germination de l'établissement de contrôle pour les grains, à l'Institut polytechnique, dont le directeur, M. le Dr Stebler, m'accueillit de la façon la plus aimable et la plus serviable. Pour les deuxièmes, on se servit d'une glacière ordinaire, semblable à celle employée, dans les ménages, pour la conservation des aliments. Après le traitement par le froid, les chrysalides restèrent quelque temps encore sous l'influence de la température ordinaire, jusqu'à l'éclosion des Lépidoptères ; ce fut aussi souvent le cas après le traitement par le chaud ; un petit nombre seulement de chrysalides restèrent dans les appareils de germination jusqu'au développement de l'imago.

D'autre part, il s'agit d'essais que l'on pourrait désigner comme « expériences de chaleur et de gelée », par opposition aux autres. Les températures employées ne le furent que pendant un certain temps, de 2 à 7 heures au plus, pour chaque exposition, car elles ne sauraient être supportées que temporairement. — Pour les expériences de chaleur, toujours à l'aide des appareils servant au contrôle des grains, on employa des températures de $+ 40^{\circ}$ C. à $+ 45^{\circ}$ C. Les degrés de congélation de 0° à $- 18^{\circ}$ C. furent fournis par l'appareil de congélation de l'établissement pour l'épreuve des matériaux de construction dont le directeur, M. le professeur L. Tetmayer, encouragea ces essais de tout son pouvoir et de la façon la plus bienveillante.

EXPÉRIENCES DE FROID ET DE CHAUD.

D'après les considérations exposées dans le « Handbuch der palaarktischen Gross-Schmetterlinge » il résulte ce qui suit :

Des espèces de provenance septentrionale, c'est-à-dire qui avec leurs analogues vivent dans des contrées septentrionales ou en proviennent, donnèrent avec le froid des formes régressives, avec la chaleur des formes progressives. — Inversement, des espèces de provenance méridionale, telles que celles qui du Sud ont pénétré dans nos régions septentrionales et dont les parents appartiennent tous, ou à de rares exceptions près, à des régions tropicales, accusent avec le chaud des formes régressives, et avec le froid des formes progressives. En ce qui concerne les expériences tentées jusqu'ici, voici ce que j'entends par les mots régressif et progressif.

1° Au moyen de ces essais, j'obtiens des formes de saison, c'est-à-dire des formes dont l'apparition correspond d'une manière constante à une saison déterminée. Comme on l'a déjà vu par les expériences généralement connues de Dorfmeister et de Weissmann (*Van. levana* et *Van. prorsa*) on pouvait par le froid transformer la 1^{re} génération de *Van. C.-album* L., celle d'été, en celle d'automne, la deuxième; inversement, par la chaleur on passe de la 2^e génération à la 1^{re}, en tout ou partie au moins. Or nous avons de bonnes raisons de croire que *Van. C.-album* L. est une espèce de provenance septentrionale, et que sa forme d'automne est la plus vieille philogénétiquement parlant, alors que la forme introduite depuis est par conséquent plus récente. D'où il s'ensuit que la 1^{re} génération aurait été, à la suite d'expériences, transformée régressivement; la 2^e génération par contre, progressivement. — La génération d'été de *Pap. podalirius* L. (Wallio), *Pieris daphidice* L. (Berlin) et *Polyommatus Amphi-damas* Esp. ⁽¹⁾ (Leipzig), pouvait aussi, chez beaucoup d'individus, se transformer parfaitement, par le froid, en la forme que donne la chrysalide d'hiver.

2° J'arrivai à produire expérimentalement des formes locales, c'est-à-dire des formes qui se rencontrent d'une façon constante dans certains pays. Ainsi je réussis par le froid à transformer directement *Van. urticae* L., de Zürich, en var. *polaris* Stgr., de Laponie, et, par la chaleur, à la rapprocher sensiblement de la var. *ichnusa* Bon., de la

(1) Le contraire se produisit aussi avec succès chez ce même *Polyom. Amphi-damas* : transformation directe de la génération d'hiver en la forme d'été. Dans la plupart des cas les chrysalides furent constamment soumises, en fin mars et commencement avril, à une température de + 37° C. pendant 11 à 14 jours.

Corse et de la Sardaigne. *Van. urticae* est très probablement une espèce de provenance septentrionale; var. *polaris* peut en être considérée comme la forme la plus vieille et var. *ichnusa* comme la forme la plus jeune.

Le *Pap. Machaon* éprouva aussi, par le chaud, un changement particulièrement frappant. A la suite du traitement auquel furent soumises des chrysalides de la forme d'été (Zürich), j'obtins des Lépidoptères semblables à ceux que l'on trouve en juillet et août en Syrie, aux environs d'Antioche et de Jérusalem. De même, la 2^e génération de *Pap. podalirius* L. (Wallis) peut se transformer par le chaud en la génération d'été, beaucoup plus caractéristique, des contrées méridionales; on peut également obtenir ainsi la forme typique de la var. *Zanclus* L. telle qu'on la trouve par exemple en Sicile.

3. *Transformations se rapportant au dimorphisme sexuel.* — Par le chaud, *Parn. Apollo* L. femelle se trouva transformé, et prit l'aspect du mâle; soumis au même procédé, celui-ci vit disparaître de ses ailes antérieures les écailles sombres de la bordure extérieure, elles devinrent blanches. Certainement on ne doit guère considérer le dimorphisme sexuel de coloration que comme un des anneaux de la chaîne de développement phylogénétique et normal de l'espèce, et dans les cas ici présentés, comme du reste cela semble être la règle générale, l'individu mâle pourrait bien représenter le type le plus jeune, et la femelle le plus vieux. Il en résulte, d'après nos expériences, que le type coloré femelle, le plus vieux, se trouva transformé en type mâle, plus jeune, et le mâle continua encore à se développer progressivement. Une autre remarquable transformation est celle du type pâle et blanchâtre de la femelle de *Rhodocera Rhamni* L. en type jaune intense, couleur du mâle, transformation qui s'effectua parfaite ou fort approchante, par le froid. Toutefois il semble qu'il s'agit, dans le cas de cette transformation frappante de la coloration type de la femelle, non de phénomènes phylogénétiques, mais bien physiologiques, c'est-à-dire d'une corrélation entre la coloration et les organes génitaux. Ainsi dans le cas présent, chez certaines femelles, les expériences de chaud causèrent aux glandes embryonnaires un endommagement et un dérangement qu'un rapport étroit semble lier à la transformation de couleur.

4. Il est encore résulté de nos expériences des formes phylogénétiques (1) qu'on ne rencontre nulle part dans le monde, ou du moins fort rarement :

(1) En février 1898, tout un lot de *Pap. Hospiton*, Gênes (chrysalides

a. Formes qui ont dû appartenir à l'histoire primitive de l'espèce, formes par conséquent régressives, dans le sens le plus propre. — Elles

de Sardaigne) se trouva rapproché, par la forme des ailes et le dessin, de *Pap. Machaon*. Les ailes antérieures étaient plus étendues, la queue des ailes postérieures allongée, les lunules jaunes de la bordure externe des ailes antérieures et postérieures et les ocelles rouge brun de l'angle anal aux ailes postérieures gagnèrent visiblement en extension; chez quelques sujets on pouvait aussi remarquer de nombreuses écailles jaunes à la base des ailes antérieures ainsi que dans la bande noire de l'anté-marginale, autant de rapprochements avec *Pap. Machaon*. Que l'on compare le sujet femelle, planche I, fig. I, sur lequel la transformation de la forme et de l'aspect des ailes ressort clairement.

On en peut déduire que *Pap. Hospiton*, qui appartient à la région montagnueuse de la Corse et de la Sardaigne, de même que *Argynnis Elisa* God., *Sal. Neomiris* God., des mêmes contrées, doit sa création comme espèce à une époque de température basse qui causa certaines différences de coloration et de forme d'aile, deux choses entre lesquelles existe un rapport étroit. Ce fut certainement favorisé aussi à un haut degré par l'isolement insulaire. Ce qui est réel, c'est que *Pap. Hospiton*, en plusieurs points, peut, par une élévation de température, être amené à converger vers *Pap. Machaon*. L'influence durable de températures basses sur *Pap. Hospiton* s'explique à cause de sa génération unique, dans l'année, alors que *Pap. Machaon*, dans la vaste étendue de contrées où il est répandu, a deux générations.

Jusqu'ici, j'ai obtenu de chrysalide environ 583 sujets de *Pap. Hospiton*, et dans l'année 1893 seulement, qui fut excessivement chaude, j'eus, de nouvelles chrysalides de Sardaigne, un petit nombre de sujets, au mois d'août, qui tiennent à peu près le milieu entre ceux transformés expérimentalement et les types normaux.

Les transformations que subirent les trois espèces de *Thats* ou leurs formes locales : *Cerisyi* B., *Deyrollei* Obth., *rumina* L., *Polyxena* Schiff., sous l'influence de la chaleur, sont aussi remarquables; 150 chrysalides de la forme locale d'Amasia (v. *Deyrollei* Oberth.) furent soumises à une température constante de + 37° C., au mois de février, pendant 9 à 15 jours, c'est-à-dire d'une façon continue jusqu'au moment de l'éclosion. A la partie supérieure des quatre ailes, et dans un rapport de 1/2 environ, les femelles gagnèrent une coloration tirant sur le brun, ce qui est très rare à l'état normal; de même aux ailes inférieures, moins marquées cependant. Ceci était en général accompagné par un agrandissement des éléments noirs du dessin. Les types les plus extrêmes arrivèrent jusqu'au brun jaune luisant du typique *rumina* ab. *Cauteneri* Sigr., de Malaga. L'original de la pl. I, fig. 2, est un des exemplaires femelles parfaitement brunis par les expériences, mais chez lesquels les tons colorés noirs n'ont dépassé la ligne normale que sur les ailes antérieures.

Chez les mâles, le même traitement ne produisit que tout à fait exceptionnellement un assombrissement sensible de la couleur claire du fond; plus souvent alors, quoique plus sensible toutefois, un accroissement de taille et

ont ceci de remarquable qu'elles offrent un rapprochement avec d'autres espèces parentes qui elles-mêmes semblent se rapprocher encore davantage d'un type primitif ayant existé autrefois. *Van. polychloros* L.

une multiplication de dessins, parfois aussi accompagnée d'un agrandissement des taches rouges des ailes postérieures. Le mâle représenté pl. I, fig. 3, accuse ces caractères. Son dessin montre une gradation semblable à celles des sujets femelles clairs de la var. *Deyrollei*, tels qu'on les trouve à l'état libre à Aintab, au N.-E. d'Antioche (Syrie).

Selon nous (Cf Standfuss, Handb. d. palaearct. Gross-Schm., 1896, p. 226-227) ce type femelle d'Aintab serait celui qui aurait le plus progressé. La fig. 4 de la pl. I. représente une femelle d'Aintab dont la chrysalide n'a subi de traitement d'aucune sorte. Un petit nombre de mâles, à la suite des expériences, acquièrent aux ailes postérieures un aspect très particulier; les pointes allongées s'étendent quelque peu, ce qui a un certain rapport avec la forme des ailes postérieures des *Papilio* à queue tel que *Podalirius* L. — *Thais Rumina* L. de Portugal (93 chrysalides furent traitées expérimentalement) donna sous l'influence de + 37° C. (chrysalides d'hiver) en janvier et février, au bout de 6 à 15 jours également, un type dont le fond jaune clair était fortement rembruni, avec en même temps une augmentation visible des éléments de dessin noir — ainsi que des individus établissant transition à cette forme — 34 exemplaires en tout. Cette particularité, peu commune chez le mâle (7 individus), fut au contraire bien développée chez la femelle (27 sujets). L'une de ces femelles est figurée pl. I. fig. 5. Ce type, l'ab. *Cauteneri* de Staudinger, se rencontre, mais rarement, en Andalousie et en Algérie. Quelques chrysalides de Malaga me donnèrent parfois l'ab. *Cauteneri*, mais jamais en aussi grand nombre que les chrysalides du Portugal sur lesquelles j'expérimentai, et à une époque plus proche aussi, alors que le Papillon éclosait déjà, à l'état libre, septembre et commencement d'octobre, donc avant tout hivernage. Parmi les *Thais Rumina* parvenues à l'éclosion dans les températures normales, il n'y eut aucune ab. *Cauteneri*.

Thais Polyxena Schiff., de Vienne (400 individus traités par le chaud) donna par + 37° C., au bout de 8 à 12 jours, 26 sujets de l'ab. *ochracea* Stgr. (forme analogue à celle de l'ab. *Cauteneri*) ainsi qu'un assez grand nombre de passage à cette forme. On ne peut distinguer ici, en même temps, une augmentation du dessin noir. — L'apparition de cette forme est encore plus accentuée chez la femelle (16 individus) que chez le mâle (10 sujets). — La fig. 6 de la pl. I représente un mâle de cette forme brunie par l'expérience. De Vienne, je ne vis jamais et n'élevai jamais de sujets aussi sombres que ceux obtenus à la suite des expériences; ce ne fut que tout à fait exceptionnellement que j'obtins des sujets aussi foncés avec des chrysalides de Budapest et des environs de Mehadia, et par le traitement normal de grandes quantités d'individus. Les formes les plus extrêmes des imagos obtenues expérimentalement se rapprochent beaucoup de la *Thais Polyxena* var. *Polymnia* Mill. aberratio (cf. Millièrre, Lépidoptérologie, 7^e fascicule, 1881, p. 2-4, pl. X, fig. 5) qui provient

par exemple, acquit par le froid, sur la partie supérieure des ailes antérieures, à la bordure externe, une rangée de taches bleues distinctes, qui à l'état normal font complètement défaut; mais on les trouve encore chez *Van. urticae* L. — *Van. Io* L., tant à sa partie supérieure qu'inférieure, se trouva également rapprochée visiblement de *Van. urticae*. A peu près au milieu de la partie supérieure des ailes antérieures se remarquèrent, chez *Van. Antiopa*, des traces visibles de tache double, précisément à l'endroit où *Van. urticae* et *C. album*, ainsi que d'autres espèces parentes, en possèdent normalement de semblables, etc.

b. Formes qui se présenteront peut-être dans l'avenir au cours du développement de l'espèce. Il en résulte que ce serait des formes progressives. Elles se distinguent en ce qu'elles s'éloignent tant du type souche que du type des formes alliées, tendant vers un type particulier qui serait issu d'un rameau nouveau. Chez les Vanesses propres, de provenance septentrionale, et traitées en grande quantité, ces formes naissent en général par le chaud. C'est particulièrement caractéristique chez *Van. Antiopa*. Ce n'est certainement que chez les Vanesses ou *Pyrameis cardui* L. et *Atalanta* L. que ces formes s'obtiennent par le froid.

5. Dans quelques rares exceptions, les expériences de froid et de chaud donnent des aberrations, c'est-à-dire des formes qui, sans se rapporter à une saison ou à une localité déterminées, se rencontrent d'aventure, là où vole l'espèce type, à l'état libre, mais fort rares aussi. Ce sont les mêmes aspects ou à peu de chose près. Parmi ces formes, il s'en trouva d'autres que l'on peut bien ranger dans cette catégorie, mais que jusqu'à présent l'on n'a encore jamais trouvées dans la nature. Nous y reviendrons plus loin.

Ainsi le froid donna la forme exceptionnelle privée d'ocelles de *Van.*

de l'île Euboea et qui pourrait bien être la forme la plus extrême de l'*ab. ochracea* connue jusqu'ici.

Les expériences de chaud pour les trois formes de *Thais*, par le même traitement, ont donc donné une grande variation dans une direction de développement très semblable, suivie surtout et presque exclusivement par le sexe femelle; tant par le nombre des sujets obtenus que par l'intensité de l'empreinte, ces résultats semblent bien indiquer qu'il ne s'agit ici que d'une formation régressive. Nous trouvons effectivement des tons bruns plus clairs ou plus sombres, comme couleur de fond, chez des familles de Papillons toutes différentes. On peut comparer à ce travail celui de Alfr. G. Mayr : *On the Color and Color Patterns of Moths and Butterflies, Proceed. of the Boston Society of Nat. Hist. Boston*, vol. XXVII, 1887.

10, et une forme aberrante caractéristique de *Van. urticae* et de *Van. polychloros*. Le chaud, dans quelques rares cas, élargit considérablement la bordure jaune de *Van. Antiopa*. — *Van. cardui* et *Van. polychloros* subirent sous cette influence des transformations aberrantes analogues. Ces aberrations se produisirent lorsque l'influence du froid ou du chaud atteignait les extrêmes; dès 1894, le résultat de mes observations à la suite de ces expériences me faisait écrire dans mon aperçu « Sur les causes de variation et d'aberration à l'état de Lépidoptère chez les Papillons (Entom. Zeitschr. Guben, 1894, 15 sept., p. 102, 103) » la conclusion suivante :

Il semble par conséquent vraisemblable à un suprême degré qu'un grand nombre des aberrations que l'on trouve dans la nature, aberrations si remarquables par leurs aspects sombres et par leur raison d'être jusqu'ici incompréhensible, proviennent de l'influence produite sur la chrysalide par des températures anormales; aussi l'emploi de températures de $+ 40^{\circ}$ C. et au-dessus, et de 0° C. et au-dessous, s'impose comme complément nécessaire aux essais jusqu'ici tentés. Je prédis les résultats de ces expériences dès 1895 dans mon grand Manuel, pages 291-292, avant même qu'elles fussent tentées de quelque façon que ce soit.

Nous arrivons au deuxième ordre d'essais de température :

EXPÉRIENCES DE CHALEUR ET DE GELÉE.

Ainsi que cela a déjà été dit, les températures de $+ 40^{\circ}$ C. à $+ 45^{\circ}$ C. et de 0° C. à $- 18^{\circ}$ (exceptionnellement jusqu'à $- 20^{\circ}$ C.) ne purent être employées que pendant peu de temps, ne pouvant naturellement être supportées que pendant un court espace, en général pour la plupart des nombreuses expériences faites pendant 3 à 6 jours, à raison de deux heures par jour. Entre les expositions, ainsi qu'après, les chrysalides restaient soumises à la température ordinaire du jour; avec les expériences de chaleur comme avec celles de gelée, la grande masse du matériel d'essai ne changea pas, seule une petite fraction s'écarta toujours du type normal et, chose remarquable, dans les mêmes proportions pour l'un ou l'autre cas; de $- 15^{\circ}$ C. à $- 20^{\circ}$ C., les formes furent les mêmes que celles de températures de $+ 40^{\circ}$ C. à $+ 45^{\circ}$ C., ou du moins très semblables, ici comme là il y eut des aberrations. Cet étrange résultat nous conduit à cette question :

Comment agissent ces expériences de gelée et de chaleur?

L'observation montre que toute une série de chrysalides étant soumises trois jours durant, dans un appareil de congélation, à une tem-

pérature de — 12° C. environ, et cela à deux reprises différentes par jour, de deux heures chaque, les Lépidoptères n'éclosent point six heures plus tard, mais bien avec des journées de retard. Il est remarquable que la même observation se fasse avec des températures de + 44° C. Ainsi les températures n'agissent en aucune façon de manière à hâter l'éclosion, comme on serait tenté de le croire, mais au contraire interrompent directement le développement et le reculent au delà du temps de l'exposition.

La forte influence de si hautes températures apparaît encore plus frappante lorsqu'on soumet à + 44° C. environ les chrysalides de l'éclosion d'été d'espèces dont une génération hiverne comme chrysalide. — Une certaine quantité n'écloît pas, en général, comme seconde génération, mais hiverne, et donne, au printemps suivant, des Papillons du type normal de la première génération. Ces observations se justifient même chez les individus laissés à l'influence normale et qui sortirent avec la deuxième génération. L'interruption dans le développement fut tel que le sommeil d'été se trouva chez ces espèces remplacé directement par le sommeil d'hiver de la génération suivante. On peut ici ajouter, ce qui est alors plus compréhensible, qu'avec les expériences de gelée, les chrysalides d'été appartenant à des espèces ayant deux générations, n'éclosent point, mais hivernent, dans une certaine proportion variable, et suivant le degré de la gelée et la durée de l'influence. D'où la réponse à la question : Comment agissent les expériences de gelée et de chaleur ? Elles interrompent le développement, plongent l'insecte dans un état léthargique, alors que pareille interruption ne se produit point avec les expériences de froid et de chaud.

Il existe encore entre ces deux genres d'expériences une deuxième différence plus importante.

Les essais de froid et de chaud donnèrent comme résultat une transformation de l'ensemble du matériel, avec une façon de procéder différente dans un sens et une proportion différente, tout aussi bien qu'avec un même traitement, dans une direction déterminée constante ; et cela sans écarts particulièrement grands d'individu à individu. L'influence de la chaleur n'imprima jamais à la même espèce, et de la même façon, une direction de développement comme celle que cause l'expérience du froid ; jamais non plus l'inverse ne se produisit. Il s'agissait donc bien clairement d'une influence directe.

Les expériences de chaud sur les chrysalides d'hiver, entreprises en proportion plus grande au printemps 1898, ne donnèrent pas un résultat si égal et une démonstration si claire. Une certaine proportion

seulement du matériel d'essai se trouva continuellement transformée dans un sens déterminé. Tout le reste demeura invariable. Il semble qu'une partie de ces chrysalides, au repos depuis longtemps, se soient trouvées fixées dans une direction de développement normal, que l'expérience ne peut plus changer — du moins n'y ai-je point réussi jusqu'ici.

L'influence, avec les expériences de froid et de chaud, est bien directe.

Il en est tout autrement avec les expériences de gelée et de chaleur. Il ne se produisit jamais ici, à l'encontre des expériences de froid et de chaud, une transformation d'un certain nombre de sujets expérimentés, dans un même sens, s'écartant de la forme normale. Il est d'abord à remarquer que, régulièrement, la plus grande partie des sujets ne changent en aucune façon. Dans le reste, et pour certains groupes d'individus, on reconnaît un certain nombre de lois dans la transformation; mais un groupe d'individus comparé à un autre, et cela dans la seule et même expérience, semble suivre une direction complètement divergente. En outre, et dans la même proportion, sous l'influence de températures basses, et lorsqu'on dépasse une certaine limite, par exemple de -8°C. à -18°C. (une différence très sensible), les mêmes écarts se manifestent pour la majorité des sujets. Avec les expériences de froid et de chaud par contre, même de faibles différences de températures, lorsqu'elles étaient employées d'une façon constante, suffirent pour donner naissance à différentes séries de formes. Nous voyons du reste, sous l'influence de la chaleur, les Vanesses donner exclusivement des formes qui correspondent sûrement à certaines formes obtenues par les expériences de gelée. Les différences (en ce qui concerne les points de similitude dans la formation de ces deux séries de formes), jusqu'ici constatées entre les individus aberrants produits par la chaleur et ceux obtenus par la gelée, vont en diminuant, et seront peut-être encore amoindries par des études plus approfondies.

Tout ceci nous conduit à répondre en outre à la question : Comment agissent ces expériences de gelée et de chaleur? que l'action est indirecte et non directe. Car, comme conséquence de l'état léthargique provoqué par ces expériences, il peut se produire des faits qui impriment à la transformation une direction qui lui est propre; et il importe peu, pour l'établissement de cette direction, que l'état léthargique soit provoqué par la gelée, la chaleur ou peut-être encore par d'autres influences perturbatrices.

Comment peut-on donc définir les aberrations? Que devons-nous en penser? car nous n'en avons pas encore donné d'explications. — Nous

avons simplement fait observer que ce sont des formes qui, sans se rattacher à une saison ou à une localité déterminées, font leur apparition, bien que très rarement, dans le domaine de l'extension de l'espèce et par conséquent dans la nature libre. Mais cela ne fournit aucune explication sur l'« être » proprement dit des aberrations.

Si, pour la recherche de ce problème, on ne considérait que quelques espèces déterminées du genre *Vanesse*, on pourrait peut-être arriver à quelque chose de consistant par l'observation superficielle, et apercevoir, en prenant comme point de départ certaines formes aberrantes parmi les aberrations, fortement mélanisantes et se ressemblant, des retours vers un ancêtre très éloigné; c'est la direction commune à ces espèces. — Toutefois cette assertion ne peut être véridique, car de puissantes raisons militent contre. L'une de ces raisons est que non seulement les aberrations se rencontrent plus nombreuses dans le sexe masculin que dans le sexe féminin, mais encore avec un penchant très prononcé pour la forme extrême; alors que le sexe féminin, d'après les expériences, montre un penchant plus fort dans la direction du développement atavique.

L'idée la plus sérieuse que l'on puisse avoir sur les aberrations en tant que formations ataviques est basée sur des considérations philogénétiques. Ainsi le genre *Vanesse* et les genres de *Nymphalides* voisins tels qu'*Argynnis* et *Melitaea* nous amènent à la conviction que des tons brun clair ou jaunâtres ne vinrent pas après coup se poser sur un fond noir ou fortement noir brun primitif, comme on devrait en réalité se le figurer après avoir posé le principe du mélanisme atavique. Au contraire, ce sont les éléments de dessin sombres qui se produisirent sur un fond primitivement jaunâtre ou brun clair. Ainsi chez les *Vanesses*, nous avons deux espèces qui amènent ce progrès philogénétique de couleur de fond brun clair parsemée de dessins sombres, à l'expression de couleur de fond fortement noire-brune, dans leur dimorphisme de saison : ce sont *Van. Lebana* L. et sa parente *Van. Burejana* Bren., de la Sibérie orientale.

Mais si nous ne devons pas considérer les aberrations comme des formes dans une direction atavique prononcée, que sont-elles alors?

Considérées au point de vue de l'influence de l'expérience, elles ne peuvent être prises comme la conséquence directe de cette influence, mais simplement comme une apparition accompagnant celle-ci, et nullement comme un résultat constant. La conséquence directe de l'expérience est la léthargie, l'interruption de développement dans laquelle l'organisme des insectes à l'essai est plongé et qui, même à un moment quelconque du travail de vie, alors que la chrysalide, par transforma-

tions successives, procède directement à la construction du corps, est encore d'une signification fondamentale pour l'empreinte future de la parure colorée de l'imago. Cette interruption arrête la continuité du cours de développement normal, qui, à vrai dire, tient attaché l'être en particulier et le pousse en avant dans une direction déterminée. Avec le retour du développement une partie des sujets, la plus grande même, poursuit sa route dans une direction normale, alors que la plus petite partie suit une direction qui s'écarte de la normale; il semble que l'interruption l'ait pour ainsi dire fait sortir de son ornière. Il s'agit par conséquent ici d'un développement relativement propre à ces êtres particuliers, à cause de l'empreinte différente d'un individu à un autre. Les aberrations pourraient donc tout d'abord représenter des anomalies individuelles de coloration dans de nouvelles directions. Mais il se manifeste encore un autre côté de leur caractère. Comparons-les, par exemple, avec les types qui, à la suite des expériences de froid et de chaud, se présentent évidemment comme conséquence directe de cette influence due à des températures modérément élevées ou abaissées; un nombre considérable de ces derniers se trouvent en effet comme formes locales ou de saison; ou alors se meuvent dans la direction de ces espèces, philogénétiquement, en avant ou en arrière. Il en est tout autrement avec les aberrations. Elles suivent une marche divergente de ces directions de développement, et, comme deuxième particularité de leur être, ne se meuvent pas dans les voies de développement normal philogénétiques de l'espèce.

Les expériences de chaleur et de gelée n'avaient certes pas pour but d'obtenir des aberrations, mais bien de s'engager dans cette voie, et, si possible, de résoudre deux questions d'intérêt scientifique; la première :

Quels facteurs du monde extérieur sont la cause des aberrations, de ces formes énigmatiques dans leur apparition et dans leur être, que l'on trouve dans la nature? — la seconde :

Ces formes nouvelles, ces parures aberrantes, sont-elles transmissibles à la descendance? Pour résoudre le premier problème, je me livrai à des expériences tout à fait méthodiques. Quiconque examine attentivement une série des plus grandes collections de Lépidoptères ne sera pas sans reconnaître que les aberrations proviennent de contrées où il y a de nombreuses et fortes variations de température, ou de contrées dans lesquelles de semblables changements brusques sont des phénomènes ordinaires, comme par exemple dans certaines vallées montagneuses de la région alpine.

Peut-être, et cela semble la conclusion probable à en tirer, les abais-

sements considérables et durables de température, à la suite d'orages violents, surtout quand ces orages sont accompagnés dans la plaine de grêle et dans les montagnes de neige, en sont-ils la véritable cause?

J'expérimentai en conséquence de la façon la plus différente, avec — 0° C. et — 2° C., pour reproduire les écarts de température les plus extrêmes qui dans de pareils cas peuvent avoir lieu; le résultat de toutes ces expériences fut complètement nul, malgré la grande quantité de sujets employés.

Ce fut seulement par une influence répétée de — 5° C. qu'apparurent quelques sujets aberrants.

Il va sans dire que le phénomène d'une température de — 5° C., en saison chaude, dépasse toute conception. Encore moins peut-il se produire des retours de — 8°, — 9°, — 12° C., etc. avec lesquels, au cours des expériences, se manifestèrent alors toujours des aberrations, quoique en petit nombre. Et même, ce dernier fait, sur lequel il faudrait insister, n'a lieu que dans le cas où chez ces espèces tout le développement de l'œuf ou du Papillon s'effectue pendant la saison chaude, et où l'imago hiverne. Il ne s'agit pas, du moins au point où en sont les résultats de mes expériences actuelles, des espèces qui passent l'hiver à l'état de larve.

Il se peut, comme l'alternative l'indique clairement maintenant, que les aberrations proviennent de températures extrêmement élevées.

Je produisis encore expérimentalement les températures (1) pos-

(1) En 1898, je continuai ces expériences de chaleur avec + 42° jusqu'à + 44° C. dans une plus grande proportion. D'abord aux mois de janvier et février avec des chrysalides ayant hiverné de *Pap. Podalirius* L., *Machaon* L., *Thais Cerisyi* var. *Deyrollei* Oberth., *Polyomm. Amphidamas* Esp. et *Van. levana* L. Je réussis à obtenir de toutes ces espèces des aberrations caractéristiques dans le sens strict du mot. *Thais v. Deyrollei* donna des formes particulièrement extraordinaires. La fig. 7 de la pl. I, donne un exemplaire de ce genre du *Pap. Podalirius* L. qui a les dessins noirs élargis et fondus, du moins en plusieurs endroits des ailes antérieures. Les tons de couleur noire du magnifique sujet femelle de *Thais v. Deyrollei* Oberth. de la fig. 9, pl. I, sont considérablement agrandis, aussi bien à la partie supérieure qu'inférieure, et au delà de la mesure normale. Cette aberration apparut de plusieurs façons dans les expériences de chaleur. L'individu femelle de *Thais Cerisyi* B. (forme locale) nous semble beaucoup moins assombri fig. 1, pl. II, mais toujours avec une empreinte s'écartant du type normal. La fig. 10 pl. I et les fig. 2 et 3 pl. II montrent des anomalies de coloration de chrysalides d'hiver de *Polyomm. Amphidamas* Esp. (Leipzig) également sous forme de mélanisme aberrant. Ces individus présentent aussi à leur partie inférieure un allongement rayonné de certaines rangées de taches.

sibles dans la nature, et ici l'expérience ne se contredit pas, bien que le matériel fût beaucoup moindre.

Il suffit qu'une chrysalide, non seulement des espèces hivernant à

Au contraire, à côté de ces aberrations énumérées de *Papilionidae* et de *Polyomm. Amphilamas*, c'est-à-dire d'une *Lycaenidae*, il y eut chez *Van. levana* L. (Leipzig), une Nymphalide, un retrait des dessins noir-brun, comme on peut s'en rendre compte par les individus représentés fig. 11, pl. I et fig. 4, pl. II. On n'a pu obtenir jusqu'à présent, du moins par les expériences de chaleur avec des chrysalides d'hiver, des individus engagés dans une direction de développement opposée, ou en général différente.

Les mâles de *Thais* v. *Deyrollei* Obth. accusèrent aussi, avec les expériences de chaleur, contrairement à leurs femelles, et d'une façon aberrante multiple, un retrait des dessins noirs, comme on peut clairement le voir par la fig. 8, pl. I.

Ces essais vinrent ainsi combler une grande lacune dans les expériences entreprises jusqu'à ce jour.

Du mois de mai à la fin d'août, je fis toute une série d'expériences de chaleur avec des chrysalides d'été.

Van. Antiopa L. donna un certain nombre d'ab. *Hygiaea* Hdrch., ainsi que des passages à cette forme; deux individus caractéristiques en sont représentés fig. 5 et 6, pl. II. D'après les renseignements recueillis jusqu'ici, les aberrations se produisirent plus nombreuses qu'auparavant; dans le cas le plus favorable, j'obtins 7 exemplaires sur 40 individus, ayant fait subir une température de $+ 42^{\circ}$ à $+ 44^{\circ}$ C. pendant 3 à 5 jours consécutifs, à raison de 4 fois par jour, une heure chaque fois. Le passage de la température du jour à celle des chaleurs se fit brusquement comme pour toutes ces expériences de chaleur, comme aussi le retour à la température ordinaire à la suite des expositions. *Van. urticae* L. produisit plusieurs formes extrêmes de l'ab. *ichnusoides* Sel. Long. ainsi que des passages à cette forme, la fig. 9, pl. II, représente un type, la fig. 10, pl. II, un passage. *Van. Io* L. (individus assez développés, de 2^e gén. Zürich) donna ab. *Belisaria* Obth., fig. 11, pl. II. *Van.* var. *Prorsa* L. donna pour chacune des nombreuses séries exposées, des var. *Prorsa* L. tout à fait normaux, comme premières éclosions; puis succédèrent des ab. *Porima* et parmi elles, très rarement toutefois, des aberrations particulières dans une direction de développement différente, ainsi que le montrent les fig. 13 et 14, pl. II. Le type de la fig. 14 est si étonnamment aberrant qu'on ne sait trop d'abord de quelle espèce il s'agit. Quelques *levana*, très grands, de couleur typique, formaient la fin des séries souvent après un intervalle très sensible. Un certain nombre de chrysalides restèrent au repos et donnèrent au printemps 1899, en totalité, des *Van. levana* typiques. Je ne répétai point les essais sur *Van. polychloros* L., en 1898, car dès 1897 (cf. Exp. Zool. Stud., pl. IV, fig. 2 et 9) les expériences de chaleur donnèrent de magnifiques aberrations *testudo* Esp. en certain nombre. Une femelle est représentée fig. 12, pl. II, parce que les sujets.

l'état adulte, mais aussi de celles hibernant comme chenille, et se trouvant encore à l'état sensible, soit soumise pendant 2, 3, 4 jours consécutifs, deux heures durant, à une température de $+ 42^{\circ}$ C. à $+ 45^{\circ}$ C. c'est-à-dire de $+ 33^{\circ}$ R. à $+ 36^{\circ}$ R. pour donner éventuellement un Lépidoptère aberrant.

Cela arrive fréquemment aux flancs des montagnes, ou aux pans des rochers, contre des troncs à l'ombre également, des planches, des pierres, ou sous des feuilles serrées le long d'un bon conducteur de la chaleur.

Voilà bien l'explication naturelle de ces aberrations, qui, au grand étonnement des entomologistes, font leur apparition pendant l'élevage des chrysalides qui se trouvent par hasard dans un endroit bien exposé, ou bien là où peut se produire une forte réverbération, ou encore simplement du côté du soleil. Dans ces endroits en effet des températures différentes peuvent se produire.

On ne peut manquer de convenir de la justesse des causes que nous attribuons ici à l'apparition dans la nature des aberrations, car les écarts obtenus par les expériences de chaleur correspondent parfaitement à ces apparitions, alors que, parmi les aberrations provenant des expériences de gelée, il se présente des formes très variées, que, jusqu'à présent, l'on n'a certainement jamais trouvées dans la nature.

Pour bien faire voir l'accord qui existe entre les formes obtenues par la chaleur et les individus aberrants de la nature, on a mis en présence, pl. III, les aberrations obtenues expérimentalement, fig. 2, 4, 6, 8, avec celles prises dans la nature, fig. 1, 3, 5, 7. Les résultats des expériences de chaleur nous conduisent donc à cette conclusion ⁽¹⁾ :

Les aberrations typiques de Nymphalides, c'est-à-dire environ 80 à 90 % de toutes les aberrations connues, sont certainement produites, dans la nature, par une influence temporaire de degrés de chaleur s'élevant jusqu'à $+ 40^{\circ}$ à 44° C. Enfin, comme question finale, on peut se demander si par hasard les formes nouvelles produites par ces essais ne sont point transmissibles à la descendance? Les formes dites phylogénétiquement progressives obtenues par les expériences de

femelles de cette belle aberration sont excessivement difficiles à obtenir parfaits et irréprochables, et sont à peine connus dans la nature.

(1) Comme le montre la continuation des expériences de chaleur en 1898 (comparez le supplément précédent), les raisons que nous donnons à l'apparition des aberrations dans la nature, pour les Nymphalides, sont exactes, non seulement pour cette famille, mais encore pour un certain nombre de *Papilionidae* et une *Lycaenide* (le *Polyom. Amphidamas* Esp.), de telle sorte que la généralisation en paraît excessivement probable.

chaud et de froid eussent été les plus propres pour arriver à ce but. L'expérience en a transformé l'aspect d'une façon indiscutable, et tout à fait directe; et il s'agit ici de formes qui n'ont jamais été observées dans la nature, c'est-à-dire d'individus ayant des qualités récemment acquises.

L'emploi de ces formes échoua malheureusement parce qu'elles n'eurent pas assez de vitalité, du moins chez les sujets jusqu'ici obtenus. Ils avaient visiblement souffert par l'expérience. Et ce furent justement les formes extrêmes (qui eussent été les plus précieuses pour la continuation de l'élevage) qui eurent les ailes endommagées, perdant du sang en un ou plusieurs endroits; si bien qu'elles étaient incapables de soutenir un vol de quelque durée. Outre les ailes, les pattes, chez ces formes extrêmes, étaient ordinairement mal développées et incapables de servir longtemps. Il fallut donc se contenter des anomalies de coloration, d'aberrations, qui, d'un côté, ne pouvaient être qu'un résultat indirect des facteurs employés, et qui cependant, de l'autre côté, sans ces facteurs, ne se rencontrent jamais parmi des milliers de sujets; il fallut aussi y ajouter des formes nouvelles, qui, comme les premières, se trouvent seulement quelquefois avec un écart individuel considérable, et en partie dans une direction de développement bien différente.

Les essais avaient prouvé qu'avec les expériences de gelée seules on pouvait obtenir un plus grand nombre de ces formes, en pleine énergie vitale; aussi n'employa-t-on pour l'élevage que le matériel obtenu par cette voie. En outre, il parut bon de tenter un premier essai avec les espèces du genre *Vanesse* qui vivent sur les *Orties*, étant donné la culture relativement aisée de cette plante en grande quantité, dans de larges terrines. On put ainsi employer immédiatement les *Vanesses C. -album, urticae, cardui* et *Atalanta*, qui, toutes, vivent en général ou à l'occasion sur l'Ortie. Ces espèces étaient du reste doublement avantageuses en ce que dans nos pays elles ont deux générations.

Malheureusement je ne réussis finalement à me procurer de matériel suffisant qu'avec *Van. urticae*; pas moins de 8.231 chrysalides.

M. le Dr Stebler mit gracieusement à notre disposition pour l'expérience une partie de la serre de l'établissement servant au contrôle des grains. Afin d'assurer une bonne ventilation, on eut soin de remplacer quelques grands carreaux par un grillage de fil de fer. Quatre grandes terrines et quelques autres récipients contenant de nombreuses touffes d'*Orties*, cultivées depuis une année, ainsi qu'une quantité de pots d'*Oeillets* en fleurs, complétèrent l'installation du petit espace,

admirablement exposé au soleil. On s'était arrangé de façon à se procurer de l'ombre à volonté.

Le lundi de Pentecôte, 7 juin 1897, j'introduisis les premières *Van. urticae* anormales; je continuai ainsi jusqu'au 15 juin, ce qui porta le nombre des individus à 42, dont 32 mâles et 10 femelles.

Les mâles surtout étaient des sujets de forme extrême, avec des ailes postérieures entièrement noires à leur partie supérieure; parmi les femelles, deux seulement appartenaient à cette forme, les huit autres avaient la bordure à taches bleues et, à l'angle des ailes postérieures, la couleur du fond était encore plus ou moins brune. C'était là certes un bien petit nombre de femelles, surtout si l'on songe qu'elles constituaient le résultat total (en tant que femelles parfaitement aberrantes) sur plus de 8.000 chrysalides!

Il fut extrêmement intéressant de voir, les semaines suivantes, combien les petits insectes s'habituaient vite à leur protecteur, et oublièrent devant lui toute frayeur. Ils donnèrent même la preuve d'un certain pouvoir de perception et de mémoire, dans un certain sens; dès que celui qui les soignait ouvrait la porte de l'espace où ils se trouvaient, ils se mettaient aussitôt à voltiger vers le sol, ayant réellement remarqué que sa présence coïncidait avec un rafraîchissement. J'avais, en effet, coutume d'arroser, peu après mon entrée, pour étancher la soif des petits animaux.

Au 25 juin, on n'avait encore observé aucun accouplement, malgré une surveillance active. Les visites n'avaient lieu que de huit heures et demie du matin à sept heures du soir. On constata bien des jeux d'amour, mais point d'accouplement réel. Il y en eut cependant, car le 26 juin, à notre grande joie, on aperçut le premier petit tas d'œufs à la partie supérieure d'une feuille d'Ortie, et les jours suivants, on put observer huit femelles, et parmi elles celle qui était la plus aberrante, occupées à pondre. Il est difficile d'évaluer exactement le nombre d'œufs pondus par chaque femelle, car les insectes pondaient plusieurs jours de suite et sur des feuilles différentes. Nous les évaluâmes, approximativement toutefois, à quelque 200, en ce que 2.000 chenilles se développèrent, bien que sur les dix femelles deux aient été dévorées par les Araignées. L'une d'elles était malheureusement une des deux le mieux aberrantes; et elle n'avait probablement point pondu, car ses ovaires étaient pleins, ce qui ne se constate jamais après la ponte.

L'éclosion des chenilles eut lieu à partir du 2 juin; elles grandirent d'abord librement sur les touffes d'Orties, mais furent mises plus tard dans des armoires bien aérées pour en faciliter l'élevage. Dès le début,

on sépara la ponte de la femelle la plus anormale pour l'enfermer et l'élever.

Malheureusement il se déclara une de ces maladies infectieuses et destructives, connues sous le nom collectif de « flacherie », si bien que, de toutes les éclosions, seuls les sujets les plus vigoureux et les plus rapidement développés arrivèrent à l'état de chrysalide, en tout 493 exemplaires. Toutes n'éclorent point. Quelques-unes périrent, victimes de parasites (espèce *Ptermalus*); d'autres succombèrent encore à la flacherie. La descendance de la femelle la plus anormale, qui fut élevée avec un soin particulier, donna 52 chrysalides, comprises dans le total des 493 déjà donné.

A partir du 21 juillet, les premiers Papillons apparurent et, jusqu'au 27, il y en eut 200 et, parmi eux, des descendants de la femelle la plus anormale. Tous ces sujets, et chacun en particulier, étaient normaux. Cependant, le 28 juillet apparut un exemplaire aberrant (cf. Exp. zool. Stud. pl. V, fig. 4) et du 31 juillet au 1^{er} août un autre encore, visiblement différent du type normal, toutefois sans anomalie bien marquée. Enfin le 5 août, parmi les dernières éclosions dues à ces essais, il se trouva un individu fortement aberrant (cf. Exp. zool. Stud., pl. V, fig. 5), également un descendant de la femelle la plus anormale comme les trois précédents, et, comme eux aussi, un mâle.

Voici, résumées, les observations qui résultent de l'élevage d'individus anormaux ou aberrants, obtenus par les expériences de gelée, ayant passé par toutes les phases de la transformation, c'est-à-dire de l'œuf à la chenille, à la chrysalide puis à l'imago :

1^o Deux des dix femelles employées pour l'expérience ne purent fournir d'éclosion.

2^o La descendance d'environ 7 couples probablement (une proportion minime), qui atteignit la forme parfaite de l'imago, retourna à la forme normale.

3^o Un huitième couple, dont on n'eut en tout que 43 Lépidoptères, donna un sujet s'écartant beaucoup de la forme normale, et, plus tard, trois autres s'en écartant moins; et tous, ce qui est capital, dans le sens du type des parents.

4^o Ces quatre individus aberrants étaient tous des mâles.

5^o Seule, la femelle la plus anormale (les 32 mâles étaient d'un type aberrant égal, comme nous l'avons déjà dit) transmet plus ou moins ses qualités, ayant le caractère de formation nouvelle, à une petite partie de ses descendants. Il semble donc que cette capacité de transmission se trouve en rapport intime avec les degrés de l'anomalie.

6° Ces élevages ayant été très incomplets par suite de l'irruption de la flacherie, il est fort à souhaiter qu'on les renouvelle sur une vaste échelle.

Malgré tout, les faits acquis pour l'appréciation de l'influence que les facteurs du monde extérieur exercent sur la transformation des organes vitaux, sont d'une grande signification. Surtout quand on songe que des sujets, tels que ceux obtenus de l'éclosion de parents normaux, ne se rencontrent jamais, même parmi des milliers d'éclosions de types normaux élevés dans les mêmes conditions.

NOTES BIOLOGIQUES

SUR LES CHALCIDIENS ET PROCTOTRYPIDES

OBTENUS PAR VOIE D'ÉLEVAGE

PENDANT LES ANNÉES 1896, 1897 ET 1898.

PAR LE D^r PAUL MARCHAL.

Pour avoir des matériaux d'étude me permettant de poursuivre mes recherches sur le développement des Hyménoptères parasites, j'ai depuis quelques années recueilli tous les Insectes qui pouvaient se trouver à ma portée et qui présentaient quelque chance de fournir des éclosions d'Hyménoptères parasites en assez grand nombre.

Les galles déterminées par les Insectes sur les végétaux sont particulièrement propres à ce genre d'étude; aussi m'ont-elles fourni un contingent important pour mes travaux.

Je me contenterai dans les lignes qui vont suivre d'énumérer les Chalcidiens et les Proctotrypides que j'ai obtenus, en donnant à leur sujet quelques courtes indications biologiques. Ces parasites ont été déterminés par W.-H. Ashmead, de Washington, qui est le maître universellement reconnu dans cette question. Les *Aphelinidae* ont été examinés par Howard, l'éminent directeur de la Division d'Entomologie de Washington. Je suis heureux d'adresser à l'un et à l'autre l'expression de ma vive reconnaissance.

Les Insectes énumérés sont rangés d'après l'ordre adopté dans le catalogue de Dalla Torre.

Famille des **TETRASTICHINAE**

TETRASTICHUS BREVICORNIS (Panz.) Thoms..

J'ai obtenu en abondance, au mois d'août 1896, ce parasite de galles de *Cecidomyia* (*Perrisia*) *oenophila* recueillies à Fontenay-aux-Roses et à Corbeil; il avait été signalé par Bouché chez *C. artemisiae*, par Kirchner chez *Lasioptera rubi* et par Ratzeburg chez *Rhodites eglanteriae*.

L'œuf de ce *Tetrastichus* se trouve soit dans la cavité générale, soit dans le tissu adipeux de la larve de la Cécidomyie qui elle-même se trouve dans la galle foliaire; cet œuf est oblong, plus renflé à une extrémité qu'à l'autre, légèrement incurvé. Il donne naissance à une petite larve vermiforme annelée, céphalée, dont les anneaux sont garnis de

petites épines à la région dorsale de leur bord postérieur. Ces épines sont surtout développées aux anneaux postérieurs; le dernier anneau se termine par une demi-couronne crénelée en dents de scie et placée dorsalement.

Cette forme larvaire est bientôt remplacée par une autre entièrement inermes, de forme ovoïde allongée, à segmentation presque nulle, que l'on voit ramper et se contracter entre les organes de la larve de Cécidomyie. Elle apparaît par transparence dans le corps de cette dernière sous la forme d'une grande aréole claire aux contours mobiles et variables; au milieu se trouve un gros nucléus brun correspondant au sac gastrique de la larve parasite. La tête peu distincte porte de très petites pièces buccales; les glandes salivaires par contre sont très développées.

La larve de Cécidomyie est désorganisée de très bonne heure par la larve parasite qui vit à son intérieur, et celle-ci se nourrit alors de tissus mortifiés. Les larves des Cécidomyies attaquées sont flasques, mates, et d'un brun jaunâtre.

Pour éviter toute cause d'erreur, plusieurs individus ont été isolés tant à l'état de larve qu'à l'état de nymphe et conduits jusqu'à l'éclosion de l'imago.

TETRASTICHUS CRASSINERVIS THOMS.

On obtient ces parasites en assez grande abondance, au mois de juillet, des nymphes d'Hyponomeute; ceux que j'ai conservés portent la mention : éclos le 20 juillet 1897, ex *Hyponomeuta padella*, Fontenay. Plusieurs individus sortent de la même chrysalide.

Ratzeburg l'avait déjà signalé comme parasite de divers Hyponomeutes.

TETRASTICHUS CRINICORNIS (PERRIS).

J'ai obtenu les parasites de cette espèce en grand nombre de galles de *Cecidomyia persicariae* recueillies à Fontenay-aux-Roses. Les insectes sont éclos en mai et juin 1897.

Je l'ai en outre obtenu des galles de *Cecidomyia ulmariae* et de celles de *Cecidomyia urticae*.

Perris avait déjà signalé ce *Tetrastichus* comme parasite de *C. urticae*.

J'ai fait sur cette espèce des observations tout à fait comparables à celles ayant pour objet le *T. brevicornis*. J'ai trouvé de 2 à 6 œufs de ce parasite dans la même larve; mais une seule des larves qui naissent de ces œufs atteint son développement complet.

TETRASTICHUS INCONSPICUUS Nees.

Obtenu de *Cecidomyia persicariae*, à Fontenay, pendant l'été de 1896.

TETRASTICHUS MICANTULUS Thoms.

Obtenu de *Cecidomyia taxi* du *Taxus baccata*, à Fontenay, en mai 1897.

TETRASTICHUS MINIMUS (Ratzb.) D. T.

Ex *Cecidomyia nervorum*, sur *Salix capreae*, Fontenay, éclos en juin 1897.

Déjà signalé par Ratzeburg comme parasite de *Cecidomyia salicina*.

TETRASTICHUS STROBILANAE (Ratzb.).

J'ai obtenu ce parasite en grand nombre des galles de *Cecidomyia lychnidis*, à Fontenay, pendant les étés de 1896 et de 1897. L'œuf, la première et la seconde forme larvaire sont tout à fait comparables aux stades correspondants des *Tetrastichus brevicornis* et *crinicornis*.

Ratzeburg signale cette espèce comme parasite de *Tortrix strobilana*.

TETRASTICHUS ALGERIAE Ashm. (nov. sp. in litteris).

Ce parasite est éclos de galles produites par *Cecidomyia ericae scopariae* sur *Erica scoparia* que j'avais recueillies en Algérie, à Sidi-Ferruch, en avril 1896.

APHILOGLYPETUS ASPHONDYLIAE Ashm. (nov. genus et nov. sp. in litteris).

J'ai obtenu cet Insecte, représentant un genre nouveau, des galles produites par *Asphondylia punica* Marchal, sur *Atriplex halimus*, et recueillies par moi-même à Kairouan (Tunisie) le 31 mars 1896.

Famille des **ENTEDONTINAE**.**ENTEDON METALLICUS** (Nees) Walk. (= *E. epigonus* Walk.).

Ex *Cecidomyia poae*; Fontenay, éclos au printemps de 1896.

Entedon metallicus est considéré par Ashmead comme synonyme de *Semiotellus nigripes* Lindm. qui est un parasite de *Cecidomyia destructor*.

CLOSTEROCERUS TRIFASCIATUS Westw.

Éclos de la chenille mineuse *Lithocolletis quercifolia*. Chêne; Fontenay, 1897.

Famille des **EULOPHINAE**.

SYMPIESIS CANALICULATUS (Först.) (= *Entedon methion* Walk.).

Éclos des chenilles de *Gracilaria juglandella*, 5 juillet 1895.

Ratzeburg signale le *Lophyrus similis* comme hôte du même Insecte.

EULOPHUS ALBITARSUS.

Obtenu en très grande abondance de galles de *Plagiotrochus cocciferae* (Cynipide) sur *Quercus coccifera*, recueillies à Sidi-Ferruch (Algérie) en avril 1896.

Mes notes portent que le même Insecte a été obtenu, en juillet 1897, de larves de Cécidomyies vivant sous des galles de *Neuroterus lenticularis*, à Fontenay. Mais les conditions de l'observation ne sont pas assez présentes à ma mémoire pour que je puisse affirmer que le parasite ne vivait pas aux dépens du Cynipide lui-même.

Famille des **PTEROMALINAE**.

MEROPORUS BREVICORNIS (Ratzb.) Ashm. (= *Habritys brevicornis* (Ratz.) Thoms.

Éclos en abondance des larves d'*Anobium paniceum*.

EUTELUS AMOENUS Walk.

Éclos des galles d'*Hormomyia capreae*; Fontenay 1897.

Möller signale le même Insecte comme parasite de *Spathegaster baccarum*.

AMBLYMERUS RURALIS Walk.

Éclos des galles de *Cecidomyia* (*Dryomyia*) *Lichtensteini*; Majorque (château de Belver), mai 1897.

PTEROMALUS GALLICUS Ratzb.

Éclos des galles de *Biorhiza terminalis* var. *mirbeckii*; Algérie, forêt d'Iacouren, avril 1896.

PTEROMALUS LEGUMINUM Ratzb.

Éclos des capsules de *Linaria vulgaris* déformées par *Mecinus antirrhini*; Verrières, 18 septembre 1896.

Ratzeburg signale comme hôte de ce parasite le *Bruchus spartii*.

PTEROMALUS PLANIUSCULUS Först.

Obtenus en abondance des galles de *Xestophanes potentillae*, recueillies à Chaville en 1896; éclos à partir du 27 juin 1897 jusqu'en juillet.

PTEROMALUS ARIOMEDES Walk.

Éclos des galles de *Trypeta proboscidea* sur racines de *Chrysanthemum leucanthemum* recueillies à Saint-Leu (S.-et-O.); éclosion en juin 1897.

DIBRACHYS BOUCHEANUS (Ratzb.) Thoms.

1° Obtenu en nombre des larves de *Galleria mellonella* L.

2° Obtenu en grande abondance des chenilles de *Sitotroga cerealella* (Alucite); éclosion en avril 1898.

Famille des **MISCOGASTERINAE.****STICTOMISCHUS PHYTOMYZAE Ashm. (n. sp. in litteris).**

Éclos des chenilles de *Phytomyza Xylostei* minant les feuilles de *Lonicera Xylostea*; Fontenay-aux-Roses.

Famille des **TRIDYMINAE****SYSTASIS ENCYRTOÏDES Walk.**

1° Quelques spécimens éclos de fleurs de *Lychnis dioica* déformées par les larves de *Cecidomyia lychnidis*; Fontenay, éclosion pendant l'été de 1896.

2° Des galles de *Dasyneura ericae scopariae*, recueillies à Aïn-Draham (Tunisie) en avril 1896.

Famille des **APHELINAE.****COCCOPHAGUS PULCHELLUS Westw.**

1° De *Lecanium rosarum*; Fontenay, 1897.

2° De *Lecanium hemisphaericum* (determ. Berlese); sur Pêcher, Cette, juin 1898.

ASPIDIOTIPHAGUS CITRINUS Craw.

Éclos d'*Aspidiotus nerii*; Fontenay, 1897.

ARCHENOMUS BICOLOR Howard.

Les exemplaires obtenus sont les types ayant servi à Howard pour décrire le genre et l'espèce. Ces parasites sont éclos d'*Aspidiotus ostreaeformis* Curtis, se trouvant sur des rameaux de Pommier.

AZOTUS MARCHALI Howard.

L'unique exemplaire obtenu est le type du genre et de l'espèce décrits par Howard. Même origine que l'espèce précédente.

Famille des **BOTHRIOTHORACINAE**

PHAENODISCUS AENEUS (Dalm.) Thoms.

De *Lecanium hemisphaericum* (déterm. Berlese); sur Pêcher, juin 1898.

Famille des **ENCYRTINAE**

CERAPTEROCERUS PILICORNIS Thoms.

De *Lecanium hemisphaericum* (déterm. Berlese); sur Pêcher, Cete, juin 1898.

AGENIASPIS TESTACEIPES Ratzb.

Parasite des chenilles de *Lithocolletis quercifoliella* minant la face inférieure des feuilles de Chêne. Les larves de ce parasite se trouvent au nombre de douze à quinze dans la même chenille; elles sont d'abord incluses dans un tube épithélial semblable à celui de l'*Ageniaspis fuscicollis* et ont évidemment une origine identique à celle des larves de cet Insecte, c'est-à-dire que toutes doivent provenir d'un seul œuf. Je n'ai pu toutefois observer que des stades assez avancés au commencement d'octobre et le tube épithélial était déjà en partie dissocié.

Lorsque ces larves ont atteint toute leur taille, elles bourrent la peau de la petite chenille qui se trouve divisée en autant de compartiments boursoufflés qu'il y a de larves. Fontenay; larves recueillies en octobre 1897; éclosion au printemps de 1898.

AGENIASPIS FUSCICOLLIS Dalman.

Le développement de cet Insecte (*Encyrtus fuscicollis*), sur lequel j'ai déjà publié une note dans le *Bulletin* de la Société, fera l'objet d'une étude complète. Je l'ai obtenu des chenilles d'*Hyponomeuta cagnatella*, *H. malinella*, *H. padella* et *H. mahalebella*. Il est à remarquer que l'*Hyponomeuta mahalebella* étant très en retard sur les autres espèces, il en est de même pour les *Ageniaspis* qui le parasitent; ils n'apparaissent que vers le 7 août, tandis que ceux qui parasitent les autres espèces commencent à éclore vers le 15 juillet. Les *Ageniaspis* des autres *Hyponomeutes* étant disparus lorsque ceux du Mahaleb apparaissent, on pouvait penser qu'il s'était peut-être formé par *ségregation chronique* une espèce ou tout au moins une race distincte. Mais ni M. Ashmead, ni moi-

même n'avons pu trouver de différences morphologiques entre les *Ageniaspis* des *Hyponomeuta mahalebella* et les autres.

BLASTOTHRIX SERICEA (Dalm.) Mayr.

De *Lecanium rosarum*; Fontenay, 1897.

ENCYRTUS SCAURUS Walk.

De *Physokermes abietis*, sur *Epicea*; Fontenay, éclosion le 1^{er} juillet 1898.

La plupart des *Encyrtus* (*sens. str.*) ont été signalés comme vivant aux dépens d'Hémiptères; mais l'*Encyrtus scaurus* avait seulement été signalé sur des larves de Lépidoptères.

Famille des **EUELMINAE**

EUELMUS CERRIS Först.

Des galles de *Cynips polycera*, sur *Quercus Mirbeckii*; Algérie : forêt d'Iacouren, avril 1896.

EUELMUS SPONGIPARTUS Först.

1° Des galles de *Biorhiza terminalis* var. *mirbecki*; Algérie : forêt d'Iacouren, avril 1896.

2° Des galles de *Plagiotrochus fusifex* sur *Quercus suber* (un seul exemplaire); Algérie : forêt d'Iacouren, avril 1896.

Famille des **ORMYRINAE**

ORMYRUS COSMOZONUS Först.

Des galles de *Cynips polycera*; Algérie : forêt d'Iacouren, avril 1896.

Famille des **TORYMINAE**

MONODONTOMERUS AERREUS Walk.

Obtenu d'un cocon de Tachinaire parasite de *Bombyx neustria*; Fontenay, 1897.

Cette espèce ayant déjà été obtenue de divers Lépidoptères, il serait intéressant de savoir si elle vit seulement comme parasite secondaire aux dépens des Tachinaires.

DIOMORUS CALCARATUS (Nees).

De galles de *Cynips argentea* recueillies en Algérie (forêt d'Iacouren) en avril 1896.

Ces galles étaient habitées par des *Pemphredon lugubris* et des *Omalus auratus*.

TORYMUS URTICAE Perris.

Obtenu en grande abondance des galles de *Cecidomyia* (*Perrisia*) *oenophila* recueillies à Fontenay en juillet. Éclosion en août.

Seurat a étudié le développement de *Torymus propinquus* Först. chez *Cecidomyia* (*Perrisia*) *urticae*.

Comme cet auteur, nous avons constaté que les larves des *Torymus* vivaient en parasites externes. L'œuf du *T. urticae* est pondu à l'intérieur de la galle sur la larve même de la Cécidomyie. Cet œuf est fixé par l'extrémité céphalique, de sorte que la larve en sortant se trouve immédiatement en présence de son hôte. La larve est nettement caractérisée par les soies souvent fort longues qui garnissent son corps. La disposition et la longueur des soies varient avec l'âge de la larve. Lorsque la larve a atteint toute sa taille, elles atteignent leur plus grand développement et acquièrent une très grande longueur sur la face ventrale où elles sont souples, contournées et présentent un aspect capillaire.

La larve du parasite ne reste pas toujours à la même place; elle se déplace parfois à la surface de son hôte en progressant un peu comme une sangsue. Fixée par son extrémité postérieure, elle lance en avant son extrémité antérieure pour aller implanter ses crochets mandibulaires un peu plus loin dans la peau de sa victime. La larve de *C. oenophila* attaquée porte ainsi un nombre variable de piqûres se traduisant par de petites cicatrices noirâtres; elle a son corps adipeux fragmenté et en partie désorganisé; elle conserve sa teinte rouge brique habituelle, mais devient trouble et plus opaque.

Une seule larve de *C. oenophila* suffit pour assurer le développement du parasite. Du reste chaque galle de *C. oenophila* est absolument close et habitée par une seule larve, de sorte que les vivres du parasite se trouvent forcément limités à un seul individu.

La nymphe de la femelle se reconnaît immédiatement à sa tarière recourbée sur le dos.

Pour éviter toute cause d'erreur, le développement de ce *Torymus* a été étudié en isolant des individus à l'état larvaire et à l'état de nymphe. Les éclosions de ces individus isolés ont eu lieu pendant le mois d'août 1897.

TORYMUS ABBREVIATUS Boh.

1° Obtenu en nombre de galles de *Cecidomyia persicariae* sur *Polygonum amphibium*. La larve de ce *Torymus* est très analogue à celle

de l'espèce précédente et présente un genre de vie semblable; mais il est fort possible qu'elle puisse attaquer successivement plusieurs larves de *Cécidomyie*.

2° Obtenu des larves de *Cecidomyia* (*Perrisia*) *piri* roulant les feuilles de Poirier; Paris, juin 1896.

TORYMUS ERUCARUM (Schrank) Mayr.

Des galles d'*Andricus radicis*; Fontenay, mai 1896. Le même hôte est signalé par Mayr.

TORYMUS FLAVIPES (Walk.) Mayr.

Obtenu en petit nombre de *Cecidomyia urticae* et de *C. oenophila*; Fontenay, juin 1897.

TORYMUS LASIOPTERAE (Giraud) Mayr.

De *Cecidomyia inclusa*, sur *Phragmites communis*.

J'ai recueilli les plantes attaquées à Fresne (Seine), en octobre 1897, et les parties portant les galles de *C. inclusa* avaient été soigneusement séparées pour éliminer les larves de *Lasioptera arundinis* se trouvant dans les sommités des tiges. Les éclosions eurent lieu en mai et juin 1898. Les sommités attaquées par *Lasioptera arundinis* donnèrent les mêmes parasites, mais les galles de *C. inclusa* n'avaient pas été entièrement éliminées.

TORYMUS LINI Mayr.

Obtenu en petit nombre des galles de *Cecidomyia persicariae* et de *C. urticae*; Fontenay, juin 1897.

TORYMUS MARCHALI Ashm. (nov. sp. in litteris).

De *Cecidomyia ulmariae*; Fontenay, juin 1897. — Son mode de vie est tout à fait comparable à celui de *Torymus urticae*. J'ai trouvé l'œuf de ce parasite non seulement sur la larve de *C. ulmariae*, mais encore sur une larve de *Diplosis* commensal vivant à l'intérieur de la galle produite par la larve de *C. ulmariae*. La larve, pourvue de longs poils, vit en parasite externe, mais reste forcément emprisonnée dans la galle.

TORYMUS VIATUS Boh.

Des galles de *Biorhiza terminalis* var. *Mirbecki*; Algérie : forêt d'Iacouren, avril 1896.

Famille des **EURYTOMINAE**.

DECATOMA BIGUTTATA (Swed.) Curtis.

1° De *Cynips polycera*, sur *Quercus Mirbecki*; Algérie : forêt d'Ia-couren, avril 1896.

2° De *Biorhiza terminalis* var. *Mirbecki*; Algérie : forêt d'Ia-couren, avril 1896.

SYSTOLE GENICULATA Först.

En 1897, des échantillons de graines d'Anis mélangées avec de nombreux exemplaires de cette espèce me furent envoyés, de Cordes, dans le Tarn, centre principal de la culture de l'Anis pour la fabrication de l'anisette et de l'absinthe. Ce Chalcidien y est considéré comme un véritable fléau, et lorsque la récolte a été rentrée, on voit les moucheron sortit de tous côtés de l'intérieur des graines, et celles-ci se trouvent complètement piquées et détériorées. Je n'ai pu trouver trace d'Insectes autres que les *Systole*; néanmoins n'ayant pas eu les matériaux nécessaires pour suivre l'évolution, je ne voudrais pas conclure d'après les apparences que le Chalcidien en question constitue une exception semblable au genre *Isosoma* et se nourrit directement aux dépens des végétaux. J'espère que de nouveaux matériaux me permettront prochainement de trancher la question.

EURYTOMA KABYLIENSIS Ashm. (nov. sp. in litteris).

Des galles de *Cynips polycera*; Algérie : forêt d'Ia-couren, avril 1896.

EURYTOMA NODULARIS Boh.

Des galles d'*Urophora cardui*; St-Leu (S.-et-O.), éclosion fin juin 1897.

EURYTOMA ROSAE Nees.

Des galles de *Biorhiza terminalis* var. *Mirbecki*; Algérie : forêt d'Ia-couren, avril 1896.

EURYTOMA RUFIPES Walk.

Des galles de *Xestophanes potentillae*; Chaville (Seine). éclosion en juin 1897.

BRUCHOPHAGUS SATIVAE Ashm. (nov. sp. in litt.).

Le genre *Bruchophagus*, d'après le catalogue de Dalla Torre, ne comptait encore que des espèces américaines.

Le *B. sativae* a été obtenu en grand nombre de graines de Sainfoin (*Onobrychis sativa*).

Toutes les espèces passées en revue jusqu'ici étaient des Chalcidides, les suivantes sont des

PROCTOTRYPIDES.

PLATYGASTER NIGRIPES Ratzb.

Des galles produites par *Cecidomyia ericae scopariae*, sur *Erica scoparia*; Algérie, avril 1896.

POLYGNOTUS CECIDOMYIAE (Ratzb.).

Des Galles de *Cecidomyia nervorum* sur *Salix caprea*; Fontenay-aux-Roses (Seine), juin 1897.

POLYGNOTUS NIGER (Nees).

1° De *Cecidomyia ulmariae*; Fontenay-aux-Roses (Seine) et St-Leu (S.-et-O.), éclosion en mai-juin.

2° De *C. persicariae*; Fontenay, mai-juin.

J'ai obtenu un grand nombre d'individus de cette espèce et j'ai fait une étude complète de son développement qui paraîtra dans un mémoire spécial.

POLYGNOTUS MARCHALI Ashm. (nov. sp. in litteris).

De *Cecidomyia cocciferae*; Alger, avril 1896.

SYNOPEAS RHANIS Walk.

1° De *Cecidomyia ulmariae*, parasite très abondant; Fontenay-aux-Roses (Seine) et St-Leu (S.-et-O.), éclosion en juin. Apparaît un peu avant le *Polygnotus niger*.

2° De *Cecidomyia urticae*.

J'ai fait l'étude complète du développement de ce parasite qui présente les larves caractéristiques des Platygasters. C'est à cet Insecte que se rapporte la note publiée dans les *Comptes Rendus de la Société de Biologie*, 1897, p. 1084.

A MONSIEUR LE PROFESSEUR A. GIARD

PAR MAURICE MAINDRON (1).

Monsieur et très honoré confrère,

Au temps de notre jeunesse, c'était l'usage, dans les collèges, que quand il arrivait quoi que ce fût d'heureux au maître, on déléguait un élève de la classe, pour lui adresser un petit compliment en vers, ou en prose. Ainsi, tout à la fois, favorisait-on deux choses également respectables et en voie de disparition, comme tant d'autres, j'entends le sens de la vénération et l'amour des bonnes lettres. Mais, encore que vous soyez, sans conteste, notre maître, nous ne sommes plus, hélas, en classe ! Je n'ai pas été délégué par mes condisciples ; et, à vrai dire, il ne vous est rien arrivé d'heureux. Car, au mot heureux correspond, ce semble, toujours, une idée de hasard, et ce qui s'est passé n'a rien que de naturel et de juste. Loin de moi de songer à faire intervenir le hasard dans la distribution de la justice, non plus que dans le choix de l'Institut. Et l'on peut dire, pour employer une expression commune, que votre place était depuis longtemps marquée dans cette illustre compagnie. Le choix qu'elle a fait nous honore presque autant que vous-même, Monsieur, car l'assiduité que vous apportez, depuis des années, à suivre, ou, pour mieux dire, à diriger nos séances, vous a lié si étroitement à la Société entomologique, que nous ne la voyons guère sans vous. Si nous constituons un corps uni, vous en êtes bien l'âme, et une âme que nous nous plaisons à honorer de notre estime et de notre particulière affection.

Votre sagesse, par surplus, connaît trop bien le cœur humain pour ne pas se rappeler que c'est, lorsqu'on devient riche, qu'on entre vraiment en rapports avec sa parenté : il vous surgit des parents de toutes parts. Vous permettrez donc à notre Société de s'asseoir — moralement, s'entend, et comme ces anges dont parle Henri Heine, en toute immatérialité — avec vous, aux séances de l'Institut. Et comme c'est, vous pouvez en répondre comme nous, une personne discrète, elle ne fera pas parler d'elle, ou quand elle y parlera, ce ne sera que par votre voix. Jamais elle n'aura été mieux représentée. Grâce à vous, elle commencera de faire figure dans le monde.

(1) Allocution prononcée par M. Maurice Maindron, à la séance de la Société entomologique de France du 27 juin 1900, à l'occasion de l'élection, à l'Académie des Sciences, de M. le Professeur A. Giard, Président de la Société. — *Note du Secrétaire.*

Ann. Soc. Ent. Fr., LIX, 1900.

Aussi bien, Monsieur, pour prendre un langage plus grave et, par cela même, digne de vous, notre Société vous doit-elle tant, que rien de ce qui vous touche ne lui peut demeurer étranger. Avec vous est entré un souffle puissant qui nous a portés, tout d'abord si haut, que beaucoup d'entre nous se sont demandé, avec une anxiété timide, comment ils pourraient jamais redescendre, tant il est peu accessible à tous de planer, sûrement, dans des régions aussi élevées. Vous nous y avez mis cependant à l'aise; et l'on croit, à vous entendre parler, que rien n'est plus naturel que de tout savoir et d'avoir toujours un fait précis, sinon dix, à citer en commentaire, pour une question inattendue et à laquelle rien, en somme, ne vous avait préparé. Ainsi vous avez donné à nos discussions — oh! toujours très amicales, Monsieur, je vous prie de le croire! — une allure plus large, et l'on se fait maintenant un plaisir de ne plus manquer les séances où l'on aura la bonne fortune de vous entendre. C'est que vous êtes un de ces docteurs subtils, comme en connut le moyen âge, et qui parlaient, toujours bien, *de omni re scibili et quibusdam aliis*, ces dernières étant ordinairement celles où se complaisaient les spécialistes. Mais avec vous ceux-ci trouvent toujours, comme on dit, « à qui parler ». On m'objectera que ce sont là des choses connues de nous tous; et, pour les répéter, je n'aurais même aucun titre, si je n'apportais ici, Monsieur, le témoignage d'une reconnaissance personnelle très grande, et qui touche au général par certains points. J'entends parler de la protection que vous avez obligé d'aucuns à assurer à mes modestes travaux de voyageur. Si j'ai pu et me remettre en chemin et rapporter quelques objets curieux dont tels de nos savants confrères, trop bienveillants, m'ont fait bien largement honneur, c'est à vous que je le dois. Vous avez eu, en effet, le courage — et il ne fut pas petit — d'élever, le premier, la voix, en ma faveur, dans ces commissions officielles où pendant vingt ans le simple énoncé de mon nom motivait un « *ignorabimus* » hautain. Vous avez entendu faire respecter le principe que les services devaient passer avant la personne. Et, sans devenir « *persona grata* », j'ai repris, grâce à vous, la place à laquelle vous avez donné à comprendre que j'avais droit.

Mais, Monsieur, la destinée se joue de nos combinaisons les plus sages, et je n'avais pas vu MM. X. Charmes et Alphonse M.-Edwards me prouver, sur votre témoignage, la plus solide bienveillance, que le premier quittait le ministère et que le second mourait, emporté brusquement, cette année même où il s'occupait de me mettre en route pour un voyage important. Ainsi s'est trouvé dissipé en quelques mois le fruit de votre intervention énergique et de mon opiniâtreté.

J'aurai tout dit quand on saura que, lorsque vous avez ainsi mené campagne en ma faveur, nous étions entièrement étrangers l'un à l'autre, et que nous ne nous étions jamais vus. Vous aviez entrepris la revision de mon procès, par cet esprit de justice qui refuse aux parties le droit de s'ériger en tribunal pour rendre des sentences et excommunier leurs ennemis.

Vous avez fait plus encore : vous m'avez rendu le courage d'entreprendre, et vous m'avez mis en mesure de ramener mes adversaires les plus prévenus. Par un revirement bien rare, et qui indiquerait, ce semble, à défaut de mieux, un sentiment profond de l'équité, M. A. M.-Edwards m'accorda son estime et m'en fournit des preuves publiques, il n'a pas tenu à lui que j'en reçusse, même, des témoignages plus effectifs. J'avoue, Monsieur, en toute humilité comme en toute franchise, que je n'aurais jamais cru qu'un jour viendrait où je pourrais regretter aussi amèrement sa mort. C'est pourtant le sentiment que j'en garde aujourd'hui, et que garderont tous ceux d'entre nous qui ont su combien cet homme absolu et hautain, mais profondément droit et sûr, aimait nos collections zoologiques et ceux qui peinaient pour les augmenter. Un vent tout autre souffle aujourd'hui. Nous permettez-vous de vous dire que nous comptons sur vous pour orienter nos voiles. Vous seul êtes aujourd'hui assez puissant pour le tenter. Vous m'entendez de reste, Monsieur, car, sans parler de votre valeur scientifique régulière, si j'ose dire, vous valez, entre nous tous, et par votre connaissance des écueils, et par la sympathie dont vous abondez pour les hommes quand ils sont de bonne volonté.

Et c'est pourquoi, Monsieur, si l'on osait donner un nom à cet ensemble de lois obscures qui semblent administrer le hasard, on pourrait dire qu'une volonté inconsciente et supérieure vous a fait succéder à celui-là même dont vous nous apparaissez comme le continuateur le plus souhaité, par l'amour large et éclairé que vous montrez pour la Zoologie, qu'elle soit expérimentale ou systématique. Ne me reprochez pas ce que la comparaison peut avoir en soi de spécial. Ce n'est jamais diminuer un vivant que de le comparer à un mort, puisque de celui-là on ne veut plus se rappeler que les meilleures qualités. Au contraire de beaucoup d'autres, Monsieur, vous avez commencé par acquérir la gloire, les honneurs vous sont venus par surcroît.

MONOGRAPHIE DES SCYDMAENIDAE

avec les planches 4 à 14

PAR J. CROISSANDEAU (1).

Gen. **Scydmaenus** (**Eumierus** Lap.) (2).

Latr., Hist. Nat. Cr. et Ins., III (1802), p. 116.

Ce genre, établi par Latreille pour le *Pselaphus Helwigi* Payk., comprend tous les Scydmanéides dont le 4^e article des palpes maxillaires est rudimentaire.

Limité d'abord à quelques espèces, il s'est accru progressivement, grâce aux travaux de Sauley et de Reitter, et est devenu tellement important que ce dernier auteur a jugé nécessaire de le subdiviser en trois coupes : *Eumicrus* (type *tarsatus*), *Eustemmus* (type *antidotus*), et *Heterognathus* (type *Hellwigi*).

Ces trois coupes, qui répondent à trois groupes de formes bien distinctes, ont été maintenues depuis, en remplaçant toutefois les noms d'*Eumicrus* in. sp. et *Heterognathus* par *Scydmaenus* in. sp. et *Cholerus* qui ont l'antériorité.

Rien de bien spécial à dire sur les sous-genres *Scydmaenus* et *Cholerus* ; tout l'intérêt se porte sur le sous-genre *Eustemmus*, si nettement tranché par son facies si spécial, qu'il justifierait, à la rigueur, un genre distinct.

A une exception près, toujours de couleur sombre, oscillant entre le rouge foncé et le brun noir, peu brillant et souvent mat, de taille relativement grande et même excessive, de forme robuste, il ne saurait se confondre avec les sous-genres précédents.

Nous y trouvons la même variabilité de détails que dans toute la famille, notamment dans les profils, la ponctuation et la pubescence ; mais tous les caractères anatomiques revêtent une fixité extraordinaire.

En dehors de ces derniers, nous savons par expérience combien il

(1) Voir *Annales*, 1893, pp. 199 et 409 ; 1894, p. 351 ; 1897, p. 402 ; 1898, p. 105.

(2) Le manuscrit de la « Monographie des Scymaenidae » de J. Croissandeau avait été déposé plusieurs années avant la publication de la « Revision du genre *Scydmaenus* Latr. (*Eumicrus* Lap.) » de F. Guillebeau (*Ann. Soc. ent. Fr.*, LXII, 1898, p. 225). — *Note du Secrétaire.*

est difficile de s'appuyer sur des caractères aussi flottants que les profils, la ponctuation et les poils. Ces derniers sont, du reste, d'une caducité extrême, et nul n'oserait, par excès de rigorisme, exclure du classement tous les insectes dépilés. Par contre, combien d'insectes dépilés élevés au rang d'espèce? Dans la monnaie courante des caractères spécifiques, les trois ci-dessus ne sauraient être considérés que comme appoint.

Le museau est court et très épais, les palpes généralement non subulés. Les yeux sont placés au sommet de la tête, toujours très petits (nous ne parlons que du s. g. *Eustemmus*). Les touffes de poils sur les joues n'existent que chez quelques espèces.

Les profils sont extrêmement variables. La tête, le prothorax et les élytres voient leurs proportions se modifier à l'infini. Quand on n'examine que quelques exemplaires pris ensemble, ils sont identiques souvent. Quand la capture est nombreuse, des fluctuations assez sensibles se révèlent toujours, et enfin quand on parvient, comme nous, à collationner des suites considérables de différents pays, on est alors stupéfait des passages qu'on rencontre.

La taille notamment offre des écarts incroyables. Le prothorax s'élargit ou s'élance, les élytres se dilatent en se raccourcissant ou se rétrécissent en s'allongeant, dans des proportions telles qu'il semblerait insensé de songer à réunir les types extrêmes. Mais, un à un, les intermédiaires s'enchainent au point qu'il devient impossible de les séparer.

M. Reitter a établi des coupes sur la proportion entre la longueur de l'arrière-corps et celle de l'avant-corps. Elles sont illusoires. La variabilité de ces deux parties est extrême, et elles sont bien difficiles à mesurer de l'œil, même quand l'insecte est parfaitement étalé.

Nous reconnaitrons cependant qu'il existe parmi ces soi-disant espèces des races particulières qui semblent, au premier abord, assez nettement caractérisées, plus ou moins grandes, trapues ou élancées. Mais, dès qu'on peut en réunir de longues suites, on est arrêté par des fluctuations de toutes sortes et il est impossible d'établir des sections nettes et précises. Les élytres notamment sont tronqués, arrondis ou acuminés dans tous les groupes, et la gouttière juxta-suturale nulle ou plus moins accentuée, sans règle aucune. Notre figure 402 représente un *scaphium* choisi pour son exagération; mais la plupart des exemplaires d'un lot de 40 ou 50 pris ensemble sont conformes aux profils de la fig. 405, à gouttière obsolète et parfois très acuminés.

La couleur est extrêmement variable et vire du brun foncé au rouge. Soit qu'elle provienne de l'habitat ou de l'âge de l'insecte, elle varie incessamment et nous ne nous expliquons pas la raison qui a inspiré

M. Reitter pour son espèce *nigripennis*. Son unique exemplaire est à peu près concolore et nous en possédons, dans d'autres groupes, d'autrement tranchés, notamment un ou deux *sternalis*.

La ponctuation présente les mêmes fluctuations. D'abord nulle, bientôt elle se révèle timidement, écartée ou serrée, pour se creuser ensuite assez profondément. Il en est ainsi de tous les insectes à téguments minces, polis et cornés. Et s'il est un caractère qui prête à l'illusion souvent, c'est celui-là.

Combien de fois, après avoir dépilé un élytre que nous croyions finement mais nettement ponctué, n'avons-nous pas été surpris de le trouver lisse! L'ombre du poil, à sa racine, semblait un point, dans l'angle de soudure. Règle générale, la ponctuation très fine sous les poils, en fait, n'existe pas.

Les poils des élytres sont généralement fins, courts et serrés. Ils sont parfois excessivement courts, formant un duvet qui masque et dénature la couleur du fond. Le prothorax et la tête ne sont jamais duvetés, mais imperceptiblement velus et souvent complètement glabres. Et, chose étonnante! on voit parfois un insecte dont l'avant-corps est complètement dépilé, quand la pubescence de l'arrière-corps a conservé toute sa fraîcheur et, vice-versa, l'arrière-corps à peu près dénudé et le prothorax encore velu. Certains exemplaires sont couverts d'une pubescence tellement compacte qu'elle semble une véritable toison peignée, quand leurs indiscutables frères l'ont beaucoup plus rase et même clairsemée. La pubescence semble, du reste, complètement indépendante de la ponctuation, certains insectes ayant une ponctuation extrêmement dense et des poils écartés et réciproquement. Ces différences accidentelles, ou propres à certaines races, ne sauraient donc être considérées comme spécifiques absolument.

En effet, dans le groupe à prothorax quadrifovéolé, les écarts sont relativement restreints et c'est dans celui non fovéolé que nous relevons les plus considérables. Cela tient évidemment au nombre inouï d'exemplaires que nous possédons de ce dernier, ce qui prouve une fois de plus que plus on accumule de matériaux et mieux on embrasse les fluctuations naturelles des races. Nous avons examiné environ 500 exemplaires du *S. conspicuus*, d'Andalousie, pris ensemble ou dans les mêmes localités. La plupart sont semblables, c'est-à-dire couverts d'une pubescence forte, épaisse et assez longue; mais un certain nombre l'ont beaucoup plus courte, et d'autres forment le passage. Un autre lot (cent environ) offre une proportion plus grande de cette pubescence courte. Comment expliquer enfin que les 9 types les plus anciens de la collection de Sauley (2 de Tanger et 7 d'Andalousie), que

nous avons religieusement conservés, sans y toucher, aient tous cette pubescence courte, c'est-à-dire moyenne, ni longue ni rase ?

Tout ce que nous pouvons constater, c'est que les exemplaires africains n'ont jamais la pubescence longue. Ils l'ont parfois très courte et serrée. C'est sur ce caractère, ainsi que sur la largeur du prothorax que le type unique de *S. parvatus* Rtr., du Maroc, a été décrit. Or dans la collection Jekel, dont le seul pourvoyeur était M. Reitter, nous avons trouvé un *S. conspicuus*, sans provenance, absolument identique à ce type, et dans la collection de Sauley un *conspicuus* d'Andalousie non moins identique.

Si dans la collection Reitter il n'y avait que le type primitif du *S. parvatus*, il est bon de dire que nous en possédions déjà cinq, du Maroc également, et que nous avait vendus M. Reitter lui-même. Deux sont entièrement dépilés et lisses, les 3 autres ont les élytres glabres et lisses, mais quelques poils encore sur la tête et le prothorax. Or tous les cinq ont le prothorax moins large que le type, ils sont bruns. En un mot ce sont tout simplement des insectes identiques aux *S. nudipennis* Rtr., lesquels sont des *S. algiricus* dénudés. Enfin le *S. indiosus* Rtr. n'est lui-même qu'un *S. conspicuus* d'Andalousie, à pubescence courte, de même que *S. algiricus*.

Quant à la pubescence du dessous, elle n'offre aucune particularité notable. Tous les *Eustemmus* sont couverts en dessous de poils jaunes, extrêmement fins et courts, relativement peu serrés, peu visibles à l'œil et n'altérant ni l'éclat ni la couleur des téguments. Chez les exemplaires très velus en dessus, la pubescence inférieure semble également un peu plus accentuée, mais sans qu'aucune règle puisse être établie, car, dans la même espèce, on rencontre des exemplaires très velus et d'autres à peu près glabres. Et cependant les entomologistes qui considèrent la pubescence supérieure comme un caractère spécifique sérieux, sont obligés, pour être conséquents avec eux-mêmes, de tenir un égal compte de la pubescence inférieure.

M. Reitter a été entraîné dans cette voie à propos du *S. antidotus* ; mais il s'est prudemment arrêté, comprenant sans doute que baser des espèces sur un tel caractère était un peu hasardé.

Au surplus, la pubescence présente le même degré de variabilité d'un bout à l'autre de la famille. Plus les espèces sont grosses et plus les nuances sont saisissables, voilà tout. Mais c'est précisément cette instabilité chez les grandes espèces, négligeable ou négligée chez les petites, à cause de son insaisissabilité, qui justifie notre doctrine. Et puis, même en vérité si on tenait compte des fluctuations de la pubescence

chez les gros, tous nos exemplaires de *S. camelus* représenteraient autant d'espèces.

Nous avions espéré un instant trouver quelques différences notables dans les pattes. Quelques-unes nous semblaient plus longues. Mais cet organe, quelle que soit la préparation, ne se présente jamais sous le même aspect. C'est ce qui explique les fluctuations apparentes de tous les dessins de nos planches. En effet, une patte ne peut être bien vue qu'à plat, après dissection, autrement on la voit toujours plus ou moins en raccourci. L'expérience fut tentée sur un grand nombre d'exemplaires. Il y avait bien quelques différences provenant de la taille, du sexe ou du hasard; mais c'était tellement irrégulier et de si peu d'importance qu'il nous parut impossible d'en tenir compte. La seule constatation certaine, c'est que tous les *Scydmaenus* ont la base des cuisses et les tibias plus foncés que le gigot.

Les trochanters furent, par la même occasion, l'objet d'un examen sérieux. Il fut difficile, en ce qui concerné les *Eustemmus*, cet organe étant velu. Il fallut la dissection et le microscope pour arriver à un résultat. Le voici : les *Eumicrus tarsatus* ont les trochanters postérieurs $\frac{1}{3}$ environ de la cuisse, compris le trochanter; les *Scydmaenus* in sp. et les *Eustemmus* $\frac{1}{4}$ de la cuisse, sauf *camelus* (prothorax caréné) $\frac{1}{5}$ seulement. Les trochanters antérieurs et intermédiaires sont normaux. Ces proportions sont établies en dessous, car en dessus les proportions changent, trochanters et fémurs étant soudés l'un sur l'autre, à leur extrémité.

Les antennes offrent des caractères très sérieux. Elles se présentent sous trois aspects capitaux : 1° massue carrée; 2° massue oblongue; 3° massue longue.

Toutefois les proportions des articles antennaires sont loin d'être immuables, et, comme dans tous les autres genres, présentent des fluctuations infinies. L'article 1^{er} est toujours plus gros que les suivants, plus ou moins masqué par le rebord frontal, généralement 2 fois aussi long que large, à angles apicaux presque toujours aigus et même épineux, surtout l'interne; mais ce caractère est, comme tous les autres, bien flottant. Les intermédiaires, 2 à 6, sont le plus souvent oblongs et subégaux; mais le 5^e est généralement un peu plus long dans certaines espèces européennes et trois espèces seulement jusqu'ici, une algérienne et deux syriennes, ont l'article 3 beaucoup plus long que les autres.

Les articles 7 et 8 sont généralement épineux, anguleux ou renflés en dedans, le plus souvent à la base, et par conséquent rétrécis au sommet, à l'encontre des intermédiaires qui le sont plus ou moins à la

base. Toutefois, plus l'antenne s'allonge et plus ce caractère s'atténue, au point de disparaître complètement dans les antennes à massue longue, surtout pour l'article 7.

La massue est non moins flottante, sauf toutefois dans le groupe à massue carrée où les articles 9 et 10 semblent de proportions invariables. Seuls leurs angles s'accroissent ou s'effacent.

Dans le groupe des *Eustemmus* à massue oblongue (*antidotus*), l'article 10 offre une mobilité particulière, et nous le voyons descendre parfois jusqu'au carré, tandis que l'article 9 reste toujours au moins un peu plus long que large. Il est toutefois impossible d'accepter cette variation comme spécifique, car dans la suite d'une trentaine de *sternalis* (Saulcy) pris ensemble, nous voyons les antennes passer par toute la filière, du carré à l'oblong très accentué, et on peut suivre toutes les gradations, même d'une antenne à l'autre, chez le même insecte, et tout le groupe subit plus ou moins cette mobilité.

Quant aux antennes à massue longue des grands *Eustemmus*, elles se modifient incessamment du haut en bas, sans que les proportions entre les articles subissent une influence sérieuse. L'antenne s'allonge ou se raccourcit, s'effile ou s'épaissit continuellement. Les articles 7 et 8 en arrivent à devenir complètement oblongs et cylindriques, et par contre l'article 10 se fusionner.

Les antennes des *Scydmaenus* sont peu velues. Les articles intermédiaires sont garnis, à leur sommet, de 1 ou 2 poils très fins, assez longs; la massue, en plus de quelques poils semblables, est légèrement duvetée de jaune. Enfin si parfois les antennes des *Eustemmus* sont brunes, unicolores et mates, le plus souvent elles sont claires, transparentes et la base des articles supérieurs largement tachée de noir.

Il faut, pour bien les étudier, les préparer avec soin et les étaler sur le cristal ou le carton. La massue, en effet, est méplate et les articles reliés l'un à l'autre par une mince tige ronde qui leur sert de pivot. Ils se meuvent donc isolément et souvent l'un se présente de face quand son voisin se présente de profil ou de trois quarts. Une antenne libre doit être examinée, article par article, dans tous les sens.

Le prothorax, en dehors de ses proportions et de ses profils, offre des caractères capitaux et solides, le plus souvent du moins. Il est quadrifovéolé à la base, bifovéolé, caréné et enfin lisse.

A la première catégorie appartiennent les *Scydmaenus tarsatus* et *syriacus* et les *Eustemmus* du groupe *antidotus*.

A la deuxième le *Scydmaenus vulpinus*, les *Cholerus* et les *Eustemmus* bifovéolés accidentellement.

A la troisième *Eustemmus camelus*.

A la quatrième les *Eustemmus* des groupes *conspicuus*, *Goliath* et *arachnipes*.

Le prothorax est extrêmement variable de proportions chez toutes les espèces. Pour en donner une idée, la collection de Saulcy ne possédait que deux *longior*, pris ensemble, ou tout au moins portant la même provenance. L'un est représenté par la fig. 408 et l'autre est identique à la fig. 407. Tous les grands exemplaires qui nous ont été communiqués présentent les mêmes fluctuations.

Le prothorax est extrêmement convexe; la base est généralement très déclive et rugueusement ponctuée. Chez certaines espèces cependant, la partie médiane de la base reste de niveau, et parfois si étroite qu'elle forme carène. La dépression latérale forme une gouttière plus ou moins profonde et, dès qu'elle s'atténue, se dessinent aussitôt de petites fovéoles plus ou moins perceptibles. Chez le groupe des *antidotus*, où la gouttière est effacée, où la déclivité basale est très peu accentuée, on distingue plus ou moins nettement quatre fovéoles extrêmement variables, parfois très petites, surtout les latérales. Les médianes sont souvent très accentuées, larges et profondes et font saillir plus ou moins l'espace séparatif.

Ce caractère est accidentel chez les espèces quadrifovéolées, mais il est la règle chez les syriennes à massue longue, bifovéolées accidentellement. Et cette carène elle-même est d'une extrême variabilité, tantôt énergiquement accentuée, jusqu'à atteindre le milieu du disque, tantôt réduite à un simple renflement et même effacée, sans qu'il y ait aucun rapport avec la présence ou l'importance des fovéoles basales. Nous sommes convaincu qu'on finira par découvrir des exemplaires sans fovéoles ni carènes, mais nous n'en avons pas encore vu. M. Reitter a bien ainsi décrit son *E. Turki*, mais il a fait erreur. Ses deux types sont bifovéolés et carénés, c'est-à-dire des *camelus* de petite taille.

Il se dégage cependant certaines règles qui ne souffrent jusqu'ici aucune exception.

Si les *Cholerus* et les *Eustemmus* de Syrie à massue longue sont bifovéolés accidentellement, quoique parfois très fortement, par contre *Scydmaenus tarsatus* et *syriacus* sont toujours énergiquement quadrifovéolés, ainsi que tous les *Eustemmus* à massue oblongue. Jamais nous n'avons rencontré un seul exemplaire à fovéoles effacées.

De même toutes les espèces à massue carrée ont le prothorax non fovéolé.

Tous les ♂ des *Scydmaenus* ont les tarses antérieurs dilatés. Ce caractère est difficile à relever. Il faut se servir du microscope, et, même

à l'aide d'un fort grossissement, on ne peut le constater sûrement chez les petites espèces.

Restent les élytres.

Ils offrent quelques caractères nettement tranchés. Les *Eumicrus* d'abord ont les épaules très saillantes, bordées intérieurement d'une gouttière divergente, large et profonde. Chez les *Scydmaenus* in sp. la base est légèrement déprimée et l'épaule accentuée. Chez tous les *Eustemmus* enfin, la base est arrondie, sans épaule. Toutefois, chez de rares exemplaires, la base s'affaisse et on voit l'épaule se dessiner vaguement tandis que l'écusson saillit légèrement. Ces accidents se présentent dans tous les groupes, jusqu'à donner l'illusion de véritables petites cuvettes basales extrêmement superficielles (fig. 405).

Quant aux dépressions longitudinales ou gouttières juxta-suturales signalées par M. Reitter, c'est un caractère tellement instable et flottant qu'il n'en peut être tenu aucun compte. On le rencontre accidentellement et plus ou moins accentué chez tous les *Eustemmus* à massue oblongue ou carrée, jamais, jusqu'ici du moins, chez ceux à massue longue.

Les *Eustemmus* sont aptères, les autres groupes ailés.

Nous terminerons par une observation curieuse.

Une espèce créée par M. de Sauley et consacrée par M. Reitter, *S. sternalis*, nous a longtemps arrêté.

Elle est décrite par M. de Sauley dans ses manuscrits :

Rufa-brunneus, pube griseo-flava vestitus, capite rotundato, thorace basi quadrifoveolato, elytris oblongis, dense subtiliter punctatis, parum convexis, metasterno carinato.

Il ajoute : « Cette espèce se reconnaît, au premier coup d'œil, à sa forme allongée, à sa ponctuation fine et serrée, ainsi qu'à la carène du métasternum, caractère qui lui est propre. »

Nous ne dirons rien de la couleur, de la pubescence, des profils de la tête et des élytres, de la ponctuation ni de la convexité, caractères essentiellement flottants et superficiels.

Mais le métasternum est pourvu, à sa base, d'un petit tubercule caréniforme, parfois prolongé jusqu'au sommet (fig. 422), caractère rarement net, presque toujours flottant, souvent insaisissable.

Le tubercule inférieur cependant est nettement accusé chez un certain nombre d'exemplaires et, malgré un examen attentif, nous ne l'avons rencontré dans aucun groupe.

Nous possédons 27 exemplaires, dont 24 types de la collection de

Sauley, le type unique de la collection Reitter et deux exemplaires à nous vendus par M. Desbrochers, qu'il avait reçus de M. Reitter probablement. Un quart environ ne possèdent pas ce caractère et sont inséparables des autres groupes.

D'autre part, tous ces insectes ont été pris en 1855, ensemble sans doute, et portent l'étiquette *Edough*. 3 cependant portent celle d'*Algérie* et enfin les 2 de M. Desbrochers, *Bône*. Nous n'en avons pas vu d'autres.

Quoique tous soient à peu près identiques de taille et de profils (fig. 405), comme on rencontre des exemplaires absolument semblables dans les autres groupes, le déterminateur se trouverait fort embarrassé pour classer les exemplaires non carénés et surtout ceux des entomologistes qui imposent l'obligation bizarre de ne pas toucher aux exemplaires communiqués. C'est évidemment un service que rend l'entomologiste au monographe de lui communiquer ses richesses; mais c'est un service non moins grand que rend le monographe à ses correspondants, et ceux-ci ne sont guère avancés de recevoir des noms accompagnés d'un : ?.

En somme, quoique nous maintenions l'espèce, nous sommes persuadé qu'elle ne doit être considérée que comme une race de *S. antidotus*, qui, de même que *S. conspicuus*, offre une flexibilité extraordinaire. On trouve, dans les mêmes localités, les races courtes et trapues (*Oli-cieri*, *Georgi*, *punctipennis*), aussi bien que les grêles (*scaphium*, *longior*, *libertus*) et les normales (*antidotus*, *vicidus*, *expansus*, *algericus*, etc.). Les fanatiques d'espèces pourront toujours trouver à se satisfaire.

TABLEAU DES SCYDMAENUS.

- I. — Base des élytres à gouttière humérale profonde, épaules saillantes, écusson bien visible..... s.-g. **Eumicrus**.
1. Base du prothorax quadrifovéolée.
 - Moyen, élancé, avant-corps étroit, prothorax très acuminé au sommet, plus long que large, antennes grêles, 2 mill.
..... **tarsatus**.
 - Grand, trapu, avant-corps large, prothorax subtransverse, en plein cintre au sommet, antennes robustes, 2 1/4 à 2 1/2 mill..... **syriacus**.
2. Base du prothorax bifovéolée, 2,2 mill..... **vulpinus**.
- II. — Base des élytres déprimée, épaules accusées, écusson invisible..... s.-g. **Scydmaenus** in sp.

1. Base du prothorax non fovéolée.

A. Antennes à massue oblongue.

a. Tête ♂ normale.

Petit, rouge ou testacé, unicolore, généralement peu brillant, avant-corps étroit, finement ponctué..... **rufus**.

Moyen, brun ou rouge foncé, unicolore, très brillant, avant-corps large à peu près lisse..... **spartanus**.

2. Base du prothorax bifovéolée accidentellement.

A' Antennes à massue oblongue.

b. Tête ♂ particulière.

Petit, rouge ou testacé, tête ♂ subcarrée, un peu plus longue que large, profondément excavée du front au vertex, ♀ subcarrée, un peu oblongue, bombée... **Perrisi**.

Petit, rouge ou testacé, tête ♂ trapézoïdale, quadrangulaire, très large à la base, transverse, angles postérieurs très accusés, profondément excavée, ♀ subcarrée ou subtransverse, bombée..... **Helwigi**.

Petit, rouge ou testacé, tête ♂ à peu près semblable à *Helwigi*, mais moins large, parfois même hexagonale; ♀ identique à *Helwigi*..... var. **cornutus**.

III. — Base des élytres très étranglée, très convexe, épaules effacées, écusson invisible..... s.-g. **Eustemmus**.

I. Article 3 normal.

1' Base du prothorax non fovéolée.

B. Antennes à massue carrée.

Grand ou très grand, rouge ou brun, unicolore, ponctuation fine et serrée, pubescence longue..... **conspicuus**.

Le même, pubescence plus courte..... var. **algerinus**.

Le même, pubescence très courte et serrée.. var. **parmatus**.

Le même, lisse et glabre..... var. **nudipennis**.

3. Base du prothorax quadrifovéolée.

A' Antennes à massue oblongue.

Grand ou très grand, rouge ou brun, unicolore, peu brillant, ponctuation fine et serrée..... **antidotus**.

Le même, ponctuation plus forte..... var. **punctipennis**.

Le même, de taille exceptionnellement grande. var. **libertus**.

Grand, étroit, élané, rouge ou brun, métasternum caréné
ou tuberculé..... **sternalis.**

1" Base du prothorax non fovéolée.

C. Antennes à massue longue.

Excessivement grand, pubescence longue et épaisse.. **Goliath.**

4. Base du prothorax carénée et bifovéolée généralement.

Excessivement grand, pubescence longue et épaisse.....

..... **Truki, camelus.**

II. Article 3 beaucoup plus long que 2 et 4.

1" Base du prothorax non fovéolée.

A" Antennes à massue oblongue.

Excessivement grand, brun, pubescence longue et épaisse.

C' Antennes à massue longue..... **Saulcyanus.**

Excessivement grand, brun, pubescence courte, écar-

tée..... **intermedius.**

Petit, testacé, très élané, pattes longues et grêles. **arachnipes.**

S. tarsatus (fig. 387)

Muller et Kunze, Mon., 41.

Moyen, brillant, trapu, avant-corps étroit, de taille à peu près constante, brun rouge, prothorax et tête brun noir, palpes, antennes et pattes rouges. Certains exemplaires sont brun-noir, unicolores, membres à peine plus clairs.

Tête petite, variable, beaucoup plus étroite que le prothorax, uniformément bombée, subcarrée, transverse; front légèrement déprimé, faisant saillir plus ou moins les tubercules juxta-antennaires; ponctuation nulle; poils très fins, serrés, jaunes; yeux gros, saillants.

Antennes normales, 1/6 environ plus longues que tête et prothorax réunis; art. 1^{er} beaucoup plus gros que 2, à peu près deux fois long comme large, compris la partie cachée, à angles apicaux aigus, surtout l'externe; 2 quart plus long que large, un peu plus gros que 3, 3 et 4 à peine oblongs; 5 plus long et un peu plus gros que 3 et 4, presque égal à 2; 6 égal à 3 et 4; 7-8 larges comme 6, plus courts, transverses, anguleux en dedans; 9 beaucoup plus gros; un peu plus long que large, à base un peu étranglée; 10 plus gros encore, long comme large; 11 piriforme, plus gros et 1 1/2 fois long comme 10.

Prothorax plus long que large, plus large que la tête, beaucoup moins que les élytres, subparallèle du milieu à la base, très rétréci au

sommet, très convexe, légèrement étranglé à la base, les angles postérieurs un peu obtus et émoussés, garni de 4 fovéoles basales, les médianes plus grandes et plus profondes; ponctuation nulle; poils jaunes, fins et serrés, couchés transversalement.

Élytres ventrus, très convexes, leur plus grande largeur vers le milieu, très étranglés à la base, acuminés, plus ou moins tronqués au sommet; épaules saillantes, séparées de l'écusson par une gouttière large et profonde, divergente; écusson très petit; suture légèrement saillante, bordée d'un sillon étroit et obsolète; ponctuation nulle; poils jaunes, fins et serrés.

Dessous brun unicolore, anus plus clair, entièrement semé de poils jaunes excessivement fins, courts et serrés; métasternum ♂ creusé en long; pattes normales, rubustes; trochanters $1/3$ de la cuisse.

Toute l'Europe, Afrique septentrionale, Syrie.

S. syriacus

Croissandeau, Ann. Fr., 1874, Bull., p. LXXXIX.

Plus grand que *tarsatus*, plus large et plus trapu, avant-corps moins étroit, variable de taille (notre fig. représente le plus petit), brun-rouge unicolore, membres à peine plus clairs.

Tête moyenne, subcarrée, plus étroite que le prothorax, uniformément bombée; front légèrement déprimé; ponctuation nulle; poils rares, même sur les joues; yeux gros, peu saillants.

Antennes courtes et robustes, à peine aussi longues que tête et prothorax réunis, à massue nettement détachée de 3 articles; 1 plus gros que 2, $1\frac{1}{2}$ fois long comme large; 2 $\frac{1}{3}$ fois long comme large; 3-8 un peu moins gros que 2, à peine oblongs, subégaux (7 et 8 triangulaires, 5 plus long, $1\frac{1}{2}$ fois long comme large ♂); 9-10 longs comme larges, plus ou moins étranglés à la base, beaucoup plus gros que 8 (10 un peu plus gros que 9); 11 piriforme, court.

Prothorax un peu plus large que long, subparallèle de la base au 1^{er} tiers antérieur où il s'arrondit à peu près en plein cintre, à peine rétréci à la base; celle-ci quadrifovéolée, les deux fovéoles médianes grandes, contiguës, profondes, faisant saillir l'intervalle, les deux latérales un peu plus petites, noyées dans la déclivité latérale; ponctuation nulle; poils jaunes, courts, clairsemés sur le disque, plus épais sur les côtés et au sommet.

Élytres larges et courts, $1/5$ à peine plus longs que tête et prothorax réunis, subtronqués au sommet, identiquement rétrécis en haut et en

bas, leur plus grande largeur au milieu; très convexes; repli huméral très saillant, long, bordé intérieurement d'une gouttière étroite et profonde; du repli huméral à l'écusson règne une cuvette courte, profonde et large qui se poursuit en une gouttière juxta-suturale profonde, mais étroite, qui ne dépasse pas la moitié des élytres; écusson relativement grand, enfoncé entre le repli sutural qui saillit énergiquement; ponctuation fine, extrêmement serrée, visible seulement dans la moitié antérieure; poils jaunes, courts, peu serrés.

Dessous comme *tarsatus*; pattes beaucoup plus robustes.

Syrie.

S. vulpinus

Schaum, Zeits. f. d. Entom., V, 1844, p. 471.

N'ayant pas pu examiner le type de cette espèce, nous nous sommes borné à reproduire sa description d'après le texte original.

Rufo-testaceus, nitidus, pubescens, thorace oblongo-ovali, postice bipunctato, coleopteris ovalibus, apice subtruncatis, humeris subelevatis. — Long. 1 lin.

Habitat in Arabia, D. Waltl.

Magnitudine Sc. tarsati, sed statura magis elongata, capite thoraceque multo angustioribus, rufo-testaceus, nitidus, pube adpressa vestitus. Caput subquadratum, oculis parum prominulis, modice convexum. Antennae capitis thoracisque longitudine, articulo primo majore, 2-6 cylindricis, subaequalibus, 7 et 9 minoribus, ultimis tribus abrupte majoribus, elongatis, 9 et 10 obconicis, ultimo ovato, acuminato. Thorax oblongo-ovalis, latitudine dimidio longior, antice rotundatus, deorsum parum angustatus, basi rotundatus, ante basin punctis duobus impressus. Coleoptera ovalia, basi thorace paulo, medio duplo latiora, apice truncata, abdomine breviora, basi utrinque juxta humeros subimpressa, humeris subelevatis. Pedes concolores, femoribus elevatis, tarsis anticis dilatatis.

S. rufus (fig. 388)

Muller et Kunze, Monogr., 10.

S. impuncticollis (Schauf.).

Petit, très variable (1 mill. à 1,5; de la fig. 388 à la fig. 391), élancé, rouge unicolore, parfois testacé.

Tête très variable, le plus souvent grosse, subcarrée, transverse,

mais parfois aussi longue que large, uniformément bombée; front parfois aplati faisant saillir plus ou moins les tubercules juxta-antennaires; ponctuation nulle; poils jaunes, excessivement courts, fins et serrés; yeux petits, légèrement saillants.

Antennes normales, plutôt grêles, à massue oblongue, $\frac{1}{6}$ environ plus longues que tête et prothorax réunis; art. 1-8 exactement conformés comme *tarsatus*; 9 très gros, plus long que large, étranglé à la base; 10 plus gros encore, même forme; 11 piriforme, plus gros et deux fois plus long que 10.

Prothorax très convexe, cordiforme, extrêmement variable, parfois très étroit et à peine plus large que la tête, parfois très dilaté, comme fig. 389, mais toujours plus long que large; ponctuation nulle ou extrêmement fine et serrée, visible surtout à la base; poils jaunes, excessivement fins, courts et serrés.

Élytres très convexes, plus ou moins ventrus, très étranglés à la base, très acuminés au sommet; épaules saillantes, parfois bordées intérieurement d'un fin sillon; base déprimée légèrement; écusson invisible; fine gouttière juxta-suturale; ponctuation serrée, fine, bien visible; poils jaunes, très fins, assez serrés.

Dessous de la couleur du dessus, les 4 premiers segments bruns, sans caractère sexuel apparent; pattes grêles, trochanters postérieurs $\frac{1}{3}$ de la cuisse; métasternum très convexe, déprimé uniformément entre les hanches postérieures; tout le dessous est couvert d'une ponctuation extrêmement fine et serrée et de poils imperceptibles.

Toute l'Europe, de la Finlande au Caucase, Afrique septentrionale, Syrie.

Nota. — M. Reitter classe cette espèce parmi celles qui ont la base du prothorax bifovéolée accidentellement; mais nous n'en avons jamais vu un seul exemplaire avec ce caractère. Peut-être en existe-t-il. Peut-être aussi M. Reitter a-t-il été illusionné par la dépression latérale de la base, parfois assez accentuée au point de faire saillir la partie médiane presque en carène.

S. spartanus (fig. 389)

Reitt., Best. Tab., V, 1881, p. 142.

Moyen, très peu variable, brillant, ventru, avant-corps assez large, rouge brun unicolore, tarses et palpes jaunes.

Tête assez grosse, variable, subsphérique, très convexe; front non déprimé, sans tubercules; mais la rainure où s'insèrent les antennes

n'en est pas moins profonde et masque plus ou moins la base du 1^{er} article; ponctuation nulle; poils jaunes excessivement fins, courts et serrés; yeux gros, non saillants.

Antennes grêles, à massue oblongue, pas plus longues que tête et prothorax réunis; art. 1 plus gros que 2, deux fois long comme large, à angles apicaux aigus; 2-8 oblongs (2 et 5 un peu plus longs, 7 et 8 parfois un peu plus courts); 9 beaucoup plus gros, oblong, étranglé à la base; 10 semblable, plus gros encore; 11 piriforme, large comme 10, à peine plus long.

Prothorax cordiforme, très convexe, sa plus grande largeur un peu avant le milieu, étranglé à la base, vigoureusement rétréci au sommet où il s'arrondit en ogive surbaissée, lisse; poils jaunes, un peu plus longs et écartés que sur la tête, un peu moins que sur les élytres.

Élytres ventrus, leur plus grande largeur vers le milieu, très étranglés à la base, acuminés au sommet, très convexes, sauf la base plus ou moins déprimée; écusson invisible; épaules nettement accusées; parfois une gouttière juxta-scutellaire courte et obsolète; ponctuation extrêmement fine et écartée, le plus souvent nulle; poils jaunes, fins, courts et assez serrés.

Dessous de la couleur du dessus, anus plus clair, sans caractère sexuel apparent, entièrement couvert d'un duvet imperceptible; trochanters postérieurs 1/3 de la cuisse.

Grèce.

S. Perrisi (fig. 390 et 391)

Reitter, Best. Tab., p. 148.

Moyen, brillant, élancé, avant-corps très étroit, rouge ou testace unicolore; taille au-dessous de la moyenne, très variable, allant de la fig. 388 à la fig. 390.

Tête ♂ subcarrée, un peu plus longue que large, un peu étranglée à la base, profondément excavée du museau jusqu'au col; l'excavation bordée de bourrelets plus ou moins sinueux et garnie à la base d'un tubercule saillant, tantôt isolé (fig. 390), tantôt prolongé jusqu'au front; tête ♀ affectant la forme du ♂ (fig. 391), à angles postérieurs toujours plus ou moins accusés, étranglée à la base, toujours uniformément bombée, très rarement un peu raboteuse; front aplati, parfois légèrement creusé comme à la fig. 395; ponctuation nulle; poils jaunes, fins, très serrés; yeux petits, peu saillants.

Antennes longues, assez robustes, à massue oblongue, 1/5 environ plus longues que tête et prothorax réunis; art. 1 plus gros que 2, deux

fois long comme large, à angles apicaux aigus; 2-6 oblongs (3, 4 et 6 égaux, plus courts que 2 et 5); 7 et 8 à peine oblongs, anguleux intérieurement; 9 beaucoup plus gros, oblong, étranglé à la base; 10 semblable, plus gros encore; 11 piriforme, à peine plus gros et plus long que 10.

Prothorax cordiforme, variable, sa plus grande largeur avant le milieu, généralement ♂ plus étroit que ♀, plus long que large, légèrement étranglé à la base, très rétréci au sommet; ponctuation extrêmement fine et serrée, à peine perceptible, un peu plus visible à la base qui porte souvent deux fovéoles très petites, plus ou moins isolètes; poils jaunes, extrêmement fins et serrés.

Élytres ventrus, leur plus grande largeur vers le milieu, très élargés à la base, acuminés au sommet, très convexes, sauf la base plus ou moins déprimée; écusson invisible; épaules accusées, le plus souvent bordées intérieurement d'un fin et court sillon; gouttière juxtaposurale presque toujours nulle; ponctuation un peu plus grosse et moins serrée que sur le prothorax; poils jaunes, très fins, très courts et très serrés.

Dessous de la couleur du dessus, segments abdominaux plus foncés, anus clair, sans caractère sexuel apparent; pattes plus longues que *rufus*; trochanters postérieurs $\frac{1}{3}$ de la cuisse.

Europe centrale et méridionale.

S. Helwigi (fig. 392 et 393)

Herbst, Käf., IV, p. 411, t. 39, fig. 12.

Taille au-dessous de la moyenne, très variable, moins brillant que *Perrisi*, d'aspect un peu rugueux, moins élancé, avant-corps plus large, rouge unicolore, rarement testacé.

Tête ♂ trapézoïdale, quadrangulaire, transverse, très large à la base, profondément excavée à la base de façon très irrégulière, parfois creusée en carré, parfois présentant deux énormes cuvettes séparées par un vallonement plus ou moins accusé et souvent divisées par une cloison longitudinale (fig. 392); cet ensemble est très difficile à distinguer, car il est souvent plus ou moins masqué par des touffes de poils; front aplati, généralement sillonné en long, très énergiquement ponctué; museau brillant, très peu visible dans la position normale; tête ♀ extrêmement variable, subcarrée, souvent même subtransverse, uniformément bombée, lisse; front aplati; vertex un peu aplati, parfois même déprimé (fig. 393); poils très fins et très serrés.

Antennes identiques à *Perrisi*, à massue peut-être un peu moins longue généralement, surtout ♀.

Prothorax variable, identique à *Perrisi*, à ponctuation aussi fine et aussi serrée, à poils un peu plus longs et plus écartés.

Élytres identiques à *Perrisi*, à ponctuation beaucoup plus forte, plus rugueuse et à poils beaucoup plus forts et plus longs.

Dessous comme *Perrisi*.

Europe centrale et méridionale.

S. cornutus (fig. 394 et 395)

Motschulsky, Bull. Mosc., 1845, p. 49.

S. cerastes Baudi, Berl. Ent. Zeitschr., 1869, p. 417.

Identique en tous points à *Helwigi*, sauf la tête.

Tête ♂ longue comme large, sous son faciès le plus restreint, subhexagonale, mais extrêmement variable, car les angles latéraux sont d'une mobilité extraordinaire, jusqu'à atteindre les proportions de la fig. 392, la tête devenant trapézoïdale. L'excavation est une vague réminiscence de la fig. 392 et, comme elle, est d'une variabilité extrême, aussi bien que dans *Helwigi*, nombre d'exemplaires de *cornutus* à tête large se confondent avec les *Helwigi* à tête étroite. Cependant la tête des *cornutus* ♂ arrive rarement au transverse et celle des *Helwigi* ♂ rarement au long comme large, la forte ponctuation rugueuse du front paraît particulière aux têtes larges (fig. 392). Chez les ♀ la tête semble également plus large chez *Helwigi*.

Mais il ne faut pas oublier que ces deux espèces ont le même habitat. Les innombrables exemplaires qui nous sont passés sous les yeux représentaient des suites nombreuses provenant des mêmes localités, notamment la Corse et Sos.

Nous avons tout examiné avec un soin méticuleux et nous devons avouer que les ♀ sont impossibles à distinguer d'abord et que nous avons, parmi les types mêmes des collections Reitter et de Saulcy, relevé des erreurs, en ce sens que parmi de nombreux *Helwigi* pris ensemble, certains ♂ ne pouvaient se classer que parmi les *cornutus* et réciproquement. Les ♀ accompagnant ces ♂ étaient toutes inséparables.

Dans ces conditions, quoique les formes extrêmes soient fort éloignées les unes des autres, il nous paraît impossible de séparer ces deux espèces et nous considérons *cornutus* comme une variété de *Helwigi*.

S. conspicuus (fig. 409 à 445)

Schaum, Berl. ent. Zeitschr., 1859, p. 50.

var. *algerinus* Reitt., Wien. Ent. Zeit., VI, 1887, p. 142.*insidiosus* Reitt., Wien. Ent. Zeit., VI, 1887, p. 142.var. *parmatus* Reitt., Best. Tab., X, 1884, p. 35.var. *nudipennis* Reitt., Wien. Ent. Zeit., VI, 1887, p. 142 et 144.*nigripennis* Reitt. — — 142 et 145.

Grand, très variable, comme le suivant, variant du rouge au brun noir, unicolore, élancé, peu brillant, avant-corps assez large. Élytres parfois bruns avec prothorax plus clair (var. *nigripennis*).

Tête très variable, comme chez le suivant, mais généralement grosse, uniformément bombée, lisse; front légèrement déprimé, parfois même creusé en avant, faisant saillir les tubercules juxta-antennaires; poils jaunes, fins, courts et assez serrés; yeux très petits.

Antennes normales, à peine plus longues que tête et prothorax réunis, à massue forte et carrée; article 1 un plus gros que deux, deux fois environ long comme large, à angles apicaux aigus; 2 1 1/2 fois long comme large, 3-6 oblongs, subégaux (5 parfois un peu plus long); 7 et 8 très variables, anguleux en dedans, le premier généralement long comme large, à peu près gros comme 6, le dernier, au contraire, plus gros, parfois jusqu'à donner l'illusion d'une massue de 4 articles; 9 très gros, carré, à angles plus ou moins arrondis; 10 plus gros que 9, presque toujours nettement carré; 11 piriforme, 1 1/2 fois long comme 10.

Prothorax exactement conformé comme le suivant et offrant les mêmes fluctuations, s'élargissant comme la fig. 443 ou se rétrécissant comme la fig. 444, lisse; base non fovéolée; poils jaunes, fins, assez serrés.

Élytres extrêmement variables, présentant toutes les fluctuations du suivant, exactement semblables, sauf pour la ponctuation et les poils. Tandis que chez *antidotus* la ponctuation est toujours fine et plus ou moins serrée, chez *conspicuus* elle est parfois très accentuée (var. *punctipennis*). La pubescence offre des écarts considérables; généralement longue (*conspicuus*), elle devient plus courte et plus fine (var. *algerinus*) et parfois excessivement courte, fine et serrée (var. *parmatus*). Elle disparaît même quelquefois (var. *nudipennis*).

Dessous comme le suivant.

Espagne, Sicile, Afrique septentrionale.

NOTA. — Les fig. 409 et 410 représentent deux *conspicuus*, 411 *nudipennis*, 412 *nigripennis*, 413 *parmatus*, 414 *insidiosus*, 415 *algerinus*.

S. antidotus (fig. 396 à 404 et 406a)

Germ., Faun. Ins. Ent., XXII, n° 3.

scaphium Reitt., Wien. ent. Zeit., VI, 1887, p. 141 et 144.

vividus — — — 141 et 144.

Olivieri Reitt., Best. Tab., V, 1881, p. 142.

expansus Reitt., Wien. ent. Zeit., VI, 1887, p. 141 et 144.

Georgi Reitt., Best. Tab., V, 1881, p. 142.

libertus Reitt., Wien. ent. Zeit., VI, 1887, p. 141 et 143.

var. *punctipennis* Fairm., Ann. Mus. civ. Gen., 1875, p. 512.

Grand ou très grand, extrêmement variable de taille et de profils, peu brillant, allant du rouge au brun noir, tête et prothorax parfois plus clairs.

Tête extrêmement variable de forme et de grosseur, tantôt subsphérique (fig. 398, 399, 401, 403, 404, 406), tantôt subcarrée (fig. 405, 396, 397), tantôt étranglée plus ou moins à la base (fig. 402), tantôt subtransverse (fig. 396, 400), tantôt suboblongue (fig. 402, 408), tantôt grosse (fig. 404), tantôt petite (fig. 401), jamais stable, même dans les suites prises ensemble, toujours, en somme, à peu près longue comme large, uniformément bombée, lisse; front aplati ou légèrement creusé; vertex souvent subsilloné; poils jaunes, fins, courts et serrés; yeux très petits.

Antennes longues, à massue forte et oblongue, $1/4$ environ plus longues que tête et prothorax réunis; article 1 plus gros que 2, deux fois long comme large, compris la partie cachée, à angles apicaux aigus; 2 $1\frac{1}{2}$ à 2 fois plus long que large; 3, 4 et 6 subégaux, $1\frac{1}{4}$ à $1\frac{1}{2}$ fois longs que larges; 5 plus long, 2 à 3 fois long comme large, mais très variable et parfois égal aux deux précédents; 7 et 8 à peine plus longs que larges, anguleux en dedans, à leur base (7 un peu plus petit); 9 très gros, oblong, ovalaire; 10 toujours plus gros que 9, oblong et ovalaire généralement, mais descendant parfois jusqu'au carré (fig. 401); 11 piriforme, très variable, $1\frac{1}{2}$ à 2 fois long comme 10.

Prothorax extrêmement variable de longueur et de largeur, mais toujours plus long que large, cordiforme, très convexe, garni à la base de quatre fovéoles plus ou moins accentuées, toujours petites, souvent peu perceptibles à cause des poils; ponctuation nulle; poils jaunes, fins, courts et serrés.

Élytres extrêmement variables de longueur et de largeur, très convexes, parfois un peu aplatis par les gouttières juxtasuturales (fig. 396, 399, 400, 401, 402), très étranglés à la base, acuminés, arrondis ou subtronqués au sommet, leur plus grande largeur toujours vers le milieu; épaules effacées; écusson imperceptible, ponctuation nulle; poils jaunes, fins, courts et généralement assez serrés.

Dessous de la couleur du dessus, antus plus clair, couvert de poils jaunes, très fins, courts et serrés, sans caractère sexuel apparent, métasternum uniformément bombé et déprimé entre les hanches postérieures; trochanters postérieurs $\frac{1}{4}$ de la cuisse; tarsi antérieurs ♂ dilatés.

Le nombre exagéré des espèces tirées de ce groupe si variable est une preuve suffisante de leur fragilité.

Afrique septentrionale, Espagne, Sicile.

NOTA. — La figure 396 représente un exemplaire choisi parmi les *Olivieri*, 397 *Georgi*, 398 *punctatus*, 399 *punctipennis*, 400 *algericus*, 401 *vicidus*, 402 un *scaphium* déprimé, 403 *antidotus*, 404 *expansus*, 405 *sternalis*, 406 *approximans*, 407 *libertus*, 408 *longior*.

S. sternalis (fig. 405)

Guilleb., L'Echange, XIII, p. 24.

Cette espèce, que nous maintenons provisoirement sur le caractère spécial du métasternum, ne se distingue de la précédente par aucun signe extérieur.

Sa taille est à peu près constante et tient à peu près le milieu entre les petits et les grands *antidotus*. Sa couleur est, jusqu'ici du moins, d'un rouge plus ou moins accusé, sans descendre jusqu'au brun.

Nous en possédons une trentaine, de différentes provenances, mais pris toujours plusieurs ensemble. Nous les avons tous préparés en cellules cristallines et plusieurs ne possèdent pas la carène métasternale. Chez quelques-uns elle est très accentuée, chez nombre d'autres très effacée et réduite à un simple reflet.

En somme, les exemplaires non carénés sont inséparables de *S. antidotus*. Nous ne voulons y voir qu'une variété de cette espèce si commune et si répandue.

Algérie, Maroc.

S. Goliath (fig. 448-449)

Reitt., Best. Tab., X, 1884, p. 35.

S. gigas (Saulcy).

Très grand, peu brillant, peu élancé, très convexe, brun unicolore.

Tête grosse, subcarrée (comme fig. 449), parfois étranglée à la base (fig. 448), uniformément bombée, lisse; front aplati devant et même parfois légèrement creusé; poils jaunes, fins, courts et serrés sur le disque, plus longs sur les tempes, comme chez les *Euconnus*.

Antennes longues et grêles, $\frac{1}{4}$ plus longues que tête et prothorax réunis; art. 1 plus gros que 2, $\frac{1}{2}$ fois long comme large, à angles apicaux aigus; 2-5 subégaux, 2 fois longs comme larges; 6 un peu plus court; 7 et 8 oblongs, subégaux, anguleux intérieurement, mais ce caractère est bien peu accentué; 9 très gros, ovulaire, presque 2 fois long comme large; 10 semblable, un peu plus gros; 11 piriforme, à peine plus gros et plus long que 10.

Prothorax subcordiforme, plus long que large, sa plus grande largeur un peu avant le milieu, très convexe, peu étranglé à la base, très rétréci au sommet, lisse; poils jaunes, courts, fins et serrés.

NOTA. — Il affecte parfois les profils de la figure 449.

Élytres variables de largeur, oscillant de la figure 448 à la figure 449, ovales, longs, étroits, très rétrécis à la base, très acuminés au sommet où ils s'arrondissent, leur plus grande largeur au milieu, très convexes, sans sillon ni gouttière; écusson invisible; ponctuation nulle; poils jaunes, fins, relativement courts et serrés.

Dessous de la couleur du dessus, unicolore, anus plus clair, sans caractère sexuel apparent, couvert de poils jaunes, fins, courts et semés; métasternum uniformément bombé et déprimé entre les hanches postérieures; trochanters postérieurs $\frac{1}{4}$ des cuisses; tarses antérieurs ♂ dilatés.

Algérie, Maroc.

S. Turki (fig. 446-447)

Reitt., Verh. d. k. k. zool.-botan. Ges. Wien, 1879, p. 742.

S. camelus Reitter, Verh. d. k. k. zool. bot. Ges. Wien, 1884, p. 93.

Très grand, très variable de taille, de profils et de détails, ventru, avant-corps étroit, brun unicolore.

Tête subcarrée à angles arrondis, uniformément bombée; front aplati

ou légèrement creusé; vertex subcaréné; ponctuation nulle; disque glabre, une touffe de poils courts sur les joues; yeux très petits.

Antennes longues et grêles, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{5}$ plus longues que tête et prothorax réunis; art. 1 plus gros que 2, $1\frac{1}{2}$ à 2 fois long comme large, à angles apicaux aigus; 2, 3, 4 et 6 $\frac{1}{2}$ à 2 fois longs comme larges (3 parfois un peu plus long); 5 plus long; 7 un peu plus court; 8 plus gros que 7, $1\frac{1}{2}$ à 2 fois long comme large; 9 beaucoup plus gros que 8, $1\frac{1}{2}$ à 2 fois long comme large; 10 plus gros encore, dilaté en dedans plus ou moins, $1\frac{1}{2}$ fois long comme large; 11 piri-forme, allongé, $1\frac{1}{2}$ fois long comme 10.

NOTA. — La variabilité des antennes est extraordinaire, comme on peut en juger par les figures 416 et 417.

Prothorax beaucoup plus long que large, subcordiforme, très convexe, légèrement étranglé à la base, en ogive arrondie au sommet, sa plus grande largeur vers le tiers antérieur, lisse et glabre, sauf quelques petits poils jaunes et très courts à la base; celle-ci déprimée latéralement à partir du milieu qui saillit plus ou moins énergiquement en carène de chaque côté de laquelle se distingue plus ou moins nettement une petite fovéole à la naissance de la dépression.

Élytres beaucoup plus larges que le prothorax, plus ou moins ventrus, leur plus grande largeur au milieu, très étranglés à la base, plus ou moins acuminés et arrondis au sommet, très convexes; épaules effacées; écusson imperceptible; ponctuation nulle; poils jaunes, longs, fins et serrés.

Dessous de la couleur du dessus, unicolore, anus plus clair, sans caractère sexuel apparent, couvert de poils jaunes, courts, fins et serrés; métasternum uniformément bombé et déprimé entre les hanches postérieures; trochanters postérieurs $\frac{1}{5}$ de la cuisse; tarses antérieurs ♂ dilatés.

Syrie.

OBSERVATION. — Les deux exemplaires types de *S. Turki* ont la carène et les deux fossettes très nettement accusées, aussi ne comprenons-nous pas l'erreur de M. Reitter qui décrit le *Turki* à prothorax non fovéolé. Il décrivit plus tard *S. camelus* comme carinulé et non fovéolé.

Or la plupart des exemplaires sont carinulés et bifovéolés. En somme la carinule est un caractère qui se rencontre accidentellement chez toutes les espèces fovéolées, et en ce qui concerne les *S. Turki*=*camelus*, si presque tous les exemplaires la possèdent, elle est souvent bien effacée, de même parfois les fovéoles; mais nous n'en avons jamais rencontré un seul qui ne fût ni caréné, ni fovéolé.

S. *Saulcyanus* (fig. 420)

Croiss., Bull. Soc. ent. Fr., 1894, p. xc.

Très grand, peu brillant, très élancé, très convexe, brun unicolore.

Tête grosse, subcarrée, très légèrement étranglée à la base, uniformément bombée, lisse; front aplati devant; poils jaunes, assez forts et longs, surtout sur les joues; yeux très petits.

Antennes grêles, à massue forte et oblongue, $1/5$ à peine plus longues que tête et prothorax réunis; art. 1 plus gros que 2, $1 1/2$ fois long comme large, à angles apicaux aigus; 2, 4, 5 et 6 subégaux, un peu plus longs que larges; 3 à peu près 3 fois long comme large; 7 un peu plus petit que 6; 8 plus gros que 7, long comme large, très dilaté à la base, très étranglé au sommet; 9 très gros, un peu plus long que large; 10 plus encore, renflé extérieurement; 11 piriforme, court, pas plus gros, et à peine plus long que 10.

Prothorax non fovéolé, subcordiforme, peu étranglé à la base, très rétréci au sommet en ogive arrondie, sa plus grande largeur au 1^{er} tiers antérieur, très convexe, lisse; poils jaunes, longs, forts et serrés.

Élytres ovales, longs, étroits, très étranglés à la base, acuminés au sommet, leur plus grande largeur au milieu, très convexes; écusson invisible; ponctuation nulle; poils jaunes, très longs, très forts, comme laineux, serrés.

Dessous de la couleur du dessus, unicolore, anus plus clair, sans caractère sexuel apparent, couvert de poils jaunes, fins, courts et serrés; métasternum uniformément bombé et déprimé entre les hanches postérieures; trochanters postérieurs $1/4$ des cuisses.

Ramley (Syrie).

S. *intermedius* (fig. 421)

Croiss., Bull. Soc. ent. Fr., 1894, p. xc.

Très grand, élancé, arrière-corps court et large, brun unicolore.

Tête grosse, subtrapézoïdale, aussi longue que large au niveau des yeux, très fortement rétrécie des yeux à la base, très convexe, lisse; front déprimé; poils très fins, courts et semés transversalement sur le disque, plus longs sur les joues; yeux très petits; palpes fusiformes, longs et étroits, déterminés par un appendice carré, nettement anguleux.

Antennes longues et grêles, à massue nettement détachée de 3 articles; 1 très gros, $1/2$ fois long comme large, compris la partie cachée

sous la proéminence frontale, à angles apicaux non aigus; 2 plus étroit et plus court 1 $\frac{1}{4}$ fois long comme large; 3 aussi large que 2, plus long, légèrement rétréci à la base, 2 fois long comme large; 4 plus étroit, beaucoup plus court, à peine plus long que large; 5 un peu plus étroit et plus court que 3, beaucoup plus long que 4, cylindrique, 2 fois long comme large; 6 identique à 4; 7 aussi large que 6, un peu plus court encore; 8 long comme large, plus large que 7, anguleux à la base; 9-10 très gros, 1 $\frac{1}{4}$ fois longs comme larges, ovalaires (10 un peu plus gros et plus long que 9); 11 piriforme, très acuminé, à peine plus long que 10.

Prothorax long et étroit, un peu plus large que la tête, fortement rétréci du milieu à la base, beaucoup plus encore du milieu au sommet où il est subtronqué uniformément et très convexe, non fovéolé; ponctuation nulle; poils extrêmement fins, courts et serrés.

Élytres en ovale à peu près pur, ventrus, courts, longs exactement comme tête et prothorax réunis, leur plus grande largeur au milieu d'où ils se rétrécissent uniformément vers la base et le sommet qui est par conséquent subtronqué, très convexes, sans aucune sinuosité ni bosse, même à l'épaule; ponctuation nulle; poils très fins, courts et serrés.

Dessous de la couleur du dessus, entièrement couvert de poils jaunes excessivement fins, courts et serrés; sans caractère sexuel apparent; pattes robustes.

Algérie : Hussein-Dey.

S. arachnipes (fig. 421)

Reitt., Best. Tab., X, p. 35.

Petit, variable, brillant, très élancé, très convexe, rouge ou testacé unicolore.

Tête grosse, aussi large que le prothorax, très rarement plus étroite, parfois un peu plus large, subcarrée, à angles arrondis, uniformément bombée, lisse et glabre; front un peu aplati; yeux petits, non saillants.

Antennes longues et grêles, à massue oblongue; art. 1 plus gros que les suivants, 1 $\frac{1}{2}$ fois long comme large; 2 et 5 plus minces, 1 $\frac{1}{2}$ fois longs comme larges; 4 et 6 à peine oblongs; 7 à peu près long comme large; 8 très petit, long comme large; 9 et 10 beaucoup plus gros, 2 fois longs comme larges, étranglés à la base, grossissant progressivement; 11 piriforme, allongé, un peu plus gros et à peine plus long que 10.

Prothorax long et étroit, pas plus large que la tête, un peu moins que les élytres, subparallèle, à peine rétréci à la base, en ogive arron-

die au sommet, sa plus grande largeur vers le 1^{er} tiers antérieur, très convexe, lisse; poils jaunes, fins, assez longs et serrés.

Élytres allongés, ovalaires, peu rétrécis à la base, acuminés au sommet, leur plus grande largeur vers le milieu, très convexes, 1/3 environ plus longs et plus larges que le prothorax; épaules effacées; écusson imperceptible; ponctuation nulle; poils jaunes, fins, longs et écartés.

Dessous unicolore, de la couleur du dessus; métasternum ♂ profondément excavé du milieu à la base, comme les *Cephennium*; pattes excessivement longues et grêles; trochanters postérieurs 1/3 de la cuisse.

Syrie.

CATALOGUE DES SCYDMAENUS.

S. g. *Scydmaenus*.

<i>tarsatus</i> Müll.	Syr. Alg. E.
<i>syriacus</i> Croiss.	Syrie
<i>vulpinus</i> Schaum.	

Scydmaenus in sp.

<i>rufus</i> Müll.	Afr. bor. E.
<i>agilis</i> Motsch.	
<i>impuncticollis</i> (Schauf.).	Alg.
<i>spartanus</i> Rttr.	Gr.
<i>Perrisi</i> Rttr.	E.
<i>Helwigi</i> F.	E.
<i>v. cornutus</i> Motsch.	E.
<i>cerastes</i> Baudi.	

S. g. *Eustemmus*.

<i>conspicuus</i> Schaum.	Afr. bor. E. m.
<i>v. algerinus</i> Rttr.	Afr. bor. Hi.
<i>insidiosus</i> Rttr.	
<i>v. parvatus</i> Rttr.	Maroc
<i>v. nudipennis</i> Rttr.	Afr. bor. Hi. m.
<i>nigripennis</i> Rttr.	Alg.
<i>antidotus</i> Germ.	Afr. bor. E. m.
<i>scaphium</i> Rttr.	Alg.
<i>vividus</i> Rttr.	Maroc
<i>Olivieri</i> Rttr.	Alg.

<i>expansus</i> Rttr.	Alg. Maroc
<i>deplanatus</i> (Saulcy)	Alg.
<i>algericus</i> (Saulcy)	Alg. Maroc
<i>maroccanus</i> (Saulcy)	Alg. Maroc
<i>angustior</i> (Schauf.)	Alg.
<i>angustius</i> (Schauf.)	Alg.
<i>Andreae</i> (Schauf.)	Alg.
<i>spectabilis</i> (Schauf.)	Alg.
<i>Georgii</i> (minor) Rttr.	Alg.
<i>pulex</i> — (Schauf.)	Alg.
<i>transversus</i> — (Schauf.)	Alg.
<i>globulus</i> — (Schauf.)	Alg.
<i>libertus</i> (major) Rttr.	Alg.
<i>approximans</i> — Rttr.	Alg.
<i>longior</i> — (Saulcy)	Alg.
<i>Poupilieri</i> — (Saulcy)	Alg.
<i>pyladus</i> — (Saulcy)	Alg.
<i>oranicus</i> — (Schauf.)	Alg.
<i>v. punctipennis</i> Fairm.	Afr. bor.
<i>punctatus</i> (Saulcy)	Alg.
<i>sternalis</i> (Saulcy)	Alg. Maroc
<i>Goliath</i> Rttr.	Algérie
<i>gigas</i> (Saulcy).	
<i>Turki</i> Rttr.	Mersina
<i>camelus</i> Reitt.	Syrie
<i>Saulcyanus</i> Croiss.	Syrie
<i>intermedius</i> Croiss.	Alg.
<i>arachnipes</i> Rttr.	Syrie

Gen. **Eudesis**

Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 583; sep. p. 143; trad., L'Abeille, 1883, XXI, p. 196. — Deuts. ent. Zeits., 1890, p. 387.

Ce genre a été établi par Reitter pour un petit Scydménide aveugle découvert en Corse, *Eudesis aglena*. Primitivement cet auteur avait attribué une importance prépondérante dans la spécification de son nouveau genre à la structure des côtés du prothorax de son espèce. Depuis, à la suite de la découverte d'une nouvelle espèce évidemment très voisine de l'*E. aglena*, Reitter a modifié sa description initiale (Deuts. ent. Zeits., p. 317). En fait, les *Eudesis* se rapprochent des *Scydmaenus* par les insertions des antennes qui se font sur le front; mais ils s'en éloignent par les antennes encore plus rapprochés à la base, contiguës, la forme des trochanters postérieurs simples alors qu'elle est très allongée chez ceux-ci et enfin par l'absence d'yeux. Deux espèces très voisines, *E. sulcipennis* Reitter et *adela* Saulcy, sont venues successivement se joindre à la première espèce, *E. aglena* décrite par Reitter.

Le tableau suivant fera ressortir les différences spécifiques de ces trois espèces.

1. Tête sillonnée dans toute la longueur; angles postérieurs du prothorax bien marqués, presque-droits, nullement émoussés..... **Adela** Saulcy.
— Tête impressionnée au plus sur l'occiput..... 2.
2. Angles postérieurs du prothorax pas tout à fait droits, c'est-à-dire côtés sinués avant la base; élytres subdéprimés à la base..... **sulcipennis** Reitt.
— Angles postérieurs du prothorax obtus; élytres non déprimés vers la base..... **aglena** Reitt.

E. aglena (fig. 429)

Reitt., Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 583; sep. p. 143; trad., L'Abeille, 1883, XXI, p. 196.

Roux testacé, très finement pubescent, à peine visiblement ponctué. Tête convexe, presque orbiculaire, sans sillon longitudinal. Antennes un peu épaisses. 1^{er} article allongé, cylindrique, 2^e un peu plus long que large, 3^e et 8^e très transversaux; massue bien marquée. 1^{er} et 2^e articles transversaux. 3^e un peu plus long que large. Prothorax oblong,

à peine plus large que la tête, un peu plus long que large, régulièrement convexe, côtés marqués vers la base, marge basilaire étroitement sillonnée. Élytres ovales, convexes, chacun avec deux sillons longitudinaux vers la base. Fémurs légèrement claviformes; tibias un peu arqués et épaissis dans le milieu.

Corse et Sardaigne.

E. sulcipennis (fig. 430)

Reitt., Deuts. ent. Zeit., 1890, p. 387.

Roux testacé, très finement pubescent. Tête presque orbiculaire, impressionnée sur le vertex. Antennes assez grêles; 1^{er} article allongé, 2^e un peu plus long que large, obconique, 3^e et 7^e subcarrés, 8^e transversal; massue bien marquée, 1^{er} et 2^e articles transversaux, 3^e à peu près aussi long que large. Prothorax un peu plus large que la tête, oblong; plus long que large; bords latéraux légèrement sinués avant les angles postérieurs; ceux-ci marqués, presque aigus. Élytres oblongs, chacun marqué d'un fort sillon oblique qui fait ressortir la région scutellaire et rappelle la structure de la base des élytres chez certains *Neuraphes*. Fémurs claviformes; tibias assez grêles, presque droits.

Algérie : Saint-Charles.

E. Adela (fig. 428)

Saulcy, Ann. Soc. ent. Fr., 1890, Bull., p. xxxiv.

Roux testacé, très finement pubescent. Tête longitudinalement sillonnée, sillon formant vers la base une forte impression triangulaire. Antennes aussi longues que la tête et le prothorax réunis; 1^{er} article allongé, 2^e un peu plus long que large, obconique, 4^e à peine plus long que large, plus long que 3^e et 5^e, 7^e plus long que 6^e et 8^e, 8^e plus étroit que 7^e; massue très nette, 1^{er} et 2^e articles transversaux, 3^e oblong, plus long que large. Prothorax de moitié plus large que la tête, un peu plus long que large, présentant sa plus grande largeur vers le tiers antérieur, légèrement rétréci vers la base; côtés presque droits, légèrement sinués avant les angles postérieurs, ceux-ci bien marqués; marges latérales légèrement concaves vers la base, creusées de chaque côté en une grande fossette arrondie. Élytres ovales, allongés, creusés chacun à la base entre le centre huméral et un espace juxta-scutellaire très étroit, une grande fossette très longue, atteignant le quart de la longueur de l'élytre; bords internes de ces fossettes bien

marqués. Élytres arrondis ensemble au sommet. Fémurs modérément claviformes; tibias droits.

Banyuls-sur-Mer.

Gen. **Leptomastax**

Pirazzoli, Coleop. Ital. gen. nov. *Leptomastax*, 1855. — Reitter et Simon, Deuts. ent. Zeits., 1884, p. 146. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 544, sep. 104; trad., L'Abeille, XXI, p. 133. — Ganglb., Käfer v. Mitteleur., 1899, III, 2^e p., 61.

Pylades Fairm., Ann. Soc. ent. Fr., 1856, p. 527.

Corpus oblongum, subparallelum, depressum, nitidum, absque pube. Caput exsertum, dilatatum, transversum, maximum.

Palpi maxillares articulis duobus ultimis oblique conjunctis, conjunctim ovatis.

Mandibulae maximae, falciformes, muticae, tenues, acutae.

Antennae subgeniculatae, validae, subapproximatae, intra mandibulas insertae, non clavatae.

Oculi nulli.

Thorax lateribus antice rotundatus, postice constrictus.

Elytra subintegra, basi non foveolata, apice conjunctim subrotundata.

Trochanteres postici simplices; femora clavata.

Tarsi validi, articulis sat brevibus, ultimo unguiculis brevibus armato.

Ce genre, extrêmement curieux, découvert et décrit par mon savant ami M. Pirazzoli, est complètement identique au genre *Pylades* de notre aimable collègue, M. Fairmaire. Les principaux caractères sont :

Tête plus large que longue, très large, ayant sa plus grande largeur au point d'insertion des mandibules qui sont très longues, grêles, mutiques, falciformes, repliées au repos, et dont l'extrémité aiguë de chacune d'elles atteint le point d'insertion de l'autre. Le labre est fortement échancré au milieu. Palpes maxillaires à 1^{er} article court; 2^e assez long, légèrement courbé, un peu renflé à l'extrémité; 3^e et 4^e soudés obliquement ensemble, formant une masse ovoïde assez grande. Antennes épaisses, subgénéculées en dehors, à 1^{er} article aussi long que la tête depuis son insertion jusqu'au cou, courbé légèrement en dehors vers les 2/3 de sa longueur; 2^e inséré obliquement à son extrémité, obconique, moins épais, des 2/3 plus court; les suivants d'abord transverses, croissant insensiblement en épaisseur, les avant-derniers carrés; 11^e très obtus, de la largeur du précédent, pas tout à fait deux

fois aussi long. Tous les articles sont assez serrés les uns contre les autres; la longueur totale n'égale pas tout à fait celle de la tête et du prothorax réunis. L'insertion des antennes a lieu devant le front, sur deux élévations placées sur la ligne antérieure joignant l'insertion des mandibules; chaque antenne est insérée à une distance de l'autre égale à la distance de l'insertion mandibulaire. Une large dépression longitudinale sépare la tête en deux, commençant à l'épistome entre les élévations antennifères, et se termine au cou, d'où partent deux assez courts sillons longitudinaux qui la limitent de chaque côté. Une dépression peu prolongée en arrière existe en outre entre l'élévation antennifère et l'insertion mandibulaire. En arrière, au-dessus de chaque angle postérieur, se trouve un gros point enfoncé.

Immédiatement après l'insertion des mandibules, sur les côtés de la tête, se trouve une très petite tache noire un peu relevée en bosse, suivie d'une très petite et très légère fossette. Cette tache remplace les yeux qui font défaut et sert très probablement d'organe impressionnable à la lumière, sans vision distincte, ainsi que cela a lieu chez plusieurs Coléoptères hypogés.

De ce point, la tête se rétrécit en arrière, plus ou moins, d'abord en ligne droite ou très légèrement courbée, puis forme des angles postérieurs très arrondis.

Le prothorax ressemble assez à celui des *Eumicrus*; mais il est plus fortement dilaté en avant; sa plus grande largeur est au $\frac{1}{4}$ antérieur; il est généralement sans impressions. Ses côtés sont fortement arrondis en avant et se rétrécissent en ligne droite vers la base. Il est moins large que la tête, mais environ d'un tiers plus long. L'écusson est très petit.

Les élytres sont en ovale allongé, régulier, leur plus grande largeur au milieu. Ils sont légèrement arrondis ensemble à l'extrémité, laissant le pygidium à découvert. Leur disque est toujours marqué de plusieurs lignes de points variant selon les espèces. La largeur des deux élytres, pris ensemble, surpasse d'un tiers celle du prothorax et leur longueur est double de celui-ci. Les épaules ne sont pas sensiblement marquées et les élytres ne sont pas, à leur base, sensiblement plus larges que la base du prothorax. Ils n'offrent, en outre, jamais aucune impression ni fossette à leur base.

Les parties inférieures n'offrent rien de particulier; les trochanters sont simples, les fémurs fortement claviformes, peu allongés, les tibia droits, et les tarses sont formés d'articles assez épais, peu allongés, décroissant en longueur du 1^{er} au 4^e, fortement serrés les uns contre les autres, le 5^e un peu plus long que le précédent, et terminé par

2 crochets très courts. On voit encore, avec un fort grossissement, 4 très petites épines à son sommet.

Outre les caractères si curieux de la tête, et qui permettent de reconnaître si facilement ce genre, j'ajouterai que la forme est fortement déprimée, assez allongée, presque parallèle, et qu'aucune pubescence ne revêt ces insectes qui sont lisses. Leur couleur est toujours rousse et leur reflet très brillant ⁽¹⁾.

Le genre *Leptomastax* est nettement tranché; il n'a aucune analogie avec les genres voisins. Le faciès, toujours constant, en fait un groupe à part. Sauf les antennes, à peu près semblables à celles des *Chevrolatia* et les mâchoires à celles des *Euthia*, nul caractère ne relie ce genre à aucun autre.

Peut-être eût-il été plus rationnel de le mettre en tête des Scydmanides et le faire suivre immédiatement des *Euthia* et *Chevrolatia*. Mais, dans une famille si homogène, où la plupart des genres sont bien délimités, l'enchaînement des formes, du faciès général, devient secondaire. Il n'y a guère que pour les *Neuraphes*, *Scydmaenus*, *Euconnus* et *Eumicrus* qu'un classement méthodique s'impose. Pour eux, un examen superficiel est insuffisant; il faut une observation longue et minutieuse pour établir si un insecte doit être classé dans l'un ou l'autre de ces genres. Le premier venu classera sans hésiter un *Leptomastax*.

Il n'en est pas de même au point de vue spécifique. Comme dans tous les autres groupes, du reste, l'espèce est difficile à déterminer. La couleur est à peu près uniforme, la taille extrêmement variable, les profils identiques partout. Heureusement deux caractères offrent une fixité suffisante, pour établir les groupes d'abord, les espèces ensuite.

Au point de vue des groupes, le caractère est net, constant, inflexible; c'est la poitrine. Au point de vue spécifique, c'est l'ensemble et le nombre des stries ou rangées de points élytrales. Ce dernier caractère, malheureusement, est moins net et plus flottant; mais il nous a paru suffisant pour établir les différentes espèces du genre. Tous les autres caractères sont sans valeur, ou, tout au plus, serviront de compléments accessoires. Ils ne joueront qu'un rôle secondaire.

En particulier l'examen d'un nombre considérable d'exemplaires nous a conduit à remarquer combien la division des *Leptomastax* en deux sections basées sur des poils est peu certaine, sauf chez quelques *L. hypogaeus*; ce caractère est absolument insaisissable, les poils étant d'une caducité extraordinaire. La plupart n'en ont point, ou un par-ci par-là.

(1) Caractères du genre extraits d'une note de M. de Sauley.

Chez les *Leptomastax* la carène pectorale se présente sous 3 aspects différents :

1° Une lame tranchante partant de la base même du prothorax, passant entre les hanches intermédiaires et s'effaçant graduellement vers le milieu du métasternum. Dans sa partie supérieure elle affecte la forme d'un point d'exclamation.

2° Une simple carène arrondie, un peu plus forte dans la partie supérieure et entre les hanches, puis grossissant en bourrelet et se terminant brusquement à la dépression métasternale où elle expire en un mince filet.

3° Un bourrelet plat assez large, sa plus grande largeur entre les hanches, arrondi et se divise en dessous en deux branches jusqu'aux hanches postérieures décrivant une arche ogivale très profonde chez les ♂, déprimée chez les ♀. Dans ce dernier groupe la poitrine tout entière, couverte d'une ponctuation très serrée, devient mate et chagrinée.

Or à ces 3 caractères, d'une inaltérable constance, correspondent 3 caractères de stries élytrales presque aussi solides.

Le premier groupe présente 3 rangées de points obsolètes, souvent même invisibles.

Le 2° présente 4 rangées, la 4° seulement obsolète.

Le 3° en a 5; les 3 premières profondes; la 4° courte, le plus souvent nette; la 5° obsolète.

Nous constaterons en outre que toutes les espèces occidentales appartiennent au 1^{er} groupe, celle de l'Europe médiane au 2°; enfin les orientales et asiatiques au 3°.

TABLEAU DES LEPTOMASTAX.

I. — Carène pectorale fine; poitrine brillante.

A. 3 rangs de points discoïdaux obsolètes.

a. Très grand, rouge brun, points imperceptibles..... **grandis.**

b. Grand, 3^e rang obsolète, rouge brun..... **hypogaeus.**

c. Moyen ou petit, rouge clair ou testacé, les 2^e et 1^{er} rangs visibles, le 3^e obsolète ou nul..... **Delarouzei.**

II. — Carène pectorale forte, tranchée brusquement et renflée au métasternum; poitrine brillante.

B. 4 rangs discoïdaux de points, le 4° obsolète.

a. Grand, rouge brun ou clair..... **Coquereli.**

- b.* Moyen, rouge brun, clair ou testacé..... **Emeryi**.
c. Petit, testacé..... var. **Simoni**.

III. Carène pectorale aplatie; poitrine mate.

- C.* 4 rangs de points profonds, le 4^e court.
a. Grand, baies externes de la tête très grandes..... **syriacus**.
b. Moyen, baies externes normales..... var. **4-striatus**.

Nota. — Les espèces des 2 dernières sections ont un 5^e rang de points, difficilement visible, sauf chez les immatures, au sommet. Ces points suivent l'épipleure, sous la déclivité discoïdale.

L. grandis (fig. 431)

Simon, Deuts. ent. Zeits., 1881, p. 155, pl. IV, p. 5. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1884, p. 505; sep., p. 145; trad., L'Abeille, XXI, p. 197.

Taille très grande, brun, pattes et palpes plus clairs. Yeux très petits, mais bien marqués, mats.

Exactement conformé comme *hypogaeus*; mais beaucoup plus grand, beaucoup plus bombé, aussi bien sur les élytres que sur le prothorax. Ceux-ci sont en ovale régulier, plus étranglés à la base qu'au sommet où ils sont arrondis en ellipse surbaissée.

Les rangs de points sont irréguliers et difficilement perceptibles. Les points sont cependant nets, bien formés, mais extrêmement fins. C'est la 2^e strie la plus distincte. Au premier coup d'œil on ne perçoit pas les points, car l'insecte est moins brillant qu'*hypogaeus*.

Un seul exemplaire (coll. Reitter).

Nous voulons bien croire que cet insecte possédait jadis des poils. C'est à peine si nous en avons découvert un seul près de la fossette basale gauche de la tête.

Métasternum et carène pectorale comme *hypogaeus*.

Patrie : Italie (Bargagli).

L. hypogaeus (fig. 432)

Pirazzoli, Col. Ital. Gen. nov., 1855, p. 3, pl. 1. — Reitter et Simon, Deuts. ent. Zeits., 1881, p. 150, pl. IV, f. 1. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1884, p. 584; sep., p. 144; trad., L'Abeille, XXI, p. 197. — Fiori, Nat. Sic., 1894, XIII, p. 229. — Ganglb., Käf. v. Mitteleur., 1899, III, 1^{re} part., p. 62.

mehadiensis Friv., Term. Fuz., IV, 1880, III, p. 180. — Ganglb., Käf. v. Mitteleur., 1899, III, 1^{re} part., p. 63.

var. *Raymondi* Sauley, Ann. Soc. ent. Fr., 1864, p. 257. — Reitter et Simon, Deuts. ent. Zeits., 1881, p. 153. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges., 1884, p. 585; sep., p. 145; trad., L'Abeille, p. 197.

Taille grande, variable, brun rouge ou jaune rouge clair, pattes plus claires; entièrement lisse et brillant.

Tête lisse; parfois imperceptiblement ponctuée; vertex bisillonné en arc; entre les 2 sillons, une gouttière variant de longueur et de profondeur, parfois obsolète ou nulle. Les sillons arqués forment, de chaque côté, avec l'angle postérieur, un arc de cercle portant en son milieu une petite fossette basale, ponctiforme, pilifère, parfois bien marquée, parfois obsolète ou nulle.

Yeux très petits, très nets parfois, mais souvent imperceptibles ou nuls.

Prothorax méplat en haut, très convexe à la base, elliptique en haut, rétréci en bas; angles postérieurs généralement droits et bien marqués, souvent émoussés.

Élytres en ovale allongé, très étranglés à la base et au sommet, portant 2 poils dressés à la base de chacun et un au sommet, un peu distant de la suture. Celle-ci est tantôt plate, tantôt légèrement saillante, tantôt renfoncée. Ils sont sillonnés de 3 rangs longitudinaux de points irréguliers plus ou moins profonds, le juxtasutural presque droit, le 2^e plus cintré en dedans, le 3^e plus encore. Le 2^e rejoint le 1^{er} avant la base. Le 3^e, plus écarté, longe la courbe discoïdale. Le 1^{er} est généralement bien marqué, le 2^e moins net, le 3^e obsolète. Ces lignes sont extrêmement variables de force et de longueur. La 1^{re} a atteint parfois presque le sommet; la 2^e s'éteint plus vite; la 3^e n'atteint pas le milieu ou ne le dépasse guère. Les deux 1^{res} suivent souvent 2 cannelures plus ou moins profondes. Il arrive parfois que la ponctuation est très obsolète.

Le métasternum est toujours large et aplati. Les ♂ semblent l'avoir un peu plus déprimé.

Patrie : France méridionale (var. *Raymondi*), Italie, Dalmatie, Autriche.

OBSERVATIONS. — La seule partie du corps qui présente des fluctuations notables est le prothorax. Il est très variable de largeur, de longueur même. Parfois le haut forme un plein cintre régulier; mais il est souvent elliptique, dessinant vaguement sur les côtés un angle arrondi. L'étranglement basal est plus ou moins prononcé. A la base

on voit, chez un seul exemplaire (v. *Raymondi* Sauley), deux petites fossettes oblongues nettement accusées. Mais nous avons constaté, chez certains exemplaires italiens, ces mêmes fossettes plus ou moins obsoletées. Chez certains autres, on en distingue au milieu du disque. Pas plus que les fossettes basales de la tête, ce caractère fuyant ne peut être considéré comme spécifique.

Nous noterons même plus loin un exemplaire du *L. 4-striatus* qui possède, sur le disque, deux fossettes oblongues et profondes.

Nous croyons devoir également mentionner un exemplaire immature de l'*hypogaeus* dont les élytres sont légèrement tronqués au sommet.

Enfin, le profil des élytres est extrêmement variable en largeur et en longueur, sans que les proportions générales soient sensiblement modifiées, sauf chez de rares exemplaires larges dont le sommet des élytres passe de l'ogive à l'ellipse. Ces fluctuations, indéfinissables comme caractères, sont communes à toutes les espèces.

L. Delarouzei (fig. 433)

C. Bris., Ann. Soc. ent. Fr., 1861, p. 597, 1863, pl. 1, f. 7. — Reitter et Simon, Deuts. ent. Zeits., 1881, p. 153, pl. 4, f. 4. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 585; sep., p. 145; trad., L'Abeille, XXI, p. 197.

nemoralis Reitter et Simon, Deuts. ent. Zeits., 1881, p. 151, pl. IV, f. 2. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 584; sep., p. 144; trad., L'Abeille, XXI, p. 197. — Fiori, Nat. sic., 1894, XIII, p. 230. — Ganglb., Käf. v. Mitteleur., III, 1^{re} part., p. 62.

hypogaeus Baudi, Berl. ent. Zeits., 1869, p. 418.

Baudii Reitter, Deuts. ent. Zeits., 1881, p. 151.

Grenieri Sauley, Deuts. ent. Zeits., 1881, p. 152, pl. IV, f. 3. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 584; sep., p. 144; trad., L'Abeille, XXI, p. 197.

sublaevis Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 585; sep., p. 145; trad., L'Abeille XXI, p. 197. — Fiori, Nat. sic., 1894, XIII, p. 230. — Ganglb., Käfer v. Mitteleur., 1899, III, 1^{re} part., p. 63.

Taille moyenne, parfois fine, très variable, rouge jaune ou testacé. Yeux très petits ou nuls.

Exactement conformé comme *L. hypogaeus*, mais plus pâle et plus élancé, presque toujours aplati, mais parfois bombé, le plus souvent à points visibles, mais quelquefois entièrement lisse. Jamais les plus grands exemplaires n'atteignent les plus petits *hypogaeus*. Parmi tous ceux qui nous sont passés sous les yeux, pas un ne possédait de poils

élytraux; mais la plupart avaient le poil suboculaire et le poil basal de la tête.

Le prothorax n'offre aucune particularité, si ce n'est qu'il est généralement raboteux.

Les élytres sont plus étroites que chez *hypogaeus*, et les stries plus obsolètes; souvent même elles sont indistinctes. Chez les exemplaires les plus caractérisés, le rang de points juxtasutural est droit, court et commence au quart antérieur pour finir au tiers postérieur de l'élytre. Le 2^e est légèrement cintré en dedans et part de l'écusson pour s'éteindre un peu plus loin que le 1^{er}; le 3^e, à peine plus écarté, n'est perceptible que chez de rares exemplaires.

Métasternum ♂ plat, à peine déprimé (?).

OBSERVATIONS. — Cette espèce est particulière aux côtes méditerranéennes corses, françaises et liguriennes, de Gênes à Collioure. Il a été capturé dans les Pyrénées-Orientales; sous des pierres profondément enfoncées, de même en Corse. A Nice, on le prend dans les détritux végétaux au pied des Oliviers et vieux arbres, etc.

Nous possédons 14 types de *Delarouzei*, dont 9 de la coll. Saulcy et 5 de la coll. Reitter, 27 *Grenieri*, 16 *sublaevis* et *laevis*, et l'unique exemplaire de *nemoralis* de la coll. Reitter. Il nous est passé, en outre, sous les yeux, de nombreuses communications, notamment les 2 *nemoralis* de M. Baudi.

L'examen approfondi de tous ces types nous a permis de constater que chez les exemplaires de Nice les points sont toujours très fins, parfois nuls, parfois aussi nettement marqués. Leurs lignes semblent ne se confondre jamais (*sublaevis* et *laevis* Rtr.).

Les types de *nemoralis* ont les 2 premières lignes de points bien marquées, plus qu'aucun niçois.

Les *Grenieri* de Corse offrent des exemplaires à ponctuation complètement obsolète et d'autres bien marqués, à lignes bien distinctes.

Viennent enfin les *Delarouzei* des Pyrénées-Orientales. Ils sont généralement plus rouges, et offrent cette particularité que, à part quelques exemplaires imponctués, les points sont très fins, mais nets et bien visibles, même parfois à la 3^e rangée. Les deux 1^{res} sont très rapprochées, et, comme les points sont très irréguliers, elles semblent se confondre, surtout à la base. Mais deux exemplaires (1 de la coll. Saulcy, Banyuls et l'autre de la coll. Reitter, Pyr.-Orient. [Nou]) offrent les deux premiers rangs de points plus gros, très nets, réguliers, toujours maintenus à une distance régulière, en un mot, la représentation exacte du *nemoralis* dont il est impossible de les séparer.

Les *Delarouzei* n'ont point d'yeux, les *sublaevis* n'en ont pas non plus ou en ont d'imperceptibles, les *Grenieri* en ont d'extrêmement petits, le *nemoralis* en a de bien visibles. Mais ce ne sont que de petites taches et nous avons vu que cet organe est très variable chez *hypogaeus*.

Tous ces insectes, pour nous, appartiennent à une espèce unique; il est impossible de les séparer autrement qu'en les déterminant sur la provenance.

L. Coquereli (fig. 438, 439 et 440)

Fairm., Ann. Soc. ent. Fr., 1855, p. 527, pl. 2, f. 1. — Reitter et Simon, Deuts. ent. Zeits., 1881, p. 158, pl. IV, f. 8. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 585; sep., p. 145; trad., L'Abeille XXI, p. 198.

Stussineri Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 220; 1881, p. 585; sep., p. 145; trad., L'Abeille, p. 198. — Reitter et Simon, Deuts. ent. Zeits., 1881, p. 159, pl. V, f. 1. — Ganglb., Käfer Mitteleur., 1899, III, 1^{re} p., p. 63.

bisetosus Reitter, Deuts. ent. Zeits., 1884, p. 116. — Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1884, p. 93.

var. *bipunctatus* Reitter, Deuts. ent. Zeits., 1881, p. 157, pl. IV, f. 17. — Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 585; sep., p. 145; trad., L'Abeille, XXI, p. 198.

Taille grande, très variable de grandeur et de profil, très élancée ou massive; rouge brun souvent clair, tarses jaunes.

Tête comme *hypogaeus*, mais la gouttière centrale du vertex n'existe pas; elle est souvent remplacée par une dépression basale plus ou moins forte. Les 2 sillons sont moins arqués et plus rapprochés. La tête, ainsi que le prothorax, est parfois très finement ponctuée. Yeux très petits, noirs, souvent nuls.

Prothorax cordiforme, sa plus grande largeur vers le $\frac{1}{3}$ ant., le haut en ogive arrondie, ovoïde, arrivant très rarement au plein cintre, jamais à l'ellipse. Il est très étranglé dans le bas; angles postérieurs émoussés; bombé surtout à la base, très lisse et très brillant.

Élytres en ovale régulier, leur plus grande largeur au milieu, par conséquent; régulièrement bombés, mais parfois un peu aplatis et la suture alors saillante. Ils sont sillonnés de 4 rangs de points, les trois 1^{ers} discoïdaux, nets et profonds en haut et s'atténuant progressivement pour s'éteindre au sommet. Chez la plupart des exemplaires, ils ne dépassent guère le $\frac{1}{4}$ postérieur, mais chez certains, on peut

les suivre presque jusqu'au sommet. Le 1^{er} juxtasutural, droit, presque noyé dans une strie plus ou moins profonde; le 2^e, régulier, peu écarté, cintré en dedans, rejoint le 1^{er} aux deux bouts, sans toucher la base; le 3^e, un peu plus écarté et plus cintré, moins régulier, longe en dedans la déclivité discoïdale, part de la base même, sans toucher les deux premiers, mais les rejoint au sommet; le 4^e part de l'épaule, suit l'arête discoïdale jusque vers le milieu de l'élytre où il disparaît. Plus les rangs de points s'éloignent de la suture, plus ils s'atténuent; le 4^e est obsolète.

OBSERVATIONS. — Parfois la suture est profondément enfoncée au-dessous de l'écusson. Parfois les premiers points des deux premiers rangs se confondent en un seul, très gros et très profond (*bipunctatus*). Mais ce caractère est purement accidentel. Il est assez fréquent chez le *L. Emeryi*. Le type de la baie de Beïkos offre cette particularité que les rangées de points sont très nets sur l'élytre gauche, tandis que sur l'autre les 2^e et 3^e sont très irréguliers, le 2^e surtout, principalement en haut.

Patrie : Dalmatie, Grèce, Turquie. Le Dr Coquerel trouva le type unique du *Coquereli*, sur le sable, dans la baie de Beïkos, près de Constantinople (de Sauley).

Aucun caractère ne sépare les autres espèces du type.

L. Simoni (fig. 434 et 436)

Stussiner, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1880, p. 499. — Reitter et Simon, Deuts. ent. Zeits., 1881, p. 163, pl. V, f. 4. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 586; sep., p. 146; trad., L'Abeille, XXI, p. 199. — Ganglb., Käfer v. Mitteleur., 1899, III, 1^{re} part, p. 64.

Kaufmanni Reitter, Deuts. ent. Zeits., 1881, p. 162, pl. V, f. 3. — Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 586; sep., p. 146; trad., L'Abeille, XXI, p. 199.

var. *Emeryi* Simon, Deuts. ent. Zeits., 1881, p. 161, pl. V, f. 2. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 586; sep., p. 146; trad., L'Abeille, XXI, p. 199.

Taille moyenne, variable, rouge brun, parfois clair.

Tête comme celle de *L. hypogaeus*, mais la gouttière médiane du vertex n'apparaît que rarement et souvent est remplacée par une dépression basale quelquefois double.

Prothorax cordiforme, lisse, assez brillant, mais légèrement raboteux. Il affecte généralement en haut le plein cintre, a les côtés à peu

près réguliers; sa plus grande largeur est du $\frac{1}{4}$ ant. au milieu. La base est relativement peu étranglée, les angles mousses et peu marqués. On y remarque parfois des fossettes plus ou moins obsolètes.

Élytres en ovale régulier, plutôt larges et moins acuminés que les espèces du groupe suivant. Ils sont plats et sillonnés de 4 rangs de points réguliers, exactement disposés comme chez *L. Coquereli* et expirant vers le $\frac{1}{4}$ postérieur. Quand ils atteignent le sommet de l'élytre, ils se rejoignent; mais, comme chez *L. Coquereli*, ce fait est excessivement rare.

Cette espèce, en somme, ne diffère de la précédente que par sa taille, sa couleur plus claire et ses rangs de points moins gros et moins profonds. Il faut noter également que la 5^e strie subdiscoidale est bien rarement perceptible, tandis qu'elle l'est presque toujours chez *L. Coquereli*. Le *L. turcicus* (iné.) sert de passage comme taille. Il ne dépasse pas l'*Emeryi*.

Var. EMERYI.

Taille petite, variable, brun clair ou testacé.

Cette variété est de tous points conforme au type. Mais elle est plus petite et les plus grands exemplaires atteignent rarement les plus petits *Simoni*.

Un des 2 types du *Kauffmanni* Rtt., cependant, s'éloigne sensiblement de l'autre. Il est rouge brun, presque double de son congénère et dépasse la taille des petits *Emeryi*. Il est plus bombé, ce qui prouve encore l'extrême mobilité des caractères de tout le genre.

Une des raisons qui démontrerait la fragilité de cette espèce, c'est que, dans la coll. de l'auteur, M. Stussiner, se trouvent 3 exempl. du *L. Simoni*. Le 1^{er}, le plus gros, porte l'étiquette de l'auteur : *L. Simoni*; mais une 2^e porte, de la main de M. de Saulcy, le nom : *L. Emeryi*. Or ce dernier n'est pas l'auteur de *L. Emeryi*. Il a donc été simplement consulté. Cet exempl. est de Naples.

Le 2^e est de Pola (Istrie). Il est plus petit et porte également deux étiquettes : *L. Simoni* Stuss. n. sp. et *L. cenideis* Stuss. (iné.).

Le 3^e porte une seule étiquette : *L. cenideis* Stuss. n. sp.

Nous nous trouvons évidemment en présence de deux races, et même peut-être de trois races d'une même espèce.

L. lapidarius

Reitt., Deuts. ent. Zeits., 1881, p. 164. — Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 586; sep., p. 146; trad., L'Abeille, XXI, p. 199.

Petit, déprimé, roux testacé, brillant.

Articles 3-8 des antennes fortement transverses, 9^e faiblement, 10^e aussi long que large. Tête de la largeur du prothorax, très finement à peine visiblement ponctuée; plus de deux fois plus large que longue; les côtés, à partir des yeux, modérément arrondis, rétrécis. Macule oculaire petite, ronde, visible, avec des traces de fossettes; à leur bord inférieur une fossette punctiforme sans poil.

Prothorax à peine plus long que large, ovale, poli, non ponctué.

Élytres elliptiques, plus courts et plus larges que chez *Simoni*, dans le milieu plus larges que le prothorax et vers le sommet progressivement et modérément arrondis, environ deux fois aussi longs que larges ensemble, déprimés, avec une ponctuation identique à celle de *L. Simoni*, seulement un peu plus profonde que celle-ci sur les côtés. Fémurs modérément épaissis en massue.

Asie Mineure : Brousse.

L'auteur n'a pas vu le type de cette espèce.

L. syriacus (fig. 441 et 442)

Simon, Deuts. ent. Zeits., 1881, p. 156, pl. IV, f. 6. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 585; sep., p. 145; trad., L'Abeille XXI, p. 198.

Var. *striatus* Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1884, p. 94.

Taille grande, variable, rouge brun brillant, parfois clair (immature), palpes et tarses jaunes.

Tête comme *hypogaeus*, sauf que les baies externes sont énormes et très profondes. Yeux très petits, noirs.

Prothorax ovoïde, moins cordiforme que le *Coquereli*; côtés plus arqués, la plus grande largeur du 1/4 ant. au milieu; moins étranglé à la base où il est très bombé et où on distingue 2 petites fovéoles très obsolètes.

Élytres en ovale régulier, mais toujours aplatis, la suture saillante au sommet. Ils possèdent 4 stries supérieures (la 5^e subdiscoïdale) : la 1^{re} juxta-suturale, composée de points réguliers, gros et profonds surtout à la base, est très enfoncée surtout au milieu; au sommet, elle s'écarte de la suture. La 2^e, moins profonde, arquée, convergente, rejoint la 1^{re} avant la base, sous l'écusson, mais la suit, jusqu'au sommet, sans l'atteindre. La 3^e, moins profonde également que la première, arquée, convergente, commence à la base de l'élytre et suit la 2^e jusqu'au sommet. La 4^e est arquée, mais divergente, composée de 6 à 8 points bien marqués, aplatie, commence à quelque distance de

la base, en arrière de l'épaule et meurt au milieu même de l'élytre. Elle se confond aux deux extrémités avec la 5^e, la subdiscoidale. Toutes ces rangées s'atténuent au sommet et se distinguent difficilement après le dernier quart.

Patrie : Syrie.

Var. QUADRISTRIATUS.

Taille moyenne, exactement conformé comme *syriacus*. Mais il semble toujours plus petit. Cependant les grands exemplaires de *L. 4-striatus* sont de même taille que les petits *syriacus*. Nous n'hésiterions pas un instant à réunir ces deux espèces si les caractères de la tête n'offraient une différence assez notable et constante.

Tous les *L. syriacus* ont la tête plus large. Leurs antennes sont proportionnellement moins écartées. Il en résulte que les baies externes sont aussi larges que la médiane intra-antennaire, et très profondes, un peu biaises. Chez *L. 4-striatus*, au contraire, toujours elles sont plus petites que chez la médiane. Les antennes paraissent donc relativement plus écartées. Quant au crâne et au vertex, ils sont d'une mobilité extraordinaire, tantôt plats, tantôt profondément creusés, chez les deux espèces, quelquefois même bisillonnés ou bifovéolés. Pas un ne se ressemble exactement.

Mais parmi les innommés de la coll. de Sauley figurent deux *Leptomastax* du mont Garizin, collés sur le même carton. L'un très grand, à tête large, l'autre beaucoup plus petit, de la taille des *4-striatus*. Or ce dernier sert de passage. Il a la tête et les baies externes moins larges que les *syriacus* et cependant un peu plus encore que les *4-striatus*. Il est impossible de l'attribuer scientifiquement à l'une plutôt qu'à l'autre espèce. Nous l'avons placé entre les deux.

Pour nous le *L. quadristriatus* est une variété de *L. syriacus*.

CATALOGUE DES LEPTOMASTAX.

<i>grandis</i> Rtrr.	I.	<i>Kiesenwetteri</i> Simon	Gr.
<i>hypogaeus</i> Pirazz.	I. A. D.	<i>bisetosus</i> Rtrr.	Gr.
<i>menadiensis</i> Friv.	I.	<i>v. bipunctatus</i> Rtrr.	Gr.
<i>v. Raymondi</i> Sauley	Ga. m.	<i>Simoni</i> Stuss.	D. Gr.
<i>Delarouzei</i> Bris.	P.-Or., Ligurie.	<i>Kauffmanni</i> Reitr.	Gr.
<i>Grenieri</i> Sauley	C. S.	<i>v. Emeryi</i> Simon	I.
<i>sublaevis</i> Rtrr.	Alp.-Mar.	<i>lapidarius</i> Rtrr.	As. Min.
<i>Coquereli</i> Fairm.	T. baie de Beïkos	<i>syriacus</i> Rtrr.	Syr.
<i>Stussineri</i> Rtrr.	D.	<i>v. 4-striatus</i> Rtrr.	Syr.

Gen. **Ablepton**

Frivaldszky, Termesz. Füz., I, 1877, p. 47. — Heyd., Deuts. ent. Zeits., 1877, p. 429. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 544; sep., p. 104; trad., L'Abeille, XXI, p. 133. — Ganglb., Käfer v. Mitteleur., III, 1^{re} p., p. 64.

Genre très voisin des *Leptomastax*; distinct par la structure des parties de la bouche, la conformation des antennes et la pubescence du corps.

Antennes assez épaisses, grossissant lentement et progressivement vers l'extrémité; insérées sur le front, peu écartées à la base. 1^{er} article allongé, subcylindrique; 2^e inséré sur le côté supérieur de l'extrémité du 1^{er}, pouvant se replier dans une courte échancrure, plus long que large; 3^e sensiblement aussi long que large; 4^e à 10^e plus ou moins transverses; 10^e oblong, un peu plus long que large. Tête orbiculaire, petite, portée sur un cou distinct, yeux rudimentaires; dernier article des palpes maxillaires ovale, relativement très épais. Mandibules normales. Prothorax en trapèze renversé, fortement arrondi aux angles antérieurs, sans fossettes à la base. Élytres ponctués-striés. Corps pubescent. Mésosternum caréné. Hanches intermédiaires rapprochées; postérieures distantes. Pattes de longueur moyenne.

Ce genre ne comprend qu'une seule espèce originaire du sud du Banat.

A. Treforti (fig. 451)

Friv., Term. Füz., I, 1877, 18, pl. 1, f. 1. — Heyden, Deuts. ent. Zeits., 1877, p. 429. — Reitter, Ent. Zeit., 1881, pl. V, f. 6. — Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 586; sep., p. 200; trad., L'Abeille, XXI, p. 200. — Ganglb., Käfer v. Mitteleur., 1889, III, 1^{re} p., p. 64.

Roux jaunâtre, couvert d'une pubescence très courte et très fine sur la tête et le prothorax, plus longue, plus forte et plus couchée sur les élytres. Tête orbiculaire, environ de moitié plus étroite que le prothorax, longitudinalement impressionnée dans la partie antérieure, présentant deux points pilifères à la base. Prothorax en trapèze renversé, très largement arrondi aux angles postérieurs, assez densément et assez distinctement ponctué. Élytres déprimés sur le disque, chacun avec quatre stries ponctuées de gros points; la 1^{re} suturale presque entière, la 2^e et la 3^e raccourcies au sommet, la 4^e très courte, intervalles des stries avec une fine ligne de points peu régulière.

• Sud du Banat.

Gen. **Mastigus**

Latreille, Gen. Crust. Ins., I, p. 280. — Lacordaire, Gen. Col., II, p. 189. — Jacq. Duval, Gen. Col. d'Eur., p. 219. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 544; sep., p. 104; trad., L'Abeille, XXI, p. 134. — Ganglb., 1899, Käfer v. Mitteleur., III, 1^{re} part., p. 65.

Ce genre, établi par Latreille, comprend quelques espèces réparties dans l'Europe méridionale et l'Afrique australe. Il se caractérise plus particulièrement par la structure des antennes qui sont insérés sur le front, coudées en arrière à partir du 1^{er} article et ne présentent pas de massue distincte. De plus, chez les *Mastigus*, le mésosternum est simple, les hanches postérieures sont éloignées, enfin les palpes maxillaires sont très longs, le premier article est petit et court, le 2^e très allongé, arqué, épaissi vers le sommet, le troisième plus court, obconique et le dernier assez grand, épaissi, ovulaire; les palpes latéraux sont courts, robustes, velus, leur premier article est court, obconique, le 2^e très grand et très épais, le dernier très petit, très grêle, subulé. Les mandibules sont normales, profondément bifides. Les élytres sont ovales, convexes; les ailes sont nulles. Les pattes sont très longues et grêles.

Ces insectes semblent vivre en colonies souvent très nombreuses. Le *M. ruficornis* Motsch. se prend parfois dans les montagnes du Piémont et des Alpes-Maritimes, en nombre considérable, courant sur les feuilles mortes autour du pied des Noisetiers (Chartreuse de Pesio). Rien n'est plus curieux que de voir ces insectes sortir de terre et courir en légions innombrables.

TABEAU DES MASTIGUS.

1. Pubescence des élytres double, comprenant de longs poils dressés, entremêlés à la pubescence ordinaire..... **pilifer** Kr.
- Pubescence simple..... 2.
2. Élytres très nettement arrondis séparément au sommet; pas de dépression concave le long de la base du prothorax.... 3.
- Élytres acuminés ensemble au sommet; une dépression concave le long de la base du prothorax..... 4.
3. Pubescence fine, peu dense; élytres sans sillon juxta-sutural; un court sillon longitudinal à la base du prothorax. — Piémont, Alpes-Maritimes, Italie méridionale.. **ruficornis** Motsch.

— Pubescence plus dense, moins fine; un léger sillon sutural; pas de court sillon à la base du prothorax. **dalmatinus** Heyd.

4. Prothorax nettement plus long que large; sillon basal de la tête ponctué, pas plus brillant que le reste; taille relativement grande. — Italie méridionale..... **Heydeni** Rott.

— Prothorax nettement pas plus long que large..... 5.

5. Sillon basal de la tête profond, lisse. — Espagne et Portugal.
..... **prolongatus** Gory.

— Sillon basal de la tête profond, pas lisse. — Espagne. **palpalis** Latr.

M. pilifer (fig. 454)

Kraatz, Deuts. ent. Zeits., 1879, p. 371. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 586; sep., p. 146; trad., L'Abeille, XXI, p. 200.

Noir; antennes, palpes et pieds noir de poix, pubescence gris cendré, entremêlée de longs poils dressés. Tête profondément sillonnée sur l'occiput, sillon s'élargissant en avant, bifurqué en avant et enfermant un lobe convexe. Prothorax plus large que la tête, un peu plus long que large, largement et vaguement impressionné devant l'écusson. Élytres acuminés ensemble au sommet, plus fortement chez les mâles que chez les femelles. -- 6 mill. à 6 mill. 1/2.

Naples, Calabre.

M. Heydeni (fig. 457)

Rottenb., Berliner ent. Zeits., 1870, p. 233. — Heyd., Deuts. ent. Zeits., 1879, p. 370. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 587; sep., p. 147; trad., L'Abeille, p. 200.

Noir, antennes, palpes et pattes noir de poix, pubescence grise, pas très serrée, laissant très visible le tégument. Tête profondément sillonnée jusqu'au niveau des yeux, s'élargissant entre la naissance des antennes et formant un espace subtriangulaire presque déprimé, non brillant. Prothorax plus long que large, en général subcaréné dans la longueur, très nettement sillonné devant la base. Élytres acuminés ensemble au sommet, plus chez le mâle que chez la femelle. Ponctuation très fine et très dense entremêlée de quelques points plus forts. — Long. 6 mill.

Naples, Calabre.

M. prolongatus (fig. 453)

Gory, Revue zool., 1839, p. 328. — Heyden, Deuts. ent. Zeits., 1879,

p. 369. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 587; sep., p. 147; trad., L'Abeille, XXI, p. 201.

acuminatus Motsch. ♀, Etud. ent., VIII, 1859, p. 131.

Noir; antennes, palpes et pattes noir de poix, pubescence grise, très fine, très peu serrée, laissant bien visible le tégument. Tête allongée, sillon occipital de la tête profond, lisse et brillant au fond, se terminant entre les bases des antennes en un espace triangulaire, subconcave. Prothorax à peine plus long que large; impressionné transversalement devant la base; au milieu de cette impression une très courte strie longitudinale et de chaque côté deux petites impressions ponctiformes. Élytres acuminés ensemble au sommet, plus fortement chez le mâle que chez la femelle; ponctuation fine, pas très dense, entremêlée de points plus forts beaucoup plus nombreux que chez *M. Heydeni*. — Long. 7 mill.

Espagne et Portugal.

M. palpalis (fig. 452)

Latr., Gen. Crust. et Ins., I, p. 201, pl. 8, f. 5. — Klug, Entomol., p. 165. — Heyden, Deuts. ent. Zeits., 1879, p. 369. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 587; sep., p. 147; trad., L'Abeille, XXI, p. 201.

acuminatus Motsch. ♂, Etud. ent., 1859, VIII, p. 131.

Noir; antennes, palpes et pattes noir de poix; pubescence grise, cendrée, courte, ne masquant pas la couleur du tégument. Tête plus longue que large; sillon occipital court, s'élargissant avant le niveau des yeux, enfermant en avant un espace triangulaire longitudinalement subcaréné, non lisse. Prothorax à peine plus long que large; finement strié dans la longueur, non impressionné devant la base, avec une impression ponctiforme de chaque côté. Élytres faiblement acuminés au sommet chez le mâle et encore moins fortement chez la femelle, pas très densément ponctués avec mélange de quelques points plus forts. — Long. 5 mill.

Espagne.

M. dalmatinus (fig. 456)

Heyd., Deuts. ent. Zeits., 1879, p. 370. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien., 1881, p. 587; sep., p. 147; traduct., L'Abeille, XXI, p. 201. — Ganglb., Käfer v. Mitteleur., 1899, III, 1^{re} part., p. 66.

Noir; antennes, palpes et pattes brun de poix; pubescence grise,

fine, plus serrée que chez *M. ruficornis*. Tête suborbiculaire; sillon occipital pas profond, enfermant en avant dans la partie élargie un espace triangulaire subdéprimé. Prothorax à peine plus long que large, sans sillon transversal le long de la base; au milieu de celle-ci, une fine strie longitudinale atteignant environ le tiers de la longueur, et de chaque côté une vague impression ponctiforme. Élytres séparément et largement arrondis au sommet, finement ponctués avec quelques points plus forts disposés en lignes peu régulières.

Dalmatie, Istrie.

Les exemplaires provenant de Naples signalés par v. Heyden, seraient plutôt, d'après Ganglbauer, des variétés de *M. ruficornis* Motsch.

***M. ruficornis* (fig. 455)**

Motsch., Etud. ent., VIII, 1859, p. 132. — Heyden, Deuts. ent. Zeits., 1859, p. 371. — Reitter, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1881, p. 587; sep., p. 147; trad., L'Abeille, XXI, p. 201. — Ganglb., Käfer v. Mitteleur., III, 1^{re} part., p. 66.

liguricus Fairm., Ann. Soc. ent. Fr., 1859, Bull., p. ccxvi.

Noir avec un très faible reflet bleuâtre; antennes, palpes et pattes roux de poix; pubescence gris cendré, très fine, peu serrée, laissant bien visible la couleur du tégument. Tête suborbiculaire; sillon occipital large, profond, non lisse, enfermant en avant un espace subtriangulaire, longitudinalement subcaréné. Prothorax plus long que large, longitudinalement subcaréné, sans impression le long de la base, avec une très courte strie longitudinale au milieu et de chaque côté une impression ponctiforme. Élytres arrondis séparément au sommet, densément ponctués avec quelques vestiges de points plus gros disposés plus ou moins en lignes. — Long. 4,5 à 5 mill.

Alpes-Maritimes, Piémont, Italie méridionale.

CATALOGUE DES MASTIGUS.

<i>palpalis</i> Latr.	Espagne.
<i>acuminatus</i> Motsch. ♂.	
<i>pilifer</i> Kraatz.	Italie méridionale.
<i>Heydeni</i> Rottenb.	id.
<i>prolongatus</i> Gory.	Espagne et Portugal.
<i>acuminatus</i> Motsch. ♀.	
<i>dalmatinus</i> Heyd.	Dalmatie, Istrie.
<i>ruficornis</i> Motsch.	Alpes-Maritimes, Piémont, Naples.
<i>liguricus</i> Fairm.	Alpes-Maritimes.

Explication des planches XIX à XLVIII

(Annales 1897, 1898, 1900).

PLANCHE XIX (vol. LXVI, pl. 12). — *Cyrtoscydmus Godarti*, fig. 211. — *C. aegialius*, fig. 212; dessous, fig. 213. — *C. dichrous*, fig. 214. — *C. amplithorax*, fig. 215. — *C. Damryi*, fig. 216. — *C. Mesmini*, fig. 217. — *C. semipiceus*, fig. 218. — *C. exilis*, fig. 219.

PLANCHE XX (vol. LXVI, pl. 13). — *Cyrtoscydmus collaris*, fig. 220. — *C. Kunzei*, fig. 221. — *C. angustatus*, fig. 222. — *C. frater*, fig. 223. — *C. angustior*, fig. 224. — *C. lusitanicus*, fig. 225. — *C. Ehlersi*, fig. 226. — *C. tithonus*, fig. 227. — *C. Fairmairei*, fig. 228.

PLANCHE XXI (vol. LXVI, pl. 14). — *Cyrtoscydmus macedo*, fig. 229. — *C. successor*, fig. 230. — *C. subtilis*, fig. 231. — *C. Helfer*, fig. 232. — *C. Barnevillei*, fig. 233. — *C. scutellaris*, fig. 234. — *C. cribrum*, fig. 235. — *C. pusillus*, fig. 236. — *C. Kamberkyi*, fig. 237.

PLANCHE XXII (vol. LXVI, pl. 15). — *Cyrtoscydmus Damryi*, fig. 238. — *C. protervus*, fig. 239. — *C. truncatus*, fig. 240. — *C. andalusiacus*, fig. 241. — *C. Achillei*, fig. 242. — *C. angulimanus*, fig. 243. — *C. Appli*, fig. 244. — *C. lustrator*, fig. 245. — *C. Saulcyi*, fig. 246.

PLANCHE XXIII (vol. LXVI, pl. 16). — *Cyrtoscydmus microphthalmus*, fig. 247. — *C. ventricosus*, fig. 248. — *C. leptoderus*, fig. 249. — *C. filum*, fig. 250. — *C. lernaeus*, fig. 251. — *C. picipennis*, fig. 252. — *C. Revelierei*, fig. 253. — *C. corcyreus*, fig. 254.

PLANCHE XXIV (vol. LXVII, [pl. 4]). — *Euconnus nanus*, fig. 256 et 256 bis. — *E. claviger*, fig. 257. — *E. barbatulus*, fig. 258. — *E. chrysocomus*, fig. 263. — *E. Saulcyanus*, fig. 264; antennes, fig. 265 et 266. — *E. denticornis*, fig. 267.

PLANCHE XXV (vol. LXVII, pl. 5). — *Euconnus cornutus*, fig. 259. — *E. Maeklini*, fig. 260. — *E. indocilis*, fig. 261. — *E. Pharaonis*, fig. 262. — *E. similis*, fig. 268.

PLANCHE XXVI (vol. LXVII, pl. 6.) — *Euconnus*; antennes, fig. 269, 272, 273, 274, 275, 276; tête, fig. 270; palpe, 271. — *E. Motschulskyi* ♀, fig. 277. — *E. Motschulskyi* ♂, fig. 278.

PLANCHE XXVII (vol. LXVII, pl. 7.) — *Euconnus pulcher*, fig. 279. — *E. puniceus*, fig. 280 et 281. — *E. nebulosus*, fig. 282. — *E. hospes*, fig. 283. — *E. lusitanicus*, fig. 284.

PLANCHE XXVIII (vol. LXVII, pl. 8). — *Euconnus robustus*, fig. 285. — *E. Schlosseri*, fig. 286. — *E. Paulinoi*, fig. 287. — *E. Heydeni*, fig. 288; antennes, fig. 289, 290, 291, 292.

PLANCHE XXIX (vol. LXVII, fig. 9). — *Euconnus promptus*, fig. 293. — *E. spissicornis*, fig. 294; antennes, fig. 296, 297, 298, 299. — *E. Ganglbaueri*, fig. 300. — *E. Alcides*, fig. 301. — *E. Leveillei*, fig. 302.

PLANCHE XXX (vol. LXVII, pl. 10). — *Euconnus*; antennes, fig. 303, 304, 305, 306, 307, 308. — *E. Koziorowiczzi*, fig. 309. — *E. eurygaster*, fig. 310. — *E. Ferrarii*, fig. 311. — *E. Loewi*, fig. 312. — *E. Skalitzyi*, fig. 313.

PLANCHE XXXI (vol. LXVII, pl. 11). — *Euconnus Guillebeaui*, fig. 314. — *E. Fauveli*, p. 315. — *E. subterraneus*, fig. 316. — *E. cruentulus*, fig. 317. — *E. demissus*, fig. 318. — *E. Sauleyi*, fig. 319. — *E. hirticollis*, fig. 320 et 321.

PLANCHE XXXII (vol. LXVII, pl. 12). — *Euconnus*; antennes, fig. 323, 324, 325, 326, 327. — *E. intrusus*, fig. 328. — *E. Wetterhali*, 329. — *E. pyrenaeus*, fig. 330. — *E. Peyroni*, fig. 331, 332. — *E. africanus*, fig. 333.

PLANCHE XXXIII (vol. LXVII, pl. 13). — *Euconnus turcomanus*, fig. 334. — *E. Kraatzi*, fig. 335. — *E. Emgei*, fig. 336. — *E. Regimbarti*, fig. 337; antennes, fig. 338 à 342; dessous, fig. 343 à 349.

PLANCHE XXXIV (vol. LXVII, pl. 14). — *Tetramelus nikitanus*, fig. 357. — *T. oblongus*, fig. 358. — *T. Pandellei*, fig. 359. — *T. Gredleri*, fig. 360. — *T. Bedeli*, fig. 361. — *T. pravus*, fig. 362.

PLANCHE XXXV (vol. LXVII, pl. 15). — *Tetramelus pubicollis*, fig. 363. — *T. laticeps*, fig. 364. — *T. navaricus*, fig. 365. — *T. Piochardi*, fig. 366. — *T. distinguendus*, fig. 367. — *T. Schiodtei*, fig. 368.

PLANCHE XXXVI (vol. LXVII, pl. 18). — *Tetramelus dorotkanus*, fig. 369. — *T. argostolius*, fig. 370. — *T. Reitteri*, fig. 371. — *T. Thomayi*, fig. 372. — *T. longulus*, fig. 373. — *T. Kraussi*, fig. 374. — *T. Brenskeanus*, fig. 375. — *T. microcephalus*, fig. 376. — *T. transsylvanicus*, fig. 377.

PLANCHE XXXVII (vol. LXVII, pl. 19). — *Tetramelus haematodes*, fig. 378. — *T. Linderi*, fig. 379. — *T. Marthae*, fig. 380. — *T. haematicus*, fig. 381. — *T. Eppelsheimi*, fig. 383. — *T. Grouvellei*,

fig. 384. — *T. Argodi*, fig. 385. — *T. Simoni*, fig. 386. — *T. styriacus*, fig. 387.

PLANCHE XXXVIII (vol. LXIX, pl. 4). — *Scydmaenus tarsatus*, fig. 387. — *S. rufus*, fig. 388. — *S. spartanus*, fig. 389. — *S. Perrisi* ♂, fig. 390. — *S. Perrisi* ♀, fig. 391. — *S. Helwigi* ♂, fig. 392. — *S. Helwigi* ♀, fig. 393. — *S. cornutus* ♂, fig. 394. — *S. cornutus* ♀, fig. 395.

PLANCHE XXXIX (vol. LXIX, pl. 5.) — *Scydmaenus Olivieri*, fig. 396. — *S. Georgi*, fig. 397. — *S. punctatus*, fig. 398. — *S. punctipennis*, fig. 399. — *S. algericus*, fig. 400. — *S. vividus*, fig. 401. — *S. libertus*, fig. 407. — *S. longior*, fig. 408.

PLANCHE XL (vol. LXIX, pl. 6). — *Scydmaenus scaphium*, fig. 402. — *S. antilotus*, fig. 403. — *S. expansus*, fig. 404. — *S. sternalis*, fig. 405. — *S. approximans*, fig. 406; dessous, fig. 422; pattes, fig. 423 à 427.

PLANCHE XLI (vol. LXIX, pl. 7). — *Scydmaenus conspicuus*, fig. 409 et 410. — *S. hirtipennis*, fig. 411. — *S. nigripennis*, fig. 412. — *S. parvatus*, fig. 413. — *S. insidiosus*, fig. 414. — *S. algerinus*, fig. 415.

PLANCHE XLII (vol. LXIX, pl. 8). — *Scydmaenus camelus*, fig. 416 et 417. — *S. Goliath*, fig. 418. — *S. gigas*, fig. 419. — *S. Kraatzi*, fig. 420. — *S. arachnipes*, fig. 421.

PLANCHE XLIII (vol. LXIX, pl. 9). — *Eudesis Adela*, fig. 428. — *E. aglena*, fig. 429. — *E. sulcipennis*, fig. 430. — *Leptomastax Raymondi*, fig. 432. — *L. Grenieri*, fig. 423.

PLANCHE XLIV (vol. LXIX, pl. 10). — *Leptomastax grandis*, fig. 431. — *L. Emeryi*, fig. 434; dessous, fig. 435. — *L. Simoni*, fig. 436. — *L. bipunctatus*, fig. 437.

PLANCHE XLV (vol. LXIX, pl. 11). — *Leptomastax Coquevelli*, fig. 438. — *L. bipunctatus*, fig. 439. — *L. Stussineri*, fig. 440. — *L. syriacus*, fig. 441.

PLANCHE XLVI (vol. LXIX, pl. 12). — *Leptomastax t-striatus*, fig. 442; détails, 443 à 450. — *Ablepton Treforti*, fig. 451.

PLANCHE XLVII (vol. LXIX, pl. 13). — *Mastigus palpalis*, fig. 452. — *M. pilifer*, fig. 454. — *M. ruficornis*, fig. 455. — *M. dalmatinus*, fig. 456. — *M. Heydeni*, fig. 457.

PLANCHE XLVIII (vol. LXX, pl. 14). — *Mastigus prolongatus*, fig. 453; dessous, fig. 458.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES SCYDMAENIDAE (1)

<i>abbreviatella</i> Thoms., 1893.	234	<i>arachnipes</i> Reitt., 1900.	439
<i>abbreviatella</i> Er., 1893.	238	<i>aries</i> Saulcy, 1898.	447
<i>abditus</i> Coquer., 1898.	140	<i>Argodi</i> Croiss., 1893.	430
Ablepton , 1900.	156	<i>Argodi</i> Croiss., 1898.	455
<i>Achillei</i> Reitt., 1897.	422	<i>argostolius</i> Reitt., 1898.	452
<i>acuminatus</i> Mots., 1900.	159	<i>armeniicum</i> Reitt., 1893.	442
<i>Adelae</i> Dodero, 1894.	361	<i>asturicum</i> Reitt., 1893.	434
<i>Adela</i> Saulcy, 1900.	142	<i>asturiensis</i> Reitt., 1894.	388
<i>aedicerus</i> Saulcy, 1894.	388	<i>atlanticum</i> Croiss., 1893.	433
<i>aegialius</i> Reitt., 1897.	407	<i>atomarius</i> Saulcy, 1894.	389
<i>aequalis</i> Saulcy, 1894.	376	<i>atomarium</i> Croiss., 1893.	431
<i>africana</i> Saulcy, 1893.	235	Atropidus , 1894.	361
<i>africanus</i> Croiss., 1898.	141	<i>Aubei</i> Reitt., 1893.	436
<i>aglena</i> Reitt., 1900.	141	<i>austricum</i> Reitt., 1893.	430
<i>aglenum</i> Reitt., 1893.	432		
<i>albericum</i> Saulcy, 1893.	420	<i>balaena</i> Saulcy, 1894.	374
<i>Alcides</i> Saulcy, 1897.	128	<i>barbara</i> Saulcy, 1893.	235
<i>algesiranum</i> Reitt., 1893.	437	<i>barbatulus</i> Reitt., 1898.	215
<i>alginus</i> Reitt., 1900.	433	<i>Barnevillei</i> Reitt., 1897.	425
<i>amplithorax</i> Reitt., 1897.	413	<i>Baudii</i> Reitt., 1898.	440
<i>andalusiicus</i> Reitt., 1897.	421	<i>Baudii</i> Reitt., 1900.	449
<i>angulatus</i> Müll., 1894.	365	<i>Baulueri</i> Saulcy, 1894.	388
<i>angulimanus</i> Reitt., 1897.	426	<i>Bedeli</i> Reitt., 1898.	448
<i>angustatus</i> Luc., 1897.	414	<i>bicolor</i> Saulcy, 1893.	438
<i>angustior</i> Saulcy, 1897.	415	<i>bicolor</i> Denny, 1897.	412
<i>antennalis</i> Saulcy, 1894.	367	<i>bipunctatus</i> Reitt., 1900.	451
<i>Antoniae</i> Reitt., 1894.	371	<i>bisetosus</i> Reitt., 1900.	451
<i>apicale</i> Reitt., 1893.	435	<i>Bonnairi</i> Qued., 1893.	229
<i>Appli</i> Reitt., 1897.	424	<i>Brenskanus</i> Reitt., 1898.	452

(1) NOTA. — Les caractères gras indiquent les genres et sous-genres; les caractères ordinaires, les espèces admises par l'auteur; les noms en lettres italiques, les espèces tombées en synonymie.

Le nombre qui suit le nom de l'auteur renvoie à l'année des *Annales*, et le dernier nombre donne la page à consulter dans cette année.

<i>breviceps</i> Reitt., 1893.....	231	<i>cornutus</i> Mots., 1900.....	132
<i>Brucki</i> Reitt., 1894.....	395	<i>coronatus</i> Sahlb., 1894....	378
<i>bulgaricus</i> Reitt., 1894.....	394	<i>crassimanus</i> Reitt., 1897...	425
<i>caecum</i> Sauley, 1893.....	441	<i>cribrum</i> Croiss., 1893.....	421
<i>caecus</i> Reitt., 1894.....	378	<i>cribrum</i> Sauley, 1897.....	420
<i>camelus</i> Reitt., 1900.....	436	<i>croaticus</i> Hampe, 1897.....	412
<i>cantulicus</i> Fauv., 1894.....	376	<i>cruentulus</i> Reitt., 1898.....	433
<i>capellae</i> Reitt., 1894.....	376	Cyrtoscydmus , 1897.....	402
<i>carinatus</i> Muls., 1894.....	372	<i>Dalmanni</i> Gyll., 1897.....	408
<i>caristosus</i> Reitt., 1894.....	369	<i>dalmatinus</i> Heyd., 1900....	159
<i>carnicum</i> Reitt., 1893.....	430	<i>Damryi</i> Reitt., 1897.....	422
<i>carpaticum</i> Sauley, 1893...	429	<i>Delarouzei</i> Bris., 1898.....	153
<i>carrarae</i> Reitt., 1893.....	436	<i>Delarouzei</i> Bris., 1900....	149
<i>caucasicum</i> Sauley, 1893....	438	<i>delicatum</i> Reitt., 1893.....	432
<i>caviceps</i> Reitt., 1894.....	367	<i>delicatum</i> Reitt., 1893....	432
<i>caviceps</i> Croiss., 1894.....	373	<i>delphinus</i> Sauley, 1894....	365
Cephennarium , 1893.....	419	<i>demissus</i> Reitt., 1898.....	433
Cephennium , 1893.....	409	<i>densipilis</i> Croiss., 1897....	412
<i>cerastes</i> Baudi, 1900.....	432	<i>denticornis</i> Thoms., 1898...	115
<i>Chevrieri</i> Heer, 1897.....	408	<i>denticornis</i> Müll., 1898....	121
Chevrolatia , 1893.....	226	<i>depressulus</i> Reitt., 1894....	376
<i>chysocomus</i> Sauley, 1898...	414	<i>dichrous</i> Baudi, 1897.....	413
<i>clandestinus</i> Reitt., 1897....	420	<i>difficile</i> Reitt., 1893.....	426
<i>clandestinus</i> Schaum, 1894...	394	<i>Diocletianus</i> Reitt., 1894...	382
<i>clavata</i> Reitt., 1893.....	238	<i>distinctus</i> Tourn., 1894....	372
<i>clavicornis</i> Reitt., 1893....	237	<i>distinguendus</i> Sauley, 1898.	147
<i>claviger</i> Müll., 1898.....	115	<i>ditomum</i> Sauley, 1898.....	442
<i>claviger</i> Thoms., 1898.....	117	<i>ditomus</i> Reitt., 1897.....	428
<i>colchicus</i> Sauley, 1894....	374	<i>divergens</i> Reitt., 1893.....	420
<i>collaris</i> Muls., 1897.....	408	<i>Doderoi</i> Reitt., 1894.....	395
<i>compressum</i> Sauley, 1893...	434	<i>dorotkanus</i> Reitt., 1898....	152
<i>confusus</i> Bris., 1898.....	438	<i>dubium</i> Croiss., 1893.....	427
<i>conicicollis</i> Fairm., 1894...	352	<i>dubius</i> Reitt., 1894.....	394
<i>conifer</i> Fauv., 1894.....	378	<i>egregia</i> Reitt., 1893.....	230
<i>conspicuus</i> Schaum, 1900..	433	<i>Ehlersi</i> Reitt., 1897.....	415
<i>convexicollis</i> Reitt., 1897...	415	<i>ellipticus</i> Reitt., 1897.....	430
<i>Coquereli</i> Fairm., 1900....	451	<i>elongatulus</i> Müll., 1894....	370
<i>corcyreus</i> Reitt., 1897.....	427	<i>Emgei</i> Reitt., 1894.....	376
<i>cordubanus</i> Sauley, 1894...	388	<i>Emonae</i> Reitt., 1897.....	426
<i>cornutus</i> Sauley, 1898.....	416		

<i>Eppelsheimi</i> Croiss., 1898...	456	<i>globulipennis</i> Reitt., 1898...	448
Euconnoides , 1898.....	454	<i>glyptocephalus</i> Sauley, 1894...	372
Euconnus , 1898.....	406	Godarti Latr., 1897.....	407
Eudesis , 1900.....	441	Goliath Reitt., 1900.....	436
Eumicrus , 1900.....	416	<i>græcus</i> Croiss., 1897.....	409
<i>eurygaster</i> Sauley, 1898...	430	<i>granulum</i> Reitt., 1893.....	438
<i>euryponensis</i> Reitt., 1897...	427	<i>Gredleri</i> Sauley, 1897.....	425
Euthia , 1893.....	232	Gredleri Reitt., 1898.....	445
Euthiconus , 1894.....	351	<i>Grenieri</i> Sauley, 1900.....	149
<i>exilis</i> Er., 1897.....	412	Grouvellei Croiss., 1893...	231
<i>eximius</i> Reitt., 1894.....	366	<i>Grouvellei</i> Croiss., 1898...	438
<i>expansus</i> Reitt., 1900.....	434	Grouvellei Croiss., 1898...	457
<i>Fairmairei</i> Croiss., 1898...	409	<i>guadarranus</i> Sauley, 1894...	397
<i>Fauveli</i> Croiss., 1894.....	362	<i>guardannus</i> Reitt., 1897.....	421
<i>Fauveli</i> Croiss., 1898.....	435	Guillebaui Croiss., 1898...	436
<i>Feliciae</i> Reitt., 1894.....	374	<i>haematodes</i> Sauley, 1898...	454
<i>Ferrarii</i> Reitt., 1898.....	432	Helferi Schaum, 1897.....	425
<i>filicornis</i> Reitt., 1894.....	364	<i>helrolus</i> Schaum, 1894.....	388
<i>filum</i> Sauley, 1897.....	428	<i>Helwigi</i> Herbst, 1900.....	431
<i>finetarius</i> Chaud., 1898...	438	hematicus Fairm., 1898...	453
<i>Fiorii</i> Reitt., 1894.....	367	<i>Herrei</i> Bris., 1894.....	394
<i>Fluminii</i> Reitt., 1894.....	394	<i>Heydeni</i> Sauley, 1898.....	432
<i>flaveolus</i> Reitt., 1894.....	394	Heydeni Rottenb., 1900...	458
<i>flavicornis</i> Mots., 1897.....	425	<i>hirticollis</i> , 1898.....	438
<i>flavipes</i> Mots., 1893.....	238	<i>Hopfgarteni</i> Reitt., 1894...	388
<i>formicetorum</i> Reitt., 1893...	238	<i>hospes</i> Sauley, 1898.....	424
<i>forticornis</i> Sauley, 1894...	388	<i>humeralis</i> Sauley, 1894...	389
<i>fovangulum</i> Reitt., 1893....	439	<i>hungaricum</i> Reitt., 1881....	430
<i>frater</i> Reitt., 1897.....	417	<i>hypogeus</i> Pirazz., 1900....	447
<i>frondosus</i> Reitt., 1894.....	366	<i>hypogeus</i> Baudi, 1900....	449
<i>fronto</i> Croiss., 1894.....	390	<i>ibericum</i> Croiss., 1893.....	431
<i>fulvum</i> Schaum, 1893.....	440	<i>imperialis</i> Reitt., 1894....	379
<i>furtivus</i> Coq., 1897.....	421	<i>impressus</i> Sahlb., 1894....	365
<i>Ganglbaueri</i> Reitt., 1898....	423	<i>impuncticollis</i> Schauf., 1900.	428
<i>Geodytes</i> , 1893.....	449	<i>indocilis</i> Reitt., 1898.....	416
<i>Georgi</i> Reitt., 1900.....	434	<i>insignis</i> J. Duv., 1893.....	228
<i>georgicus</i> Sauley., 1894....	372	<i>insidiosus</i> Reitt., 1900....	433
<i>geticus</i> Sauley, 1894.....	394	<i>intermedium</i> Fairm., 1893.	424
<i>gibbulus</i> Schauf., 1897.....	405	<i>intermedius</i> Croiss., 1900..	438
		<i>judaicum</i> Sauley, 1893.....	438

Kamberskyi, 1897.....	425	<i>lusitanicus</i> Sauley, 1897...	445
Kiesenwetteri Aubé, 1893..	420	<i>lustrator</i> Reitt., 1897.....	424
<i>Kiesenwetteri</i> Kiesew., 1898.	419		
Korbi Reitt., 1894.....	366	macedo Reitt., 1897.....	414
Koziorowicz Croiss., 1898..	430	Macroderus , 1893.....	416
Kraatzi Reitt., 1898.....	458	Maeklini Mann., 1898.....	417
<i>Kraussi</i> Reitt., 1898.....	452	<i>majus</i> Reitt., 1893.....	422
Kunzei Géné, 1897.....	410	<i>maritimum</i> Reitt., 1893....	428
		maroccana Reitt., 1893.....	230
Langei Reitt., 1898.....	459	Margaritae Reitt., 1894.....	397
laticeps Sauley, 1898.....	447	<i>Marthae</i> Reitt., 1898.....	453
laeviceps Croiss., 1894.....	384	Mastigus , 1900.....	437
lantosquense Reitt., 1893..	425	megaloderoides Mots., 1893.	442
<i>latens</i> Sauley, 1894.....	394	Megaloderus , 1893.....	416
laticolle Aubé, 1893.....	422	mehadiensis Friw., 1900...	448
<i>latitans</i> Sauley, 1894.....	394	Merkli Simon, 1893.....	237
latum Mots., 1893.....	435	Mesmini Croiss., 1897.....	441
Lederianus Reitt., 1894....	368	microcephalus Reitt., 1898.	451
<i>Leprieuri</i> Sauley, 1894.....	390	microphthalmus Reitt., 1897.	418
<i>leptocerus</i> Reitt., 1894....	382	Microscydmus , 1898....	405
Leptocharis , 1897.....	404	<i>minimum</i> Reitt., 1893.....	441
Leptoderoides , 1897.....	404	minimus Chaud., 1898.....	405
leptoderus Reitt., 1897....	419	minutissimum Aubé, 1893..	444
lerneus Reitt., 1890.....	429	<i>minutus</i> Chaud., 1894.....	388
Leptomastax 1900.....	443	<i>minutus</i> Sahlb., 1898.....	408
lesinae Reitt., 1893.....	438	<i>montanum</i> Reitt., 1893....	429
<i>Leveillei</i> Croiss., 1898.....	429	<i>montenegrinum</i> Reitt., 1893.	429
<i>libertus</i> Reitt., 1900.....	434	Motschulskyi Sturm, 1898..	419
<i>liguricus</i> Croiss., 1894.....	372	<i>Mulsanti</i> Reitt., 1894.....	396
<i>liguricus</i> Fairm., 1900.....	460	<i>muscorum</i> Fairm., 1898....	453
<i>lilliputanus</i> Reitt., 1893...	438	<i>mycroglenes</i> Sauley, 1894...	396
<i>Linderi</i> Sauley, 1898.....	453	myrmecophilus Aubé, 1894.	396
linearis Mots., 1893.....	238	<i>mysticus</i> Sauley, 1894.....	396
Loewi Kiesenw., 1898.....	431		
longicollis Mots., 1894.....	383	Nanophthalmus 1893....	420
<i>longicollis</i> Muls., 1894.....	396	nanus Schaum, 1898.....	405
longipilis Croiss., 1894.....	377	Napocrus , 1898.....	413
<i>longulus</i> Halbh., 1898.....	452	<i>nakeralae</i> Reitt., 1894.....	374
<i>Lostiae</i> Dodero, 1893.....	348	<i>navaricus</i> Sauley, 1898....	447
<i>Lostiae</i> Dodero, 1897.....	417	nebulosus Reitt., 1898.....	423
<i>Ludyi</i> Reitt., 1894.....	376	<i>nemorialis</i> Reitt., 1900.....	449

Neuraphes 1894.....	356	<i>Poweri</i> Fwl., 1897.....	423
<i>Nicaense</i> Reitt., 1893.....	428	<i>praeteritus</i> Rye, 1894.....	383
<i>nigrescens</i> Reitt., 1894.....	388	<i>pravus</i> Reitt., 1898.....	148
<i>nigripennis</i> Reitt., 1900....	433	<i>profanus</i> Reitt., 1894.....	388
<i>nikitanus</i> Reitt., 1898.....	451	<i>prolixus</i> Reitt., 1898.....	126
<i>nodifer</i> Reitt., 1894.....	376	<i>prolongatus</i> Gory, 1900....	158
<i>nodifrons</i> (Saulcy), 1894....	367	<i>propinquus</i> Chaud., 1897..	408
<i>nudipennis</i> Reitt., 1900....	433	<i>protervus</i> Coq., 1897.....	421
-		<i>proximus</i> Reitt., 1894.....	395
<i>occipitalis</i> Saulcy, 1894....	382	<i>prumptus</i> Coq., 1898.....	124
<i>oblongus</i> Sturm, 1898.....	145	Pseudoleptocharis , 1897.	407
<i>Olivieri</i> Reitt., 1900.....	134	<i>pubicollis</i> Müll., 1898.....	147
<i>ornatus</i> Reitt., 1894.....	371	<i>pulcher</i> Reitt., 1898.....	199
<i>osmanlis</i> Reitt., 1894.....	367	<i>pumilio</i> Schaum, 1894.....	388
<i>ossolanum</i> Saulcy, 1893....	429	<i>punicus</i> Reitt., 1898.....	119
<i>ovalipennis</i> Bonnaire, 1894.	388	<i>puncticeps</i> Saulcy, 1894....	372
		<i>puncticolle</i> Reitt., 1893.....	438
<i>palpalis</i> Latr., 1900.....	159	<i>punctipenne</i> Fairm., 1893..	422
<i>Pandellei</i> Croiss., 1894.....	363	<i>punctipennis</i> Fairm., 1900..	134
<i>Pandellei</i> Fairm., 1898.....	146	<i>punctithorax</i> Reitt., 1893...	439
<i>panormitanus</i> Saulcy, 1894.	388	<i>pusillimus</i> Reitt., 1894.....	390
<i>parallela</i> Fairm., 1893.....	235	<i>pusillus</i> Müll., 1897.....	424
<i>parallelocollis</i> Saulcy, 1893.	352	<i>pygmaeum</i> Saulcy, 1893....	437
<i>parallelus</i> Chaud., 1894....	376	<i>pyrenaeum</i> Saulcy, 1893....	431
<i>parilis</i> Reitt., 1894.....	388	<i>pyrenaeus</i> Xamheu, 1898..	141
<i>parmatus</i> Reitt., 1900.....	433		
<i>parviceps</i> Reitt., 1894.....	367	<i>Raymondi</i> Saulcy, 1893....	230
<i>pedemontanum</i> Saulcy, 1893.	432	<i>Raymondi</i> Saulcy, 1897....	417
<i>perispunctum</i> Kol., 1893....	425	<i>Raymondi</i> Saulcy, 1897....	425
<i>Perrisi</i> Reitt., 1900.....	130	<i>Raymondi</i> Saulcy, 1900....	148
<i>Peyroni</i> Reitt., 1898.....	142	<i>regalis</i> Reitt., 1894.....	379
<i>Pharaonis</i> Mots., 1898....	117	<i>Regimbarti</i> Croiss., 1898...	159
<i>Pici</i> Reitt., 1894.....	389	<i>Reitteri</i> Bris., 1893.....	422
<i>picipennis</i> Reitt., 1897.....	429	<i>Reitteri</i> Croiss., 1894.....	399
<i>pilifer</i> Kraatz, 1900.....	158	<i>Reitteri</i> Saulcy, 1898.....	152
<i>Piochardi</i> Saulcy, 1898....	147	<i>Revelierei</i> Reitt., 1894.....	389
<i>Pirazzolii</i> Saulcy, 1897....	425	<i>Revelierei</i> Reitt., 1897....	417
<i>planiceps</i> Reitt., 1894.....	380	<i>robustus</i> Reitt., 1898.....	122
<i>plani/rons</i> Blatsh., 1894....	388	<i>rotundicolle</i> Reitt., 1893....	442
<i>plicata</i> Gyll., 1898.....	234	<i>rotundipennis</i> Schaum, 1897.	426
<i>plicicollis</i> Reitt., 1894.....	376	<i>rubicundus</i> Schaum. 1894..	372

<i>ruficornis</i> Denny, 1898.....	121	<i>speculiceps</i> Saulcy, 1894....	378
<i>ruficornis</i> Mots., 1900.....	160	<i>spissicornis</i> Coq., 1898.....	125
<i>rufulus</i> Saulcy, 1894.....	390	Stenichnus , 1897.....	406
<i>rufus</i> Müll., 1900.....	128	<i>sternalis</i> Guilleb., 1900.....	135
<i>rugiceps</i> Croiss., 1894.....	381	<i>Steveni</i> Kol., 1897.....	425
<i>rutilipennis</i> Müll., 1898....	137	<i>strictus</i> Fairm., 1894....	396
<i>sanguinipennis</i> Reitt., 1898.	138	<i>striolatum</i> Reitt., 1893.....	437
<i>sardoum</i> Reitt., 1893.....	436	<i>Stussineri</i> Reitt., 1894.....	367
<i>satyrus</i> Reitt., 1893.....	365	<i>Stussineri</i> Reitt., 1900.....	151
<i>saucius</i> Reitt., 1894.....	368	<i>styriacus</i> Grimm., 1898....	155
<i>Saulcyanus</i> Croiss., 1898....	115	<i>subcordatus</i> Fairm., 1834.	391-394
<i>Saulcyanus</i> Croiss., 1900....	138	<i>sublaevis</i> Reitt., 1900.....	149
<i>Sauleyi</i> Reitt., 1893.....	440	<i>subparallelus</i> Saulcy, 1894.	394
<i>Sauleyi</i> Croiss., 1897.....	416	<i>subseriatus</i> Reitt., 1897....	408
<i>Sauleyi</i> Croiss., 1898.....	134	<i>subsulcatulus</i> Reitt., 1894.	388
<i>scaphium</i> Reitt., 1900.....	134	<i>subterraneus</i> Reitt., 1898....	150
<i>Schaumi</i> Reitt., 1893.....	234	<i>subtetratomus</i> Reitt., 1894.	396
<i>Schaumi</i> Luc., 1898.....	140	<i>subtilis</i> Reitt., 1897.....	416
<i>Schiodtei</i> Kiesw., 1898.....	147	<i>subtilis</i> Grimm., 1898.....	138
<i>Schlosseri</i> Reitt., 1898.....	122	<i>successor</i> Reitt., 1897.....	409
<i>scutellaris</i> Müll., 1897.....	423	<i>sulcatulus</i> Fairm., 1894....	388
Scydmaenidae , 1893....	199	<i>sulcipennis</i> Reitt., 1894....	394
Scydmaenites , 1898.....	158	<i>sulcipennis</i> Reitt., 1900....	141
<i>scydmaenoides</i> Steph., 1893.	238	<i>suramensis</i> Reitt., 1898....	121
Scydmaenus , 1900.....	116	<i>suturellus</i> Mots., 1898.....	105
<i>sellatus</i> Fauv., 1894.....	372	<i>syriacus</i> Croiss., 1898.....	153
<i>semicastaneus</i> Reitt., 1894..	367	<i>syriacus</i> Croiss., 1900.....	127
<i>seminulum</i> Saulcy, 1893....	438	<i>tarsatus</i> Müll., 1900.....	126
<i>semipiceus</i> Reitt., 1897....	419	<i>tenuicornis</i> Reitt., 1894....	395
<i>semipunctatus</i> Fairm., 1897.	412	Tetramelus , 1893.....	142
<i>Sharpi</i> Saulcy, 1894.....	376	<i>Theryanum</i> Reitt., 1893....	438
<i>similaris</i> Reitt., 1894.....	394	<i>Thomayi</i> Reitt., 1898.....	152
<i>simile</i> Reitt., 1893.....	429	<i>thoracicum</i> Müll., 1893....	422
<i>similis</i> Saulcy, 1894.....	395	<i>Titan</i> Reitt., 1894.....	397
<i>similis</i> Weise, 1898.....	120	<i>tithonus</i> Reitt., 1897.....	415
<i>Simoni</i> Reitt., 1898.....	157	<i>transsylvanicus</i> Saulcy, 1898.	149
<i>Skalitzkyi</i> Croiss., 1898....	126	<i>Treforti</i> Friv., 1900.....	
<i>solitarius</i> Reitt., 1894.....	366	<i>tricavulus</i> Reitt., 1894....	396
<i>Sparshalli</i> Denny, 1894.	384-388	<i>tripunctatus</i> Reitt., 1894....	368
<i>spartanus</i> Reitt., 1900.....	129	<i>tritonus</i> Reitt., 1894.....	396

<i>tritonus</i> Kiesw., 1898.....	440	<i>Uzaci</i> Doderö, 1894.....	369
Tropithorax , 1894.....	359	<i>ventricosus</i> Reitt., 1897....	418
<i>truncatella</i> Er., 1893.....	234	<i>vicinus</i> Chaud., 1897.....	412
<i>truncatus</i> Coq., 1897.....	421	<i>vividus</i> Reitt., 1900.....	434
<i>Truquii</i> Baudi, 1897....s.	413	<i>Vulcanus</i> Reitt., 1894.....	367
<i>Tschapecki</i> Sauley, 1894...	352	<i>vulneratus</i> Reitt., 1894.....	398
<i>tuberculatus</i> Chaud., 1897..	408	<i>vulpinus</i> Schaum, 1900....	428
<i>turcomanus</i> Reitt., 1898....	440	<i>Weterhalli</i> Gyll., 1898.....	439
<i>turgidum</i> Reitt., 1893.....	434	<i>Wighami</i> Denny 1894.....	365
<i>Turki</i> Reitt., 1900.....	436	<i>Yermolowi</i> Sauley, 1894...	394

SUR UN NOUVEL HYMÉNOPTÈRE AQUATIQUE,

LE *LIMNODYTES GERRIPHAGUS* N. GEN. N. SP.

PAR LE D^r PAUL MARCHAL.

Dans ses études embryologiques sur les Insectes, Metchnikoff ⁽¹⁾ a signalé l'existence d'un Hyménoptère parasite des œufs de *Gerris lacustris*, il en a même étudié le développement et a rapporté l'imago à une espèce de *Teleas* indéterminée.

Ganin ⁽²⁾ a retrouvé depuis le même parasite et par plusieurs desins a fait connaître la larve si bizarrement constituée de cet Hyménoptère.

Au mois de mai dernier, j'ai recueilli moi-même dans un étang du bois de Meudon, l'étang de Trivaux, des œufs de *Gerris* parasités par un Proctotrypide, qui, s'il n'était pas identique à celui observé par les deux auteurs précédents, appartenait en tout cas à une espèce fort voisine.

Toutes les pontes de *Gerris* que j'ai observées étaient formées d'œufs alignés sur la face inférieure des feuilles de Potamogeton, le long du bord libre (3, fig. 1).

En passant en revue le produit de ma première récolte du 12 mai, je pus constater que dans certaines rangées d'œufs de teinte jaune et qui contenaient des embryons de *Gerris* déjà formés, se trouvaient quelques œufs d'un blanc mat; en examinant ces œufs au microscope, je vis que leur contenu était animé de mouvements de contraction ondulatoires, et en les ouvrant je mis à découvert une larve annelée présentant une tête armée de petits crochets mandibulaires et qui évidemment était une larve d'Hyménoptère; cette larve très avancée dans son développement correspondait à la 3^e forme larvaire de Ganin, et remplissait toute la coque de l'œuf.

Désirant connaître le développement du parasite que je venais de découvrir, je recueillis, le 14 mai, de nouvelles pontes de *Gerris*, et en examinant les œufs les uns après les autres, je trouvai à l'intérieur de certains d'entre eux la première forme larvaire du parasite. Cette première forme larvaire (4, fig. 1) ressemble beaucoup à celle représentée par Ganin dans les fig. 2, 3, 4, 5 et 6 de sa planche XXXIII; mais

(1) *Embryologische Studien an Insecten* (Lepzig, 1866), p. 91.

(2) *Zeitsch. f. wiss. Zool.*, XIX, 1869, p. 431, pl. xxxiii.

elle m'a paru en différer par la disposition des soies et par la brièveté de la corne caudale; de plus, je n'ai pu constater la présence d'une dent à la base de cette dernière.

Dans le courant de juin j'obtins l'éclosion de 6 individus adultes




Fig. 1. — 1, *Limnodytes gerriphagus* ♀; gr. = 27. — 2, le même vu de profil avec l'aiguillon sorti; gr. = 27. — 3, œufs de *Gerris* sur le bord d'une feuille de *Potamogeton*; gr. = 2. — 4, première forme larvaire du *Limnodytes*; gr. = 115

dont 4 femelles et 2 mâles. Ils étaient éclos dans un grand verre en partie rempli d'eau, où flottaient des fragments de feuilles de *Potamogeton* portant des œufs de *Gerris* parasites. Grâce à la présence d'un disque de verre servant de couvercle, ils restèrent emprisonnés à l'intérieur du verre et je pus les observer à loisir; or j'eus bientôt la surprise de voir que ces minuscules Hyménoptères pouvaient également bien se servir de leurs ailes pour voler et pour nager. Chacun d'eux traversait en volant l'espace qui s'étendait entre la surface de

l'eau et le couvercle, ou bien volait d'une paroi à l'autre. Pour pénétrer dans l'eau, il inclinait la tête en avant et faisait visiblement un effort destiné à vaincre la résistance opposée par la tension superficielle; ce passage de l'air dans l'élément liquide lui était d'ailleurs rendu plus facile lorsqu'il se trouvait sur le bord d'une feuille flottante qu'il n'avait qu'à contourner pour pénétrer dans l'eau. Une fois immergé, l'Insecte continuait à marcher, s'il se trouvait sur une plante aquatique, et cheminait alors avec une aisance aussi grande que s'il eût été en dehors de l'eau; si au contraire il n'était en contact avec aucun corps solide, il se mettait à nager avec ses ailes, frappant l'eau avec ces dernières sans précipitation et d'un mouvement cadencé; il pouvait ainsi s'élever ou descendre et traverser toute l'épaisseur d'eau qui se trouvait contenue dans le verre; lorsqu'il arrivait à la surface, il devait faire un nouvel effort pour passer du liquide dans l'air libre, puis ne tardait pas à reprendre sa vie aérienne.

Le parasite des œufs de *Gerris* constitue donc un nouvel exemple d'Hyménoptère aquatique à ajouter à ceux qui sont déjà connus.

Parmi ces derniers, deux, à ma connaissance, sont capables de nager sous l'eau, le *Polynema natans*, parasite des œufs de *Calopteryx* observé par Lubbock ⁽¹⁾ et par Ganin ⁽²⁾, et la *Prestwichia aquatica*, parasite des œufs de Notonecte et de Dytique, observé par Lubbock, par Enock et par d'autres auteurs. Le premier est un Mymaride et nage avec ses ailes de la même façon que notre parasite; le deuxième est un Chalcidide et nage avec ses pattes.

Le mode de locomotion aquatique de notre Hyménoptère est tout à fait comparable à celui de *Polynema natans*. Mais Lubbock n'a pu voir ce dernier Insecte faire usage de ses ailes pour le vol. De plus, d'après Ganin, chez *Polynema natans*, les ailes seraient remplies de sang et fonctionneraient comme des branchies; les trachées par contre feraient défaut à tous les stades de l'évolution. Chez le parasite des œufs de *Gerris*, au contraire, l'aile présente la structure habituelle et il existe un stigmate métathoracique normal.

Il convient maintenant d'examiner la place que doit occuper dans la classification l'Hyménoptère qui nous occupe.

L'étude de ses caractères morphologiques permet de le ranger parmi les Proctotrypides dans la sous-famille des Scelionides; il me parait en outre assez voisin du genre *Thoron*; mais il en diffère par la forme caractéristique des ailes, par leur nervation (la nervure sous-margi-

(1) *Proc. Linn. Soc.*, XXIV, 1863, p. 135-142.

(2) *Loc. cit.*

nale n'étant pas distincte du bord de l'aile); par le mode d'insertion et la constitution des antennes; par la forme du premier anneau abdominal qui dans le genre *Thoron* est fortement bombé et masque le métanotum (1), tandis que dans le type qui nous occupe, le premier anneau ne présente pas de voussure dorsale et laisse le métanotum entièrement à découvert; nous pensons que ces caractères sont suffisants pour permettre l'établissement d'un genre nouveau.

Limnodytes, n. gen. (λίμνη étang, δύτης plongeur).

Tête aussi large que le thorax. Ocelles écartés, les latéraux plus rapprochés des yeux composés que de l'ocelle médian. Antennes cou-




Fig. 11. — *Limnodytes gerriphagus*. 1, aile postérieure; gr. = 60. — 2, antenne du mâle; gr. = 100. — 3, antenne de la femelle; gr. = 100.

dées, insérées l'une à côté de l'autre, juste au-dessus du clypeus dans une cupule saillante, formées de douze articles dans les deux sexes (sans compter le radicule); radicule assez court, mais bien visible extérieurement; antenne moniliforme chez le mâle, terminée en une mas-

(1) Pour ne pas changer l'ancienne nomenclature, je continue à désigner le segment médiaire sous le nom de métathorax.

sue quadriarticulée chez la femelle. Mandibules saillantes et tridentées. Thorax large et bombé; pronotum linéaire en dessus; mésonotum large et lisse, arrondi en avant; sillons paropsidaux à peine indiqués et seulement en arrière; scutellum semicirculaire; postscutellum mousse, peu saillant; métanotum bien visible et normalement développé. Ailes antérieures et postérieures longuement ciliées sur leurs bords. Ailes antérieures grandes, présentant un angle fortement saillant dans la première moitié de leur bord postérieur; nervure sous-marginale se confondant avec le bord de l'aile et se terminant brusquement avant la moitié du bord en un stigma marginal progressivement élargi; pas de nervure post-marginale; rameau stigmatique formant avec le bord de l'aile un angle de moins de 45° et se terminant par un élargissement chitineux claviforme. Ailes postérieures étroites, en forme de rames; nervure costale bisinuée, se terminant en un épaississement chitineux, ce dernier formant un angle fortement saillant avant la moitié du bord antérieur de l'aile. Pattes grêles; fémurs subclaviformes; tibias terminés par un éperon; éperon de la 1^{re} paire falciforme et bifurqué, ceux de la 2^e et 3^e paire spiniformes. Abdomen ovoïde, légèrement déprimé, plus long que le thorax; 1^{er} segment abdominal (pétiole) court, non renflé dorsalement à la base; 2^e et 3^e segments de grande taille.

Limnodytes gerriphagus, nov. sp.

Mâle. — Long. 1 mill. Brun noir.

Tête recouverte d'une pubescence clairsemée. Antennes de 12 articles (sans compter le radicule), velues; radicule court et sinué; scape à peine plus long que les 2 articles suivants; 1^{er} article (pédicule) du funicule cyathiforme, plus court que le 2^e; 2^e brièvement pédiculé; 3^e, 4^e et dernier article ayant une longueur de plus du double de leur largeur; les autres articles ayant une longueur subégale ou inférieure au double de leur largeur; dernier article fusiforme.

Mandibules jaunes à dents brun-rouge.

Thorax d'un noir brillant présentant quelques poils clairsemés.

Postscutellum portant un bouquet de soies.

Pattes d'un brun testacé foncé; trochanters et région de l'articulation tibio-tarsienne d'un testacé clair.

Tarse antérieur notablement plus long que la jambe antérieure; 1^{er} article du tarse antérieur plus long que les 3 suivants.

Tarse postérieur un peu plus long que la jambe postérieure; 1^{er} article du même tarse égalant en longueur les 3 suivants.

Tarse intermédiaire avec un 1^{er} article relativement court et égalant à peine les 2 suivants.

Ailes faiblement irisées, d'une teinte légèrement enfumée due à la présence sur toute leur étendue de poils courts clairsemés.

Ailes antérieures dépassant en arrière l'abdomen de leur tiers postérieur; angle saillant placé un peu après le tiers antérieur du bord postérieur de l'aile; frange ciliée commençant aussitôt après cet angle saillant, s'élargissant progressivement et ayant vers le sommet de l'aile une largeur égale au moins au tiers de la largeur de l'aile; au niveau du stigma de la nervure marginal, soies longues et fortes.

Ailes postérieures étroites à bords presque parallèles; bord antérieur en forme d'accolade; frange garnissant le bord postérieur ayant une largeur notablement supérieure à celle de l'aile.

Femelle. — Diffère du mâle par les caractères suivants :

Long. 4,3 mill. — Antenne présentant un scape à peine plus long que les 3 articles suivants.

Funicule avec le 1^{er} article (pédicule) large, cyathiforme plus long et plus large que le 2^e article; 2^e, 3^e et 4^e articles ayant une longueur supérieure ou subégale au double de leur largeur; le 2^e légèrement pédiculé, le 3^e un peu plus court que le précédent et que le suivant; le 5^e encore plus court, le 6^e ovoïde; le 7^e subsphérique; les 4 derniers très élargis et réunis en une massue ovoïde allongée, séparés par de simples lignes de suture à direction oblique; massue égalant environ en longueur le quart de l'antenne tout entière.

Abdomen plus large que chez le mâle et plus brièvement resserré à la base.

SUR QUELQUES HYMÉNOPTÈRES DE MADAGASCAR

PAR R. DU BUYSSON.

Parmi les Hyménoptères provenant de Madagascar (Fort-Dauphin), que M. Grandidier a donnés au Muséum, se trouve un Apide des plus intéressants. Il appartient aux Andréniens à langue courte et obtuse, et je suppose qu'il doit être parasite. Il se rapproche du *Lipotriches abdominalis* Gerstaecker (Peters Reise n. Mossambique, Insecten, V, 1862, p. 446; t. 29, fig. 6) et de la *Nomia* ? *Betsilei* de Saussure (Hist. ph. nat. et pol. de Madagascar, publiée par A. Grandidier, vol. XX, Hym., p. 71-74, 1890, pl. 17, fig. 5), mais il diffère de l'un et de l'autre. Il possède des caractères tellement tranchés que je crois devoir créer un genre nouveau pour pouvoir l'y ranger. Par suite de la conformation du prothorax, je l'appellerai *Thrausmus* (Θραυσμός, es-carpé) et je dédie l'espèce à M. Guillaume Grandidier.

Thrausmus, gen. nov.

Palpes maxillaires de six articles subégaux; palpes labiaux de quatre articles. Mandibules longues, falciformes, avec de longues soies en dessous. Antennes avec le scape très allongé, le fouet court et robuste, les articles subtransversaux. Pronotum extrêmement réduit au milieu, tronqué perpendiculairement en avant. Pubescence plumeuse. L'aire supérieure du métathorax ornée de larges stries longitudinales, rayonnantes autour du postécusson. Ailes antérieures avec trois cellules cubitales, la 2^e petite, plus haute que large; les nervures transverso-cubitales 1^{re} et 2^e parallèles; les nervures récurrentes aboutissant, la 1^{re} au milieu de la 2^e cubitale, la 2^e dans la moitié postérieure de la 3^e cubitale. Cuisses inermes, normales; tibias postérieurs élargis, comprimés; prototarses postérieurs comprimés, légèrement élargis, ongles longuement bifides. Abdomen avec les segments 1 et 2 légèrement renflés transversalement dans le tiers postérieur, le 2^e segment avec une marge distincte, déprimée, le 5^e avec une frange anale.

T. Grandidieri, n. sp. — Corps de petite taille, robuste, noir brun sur l'avant-corps, devenant roux ferrugineux par places, l'abdomen et les pattes plus ou moins roux ferrugineux; pubescence blanche. Tête transversale, à ponctuation médiocre, serrée, subréticulée; face couverte d'une pubescence plumeuse, blanchâtre, abondante; une

légère carène entre les antennes, à la base du clypeus, celui-ci légèrement convexe, le bord antérieur presque droit, entier, garni de poils raides, longs, blanchâtres; mandibules touchant les yeux par leur base. Antennes épaisses, courtes, le scape long, roux testacé en dessous, le 3^e article très court, plus court que le 4^e et subégal au 2^e. Pronotum avec la tranche antérieure perpendiculaire, lisse, anguleuse sur les côtés, les calus huméraux ferrugineux, entourés de gros poils plumeux blancs; mésonotum à ponctuation grosse, profonde, subréticulée, serrée, les bords au-dessus des ailes carénés; écusson et post-écusson normaux; écailles grandes, testacées, scarieuses; ailes légèrement enfumées, hyalines à la base; tibias et tarses de couleur plus claire, couverts de poils blancs serrés; les tibias portent sur leur bord postérieur, huit épines assez fortes, testacé pâle, et près de leur bord apical extérieurement une sorte d'épine élargie et arrondie à son extrémité, rappelant un peu celles que possèdent les *Nomada* à l'extrémité des tibias. Abdomen obové, à ponctuation fine, profonde, espacée; la bordure de chaque segment presque imponctuée; 1^{er} segment plus grand que les autres, arrondi et imponctué en avant; 2^e segment ayant de chaque côté de sa base une tache triangulaire de poils blancs plumeux; 3^e segment presque entièrement couvert de poils blancs couchés, plumeux, clair-semés; 4^e segment avec des poils blancs couchés, plumeux, entremêlés de poils raides, simples, dressés, roussâtres; 5^e segment portant une frange anale de poils roussâtres. Le ventre est à ponctuation très éparse; chaque segment porte quelques poils roussâtres, simples, de chaque côté du bord apical; le 5^e segment est caréné. — ♀ Long. 7,5 mill.


NOMIA VIRIDILIMBATA SAUSS. — ♀ Les premiers articles des tarses postérieurs sont fortement anguleux en dessus; le 1^{er} article porte à son extrémité une longue frange de poils agglutinés, tous égaux en longueur.

♂ Le 7^e segment abdominal est arrondi sur les côtés et porte en son milieu apical un prolongement distinct largement arrondi.

Madagascar : Fort-Dauphin.

ODYNERUS ANDREANUS SAUSS. — ♂ Les cuisses intermédiaires sont légèrement et largement échancrées en dessous. Les articles 10 et 11 des antennes sont incisés, la partie échancrée est brillante, lisse et est imponctuée; le 13^e article est en forme de crochet.

Madagascar : Fort-Dauphin.



Thrausmus Grandidieri R. du Buyss.

EXPLICATION DES FIGURES.

- Fig. 1. — Corps du *Thrausmus Grandidieri* Buyss. grossi six fois.
- 2. — Aile antérieure du même, grossie six fois.
- 3. — Aile postérieure — — —
- 4. — Ongles des tarse du même, grossi cinquante fois.
- 5. — Base de l'antenne — — — *a* scape.
- 6. — Palpe maxillaire — — —
- 7. — Palpe labial — — —
- 8. — Tibia et prototarse du même, grossis vingt fois; *a* tibia, *b* prototarse ou 1^{er} article du tarse.
- 9. — Tarse postérieur de la *Nomia viridilimbata* Sauss.; 1^{er}at, premier article du tarse; 2^{at}, deuxième article du tarse; grossissement 20 fois.
- 10. — Cuisse intermédiaire de l'*Odynerus Andreanus* Sauss. ♂ grossie 20 fois.
- 11. — Extrémité de l'antenne du mâle de l'*Odynerus Andreanus* Sauss. grossie 40 fois; 10^e aa, dixième article antennaire; 11^e aa, onzième article antennaire.

MONOGRAPHIE
DES
CÉCIDOMYIDES D'EUROPE ET D'ALGÉRIE

(planches 15 à 44)

PAR L'ABBÉ J.-J. KIEFFER

PROFESSEUR AU COLLÈGE ST-AUGUSTIN, A BITCHE.

Aucune des familles dont se compose l'ordre des Diptères n'a été l'objet de travaux aussi nombreux que celle des Cécidomyides. Si l'on ne tenait compte que de leur apparence extérieure, ces petits mouches dont la taille ne mesure généralement qu'un à trois millimètres, parfois même moins d'un millimètre, et atteint rarement six millimètres (*Clinorhysis* Kieff. et *Hormomyia* H. Lw.), pourraient peut-être nous sembler insignifiants; mais si l'on considère les formes si variées des minimes vermineux qu'ils représentent à l'état larvaire, ou encore les curieuses excroissances ou galls produites sur les plantes par la plupart d'entre eux, ou enfin les dégâts considérables, parfois même les véritables désastres causés à l'agriculture par d'autres, on comprendra qu'ils aient depuis longtemps attiré sur eux l'attention des naturalistes.

Il faut remonter bien haut à travers les temps pour arriver aux plus anciens représentants des Cécidomyies qui soient parvenus à notre connaissance. M. le docteur F. Meunier vient de découvrir dans le copal des tropiques et dans l'ambre de la période tertiaire des représentants des genres *Diplosis* H. Lw., *Cecidomyia* H. Lw. et *Campylomyza* Meig.; dans l'ambre seul, *Cecidomyia conjuncta* Meun. et *spectabilis* Meun. [487 ⁽¹⁾, p. 128 et 488, p. 161]. Auparavant déjà, H. Loew avait signalé dix-huit espèces de Cécidomyies trouvées par lui dans l'ambre et se répartissant de la façon suivante : *Cecidomyia* H. Lw., plusieurs espèces dont une est nommée *Cecid. minutissima* H. Lw., les autres sans dénomination; *Diplosis* H. Lw.; *Asynapta* H. Lw., trois espèces; *Epidosis incompleta* H. Lw.; *Dirhiza* H. Lw.; *Campylomyza* Meig., cinq espèces, dont l'une reçoit le nom de *C. monilifera* H. Lw.; enfin une Hétéropézine douteuse, *Monodicrana terminalis* H. Lw. [403, p. 32].

C'est également pendant la période tertiaire que les feuilles de *Ju-*

(1) Les nombres entre crochets indiquent le numéro sous lequel on trouvera le titre de l'ouvrage, au chapitre « Bibliographie ».

glans acuminata Braun portaient des galles arrondies, découvertes récemment dans la lignite et considérées par von Heyden comme dues à une Cécidomyie que cet auteur appela *Cecidomyia dubia* Heyd. [230, p. 80, pl. X, fig. 4].

Un autre auteur, Heer, a observé sur les nervures des feuilles fossiles de *Populus* n. sp.? des galles qu'il attribue à une Cécidomyie, nommée *Cecidomyia Bremii* Heer [220, p. 395, fig. 322].

Une autre espèce, *Mikiola fagi*, dont les galles sont communes dans toute l'Europe sur les feuilles du Hêtre, aurait existé dès l'époque pliocène; c'est du moins ce que nous lisons dans un article de M. Marty [452] intitulé : « De l'ancienneté de la *Cecidomyia fagi*. » L'auteur y représente une feuille de *Fagus pliocenica* et ajoute « qu'elle montre avec la plus grande netteté le petit trou circulaire et le renflement du pédoncule d'une galle qu'il ne peut rapporter qu'à celle de la *Cecidomyia fagi* ».

La plus ancienne mention qui ait été faite d'une galle de Cécidomyie remonte au premier siècle de l'ère chrétienne. En parlant du Hêtre, Pline l'Ancien fait la remarque suivante : « Folium fagi... media parte plerumque gignens superne parvulam baccam viridem, acumine aculeatam » (*Historiarum mundi liber XVI, 7*). Cette « baie verte, à sommet terminé en pointe, qui se forme le plus souvent sur la partie médiane du dessus des feuilles de Hêtre » est évidemment la galle de *Mikiola fagi*. Au ^{xvi}^e, au ^{xvii}^e et au ^{xviii}^e siècle, Clusius [64], Malpighi [435], Réaumur [587] et d'autres signalèrent un certain nombre de galles produites par des Cécidomyies, mais ils n'eurent pas connaissance, ou du moins ne firent pas mention des auteurs de ces déformations. Réaumur décrivit cependant quelques larves et signala l'organe appelé spatule sternale. Linné donna la première description de l'insecte à l'état parfait. Parmi les Diptères décrits par lui, les six suivants paraissent être à rapporter à la famille qui nous occupe : *Tipula juniperina*, *persicariae*, *palustris*, *longicornis*, *pennicornis* et *incarnata*.

Quant à la place qu'on devait assigner aux Cécidomyies, les anciens auteurs ne s'accordaient guère. Linné, De Geer et Schranck les classaient dans le genre *Tipula*, Geoffroy les rangeait dans son genre *Scatopse*, et Fabricius les plaçait parmi les *Chironomus*. Ce ne fut qu'en 1803 que ces petits insectes purent être admis à former un genre à part, auquel Meigen donna le nom de *Cecidomyia*, c'est-à-dire mouche de galle (χηλιδος μυῖα). Deux ans plus tard, Latreille créa pour une espèce le genre *Oligotrophus*. En 1818, Meigen ajouta les genres *Lasioptera* et *Campylomyza*, auxquels vinrent bientôt s'adjoindre *Lestremia*, de Macquart [428] et *Catocha*, de Haliday [499]. Rondani établit plu-

sieurs nouveaux genres en 1840, et les groupa dans deux familles, qu'il appela *Cecidomyiinae* et *Lestremiinae*, en admettant dans cette dernière des Sciarides et des Bibionides. Zetterstedt [823 et 827] ne tarda pas à réunir ces deux familles en une seule, qu'il désigna du nom de *Cecidomyzides*, tandis que H. Loew [402] les nomma plus tard *Tipularia gallicola*. Schiner [661] changea ces dénominations en celle de *Cecidomyiidae*, ajouta aux *Cecidomyiinae* et *Lestremiinae* de Rondani, les *Heteropezinae* Schin., en considérant ces trois groupes comme sous-familles des *Cecidomyiidae*. Les Cécidomyies occupaient désormais le rang qui leur revenait.

Fantae molis erat condere gentem!

Néanmoins, malgré le grand nombre de publications dont ces insectes furent ensuite l'objet, malgré les essais de Monographie tentés successivement par Bremi [50], H. Loew [402] et Winnertz [816], malgré l'utile et laborieux Synopsis de Bergenstamm et P. Löw [22], leur étude faisait encore peu de progrès, à tel point que la plupart des espèces décrites sans indication de leurs galles ou de leur genre de vie sont et demeureront toujours énigmatiques. Grâce aux observations publiées successivement par L. Dufour, Laboulbène, N. Wagner, Meinert, von Osten-Sacken, Fr. Löw, Karsch, Targioni-Tozzetti, Riley, Mik, Wachtl, Lintner, Fr. Thomas et surtout Rübsaamen, il est désormais possible de reconnaître une Cécidomyie d'après une diagnose et sans connaître ses mœurs. Mais un vaste champ demeure encore ouvert. Un diptérologiste bien connu, H. Loew [402] écrivait à ce sujet : « Si l'on voulait découvrir et observer toutes les Cécidomyies d'un pays, la vie et le travail d'un homme ne suffiraient pas. » La présente Étude, résultat de quinze années d'observations, n'a donc pas la prétention d'être complète. Nous n'ignorons pas qu'il reste encore bien des espèces à découvrir, surtout au Sud et à l'Est de l'Europe, ainsi qu'en Algérie, régions relativement peu explorées. Faire connaître les Cécidomyies découvertes jusqu'à ce jour, en rendre l'étude plus facile et leur attirer par là de nouveaux observateurs, tel est le but de ce travail. Enfin glorifier l'Auteur de la nature, dont la grandeur nê se manifeste pas moins dans ces êtres infimes que dans ses créatures les plus sublimes, telle est la fin dernière que nous nous sommes proposée dans cette étude. — Creavit Deus in cœlo angelos, in terra vermiculos; nec major in illis, nec minor in istis (S^t AUGUSTIN).

I^{RE} PARTIE

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LES CÉCIDOMYIES.

Avant d'aborder la description des espèces en particulier, nous présenterons d'abord un aperçu de la Bibliographie, puis nous traiterons des caractères généraux des Cécidomyies; des dégâts qu'elles occasionnent et de leurs parasites; de leur élevage et de leur conservation; enfin nous terminerons par l'exposé de la classification.

§ 1.

BIBLIOGRAPHIE.

1. ALOI (ANT.). 1886. Di un nuovo insetto, dannoso alle viti, del genere *Cecidomyia*, scoperto nelle vigne della piana di Catania. (Academ. Gioenia di scienze natur. in Catania, t. XIX, avec pl.).
2. ALTUM (B.). 1875. Forstzoologie, III.
3. — 1889. Waldbeschädigungen durch Thiere und Gegenmittel. Berlin.
4. — 1892. Das Auftreten der Kiefernadelscheiden-Gallmücke, *Cecidomyia brachyntera*. (Zeitschr. für Forst- und Jagdw., p. 327-335).
5. AMBLARD. 1856. Note sur une galle du *Tamarix brachystylis*. (Ann. Soc. ent. de Fr., 3^e sér., t. IV, p. 169-172, pl. IV).
6. AMERLING. 1859. Ueber *Asynapta lugubris* auf Pflaumenbäumen. (Lotos., p. 60 et 140; pl. II). — Le même article dans : Gesammelte Aufsätze aus dem Gebiete der Naturökonomie und Physiokratie. Prag. 1868, p. 141.
7. ANGELINI (B.). 1831. Degli insetti nocivi all'Olivio. (Memor. Academ. Veron., t. XII, p. 313-319).
8. ANONYME. Observations sur la reproduction parthénogénésique chez quelques larves d'Insectes diptères par N. Wagner, Meinert, Pagenstecher et Ganin. (Annales des Sciences naturelles. Paris. Série 3, t. IV, p. 259-289, pl. XIII et XIV.) Un résumé dans : Ann. and Mag. Nat. Hist., ser. 3, vol. XVIII, p. 496-498.
9. — 1886. Larva of *Cecidomyia caricis*. (Entomologist, XIX, p. 10).

10. ANONYME. 1886. *Cecidomyia clausilia*. (Ibid., p. 224).
11. — 1890. Root Gall of Orchids. (Gard. Chron. 3^e serie, t. VIII. London, p. 505, fig. 100-102).
12. APETZ. 1849. Entomologische Notizen. (Stett. Ent. Zeit., t. X, p. 62).
13. APPEL. 1891. Galles ou Zoocécidies. (Archiv. des Sciences phys. et nat. Genève, 3^e série, t. 26, p. 643-644).
14. BECCARINI. 1893. Sopra un curioso cecidio della *Capparis spinosa*. (Malpighia, VII, p. 405-414).
15. BACH. 1859. Ueber gewisse Veränderungen und Auswüchse an verschiedenen Pflanzentheilen, welche durch den Einfluss der Insecten bewirkt werden. (Natur und Offenb., t. V, p. 250-263).
16. BADDELEY. 1836. Corbyn's India Review. N. 7.
17. VON BAER. 1863. Bericht über eine neue von Prof. Wagner in Kasan an Dipteren beobachtete abweichende Propagationsform. (Bull. Acad. Sciences St-Petersbourg, t. VI, p. 239-241.)
18. — 1866. Ueber Prof. Wagner's Entdeckung von Larven, die sich fortpflanzen, Herrn Ganin's verwandte und ergänzende Beobachtungen und über die Paedogenesis überhaupt. (Ibid., t. IX, p. 64-137, pl. I).
19. BALLÉ (E.). 1890. Catalogue descriptif des galles observées aux environs de Vire. (Bull. Soc. des amis des Sciences natur. de Rouen, p. 415-437).
20. BAZIN. 1856. Notice sur un Insecte qui a causé les plus grands ravages dans nos dernières récoltes de blé sur pied, la Cécidomyie du froment et quelques-uns de ses parasites. Paris, 32 p. avec pl. col.
21. BEAUVISAGE. 1883. Les galles utiles. Thèse d'agrég. Paris, 100 p.
22. BERGENSTAMM (J.-V. von) et Löw (P.). 1876. Synopsis Cecidomyidarum. (Verh. zool. bot. Ges. Wien., t. XXVI, p. 1-104).
23. BEYERINCK. 1877. Bijdrage tot de Morphologie der Plantegallen. (Academische Proefschrift. Utrecht).
24. — 1885. Die Galle von *Cecidomyia poae* an *Poa nemoralis*. (Botanische Zeitung, t. XLIII, N. 20, p. 305, pl.).
25. BEZZI (MARIO). 1892. Contribuzione alla Fauna ditterologica della Provincia di Pavia. (Bull. Soc. entom. ital. Anno XXIV, 75 p.).
26. — 1893. I Ditteri del Trentino. Padova, 145 p.

27. BEZZI (M.) et DE STEFANI. 1897. Enumerazione dei Ditteri raccolti in Sicilia.
28. BIGOT. 1854. Essai d'une classification générale et synonymique de l'ordre des Insectes diptères. (Ann. Soc. entom. France, série 3, t. II, p. 447-477).
29. BINNIE. 1876. On Dipterous Gallmakers and their Galls. (Transact. of the Glasgow soc. of Field Natur., p. 154-164).
30. — 1877. On the *Asphondylia* of the Glasgow district. (Proceed. of Nat. Hist. Soc. of Glasgow, p. 111-114).
31. — — Note on *Cecidomyia trifolii* and its Gall. (Ibid., p. 114-115.)
32. — — Further notes on the Cecidomyidae with description of three new Species. (Ibid., p. 178-186).
33. BIRNIE. 1824. On the efficacy of certain steeps, to preserve wheat from the fly and smut. (New Engl. Farmer, t. III, p. 171).
34. BLANCHARD. 1840. Histoire naturelle des Insectes, Paris. T. III.
35. — 1852. Gay historia fisica de Chile, t. VII.
36. BLANCHÈRE. 1876. Les ravageurs des vergers et des vignes. Paris.
37. BLOOMFIELD (E.-N.). 1888. *Cecidomyia nigra* Meig. (Ent. Monthl. Magaz., XXIV, p. 273-274).
- 37 bis. — 1889. Ravages of *Cecidomyia piri-cora* Ril. (Entom. Monthl. Magaz., XXV, p. 323-324).
38. BOIE. 1838-1839. Zur Verwandlungsgeschichte inländischer Zweiflügler. (Kröyer's Naturhist. Tijdschr, t. II, p. 234-248).
39. BORRIES (H.). 1892, [*Asphondylia sarothamni* avec deux générations] (Berliner Ent. Nachrichten, p. 186).
40. BOSC D'ANTIC. 1817. Quelques aperçus sur l'insecte connu sous le nom de Mouche hessoise et sur un insecte parasite qui s'en nourrit. (Ann. de l'Agric. France, t. X, p. 277-303).
41. — — Sur une nouvelle espèce de Cécidomyie. (Nouv. Bull. Soc. Philom., p. 133-134. — Journal de Physique, Blainville, p. 17. — Isis, 1818, p. 1559).
42. BOUCHÉ. 1833. Naturgeschichte der schädlichen und nützlichen Garteninsecten. Berlin.
43. — 1834. Naturgeschichte der Insecten. Berlin.

44. BOUCHÉ. 1847. Beiträge zur Kenntniss der Insectenlarven. Stettin Ent. Zeitung, t. VIII, p. 142-146).
45. BRAUER. 1867. Die Einwendungen Dr. Gerstäcker's gegen die neue Eintheilung der Dipteren in zwei grosse Gruppen. (Verh. zool. botan. Gesellsch. Wien, t. XVII, p. 737-742).
46. — 1869. Kurze Charakteristik der Dipterenlarven. (Ibid., t. XIX, p. 841-852).
47. — — Ueber *Mantispa styriaca*. (Ibidem, p. 839).
48. — 1883. Systematische Studien auf Grundlage der Dipterenlarven. (Denkschrift de Kais. Acad. d. Wissensch. Wien, t. XLVII).
49. BREMI. 1844. Zur Naturgeschichte der Cecidomyien. (Verh. schweiz. naturforsch. Gesellsch. Chur., p. 100-104.)
50. — 1847. Beiträge zu einer Monographie der Gallmücken. (Denkschr. allgem. schweiz. Gesellsch. f. d. ges. Naturwiss. Neuenburg, t. IX, pl. I et II).
51. — 1849. Mittheilungen über die Insecten der Eichen. (Mitth. naturf. Gesellsch. Zürich, t. I, n. 14).
52. BRISCHKE. 1869. Kleinere Beobachtungen über Insecten. (Schrift. naturf. Ges. Danzig. Neue Folge., t. II, n. 2).
53. — 1871. Ueber die Rapsfeinde und ihre Parasiten. (Ibid., t. II, N. 3 et 4).
- 53 bis. — 1880. Cecidomyidengalle auf *Pteris* (Katters Ent. Nachr., VI, p. 56-57).
54. — 1882. Die Pflanzendeformationen und ihre Erzeuger in Danzig's Umgebung.
55. BRUGNATELLI. 1852. Confronto di varie galle di Cecidomyie. (Memor. Ist. Lombard., t. III, p. 125).
56. BRUHIN. 1891. Ein neuer Fundort der Galle von *Cecidomyia glechomae* Kieff. (D. B. M. IX, p. 189).
57. BÜSGEN (M.). 1895. Zur Biologie der Galle von *Cecidomyia fagi* Hart. (Forstlich Naturwissenschaftliche Zeitschrift. München, IV, p. 9-18).
58. CALLONI (S.). 1886. Larve di *Cecidomyia* sulla *Viola odorata*. (Rendiconti R. Istor. Lombard. Sc. ed. Art. Ler. 2, t. XIX, Milano, p. 220-240).

- 58 bis. CAMERON (P.). 1880. Description of a new species of *Torymus* with notes on other insects of that genus. (Ent. M. Mag. XVII, p. 40-41).
59. — 1887. On Galls of *Cecidomyia*. (Nat. Hist. Soc. of Glasgow, New. Ser., t. I).
- 59 bis. — 1886. Biological Notes. (Ibid., t. II).
60. CAMPBELL MAULE. 1887. The Hessian Fly. (Transact. of the Hertfordshire Nat. Hist. Soc., t. IX).
61. CARUS. 1867. Prof. N. Wagner's Entdeckung von Insectenlarven, die sich fortpflanzen. (Nova Acta Acad. Leopold. Carol. Dresden, t. XXXIII, p. 95-97).
62. CECCONI. 1897. Prima Contribut. alla conoscenza delle galle della foresta di Vallombrosa. (Malpighia, anno XI, p. 433-457).
63. CHOLODKOWSKY N. 1894. Zur Kenntniss der Lebensweise von *Cecidomyia pini*. (Forstlich Naturwissenschaftliche Zeitschrift. München, III, p. 380).
64. CLUSIUS. 1583. Historia rariorum plantarum. Antwerpiae.
65. COATES. 1844. Remarks on the present state of the evidence in regard to the Hessian Fly.
66. — 1842. Note on the natural Alliances of the genus *Cecidomyia*, intended to facilitate identification. (Proceed. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, t. I, p. 191-192).
67. COBB and OLLIFF. 1891. Insect larvae (*Cecidomyia* sp.?) eating Rush on Wheat and Flax. (Agricult. Gazette of New South Wales, II).
68. COCKERELL (T.-D.-A.). 1890. (The Entomologist, t. XXIII, p. 278-281).
69. — — *Trypeta bigeloviae* n. sp. avec *Cecidomyia bigeloviae* Clk. (Ent. M. Magaz. (2) I, p. 324).
70. — 1900. *Diplosis parthenicola* n. sp. (Ibid., t. XXXIII, p. 201.)
71. COHN. 1869. Untersuchungen über Insectenschaden auf den schlesischen Getreidefeldern im Sommer 1869. (Abhandl. schlesisch. Ges. f. vaterl. Cultur. Breslau, p. 187 et s.).
72. COMSTOCK. 1880. *Cecidomyia trifolii* Fr. Lw. on *Trifolium repens* near Washington. — The resin inhabiting *Diplosis*. (Annual Report of the Depart. of Agric. for the year 1879. Washington, p. 197-199; p. 256-257, pl. VI, fig. 5).

73. COMSTOCK. 1895. *Diplosis resinicola* (Manual, etc.).
74. CONTARINI. 1840. Memoria sopra una nuova specie di *Cecidomyia* (*C. Woeldickii*) ed alcune osservazioni quelle dell' Iperico descritto del Prof. Géné. (Atti dell' Ateneo di Venezia, t. III, p. 26, pl. I. — Isis, 1844, p. 799).
75. CONTRI. 1850. Sul muscino del frumento. (Mem. Acad. Bologna, t. II, p. 189-206).
76. COQUILLETT (D.-W.). 1895. A Cecidomyid that lives on Poison Oak (Insect Life, VII, p. 348).
77. — 1899. A Cecidomyid injurious to Seeds of Sorghum. (Bull. U. S. Departm. of Agriculture. Division of Entomologie. New series, 18, p. 81-82).
78. — 1900. Two new Cecidomyians destructive to buds of Roses. (United St. Departm. of Agriculture, Division of Entomology. New Series. Bulletin, 22, p. 44-48, fig.).
79. — — A new Violet Pest. (Ibid., p. 48-51, fig.).
80. COSTA (O.-G.). 1844. Descrizione di dodici nuove specie dell' ordine dei Ditteri et illustrazione di altre quattordici meno ovvie. (Atti Acad. sc. Napoli, t. V, p. 109-120, p.).
81. COUCH. 1857. A few remarks on the midge fly, which infests the wheat. (Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 2, t. XX, p. 399 et s.).
82. COOPER. 1869. A new thorn-leaf Gall. (Canadian Entomol., t. 1, p. 68).
83. — — The alder-bud Gall. (Ibid., p. 81).
84. CUBONI (G.). 1894. La comparta della *Cecid. destructor* nell' Agro Romano. (Bull. N. Agric. XVI, Roma, II, p. 143-144) (1).
85. CURTIS (J.). 1845. Observations on the natural History and Economy, etc. 8 Paper including a Saw-fly, the Hessian fly, the wheat midge and the barley midge. (Journal Agric. soc. Engl., t. VI, p. 131-156, pl.).
86. — — The yellow Rocket midge. (Gardeners Chronicle, t. V, p. 400).
87. — 1860. Farm Insects. Glasgow.

(1) Comme les larves ont été observées sur l'Avoine, il s'agit donc de *Mayetiola avenae* March. et non de *M. destructor* Say.

88. CZECH (C.). 1854. Ueber den Ursprung der Gallen. (Stettiner Ent. Zeit., t. XV, p. 334-343).
- 88 bis. CZECH (Jos.). 1880. Ein neuer Fichtenschädling. (Centralbl. f. d. gesammte Forstwesen, t. VI, p. 258-260, 2 fig.).
89. DAGUILLON. 1898. On a leaf Dipteroecidium of *Hypericum perforatum*. (Revue générale de Botanique, X, p. 109).
90. DAHLBOM. 1851. Anteckningar öfver Insecter observerade på Gottland och i en del af Calmer Län. (Vetenskaps Acad. Handl. Stockholm, p. 166).
91. VON DALLA-TORRE. 1891-1892. Die Zoocecidien und Cecidozoen Tirols und Vorarlbergs. (Berichte des Naturw. mediz. Vereins in Innsbruck, XX Jahrg., p. 90-172).
92. — 1894. Zweiter Beitrag. (Ibid., XXI Jahrg., p. 3-24).
93. — 1896. Dritter Beitrag. (Ibid., XXII, p. 135-165).
94. DAWSON (J.-W.). 1849. Notice of specimens of the Wheat Midge from Nova Scotia. (Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Proceed., t. IV, p. 210-211. — Ann. Mag. Nat. Hist., 1850, t. V, Ser. 2, p. 152-154).
95. DECAUX (F.). 1890. *Burus sempervirens* attaqué par *Cecidomyia buxi*. (Bull. Soc. ent. France, p. 68).
96. DEGEER. 1782. Abhandlungen zur Geschichte der Insecten. Uebersetzt von Goeze, t. VI.
97. DÉRESSE et PERRAUD. 1891. Contrib. à l'étude de la Cécidomyie de la Vigne. (Revue trimestrielle de la station viticole de Villefranche, 2^e année, p. 60-74, pl. A et B).
- 97 bis. DORSETT (P.-H.). 1892. Notice of an insect destructive to buds of roses.
98. DREWSEN. 1842-1843. Over de for Rapsen skadelige Insekter. (Krøyer's Naturhist. Tidsskr., t. IV, p. 337-339).
99. DUFOUR (L.). 1837. Mémoire sur une galle de la Bruyère à balais et sur les insectes qui l'habitent, *Cecidomyia ericae-scopariae* n. sp., *Eulophus ericae* n. sp. et *E. verbasci*. (Ann. Soc. ent. France, t. VII, p. 83-91).
100. — 1838. Note pour servir à l'histoire des Cécidomyies et description d'une nouvelle espèce de ce genre de Diptères. (Ann. Soc. ent. Fr., t. VII, p. 293-296).

101. DUFOUR (L.). 1844. Histoire des métamorphoses des Cécidomyies du Pin maritime et du Peuplier. (Ann. d. Sciences natur. Paris, 2^e série, t. XVI, p. 257-263, pl. I).
102. — 1845. Sur les galles du *Verbascum* et de la *Scrophularia*. (Comptes Rendus hebdomadaires de l'Académie des sciences, t. XXI, p. 1134-1140).
103. — — Mémoire pour servir à l'histoire des métamorphoses des Tipulaires du genre *Lasioptera*. (Mémoires de la Société royale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille, p. 115-122, pl. I, fig. 1-5).
104. — 1846. Histoire de la galle de l'*Eryngium* et des divers insectes qui l'habitent. (Ibid., p. 121-128, pl. I).
105. — — Description des galles du *Verbascum* et du *Scrophularia* et des insectes qui l'habitent. (Ann. des Sciences naturelles. Paris, 3^e série, t. V, p. 5-24, pl. II).
106. — 1861. Un mot sur la galle de la Ronce. (Ann. Soc. ent. Fr., 4^e série, t. I, p. 572).
- 106 bis. DYAR (HARRISON-G.). 1890. The Tulip tree leaf Gall-fly (*Diplosis liriodendri* O. S.). (Insect Life, II).
107. ECKSTEIN. 1891. Pflanzengallen und Gallenthiere. (Zool. Vorträge von Marschall. Leipzig).
108. ENOCK (Fr.). 1891. The life-History of the Hessian Fly, *Cecid. destructor*. (Trans. of the Entomological Society of London, p. 329-366, pl. XVI).
- 108 bis. — 1888. Parasites of the Hessian Fly. (Entomologist, XXI, p. 202-203).
109. FABRICIUS. 1781. Species Insectorum. Hamburg, t. II.
110. — 1794. Entomologia systematica. Hafniae, t. IV.
111. — 1805. Systema Antliatorum. Brunsvigae.
112. FELT (E.-PORTER). 1897. Antennal structure of certain Diplosids. (Psyche. Cambridge, t. VIII, p. 3-5, pl. I).
113. FITCH (ASA). 1844. Insects of the Genus *Cecidomyia*. (Amer. Journ. Sc. et Agric., t. I, p. 255-269).
114. — 1845-1846. An essay upon the Wheat Fly and some species allied to it. (Transact. of the New-York State Agr. Soc. Albany, t. VI).
115. — 1846-1847. The Hessian Fly, its history, character, transformation and habits. Albany.

116. FITCH (ASA). 1859. Reports on the noxious, beneficial and other insects of the State of New York, t. I cont. 1 and 2. Rep. Albany 1856; t. II, cont. 3., 4 and 5 Rep. Albany, 1859.
117. — — Sixth report on the noxious and other insects of the State of New York. (Trans. N. Y. St. Agric. Soc., t. XIX, p. 587-598).
- 117 bis. FITCH (E.-A.). 1880. British Gall-Gnats. (The Entomologist, XIII, p. 145. 146-154).
118. — 1883. Galls on *Viola* and *Juniperus*. (Proceed. Ent. Soc. London, p. v, fig.).
119. FLETCHER (J.). 1898. The Hessian Fly attacking Timothy Grass. (The Canadian Entomologist., t. XXX, 2).
120. FOCKEU (H.). 1889. Première liste des galles observées dans le Nord de la France. (Revue biologique du Nord de la France, t. I, 20 p.).
121. — — Contribution à l'histoire des galles. Lille, 110 p. et 22 fig.
122. — 1890. Deuxième liste des galles observées dans le Nord de la France. (Revue biologique du Nord de la France, t. II, 24 p.).
123. — — Galles observées dans le Nord de la France. Supplément. (Ibid., t. III, 7 p.).
124. — — Note sur la galle de l'*Hormomyia fagi*. (Ibid., 11 p. avec 4 fig.).
125. — 1896. Recherches anatomiques sur les galles. Étude de quelques Diptéroécidies et Acarocécidies. Lille, 162 p. et 12 pl.
126. FOCILLON. 1852. Insectes nuisibles au Colza. (Annales de l'Institut agronomique).
127. FONSCOLOMBE (BOYER DE). 1832. Monographia Chalciditum. (Ann. des Sciences naturelles, Paris, t. XXVI, p. 285, 288, 295 et 296).
128. FORBES (S.-A.). 1883. 13th Report of the State Entom. on the noxious and beneficial Insects of the State of Illinois. (2 Ann. Rep. for 1883. Springfield).
129. — 1884. 14th Report of the State Entom., etc. (Ibidem, p. 38-50).
130. — 1887. Contribution to a knowledge of the Hessian Fly. (Office of the State Entomologist of Illinois, p. 45-61).
131. 1890. A second Contrib. to a Knowledge of the Hessian Fly (15th

Report of the State Entomologist on the noxious and beneficial Insects of the State of Illinois).

132. FORBES (S.-A.). 1891. Additional notes on the Hessian Fly. (17th Report, etc., p. 54-63).
133. FOREL. 1866-1868. Notes sur quelques Insectes nuisibles au Colza dans le canton de Vaud. (Bull. Soc. vaud. Sc. natur., t. IX, p. 72).
134. FRANCK (B.). 1881. Die Krankheiten der Pflanzen. Breslau.
135. — 1893. Ein neuer Rosenfeind, *Clinodiplosis oculiperda* Rbs. (Gart. Fl. 42. p. 676).
136. FRAUENFELD (VON). 1855. Beitrag zur Insectengeschichte. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, t. V, p. 13-22 et Sitzungsberichte, p. 40).
137. — — Beobachtungen über Insecten metamorphosen. (Ibid., p. 149-152).
138. — — Sitzungsber. Akademie der Wissensch. Wien, p. 261-262.
139. — 1856. Die Linsengallen der österreichischen Eichen. (Bull. Soc. nat. Moscou, t. XXIX, p. 293-405, pl. IV).
140. — 1858. Verhandl. zool. bot. Ges. Wien, p. 255.
141. — 1859. Notizen über die Fauna Hongkongs und Shanghais. (Sitzber. Acad. Wiss. Wien., t. XXXV, p. 241-272).
142. — — Ueber exotische Pflanzenauswüchse, erzeugt von Insecten. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, t. IX, p. 319-332; pl. VI-VII).
143. — 1860. Verh. zool. bot. Ges. Wien, p. 91 et p. 167.
144. — 1861. Beitrag zur Kenntniss der Insecten-Metamorphose aus dem Jahre 1860. (Ibid., XI, p. 163-174, pl. II, D).
145. — 1862. Beitrag zur Insecten-Geschichte aus dem Jahre 1861. (Ibid., t. XII, p. 1171-1178).
146. — 1863. Beitrag zur Metamorphosen-Geschichte. (Ibid., t. XIII, p. 1223-1240; 1169 et 2233-2234).
147. — 1865. Ueber Gallmückenlarven, welche mit Phytoptiden auf *Evonymus* leben. (Ibid., t. XV, p. 898).
148. — — Eine Galle auf den Blättern von *Tilia grandifolia*. (Ibid., p. 535-536).
149. — — Bericht über eine Sammelreise durch England, Schottland, Irland und die Schweiz. (Ibid., t. XV, p. 575-594).

450. FRAUENFELD (VON). 1866. Zoologische Miscellen, IX. (Ibid., p. 535-556).
451. — 1867. Zoologische Miscellen, XII. (Ibid., t. XVII, p. 781-783).
452. — 1868. Zoologische Miscellen, XIV. (Ibid., t. XVIII, p. 147-166).
453. — 1869. Sitzungsberichte. (Ibid., t. XIX, p. 60).
454. — 1870. Kurzer Bericht der Ergebnisse meines Ausfluges von Heiligenblut über Agram an den Plattensee. (Ibid., t. XX, p. 659-664).
455. FREEM (W.). 1888. On the Hessian Fly. (Rep. 37 Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. 1887, London, p. 767-768).
456. FRISCH. 1736. Beschreibung von allerley Insekten in Teutsch Land., part. IV et XII.
457. FROGGATT (W.-W.). 1890. Galle de Cécidomyie sur *Eucalyptus corimbosa*. (Proc. Linn. Soc. New South Wales for, 1899, t. IV, p. 1053).
458. FULLER (CLAUDE). 1896. Plant-Galls formed by Insects. (Agricultural Gazette of New South Wales, VII, 10, avec fig.
459. GADEAU DE KERVILLE. 1883. Mélanges entomologiques. 1^{er} mémoire. Énumération et description des galles observées en Normandie. (Bull. Soc. d. amis d. Sc. nat. Rouen, p. 1-43).
460. — — 2^e Mémoire. (Ibid., 24 p.).
461. — 1884. 3^e Mémoire. (Ibid., p. 341-388).
- GANIN. Voir HANIN.
462. GÉMIN. 1857. Notes pour servir à l'histoire des insectes nuisibles à l'agriculture. N. 2. Insectes qui attaquent les blés. (Mém. de la Soc. d'horticulture de la Moselle, Metz, 38 p.).
463. — 1860. Notes pour servir à l'hist. d. ins. nuisibles dans le départ. de la Moselle. Insectes qui vivent sur le poirier. (Bull. Soc. d'Hist. nat. Moselle, t. IX, p. 109-330).
464. GÉNÉ. 1833. Memoria per servire alla storia naturale di una *Cecidomyia* che vive sugli Iperici. (Mem. Acad. sc. Torino, t. XXXVI, p. 287-295, pl. XIII).
465. GEOFFROY (E.-L.). 1764. Histoire abrégée des insectes, Paris, t. II.
466. GERMAIN DE S'-PIERRE. 1853. Galles du *Poa nemoralis*. (Journal de l'Institut).

167. GERNET. 1867. Étude sur *Cecidomyia brachyntera*. S^t-Petersbourg, p. 1-16, pl. (texte russe).
168. — 1871. Rapport sur les galles des feuilles de Chêne envoyées de Crimée. (Horae Soc. entom. rossicae, VIII, Bull., p. iv-v).
169. GERVAIS. 1869. *Cynips vitis*. (Bull. Soc. ent. France, p. 43-44).
170. GIARD (A.). 1889. Sur la castration parasitaire de l'*Hypericum perforatum* par la *Cecid. hyperici* Br. et par l'*Erysiphe Martii* Lév. (Comptes Rendus des séances de l'Acad. d. Sciences, Paris).
171. — 1893. Note sur l'organe appelé *spatula sternalis* et sur les tubes de Malpighi des larves de Cécidomyies. (Bull. Soc. ent. Fr., p. LXXX-LXXXIV, fig. 1-3).
172. — — Sur *Hormomyia fagi*. (Ibid., p. CCXI-CCXLI).
173. — — Observations sur les Nématodes parasites de Cécidomyies. (Ibid., p. CCCXI).
174. — — Un genre nouveau et une espèce nouvelle de *Cecidomyiidae* : *Drisina glutinosa*. (Ibid., p. CCCXI-CCCXLIV).
175. — 1894. Communication sur *Cecidomyia destructor*. (Ibid., p. CXXXIX-CXLI).
176. — 1895. Note sur le genre *Octodiplosis*. (Ibid., p. CCCLV-CCCLVI).
177. — 1900. Sur l'existence probable de *Rhopalomyia Giralddii* K. et T. dans le Sud oranaïs. (Ibid., p. 260).
178. GIEBEL. 1869. Landwirthschaftliche Zoologie, Glogau.
179. GILLETTE (C.-P.). 1890-1891. A new Cecidomyiid infesting Box-elder (*Negundo aceroides*). (Proceed. of Iowa Acad. of Sciences, I, 2).
180. GIMMERTHAL. 1846. Zweiter Beitrag zur Dipterologie Russlands. (Bull. Soc. nat. Moscou, t. XIX, p. 3-82).
181. GIRAUD. 1859. Signalement de quelques espèces nouvelles de Cynipides et de leurs galles. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, t. IX, p. 337-374).
182. — 1861. Fragments entomologiques. II. Supplément à l'histoire des Diptères gallicoles. (Ibid., t. XI, p. 470-484, pl. XVII).
183. — 1863. Mémoire sur les Insectes qui vivent sur le Roseau. (Ibid., t. XIII, p. 1258-1263).
184. — — Description et biologie de trois espèces nouvelles du genre *Cecidomyia*. (Ibid., p. 1301-1306).

185. GIRAUD. 1868. Bull. Soc. ent. France, 4^e série, t. VIII, p. 112.
186. GISTEL. 1856. *Mysterien der europ. Insectenwelt*. Kempten.
187. GORRIE. 1829. On the Wheat Fly. (London's Mag. Nat. Hist., ser. 1, t. II, p. 323-324. — *Encycl. of Agric.* London, p. 820).
188. GOURREAU. 1859. Bull. Soc. ent. France, p. 244.
189. — 1862. *Les insectes nuisibles aux arbres fruitiers, aux plantes potagères, aux céréales et aux plantes fourragères*. Auxerre. Avec supplément, 1863.
190. GULLET. 1772. On the effects of Elder in preserving growing Plants from Insects and Flies. (Philos. Trans., t. LXII, p. 348-353).
191. HABERLANDT. 1864. *Cecidomyia destructor*, Weizengallmücke oder Weizenverheerer. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, t. XIV, p. 401-406).
192. HAGEN. 1860. Bericht über die in der Provinz Preussen von 1857-1859 schädlich aufgetretenen Insecten. (Stettin. Ent. Zeitg., t. XXI, p. 26-37).
193. HAGEN (H.-A.). 1880. The Hessian Fly not imported from Europe. (Canadian Entomologist, p. 197-207).
194. — 1884. The occurrence of the Hessian Fly in North America before the revolution. (Science, t. III, p. 432).
195. — 1886. Galls of *Cecidomyia liriodendri* O. S. (Canad. Entomol. XVIII, p. 159).
196. — 1885. Further material concerning the Hessian Fly. (Canad. Entom., t. XVII, p. 84-83).
197. — — On the Hessian Fly in Italy (Ibid., p. 129-131).
198. — 1890. On the relation of Fungi to Galls and to Larvae of *Cecidomyia* living in Galls. (Psyche, IV, p. 139).
199. VON HAIMHOFFEN. 1875. Beobacht. über die Blattgalle und deren Erzeuger auf *Vitis vinifera*. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, t. XXV, p. 801-810).
200. HALIDAY. 1833. Catalogue of Diptera occurring about Holywood in Downshire. (Entom. Mag. London, I, p. 143-180).
201. HANDLIRSCH (A.). 1885. Zwei neue Dipteren. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, p. 135-142, pl. V).

202. HANIN. 1865. ⁽¹⁾ Neue Beobachtungen über die Fortpflanzung der viviparen Dipteren-larven. (Zeitschr. f. wissensch. Zoologie, t. XV, p. 375-390, pl. XXVII).
203. HARDY. 1848. Gall on the Tansy, with a description of the Fly, which it is occasioned. (The Zoologist, London, p. 2166).
204. — 1850. On the effects produced by some Insects... upon Plants. (Ann. Mag. Nat. Hist., t. VI, p. 182-188).
205. — 1854. (Scotland Gardener).
206. HARKER (A.). 1890. On the Gall-Midges. (Proc. Colleswold. Nat. Field Club, IX, p. 220-228).
207. HARRIS (T.-W.). 1830. Extracts from paper entitled « Some account etc... by Thomas Say ». (New. Engl. Farmer, t. IX, p. 9).
208. — 1841. Wheat insects continued. (Ibid., t. XIX, p. 306-307).
209. — 1842. A Report on the insects of Massachusetts, injurious to vegetation. (Silim. Amer. Journ. Sc., t. XLII, p. 380. — 1843, t. XLIII, p. 386-388).
210. — — The Hessian Fly. (New. Engl. Farmer, t. XX, p. 409-410).
211. — — A Treatise of the insects of New England, which are injurious to vegetation. Cambridge.
212. — 1860. Observations on the transformations of the Cecidomyiidae. (Proceed. Boston Soc. Nat. Hist., t. VII, p. 179-183).
213. — 1862. A Treatise on some of the insects injurious to vegetation. Boston.
214. — 1869. Entomological Correspondence. (Occasional papers Boston Soc. Nat. Hist., t. I).
215. HARTIG (TH.). 1837. Entomologische Notizen im Jahresber. über die Fortschritte der Forstwiss. und der forstl. Naturkunde, t. I, p. 640-646.
216. HARTIG (R.). 1893. Eine neue Gallmückenart, *Cecidomyia piceae*. (Forstl. Naturw. Zeitschr., II, p. 6-8; 274).
217. HAVENS. 1792. On the Hessian Fly. (Trans. Soc. N. York for the Promot. of. Agric. I, p. 89-107).

(1) C'est Ganin qu'il faudrait écrire.

218. HEEGER. 1851. Beiträge zur Naturgeschichte der Insecten. (Sitzbr. Acad. Wiss. Wien, t. VII, p. 203, pl. et p. 342, pl.).
219. — 1856. Neue Metamorphosen einiger Dipteren. (Ibid., t. XX, p. 335, pl. I).
220. HEER. 1865. Urwelt der Schweiz. Zürich.
221. HENSCHEL. 1875. *Cecidomyia Kerneri* n. sp. (Centralblatt für das ges. Forstwesen von R. Micklitz. Wien, I, p. 183-185, fig. 1-4).
222. — 1876. Leitfaden zur Bestimmung der schädlichen Obst- und Forstbaum-Insecten, p. 121-122.
223. — 1880. *Cecidomyia abietiperda* n. sp. (Centralblatt für das gesammte Forstwesen, Wien, t. VI).
224. — 1881. Ein neuer Forstschädling, die Fichtenknospengallmücke, *Cecidomyia piceae* n. sp. (Ibid., t. VII, p. 505-508).
225. HENSLOW. 1844. On *Cecidomyia tritici* (Rep. Brit. Assoc. Adv. Sc., 11 Meet., p. 72-73. — Journ. R. Agric. soc. engl., t. II, p. 22-24; et t. III, 1842, p. 36-40).
226. HERPIN. 1842. Mémoire sur divers insectes nuisibles à l'agriculture et plus partic. au froment, au seigle, à l'orge et au trèfle. (Mém. Soc. r. Agric. Paris).
227. HERRIK. 1844. A brief preliminary Account of the Hessian Fly und its parasits. (Silim. Amer. Journ., t. XLI, p. 153-158).
228. — 1844. Observations communicated at the request of the hon. Elsworth by Herrik. The Hessian Fly. (Rep. of the Comm. of the Comm. of Patents showing the operations of the Patent Office during the year 1844, p. 161-167).
229. VON HEYDEN. 1861. Aus meinen entom. Tagebüchern. (Herrich-Schäffer's Corresp. Blätt. für Sammler, Regensburg, t. II, p. 97-98).
230. — 1862. Gliederthiere aus der Braunkohle des Niederrheins, der Wetterau und der Rhône. (Meyer's Palaeontographia, t. X, p. 80).
231. HIERONYMUS G. 1884. Ueber Untersuchungen einiger Gallen aus Argentinien. (Jahresber. schles. Ges. f. vaterl. Cultur in Breslau, p. 271-272).
232. — 1890. Beiträge zur Kenntniss der europ. Zooecidien. (Ibid., Ergänzungsheft. 224 p.).
233. HOLMGREN (A.-S.). 1884. — On *Cecidomyia* auf *Salix*. (Entom. Tidsskr., t. V, p. 96 et 206).

234. HOWEL. 1856. On the wheat Fly. (Proc. Amer. Assoc. Adv. Sc., 7 Meet., p. 179-181).
235. INCHBALD (P.). 1860. (Entomologist's Weekly Intell., t. VIII.) Rose-Galls on the Willow. (p. 60-61); Gall-Gnats (p. 164); Yarrow Gall-Gnat (p. 195); *Cecidomyia Chamaedrys* (p. 196).
236. — 1861. (Ibid., t. X.) *Cecidomyia salicis* (p. 61); *Cecidomyia guleobdolontis* (p. 69); *Cecidomyia taxi* (p. 76); The Willow (p. 197).
237. — 1883. *Cecid. cardaminis* in England. (Entomologist, London, t. XVI, p. 194).
238. — 1885. A year's work among Gall-Gnats. (Ibid., t. XVIII, p. 36-38, 311-313).
239. — 1887. Notes on some Cecidomyidae. (Ibid., p. 34-36.)
240. INCHBALD and MEADE. 1886. A new Cecidomyid : *Cecid. muricatae* (Ibid., t. XIX, p. 152).
241. — 1888. *Lasioptera cerenlis* (The Entomologist, London, t. XXI, p. 193-197).
242. — 1887. The Hessian Fly in Great Britain. (The Entomologist, XX, p. 169-173).
243. JANET (Ch.). 1895. Remarque relative aux antennes des *Xylodiplosis*. (Bull. Soc. ent. Fr., p. cccLXXV).
244. — 1896. Sur les filets arqués des antennes des *Xylodiplosis*. (Ibid., p. 183-185, fig. 1-3).
245. JATTA (G.). 1896. Di una *Cecidomyia* dell' Olivo. (Agricoltore meridionale, IX, p. 148).
246. DE JOANNIS. 1858. — Note sur une galle de *Nasturtium palustre* D. C. (Ann. Soc. linn. Angers, p. 178).
247. JONSTON. 1657. Historia naturalis de insectis. Amstelodami.
248. KALTENBACH. 1874. Die Pflanzenfeinde aus der Klasse der Insecten. Stuttgart.
249. KARSCH (A.). 1855. Aus dem Leben einer Mücke (Natur und Offenbarung, t. I, p. 266-267).
250. KARSCH (F.). 1877. Revision der Gallmücken. Dissert. zur Erlangung der Doctorwürde. Münster i. W. 58 p. pl.
251. — 1878-1879. (Jahresbericht Westph. Prov. Ver. Münster).
252. — 1880. Neue Zooecidien und Cecidozoen. (Zeitschr. f. allgem. Naturw. Halle, p. 286-308, pl. VI-VII).

253. KARSCH (F.). 1881. Eine neue *Cecidomyia* aus der Umgegend Berlins. (Berliner Ent. Zeit., p. 227-231).
254. — 1887. Ueber eine Cecidomyide aus den Rhizomorphen des Kohlenreviers bei Burgk i. Sachsen. (Ent. Nachrichten, Berlin, p. 198).
- 254 bis. — 1889. Ein neuer Feind der Rosencultur. (Ibid., p. 58).
255. KERNER (A. VON). 1890. Veränderung der Gestalt durch Gallenerzeugende Thiere. (Pflanzenleben, p. 520-546).
256. KERTESZ. 1898. *Asphondylia Rubsaameni* n. sp. (Termész. Füzetek, t. XXI, p. 241-244, pl. I-II).
257. KESSLER (F. 1884.). Zur Frage, ob Getreiderost oder die Hessianfliege die Erkrankung der Roggensaaten im Herbste hervorruft. (Landwirthsch. Zeitg. und Anz. f. d. Rgbz. Cassel, p. 145-149).
258. KIDD. 1868. Notes on the gall of *Spiraea ulmaria*. (Ent. monthl. Mag., t. IV, p. 233).
259. KIDD and MÜLLER. 1869. A List of Gall-bearing British Plants. (Ibid., t. V, p. 118-216).
260. KIEFFER (J.-J.). 1886. Suite aux Contrib. à la Faune et à la Flore de Bitche. (Bull. Soc. Hist. nat. Metz, Separ.; et 1887, p. 1-48).
261. — — Beschreibung neuer Gallmücken und ihrer Gallen. (Zeitschr. für Naturw. Halle, p. 326-333).
262. — 1887. Ueber Gallmücken und Mückengallen. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, p. 95-114, pl.).
263. — 1888. Beiträge zur Kenntniss der Gallmücken. (Entom. Nachrichten, Berlin, p. 200-205, 243-249, 262-268, 310-314).
264. — 1889. Neue Beiträge zur Kenntniss der Gallmücken. (Ibid., p. 149-156, 171-176, 183-194, 208-212).
265. — — Zwei neue Gallmücken. (Wiener Ent. Zeitung, p. 262-264).
266. — 1890. Ueber Gallen und Gallmücken aus Blütenköpfen verschiedener Compositen. (Entom. Nachrichten, Berlin, p. 27-32 et 36-38).
267. — — Die Gallmücken der *Tilia*-Arten. (Ibid., p. 193-197).
268. — — Die Gallmücken des Horn-Klee's (Wiener ent. Zeitung, p. 29-32).
269. — — Die Gallmücken des Besenginsters. (Ibid., p. 133-138).

270. KIEFFER (J.-J.). 1890. Ueber lothringische Gallmücken. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, p. 197-206).
271. — 1891. Die Zoocecidien Lothringens. Fortsetzung. (Ent. Nachrichten, Berlin, p. 220-224, 230-240, 252-256).
272. — — Zur Kenntniss der Weidengallmücken. (Berliner Ent. Zeitschr., p. 244-258, pl. IX, et 4 fig.).
273. — — Mittheilungen über Gallmücken. (Ibid., p. 259-266; 7 fig.).
274. — — Les Diptéroécidies de Lorraine. (Feuille des Jeunes Naturalistes, Paris, p. 181-192; 208-215.)
275. — 1892. Beobachtungen über Gallmücken mit Beschreibung einiger neuen Arten. (Wiener ent. Zeitung, p. 212-224, pl. I).
276. — — Die Zoocecidien Lothringens. 3. Fortsetzung. (Ent. Nachr. Berlin, p. 43-46, 59-64, 73-80).
277. — 1893. Troisième Contrib. à la Faune et à la Flore de Bitché. (Bull. Soc. Hist. nat. Metz, p. 1-34).
278. — — *Diplosis cilicrus* m. (Ibid., p. 35-37).
279. — — Ueber einige in Lothringen gesammelte Cecidien. (Ent. Nachr. Berlin, p. 21-24).
280. — 1894. Sur le rôle de la spatule sternale. (Ann. Soc. ent. Fr., p. 36-44).
281. — — Sur le groupe *Epidosis* (Ibid., p. 341-350, pl. 4 et 5).
282. — — Trois nouveaux genres du groupe *Diplosis* (Bull. Soc. ent. Fr., xxviii).
283. — — Communication sur le genre *Octodiplosis* Giard. (Ibid., p. CLXXIV).
284. — — Note préliminaire sur le genre *Campylomyza*. (Ibid., p. CLXXV-CLXXVI).
285. — — Genres nouveaux du groupe des *Diplosis*. (Ibid., p. CCLXXX).
286. — — Ueber die Heteropezinae. (Wiener ent. Zeitung., p. 200-212, pl. I).
287. — — Neuer Beitrag zur Kenntniss der Zoocecidien Lothringens. (Ent. Nachr. Berlin, p. 295-298).
288. — — Les œufs des Cécidomyies. (Ann. des Sc. nat. Rouen, p. 9, 40, 45-46, fig.).

289. KIEFFER (J.-J.). — Description de quelques larves de Cécidomyies. (Feuille des Jeunes Naturalistes, Paris, t. XXIV, p. 83-88, 119-123, 147-152, 185-189, avec 23 fig.).
290. — 1895. Beobachtungen über die Larven der Cecidomyinen. (Wiener Ent. Zeitg., p. 1-16).
291. — — Essai sur le groupe *Campylomyza* (Soc. Amis Sc. nat. Rouen (inachevé). — Miscellanea Entom. Narbonne, p. 46-47, 56-63, 73-79, 91-97, 109-113, 129-133, pl. I-II et 9 fig.).
292. — — Ueber Papillen der Gallmückenlarven (Wiener ent. Zeitg. p. 117-126).
293. — — Ueber moosbewohnende Gallmückenlarven. (Ent. Nachr. Berlin, p. 113-123).
294. — — Die Zoocecidien Lothringens, VI, Fortsetzung. (Ibid., p. 171-176).
295. — — Beobachtungen über die Nymphen der Gallmücken. (Wiener ent. Zeitg., p. 266-270).
296. — — Les nymphes des Cécidomyies. (Feuille des Jeunes Naturalistes, Paris, p. 164-168 et 9 fig.).
297. — — Observations sur les *Diplosis* et les *Oligotrophus*. (Bull. Soc. ent. Fr., p. LXX-LXXI).
298. — — Nouv. observ. sur le groupe des *Diplosis* et description de cinq genres nouveaux. (Ibid., p. cxcii-cxciv, fig.).
299. — — Une nouvelle Cécidomyie du Saule. (Ibid., p. clxxiv-clxxvi).
300. — — Nouv. observ. sur les antennes des Cécidomyies. (Ibid., p. cccxviii-cccix, fig. 1-3.)
301. — — Tableau dichot. pour la distinction des larves du genre *Dichelomyia* vivant sur le Saule. (Ibid., p. ccx-ccxi).
302. — — Diagnoses de deux Cécidomyies nouvelles. (Miscellanea Entom. Narbonne, p. 150).
303. — — Observations sur les ornements des antennes des Cécidomyies. (Feuille des Jeunes Naturalistes, Paris, 26^e année, p. 7-10 et 36, fig. 1-7).
304. — 1896. Quatre nouveaux genres du groupe *Diplosis* (Ibid., p. 4-5).
305. — — Division du genre *Oligotrophus*. (Ibid., p. 5).

306. KIEFFER (J.-J.). — Neue Mittheilungen über Gallmücken. (Wiener ent. Zeitg., p. 85-105).
307. — — Neuer Beitrag zur Kenntniss der *Epidosis* Gruppe. (Berliner Ent. Zeitschr., p. 1-44, pl. I-III).
308. — — Ueber die Unterscheidungsmerkmale der Gallmücken. (Ent. Nachr. Berlin, p. 67-77).
309. — — Diagnoses de quelques Diptères du groupe *Diplosis* recueillis en Lorraine. (Bull. Soc. ent. Fr., p. 14-15).
310. — — Remarques et observ. sur les filets arqués des antennes chez les Cécidomyides. (Ibid., p. 37, fig. 1-2).
311. — — Sur les Cécidom. du Saule; description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle. (Ibid., p. 188-189).
312. — — Diagnose de trois Cécidomyies nouvelles. (Ibid., p. 216-218, fig.).
313. — — Diagnose de deux espèces nouvelles de Cécidomyies. (Ibid., p. 236-237).
314. — — Sur les transformations de certains organes chez les larves de Cécidomyies. (Ibid., p. 237-238, fig.).
315. — — Diagnose d'une nouvelle Cécidomyie. (Ibid., p. 233).
316. — — Observations sur les *Diplosis* et diagnose de cinq espèces nouvelles. (Ibid., p. 382-384).
317. — 1896-1899. Zoocécidies d'Europe. (Miscellanea Entomologica, Narbonne, t. IV-VII).
318. — 1897. Note sur *Cecid. baccarum* et *Cecid. hypogaea*. (Bull. Soc. ent. Fr., p. 261).
319. — — Diagnoses de Cécidomyies nouvelles du genre *Perrisia* Rond. (Ibid., p. 300-301).
320. — — Meine Antwort an den Privatdocenten Herrn Dr Karsch und an den Herrn Zeichenlehrer Rübsaamen, mit Beschreibung neuer Gallmücken, Trier., 21 p.
321. — — Nachtrag zu den Zoocecidien Lothringens. (Berliner ent. Zeitschr., p. 17-24).
322. — — Monographie des Cynipides d'Europe et d'Algérie : Cécidomyies dans les galles de Cynipides (Spécies des Hyménoptères d'André).

323. KIEFFER (J.-J.). 1898. Synopse des Cécidomyies d'Europe et d'Algérie. (Bull. Soc. Hist. nat. Metz, p. 4-63).
324. — 1899. Enumération des cécidies recueillies aux environs des Petites-Dalles, avec description de deux Cécidomyies nouvelles. (Bulletin de la Soc. des Amis des Sciences naturelles, Rouen, p. 87-105).
325. — — Ueber *Dicerura* Kieff. (*Iridomyza* Rbs.) Wiener ent. Zeit., p. 165-170, fig. 1-4).
326. — 1900. Ueber Krallen und Haftballen der Dipteren. (Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, Neudamm, p. 337-340, pl.).
327. — — Suite à la Synopse des Cécidomyies d'Europe et d'Algérie (Bull. Soc. Hist. nat. Metz).
328. KIEFFER et TROTTER. 1900. Description d'une Cécidomyie nouvelle de Chine. (Bull. Soc. entom. France, p. 233, fig.).
- 329 KIRBY. 1797. Letter to Mr. Marsham containing observations on the insects that infested the corn in the year 1795. (Trans. Linn. Soc. London, 1797, t. III, p. 246-249).
330. — 1798. History of *Tipula tritici* and *Ichneumon tipulae*, with some observations upon other Insects that attend the wheat. (Ibid., t. IV, p. 230-239, fig.).
331. — 1800. A continuation of the history of *Tipula tritici*. (Ibid., t. V, p. 96-111, pl.).
332. — 1828. Some account of the Hessian Fly. (London's Mag. Nat. Hist., t. I, p. 227-228, fig., et 1829, t. II, p. 292).
333. KIRCHNER. 1855. Die Gallenauswüchse des Budweiser Kreises, nebst nomineller Angabe der Gallenerzeuger und deren Schmarotzer. (Lotos, t. V, p. 127-137, 157-161, 236-244).
334. KLIPPERT. 1858. Animale Parasiten, welche den Weizen afficiren. (12. Jahresber. Ohio Staats-Ackerbaurath, p. 702-723, fig.).
- 334 bis. KÖPPEN (FR.-TH.). 1880. Die schädlichen Insecten Russlands. St-Petersburg, 527 p. et 1 pl.
- 335 KOLLAR. 1837. Naturgeschichte der schädlichen Insecten in Beziehung auf Landwirthschaft und Forstcultur. Wien.
336. — 1850. Naturgesch. der Zerr-Eichen-Saummücke (*Lasioptera Cerris*) eines schädlichen Forstinsekt. (Denkschr. Acad. Wiss. Wien, t. I, p. 48-50, fig.).

- 336 bis. KOLLAR. 1858. Die Tamarisken-Gallmücke : *Cecidomyia tamaricis* Koll. (Wiener entom. Monatschr., t. II, p. 169).
337. KRAHE (J.-A.). 1886. Die Weidenfeinde, Aachen.
338. KRIECHBAUMER. 1875. Zwei neue Gallen. (Ent. Nachr. Berlin, p. 157-158).
339. KRONFELD (M.). 1888. Ueber vergrünte Blüthen von *Viola alba* Bess. (S. Acad. Wien. Mathem. Naturw. Cl., t. 97, p. 58-67).
340. KUNSTLER. 1864. Ueber Getreide- Verwüster. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, t. XIV, p. 407-416).
341. — — Beitr. zur Kenntniss der Land- oder Forstwirthschaft schädlichen Insecten. (Ibid., p. 779-784).
342. — 1871. Die unseren Kulturpflanzen schädlichen Insecten, Wien.
343. LABOULBÈNE. 1857. Métamorphoses de la *Cecidomyia papaveris* Winn. et remarques sur plusieurs espèces du genre *Cecidomyia*. (Ann. Soc. ent. Fr., sér. 3, t. V, p. 565-585, pl. XII).
344. — 1873. Métamorphoses de la Cécidomyie du Buis. (Ibid., sér. 5, t. III, p. 313-326, pl. IX).
345. — 1893. Communication sur la spatule sternale et sur les tubes de Malpighi des larves de Cécidomyies. (Bull. Soc. ent. Fr., p. CLXXIV-CLXXV).
346. — 1894. Note sur *Cecidomyia destructor*. (Ibid., p. cxi).
347. — — Note sur la Cécidomyie de l'Avoine. (Bull. des séances de la Soc. nat. d'Agric. de France, séance du 13 juin, p. 425-426).
348. — — Sur les métamorphoses de la *Cecidomyia destructor* et sur le puparium ou l'enveloppe de la larve avant la transformation en chrysalide. (Académie des Sciences. Comptes rendus, n° 4).
349. LAGERHEIM (G.). 1893. Ueber Dipteroceciden auf *Carex*-Arten (Tromsø Museums Aarshefter, 16, p. 168-174).
350. LAMPA (SVEN). 1891. Hoetemygan, *Cecidomyia tritici*. (Entom. Tidskrift., p. 113-115, pl. 6).
351. LATREILLE. 1805. Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes. Paris.
352. — 1806. Genera Crustaceorum et Insectorum. Paris.
353. LEDERMULLER. 1763. Mikrosk. Gemüths- und Augen-Ergötzung.

Nürnberg, p. 432, pl. 68, fig. g-k. (Description et fig. d'un *Diplosis* de cônes de Pins).

354. LETZNER. 1885. *Ceutorrhynchus assimilis* und *Cecidomyia brassicae*. (62. Jahresber. Schles. Ges. Vaterl. Cultur., p. 347).
355. LEUCKART. 1865. Die ungeschlechtliche Fortpflanzung der Cecidomyidenlarven. (Archiv. für Naturg., t. XXXI, p. 286-303; Ann. and Mag. Nat. Hist., ser. 3, t. XVII, p. 161-173, pl.).
356. — — Ueber die Fortpflanzung der viviparen Cecidomyidenlarven. (Nachr. ges. Wiss. und G. A. Univers. Göttingen, p. 215-219).
357. — 1886. (Zoologischer Anzeiger, p. 745).
358. LICHTESTEIN (J.). 1869. *Gynips vitis* (Bull. Soc. ent. France, p. 43-44).
359. — 1877. Notes pour servir à l'histoire des Insectes du genre *Phylloxera*. (Annales agronomiques, Paris, t. III, n° 4).
360. — 1884. Tableau synoptique et catalogue raisonné des maladies de la vigne. (Progrès Agric. Vitic. Montpellier, 20 p.).
361. LICHTESTEIN et PLANCHON. 1870. Instructions pratiques adressées aux viticulteurs, p. 46.
362. LIEBEL (R.). 1886. Die Zooecidien und ihre Erzeuger in Lothringen. (Zeitschr. f. ges. Naturw. Halle, p. 531-574).
363. — 1889. *Asphondylia Mayeri* n. sp. Ein neuer Gallenerzeuger des Pfriemenstrauches. (Entom. Nachr. Berlin, p. 265-267).
364. — — Dipterologischer Beitrag zur Fauna des Reichslandes. (Ibid., p. 282-286).
365. — — Ueber Zooecidien Lothringens. (Ibid., p. 297-307).
366. — 1892. Die Zooecidien der Holzgewächse Lothringens. Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde. München.
367. LINDEMANN. 1880. Zwei neue dem Getreide schädliche Insecten Russlands. (Bull. Soc. natural. Moscou, p. 42; 126-138).
368. — 1881. Ueber *Eurytoma hordei*, *albinervis*, *Lasioptera cerealis* und ihre Feinde. (Ibid., p. 9-12).
369. — 1877. Die Hessenfliege, *Cecil. destructor*, in Russland. (Ibid., p. 378-441).
370. — — Die Pteromalinen der Hessenfliege. (Ibid., n° 4).

371. LINDEMANN. 1888. *Cecidomyia hierochloae*, eine neue Gallmücken-Art. (Ent. Nachr. Berlin, p. 50-52).
372. — — Ueber das Vorkommen der Hessenfliege an wildwachsenden Gräsern. (Ibid., p. 242-243).
373. LINNÉ. 1761. Fauna Suecica. Stockholm.
374. — 1788. Systema naturae. Leipzig.
375. LINTNER (J.-A.). 1879. Clover seed fly, a new insect pest. (American Naturalist, 13, p. 490; Canadian Entomologist, 11, p. 44-45; Annual Report of the entomological Society of Ontario, p. 28-30).
376. — — On *Cecidomyia leguminicola*. (Canadian Entomologist, 11, p. 121-124).
377. — — Report on some injurious Insects of the year 1878. (New York State agricultural Society, 38th Annual Report, p. 61-72).
378. — 1880. Report on some injurious Insects of the year 1879. (New York State agric. Soc., 39th Annual Report, p. 35-55).
379. — 1883. *Platygaster* larva destroying galls of *Cecidomyia salicis-batatus* (Psyche, 4, p. 79).
380. — 1886. Thrips destroying eggs of *Cecid. leguminicola*. (2th, Report on the injurious and other Insects of New York. Albany, p. 31).
381. — 1887. *Cecidomyia destructor* Say, hessian fly. (Report of the state entomologist to the regents of the University of the State of New-York, for the year 1885, 39th Annual Report, p. 103).
382. — 1888. Chalcid parasites of *Cecidomyia betulae* Winn. (On the injurious and other insects of the state of New York. (Albany, 4th Report, p. 27).
383. — — *Cecidomyia balsamicola* n. sp. and its gall. (Ibid., p. 60-63).
384. — — *Lasioptera vitis* O. S. and its gall. (Ibid., p. 63-67).
385. — 1889. Clover seed midge, *Cecidomyia leguminicola* Lint. (Ibid., 5th Report, p. 262).
386. — — Black knot of the plum tree and its guests : *Diplosis septemmaculata* (Ibid., p. 280).

1. Nous ne citons pas ici les journaux dans lesquels Lintner a publié des observations sur les Cécidomyies; ce sont surtout: *Country Gentleman*; *Albany evening Journal*, *New England homestead*, etc.

387. LINTNER (J.-A). 1889. Hessian fly, *Cecidomyia destructor* Say. (Ibid., p. 263).
388. — 1891. Pear midge, *Diplosis pirivora* Ril. in New-York. (Canadian Entomologist, 23, p. 224).
389. — — *Cecidomyia balsamicola*. (On the injurious and other insects of the state of New York. Albany, 7th Report, p. 307).
390. — — *Cecidomyia* sp. in jumping gall. (Ibid., p. 308).
391. — 1892. *Diplosis pirivora*. (Ibid., 8th Report, p. 140-152).
392. — 1895. Idem. (Ibid., 10th Report, p. 386).
393. — 1896. *Cecidomyia betulae* (Ibid., 11th Report, p. 162-165).
394. — — *Diplosis cucumeris*, melon vine midge. (Ibid., p. 165-168).
395. — — *Diplosis setigera*. (Ibid., p. 168-170).
396. — 1897. *Cecidomyia leguminicola*. (Ibid., 12th Report, p. 359).
397. LLOY. 1863-1864. I Ditteri distribuiti secondo un nuovo metodo di classificazione naturale. (Atti Inst. Venet., t. IX, p. 499-504).
398. LIPOVNICZKY (G.). 1884. Sur les dégâts de la *Cecid. destructor* dans le départ. de Tolna. (Rovart. Lapok, t. I, p. 231-232).
399. LOEW (H.). 1844. Beschreibung zweier merkwürdigen neuen Dipteren. (Stettiner ent. Zeitg., t. V, p. 321-326).
400. — 1845. Beschreibung einiger vom Herrn Pastor Hoffmeister zu Nordhausen aufgefundenen merkwürdigen Dipteren. (Ibid., t. VI, p. 394-402).
401. — 1847. Mittheilungen über die Verwandlungsgeschichte einiger Insecten und über ihren Haushalt auf Pflanzen. (Allg. deutsch. naturhist. Zeitg., t. II, p. 287-304).
402. — 1850. Dipterologische Beiträge, Theil IV, Posen, 40 p. avec pl.).
403. — — Ueber den Berstein und die Bersteinfauna, Berlin.
404. — 1851. Zur Kenntniss der Gallmücken. (Linnaea Entom., t. V, p. 370-384).
405. — 1858. Ueber die den Roggen in den Provinzen Schlesien und Posen verwüstende Fliegenmade. (Zeitschr. f. Entomol. d. Ver. f. schles. Insectenk. Breslau, Jahrg. XII).
406. — 1859. Die neue Kornmade. Züllichau.
407. — 1864. Bericht über die lebendig gehörenden Dipterenlarven,

welche in den letzten Jahren beobachtet worden sind. (Berliner ent. Zeitg., t. VIII, p. v-x).

408. Loew (H.). 1865. Notiz über eine neuere die lebendig gebarenden Dipterenlarven betreffende Publikation. (Ibid., t. IX, p. 270).
409. — 1870. Pflanzenkrankheiten. (Schumacher's Jahrbücher der Landwirthschaft, III, p. 533).
410. Löw (Fr.) 1873. Zoologische Notizen. IV. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, t. XXIII, p. 139-144, pl. II).
411. — 1874. Beiträge zur Kenntniss der Gallmücken. (Ibid., t. XXIV, p. 143-162, pl. II).
412. — — Neue Beiträge zur Kenntniss der Cecidomyiden. (Ibid., p. 321-328).
413. — 1875. Ueber neue und einige ungenügend gekannte Cecidomyiden der Wiener Gegend. (Ibid., t. XXV, p. 13-32, pl. II).
414. — 1877. Ueber Gallmücken. (Ibid., t. XXVII, p. 1-38, pl. I).
415. — 1878. Mittheilungen über Gallmücken. (Ibid., t. XXVIII, p. 387-406, pl. IV).
416. — 1880. Ueber neue Gallmücken und neue Mückengallen. (Ibid., t. XXX, p. 31-40).
417. — 1883. Fälschlich für Gallenerzeuger gehaltene Dipteren. (Ibid., t. XXXIII, p. 217-220).
418. — 1885. Zwei neue *Cecidomyia*-Arten. (Berliner ent. Zeitschr., t. XXIX, p. 109-112).
419. — — Beiträge zur Kenntniss der gallenerzeugenden Cecidomyiden. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, t. XXXV, p. 483-510, pl. XVII).
420. — — Bemerkungen über Weyenberg's *Lasioptera Hieronymi*. (Ibid., p. 511-514).
421. — 1886. Cecidiologische Notizen. (Ibid., t. XXXVI, p. 97-102).
422. — 1887. Die Weinblattgallmücke. (Allgem. Wein-Zeit. Wien, Jahrg. 4, p. 80).
423. — 1888. Mittheilungen über neue und bekannte Cecidomyiden. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, t. XXXVIII, p. 231-246).
424. — — Norwegische Phytopto- und Entomocecidien (Ibid., p. 537-548).

425. LOEW (H.). 1889. Beschreibung zweier neuen Cecidomyiden-Arten. (Ibid., t. XXXIX, p. 201-204).
426. — — Die in den taschenförmigen Gallen der Prunus-Blätter lebenden Gallmücken und die *Cecidomyia foliorum* H. Lw. (Ibid., p. 535-542).
427. LÜSTNER (G.). 1900. Ueber eine neue Gallmücke des Weinstockes, *Clinodiplosis vitis* n. sp. (Berliner entom. Nachrichten, p. 6, fig.).
428. MACQUART. 1826. Insectes Diptères du Nord de la France. (Mém. Soc. Sciences. Agric. et Arts. Lille, p. 59-224).
429. — 1831. Les arbres et les arbrisseaux d'Europe et leurs insectes. (Ibid., p. 174-530).
430. — 1834. Supplément aux arbres et arbrisseaux et leurs insectes. Lille.
431. — 1834. Les plantes herbacées d'Europe et leurs insectes. (Mém. Soc. Sciences, Agric. et Arts, Lille).
432. — 1855. Suite du travail précédent. (Ibid.).
433. — 1856. Fin du travail précédent. (Ibid.).
434. MÄKLIN. 1868? Bericht über die Vermehrung der Cecidomyidenlarven und die darauf bezüglichen Arbeiten. (Ofers Finska Vetens. Soc. Förhand., t. VIII, p. 22-32).
435. MALPIGHI. 1679. De Gallis.
436. MANNERHEIM. 1823. Mémoire entomologique sur une nouvelle espèce de Cécidomyie. (Mém. Soc. natural. de Moscou, t. VI, p. 180-184, pl. XX).
437. MARCHAL (P.). 1894. Sur les Diptères nuisibles aux céréales. (Comptes rendus des séances de l'Acad. des Sciences, séance du 10 sept., 3 p.).
438. — — Communication sur une Cécidomyie nuisible aux Avoines. (Bull. Soc. ent. Fr., p. CLXXIV).
439. — 1895. Observations biologiques sur *Cecidomyia destructor*. (Ibid., p. CXXXIV-CXXXVI).
440. — — La Cécidomyie de l'Avoine, *Cecidomyia avenae* n. sp. (Ibid., p. CCLXII-CCLXIV).
441. — — Sur *Cecidomyia destructor*. (Ibid., p. CCCII-CCCH).
442. — — La Cécidomyie de l'Avoine, *Cecidomyia avenae* n. sp.

(Comptes Rendus des séances de l'Acad. d. Sc. Paris, séance du 10 juin, 3 p.).

443. MARCHAL (P.). 1896. Sur deux Cécidomyies nouvelles vivant sur la Pomme de terre et le Lierre. (Bull. Soc. ent. Fr., p. 97-100, fig. 1-2).
444. — — Remarque sur la fonction et l'origine des tubes de Malpighi. (Ibid., p. 237-238).
445. — 1897. Notes d'entomologie biologique sur une excursion en Algérie et en Tunisie. (Mém. Soc. zool. de Fr., t. X, p. 5-25, pl. I).
- 445 bis. — — Sur les réactions histologiques et la galle animale interne provoquée chez une larve de Diptère (*C. destructor*) par un Hymén. paras. *Trichacis remulus*. (C. R. Soc. de Biologie, p. 129).
446. — — Les Cécidomyies des céréales et leurs parasites. (Ann. Soc. ent. Fr., t. LXVI, p. 1-105, pl. 1-8).
- 446 bis. — 1900. Notes biologiques sur des Chalcidiens et Proctotrypi-
des obtenus par voie d'élevage. (Ibid., p. 102-112).
447. MARNO. 1869. Die Typen der Dipteren-Larven als Stützen des neuen Systems. (Verh. zool. bot. Ges., t. XIX, p. 319-326, fig.).
448. MARSHAM. 1798. Further observations of the wheat insects. (Trans. Linn. Soc. London, t. IV, p. 224-229).
449. MARTEL. 1897. Liste des galles ou galloïdes recueillis aux environs d'Elbeuf. (Bull. Soc. Sc. nat. d'Elbeuf, 1891-1896 et 1897).
450. MARTEN (J.). 1893. Description of a new species of Gall-making Diptera, *Lasioptera Muehlenbergiae* n. sp. (Bull. Ohio Exper. Stat., I, p. 153-156).
451. — 1889. Description of *Asphondylia helianthi-globulus*. (Psyche, V, p. 102).
452. MARTY (P.). 1894. De l'ancienneté de la *Cecidomyia fagi*. (Feuille des Jeunes Naturalistes, Paris, t. XXIV, p. 173, fig.).
453. MASKELL (W.-M.). 1889. On some Gall-producing Insects in New-Zealand. (*Cecidomyia oleariae* n. sp. dans des galles de feuilles d'*Olearia furfuracea*, Trans. New-Zealand Inst. XXI, p. 253-8).
454. MASSALONGO (C.). 1890. Di un Dittero galligeno che vive sull' Olivo. (Bolletino del Naturalista, Siena, p. 912. Riv. ital. Sc. nat., X, 1891).

455. MASSALONGO (C.). 1891. Sulla rogna delle foglie dell' Olivo, Nota preventiva. (Bollet. agrario Veronese, Verona, p. 103-105).
456. — — La rogna delle foglie dell' Olivo. (Mem. dell' Acad. Medico-chirurgica di Ferrara, p. 1-16, pl. I-II).
457. — — Di alcuni Entomocecidii della Flora Veronese. (Bull. della Soc. bot. ital. p. 79-82).
458. — 1892. Entomocecidii italiani (Atti del Congresso botanico internazionale. Genova, 1893, p. 21-53).
459. — — Sopra un Dittero-cecidio dell' *Eryngium amethystinum* L. (Boll. Soc. bot. ital., p. 429-430).
460. — — Deformazione parassit. dei fiori di *Ajuga Chamarpitys*. (Ibid., p. 430-431).
461. — 1893. Entomocecidii nuovi o non ancora segnalati nella Flora italiana. (Ibid., p. 427-431).
462. — — Le galle nella Flora italiana. (Atti dell' Acad. di Agricolt., Arti et Comm., t. 49, ser. 3^a, Verona, 302 p. et 40 pl.).
463. — 1894. Nuovo Contributo alla conoscenza dell' Entomo-cecidio-logia italiana. (Boll. Soc. bot. ital., p. 79-89).
464. — 1895. Nuovo contributo alla conoscenze dell' Entomo-cecidio-logia ital. (Nuovo Giornale botanico italiano, nuov. ser., t. II, p. 45-57).
465. — 1897. Nuovo Contributo alla conosc. d. Entomo-cecid. ital. Terza Comunic. (Bull. Soc. bot. ital., p. 94-96; 137-144).
- 465 bis. — et Ross. 1898. Ueber sicilianische Cecidien. (Berichte. d. deutsch. bot. Ges., t. XVI, p. 403-406, pl. XXVII).
466. MATTIROLO (O.). 1896. Sopra alcune Larve micophage. (Bull. Soc. bot. ital., p. 180-183).
467. MAYR (G.). 1871. Die mitteleuropäischen Eichengallen in Wort und Bild. Wien.
468. MAYET (VALÉRY). 1890. Les insectes ampélophages. Paris.
469. MEADE (R.-H.). 1888. *Diplosis pirivora*, the Peargnat. (Entomologist, XXI, p. 123-124).
470. — 1889. Description of the Asch-cauliflower Gnat. (Ent. M. Magaz., XXV, p. 77).
471. MEADE (R. H.) et INCHBALD. 1886. *Cecidomyia muricatae* n. sp. (The Entomologist, London, p. 152).

472. MEADE (R.-H.) et INCHBALD. 1888. *Lasioptera cerealis* Lind. (Ibid., t. XXI, p. 197).
473. MECZNIKOFF. 1865. Ueber die Entwicklung der Cecidomyidenlarve aus dem Pseudovum. (Archiv. f. Naturgesch., t. XV, p. 304-310, pl. XII).
474. — 1866. Embryologische Studien an Insekten. (Zeitschr. f. wiss. Zool., t. XVI, p. 389-500, pl. 23-30).
475. MEIGEN. 1803. Versuch einer neuen Gattungseintheilung der europäischen zweiflügligen Insecten. (Illiger's Magaz., t. II, p. 259-281).
476. — 1804. Klassification und Beschreibung der europäischen zweiflügligen Insecten. Braunschweig, t. I.
477. — 1818. Systematische Beschreibung der bekannten europäischen zweiflügligen Insecten. Aachen, t. I.
478. — 1830. Idem., t. VI.
479. — 1838. Idem., t. VII.
480. MEIJERE (J.-C.-H. DE). 1899. Sur un cas de dimorphisme chez les deux sexes d'une Cécidomyie nouvelle, *Monardia van der Wulpi* n. sp. (Tijdschrift voor Entomologie, p. 140-152, pl. 9-10).
481. MEINERT (FR.). 1864. *Miastor metraloas*, yderligere oplysning om den Prof. Wagner nyligt beskrevne Insektlarve, some formerer sig ved spiredannelse. (Naturh. Tijds., 3, Raek, t. III, p. 37-43).
482. — — Weitere Erläuterungen über die von Prof. Wagner beschriebene Insektlarve, welche sich durch Sprossenhildung vermehrt. (Zeitschr. f. wiss. Zool., Leipzig, t. XIV, p. 394-399).
483. — 1865. On larvespirernes Oprindelse i Miastorlarven. (Naturhist. Tijdsskr., 3 Raek, t. III, p. 83-86).
484. — — Endnu et par ord om Miastor, tilligemed bemaerkninger om spiredannelsen hos en anden *Cecidomyia* Larve og om aeggets dannelse og udvinkling i dyreriget overhovedet. (Ibid., 3 Raek, t. III, p. 225-238).
485. — 1869-1870. Om en ny slaegt med ynglende Larveform of Cecidomyiernes Familie. (Ibid., 3 Raek, t. VI, p. 463-466).
486. — 1872. Om aeggets anlaeg og udvikling og om embryonets første dannelse i Miastorlarven. (Ibid., t. VIII, p. 345-378, pl. XII).

487. MEUNIER (FERN.). 1899. Sur les Diptères du Copal du Musée de Koenigsberg. (Miscellanea Entomologica. Narbonne, p. 128).
488. — — Revision des Diptères fossiles types de Loew conservés au Musée de Koenigsberg. (Ibid., p. 161).
489. MIK (JOS.). 1882. Ueber ein neues Gallinsect aus Nieder-Oesterreich. (Wiener ent. Zeitg., t. I, p. 265-269, fig. 1).
490. — — 1883. Ueber ein bisher noch unbekanntes Organ der Cecidomyiden-Larven. (Ibid., t. II, p. 40-41).
491. — — Eine neue Gallmücke. (Ibid., p. 209-216, pl. III).
492. — — 1884. Zur Synonymie von *Cecidomyia onobrychidis*. (Ibid., t. III, p. 215-217, fig. 1-2).
493. — — 1885. *Cecidomyia Beckiana* n. sp. auf *Inula Comyza*. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, t. XXXV, p. 137-146, pl. X, et fig. 1-4).
494. — — Ueber die Sternalpapillen bei Cecidomyiden-Larven. (Ibid., p. 331).
495. — — Ueber Zoocecidien auf *Taxus baccata* und *Euphorbia cyparissias*. (Wiener ent. Zeitg., t. IV, p. 65-66, pl. I).
496. — — Diptera des Gebietes von Hernstein in Nieder-Oesterreich und der weiteren Umgebung. (Beck's Fauna von Hernstein, II Theil).
497. — — 1886. Anmerkung zu Dr von Schlechtendal's Artikel « Ueber Zoocecidien auf *Taxus* und *Euphorbia*. » (Wiener ent. Zeit., t. V, p. 61).
498. — — Ueber *Diplosis brachyntera* Schw. (Ibid., p. 101-102).
499. — — *Cecidomyia Inebaldiana* n. sp. (Ibid., p. 317-318).
500. — — 1888. Ueber die Gallmücke, deren Larve auf *Lamium maculatum* Trieb-Gallen erzeugt. (Ibid., t. VII, p. 32-38, pl. I).
501. — — Zur Biologie einiger Cecidomyiden. (Ibid., p. 311-316, pl. IV).
502. — — 1889. *Cecidomyia Bergrothiana* n. sp. auf *Silene nutans*. (Ibid., t. VIII, p. 236).
503. — — Einige Bemerkungen zur Kenntniss der Gallmücken. (Ibid., p. 250-258, pl. III).
504. — — Zur Biologie von *Hormomyia capreae*. (Ibid., p. 306-308, pl. V).

503. MIK (Jos.). 1890. Drei Cecidomyidengallen aus Tirol. (Ibid., t. IX, p. 233-238, pl. I-II).
506. — 1891. Ueber Cecidomyiden. (Ibid., t. X, p. 1-3).
507. — — Eine Cecidomyiden-Galle auf *Biscutella saxatilis* in Italien. (Ibid., p. 309-310, pl. IV).
508. — 1892. Ueber zwei Cecidomyiden-Gallen aus Tirol. (Ibid., t. XI, p. 306-308, pl. III).
509. — 1893. Ueber *Asphondylia melanopus* Kieff. (Ibid., t. XII, p. 292-296, pl. III).
510. — 1894. Eine neue Cecidomyiden-Galle auf *Euphorbia palustris*, (Ibid., t. XIII, p. 297-298, pl. IV).
511. — 1895. Ueber eine bereits bekannte Cecidomyiden-Galle an den Blüten von *Medicago sativa* L. (Ibid., t. XIV, p. 287-290, pl. III).
512. — 1896. Ueber eine *Asphondylia*-Galle. (Ibid., t. XV, p. 209-212, pl. II).
513. — — Eine neue Cecidomyiden-Galle auf *Centaurea scabiosa*. (Ibid., p. 292-294, pl. IV).
514. — 1897. Vorkommen der *Lasioptera*-Galle auf *Eryngium amethystinum*. (Ibid., t. XVI, p. 34).
515. — — Ueber eine Gallmücken-Larve in Harzgallen auf *Pinus*. (Ibid., p. 37).
516. — — Einiges über Gallmücken. (Ibid., p. 284-296, pl. IV).
517. — 1898. Altes und neues über Dipteren. III. Drei Cecidomyiden-Gallen vom Monte-Spaccato bei Triest. (Ibid., t. XVII, p. 200, 203, pl. II).
518. MOLLIARD (M.). 1895. Recherches sur les cécidies florales. (Ann. Sc. nat. Botan., sér. 8, t. 4, p. 67, pl. 3-14).
519. MONCREAFF. 1870-1871. Note on gall-makers and their parasites. (Newm. Entomologist. London, t. V, p. 239).
520. MOOR. (E. von). 1881. Zwei neue Feinde des Obstbaues. (Wiener illustr. Gartenzeitung, VI, p. 105-107 et p. 175).
521. MORRIS (Miss H.). 1841. Observations of the developpment of the Hessian Fly. (Proceed. of the Acad. of Nat. Sc. Philadelphia, t. I, p. 66-68).
522. — 1847. *Cecidomyia culmirola* Morr. (Ibid., t. III, p. 238).
523. — 1849. (Ibid., t. IV, p. 194).

524. MORRIS (MISS H.). 1843. On the *Cecidomyia destructor* or Hessian Fly. (Trans. Amer. Phil. Soc. Philadelphia, 2 ser., t. VIII, p. 48-52).
525. MOTSCHULSKY. 1856. Sur les insectes utiles et nuisibles (texte russe). St-Petersbourg.
526. MOUFET. 1634. Insectorum sive minimorum animalium theatrum. London.
527. MÜLLER (A.). 1869. On the spinning of the larva of a *Cecidomyia*. (Ent. Monthl. Mag., t. V, p. 220).
528. — — Observations on *Cecidomyia taxi*. (Ibid., p. 64).
529. — — On the habits of *Cecidomyia urticae* Perr. (Ibid., p. 137).
530. — 1869-1870. On the habits of *Cecid. salicina*, *marginemtorquens* and *salicis*. (Ibid., t. VI, p. 109-110).
531. — 1870. On the examination of living gall-midges. (Ibid., t. VI, p. 185).
532. — 1870-1871. A preliminary account of *Cecidomyia dorycnii* n. sp. (Ibid., t. VII, p. 76).
533. — — Synonymic notes on some species of *Cecidomyia*. (Ibid., p. 39).
534. — — Note on leaf-folding gall-midges. (Ibid., p. 88).
535. — — *Cecidomyia terminalis* H. Lw. pruning the topschoots of *Salix fragilis*. (Ibid., p. 89).
536. — — Note on galls from the Drachenfels. (Ibid., p. 254).
537. — 1871. On a the *Cecidomyia* forming galls on *Pteris aquilina*. (Ibid., t. VIII, p. 99-100).
538. — — The Gall-midge of the ash, *Cec. botularia*. (Newm. Entomologist. London, 1870-1871, t. V, p. 248-250).
539. — — Galls of *Campanula rotundifolia*. (Ibid., p. 295-296).
540. — 1872. Galls on *Glechoma hederacea* caused by *Cec. bursaria* Br. (Ibid., t. VI, p. 180).
541. — 1876. British Gall-Insects.
542. MÜLLER (F.). 1884. Fühler mit Beisswerkzeugen bei Mückenpuppen. (Kosmos, t. II, p. 300-302, fig. 1-4).
543. MUSE. 1832. On the Hessian Fly. (Sillim. Amer. Journ., t. XXI, p. 71-74, 153-158. — Isis, 1835, p. 91-92).
544. DE NABIAS. 1886. Les galles et leurs habitants. Thèse d'agrégation. Paris, 144 p.

545. NEWMANN. 1870-1871. Galls of the Maple, *Acer campestre*. (Newm. Entomologist. London, t. V, p. 13).
546. NÖRDLINGER. 1855. Die kleinen Feinde der Landwirthschaft. Stuttgart.
547. NOWICKI. 1874. Beobacht. über der Landwirthschaft schädliche Thiere in Galizien im Jahre 1873. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, t. XXIV, p. 356-358, p. 362 et suiv.).
548. ORMEROD (MISS EL.). 1886. The Hessian Fly in Great Britain. London, 23 p., 7 fig.
549. OSBORN. 1898. The Hessian Fly in the U. States. (Bull. U. S. Department of Agriculture, Division of Entomology, N. Ser., 16, 18).
550. VON OSTEN-SACKEN. 1861. Ueber die Gallen und andere durch Insecten hervorgebrachte Pflanzendeformationen. (Stettiner ent. Zeit., t. XXII, p. 405-420).
551. — 1862. Monographs of the Diptera of N. America. Washington, t. I.
552. — 1863. *Lasioptera* reared from a gall on the golden-rod. (Proceed. Ent. Soc. Philadelphia, t. I, p. 368-370).
553. — 1866-1867. Two new north american Cécidomyiæ. (Ibid., t. VI, p. 219-220).
554. — 1868-1869. Biological notes on Diptera. (Transact. Amer. Ent. Soc. 1868-1869, t. II, p. 299-303).
555. — 1870-1871. Biological notes on Diptera. (Ibid., t. III, p. 54-54, 245, 345-346).
556. — 1875. (Canad. Entomologist, p. 207).
557. — 1877. Western Diptera : Descriptions of new genera and species of Diptera from the region west of the Mississipi and specially from California. (Bulletin of the Survey, t. III. Washington, p. 189-354).
558. — 1886. Dipterologische Notizen. (Wiener ent. Zeit., V, p. 42).
559. — 1893. Zur Geschichte der sogenannten Brustgräte (Breast-bone) der Cécidomyiden. (Berliner ent. Zeitschr., p. 373-377).
560. — 1896. A *Cécidomyia* living in Pine-resin, *Diplosis resinicola*. (Ent. Nachr. Berlin, p. 343-345).
561. PACKARD. 1866-1867. On certain entomological speculations. (Proceed. Ent. Soc. Philadelphia, t. VI, p. 209-218).

562. PACKARD. 1870. Guide to the study of Insects. Salem.
563. — 1873. Our common Insects. Salem.
564. PACKARD (A.-S.). 1878. *Diplosis pini-rigidae* n. sp. (Annual Report of the U. St. Survey of the Territories for 1876. Washington, p. 527).
565. — 1881. Insects injurious to forest and shade trees. (Bull. U. St. Entom. Comm. Washington).
566. — 1884. The Hessian Fly, its ravages, habits and the means of preventing its increase. (3^d Report U. St. Entom. Comm., p. 198-248, 2 pl.).
567. — 1890. 5th Report of the U. St. Entomological Commission. Forest Insects. Washington, p. 188, 798-799).
568. PAGENSTECHER. 1864. Die ungeschlechtliche Vermehrung der Fliegenlarven. (Zeitschr. f. wiss. Zool., t. XIV, p. 400-416, pl. 39. 40).
569. PAGLION (UTTORIO). 1894. Zooecidii della Flora Avellinese. (Rivist Patolog. veget., III, p. 29-38).
570. PALLAVICINI MISCIATELLI (MANG.). 1895. Zooecidii della Flora italiana. (Boll. Soc. bot. ital. Firenze, p. 111-122).
571. PASSERINI. 1850. Notizie sopra due specie d'Insetti novici agli alberi una *Cecidomyia* alle foglie dei Cerri, ed i Bruchi o larve delle *Liparis salicis* ai piopi cipressini. (Nov. Ann. Sc. nat. Bologna, ser. 3, t. I, p. 475).
572. PEGLION. 1894. Zooecidii della Flora Avellinese. (Rivista Patol. veget. Avellino, t. III, p. 29-35).
573. PERAGALLO (A.). 1885. Études sur les insectes nuisibles à l'Agriculture. Nice, 183 p., 1 pl.
574. PERRIS. 1840. Observations sur les insectes qui vivent dans la galle de l'Ortie dioïque. (Ann. Soc. ent. Fr., t. IX, p. 401-406, pl. XI).
575. — 1855. Histoire des métamorphoses de divers insectes. (Mém. Soc. sc. Liège, t. X, p. 233-280).
576. — 1871. Insectes du Pin maritime. Diptères. (Ann. Soc. ent. Fr., sér. 4, t. X, p. 162-185).
577. — 1873. Promenades entomologiques. (Ibid., p. 69).
- 577 bis. — 1876. Nouvelles promenades entomologiques. (Ibid., p. 221).

578. PHILIPPI. 1865. Aufzählung der chilenischen Dipteren. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, t. XV, p. 595-782).
579. PIERRE. 1896. Une galle du Saule. (Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, t. IX).
580. PLANCHON et LICHTENSTEIN. 1870. Instructions pratiques adressées aux viticulteurs.
581. POSPELOW. 1898. Zur Lebensweise der Hessenfliege (Illustrierte Zeitschrift für Entomologie. Neudamm. p. 100-102).
- 581 bis. — 1899. Die Biologie der Hessenfliege und ihrer Parasiten. (Zool. Laborator. Moskau, Landwirth. Institut, p. 1-12, fig.).
582. PRILLIEUX. 1853. Galle du *Poa nemoralis*. (Ann. Sc. nat., Botan., 3^e série, t. XX, p. 191-196, pl. 17).
583. RATZBURG. 1844. Ueber den Bau und die Lebensweise zweier an der Kiefer lebenden Gallmücken-Larven. (Wiegmann. Archiv. f. Naturg., t. I, p. 233-247, pl. X).
584. — 1842. Dipterologische Mittheilung. (Stettiner ent. Zeitg., t. III, p. 93).
585. — 1844. Die Forstinsecten. Berlin, t. III.
586. — 1868. Die Waldverderbniss. Berlin, t. II.
587. RÉAUMUR. 1736-1740. Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes. Paris, t. II-V.
588. REUTER (E.). 1895. Zwei neue Cecidomyinen. (Acta societatis pro Fauna et Flora fennica, t. XI, N. 8, 15 p. et 2 pl.).
589. — — Berättelse öfver... Skadeinsecter. (Landbruksstyrelsens Meddelanden. Helsingfors, 1894, N. VII, 46 p.).
590. — 1897. Berättelse öfver Skadeinsecters uppträdande i Finland. (Ibid., N. XXI, 53 p.).
591. RILEY (C.-V.). 1871-1872. Reports on the noxious and beneficial Insects of Missouri. (3^d Rep., 1871; 4th Rep., 1872).
592. — 1873. Fifth Report on the noxious and beneficial Insects of Missouri, p. 114-119. (Contient la description de quatre espèces de galles de Cécid. sur *Vitis*).
593. — 1884. The Hessian Fly. (Americ. Natural., t. XVIII, p. 194-195).
- 593 bis. — 1880. Gall on Solidago leaves. (The American Entomologist, III, p. 278).

594. RILEY (C.-V.). 1884. Insects in relation to agriculture. (Encycl. britann. Americ., p. 135-142).
595. — 1895. On the parasites on the Hessian Fly. (Proceed. U. St. Nation Mus., t. VIII, p. 413-422, pl. 21).
596. — 1886. The Pear-Midge or Pear-Diplosis. (Ann. Report of the Department of Agriculture for the year 1885. Washington, p. 283-289, pl. VII).
597. — — The wheat-Midge. (Ibid., p. 318-349).
598. — 1887. Beschreibung einer den Birnen schädlichen Gallmücke. (Wiener entom. Zeitung, t. VI, p. 201. Traduction du N° 596).
599. — 1888. *Cecidomyia destructor* in New Zealand. (Insect Life, 1, p. 32).
600. — — Remarks on *Cecid. destructor* in Amerika. (Ibid., p. 107-108).
601. — — The Hessian Fly an imported Insect. (Canad. Entom., XX, p. 121-123).
602. RILEY and WALSH. 1868-1870. The American Entomologist and Botanist, t. I-II.
603. BONDANI (CAM.). 1840. Sopra alcuni nuovi generi d'insetti Ditteri. Memoria seconda per servire alla Ditterologia italiana. Annali dell' Accademia degli Aspiranti Naturalisti. Parma).
604. — 1843. Osservazioni sopra alcune larve d'insetti Ditteri viventi nel gambo dei cereali in Italia. (Nuovi Ann. Sc. nat. Bologna, t. IX, p. 151-159, pl. I).
- 604 bis. — 1846. Compendio della seconda memoria Ditterologica con alcune correzioni. (Ibid., ser. 2, t. VI, p. 361-376, pl. I).
605. — 1847. Osservazione sopra parecchie specie di esapodi afidicidi e sui loro nemici. (Ibid., t. VIII, p. 432-448).
606. — 1856. Dipterologiae Italicae Prodromus. Parma, t. I.
607. — 1860. Sugli insetti che concorrono alla fecondazione dei semi nelle *Aristolochia*. (Atti Soc. ital. Sc. nat. Milano, t. II, p. 133-135, pl. II, B).
608. — — Stirpis Cecidomyiarum genera revisa. (Ibid., p. 286-294, pl. V, D).
609. — 1864. Sopra tre insetti bialati che rodono il calmo dei cereali. (Ibid., t. VII, p. 187-190).

640. RONDANI (CAM.). 1865. *Cecidomyia frumentaria* Rond. (Ibid., p. 150-153).
641. — 1867. De speciebus duabus dipterorum generis *Asphondyliae*. (Ann. Soc. nat. Modena, t. II, p. 37-40, pl. VI).
642. — 1869. Di alcuni Insetti Ditteri che aiutano la fecondazione i diversi Perigonii. (Archiv. per la Zoologia, l'Anatomia e la Fisiologia, serie 2, t. I, p. 187-192).
643. — 1874. Degli insetti novici e dei loro parassiti. (Bull. Soc. ent. ital. Firenze, t. VI, p. 43).
644. ROSENHAUER 1860. Die Weizenverwüster. (Intelligenzbl. d. Univers. Erlangen. N, 62. Stettiner ent. Zeitg., t. XXI, p. 320).
645. VON ROSER. 1840. Erster Nachtrag zu dem im Jahre 1834 bekannt gemachten Verzeichnisse der in Württemberg vorkommenden zweiflügligen Insecten. (Correspondenzbl. württemberg. landw. Ver. Stuttgart, t. I, p. 49-64).
646. ROSTRUP (SOF.). 1896. Danske Zooecidier. (Vidensk. Meddel. fra den naturhist. Foren., 64 p.).
647. RUDSAAMEN (E.). 1889. Ueber Gallmücken und Gallen aus der Umgebung von Siegen. (Berliner ent. Zeitschr., p. 43-70).
648. — — Ueber Gallmücken aus mycophagen-Larven. (Ent. Nachr. Berlin, p. 377-382).
649. — — Beschreibung neuer Gallmücken und ihrer Gallen. (Zeitschr. f. Naturwiss. Halle, t. 62, p. 373-382).
650. — 1890. Die Gallmücken und Gallen des Siegerlandes. (Verh. d. nat. Ver. Bonn, Jahrg. 47, 5 Folge, Bd. VII, p. 18-58, pl. I-III).
651. — — Beschreibung einer an *Sanguisorba offic.* aufgefundenen Mückengalle und der aus dieser Galle gezogenen Mücken. (Wiener ent. Zeitg., p. 25-28).
652. — — *Cecidomyia pseudococcus* und ihre Lebensweise. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, p. 301-310, pl. VI. — Imago et nympha — Mœurs par Fr. Thomas).
653. — 1891. Ueber Gallmücken aus zooph. Larven. (Wiener ent. Zeitg., p. 6-16, pl. I, fig. 1-2).
654. — — Mittheilungen über Gall. aus dem Kreise Siegen. (Berliner ent. Zeitschr., p. 1-10, pl. I).
655. — — Drei neue Gallmücken. (Ibid., p. 43-52, fig. 1-8).

626. RUBSAAMEN (E.). 1891. Drei Gallmückenlarven. (Ibid., p. 381-392, pl. XIV).
627. — — Neue Gallmücken und Larven. (Ibid., p. 393-406).
628. — — Mittheilungen über neue und bekannte Gallen. (Zeitschr. f. Naturw. Halle, t. 64, p. 123-156, pl.).
629. — — Die Gallmücken und Gallen des Siegerlandes, II Theil. (Verh. d. nat. Ver. Bonn, Jahrg. 47, 5 Folge, t. VII, p. 231-264, pl. VIII).
630. — — Ueber die Zucht und das Präpariren von Gallmücken. (Ent. Nachr. Berlin, p. 353-359).
631. — 1892. Mittheilungen über Gallmücken. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, p. 49-62, pl. II et 13 fig.).
632. — — Die Gallmücken des königl. Museums. (Berliner Ent. Zeitschr., p. 349-441, pl. VII-XVIII).
633. — 1893. Vorläufige Beschreibung neuer Cecidomyiden. (Ent. Nachr. Berlin, p. 461-466).
634. — — Eine neue Gallmücke, *Asph. capparidis*. (Ibid., p. 363-366, 8 fig.).
635. — 1894. Ueber australische Zooecidien. (Berliner Entom. Zeitschr., p. 199-234, pl. X-XVI).
636. — 1895. Ueber Graspallen. (Ent. Nachr. Berlin, p. 4-17, 24 fig.).
637. — — Ueber Cecidomyiden. (Wiener Ent. Zeitg., p. 181-193, pl. I).
638. — — Cecidomyiden-Studien, I-II. (Ent. Nachr. Berlin, p. 177-192; 193-194; 257-263).
639. — 1896. Ueber russische Zooecidien und deren Erzeuger. (Bull. Soc. imp. natur. Moscou, p. 396-488, pl. XI-XVI).
640. — 1898. Grönländische Mycetophiliden, Sciariden, Cecidomyiden, Psylliden, Aphiden und Gallen. (Bibl. zool., 20 Heft, p. 103, Zool. Erg. Drygalski. Grönland-Expedit. VIII).
641. — 1898. Mittheilungen über neue und bekannte Gallen aus Asien, Afrika und Amerika. (Berliner entom. Nachr., p. 225-282.)
642. — 1899. Ueber die Lebensweise der Cecidomyiden. (Biologisches Centralblatt, p. 529-607).
- 642 bis. — — Ueber Gallmücken auf *Carex* und *Iris*. (Wiener ent. Zeit., p. 57-76, pl. I).

643. RUBSAAMEN (E.). 1900. Ueber Zooecidien von der Balkan-Halbinsel (Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, t. V, p. 248).
644. RUDOW. 1875. Die Pflanzengallen Norddeutschlands und ihre Erzeuger. (Archiv. d. Ver. f. Freunde der Naturgesch. in Mecklenburg, Jahrg. 29, p. 1-96).
645. — — Uebersicht der Gallenbildungen, welche an *Tilia*, *Salix*, *Populus*, *Artemisia* vorkommen, nebst Bemerkungen zu einigen anderen Gallen. (Giebel's Zeitschr. f. ges. Naturwiss., t. 44, p. 237-287).
646. — 1891. Einige Missbildungen an Pflanzen, hervorgebracht durch Insecten. (Zeitschr. für Pflanzenkrankheiten, I, p. 287-296 et 331-363).
647. — 1893. Ueber einige gallenbildende Insecten. (Societ. Entomologica, VIII, p. 16).
648. RÜHL (Fr.). 1886. Die Gallmücken. (Natur, XXXV, p. 158-159).
649. SAHLBERG (J.). 1892. *Cecid. strobil* en Skadeinsect uti nordens granskogar. (Societas pro Fauna et Flore fennica. Meddelanden, XVII, p. 14-16).
650. SAJO (K.). 1894. A Heszzenilégý. Die Hessenfliege. (Természettudományi Közlöny, p. 241 et s.).
651. SAUNDERS (W.). 1881. Various species of Cecidom. injurious to clover. (Rep. Ent. Soc. Ontario, p. 38-45).
652. SAUTER. 1817. Beschreibung des Getreideschänders, *Tipula cerealis*. Winterthur.
653. SAY. 1817. Some account of the insect known by the name of the Hessian Fly and of a parasitic insect that feeds on it. (Journ. Acad. nat. Sc. Philadelphie, t. I, p. 45-48, 63-64, pl. III).
654. — 1823. Descriptions of Dipterous Insects of the United States. (Ibid., t. III, p. 9-54).
655. — — Keatings narrative of an expedition to the source of St-Peters River, etc. Appendix, t. II, p. 268-378).
656. SCHENKLING (C.). 1899. *Asynapta lugubris* W. Die Flaumengallmücke. (Insectenbörse, 17^{er} Jahrg., p. 225, fig.).
657. SCHNER (R.). 1854. Dipterologische Fragmente. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, t. IV, p. 169-176).
658. — 1856. Anmerkungen zu Frauenfeld's Beitrag zur Insecten-Geschichte. (Ibid., t. VI, p. 215-224).

659. SCHNER (R.). 1864. Fauna Austriaca. Diptera, t. II.
660. — 1865. Ueber *Miastor metralous* Mein. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, t. XV, p. 87-88).
661. — 1868. Diptera der Novara-Expedition. Zool. Theil, t. II.
662. VON SCHLECHTENDAL. 1883. Ueber Cecidien (Jahresber. Ver. f. Naturkunde. Zwickau, 7 p., pl.).
663. — 1885. Beiträge zur Kenntnis der Pflanzengallen. (Ibid., 23 p., pl.).
664. — 1886. Ueber Zoocecidien auf *Taxus* und *Euphorbia*. (Wiener ent. Zeit., V, p. 61).
665. — 1891. Die Gallbildungen der deutschen Gefäßpflanzen. (Ibid.).
666. — 1892. Nachträge und Berichtigungen. (Ibid.).
667. — 1895. Zweiter Nachtrag. (Ibid.).
668. SCHMIDBERGER. 1833. Beiträge zur Obstbaumzucht und zur Naturgeschichte der den Obstbäumen schädlichen Insecten, Heft III. Linz.
669. SCHNEIDER (A.). 1885. Die Entwicklung der Geschlechtsorgane der Insecten. (Zoolog. Beiträge, I, p. 257-300).
670. SCHOLTZ. 1849. Ueber den Aufenthalt der Dipteren während ihrer ersten Stände. (Zeitschr. f. Ent. Ver. f. schles. Insectenk. Breslau. N. 9).
671. SCHRANK. 1776. Beiträge zur Naturgeschichte. Leipzig.
672. — 1781. Enumeratio Insectorum Austriae. Augsburg.
673. — 1803. Fauna Boica. Landshut, t. III.
674. SCHULZE (B.). 1883. Die Schädlinge der Korbweiden. Eger, 62 p.
- 674 bis. SCHWAEGRICHEN. 1835. Pfeil's krit. Blätter für Forst- und Jagdwissenschaft.
675. SCOPOLI. 1763. Entomologia carniolica. Wien.
676. SHIMER. 1867-1868. Description of a new species of *Cecidomyia*. (Transact. Amer. Ent. Soc., t. I, p. 181-182).
- 676 bis. — 1868-1869. (Ibid., t. II, p. 395).
677. SHIRREFF. 1829. Some account of the Wheat Fly. (London Magaz. Nat. Hist., ser. 1, t. II, p. 448-451).
678. SIDNEY OLLIF. 1893. The Hessian Fly. (Agric. Gazette of N. S. Wales, IV, p. 7, pl.).

679. VON SIEBOLD. 1852. Ueber *Cecid. saliciperda*, eine den Weidenbäumen nachtheilige Gallmücke. (Verh. schles. Forstvereins, p. 148-154, pl. I).
680. SKUSE (A.). 1888. Diptera of Australia. (Proceed. Linn. Soc. of New South Wales. Sydney, p. 17-145).
681. — — Notes on a new Dipterous Insect belonging to the Family Cecidomyidae infesting Grass (*Lasioptera vastatrix* n. sp.); also on two Hymenopterous Insects Parasitic upon the former. (Ibid., for 1887, t. II, p. 1071-1073).
682. — 1890. Larves de Cécidomyies sur les feuilles d'*Eucalyptus corymbosa* et dans des galles sphériques de *Frenela Endlicheri*. (Ibid., for 1889, t. IV, p. 1100).
683. — — Nymphes de Cécidomyies dans les galles cylindriques sur les rameaux d'*Acacia longifolia*. (Ibid., p. 654).
684. — 1891. Diptera of Australia (Ibid., 3^e sér., t. V, p. 373-412). Ibid., p. 689.
685. SNELLEN VAN VOLLENHOVEN. 1843. De schadelijke Insecten in Tuinen met de Middelen tot derzelver Verdelgung. Rotterdam.
686. — 1852. De Insecten welke den Landbouwer schaden. Arnhem.
687. SNOW (W.-A.) and MILLS. 1900. The destructive *Diplosis* of the Monterey Pine. (Entomol. News, XI, N. 6).
688. SOUBEIRAN. 1853. Notes sur une galle du *Nasturtium palustre*. (Ann. Soc. Linn. Maine-et-Loire, t. I, p. 179-181).
689. STARKE. 1860. Bemerkungen zur Charakteristik der neuen Roggenmade oder Roggengallmücke, *Cec. secalina*, und der Zwergsägewespe, *Cephus pygmaeus*. (Abhandl. naturf. Ges. in Görlitz, t. X, p. 391-399).
690. — — Bemerkungen über das Auftreten mehrerer dem Getreide schädlichen Insecten im Jahre 1859. (Koch's Wochenschr. d. Ver. f. Beförd. d. Gartenbau. Berlin, Jahrg. III, p. 81-84).
691. DE STEFANI (PEREZ). 1897. Zoocecidii del reg. Orto botanico di Palermo. (Boll. del R. Orto bot., t. I, n. 3, 4, 28 p. et pl. II).
692. — — Enumerazione di Ditteri raccolti in Sicilia.
693. — 1898. Note sopra due zoocecidii della *Phillyrea variabilis*. Palermo, 15 p. avec fig. 1.
694. — — Miscellanea entomologica sicula. (Naturalista sicil., Ann. II, N. S., p. 249-256).

695. DE STEPHANI (PEREZ). 1898. Produzioni patologiche sulle piante causate da animali. (Agricoltore calabro-siculo. Catania, anno XXIII, 43 p.)
- 695 bis. — 1900. Zooceccidi e Cecidozoi dell' *Atriplex Halimus* L. in Sicilia. (Atti dell' Academia Gioenia di Scienze naturali in Catania, t. XIII, série 4, p. 1-27, con tav.).
696. STEPHENS. 1822. A Systematic Catalogue of British Insects. London.
697. — 1846. Illustrations of British Entomology. London. Haustellata. Supplement.
698. STROBL G. 1880. Dipterologische Funde um Seitenstetten. (Programm des Ober-Gymnasiums der Benedictiner zu Seitenstetten, p. 2-65).
699. SWAMMERDAM. 1752. Bibel der Natur. Leipzig.
700. SZEPLIGETI V. 1890. Adatok a gubacsok... (Termeszetrাজi Füzetek. Budapest, p. 12-25).
701. — — Beiträge zur Kenntniss der Verbreitung der Gallen mit besonderer Rücksicht auf die Umgebung von Budapest. (Ibid., p. 40-44).
702. — 1895. Adatok a magyarországi Gubacsok ismeretéhez. (Ibid., p. 214-219).
703. TARGIONI-TOZZETTI (A.). 1886. Notizie sommarie di due specie di Cecidomyidei, una consociata ad un *Phytoptus*... in alcune galle de *Corylus avellana*, una gregaria sotto la scorza dei rami di Olivo. (Boll. Soc. ent. Ital. trim. IV).
704. — 1888. Relazione intorno ai lavori della Stazione di Entomologia agraria di Firenze. (Annali del Minist. di Agricoltura, p. 457-466, 231 et 250).
705. TASCHENBERG. 1865. Die der Landwirtschaft schädlichen Insekten und Würmer. Leipzig.
706. — 1871. Entomologie für Gärtner und Gartenfreunde. Leipzig.
707. — 1874. Forstwirtschaftliche Insekten-Kunde. Leipzig.
708. TAVARES DA SILVA. 1900. As zoocecidias Portuguezas. (Annaes de Sc. Mat., vol. VII, Porto).
709. THEOBALD (F.-V.). 1891. An account of British Flies. London, p. 38-91.
- 709 bis. — 1893. The hessian Fly in South Devon. (Ent. monthl. Magaz., XXIX, p. 285-286).

710. THOMAS (FR.). 1876. Beschreibung neuer oder minder gekannte Acaroecidien (Nova Acta Acad. Dresden, p. 253-283).
711. — 1877. Ein neuer Stachelbeerfeind. (Zeitschr. für die gesamm. Naturw. Halle, p. 131-135).
712. — 1878. Ueber 42 neue Cecidien. (Zeitschr. f. die Gesamm. Naturw. Halle, p. 703-707).
713. — 1881. Ueber einige neue deutsche Cecidien. (Sitzungsber. d. bot. Ver. d. Provinz Brandenburg., p. 50-54).
714. — 1885. Zur Beziehung zwischen Pilzen und Gallen sowie Gallmückenlarven. (Irmischia, p. 4).
715. — — Ueber zwei neue Fälle von Symbiose von Gallmückenlarven und Uredineen. (Ibid., p. 9).
716. — — Beitrag zur Kenntniss alpinen Phytoptocidien. (Programmh. d. Realschule zu Ohrdruf).
717. — — Beiträge zur Kenntniss der in den Alpen vorkommenden Phytoptocidien. (Mittheil. d. bot. Vereins für Gesamtthüringen, p. 16 à 63).
718. — 1886. Ueber Weinblattgallen. (Entom. Nachrichten. Berlin, XII, p. 199-200).
719. — — Ueber die Mückenblattgalle von *Vitis vinifera*. (Ibid., p. 129-135).
720. — 1889. Ueber einige neue exotische Cecidien : Cecidomyiden-galle auf *Euphorbia polycarpa*. (Sitzber. Naturf. Ges. Berlin, p. 101-109).
- 720 bis. — 1890. Larve und Lebensweise der *Cecidomyia pseudococcus* n. sp. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, p. 301-305. pl. VI).
721. — — Weiteres über *Cecid. pseudococcus*. (Ibid., Sitzber., p. 1-2).
722. — 1892. Alpine Mückengallen. (Ibid., p. 356-376, pl. VI-VII).
723. — — Beobachtungen über Mückengallen. (Programm des Gymnasiums zu Ohrdruf).
724. — 1893. Zwei hochalpine *Rhopalomyia*-Arten. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, p. 301-309 avec 10 fig.).
725. — — Die Mückengallen der Birkenfrüchte. (Forstlich-naturw. Zeitschr., p. 463-465).

726. THOMAS (FR.). 1893. Cecidiologische Notizen. (Entom. Nachrichten, Berlin, p. 289-304).
727. — — Besprechung Rübsaamen's Mittheilungen über neue und bekannte Gallmücken. (Bot. Centralblatt. Cassel., p. 262-264).
728. — 1894. Ueber die Fenstergalle des Ahorns. (Mitth. Thüring. bot. Verh. Neue Folge. Sitzber., p. 44).
729. — 1895. Die Fenstergalle des Berg-Ahorns. (Forstlich-Naturw. Zeitschr., p. 429-437).

TOWNSEND, VOIR TYLER TOWNSEND.

730. TRAIL (J.-W.). 1871-1872. Scottish Galls. (Scottish Naturalist, t. I, p. 123-5, 156-9, 195-6, 234-5).
731. — 1873-1874. — — (Ibid., t. II, p. 30-2, 78-80, 172-3, 252-4, 301-4).
732. — 1877-1878. — — (Ibid., t. IV, p. 14-5, 168-170).
733. — 1879-1880. — — (Ibid., t. V, p. 213-217).
734. — 1881-1882. — — (Ibid., t. VI, p. 15-20, 255-257).
735. — 1883-1884. — — (Ibid., New Series, t. 1, p. 206-216, 276-280).
736. — 1886. — — (Ibid., t. II, p. 250, 302).
737. — 1887. — — (Ibid., t. III, p. 107-110).
738. — 1890. — — (Ibid., p. 226-232).
739. — 1878. Galls and their makers in Dee. (Trans. of the Aberdeen nat. hist. Soc., p. 55-83).
740. — 1885. Scottish Galls. (Ibid., p. 35-55).
741. — 1886. A new Galle-midge, *Hormomyia abrotani* n. sp. (Scottish Naturalist, p. 250).
742. 1888. The Gall-making Diptera of Scotland. (Ibid., N. S., t. IV, 36 p.).
743. — — The Galls of Norway. (Trans. and Proceed. of the botanical Society of Edinburgh, p. 201-219).
744. — 1889. — — — — (Ibid., t. XVII, p. 482-486).
745. — 1892. New Scottish Galls. (Ann. Scott. Nat. Hist., p. 264-266).
746. TRELEASE. 1884. Notes on the relation of two Cecidomyid to fungi. (Psyche, Journal of Ent., t. IV, p. 195-200).

747. TROTTER (AL.). 1897. Zoocecidii della Flora mantovana. (Atti della Soc. dei Natural. di Modena, t. XIV, p. 150-172).
748. — 1898 — — — — Secondo Contributo. (Ibid., t. XVI, p. 9-39).
- 748 bis. — — Zoocecidii della Flora Modenese e Reggiana. (Atti d. Soc. d. Naturalisti di Modena, anno 31, p. 118-142).
- 748 ter. — 1899. Contributo alla conoscenza degli Entomocecidii italiani. (Rivista di Patologia vegetale, anno VII. Firenze).
749. — 1900. Description d'une nouvelle *Rhopalomyia* d'Italie, *Rhopalomyia Kiefferi* n. sp. (Bull. Soc. ent. France, p. 285).
- 749 bis. — — Ricerche intorno agli Entomocecidii della Flora italiana. (Nuovo Giornale bot. ital., nuova serie, t. VII, p. 187-206, pl. IX).
- 749 ter. — — Intorno alla *Phillyrea media* figurata da Reichenbach. (Bullet. della Soc. bot. ital. Firenze, p. 95-98).
750. TROTTER et KIEFFER. — 1900. Description d'une Cécidomyie nouvelle de Chine. (Bull. Soc. ent. Fr., p. 233, fig.).
751. TRUMBULL SLOSSON. 1896. Singular habit of a Cecidomyid. (Entomological News, VII, p. 8).
752. TRYON (H.). 1892-1894. The insects enemies of the Cereals belonging to the Genus *Cecidomyia*. (Natural History Society of Queensland. Transactions, I).
- 752 bis. TSCHERNJAWSKY. 1876-1877. (Sur une larve de Cécidomyie qui se propage par paedogenèse et qui vit dans des excroissances ⁽¹⁾ sur le bas de la Vigne. (Annales de la Soc. entom. russe, t. X, p. 199-204. Texte russe).
753. TUBEUF (C. von). 1893. Die Mückengallen der Birkenfrüchte. (Forstl. Naturw. Zeitschr., II, p. 463-464).
754. — 1897. Neue Beobachtungen über die Cecidomyiden-Galle der Lärchen-Kurztriebe. (Ibid., Heft 5, fig. 1-2).
755. — — Pflanzenpathologische Notizen. (Ibid., p. 536).
756. TYLER TOWNSEND (C.-H.). 1893. Note on some Cecidomyidae of the vicinity of Washington. (Entomological Society of Washington. Proceedings, II, p. 388-390).
757. — — Note on certain Cecidomyidous Galls on *Cornus* (Ibid.).

(1) M. le Dr Fr. Thomas, croit, et avec raison selon moi, que ces excroissances ne sont pas l'œuvre de la Cécidomyie, mais que celle-ci s'y est développée quand ces excroissances commençaient à entrer en décomposition.

758. TYLER TOWNSEND (C. H.). 1893. Fleshy Cecidomyid Galls on *Atriplex canescens*. (Amer. Natural., t. XXVII, p. 1021. Philadelphia).
759. — — Stem Gall on *Ephedra nevadense*. (Academy of nat. Sc. of Philadelphia. Proceed.).
760. — — A cabbage-like Cecidomyidous Gall on *Bigelovia*. (Psyche, VI, p. 491).
761. — 1894. A cone-like Cecidomyid Gall on *Bigelovia*. (Ibid., VII, p. 176).
762. — 1895. On the cabbage-shaped Gall of *Cecid. salicis brassicoides* and its occupants. (The Canadian Entomologist, XXVII, p. 8-9).
763. VALLOT. 1819. Cécidomyie de l'Euphorbe. (Mém. Acad. Sc. Dijon, p. 43).
764. — 1827. Compte rendu des travaux de l'Acad. d. Sciences... de Dijon. (Ibid., p. 92-95).
765. — 1829. Galles et fausses galles. (Ibid., p. 107-114).
766. — 1832. Observations sur la galle chevelue du Gramen et sur l'insecte qui la produit. (Ann. Sc. nat. Paris, t. XXVI, p. 263-268. — Isis., 1835, p. 512).
767. — 1836. Observations sur deux espèces de fausses galles. (Ibid., sér. 2, t. V, p. 319).
768. — — Observations diverses : Sur quelques fausses galles, p. 189; Galles chevelues du Gramen, p. 190; Insectes vivant sur le Rhododendron, p. 221. (Mém. Acad. Sc. Dijon, p. 189-224).
769. — 1838. Observations entomologiques, Cécidomyie de l'Épine blanche. (Ibid., p. 50).
770. — 1845. Sur les Galles du Bouillon Blanc, *Verbascum pulverulentum*. (Ibid., p. 481-483).
771. — 1849. Éclaircissements relatifs à plusieurs passages des Mémoires de Réaumur. (Ibid., p. 81-111).
772. VANDEVELDE (A.-J.-J.). 1896. Bydrage tot de physiologie der Gallen. Het aschgehalte der aangetoete bladeren (Bot. Jaarb. Dodonea, VIII, p. 102 et s.).
773. VERRALL. 1875. On *Asphondylia ulicis*. (Ent. Month. Mag., t. XI, p. 224).
774. VIALA. 1883. Les maladies de la Vigne. Montpellier, p. 565, pl. XVIII.

775. VIANNE (E.). 1879. Cécidomyie du Froment. (Bull. d'Insectologie agricole, p. 65).
776. WACHTL. 1878. Entomolog. biologische Studien. Beitrag zur Kenntniss d. Lebensweise von *Cecid. betulae*. (Mittheil. d. forstl. Versuchsw. Oesterreichs. Wien, t. II, pl. IV).
777. — 1881. Beiträge zur Kenntniss der gallenerzeugenden Insecten Europas. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, p. 531-546, pl. XVIII).
778. — 1882. Beitr. z. Kenntniss d. gallenerzeugenden Insecten Europas. (Wiener ent. Zeitg., p. 289-293, pl. IV).
779. — 1883. Einige neue europäische Gallmücken. (Centralblatt f. d. ges. Forstwesen, p. 476-478).
780. — 1884. Eine neue und eine verkannte Cecidomyide. (Wiener ent. Zeitg., p. 161-166, pl. II).
781. — 1885. Zwei neue europ. Cecidomyiden. (Ibid., p. 193-196, pl. II).
782. — 1886. Ueber Gallmücken. (Ibid., p. 209-210, pl. III).
783. — — *Lasioptera populea* Wachtl. (Ibid., p. 308-310, pl. V).
784. — 1887. Zwei Gallmücken und ihre Gallen. (Ibid., p. 289-292, pl. IV).
785. — 1888. Vorläufige Beschreibung einer neuen Gallmücke. (Ibid., p. 205-206).
786. WAGNER (BALTAZ.). 1861. Untersuchungen über die neue Getreidegallmücke. Marburg.
787. — 1866. *Diplosis tritici* K. und *Diplosis aurantiaca* n. sp. (Stettiner Ent. Zeitg., t. XXVII, p. 65-96, 169-187, pl. III).
788. — 1871. *Diplosis equestris* n. sp. Sattelmücke. (Ibid., t. XXXII, p. 414-423, pl. IV).
789. WAGNER (N.). 1862. Sur la génération spontanée des larves d'insectes. Kasan, 50 p. in-folio, 5 pl. (Texte russe).
790. — 1863. Beitrag zur Lehre von der Fortpflanzung der Insectenlarven. (Zeitschr. f. wiss. Zoologie, t. XIII, p. 513-527, pl. 35-36).
791. — 1865. Ueber die viviparen Gallmückenlarven. (Ibid., t. XV, p. 106-118, pl. VIII).
792. WALKER. 1848. List of specimens of Dipterous Insects of the British Museum. London. Part. I.

793. WALKER. 1856. Catalogue of the Dipterous Insects collected at Sarawak, Borneo. (Journ. Proc. Linn. Soc., t. I, p. 105).
794. — 1856. Insecta Britannica, Diptera. London, t. III.
795. — 1870-71. Newman's Entomologist. London, p. 451.
796. WALSH. 1869. Mr. Couper's thorn-leaf gall. (Canadian Entomologist, t. I, p. 79-80).
797. — 1863. Proceed. Ent. Soc. Philadelphia, t. II, p. 481-482.
798. — 1864. On the Insects Coleopterous, Hymenopterous and Dipterous, inhabiting the galls of certain species of willow. (Proc. Ent. Soc. Philadelphia, t. III, p. 543 et 614).
799. — 1866. The wheat midge. (Pract. Entom. Philadelphia, t. I, p. 40-37; 1867, t. II, p. 99).
800. — 1866-1867. Proceed. Ent. Soc. Philadelphia, t. VI, p. 223-229, 266 et 288.
801. WEBSTER (F.-M.). 1891. The Hessian Fly. (Bull. of the Ohio agricultural experiment Station. Columbus, 2^d ser., t. IV, p. 133-158).
802. — 1893. A Dipterous Gall-maker and its associates. (Bull. Ohio Exper. Stat., I, p. 154-155).
803. WEYENBERGH. 1874. Varia entomologica. (Tijdschrift v. Entom., t. IX, p. 149, pl. IX).
804. — 1875. *Lasioptera Hieronymi* n. sp. (Anales de Agricult. de la Republica Argentina, t. III, p. 164-165).
805. WESTWOOD. 1840. Introduction to the modern classification of Insects. London, t. II.
806. — 1847. The willow-twigg Midge (Gardener's Chronicle, n° 63, p. 588, fig.).
807. — — The wheat Midge. (Ibid., n° 37, p. 604, fig.).
808. WESTWOOD (J.-O.). 1885. Galls on the roots of Orchids. (Ibid., New Ser., t. XXIV, p. 84, fig. 19-20).
809. WHEELER (W.-M.). 1899. On two new species of Cecidomyid flies producing Galls on *Antennaria plantaginifolia* (*Cecidomyia antennariae* n. sp. et *Asynapta antennariae* n. sp. — Proc. Nat. Hist. Soc. Wisconsin, p. 209-216).
810. WHITEHEAD and GRAY. 1887. Report of commissioners appointed by the Government to enquire into the present visitation of the Hessian fly on corn crops in Great Britain. London.

841. WIEDEMANN. 1830. Aussereuropäische Zweiflüglige Insecten. Hamm, t. I.
- 841 bis. WILHELM (H.). 1891. Die Hessenfliege, *Oscinis pusilla* und Mitte zur Bekämpfung. Leipzig.
842. WILLISTON (S.-W.). 1896. On the Diptera of St-Vincent, West-Indies (*Trichopteromyia* n. g. *Cecidomyidarum*). (Trans. Entom. Soc. London, p. 253-446, pl. VIII-XIV).
843. WILMS UND WESTHOFF. 1883. Verzeichniss der in Westphalen beobachteten Gallgebilde. (41 Jahresber. Westph. prov. Verein. Münster, p. 33-51).
844. WINNERTZ. 1846. Beschreibung einiger neuen Gattungen aus der Ordnung der Zweiflügler. (Stettiner ent. Zeitg., t. VII, p. 11-20, pl. I-II).
845. — 1852. Dipterologisches. (Ibid., t. XIII, p. 49-58).
846. — 1853. Beitrag zu einer Monographie der Gallmücken. (Linnæa Entomologica, t. VIII, p. 154-322, pl. I-IV).
847. — 1854. Ueber *Cecid. juniperina* L. und *Cecid. pisi* n. sp. (Stettiner ent. Zeitg., t. XV, p. 322-327).
848. — 1870. *Heteropeza* und *Miastor*. (Verh. zool. bot. Ges. Wien, XX, p. 3-8, pl. I).
849. — — Die Gruppe der Lestremiinae. (Ibid., p. 9-36, pl. II).
820. VAN DER WULP. 1874. Dipterologische Aanteekeningen, n° 4, VIII, *Cecidomyidae*. (Tijdschrift v. Entom., t. IX, p. 109-114).
821. — 1883. Anhangsel tot zipi werk over de Nederlandsche Diptera. (Ibid., t. XXVI, p. cxxxvi).
822. — und J.-C. DE MEIJERE. 1898. Nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Diptera. (Ibid., t. XLI, 150 p.).
823. ZETTERSTEDT. 1840. Insecta Lapponica. Lipsiae.
824. — 1850. Diptera Scandinaviae. Lund, t. IX, 1850, p. 3669-3701).
825. — 1852. Idem, t. XI.
826. — 1855. Idem, Addenda tomis IX et XI, p. 4878-4886.
827. — 1860. Idem, t. XIV.
828. ZIEGELE. 1880. Ueber die Flora des Hohenasperg. (Jahresheft Ver. Vaterl. Naturkunde. Stuttgart, 36 Jahrg., p. 57-61).

§ 2.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX

DES

CÉCIDOMYIES.

Considerons l'insecte dans ses divers états, à savoir, à l'état d'imagos ou d'insecte parfait, à celui de nymphe, de larve et d'œuf.

1. — Caractères généraux de l'insecte parfait.

Il sera surtout question ici des caractères morphologiques externes ; nous ajouterons quelques mots sur les caractères anatomiques, physiologiques et biologiques.

1^{re} Morphologie de l'insecte parfait.

On peut assigner aux Cécidomyies les caractères distinctifs suivants : *Antennes composées de plus de six articles. Ailes ayant au maximum six nervures longitudinales et une seule nervure transversale. Nervure costale se continuant sur le bord alaire inférieur, où elle est néanmoins toujours plus étroite que sur le bord supérieur. Tibias non terminés par un éperon* (1).

Leur corps est allongé et svelte ; la pilosité plus ou moins dense, plus souvent appliquée que dressée, offrant toutes les formes intermédiaires, depuis celle d'un poil jusqu'à celle d'une écaille large et striée longitudinalement et transversalement (pl. 15, fig. 4-8).

Leur coloration est sujette à des variations et peut facilement occasionner des méprises. A peine éclos, l'insecte offre des couleurs claires, généralement rouges ou jaunes, avec des bandes sombres ; toutefois les bandes et les dessins de couleur sombre font souvent défaut au moment de l'éclosion et apparaissent un peu plus tard et petit à petit. Cette coloration gagne ensuite insensiblement en intensité, et quand l'insecte prend son essor, c'est-à-dire une ou deux heures après l'éclosion — selon que la température est plus ou moins chaude — sa parure a atteint son plus bel éclat. La coloration tend ensuite à s'assombrir. Bien des espèces prennent même finalement une teinte d'un brun sombre, sur laquelle on ne peut plus ou à peine distinguer encore

(1) *Choristoneura sarothamni* Kieff. fait exception, comme nous l'expliquerons plus loin en parlant des pattes des Cécidomyies.

les bandes primitives. Mes observations m'ont convaincu que cet assombrissement n'indique pas le déclin de la vie; j'ai constaté pour plusieurs espèces à l'état de liberté, par exemple pour les femelles de *Xylodiplosis praecox* Winn. et de *Campylomyza pini* Kieff. que la teinte claire ne dure guère que le premier jour et que l'insecte vit encore plusieurs jours avec la teinte sombre.

A. Tête de l'Insecte parfait.

La tête est de grosseur médiocre. Vue par devant, elle offre un contour arrondi, moins souvent subtriangulaire. Le vertex n'est jamais enfoncé, mais toujours plus ou moins convexe. Au-dessus de la bouche se voit ordinairement une protubérance couverte de longues soies. Les parties de la tête qui demandent une observation spéciale sont la bouche, les palpes, les antennes, les yeux et les ocelles.

I. BOUCHE. — Chez les Chironomides et plus encore chez les Bibionides, le bas de la face est ordinairement prolongé en forme de groin plus ou moins allongé. Il n'en est pas de même pour les Cécidomyies, chez lesquelles le bas de la face est au contraire peu ou point proéminent. Dans la plupart des cas, la bouche des Cécidomyies ressort peu et continue la direction de la face, avec l'extrémité légèrement recourbée en avant; chez *Clinorhyncha* toutefois, elle fait saillie en forme de trompe et se replie vers la poitrine en formant un angle avec la face (pl. 16, fig. 3; dans le genre *Colomyia* (pl. 16, fig. 4), elle a également l'aspect d'une trompe, mais elle est moins prolongée et ne forme pas d'angle avec la face. Dans le genre *Stefaniella*, les parties buccales sont, au contraire, très petites, non proéminentes et paraissant atrophiées, de sorte que le bas de la face semble être arrondi entre les palpes et dépourvu de parties buccales; ces dernières ne se reconnaissent qu'avec un fort grossissement et d'une façon peu distincte. Les pièces qui composent la bouche sont le labre, les deux mâchoires, la ligule et la lèvre inférieure. Le labre, *labrum*, ou lèvre supérieure est une pièce chitineuse, médiane, unique et formant la partie supérieure de la bouche; il offre une conformation variable, depuis celle d'une pièce semi-circulaire ou ovalaire (pl. 16, fig. 4, *ls*), jusqu'à celle d'une lamelle étroite, pointue et hyaline vers son bout (pl. 16, fig. 3, *ls*); ses bords sont toujours munis de minimes soies. Sa base s'articule à une pièce chitineuse et triangulaire (pl. 16, fig. 2, *t*). Les deux mâchoires, *maxillae* (pl. 16, fig. 2, *m*) se présentent sous forme de deux pièces allongées, convexes en dehors, concaves en dedans et se touchant par leurs bords qui sont ciliés ou plus longuement

poilus que leur surface. Entre elles, et recouverte supérieurement par le labre, se trouve la ligule ou languette (pl. 16, fig. 2, *l*) dont l'aspect est celui d'une pièce étroitement linéaire, fortement ciliée sur les côtés dans sa moitié terminale. Dans le genre *Stefaniella* il m'a été impossible de découvrir les mâchoires et la ligule.

Enfin en dessous, la lèvre inférieure paraît tantôt ne former qu'une pièce unique, plus grande que le labre et les mâchoires, tronquée à son extrémité, par exemple chez *Stefaniella*, tantôt elle est très courte, divisée en deux parties par un sillon longitudinal (pl. 16, fig. 1, *li*) et s'articulant à une pièce triangulaire et chitineuse, semblable à celle qui se voit à la base du labre. La conformation de la bouche indique donc que les Cécidomyies ne peuvent absorber qu'une nourriture liquide et qu'elles ne peuvent entamer un tissu, comme le font certains Chironomides dont la bouche est assez semblable à celle de *Clinorhyncha*, mais comprend, en plus, deux pièces linéaires, dentelées en dedans vers leur bout et faisant office de mâchoires supérieures.

II. PALPES. — La lèvre inférieure présente à sa base, de chaque côté, un prolongement conique ou cylindrique, qui sert de support à un palpe et a souvent l'apparence d'un premier article de ce dernier (pl. 16, fig. 1, *p*). Ces palpes ne font jamais défaut, à l'exception du genre *Oligares*, mais ils sont parfois très petits et difficiles à apercevoir quand on ne se sert que d'une loupe. Le nombre de leurs articles varie de 1 à 4 ⁽¹⁾ et forme un caractère générique. Dans la plupart des cas, ils sont couverts d'une pubescence fine, disposée sans ordre et entremêlée de quelques poils épars et plus longs; d'autres fois la pilosité courte et serrée est disposée par rangées transversales, de sorte que les articles paraissent être annelés; cela a lieu pour le groupe des *Epidosides* et la sous-famille des *Lestremiinae*, et ce caractère leur est commun avec les *Sciaridae*, les *Mycetophylidae* et les *Chironomidae*. Parfois aussi les palpes sont recouverts d'écailles, ce qui est le cas pour les genres *Lasioptera*, *Baldratia*, *Stefaniella*, *Clinorhyncha* et *Brachyneura*.

III. ANTENNES. — Chez les Cécidomyies, les antennes sont très fragiles, mais aussi très gracieuses, surtout chez les mâles. L'insecte les porte ordinairement relevées et arquées en arrière. Le point d'insertion est

(1) C'est par erreur que II. Loew [402] et Winnertz [814] indiquent dans leur Monographie que les palpes sont toujours composés de quatre articles; l'un et l'autre décrivent de nombreuses espèces dont les palpes ne comptent en réalité que deux ou trois articles.

toujours éloigné des parties buccales et se trouve vers le milieu ou le tiers supérieur de la tête. Ces organes demandent une attention particulière, non seulement à cause de l'élégance de leur forme, mais encore à cause de la diversité de leur conformation, qui offre des caractères distinctifs importants.

Nombre, forme et couleur des articles. — Nous distinguons deux articles basaux et un funicule composé de quatre à trente-six articles. Ce nombre est tantôt un caractère propre à tout un groupe, par exemple chez les *Diplosides*, où il est toujours de douze; tantôt un caractère générique, par exemple chez les *Asphondylia* et les *Schizomya*; tantôt il diffère avec les espèces d'un même genre ou enfin il varie chez les individus d'une même espèce. Le premier article basal a la forme d'un cône renversé, tandis que le second est globuleux. Le premier article du funicule est plus ou moins distinctement pédiculé, ce qui n'est jamais le cas pour les suivants; c'est par ce pédicule qu'il s'emboîte dans une excavation obconique du second article basal, laissant ainsi au funicule la faculté de se mouvoir en tous sens. A son extrémité supérieure, il est tantôt soudé au second, ce qui est ordinairement le cas pour les *Diplosides* (pl. 18, fig. 5), tantôt articulé avec lui (pl. 18, fig. 12), ce qui est de règle pour les *Lestrémines*; les suivants sont toujours articulés l'un à l'autre et se brisent facilement à l'endroit de cette articulation. Ils se terminent ordinairement par un prolongement cylindrique, souvent un peu évasé au bout et plus ou moins allongé, de sorte qu'ils ont l'apparence d'une minime bouteille ou carafe. L'article terminal est dépourvu de prolongement ou son prolongement est autrement conformé. On a considéré longtemps ce prolongement, que nous désignons du nom de *col*, comme un pédicule situé à la base de l'article, et l'on disait, pour ce motif, que les articles des antennes sont pédicellés. Laboulbène démontra en 1837 [343] que cette interprétation était erronée et fit voir que ce pédicule n'était en réalité qu'un prolongement terminal de l'article précédent. « J'ai bien vu, écrit-il, la manière dont les articles sont unis entre eux. L'extrémité de chaque article est grêle, en forme de pédicule, la base est globuleuse, munie de poils verticillés, fig. 11. »

J'ai constaté qu'il en est de même pour les autres familles des Nématocères; ce que l'on considérait jusqu'ici comme pédicule, est au contraire un prolongement terminal, comme chez les Cécidomyiides.

La forme des articles est très variée; elle est tantôt cylindrique, tantôt ellipsoïdale, ovulaire ou sphérique. Une conformation extrêmement curieuse est celle que nous offre le groupe des *Diplosides*. Les anciens auteurs admettaient tous que, chez les *Diplosides*, les articles du funicule

du mâle formaient un nombre double de celui des articles de la femelle. Ce fut encore Laboulbène qui releva l'erreur et fit voir que le nombre des articles était le même dans les deux sexes [344]. Dans sa description de la *Cécidomyie* du Buis, cet auteur s'exprime de la façon suivante : « L'appréciation du nombre des articles antennaires doit nous arrêter et être discutée avec soin. J'ai dit qu'il y avait en tout quatorze articles, tant aux antennes du mâle qu'à celles de la femelle ; je me trouve ainsi en contradiction avec Meigen, Loew, Winnertz, Schiner, Wagner, etc., c'est-à-dire avec ceux qui se sont le plus occupés des *Cécidomyies*.

« J'ai été longtemps à me rendre compte de la vérité à cet égard. En faisant macérer l'antenne d'un insecte frais, puis en la traitant par une solution de potasse, j'ai vu de la manière la plus évidente que tous les articles de l'antenne mâle, moins les deux premiers, étaient formés de longs articles à double renflement, ayant trois verticilles de poils : un en haut, un en bas, longs et égaux, et un verticille moyen plus petit. En réalité, l'antenne du mâle est faite sur le plan de l'antenne de la femelle, ayant en plus un verticille de poils et un étranglement vers la base ; on s'en convaincra en comparant les figures 44 et 43. Je recommande aux observateurs de vérifier le mode d'articulation des articles chez les *Cécidomyies* dont les mâles ont de longues antennes. Je ne serais pas étonné que ce nombre d'articles fût le même chez les mâles et chez les femelles, et que ce qui peut paraître une exception chez la *C. buxi* devint la règle pour l'avenir. » Un autre moyen pour bien observer cette disposition, est de rouler entre deux lamelles de verre une antenne macérée dans de l'eau ou de l'alcool ; les articles se sépareront et l'on verra très nettement que chacun se compose de deux renflements.

On remarque même, sur les articles des mâles de ce groupe, une tendance à se diviser encore davantage, de façon à simuler non plus deux, mais trois articles. Dans beaucoup de genres, le renflement supérieur est plus ou moins rétréci au milieu, et dans certaines espèces de *Bremia*, ce rétrécissement est tellement étroit au dernier ou aux deux derniers articles que l'on peut en réalité considérer l'article comme composé de trois renflements. Cela est probablement le cas pour les articles du funicule des mâles d'*Hormomyia*, dont le nombre serait de trente-six ; les espèces qui me sont connues ont les articles des antennes conformés comme les mâles des *Diplosides*, c'est-à-dire composés de deux renflements.

Trois insectes font pourtant exception à cette règle : ce sont *Clinodiplosis Liebeli* Kieff. *Clinodiplosis aberrans* Kieff. et *Massalongia rubra* Kieff., chez lesquels les articles antennaires du mâle ne se composent que d'un seul renflement allongé comme chez la femelle.

Quant à la couleur des antennes, on peut admettre comme règle générale qu'elle est plus claire sur les deux articles basaux que sur le funicule; celui-ci est ordinairement d'un brun plus ou moins sombre. Dans tous ces cas, les articles du funicule offrent une coloration uniforme. Mais ici encore nous trouvons deux exceptions. L'insecte décrit par Handlirsch sous le nom de *Cecidomyia Braueri* a les articles du funicule d'un brun noir, tandis que leur prolongement ou col est d'un blanc pur. Cela est du moins le cas pour le mâle; la femelle m'est inconnue et Handlirsch ne fait pas mention de ce caractère si frappant. La seconde exception est fournie par diverses espèces du genre *Lesiodiplosis* (*altmanni* Kieff., *cruenta* Kieff., *lineata* Kieff. et *septemguttata* Kieff.). Chez les mâles de ces espèces la nodosité inférieure de chaque article du funicule est noire, tandis que la nodosité supérieure est d'un jaune plus ou moins clair, ce qui est aussi le cas pour le col (sauf le bout) et le rétrécissement. Chez les femelles, les articles sont nettement rétrécis en leur milieu, noirs dans leur moitié inférieure et jaunes dans leur moitié supérieure; le col est jaune, sauf le dernier quart qui est noir.

Ornements des antennes. — En me servant de cette expression, je ne veux nullement prétendre, comme M. Rübsaamen m'en a accusé ⁽¹⁾, que le but des gracieux verticilles dont les antennes des Cécidomyïes sont munies, soit de servir d'ornement; j'entends par là qu'en réalité ils ornent ces insectes, quelle que puisse être d'ailleurs leur destination. Mes observations me permettent de croire qu'ils servent d'organes du toucher.

On peut distinguer les sept sortes de verticilles qui suivent.

1. *Verticilles de soies* (*Verticilli setosi*). Outre la pubescence ⁽²⁾ qui recouvre toujours la surface des articles antennaires et ne fait défaut que sur leur col, qui est presque toujours parfaitement glabre, on distingue des soies plus allongées, formant un ou plusieurs verticilles,

(1) Citons cette accusation à titre de curiosité : « Je voudrais tout d'abord, pour faire comprendre à M. K. combien est comique le terme qu'il emploie, lui demander s'il considère une verrue nasale ou le nez lui-même comme un ornement du visage? Peut-être comprendra-t-il alors le ridicule et la fausseté du terme dont il se sert. » Voilà ce que M. le docteur Karsch, professeur à l'Université de Berlin, oubliant sans doute qu'il a écrit lui-même que les antennes de *Diplosis Gollmeri* Karsch sont « ornées de verticilles », a accepté de servir à ses lecteurs, sous le titre de *Nouvelles entomologiques de Berlin!* [Cf. 320, p. 10.]

(2) Dans le genre *Brachyneura* elle est remplacée par des écailles.

se détachant assez facilement de la papille qui leur sert de base et ne manquant que dans les deux genres *Asphondylia* et *Brachyneura*. Ces verticilles sont tantôt dressés et parallèles au grand axe de l'article, ce qui est la règle pour le verticille supérieur chez les Épidosides, tantôt étalés à angle droit, par exemple le verticille intermédiaire dans le même groupe, tantôt obliques, ce qui se voit le plus fréquemment, ou enfin rejetés en arrière et incurvés à l'extrémité, par exemple le verticille inférieur dans le groupe *Campylomyza*. En règle générale, ils sont plus longs chez le mâle que chez la femelle. C'est la même chose que nous observons chez les Chironomides, tandis que chez les Mycétophilides et les Sciarides, sauf quelques exceptions, ces verticilles font défaut. Leur forme est ordinairement régulière; dans le genre *Bremia* et faiblement aussi chez quelques espèces de *Lestodiplosis*, leur forme est irrégulière, c'est-à-dire que les soies sont beaucoup plus longues sur un côté des articles que sur l'autre (pl. 16, fig. 7).

2. *Verticilles de lamelles* (*Verticilli laminosi*). Cette forme n'a été observée jusqu'ici que sur des espèces de la sous-famille des Lestrémines. Chez *Campylomyza villosa* Kieff., les articles du funicule offrent vers leur tiers supérieur un verticille hyalin, formé d'une seule pièce en lamelle, d'aspect subcylindrique, un peu évasé au sommet (pl. 17, fig. 3). *Campylomyza Strobli* n. sp. présente des verticilles semblables, mais à bord divisé faiblement en quatre lobes, formant ainsi une transition avec les suivants. Que l'on s'imagine une lamelle courbée en cylindre, se déchirant en quatre lobes, et l'on aura la seconde forme, c'est-à-dire celle de *Campylomyza coronata* Kieff. Ici aussi on se trouve en présence d'un verticille transparent composé d'une seule pièce, mais cette pièce n'est plus entière comme dans l'espèce précédente, quatre profondes incisions la divisent en autant de lamelles; ces dernières sont donc réunies l'une à l'autre par le bord de leur base et forment ainsi une sorte de couronne autour de l'article. Enfin, chez la femelle de *Monardia stirpium* Kieff., nous trouvons encore un verticille de quatre lamelles hyalines (pl. 17, fig. 9), mais ces lamelles sont entièrement séparées l'une de l'autre, un peu plus larges que hautes, faiblement concaves en dehors, à peine échancrées supérieurement et fixées à un support dans leur quart inférieur. Le mâle de la même espèce n'a que deux lamelles autrement conformées, les deux autres lamelles du verticille sont remplacées chacune par une paire de soies (pl. 17, fig. 4).

3. *Verticilles de filets arqués* (*Verticilli arcuati*). Les mâles du groupe des Diplosides (je ne connais que trois exceptions sur plus de cent es-

pèces que j'ai examinées), ainsi que plusieurs femelles du même groupe et quelques espèces du groupe des Épidosides, sont ornés de verticilles très gracieux, observés d'abord par Targioni-Tozzetti [704, p. 464]. Dans la description d'*Arthrocnodax pseudogallarum* Targ., cet auteur écrit : « *Articoli ornati* ⁽¹⁾ alternativamente di un verticillo basale o di peli setiformi e di altro subapicale di peli lunghi, biforcati all' origine, e per l'apice di ciascun ramo, riuniti ad ansa coll' apice del ramo corrispondente del piu prossimo pelo congenere, da un lato a dall' altro ». Sept années plus tard, alors que je n'avais encore aucune connaissance de l'observation du professeur de Turin, qui semble être demeurée inconnue jusqu'à ce jour, ces « poils longs, bifurqués à leur origine et réunis par leur bout à l'extrémité de poil voisin, en formant une anse » furent décrits dans une de mes notices de la façon suivante : « Au premier aspect, ces verticilles semblent être composés de poils soudés deux à deux par leur extrémité, mais en réalité, il n'en est pas ainsi. Tandis que les papilles des verticilles ordinaires ne portent qu'une soie, l'on voit ici deux minces filets qui sortent de la même base, se divariquent, puis, au milieu de leur longueur, chacun d'eux se recourbe subitement et va rejoindre la papille voisine, à laquelle il est soudé par son extrémité ; il en résulte un verticille composé non pas de soies, comme d'ordinaire, mais de filets arqués ou bien, si l'on préfère, de poils filiformes et recourbés, dont chacun serait fixé par son extrémité à la base du poil suivant (fig.) » [298, p. cxcii].

Cette observation fut diversement jugée. Selon Enzo Reuter, professeur à l'Université d'Helsingfors [588], ces filets ne seraient autre chose que le bord épaissi d'une lamelle hyaline, extrêmement fine, qui m'aurait échappé ; et un ancien maître d'école de Westphalie, M. Rübsaamen, ajoutait avec le bon ton qui le caractérise : « M. E. Reuter a bien démontré que l'idée que M. K. s'est faite de ces organes est fausse... Ces appendices sont en général peu apparents : chez *Diplosis*, *Dichelomyia* et *Lasioptera* ils ne paraissent en règle générale que comme des productions extrêmement petites, hyalines et ayant la forme d'une verrue... Or M. K. considérerait-il une verrue nasale ou le nez lui-même comme un ornement du visage ? » ⁽²⁾. Nous nous trouvons donc en présence de trois opinions : celle des filets arqués formant boucle, celle de lamelles à bord épaissi, et celle de M. Rübsaamen ou « de productions extrêmement petites, ayant la forme de verrues ».

(1) Voir la note à la page 239 (59).

(2) Cf. Berliner entom. Zeitschrift, 1896, p. 402.

Pour cette dernière opinion, nous ne lui ferons pas l'honneur de la réfuter; un regard jeté sur les figures 5, pl. 17, et 7, pl. 16 suffira pour la juger, elle et son auteur. Quant à la seconde, je puis affirmer que les insectes sur lesquels M. Reuter a fait ses observations et qui ont été ensuite soumis à mon examen, ont les verticilles en question conformés comme les autres *Diplosides* que j'ai examinés. Or il est absolument hors de doute que, chez toutes ces espèces, le verticille est bien réellement formé de filets arqués et non point de lamelles. Je me contente de transcrire ici les preuves que j'ai fournies en 1896. « Si l'on roule une antenne de *Xylodiplosis* entre deux lamelles sous le microscope, les filets se détacheront et voici ce que l'on verra : 1° Aucune ligne transversale ne réunit les deux papilles; 2° les arcs perdront leur forme irrégulière et se présenteront sous les aspects les plus divers, depuis la forme allongée jusqu'à celle où l'arc se rapproche de la ligne droite; or cela serait impossible si les filets n'étaient que le bord épaissi d'une lamelle transparente; 3° les filets eux-mêmes offriront fréquemment la forme d'un 8 (ce qui a même parfois lieu sur l'antenne même, comme je l'ai représenté dans mon dessin (*Bull. Fr.*, 1895, p. cxvii), ou bien ils seront diversement contournés, presque tressés, ce qui exclut évidemment la présence d'une lamelle entre eux. Le dessin représente une portion d'un verticille détaché de l'antenne et montrant ces diverses formes. J'avoue volontiers que, moi aussi, j'ai considéré cette disposition comme « irréalisable », mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Tous les *Diplosis* observés jusqu'ici, y compris celui dont parle M. Reuter, ont des filets arqués; les verticilles de lamelles n'existent que dans le groupe *Campylomyza* ».

A ces preuves s'ajoutent encore les suivantes. M. Ch. Janet, ingénieur à Beauvais, qui avait d'abord pensé « qu'une semblable disposition devait être considérée comme absolument irréalisable chez un insecte », écrit après avoir examiné les antennes de *Xylodiplosis* : « J'ai pu reconnaître que la description de « filets arqués » soudés par leurs deux extrémités au tégument et formant une boucle ouverte, dépourvue de toute membrane de remplissage, est parfaitement exacte. Ni les imprégnations par le nitrate d'argent, ni les colorations par l'éosine ne décèlent, à l'intérieur des filets arqués, une membrane que sa transparence ferait échapper à l'observation directe. Bien plus, dans une préparation, j'ai vu l'un des poils d'un verticille non représenté par M. Kieffer, qui, par suite d'un accident de préparation, passait nettement au travers de la boucle formée par un filet arqué » [244, p. 185].

D'autre part, vers la fin de la même année, Lintner, alors chef de la

station entomologique de New-York, décrivant deux nouvelles espèces de Diplosides, *Bremia cucumeris* (Lintn.) et *Contarinia setigera* (Lintn.), donne également la description des filets arqués et ajoute, après avoir parlé de l'opinion du professeur de Finlande : « In a preparation of the male antennae of *Diplosis piriwora* Ril., a number of the arched filaments became loosened and escaped from their attachments but the anastomosis, where each arch is jointed to the base of the next, remained unbroken and distinct. In this preparation the components of the arches may be seen diverging at various angles — another evidence in favor of there being no connecting membrane » [394, p. 166]. C'est encore au même résultat qu'arrive, en 1897, M. Porter Felt, le successeur de Lintner [112].

S'il ne peut exister de doute au sujet de la présence de véritables filets arqués, il n'en est plus de même quand on veut expliquer leur formation. Je me contenterai d'exposer ici la théorie de l'ingénieur de Beauvais (*l. c.*). Après avoir posé la question : « Comment peut-on s'expliquer la formation de ces filets arqués ? », il répond : « Les poils apparaissent, après le décollement de la cuticule chitineuse, sous forme de bourgeons qui s'élèvent sur des cellules hypodermiques. Puis la surface de ce bourgeon se chitïnise et le poil prend ainsi sa forme définitive. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il commence à se chitïniser, que le bourgeon hypodermique ait atteint la longueur que le poil devra atteindre. Dès que sa partie distale a acquis sa forme définitive, elle peut commencer à former sa cuticule, tandis que la partie proximale continue à croître pour se chitïniser, à son tour, dès que l'allongement sera arrivé à son terme. Pour les filets arqués, il est probable qu'il se forme sur les antennes de véritables lamelles hypodermiques (pl. 17, fig. 12, a), que ces lamelles se bordent d'un bourrelet épaissi au-dessous duquel apparaît une fente et que la partie centrale se rétracte peu à peu, de manière à ne laisser que les filets arqués qui se chitïnisent (pl. 17, fig. 12, b, c, d). Il est probable que, contrairement à ce que représente ce schéma, l'apparition de la fente au-dessous de l'extrémité distale et la chitïnisation de cette extrémité commencent bien avant que la lamelle ait atteint la longueur totale correspondant à la hauteur des arceaux qu'elle laissera comme résidus définitifs. » Après avoir rapporté cette explication, M. Porter Felt [112, p. 4-5], fait la remarque suivante : « This is perhaps as good a theory as can be advanced and agrees closely with the facts, but it seems as though if true, there should be remnants of the membrane observable in some of the species. The insertion of the arched filaments being so similar to that of setae renders this theory not easy to accept, though no better one can

be advanced. It is worthy of note in this connection that M. Kieffer has described some small hyaline lamellae on the female antennae of the genus *Monardia*. »

Si l'on considère des Cécidomyies appartenant à des genres ou à des groupes différents, on sera frappé de la diversité de forme qu'offrent les filets arqués. En prenant pour typique la forme dont il a été question jusqu'ici, c'est-à-dire celle des mâles des *Diplosides* et d'un certain nombre d'*Épidosides*, nous y trouverons néanmoins quelques variations, soit quant à leur consistance qui peut être plus ou moins chitineuse, parfois entièrement hyaline, soit quant à leur régularité. Les verticilles *réguliers*, de beaucoup les plus fréquents, paraissent tantôt par trois, tantôt par deux seulement sur un même article. Chez les mâles des *Diplosides*, où chaque article se compose de deux renflements et de deux rétrécissements, ou bien, si l'on préfère, de deux nodosités et deux cols, le renflement inférieur porte toujours un verticille de soies, et, un peu plus haut, un verticille de filets arqués; le renflement supérieur n'a de même qu'un grand verticille de soies, auquel s'ajoute parfois un second plus court, mais tantôt un, tantôt deux verticilles de filets arqués situés l'un au-dessus, l'autre au-dessous du grand verticille de soies. Les nombreuses espèces de *Contarinia*, à l'exception de *C. picridis*, ainsi que certains représentants du genre *Hormomyia*, n'ont que deux verticilles de filets arqués, à savoir un sur chaque renflement de l'article; chez les autres genres de *Diplosides*, chaque article est pourvu de trois verticilles de filets arqués.

Quant aux verticilles *irréguliers*, la plus curieuse forme se rencontre dans le genre *Bremia*, dont elle constitue un caractère générique (pl. 16, fig. 7). Nous remarquons ici aux verticilles supérieur et inférieur, une boucle extrêmement longue, étalée, fort étroite et s'amincissant au bout; les deux boucles voisines sont au contraire très petites, les suivantes de plus en plus longues, mais dressées et n'atteignant ordinairement pas le tiers de la boucle étalée. A chacune de ces boucles correspond une soie à peu près d'égale longueur. Dans le genre *Lesotodiplosis* on remarque également ces verticilles irréguliers, mais cette irrégularité est moins apparente et parfois à peine sensible.

4. *Verticilles de filets appliqués (Verticilli appressi)*. Toutes les autres Cécidomyines rentrent dans cette catégorie. Les boucles sont ici courtes et appliquées à l'article qu'elles dépassent à peine, et les verticilles sont reliés entre eux par un filet parallèle au grand axe de l'article. Dans les genres *Asphondylia*, *Polystepha* et *Schizomyia*, les verticilles sont parfois nombreux et toujours composés de filets sinueux (pl. 16,

fig. 6 et 9). Dans les autres genres, chaque article du funicule montre seulement deux verticilles composés chacun de deux boucles très larges et en forme de demi-cercle, appliqués à leur support et reliés l'un à l'autre par un filet droit, ou faiblement courbé (pl. 16, fig. 5 et 8).

5. *Verticilles de créneaux* (*Verticilli crenulati*). On trouve cette forme dans la sous-famille des Lestrémines. Les mâles des genres *Campylomyza*, *Monardia* et *Bryomyia* ont les articles du funicule excentriques et munis de plusieurs séries transversales de petits créneaux appliqués à l'article et portant à leur centre une longue soie. Les séries y sont ordinairement disposées de la façon suivante. L'inférieure forme un verticille ou anneau, un peu au-dessous du milieu de l'article; cet anneau est oblique, étant plus rapproché de la base de l'article sur le dessus que sur le dessous. La seconde série est également oblique, mais seulement semi-circulaire, elle manque sur le dessous ainsi que les deux séries suivantes qui sont encore plus courtes. La partie la plus convexe, c'est-à-dire le dessus de l'article, offre donc quatre séries, tandis que le dessous n'en a qu'une (pl. 17, fig. 1-2).

6. *Verticilles de faisceaux*. Les femelles de *Catocha* présentent, au tiers supérieur des articles, un verticille composé de quatre appendices séparés l'un de l'autre et se divisant chacun en trois ou quatre prolongements subulés, hyalins et un peu plus gros que les soies (pl. 17, fig. 8).

7. *Verticilles d'appendices filiformes*. La femelle de *Wasmanniella aptera* Kieff. a les articles munis d'un verticille composé de quatre appendices filiformes ou linéaires, rarement bifurqués, plus ou moins courbés en dedans. Chez la femelle de *Bryomyia* (pl. 17, fig. 6-7), les articles du funicule n'ont que deux appendices, à savoir, de chaque côté un appendice hyalin, filiforme, courbé perpendiculairement au grand axe de l'article et presque appliqué à ce dernier. Ces appendices se retrouvent dans la famille des Chironomides, où les femelles du groupe *Chironomus* portent aux articles du funicule deux appendices hyalins, filiformes ou lancéolés, et dressés verticalement ou obliquement.

IV. YEUX ET OCELLES. — Les yeux occupent la plus grande partie de la tête; ils sont largement sinués au côté interne et se touchent généralement au vertex, de sorte que le bord interne des deux yeux réunis rappelle la forme d'un fer à cheval.

Parfois des espèces ont, dans l'un et l'autre sexe, les yeux nettement séparés au vertex, par exemple *Hormomyia cornifex* Kieff., tandis que d'autres espèces du même genre ont les yeux distinctement réunis au vertex, par exemple *Hormomyia crassipes* H. Lw. et Lamber-

toni Kieff. Leur couleur est noire; une seule espèce, *Camptomysia erythronma* Kieff., a les yeux d'un beau rouge. Les facettes dont ils se composent paraissent hyalines quand on les voit de profil; elles se touchent généralement et leur base offre alors une forme exactement hexagonale, ce qui est très distinctement le cas pour les espèces du genre *Asphondylia*; sur les bords des yeux et plus encore à leur extrémité supérieure les facettes sont écartées les unes des autres, leur base est arrondie et les intervalles paraissent toujours glabres. Quant aux ocelles, ils n'existent que dans la sous-famille des Lestrémines et sont groupés de telle façon que l'intermédiaire, situé plus en avant, forme un triangle avec les deux latéraux.

B. Thorax de l'Insecte parfait.

Le thorax des Cécidomyies est convexe sur le dessus et porte un stigmate de chaque côté du prothorax. Ce dernier est court et peu allongé (pl. 45, fig. 3); dans les genres *Clinorhyncha* H. Lw. et *Asynapta* H. Lw., il se prolonge en avant, en s'amincissant insensiblement en forme de col (pl. 45, fig. 2); dans le genre *Hormomyia* H. Lw., il s'avance par-dessus la tête, en forme de capuchon (pl. 45, fig. 4).

PATTES. — Chez les Cécidomyines et surtout dans le groupe des Épidosines, les pattes sont longues et grêles; chez la plupart des Lestrémines et des Hétéropézines, elles sont plus courtes et plus robustes; leur surface est tantôt entièrement couverte d'écailles, tantôt de poils courts, serrés et appliqués, entremêlés d'autres plus longs, épars et dressés. Le dessous des tarses est ordinairement parsemé de soies dressées, dont la longueur égale environ l'épaisseur de l'article. Hanche non prolongée, au maximum deux ou trois fois aussi longues que larges. Tibias presque toujours inermes, c'est-à-dire non terminés par un éperon, mais portant seulement deux ou trois courtes soies dressées, à son extrémité; je ne connais qu'une seule exception qui est *Choristoneura sarothamni* Kieff., dont le tibia porte à son extrémité, outre deux soies courtes, un éperon ou soie plus forte, qui atteint les deux tiers de la longueur du métatarse. On serait tenté, pour ce motif, ainsi que pour la forme insolite des antennes, d'exclure cette espèce de la famille des Cécidomyies, si sa larve n'avait pas tous les caractères de celles des Cécidomyies; notons encore que cet éperon est simple et non dentelé comme chez les familles voisines.

Le nombre des articles des tarses est variable chez les Hétéropézines, toujours de cinq chez les deux autres sous-familles. Il est rare qu'un exemplaire capturé possède encore tous les articles des tarses; sou-

vent même les individus obtenus par éclosion sont mutilés de la même façon. On remarquera dans tous ces cas, que le premier article ou métatarse ne fait à peu près jamais défaut, mais que ce sont les articles suivants qui manquent. Cela tient à leur mode d'insertion. Le métatarse est fixé le plus solidement de tous, aussi est-il rare de le voir se détacher du tibia auquel il s'articule de la même façon que celui-ci au fémur. Le second s'emboîte dans le premier par un prolongement en forme de lame de couteau (pl. 18, fig. 4), qui diminue insensiblement de largeur depuis sa base jusqu'à son sommet, ne lui laisse que peu de jeu et se brise ou se détache facilement; cet article est donc en quelque sorte greffé au métatarse. Les segments suivants sont articulés l'un à l'autre de telle façon qu'ils peuvent se mouvoir, non plus seulement dans le sens vertical, comme le précédent, mais en tous sens. La longueur de ces articles est variable et fournit des caractères différentiels pour distinguer les sous-familles et les espèces entre elles. Chez les Cécidomyines, le métatarse est beaucoup plus court que le second article (pl. 15, fig. 1), chez les Lestrémines il est plus long que le second (pl. 17, fig. 11). Les deux crochets du dernier article sont tantôt simples (pl. 22, fig. 15), tantôt bifides (pl. 22, fig. 13), tantôt dentelés (pl. 22, fig. 11), tantôt munis d'une dent unique, tantôt brusquement élargis avant l'extrémité (pl. 22, fig. 12). Ils sont ordinairement conformés de la même façon sur toutes les pattes, rarement bifides sur les unes et simples sur les autres. Tous deux sont fixés à l'extrémité d'un minime article cylindrique, appelé *onychium* ⁽¹⁾, qui est mobile et se trouve souvent caché en partie par la partie supérieure de l'extrémité du cinquième article des tarses, qui s'avance ordinairement plus que la partie inférieure. L'*empodium*, qui se trouve entre les deux crochets, se présente sous la forme d'une pelote aplatie, de longueur variable, s'élargissant de la base au sommet qui est tronqué ou arrondi; vu de profil, il paraît linéaire ou s'élargissant vers le bout libre. Le dessous est recouvert de poils denses, dressés, sétiformes ou bien à extrémité recourbée et élargie (pl. 22, 11-15). Le dessus est couvert de poils plus courts; parfois le milieu du dessus est relevé sous forme de crête longitudinale, mais j'ignore si cela est accidentel ou un caractère constant (pl. 22, fig. 14). Dans la sous-famille des Lestrémines l'*empodium* est souvent mince, linéaire, glabre et muni inférieurement de trois à cinq poils longs et ramifiés ou plutôt d'appendices hyalins, sétiformes

(1) Chez *Miastor* Mein., dont les tarses ne se composent que de quatre articles, Schiner a pris l'*onychium* pour le cinquième article.

et se bifurquant une ou deux fois à leur extrémité, imitant le bois du cerf, comme cela a lieu pour des espèces du genre *Chironomus* (pl. 23, fig. 5); d'autres fois l'empodium manque complètement (pl. 23, fig. 6). Les deux pulvilles, situés de chaque côté des crochets, ont la forme de la pelote, dont ils n'atteignent à peu près jamais la longueur (pl. 22, fig. 14); ils sont généralement peu apparents, souvent rudimentaires ou nuls. Je les ai signalés pour la première fois en 1895 [290, p. 10]. C'est donc le contraire des Muscides, où les pulvilles apparaissent toujours sous la forme de deux longues pelotes, plus longues chez le mâle que chez la femelle, tandis que l'empodium est représenté par une soie ou tout à fait nul.

AILES. — Toutes les Cécidomyies, à l'exception de quelques Lestrémines, dont nous parlerons plus loin, sont munies d'ailes relativement grandes et larges, à extrémité arrondie, rarement, chez quelques Hétéropézines, à extrémité amincie en pointe. Le bord supérieur et parfois quelques nervures sont munis de poils dressés ou d'écailles appliquées et se recouvrant; le bord inférieur est toujours distinctement cilié. A sa base, l'aile se rétrécit insensiblement au bord inférieur, parfois subitement et presque à angle droit; mais on n'y trouve jamais, comme chez les Muscides, après ce rétrécissement, l'appendice appelé alule. La surface offre généralement des reflets irisés; elle paraît couverte d'une ponctuation très fine et très serrée, et parsemée de poils relativement longs et appliqués, rarement d'écailles; chez la plupart des Hétéropézines et des Lestrémines, la pilosité alaire est au contraire composée de soies extrêmement petites et dressées, comme c'est la règle chez les Sciarines. Les écailles proprement dites sont diversement conformées; elles sont habituellement allongées, rétrécies en pédicule à leur base et arrondies ou tronquées et dentelées au sommet. Des stries nombreuses, droites et parallèles les parcourent dans le sens de leur longueur et souvent aussi dans le sens de leur largeur; les premières aboutissent chacune à une des dents du sommet (pl. 15, fig. 7). Leur forme est la même que celle des écailles qui recouvrent les nervures de divers Culicides, mais leurs dimensions sont toujours plus petites. Celles des ailes, comme aussi celles que l'on remarque sur les autres parties du corps, ont presque toujours une couleur noire, mais on en voit aussi qui sont jaunes, d'autres qui sont d'un blanc pur et qui forment des taches argentées sur le bord antérieur de l'aile ou des bandes sur l'abdomen, etc. L'examen de ces productions démontre que les écailles noires doivent leur coloration à une couche de pigment; vues avec un fort grossis-

sement, elles paraissent opaques; les écailles blanches, vues avec le même grossissement, paraissent hyalines et ne renferment pas de couche de pigment.

Dans le genre *Endaphis* et chez quelques autres Cécidomyies, la surface alaire est parsemée de *poils élargis en écaille*, c'est-à-dire de poils relativement longs, appliqués, rétrécis à leur base et à leur sommet, comprimés et élargis en leur milieu. Leur forme est donc intermédiaire entre celle des poils ordinaires de la surface alaire et celle des écailles proprement dites (pl. 15, fig. 4-5).

Le bord antérieur de l'aile paraît épaissi de façon à former une *nervure costale*; celle-ci est souvent interrompue après l'insertion de la troisième nervure longitudinale; mais, dans tous les cas, elle se prolonge, après l'insertion de la troisième nervure, avec ou sans interruption, jusqu'au bord postérieur où elle disparaît insensiblement. Dans un seul cas, c'est-à-dire chez le mâle de *Diplosis auripes* Fr. Löw, la partie basale de la nervure costale offre un renflement très apparent et d'un beau blanc. Chez les Chironomides et les Bibionides, la nervure costale cesse après sa jonction avec le cubitus.

Quant aux nervures longitudinales, leur nombre varie de deux à sept. La dénomination employée par Schiner nous paraissant la plus exacte, parce qu'elle s'adapte à tous les Diptères, nous l'adopterons ici et nous distinguerons avec Schiner les nervures longitudinales suivantes. La première, appelée *nervure subcostale*, ne fait jamais défaut; elle est courte, simple dans les deux premières sous-familles, généralement double chez les Lestrémines. La seconde manque chez toutes les Cécidomyies. La troisième, appelée *nervure cubitale* ou *cubitus*, n'atteint parfois que la moitié du bord antérieur et est alors tellement rapprochée de la première qu'on ne peut l'en distinguer qu'après avoir fait disparaître les écailles qui la recouvrent (pl. 15, fig. 2 et 22, fig. 4), ou bien elle est plus allongée et écartée de la première, et son extrémité est tantôt éloignée de la pointe de l'aile (pl. 22, fig. 3 et 5), tantôt rapprochée d'elle, ou l'atteignant (pl. 22, fig. 6) ou enfin la dépassant même (pl. 22, fig. 7 et 8). Le cubitus sort toujours de la première nervure; son origine se trouve le plus souvent vers le milieu (pl. 22, fig. 3 et 7), rarement vers l'extrémité de cette dernière (pl. 23, fig. 2); sa base offre l'aspect d'une nervure transversale plus ou moins distincte, et a été généralement considérée comme telle, ou bien cette base fait à peu près défaut; dans l'un et l'autre cas le cubitus semble en réalité sortir de la base de la cinquième nervure. Chez les Épidosides, le cubitus sort ordinairement de la base de la première nervure, qu'il longe jusqu'au delà de la moitié, pour s'en détacher subitement en formant un

angle avec elle; sa partie basale, qui se confond presque avec la première nervure, n'a donc plus l'apparence d'une nervure transversale (pl. 22, fig. 8). La quatrième nervure longitudinale, que nous appelons avec Schiner *nervure discoïdale*, n'existe que dans la troisième sous-famille et dans le genre *Diallactes*; elle est ordinairement simple (pl. 22, fig. 8), rarement bifurquée (pl. 23, fig. 4-4); elle sort toujours de la partie inférieure de la troisième. La cinquième, appelée *nervure posticale*, est presque toujours présente et généralement bifurquée; elle sort de la base de l'aile. La sixième et la septième, ou *nervures anales*, ne se trouvent que chez quelques Lestrémines; elles sortent de la base de l'aile et sont toujours simples (pl. 23, fig. 3-4).

Il n'existe qu'une seule nervure transversale, qui relie le cubitus à la base de la nervure posticale. Dans la plupart des cas, elle semble être la base du cubitus, comme nous venons de le voir, et elle est considérée comme telle par tous les auteurs qui prennent la véritable base du cubitus pour nervure transversale. Chez la plupart des Épidosides, la nervure transversale s'écarte au contraire très nettement de la direction du cubitus; à son origine, elle est éloignée de la base de ce dernier et court tantôt parallèlement avec celle-ci, tantôt divergeant avec elle (pl. 22, fig. 8) et plus ou moins courbée en S.

Outre ces nervures, on distingue encore un pli alaire, caractéristique pour les Cécidomyies et ayant l'apparence d'une nervure longitudinale; ce pli est à peu près parallèle à la nervure posticale, dont le rameau supérieur se confond ordinairement avec lui; c'est ce qui explique comment certains auteurs ont considéré la base de ce rameau comme une nervure transversale et le pli alaire comme une nervure longitudinale. Chez les Épidosides on observe encore, entre l'extrémité du cubitus et celle de la nervure posticale, un pli alaire plus court, partant du bord postérieur avec l'apparence d'une nervure longitudinale et n'atteignant pas le milieu de l'aile. Bremi l'a signalé d'abord, mais en le considérant comme une petite nervure. Nous indiquerons, en parlant de la classification, comment la nervation alaire nous renseigne sur la place à assigner aux Cécidomyies dans le cadre des Diptères, et sur la façon de grouper les représentants dont elle se compose.

APTÉRISME ET DIMORPHISME. — Trois Lestrémines sont à rapporter ici. J'ai décrit en 1898 [323, p. 49] une Cécidomyie aptère, chez laquelle les deux ailes sont remplacées par un appendice opaque, charnu et rouge comme le thorax; à cause de l'endroit de leur insertion qui est plus rapproché de l'écusson et des hanches postérieures que ce n'est

le cas pour les espèces à ailes normales, on pourrait aussi les considérer comme tenant lieu de balanciers, dont on ne trouve pas de vestige. Le mâle de cette espèce m'est demeuré inconnu. Plus récemment, en 1899 [480], M. le Dr de Meijere a observé un cas de dimorphisme chez les deux sexes d'une Cécidomyie nouvelle, qu'il a décrite sous le nom de *Monardia van-der-Wulpi*. Parmi les mâles, certains individus ont les ailes et les balanciers normalement développés, d'autres ont ces organes très raccourcis et montrent quelque variation dans le développement des ailes et des nervures. Ce qui est particulièrement remarquable dans la nervation alaire de ces mâles, c'est que le cubitus sort, non plus de la première nervure longitudinale, mais du bord antérieur de l'aile (pl. 18, fig. 6), et que, dans les ailes les moins développées, la dernière nervure longitudinale n'est pas bifurquée. Quant aux femelles, les unes ont les ailes et les balanciers normalement développés, les autres au contraire sont aptères, c'est-à-dire que leurs ailes sont à l'état rudimentaire, sans nervure, mais seulement avec une fine trachée provenant de la partie antérieure du thorax; les balanciers sont extrêmement petits et offrent l'aspect d'une verrue hémisphérique, munie quelquefois d'un poil à son extrémité. Ces femelles aptères sont encore remarquables par leur écusson qui n'est nullement proéminent, comme chez les mâles et chez les femelles à ailes normales, et plus large que chez ces derniers. Un cas semblable de dimorphisme a été signalé un peu plus tard par M. Rübsaamen pour *Monardia dimorphogyna* Rbs. [642]. Tandis que l'aptérisme est connu pour beaucoup de Diptères, le dimorphisme n'a été observé que fort rarement. Je l'ai constaté pour les mâles d'*Erioptera atra* Meig.; Schiner l'indique pour les deux sexes d'*Elachiptera brevipennis* Meig. (II, p. 234); le Rév. Père Strobl pour les femelles de *Tipula varipennis* Wied. et *fulvipennis* Deg. (Die Dipteren von Steiermark. Mittheil. naturw. Vereins für Steiermark, 1894, p. 88 et 92); M. Stein pour les mâles de *Lipoptena cervi* L. (Deutsche entom. Zeitschr., 1877, p. 297).

Chez un Cynipide, *Biorrhiza pallida* Ol. (*terminalis* Fabr.) nous remarquons un dimorphisme semblable chez les femelles, et, comme ici, la convexité de l'écusson diminue à mesure que les ailes se raccourcissent.

BALANCIERS. — L'écaille qui recouvre les balanciers chez un grand nombre de Diptères, fait défaut chez les Cécidomyies. Les balanciers sont allongés, composés d'un pédicule et d'une massue; cette dernière est tantôt plus longue, tantôt beaucoup plus courte que le pédicule, couverte de poils ou d'écailles, tantôt ovoïdale, tantôt allongée, très

rarement comprimée et formant ainsi une transition entre le balancier et l'aile. Chez *Wasmanniella* ils font complètement défaut.

C. Abdomen de l'Insecte parfait.

L'abdomen des Cécidomyies est allongé, ordinairement aminci vers l'extrémité, revêtu de poils appliqués ou d'écaillés, ou de longs poils dressés. Il se compose de neuf segments, dont les huit premiers sont munis d'une paire de stigmates. Chez le mâle, le neuvième segment porte l'armure génitale, qui est habituellement plus ou moins recourbée par en haut; chez la femelle, il porte l'oviducte. Dans les genres *Camptomyia* et *Rübsaamenia* les derniers segments abdominaux sont recourbés par en haut.

I. ARMURE GÉNITALE DU MÂLE. — La première description exacte de l'appareil génital d'un mâle de Cécidomyie a été publiée en 1886 par Riley, alors chef de la station entomologique de Washington [596, p. 287] : « Il est probable, écrit cet auteur, que l'appareil génital du mâle offre des caractères servant très avantageusement à distinguer l'espèce décrite, et c'est pour ce motif que j'ai donné une figure agrandie de ces parties. Il y a tout lieu de croire que pour cette famille, qui contient des espèces si petites, d'une coloration si uniforme et parmi lesquelles il est si difficile d'établir des différences spécifiques, on trouvera à l'avenir dans la forme de l'appareil génital les caractères les plus importants pour la classification. Il est vraiment étrange que les auteurs qui se sont occupés de Cécidomyies, aient accordé si peu d'attention à cet organe ». L'auteur américain me fit encore la même remarque plus tard par lettre, en m'envoyant le travail que je viens de citer. Sa supposition ne tarda pas à être prouvée : quatre ans plus tard, c'est-à-dire en 1890 [266, p. 29], je signalai pour *Rhopalomyia syngenesiae* (H. Lw.) la forme insolite de la pince, par laquelle cet insecte se distingue de la plupart des Cécidomyines.

Si nous considérons cet organe, nous y remarquons la pince ou forceps, les lamelles et le stylet.

La *pince* est formée par deux branches horizontales, incurvées l'une vers l'autre, se mouvant dans un même plan et composées chacune de deux articles. L'article basal (pl. 49, fig. 2, a) est ordinairement le plus gros, dans le genre *Macrolabis* il est même cinq ou six fois aussi gros que l'article terminal; sa surface est couverte d'une pubescence courte et assez dense; elle est, en outre, parsemée de poils longs et

obliquement dressés. Dans les genres *Schizomyia*, *Lestodiplosis* et *Dicerura* il est muni d'un appendice sur le dessous ou sur le côté interne comme c'est ordinairement le cas chez les Chironomides (pl. 19, fig. 7). L'article terminal (pl. 19, fig. 2, *f*) est de forme très variée suivant les genres ou, dans le groupe *Campylomyza*, suivant les espèces. Il est articulé à l'article basal et peut se mouvoir en dedans, indépendamment de ce dernier. Son extrémité est presque toujours munie d'un appendice en forme de crochet ou d'un groupe de petites épines. Sa surface est parfois glabre, ordinairement recouverte d'une fine pubescence, moins souvent parsemée de longs poils dressés.

Les *lamelles* sont au nombre de deux ou trois. Les deux premières se trouvent au-dessus du stylet qu'elles recouvrent en tout ou en partie; elles sont superposées l'une à l'autre et soudées ensemble par leur base, comme je l'ai démontré en 1891 [272, p. 243], de sorte qu'elles se meuvent dans le sens vertical, c'est-à-dire de bas en haut. Nous avons appelé, en 1891, la première (pl. 19, fig. 2, *a*) *lamelle supérieure* (*lamellula superior*), et la seconde (pl. 19, fig. 3, *b*) *lamelle intermédiaire* (*lamellula intermedia*). Dans la sous-famille des Cécidomyiines, la lamelle supérieure est presque toujours plus ou moins profondément bilobée; ces lobes sont arrondis, moi- ouvent échancrés ou tronqués obliquement. La lamelle intermédiaire est de forme plus variable, tantôt bilobée, tantôt échancrée, tantôt entière, ou encore étroite et linéaire, etc. Sa forme constitue souvent un caractère générique; d'autres fois elle indique un caractère spécifique, par exemple dans le genre *Hormomyia* dont quelques espèces, comme *H. cornifex* Kieff., *H. Lambertoni* Kieff., ont une lamelle intermédiaire à extrémité arrondie, tandis que d'autres, par exemple *H. Strobli* Kieff., offrent une échancrure à l'extrémité de cette lamelle. Riley [596, p. 288] a bien décrit ces deux lamelles pour *Contarinia piri-vora* (Ril.). Il dit de la lamelle supérieure « qu'elle est lobée en croissant » et que « les deux cornes du croissant atteignent environ l'extrémité du stylet (the tip of the style) ». La lamelle intermédiaire est décrite ainsi : « Immédiatement au-dessus du stylet (Still above the style) se voit une pièce divisée en deux lobes par une entaille médiane en forme de V ». C'est bien à tort que M. Rubsaamen [625, p. 48] a fait à Riley le reproche d'avoir mal observé, et a nié l'existence de cette entaille, en prétendant qu'au lieu de deux lamelles bilobées, il fallait admettre quatre lamelles entières, superposées deux à deux et fixées par leur base à un renflement de l'appareil génital. La figure 3, pl. 19, reproduction d'un dessin que j'ai publié en 1891 [272], représente les

deux lamelles relevées par en haut et dissipe tout doute sur la justesse de l'observation de Riley.

La *lamelle inférieure* (*lamellula inferior*) se trouve en dessous du stylet et se compose de deux pièces parallèles (pl. 19, fig. 2 et 3, c). Elle manque dans beaucoup de genres, par exemple chez les *Diplosides*.

Le *stylet* (*stylus*) est décrit ainsi par Riley [596, p. 288] : « Just above these clasps is the *style* ⁽¹⁾ or intromittent organ proper, a pointed process, reaching, when at rest, not quite to half the length of the swollen basal joint of clasps ». Cet organe (pl. 19, fig. 2 et 3, d) est subcylindrique, souvent un peu aminci vers le bout, transparent au moins dans sa moitié terminale, situé dans le même plan que la pince et fixé entre les deux branches de cette dernière.

II. OVIDUCTE. — On peut distinguer trois formes principales, à savoir l'oviducte à appendice en pochette, l'oviducte aciculaire et l'oviducte à lamelles.

L'*oviducte à pochette* (pl. 20, fig. 4) est presque toujours rétrac-

(1) J'ai cité ici les paroles mêmes de Riley; je m'étais contenté autrefois d'employer les termes de cet auteur, en désignant leur provenance; mais mal m'en a pris! Que l'on en juge par la remarque suivante que M. Karsch, professeur à l'Université de Berlin et rédacteur des *Entomologische Nachrichten*, a accepté de publier comme une « nouvelle entomologique » : « Si M. K. rougit d'employer le terme de pénis, il devrait rougir aussi de recourir au mensonge. Que l'on ouvre le volume de l'année 1887 du *Wiener Entom. Zeitung*, on y trouvera que Riley s'est servi tout au contraire du terme que M. K. ne veut pas employer... Les mensonges ont de courtes jambes ». M. Rübsaamen, l'aimable auteur de cette remarque, le même qui se flattait que « ses grossièretés (sic!) feraient cracher du fiel à un professeur de l'Université de Paris », a, dans le cas particulier, dupé le lecteur en le renvoyant non au texte original que j'avais cité, mais à une traduction allemande inexacte parue un an plus tard que le texte original! Son procédé est d'autant plus inexcusable que j'avais, dès 1891 [272, p. 243], indiqué le texte original dans les termes suivants : « Riley a désigné cet organe du nom de stylet (*style*), dans le *Report of the Entomologist for the year 1885*, Washington, 1886, p. 288 ». Si l'on recourt au texte original, il est facile de se convaincre que Riley a réellement, et à trois reprises, désigné l'organe en question du nom de *stylet*. Notons encore que le Professeur de l'Université de Berlin, honteux et confus — je lui avais relevé sur une seule des pages de sa Revue quinze assertions fausses — refusa d'insérer une rectification, ne voulant sans doute pas apprendre à ses lecteurs comment ses « *Nouvelles entomologiques de Berlin* » les avaient dupés (*cf. Berliner Ent. Zeitschr.*, 1896, p. 401-407).

tile et susceptible d'être très allongé; sa forme paraît subcylindrique et ses parois peuvent se dilater fortement, ce qui a lieu au moment de la ponte, l'œuf étant plus large que l'oviducte. A son extrémité, on remarque un appendice en forme de pochette, de même largeur que l'oviducte, muni comme lui de poils tactiles, fermé à son bout libre et ouvert longitudinalement en dessous, dans son tiers inférieur; à l'endroit de cette fente se trouve un minime appendice en forme de lamelle velue. Cette forme n'existe que dans la sous-famille des Cécidomyiines, où toutes les espèces du premier groupe, à l'exception de *Choristoneura* Rbs., et une partie de celles du second en sont pourvues. Comme cette sorte d'oviducte n'est pas apte à forer, il est évident que les espèces qui en sont munies ne peuvent pas entamer le tissu des plantes en y déposant leurs œufs.

L'*oviducte aciculaire* (pl. 20, fig. 1-3) est susceptible de s'allonger fortement comme le précédent, mais sa forme rappelle celle d'une aiguille et il ne se termine ni par un appendice en pochette ni par des lamelles distinctes. Son extrémité est munie d'une pointe qui offre en dessous, à sa base, une ouverture par laquelle l'œuf devra sortir au moment de la ponte. Cette forme n'existe également que dans la sous-famille des Cécidomyiines, c'est-à-dire chez un genre du premier groupe (*Choristoneura* Rbs.), chez trois genres du second groupe (*Asphondylia* H. Lw., *Schizomyia* Kieff. et *Cystiphora* Kieff.), puis chez trois genres du troisième groupe (*Monarthropalpus* Rbs. et imparfaitement chez *Contarinia* Kieff. et *Stenodiplosis* Reut.). Pour *Choristoneura*, *Asphondylia*, *Schizomyia* et *Monarthropalpus* l'oviducte paraît être apte à perforer le tissu d'une plante; *Contarinia* et *Stenodiplosis*, chez lesquels la pointe est plus ou moins distinctement bifide, élargie et munie de poils tactiles, et d'un minime appendice en dessous, forment la transition entre la seconde et la troisième forme.

L'*oviducte à lamelles* (pl. 21, fig. 4) est parfois susceptible de s'allonger comme les formes précédentes et d'atteindre même une longueur égalant plusieurs fois celle du corps, mais le plus souvent il n'est pas proéminent ni susceptible de s'allonger. Il se termine par une ouverture arrondie au-dessus de laquelle se voient deux lamelles parallèles, munies de poils tactiles, tandis qu'au-dessous de cette ouverture on ne remarque qu'une ou deux lamelles beaucoup plus petites. Cette forme existe chez toutes les espèces des sous-familles des Hétéropézines et des Lestrémines; dans la sous-famille des Cécidomyiines, on la trouve dans le genre *Mikiola* qui forme la transition entre le 2^e et le 3^e groupe, puis dans tous les genres du troisième groupe, à l'exception

de *Monarthropalpus*, *Contarinia* et *Stenodiplosis*, enfin chez tous ceux du 4^e groupe.

Ces lamelles peuvent présenter différentes formes. Tantôt elles ne se composent que d'un article unique (2^e et 3^e groupes des Cécidomyines), et alors elles sont plus ou moins soudées à leur base, formant ainsi une transition vers l'oviducte des *Contarinia* et des *Stenodiplosis*, ou bien elles sont entièrement libres, ce qui est ordinairement le cas; tantôt elles sont biarticulées, ce qui a lieu pour le 4^e groupe des Cécidomyines, à l'exception de quelques genres qui forment la transition entre ce groupe et le précédent: on trouve encore les lamelles biarticulées chez certaines Hétéropézines; enfin elles paraissent triarticulées chez quelques genres du 4^e groupe des Cécidomyines et chez tous ceux des Lestrémines. L'oviducte à lamelles est évidemment inapte à entamer une plante.

D. Cas d'anomalie.

Il n'est pas rare de trouver des cas d'anomalie chez l'insecte parfait. Nous avons déjà parlé du dimorphisme alaire qu'on pourrait faire rentrer ici. Le cas le plus fréquent se présente pour les palpes et les antennes. Il arrive que plusieurs articles des palpes sont soudés entre eux et n'en font qu'un. La même chose a lieu pour les antennes, surtout pour les deux derniers articles, comme je l'ai observé bien des fois. M. Marchal cite un cas d'anomalie pour *Mayetiola destructor* [446, p. 7] : « J'ai rencontré une antenne qui ne présentait que 2 + 11 articles; le second article mamelonné d'une façon irrégulière, résultait de la réunion de trois articles, le quatrième et l'avant-dernier résultaient chacun de la réunion de deux ». Pour *Contarinia ononidis* Kieff. j'ai signalé un cas plus remarquable : « L'unique mâle que j'ai obtenu offrait une anomalie assez curieuse : l'une de ses antennes était conformée comme d'ordinaire, c'est-à-dire chaque article du funicule composé de deux renflements globuleux et de deux cols; l'autre avait les quatre premiers et les cinq derniers articles du funicule semblables à ceux de la première antenne; l'article cinquième paraissait encore composé de deux renflements globuleux, mais à peine séparés par un rétrécissement et non plus par un long col ou pédicule; le sixième n'offrait plus qu'un renflement unique, allongé, un peu moins gros au milieu qu'aux deux bouts, et semblable aux articles du funicule de la femelle; le septième semblable au cinquième » [324, p. 105]. On a donc ici le cas de l'antenne d'un mâle, dont un article a adopté la forme de ceux de la femelle, et deux autres une forme intermédiaire. En réalité, chez trois Diplosides, *Clinodiplosis Liebeli* Kieff., *aberrans* Kieff. et *Massalongia*

rubra Kieff. le funicule du mâle est conformé comme chez la femelle.

Chez le mâle de *Clinodiplosis caricis* Kieff. j'ai observé une anomalie encore plus étrange : l'antenne offre ici une tendance à se bifurquer (pl. 18, fig. 7). L'article neuvième est normal, c'est-à-dire composé d'un renflement globuleux séparé par un col plus long que lui, d'un renflement piriforme terminé lui-même par un col aussi long que lui; l'article dixième a le renflement globuleux ainsi que le col qui le sépare du renflement piriforme normaux, mais le renflement piriforme est dépourvu de col et soudé par toute sa largeur au douzième article; le onzième article sort latéralement de l'extrémité du dixième et de la base du douzième, avec lesquels il forme presque un angle droit; il est dépourvu de col et se compose d'un renflement basal globuleux et d'un renflement terminal plus gros et subglobuleux.

2° Caractères anatomiques de l'imago.

Il ne sera question ici que de l'appareil respiratoire. Comme chez la larve, le nombre de stigmates est de neuf paires, réparties de la façon suivante : la première paire se voit latéralement un peu en avant de l'insertion de l'aile; les huit autres sur les huit segments abdominaux, dont le dernier semble être la base de l'oviducte. M. Marchal indique au contraire deux paires de stigmates au thorax, à savoir une en arrière du prothorax et l'autre au métathorax. De même que chez la larve, les trachées forment deux troncs latéro-dorsaux, de forme sinueuse, émettant au côté externe, à chacun des sept premiers segments abdominaux, une branche transversale, qui se rend à un stigmate; après chaque branche externe, les troncs sont réunis entre eux par une branche interne moins grosse, également transversale et presque droite, qui émet de chaque côté de son milieu un rameau dirigé en avant et se perdant en un faisceau fibrilleux communiquant avec le vaisseau dorsal.

3° Caractères physiologiques de l'imago.

A l'état d'insecte parfait, les Cécidomyiides ne vivent que quelques jours, parfois même quelques heures seulement, du moins en captivité. Comme Laboulbène l'a déjà remarqué pour *Monarthropalpus buxi* Lab. et *Perrisia papaveris* Winn., « l'accouplement a lieu à la manière des chiens, le mâle et la femelle étant placés sur une même ligne » [344, p. 323]. Les mâles meurent peu après l'accouplement, tandis que les femelles s'éloignent et cherchent un endroit propice pour y effectuer leur ponte. Au repos l'insecte appuie tous ses tarses sur le support;

chez *Choristoneura sarothamni* Kieff., les pattes postérieures sont au contraire relevées par en haut, recourbées et éloignées du support, de sorte que l'insecte ne s'appuie que sur ses quatre pattes antérieures.

VOL ET MOUVEMENTS. — Le vol des Cécidomyies est lesté à l'état de liberté. C'est ainsi que les espèces lignicoles qui se trouvent en abondance sur les quartiers de bois empilés dans les forêts, sont difficiles à saisir, parce qu'elles s'envolent rapidement et au loin, dès qu'on les approche. Il en est de même des espèces cécidogènes. Même celles au corps épais et lourd, comme *Mikiola fagi* Hart. et les *Hormomyia* H. Lw., volent fort haut, bien que plus lourdement. On trouve les galles de la première jusqu'au sommet des grands Hêtres, et j'ai capturé des représentants du second groupe sur des fenêtres du second étage au collège de Bitché. Il en est autrement pour les individus obtenus par éclosion; leur vol est toujours plus lourd qu'à l'état de liberté.

Les *Porricondyla*, *Dicrodiplosis longipes* Kieff. et d'autres espèces aux pattes d'une longueur démesurée se posent volontiers sur les toiles d'Araignée tendues verticalement sur les quartiers de bois empilés et s'y balancent en leur imprimant un mouvement de va-et-vient assez rapide; quand on approche d'elles un tube à alcool pour les capturer, elles s'envolent précipitamment, sans être aucunement retenues par la toile. Quant au contraire elles se sont précipitées pendant leur vol, dans une toile d'Araignée qu'elles n'avaient sans doute pas remarquée, elles s'y empêtrent et demeurent ordinairement prises.

NOURRITURE. — Il est rare que l'on aperçoive une Cécidomyie prenant de la nourriture. Quelques *Lasioptera* et *Clinorhyncha* et quelques Lestrémines butinent sur les fleurs d'Ombellifères, surtout d'*Heracleum sphondylium*. Selon Rondani [612, p. 491], les femelles de *Micromyia lucorum* Rond. se prennent en mai dans les fleurs d'Aristolochie et procurent indirectement la fécondation de cette plante. Selon Meigen [477, p. 81], les femelles de *Campylomyza aceris* Meig. se trouvent en abondance sur les feuilles de l'*Acer platanoides*. J'ai observé plusieurs fois des *Campylomyza* posés sur des feuilles très légèrement humides et y appuyant leur trompe à différentes reprises, comme pour en pomper le suc. Apetz a fait l'observation suivante. Un *Campylomyza* était posé sur une chenille de *Smerinthus ocellata* et paraissait s'y être solidement fixé. Une seconde fois le même fait fut observé et l'on remarqua distinctement que le Diptère suçait la chenille, à la façon des *Culex*. L'auteur en concluait que les *Campylomyza* semblaient tenir le rôle des *Culex* auprès des chenilles [12, p. 62]. Comme les parties buccales

des *Campylomyza* ne leur permettent pas d'entamer un tissu, mais seulement de lécher et de pomper un suc, on ne peut donc accorder à ces insectes le rôle des Culicides.

PONTE. — Au moment où il se dispose à pondre, l'insecte court en tous sens sur la partie de la plante à laquelle il veut confier ses œufs. A-t-il trouvé un endroit propice, il courbe alors la partie postérieure de son abdomen perpendiculairement à la surface du support, mais l'oviducte est couché parallèlement à cette surface et animé d'un mouvement vibratoire. D'autres fois, par exemple chez *Xylodiplosis praecox* Winn., l'oviducte est perpendiculaire au plan du support dans lequel il pénètre. On voit alors la base de l'oviducte se renfler considérablement; à ce moment, l'insecte semble se reposer un instant, puis, après un nouvel effort, l'œuf entre dans l'oviducte qu'il traverse ordinairement si rapidement que l'œil a peine à le suivre; pendant ce trajet, l'oviducte s'étend considérablement dans le sens de sa hauteur, mais peu dans celui de sa largeur, et le pli longitudinal que l'on voit de chaque côté avant la ponte disparaît; arrivé à l'extrémité de l'oviducte, l'œuf y subit un nouvel arrêt, étant retenu en partie par la pochette ou les lamelles de l'oviducte ou encore par un liquide visqueux qui le fait adhérer faiblement à l'oviducte, de sorte que l'insecte peut le fixer au substratum. Souvent 2 à 7 œufs se succèdent de la sorte en se poussant l'un l'autre et forment ensuite comme une chaîne composée d'autant d'anneaux. D'autres fois les œufs sont pondus en amas plus ou moins considérable. C'est ainsi que Winnertz a observé dans une seule galle : pour *Perrisia cardaminis* Winn. 10 à 15 larves, pour *P. acrophila* Winn. 20 à 25, et pour *Dasyneura brassicae* Winn. 50 à 60. Pour *Contarinia pulchripes* Kieff. j'en ai observé 86 dans une seule gousse de Genêt, et pour *C. campanulae* Kieff. 103 dans une seule fleur de Campanule. Nous parlerons plus loin, en traitant de l'œuf, du nombre d'œufs que renferme le corps d'une femelle.

Quant à l'endroit où s'effectue la ponte, ce n'est pas toujours celui où les larves trouveront leur nourriture; dans ce cas celles-ci seront obligées d'effectuer une migration immédiatement après leur sortie de l'œuf. Citons quelques exemples : *Mayetiola destructor* Say pond ses œufs sur la face supérieure des feuilles du Blé, dans les sillons qui se trouvent entre les nervures; la larve descend de la feuille immédiatement après son éclosion, jusqu'à ce qu'elle se soit dérobée à la lumière sous la gaine. Il en est de même de *M. avenae* March., de *Dasyneura scirpi* Kieff., etc. *Mikiola fagi* Hart. pond sur un bourgeon de Hêtre ou sur l'écorce immédiatement en dessous d'un bourgeon; les jeunes

larves pénètrent entre les écailles jusque sur les petites feuilles sur lesquelles elles se fixent. *Contarinia campanulae* Kieff. et *Perrisia saxifragae* Kieff. déposent leurs œufs sur les fleurs encore à l'état de bouton, et les larves pénètrent plus tard dans celles-ci sans les perforer. Il semble que dans tous ces cas la larve fuit la lumière. D'autres espèces, telles que *Contarinia pulchripes* Kieff., *Xylodiplosis praecox* Winn., etc. déposent leurs œufs à l'endroit même où la larve trouvera sa nourriture.

On peut voir au printemps, dans les forêts, des quartiers de bois de Hêtre entassés à côté de bois de Chêne; les femelles de *Xylodiplosis praecox* Winn. se rendront en foule sur la surface de section de ce dernier pour y déposer leurs œufs, mais aucune ne s'aventurera sur le bois de Hêtre. Les femelles d'*Endaphis perfidus* Kieff. déposent leurs œufs sur le corps des Aphides, mais je n'en ai jamais vu pondre sur la feuille qui portait ces derniers. L'instinct de propagation a donc ici une double direction : il porte la Cécidomyie femelle non seulement à pondre, mais à le faire sur la plante nourricière de préférence à toute autre. Chez les espèces obtenues par éclosion et conservées en captivité, on peut remarquer au contraire qu'elles déposent leurs œufs même sur des plantes qui ne peuvent pas nourrir leurs larves; bien plus, on les voit fréquemment pondre sur la paroi en verre du bocal qui les emprisonne; d'autres fois on peut même les voir pondre, alors qu'elles sont placées sous le microscope, sur la lame porte-objet, et recouvertes par la lamelle couvre-objet. Dans tous ces cas on peut admettre que l'insecte qui, du reste, vit moins longtemps et vole plus lourdement en captivité qu'à l'air libre, était à son déclin, et que, n'ayant plus la force ou la possibilité de rechercher la plante nourricière, il obéit du moins, en pondant même à n'importe quel endroit, à une des deux directions de l'instinct de propagation.

Beaucoup d'auteurs admettaient que les femelles des Cécidomyies perforaient le tissu végétal pour y déposer leurs œufs. Il est certain que, dans la plupart des cas, l'oviducte de la femelle n'est pas apte à forer. Seuls les genres *Asphondylia* H. Lw., *Schizomyia* Kieff., *Monarthropalpus* Rbs. et *Choristoneura* Rbs. renferment des espèces dont la tarière paraît capable de perforer un tissu végétal, mais je n'ai pas encore pu m'assurer si cette perforation a réellement lieu. Laboulbène l'affirme pour *Monarthropalpus buxi* Lab. : « C'est au moyen de sa tarière, écrit-il, que la femelle dépose ses œufs dans les feuilles du Buis. M. Jules Fallou, qui a pu suivre la femelle pendant la ponte, m'en a raconté les particularités de la façon suivante : La ponte dure 12 à 14 minutes. Les femelles se posent sous la feuille du Buis, puis elles

enfoncent leur tarière par des mouvements alternatifs de va-et-vient. Elles se reposent au bout de six minutes, puis aux deux tiers du temps complet. Pendant le dernier tiers de la ponte, la femelle imprime au corps un mouvement de rotation; il est probable qu'alors elle dépose son œuf, puis elle s'échappe et cherche une autre feuille » [344, p. 323]. « M. Fallou m'a montré les œufs déposés dans les feuilles du Buis. Ils ressemblent à ceux qui ont été extraits du corps » [ibid. p. 345].

En observant la ponte de *Contarinia pulchripes* Kieff., j'ai vu la femelle introduire sa tarière à travers une valve de la gousse du Genêt; ouvrant ensuite cette gousse, j'ai trouvé un amas d'œufs pédonculés contre une jeune graine, mais en examinant attentivement à la loupe la surface de cette gousse ainsi que de celles sur lesquelles j'avais remarqué des pondeuses, je pus voir que les trous n'étaient pas fraîchement forés, mais un peu noirâtres; comme, d'autre part, des œufs non pédonculés et beaucoup plus gros que ceux de la Cécidomyie se trouvaient à l'intérieur de ces gousses, il en faut conclure que les ouvertures ont été faites par des Apionides ou par des Chalcidites dont les larves se voient en abondance plus tard, et que les Cécidomyies en ont profité. On se trouve donc ici devant un cas de symbiose.

GÉNÉRATION. — Il est probable que la parthénogénèse n'existe pas chez les Cécidomyies. J'ai vu bien des fois des femelles non fécondées déposer leurs œufs à l'endroit où elles se trouvaient et jamais il n'en est sorti une larve; le contraire avait lieu pour les femelles fécondées. Enock et Marchal font la même remarque pour *Mayetiola destructor* Say et *avenae* March. Il semble donc que ces Diptères ne se propagent à l'état d'imago que par génération sexuée, et à l'état larvaire par pædogénèse, comme nous le verrons en traitant des larves. Quant au nombre de générations dans une année, il varie selon les espèces.

Dans beaucoup de cas il n'existe qu'une seule génération par an, dans d'autres on en distingue plusieurs. D'après les observations de M. Marchal, *Mayetiola destructor* Say peut, si elle trouve les circonstances favorables pour son développement, présenter jusqu'à six générations par an, mais dont la plupart sont partielles.

II. — Caractères généraux de la Nymphe.

Nous traiterons successivement : 1° du passage de la larve à l'état de nymphe, 2° de la morphologie de cette nymphe, 3° de son enveloppe, 4° du lieu, de la durée, de l'époque et des conditions de la nymphose, enfin 5° des mouvements de la nymphe.

1^o Passage de l'état larvaire à l'état nymphal.

Dans son Étude sur les Cécidomyies des céréales, M. le Docteur P. Marchal décrit ainsi le passage de la larve à la nymphe chez *Mayetiola destructor* Say : « Pendant cette période de repos s'accomplissent les phénomènes préparatoires de la nymphose. Le sac céphalique qui contient les histoblastes des antennes, des yeux et des parties céphaliques adjacentes est facilement visible par transparence; il en est de même des histoblastes des pièces buccales, des pattes, des ailes et des balanciers, et l'on peut suivre leur développement graduel. Lorsque le moment de l'apparition de la nymphe est proche, la peau est complètement tendue, et entre elle et la nymphe se trouve une mince couche de liquide. A ce moment on voit encore battre le cœur. Ce stade est celui de pronymphe... A ce stade, le sac céphalique commence déjà à se dévagner, et son orifice, par lequel passe l'extrémité de l'antenne, s'est notablement élargi. A mesure que la pronymphe se gonfle et que l'orifice du sac s'élargit, les organes contenus dans le sac qui se dévagine se trouvent graduellement refoulés au dehors. La peau se tend enfin en avant du corps, la nymphe se dégage alors de sa peau larvaire et se trouve mise à nu; en même temps, le sac céphalique s'est entièrement dévagné en faisant apparaître les différentes parties qu'il contenait dans leur position définitive, et en entraînant à sa suite le cerveau qui se trouve logé dans la tête. Le disque oculaire de concave est devenu convexe; les antennes se sont dépelotonnées, en outre les nombreux plissements transversaux qui existaient sur toute leur longueur se sont étendus, de sorte qu'elles paraissent beaucoup plus longues. Il en est de même de tous les appendices. Pendant le stade correspondant à la pronymphe, et seulement pendant ce stade, les trachées m'ont paru vides d'air » [446, p. 27].

2^o Morphologie de la Nymphe.

Il est assez difficile de découvrir les nymphes des Cécidomyies qui se métamorphosent en terre; il faut pour cela, quand les éclosions commencent, remuer la terre de laquelle sortent les Diptères et chercher à découvrir les cocons ellipsoïdaux et couverts de terre, qui renferment les nymphes. Même les nymphes qui se transforment dans la cécidie, mais dans un cocon, ne peuvent pas toujours être extraites facilement de leur enveloppe et il faut bien des précautions si l'on veut déchirer cette dernière sans entamer en même temps la nymphe. Mais si l'on ne veut étudier que la morphologie, il existe un autre procédé qui est

fort simple. Au moment de l'éclosion, la dépouille nymphale, c'est-à-dire la peau de la nymphe, reste fixée à l'endroit où l'imago en est sortie ; on la trouvera donc, émergeant à moitié de terre, ou bien fixée par sa base à l'ouverture de la galle ou dans une fente d'écorce, suivant que l'éclosion a eu lieu dans l'un ou l'autre de ces endroits ; parfois l'imago la traîne encore avec elle, n'ayant pu réussir à se dégager complètement. En règle générale, cette dépouille est molle, souple et parfaitement transparente ; chez les *Asphondylia* toutefois elle est brune, chitineuse et dure ; chez *Cécidomyia pini* D.G. elle est également brune et chitineuse, mais seulement en partie et moins fortement. Que l'on mette cette dépouille nymphale sur une lame de verre, qu'on l'humecte avec de l'eau, qu'on la comprime ensuite avec une épingle de façon à en faire disparaître les plis et les bulles d'air, et l'on obtiendra en quelques instants une dépouille parfaitement transparente et se prêtant très bien à l'observation.

Comme les chrysalides des Papillons, les nymphes des Cécidomyies sont conformées de telle façon qu'on y reconnaît presque toutes les parties de l'insecte parfait ; elles ressemblent par là à celles des autres Nématocères et diffèrent d'une façon considérable de celles des Muscides qui sont de véritables pupariums.

La coloration est blanche ou rougeâtre au commencement ; les yeux prennent ensuite une teinte brune, puis noire ; le reste du corps s'assombrit à mesure que le moment de l'éclosion approche ; quand ce moment est arrivé, la ligne dorsale du thorax se fend dans presque toute sa longueur. Voici en quels termes Laboulbène décrit l'éclosion de *Monarthropalpus buxi* Lab. : « C'est le matin qu'on peut être sûr de voir le curieux spectacle d'une nymphe qui, taraudant avec ses saillies frontales la mince pellicule, apparaît au dehors. Cette nymphe est agile, car elle s'agite vivement toutes les fois qu'on l'inquiète ou qu'on la met à découvert ; au moment où elle doit se transformer, elle sait fort bien trouver le petit espace arrondi et rendu très mince par la larve prévoyante. Une partie de la tête est dégagée, le thorax apparaît, puis la nymphe avance encore, dirigée en bas, car c'est toujours sur la partie inférieure des feuilles de Buis qu'est le point de sortie dont je parle. Après une série de temps de repos, le thorax s'est ouvert et le corps sort lentement. On voit se détacher d'abord les antennes ; si c'est un insecte femelle, les ailes, puis les pattes. Si c'est un mâle, les ailes, les pattes antérieures sont retirées, puis les intermédiaires et les longues antennes viennent les dernières. Enfin, après avoir dégagé toutes ses pattes, la Cécidomyie parvient à faire sortir l'abdomen du fourreau nymphal et elle prend position sur ses longues jambes en remuant ses

ailes encore petites et noirâtres, tandis que son corps est d'une couleur blanchâtre. Elle acquiert peu à peu sa teinte orangée, elle essaie ses ailes devenues transparentes et si délicatement frangées, puis elle s'envole, s'abaissant et se relevant par petites saccades » [344, p. 30-31].

Comme nous venons de le dire, la peau de la nymphe est habituellement transparente. Chacune des antennes est renfermée dans une gaine avec des articulations plus ou moins distinctes et correspondant aux articles des antennes; ces deux gaines se courbent au-dessus des yeux pour se rapprocher ensuite sur la poitrine, sur le bord antérieur des ailes (pl. 23, fig. 10-14). Selon Bouché, *Winnertzia salicis* Bouch. aurait les étuis des antennes hérissés de soies, mais ce doit être une erreur; toutes les espèces observées jusqu'ici, y compris celles du genre *Winnertzia* Rond., ont ces organes entièrement glabres. Chacun des palpes est également renfermé dans une gaine plus ou moins courbée à sa base et remontant parallèlement au bord interne de l'œil, mais non articulée; une autre gaine renferme les parties buccales (pl. 24, fig. 3 et 12). Les pattes et les ailes sont renfermées dans des fourreaux particuliers; ceux des pattes postérieures sont les plus longs et situés en dehors, ceux des pattes antérieures les plus courts et placés en dedans. Il est à remarquer que chez les individus brachyptères, le fourreau des ailes est néanmoins aussi grand que chez les sujets normaux, et que l'aile dans ce cas ne le remplit qu'en partie.

Laboulbène a déjà remarqué qu'on pouvait distinguer les sexes pendant la nymphose. Le mâle se distingue en effet par le fourreau de la pince à l'extrémité de son corps. et par le fourreau antennaire ordinairement plus long, surtout chez les *Diplosides*.

Les différents organes ou téguments visibles sur la surface de la nymphe peuvent être groupés en papilles, verrues, spinules, armures et stigmates.

I. PAPILLES ET SOIES. — Leur office nous paraît être celui d'organes tactiles. Nous distinguons ici les papilles cervicales, faciales, thoraciques, dorsales et latérales.

1. *Papilles cervicales* (*Papillae cervicales* Kieff., mars 1895 [295]). Les anciens auteurs tels que Dufour, 1841 et 1845, avaient déjà remarqué sur le vertex de la nymphe des Cécidomyies, deux soies plus ou moins longues, que Laboulbène, en 1857, désigna du nom de *soies cervicales*, et Wachtl, plus tard, de celui de *Scheitelborsten*.

En réalité, il s'agit ici de papilles, avec ou sans soie, situées en arrière de l'insertion du fourreau des antennes. Voici en quels termes j'ai

fait voir en 1895 qu'elles sont toujours au nombre de quatre et non pas de deux, comme on l'avait cru jusqu'alors : « De chaque côté du vertex se voit un mamelon portant deux papilles ; l'extérieure de ces papilles se termine toujours par une soie ordinairement fort longue, tandis que l'intérieure, plus petite, est toujours dépourvue de soie ; entre les deux mamelons se voit une arête transversale, plus ou moins chitineuse » [296], diversement conformée selon les espèces (pl. 24, fig. 18, a) et pouvant aussi faire entièrement défaut. J'ai constaté depuis cette époque, que la papille interne peut également porter une soie, mais qui est alors beaucoup plus petite que l'externe. De même la papille externe peut être dépourvue de soie ; en ce cas, les soies du vertex sont donc entièrement défaut, ce qui n'a jamais lieu pour les papilles elles-mêmes.

2. *Papilles faciales* (*Papillae faciales* Kieff., mars 1895 [295] ; *Setae rostrales* et *infra-oculares* Rübsaamen, juillet 1895 [637]). Au-dessus des parties buccales, entre les deux yeux, on voit de chaque côté une ou deux papilles, dont l'une est habituellement munie d'une soie, tandis que l'autre en est dépourvue ; nous les avons nommées *papilles faciales supérieures* ; chez les Cécidomyies elles sont plus rapprochées du bord inférieur des yeux que du bord supérieur (pl. 24, fig. 3), tandis que l'inverse a lieu pour les Lestrémines et les Hétéropézines (pl. 24, fig. 12). Entre la base du fourreau des palpes et le bord inférieur des yeux, se voit chez les Cécidomyines, un groupe de trois papilles généralement munies d'une minime soie (pl. 24, fig. 3), ou, chez les Lestrémines, une papille unique munie d'une longue soie, à côté de laquelle se trouve parfois une papille sans soie (pl. 24, fig. 12) ; ce sont les *papilles faciales inférieures*. Enfin au bord supérieur et externe des yeux apparaît encore une autre papille portant une longue soie chez les Lestrémines (pl. 24, fig. 12), et habituellement dépourvue de soie chez les Cécidomyines, c'est la *papille faciale externe*, que j'ai considérée, en la signalant pour la première fois, comme faisant partie des papilles latérales.

3. *Papilles thoraciques* (*Papillae thoracales* Kieff., l. c.). Le thorax des nymphes présente, d'une façon peu distincte, trois segments dont le dessus est lisse et glabre, à l'exception des sutures qui sont habituellement un peu rugueuses ou couvertes de rides. Chacun de ces segments offre, de chaque côté de la suture médiane et longitudinale qui se déchirera au moment de l'éclosion, une rangée transversale de trois papilles, dont la première et la dernière sont munies d'une soie ; les deux premiers segments ont en outre, dans le même alignement, deux papilles portant chacune une soie ; en dehors de celles-ci, mais seule-

ment au premier segment, se voit encore une papille mais dépourvue de soie. Chez les Cécidomyines, ces soies sont toujours très petites et, par suite, difficiles à découvrir; chez les Lestrémines, celles des deux premiers segments sont longues et très apparentes.

4. *Papilles dorsales* (*Papillae dorsales* Kieff., l. c.). Les huit segments abdominaux portent sur le dessus, entre les deux stigmates, mais plus bas qu'eux, une rangée transversale de six papilles, dont ordinairement l'externe de chaque côté, et parfois toutes sont munies d'une courte soie; le huitième segment abdominal fait exception, en ce sens que le nombre des papilles dorsales n'y est jamais de six, mais seulement de deux chez les Cécidomyines, à l'exclusion du groupe des Épidosides (pl. 24, fig. 10), ou bien de quatre chez les Lestrémines et le groupe des Épidosides (pl. 24, fig. 7); dans le premier cas le segment anal offre sur le dessus, de chaque côté, une papille, et dans le second cas, trois papilles munies d'une courte soie.

5. *Papilles latérales* (*Papillae laterales* Kieff., l. c.). De chaque côté des segments thoraciques se voient deux papilles latérales (pl. 23, fig. 15, et 24, fig. 6); de même, les segments abdominaux présentent de chaque côté, en dehors du stigmate, deux, trois ou quatre papilles, dont l'une appartient au dessus, les autres au dessous du segment. Toutes les Cécidomyines, à l'exception des Épidosides, sont dans le premier cas; toutes les autres dans le second. Dans le genre *Aprionus*, la soie que porte la première des papilles latérales est fort longue, parfois beaucoup plus longue que le segment lui-même (pl. 23, fig. 15, et 24, fig. 7).

II. VERRUES ABDOMINALES (*Verrucae abdominales* Kieff., l. c.). — Tandis que le thorax des nymphes est ordinairement lisse, rarement rugueux ou chagriné, par exemple chez *Winnertzia*, leur abdomen est toujours couvert de petites verrues pointues et dirigée en arrière (pl. 24, fig. 10). Leur but est de favoriser les mouvements de la nymphe lorsqu'elle veut se déplacer, mais surtout au moment de l'éclosion. Comme pendant ces mouvements les segments rentrent un peu les uns dans les autres, les verrues abdominales font défaut sur le dernier quart des segments, c'est-à-dire sur la partie qui rentre sous le bord antérieur du segment suivant.

III. SPINULES DORSALES (*Spinulae dorsales* Kieff., l. c.). — Beaucoup de nymphes portent sur le dessus des segments abdominaux, au bord antérieur, plusieurs rangées transversales de spinules brunes, rarement subhyalines, dirigées en arrière et groupées de façon à former un arc

de cercle (pl. 24, fig. 10). Leur partie médiane et leur extrémité sont ordinairement plus chitineuses que les parties latérale et basale; parfois elles sont plus ou moins profondément bifides (pl. 24, fig. 14); Perris les désignait déjà du nom de spinules, en 1870. Elles manquent toujours au premier segment abdominal et ordinairement aussi au segment anal; elles ne forment donc habituellement que sept séries, réparties sur les segments abdominaux 2 à 8. Dans certains genres, par exemple *Asphondylia* H. Lw., elles ne font jamais défaut; dans d'autres, par exemple *Oligotrophus* Latr., elles manquent habituellement, enfin dans d'autres, par exemple chez *Perrisia* Rond., elles sont tantôt développées, tantôt nulles. Le but de ces spinules est le même que celui des verrues abdominales.

IV. ARMURES. — Nous distinguons une armure cervicale, frontale, sternale et latérale.

1. *Armure cervicale* ou *Cornes céphaliques* (*Aculei verticales* Wachtl, 1881). La plupart des nymphes sont armées, sur le haut de la tête, de deux prolongements pointus, diversement conformés, bruns, durs, fixés à la base du fourreau des antennes (pl. 24, fig. 13). Ils ont été signalés et figurés d'abord par De Geer en 1782 [96, p. 154, fig. 13]. Il est vrai que l'auteur suédois les nomme « deux petits organes respiratoires de forme conique », de sorte que l'on pourrait croire qu'il est question de stigmates thoraciques, mais le dessin qu'il en donne, ne laisse aucun doute à ce sujet. Laboulbène leur a donné, en 1846, le nom de cornes céphaliques. Leur forme est ordinairement conique, parfois avec une dent à leur base, comme H. Loew l'a déjà indiqué en 1850 pour *Rhabdophaga salicis* D. G. et *Acodiplosis inulæ* H. Lw., d'autres fois dentelée, par exemple chez *Asphondylia* H. Lw.

Quant à la destination de cette armure, les auteurs s'accordent à dire qu'elle sert à perforer, au moment de l'éclosion, la mince paroi du cocon ou de la galle, qui sépare l'insecte du dehors. C'est ainsi que Dufour écrivait déjà en 1841 de la nymphe de *Rhabdophaga saliciperda* Duf. : « Nymphé terminée en avant par un rostre droit et bilide, muni d'un poil de chaque côté de sa base... Rien de plus curieux que la physionomie bizarre de cette nymphe dont la tête semble se terminer par une sorte de hure de deux pièces mandibuliformes, qui font l'office de tarière pour percer le bois. » Un peu plus tard, en 1846, le même auteur écrit de la nymphe de *Lasioptera eryngii* Duf. : « La larve, par un admirable instinct, par une mission toute providentielle, conduit sa galerie jusqu'à l'épiderme cortical de la galle, de manière que ce mince diaphragme la met à l'abri des agents extérieurs. Avertie

de sa métamorphose en nymphe, elle vient se placer justement tout près de cette vitre membraneuse. La nymphe, en travail d'insecte ailé, perce avec la double pointe de sa tête le diaphragme. Au moyen de mouvements successifs insensibles et à la faveur de sa forme cylindrique elle s'engage jusqu'au quart postérieur de sa longueur dans l'ouverture qu'elle vient de pratiquer ». Winnertz reproduit de même l'assertion de H. Loew, d'après laquelle les cornes céphaliques « permettent à la nymphe de transpercer la galle ».

On peut remarquer en effet, que les nymphes qui n'ont rien à percer ni à soulever, sont inermes, tandis que toutes les autres ont une armure céphalique. C'est par ce caractère que j'ai distingué *Rhabdophaga dubia* Kieff. de *R. salicis* Schrk. avec laquelle cette espèce avait été confondue jusque-là, parce que toutes deux forment sur les rameaux des Saules des renflements arrondis et d'égale grosseur. Le moment de la maturité est-il arrivé, la larve de *R. salicis* commence le long et pénible travail de perforation à travers la couche ligneuse et corticale et ne laisse entre elle et le dehors qu'une pellicule mince et transparente; ce travail achevé, elle se change en nymphe. Celle de *R. dubia* au contraire, guidée par un tout autre instinct, n'essaie pas d'entreprendre un travail aussi pénible et se change en nymphe au centre du renflement. Que l'on compare maintenant les nymphes des deux espèces; celles de *R. salicis* placées de divers côtés, chacune derrière la membrane recouvrant l'ouverture circulaire préformée par la larve, sont munies d'une forte armure céphalique, avec laquelle elles pourront transpercer cette membrane; celles de *R. dubia* au contraire, demeurées au centre de la nodosité, sont entièrement inermes, et l'on se demande comment elles en sortiront. De Geer s'en est déjà préoccupé, il y a plus de cent ans, et il nous a transmis son observation qui est parfaitement exacte : « Je désirais savoir, écrit-il, comment la petite mouche, qui n'a ni mandibules ni dents, s'y prendrait pour sortir de cette épaisse galle ligneuse. J'ai remarqué qu'elle le fait avant de se débarrasser de sa dépouille nymphale et à un endroit préparé par la nature. Les bourgeons qui recouvrent la nodosité et qui, dans des conditions normales, auraient donné des rameaux, se sont desséchés et ont occasionné la formation d'un canal plus ou moins obstrué par les écailles desséchées du bourgeon et communiquant avec la cavité larvaire. La nymphe se hisse d'une cavité dans l'autre, jusqu'à ce qu'elle soit enfin arrivée à l'air libre, c'est-à-dire à l'endroit du bourgeon, et que sa moitié antérieure dépasse la surface de la nodosité; l'imagó se débarrasse alors de sa peau de nymphe qui reste fixée à l'ouverture » [96, p. 156].

Néanmoins on a tort de généraliser, car ces cornes céphaliques ne servent pas toujours à percer, mais parfois seulement à soulever l'opercule de la galle. En effet, dans bien des cas, par exemple chez *Rhopalomyia syngenesiae* H. Lw., la larve se préforme au sommet de la galle un espace circulaire dont les bords seuls sont entamés en forme d'anneau; au moment de l'éclosion l'insecte pousse avec ses deux longues cornes céphaliques contre cet opercule qui se détache et tombe. Fr. Löw a fait la même remarque pour *Oligotrophus Reaumurianus* Fr. Lw. : « Avant de se métamorphoser, la larve préforme tout autour de la pointe conique de la galle un sillon annuliforme, dont le but est de permettre à la nymphe de se dégager, car il se forme de la sorte une espèce de couvercle que la nymphe, au moment de l'éclosion, n'aura qu'à soulever pour se trouver en liberté » [415, p. 390].

2. *Armure frontale* (*Aculei frontales* Wachtl, l. c.). Cette armure, ainsi que la suivante, n'a encore été observée que sur les *Asphondylia*. Elle consiste en deux saillies chitineuses, pointues, soudées par leur base et situées vers le milieu de l'espace qui sépare les yeux, et se dirigeant obliquement par en haut.

3. *Armure sternale* (*Aculei sternaes* Wachtl, l. c.). Elle se trouve non point sur la poitrine, comme le nom semblerait l'indiquer, mais entre les bords inférieurs des yeux, au-dessus des fourreaux des palpes. Elle consiste en un prolongement oblique, court et large, muni de trois dents, dont l'intermédiaire est ordinairement pointue et les deux latérales obtuses (pl. 24, fig. 10).

4. *Armure latérale* (*Aculei laterales*). J'appelle de ce nom deux saillies brunes et chitineuses, écartées l'une de l'autre et fixées au bord interne des deux yeux. On la trouve chez quelques espèces, mais elle est surtout bien apparente chez *Rhopalomyia Giralddi* Kieff. et Trott.; ici les deux saillies sont aussi larges que hautes et fixées perpendiculairement à la surface.

V. STIGMATES. — La nymphe, de même que l'imago et la larve, offre neuf paires de stigmates, dont la première se trouve sur le prothorax et les autres sur les huit segments abdominaux. Les stigmates du thorax diffèrent par leur forme de ceux de l'abdomen; chez les Cécidomyines, ils paraissent habituellement sous forme de tube brun, droit ou arqué, ordinairement aminci vers le bout (pl. 24, fig. 8-9). Une trachée parcourt ce tube jusqu'au sommet et elle paraît se souder avec lui au moins dans la partie terminale; à cet endroit et parfois sur toute la longueur, on remarque sur le stigmate une ou plusieurs

rangées longitudinales de petites ouvertures circulaires par lesquelles l'air peut pénétrer, soit que ces ouvertures soient entièrement libres, soit qu'elles demeurent recouvertes par une membrane transparente; vu de côté, le stigmate paraît dentelé, ce qui indique que chaque ouverture est reliée par un minime canal à la trachée (pl. 24, fig. 8).

Chez les Lestrémines, les stigmates thoraciques ne sont pas proéminents, mais paraissent sur le flanc d'un mamelon (pl. 24, fig. 6) sous forme de plaque faiblement convexe, allongée ou ovale, percée de minimes ouvertures libres ou avec membrane invisible. Chez *Monardia stirpium* Kieff., ces ouvertures forment d'abord une rangée longitudinale simple, puis deux, trois et enfin quatre rangées. Au sujet de cette forme que j'ai signalée et figurée en 1893 [291], M. de Meijere écrit en 1899 : « Avec de forts grossissements on aperçoit sur les stigmates prothoraciques de *Monardia van-der-Wulpi* Meig. environ vingt petits cercles, qui d'abord semblent être des ouvertures. Cependant en les comparant avec ce qui m'est connu sur les organes correspondants d'autres nymphes, et aussi sur les stigmates des larves des Diptères ⁽¹⁾, je suis disposé à croire que dans ce cas il ne s'agit pas de véritables ouvertures, mais d'endroits couverts d'une membrane extrêmement mince. Quand on observe le stigmate de côté, on peut s'assurer que ces cercles sont situés à l'extrémité de tubes très courts reliant la chambre terminale de la trachée avec l'extérieur. Il y a donc ici la même structure que dans les stigmates de plusieurs larves de Diptères. J'ai adopté le nom de bouton (Knospen) pour lesdits tubes » [480, p. 144]. On trouve une disposition analogue chez plusieurs *Winnertzia* Rond., mais alors le stigmate est circulaire et non allongé (pl. 24, fig. 4). Chez une Sciarine, j'ai remarqué une forme analogue à celle des Lestrémines, avec cette différence que les ouvertures du stigmate se présentent sous l'aspect de cinq fentes transversales et ellipsoïdales.

Les stigmates abdominaux sont tantôt proéminents sous forme de tubes, par exemple *Lestodiplosis* Kieff., *Camptomyia* Kieff., etc. (pl. 23, fig. 7), tantôt ressortant seulement comme une bossette, par exemple chez les Lestrémines, tantôt proéminents en forme de tube sur les premiers segments et non proéminents sur les suivants, par exemple chez *Peromyia* Kieff. Dans le second cas, leur forme rappelle celle des stigmates thoraciques chez les mêmes espèces. C'est ainsi que chez *Monardia stirpium* Kieff., les stigmates abdominaux

(1) Voir DE MEIJERE : Ueber zusammengesetzte Stigmen bei Dipterenlarven. *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXVIII, p. 65.

sont à peine proéminents sous forme d'une bosselette circulaire ; sur sa surface, cette bosselette paraît criblée de petites ouvertures, et son bord paraît orné d'une rangée de minimes petits cercles (pl. 24, fig. 5). Chacun de ces petits cercles et chaque ouverture de la surface sont en communication avec la trachée, au moyen d'un tube extrêmement petit.

3^e Enveloppe de la Nymphé.

Quand une larve se métamorphose en terre, ce qui est le cas pour la plupart des Cécidomyines, ou bien dans une cécidie non entièrement close, par exemple *Perrisia veronicae* Vall., *trifolii* Fr. Lw., *salicariae* Kieff., *Arnoldia gemmae* Rbs., etc., ou sur l'écorce, elle se forme habituellement une enveloppe que nous désignons du nom de cocon ; le contraire a lieu quand elle subit sa métamorphose dans le bois, comme beaucoup de Lestrémines, ou sous l'écorce, comme *Winnertzia*, *Camptomyia*, etc., ou enfin dans une cécidie bien close de toutes parts, ce qui est le cas pour tous les *Clinorhyncha*, *Baldratia*, *Asphondylia*, la plupart des *Lasioptera* et beaucoup d'autres espèces. Lorsque la galle est hermétiquement fermée, mais sera munie d'une minime ouverture quand elle se détachera du support, par exemple *Mayetiola fagi* Hart., la larve ne forme pas de cocon pour la métamorphose, mais se contente de fermer l'ouverture au moyen d'une membrane transparente, dont la substance est produite par elle.

I. COULEUR, FORME ET CONSISTANCE DU COCON. — Si l'on compare les enveloppes des diverses sortes de nymphes entre elles, on remarquera que leur couleur et leur forme sont variées. Leur couleur est le plus fréquemment blanche ou un peu jaunâtre, par exemple chez *Perrisia violae* Fr. Löw, *pini* Bouché, etc., moins souvent brune, par exemple chez *Mayetiola*, certains Épidosides, etc., rarement d'un rouge ferrugineux, par exemple *Perrisia mali* Kieff. (1).

On peut distinguer les cocons doubles et les cocons simples. Le cas du cocon double a lieu pour *Cecidomyia pini* D. G., comme De Geer l'avait déjà remarqué. Ici le cocon extérieur est blanc, résineux, de forme ellipsoïdale, pointu et libre à l'extrémité correspondant à la tête, obtus au bout opposé ; la partie par laquelle il est fixé dans le sens de sa longueur à la face supérieure de l'aiguille est ouverte, de sorte que

(1) J'avais mis des larves de cette espèce dans une boîte de fer-blanc, dont le fond était humide et un peu entamé par la rouille ; grâce à cette humidité, les larves se firent leur cocon et se métamorphosèrent, mais il est possible que la couleur que présenta leur cocon fut due à la rouille de la boîte.

le cocon interne sépare seul la larve de son support. Mise dans de l'alcool, cette enveloppe résineuse se dissout facilement et l'on voit apparaître le cocon interne, soyeux et mince, composé de fils microscopiques.

Une seconde forme de cocon double est fournie par *Holoneurus* Kieff.; ici le premier cocon a la forme d'un bouclier et l'apparence d'une mince pellicule recouvrant le cocon interne.

D'après les observations de M. le Dr P. Marchal, il en est encore de même pour les *Mayetiola* ou du moins pour *M. destructor* Say. Il résulte en effet de ses études sur cette espèce, comme nous le verrons encore plus loin, que le cocon « se trouve constitué par une mue larvaire qui forme toute la couche dure, épaisse et brune, et par une sorte de cocon très mince et soyeux qui la double et la tapisse intérieurement. Cette structure mixte, qui n'a encore été signalée chez aucun Diptère, ni, je crois, chez aucun insecte, mérite d'attirer l'attention, car elle établit un terme de passage entre les pupes habituelles des Diptères (*pupae coarctatae*) et les larves qui pour opérer leur nymphose se renferment dans des cocons ainsi que, chez les Cécidomyies, certaines espèces en fournissent des exemples » [446, p. 22].

Thurauia aquatica Rbs. se fait également deux cocons; le premier, d'un rouge brun, est formé de la peau de la larve, comme chez les *Mayetiola*, et a l'aspect d'un puparium; le second est transparent, piriforme, ouvert supérieurement et composé de fils assez espacés et séparés l'un de l'autre par une matière semblable à du parchemin; mais, chose singulière, la larve sort du premier cocon avant d'avoir formé le second, et remonte plus haut sur la plante où elle fabrique ce dernier, dans lequel elle se métamorphose [642 bis, p. 59]. Nous avons donc ici la transition entre le cocon double proprement dit, et le cocon simple. Il est à remarquer que dans les quatre cas que nous venons de citer et qui diffèrent notablement l'un de l'autre, le cocon qui a été formé en dernier lieu est toujours composé de fils, au moins en partie.

Les cocons simples sont le plus souvent de forme ellipsoïdale, rarement ouverts supérieurement, par exemple chez *Rhabdophaga rosaria* H. Lw., ou longitudinalement sur la partie qui touche le support, comme chez *Porricondyla albimana* Winn.; d'autres fois elle offre l'aspect d'un bouclier sous lequel la nymphe disparaît complètement, par exemple chez *Colomyia* Kieff. et *Rübsaamenia* Kieff.

II. FORMATION DU COCON. — 1. Pour le cocon des *Mayetiola* Kieff. et le premier cocon de *Thurauia* Rbs., l'examen microscopique montre

qu'ils sont formés aux dépens de la peau de la larve, comme Winnertz l'écrivait déjà. En effet, sa surface chitineuse et brune est divisée en segments, mais d'une façon peu distincte, et ces segments sont parsemés de petites verrues terminées par une spinule et munis en outre d'une rangée transversale de 24 ou 26 petites nodosités. M. le Dr Marchal, qui a le mieux étudié la larve et la nymphe de *Mayetiola destructor* Say, décrit ainsi le cocon et sa formation [446] :

« Lorsque la larve a atteint toute sa croissance, elle devient turgescente; la peau se tend et la segmentation du corps s'efface; en même temps sa transparence diminue et elle prend une opacité opaline, puis, peu à peu, la couleur change; elle devient d'abord d'un jaune clair testacé, puis ce jaune fonce de plus en plus jusqu'à devenir marron; le puparium se trouve alors constitué, et l'on a sous les yeux une petite coque allongée, dure, brune et sur laquelle on ne peut distinguer sans étude très attentive les détails de la larve, si bien que différents auteurs ont regardé cette coque comme étrangère à la larve et résultant d'une sorte de sécrétion, opinion qui du reste semblerait confirmée par ce fait que l'on retrouve la larve revêtue de sa peau et libre à l'intérieur de la coque qui la contient. La plupart des auteurs s'accordent toutefois à la considérer comme résultant de l'induration de la peau de la larve. En réalité cette coque, à laquelle nous donnerons avec les auteurs anglais le nom de *case pupale*, a, lorsqu'elle est entièrement constituée, une structure mixte qui n'avait pas encore été signalée. Elle est formée à l'extérieur : 1° par la cuticule de la peau de la seconde forme larvaire, que celle-ci isole d'elle-même par un processus analogue à celui des autres mues; 2° par un revêtement de soie dont la larve, ayant revêtu sa troisième forme, tapisse la paroi interne de la cuticule. La première couche externe est de beaucoup la plus épaisse et existe seule au début.

« En suivant la formation du puparium il est facile de se rendre compte de sa nature. Au début de sa formation, la peau de la larve encore blanche, qui semble distendue par les liquides internes, s'indure et s'épaissit, et avant qu'elle n'ait pris la teinte marron et l'opacité caractéristique du puparium, on voit la larve revêtue d'une deuxième cuticule interne s'isoler et se rétracter à son intérieur. A ce moment la peau externe étant encore translucide et n'offrant qu'une légère teinte jaunâtre, il semble que l'on a sous les yeux deux larves emboîtées l'une dans l'autre, présentant chacune une tête testacée à parties brunes et chitineuses tranchant nettement sur le reste du corps. Si l'on ouvre la peau externe, on constate qu'entre elle et la larve se trouve un liquide clair; on peut voir, à ce moment, une sorte de cordelette

s'étendre de la dépouille chitineuse de la tête à celle de la larve ; cette cordelette est la mue de la partie antérieure du tube digestif qui se rompra ensuite quand la larve se rétractera davantage. La peau externe destinée à former la case pupale présente les mamelons coniques que nous avons vus dans la seconde forme larvaire ; on y retrouve également tous les détails de la tête et de l'anus ; en revanche on n'y voit trace ni des papilles, ni de la spatule sternale de la 3^e forme larvaire. Sur cette dépouille externe on voit en outre de nombreuses petites aréoles arrondies ou elliptiques correspondant aux insertions musculaires ; chaque ligne séparant deux segments successifs se trouve ainsi représentée sur la case pupale par une série de petites surfaces d'insertions musculaires symétriquement placées ; on en distingue sur chaque interligne dix ventrales et de chaque côté trois latéro-dorsales. En outre, sur chaque segment on rencontre un certain nombre d'insertions musculaires symétriquement placées.

« Ces détails deviennent de moins en moins perceptibles à mesure que la case pupale prend son caractère définitif et s'indure en prenant une coloration foncée. Les détails de la cuticule céphalique deviennent notamment entièrement méconnaissables, et celle-ci se rétracte et s'invagine plus ou moins sous l'influence de la traction de la cordelette dont nous avons parlé plus haut. Examinée au microscope, cette couche formée par la cuticule modifiée de la seconde forme larvaire présente une structure fibreuse ; les fibres, tout en étant anastomosées entre elles, présentent une direction générale perpendiculaire à la surface externe, et les espaces qu'elles limitent constituent un système de canalicules perpendiculaires à la surface ; sur la paroi interne, elles s'orientent au contraire dans une direction parallèle à la surface. Cette structure se trouve interrompue au niveau des insertions musculaires où la cuticule devient lisse et homogène, et autour des aréoles ainsi déterminées les fibrilles affectent une disposition rayonnée. Dans toute son épaisseur, la cuticule formant la case pupale est donc poreuse, et on s'explique aisément la facilité avec laquelle elle absorbe l'humidité et se laisse pénétrer par elle ; dure et cassante à la sécheresse, elle est au contraire souple et flexible à l'humidité. Cette dernière condition est indispensable pour permettre l'éclosion lorsque le puparium a été longtemps exposé à la sécheresse.

« La seconde couche, qui ne se rencontre que dans le puparium entièrement constitué et ayant acquis sa consistance ainsi que sa teinte définitive, forme une sorte de glais soyeux blanchâtre à son intérieur. A l'examen microscopique, sur les fragments mis en observation, on voit souvent cette couche interne dépasser sur le bord des cassures la

couche externe, et alors on constate nettement qu'elle est formée d'un feutrage de fils soyeux entrelacés. »

2. Quant au cocon interne de *Cecidomyia pini*, la couche soyeuse et interne des *Mayetiola* et les cocons des autres Cécidomyies, leur formation a été diversement expliquée; il est bien possible que les cocons pour lesquels l'examen microscopique montre qu'ils sont formés de fils entrelacés, soient produits d'une autre façon que les cocons non composés de fils; en ce cas les deux explications qu'on a avancées jusqu'ici et que nous allons exposer, pourraient être vraies simultanément, mais pas pour les mêmes espèces. La plupart des anciens auteurs pensaient que les larves des Cécidomyies se filaient leur cocon, comme le font les chenilles. C'est ainsi que H. Loew [402] écrit : « Avant la métamorphose, beaucoup de larves se filent un cocon blanc et mince, dont les fils sont difficiles à reconnaître ». C'est la même opinion qu'émet M. le Dr P. Marchal, quand il dit que les larves « tissent un cocon soyeux » (l. c., p. 23) et quand il explique la formation de la couche soyeuse et interne du cocon de *Mayetiola destructor*. « Les longues glandes salivaires de la larve, écrit-il, qui descendent jusque vers l'extrémité postérieure du corps et dont les deux conduits excréteurs se réunissent en un conduit commun débouchant au niveau de la *ligula*, doivent évidemment être regardées comme les organes producteurs de la soie. L'expérience suivante le démontrera. Je pris une larve dont le puparium venait de se constituer, et qui était en train d'opérer à son intérieur la version dont nous aurons plus loin occasion de parler, version qui a pour résultat de mettre sa tête là où se trouvait son extrémité postérieure et vice-versa. Je la mis sur une lame porte-objet, la recouvris d'une lamelle simplement posée dessus sans exercer de pression et sans eau, puis je déposai le tout dans une chambre humide. Le lendemain je vis que *en avant* de la larve et tout autour de sa partie *antérieure*, à l'exclusion de sa partie postérieure, se trouvait tout un réseau soyeux, qui à l'œil nu avait l'apparence d'une sorte de bave desséchée; au microscope, il apparaissait sous forme d'un réseau filamenteux; le fil, intriqué en tous sens, formait de nombreuses mailles irrégulières; la moitié postérieure de la larve restait entièrement nue. La larve étant tournée de façon à présenter sa face ventrale en haut contre la lamelle couvre-objet, elle n'avait pu arriver à se retourner, par suite de la légère pression exercée par cette lamelle; or, il est à noter que, dans ces conditions bien déterminées, la lamelle avait été seule couverte par le réseau, il n'en existait nullement sur la lame porte-objet. Ces faits montrent bien que la soie est sécrétée

en avant de l'animal et sur sa face ventrale; or il n'y a que les glandes salivaires qui puissent lui donner naissance » [446, p. 21-22].

Ratzburg a fait une observation analogue en 1844 sur *Cecidomyia pini* D. G., mais sans arriver absolument à la même conclusion que M. Marchal. Ayant extrait plusieurs larves de leur cocon, il leur présenta des rameaux de Pin fraîchement cueillis. Après avoir erré sur les aiguilles, les larves finirent par s'y fixer; au bout d'une heure, l'examen à la loupe fit voir que quelques gouttelettes de liquide s'étaient formées tout autour de la tête qui était étroitement appliquée au support; ce liquide n'était pas fortement résineux, mais offrait néanmoins une consistance visqueuse et épaisse. Ratzburg espérait que les larves finiraient par être couvertes de cet enduit, mais il n'en fut rien. Il en cherche la raison dans ces deux faits, que les larves avaient dû être affaiblies par suite de leur extraction du cocon, et que les aiguilles, en se desséchant, ne pouvaient plus fournir aux larves le liquide nécessaire (1). Il arrive à cette conclusion : « Je me crois autorisé à admettre que le cocon résineux se forme aux dépens des sucres résineux absorbés par la larve; il serait difficile de déterminer si ces sucres sortent par la bouche de la larve ou par l'orifice anal ou enfin s'ils sont le produit de l'exsudation des grosses vésicules du dos; la première de ces trois hypothèses concorde pourtant le mieux avec mon observation ».

Perris [576], ayant observé une larve de Mycétophilide et deux autres larves de Diptères qui s'étaient fait une coque avec une matière émise par leur anus, ou par un organe spécial situé près de la partie postérieure de leur corps, pensait qu'il fallait expliquer de la même façon la formation du cocon de *Cecidomyia pini* D. G.

Winnertz rejette l'opinion du filage du cocon et admet au contraire que le cocon est le produit de l'exsudation de la larve [816, p. 197] : « Je ne puis confirmer, écrit-il, l'assertion de plusieurs auteurs, d'après laquelle les larves de Cécidomyies se fileraient leur cocon. Mes observations me portent à admettre qu'elles exsudent en quelque sorte l'enveloppe soyeuse qui recouvre la nymphe et que cette masse se dépose à la façon des cristaux, et forme ainsi un sac autour de la larve. Pour plusieurs espèces, j'ai remarqué comment les larves s'étaient fixées à une feuille; au bout de 24 heures il s'était formé tout autour d'elles et

(1) Mes observations sur des larves extraites de cocons fixés à la paroi d'une boîte de fer-blanc me font croire que, si ces larves ne pouvaient plus se faire un nouveau cocon, c'est que les glandes ou les organes qui avaient fourni la matière du premier ne renfermaient plus la matière nécessaire à un second.

à une certaine distance d'elles un mince dépôt qui n'offrait aucune trace de fils; petit à petit, ces dépôts en s'agglomérant, formaient des parties liliformes (comme se forment certains cristaux en aiguille), sans que la larve fit le moindre mouvement, ce qui n'aurait pu être le cas, si elle avait participé activement à cette formation.

« Cette enveloppe est ordinairement achevée au bout de quelques jours, et alors encore on ne peut trouver trace de fils au microscope. Si M. Loew dit que la faculté de filer un cocon existe surtout chez les espèces du genre *Cecidomyia* H. Lw., je dois faire remarquer que les nymphes de la plupart de ces espèces sont en effet renfermées dans un petit sac blanc, mais que je n'ai pu constater, pour aucune d'entre elles, que ce petit sac fût un véritable cocon filé ».

Mes observations semblent confirmer l'opinion de Winnertz. Dans la plupart des cas, l'examen au microscope démontre que le cocon n'est pas composé de fils. J'ai publié en 1891 [273, p. 262] et plus tard en 1894 [289] l'observation suivante : « Lorsque je découvris les larves de *Colomyia clavata* Kieff. recouvertes déjà de leur enveloppe blanche, j'en remarquai plusieurs qui portaient sur le dessus des segments abdominaux, l'anal excepté, une rangée transversale de 6 à 8 corpuscules oviformes et vides, correspondant par conséquent aux papilles dorsales. Ces corpuscules, se gonflant toujours, finirent par se toucher, s'ouvrir, s'étaler et se confondre les uns avec les autres; en cet état leur substance ressemblait exactement à celle de la paroi inférieure de l'enveloppe, tandis que la surface supérieure de celle-ci était tout à fait lisse (fig. 8). Il me semble donc pouvoir conclure de là, qu'au moins dans le cas particulier, l'enveloppe est le produit d'une sécrétion qui a lieu par les papilles dorsales de l'abdomen, travail auquel les segments thoraciques et le segment anal ne prennent point part. Or nous avons vu que chez *Diplosis pini* D.G., ce sont précisément les papilles sétigères de l'abdomen qui sont renflées en vésicule, et que celles du thorax et du segment anal ne montrent pas cette forme. Il semble donc probable que ces vésicules ont comme destination d'élaborer et d'émettre ensuite le suc qui servira à la formation de la coque résineuse ».

Une seconde observation, que j'ai publiée également en 1894 (*l. c.*), se rapporte à une larve de *Campylomyza* dont les papilles dorsales ont pris la forme d'appendices écailleux, semblables aux fruits du sapin : « Une larve qui s'était fixée à la surface du bois, me parut, au second ou au troisième jour, être revêtue d'une matière blanche, moussue, composée de filets longitudinaux et transversaux. Je détachai cette larve avec précaution au moyen d'une épingle, puis je l'examinai au microscope. Il me fut alors facile de voir que la matière blanche n'é-

taut pas continue, mais qu'elle recouvrait seulement les appendices dorsaux et latéraux et qu'elle était composée de petits fragments linéaires paraissant sortir d'entre les écailles ou verrues de ces appendices. Les autres larves qui s'étaient réfugiées dans le bois étaient à ce moment presque toutes changées en nymphes et revêtues d'une enveloppe d'un blanc grisâtre, fait unique dans le groupe des *Campylomyza*, car toutes les espèces que je connais se métamorphosent sans se former d'enveloppe. Je ne crois donc pas faire erreur en considérant ces appendices dorsaux et latéraux comme des organes sécrétant la matière dont se compose l'enveloppe de la nymphe ».

Ajoutons encore que les larves que j'ai examinées fréquemment pendant qu'elles se métamorphosaient contre la paroi d'un bocal en verre, paraissaient parfaitement immobiles.

Tout récemment [642, p. 547], M. Rübсаamen, après avoir reproduit le passage de Winnertz cité plus haut, ajoute : « Il me paraît certain que Winnertz n'a pas entièrement tort sous plus d'un rapport. Chez bien des Cécidomyies, le petit sac paraît en réalité se former selon la façon indiquée par Winnertz, de sorte qu'on peut le considérer réellement comme un produit d'exsudation. C'est ainsi que j'ai vu des larves de *Colomyia clavata* Kieff. sur du bois de Bouleau, paraissant enveloppées d'un cocon. En réalité, ce n'était qu'une enveloppe en forme de bouclier, semblable à celle des Diaspides, sous laquelle la larve était couchée. Examinée au microscope, cette enveloppe montrait une pellicule mince et de consistance uniforme; un grossissement de 500 ne put faire voir trace de fil. En tout cas on ne peut nier la possibilité que de pareilles enveloppes ne soient le produit d'une exsudation de la peau, qui s'est durci à l'air. Les papilles de la larve sont-elles l'organe de cette exsudation, et de quelle manière cela a-t-il lieu, c'est ce qui reste encore à éclaircir. Sur beaucoup de cocons on peut distinguer de véritables fils, mais la présence de ces fils ne prouve pas plus que la larve les ait filés avec sa bouche, et c'est ce que Winnertz voulait surtout nier, que leur absence ne prouve à elle seule que le cocon soit à considérer comme un produit d'exsudation ».

En tout cas, quel que soit leur mode de formation, il est différent du précédent, c'est-à-dire l'enveloppe n'est jamais le résultat d'une mue larvaire. M. Marchal écrit à ce sujet [446, p. 23] : « Étant donnée la structure signalée chez *Cec. destructor*, il y avait lieu de s'assurer de la réalité de ce second mode de pupation ⁽¹⁾; car une dépouille larvaire transparente, recouvrant le cocon à l'extérieur, aurait pu facile-

(1) C'est-à-dire du mode qui n'est pas le résultat d'une mue larvaire.

ment échapper à un observateur non prévenu. Je me suis assuré en examinant les cocons de *Cecid. ericae-scopariae* Duf. et ceux de *Dasyneura Kiefferi* March., qu'ils étaient entièrement libres et n'étaient revêtus d'aucune enveloppe extérieure; ceux d'*ericae-scopariae* renfermaient la nymphe de l'Insecte et une dépouille larvaire pourvue d'une spatule sternale et abandonnée de la nymphe ».

CONCLUSION. — Nous arrivons donc à la conclusion suivante. On peut distinguer chez les Cécidomyies deux mode de pupation.

1^{er} Mode. La nymphose s'opère à l'intérieur de la peau durcie de la larve, c'est-à-dire, dans un puparium improprement dit, et l'insecte au moment de l'éclosion en sort par un des pôles, comme chez les Muscides; mais tandis que chez ces dernières la dépouille larvaire aux dépens de laquelle se forme le puparium est le résultat de la dernière mue et que l'insecte passe en même temps à l'état de nymphe, chez les Cécidomyies, au contraire, elle n'est que le résultat de l'avant-dernière mue larvaire, car on trouve à l'intérieur de ce puparium ou de cette peau endurcie une larve qui diffère de celle du stade précédent par la présence d'une spatule dont le puparium n'offre pas trace, et cette larve peut demeurer en cet état, sans se métamorphoser, pendant un temps assez long; ce stade a été appelé « hypnodie » par Künckel d'Herculais, tandis qu'Asa Fitch le désigne du nom de « flax-seed state » et la larve « dormant larve ». A l'intérieur de ce puparium (*Mayetiola*) ou en dehors de lui (*Thurauia*), la larve se forme plus tard selon le second mode un cocon composé de fils. Selon M. Marchal (*l. c.*, p. 22-23), *Contarinia tritici* se transformerait « dans une case pupale formée uniquement par l'avant-dernière mue larvaire ». D'après mes observations, l'insecte en question se métamorphose d'après le second mode, dans un cocon blanc, qui ne résulte nullement d'une mue larvaire. Ce qui peut induire en erreur, c'est que l'on trouve fréquemment dans les épis du Blé et du Seigle, après la sortie des larves de Cécidomyies, des individus appartenant à la même espèce, mais demeurant dans les épillets et semblant s'y métamorphoser dans un puparium qui est en effet le résultat de la dernière mue; mais de pareils pupes ne donneront jamais autre chose que des parasites. J'ai constaté ce fait sur une foule d'espèces différentes. Nous y reviendrons en parlant des parasites des Cécidomyies.

2^e Mode. La larve ne se rétracte pas à l'intérieur de sa peau endurcie, mais elle se contente de former autour d'elle un cocon soit par filage,

soit par une sécrétion de la peau ou des papilles dorsales ou des glandes salivaires.

Si nous comparons le mode de nymphose des Cécidomyies avec celui des autres Diptères, nous arrivons au résultat suivant. Brauer et Schiner divisent les Diptères d'après leur mode de nymphose, en Orthorhaphes et en Cyclorhaphes. La 1^{re} division comprend les espèces dont la nymphe est libre ou bien cachée dans une enveloppe formée par l'induration de la peau larvaire et qui, au moment de l'éclosion, se fend longitudinalement ou en forme de T sur sa partie dorsale. La 2^o comprend les Muscides et les Syrphides, c'est-à-dire les espèces dont la nymphe est renfermée dans un puparium formé par l'induration de la peau larvaire, qu'elle ouvre à l'un des pôles, au moment de l'éclosion. Presque toutes les Cécidomyies rentrent dans la première division; le genre *Mayetiola* forme la transition vers la seconde.

4^e Lieu, époque, durée et conditions de la nymphose.

1. LIEU DE LA NYMPHOSE. — Beaucoup de larves se métamorphosent dans la cécidie ou à l'endroit où elles ont trouvé leur nourriture, par exemple toutes les espèces des genres *Clinorhyncha* H. Lw., *Asphondylia* H. Lw., *Hormomyia* H. Lw. et *Rhabdophaga* W. Cependant le plus grand nombre quittent leur berceau et se réfugient en terre ou sous les feuilles ou entre les folioles des mousses pour y subir leur métamorphose, tels sont, entre autres, tous les représentants du genre *Contarinia* Rond., c'est-à-dire une centaine d'espèces. D'autres se métamorphosent aussi bien dans la cécidie qu'en terre; tel est le cas pour *Contarinia runcicis* H. Lw. et *Cont. acetosae* Kieff.; pendant que les insectes parfaits éclosent et sortent des fleurs de *Rumex*, on voit sortir en même temps des mêmes fleurs des larves appartenant à la même espèce, mais qui se rendent en terre pour y subir leur métamorphose. Pour *Rhopalomyia foliorum* H. Lw., l'insecte se transforme dans la cécidie pendant l'été et l'automne, et l'on voit plusieurs générations se succéder; mais, au mois d'octobre, les larves cessent de se métamorphoser dans la cécidie, elles se rendent en terre pour y hiverner et s'y changer en nymphe au printemps suivant. Il n'est pas rare de voir des larves d'espèces qui se transforment toujours dans la cécidie, quitter celle-ci pour se rendre en terre, quand cette cécidie a été détachée ou qu'elle s'est desséchée. Enfin des espèces qui se métamorphosent toujours dans la galle peuvent parfois, mais exceptionnellement, arriver à la métamorphose, quand on les met sur de la terre humide ou dans un endroit humide. J'ai même observé le fait suivant, publié

en 1894 [289] : « Une larve de *Mikiola fagi* Hart., extraite de la cécidie en octobre, avait été mise dans un verre rempli d'eau, et s'y était laissé tomber jusqu'au fond. Le lendemain je voulus l'en sortir pour l'examiner, mais je fus fort étonné de trouver non plus une larve, mais une nymphe blanche et vivante. Je la remis dans l'eau, où les jours suivants, sa couleur passa insensiblement du blanc au rouge ».

II. DURÉE DE LA NYMPHOSE. — Chez *Miastor metraloas* Mein. la durée de l'état nymphal est extrêmement courte; N. Wagner dit à deux reprises que cet insecte n'est demeuré à l'état nymphal que jusqu'au 3^e ou 4^e jour [791, p. 107 et 113]. En dehors de ce cas, la durée de l'état nymphal est ordinairement de dix à vingt jours. Cette règle n'est cependant pas sans exception. En effet, comme nous venons de le voir, la larve de *Mikiola fagi* Hart. se transforme en nymphe au plus tard en octobre, et l'insecte ailé n'apparaît qu'en mars de l'année suivante; Büsgen a même remarqué que, pour cette espèce, la durée de la nymphose est variable, et qu'on trouve déjà, à la fin de juillet, une nymphe dans certaines galles, tandis que d'autres renferment encore une larve assez petite [57, p. 16]. *Asphondylia thymi* Kieff., *echii* H. Lw. et *Hornigi* Wachtl demeurent à l'état nymphal depuis le mois de septembre jusqu'en juillet de l'année suivante. Je sais qu'ici je suis en contradiction, comme du reste en beaucoup d'autres points, avec M. Rübsaamen, qui écrit : « Le mode d'hibernation d'*Asphondylia Hornigi* n'est pas encore connu; cette espèce abandonne les cécidies en automne, par conséquent en une saison où une nouvelle production de galles n'est guère possible. On ignore si l'insecte hiverne à l'état d'imago, ou s'il dépose ses œufs en automne sur *Origanum* ou sur d'autres plantes » [642, p. 540]. M. Rübsaamen a ignoré que Wachtl, en décrivant cette espèce, dit formellement : « Les *Origanum* furent recueillis en automne... L'insecte ailé fait son apparition au printemps suivant » [777, p. 535]. Sans doute que Wachtl a conservé les plantes dans une chambre chauffée en hiver; mes observations ont été faites sur des cécidies conservées en chambre froide, où les conditions étaient à peu près les mêmes qu'à l'air libre, et recueillies par moi-même, à la fin du mois de septembre, à Cœuvres, non loin de Soissons.

III. ÉPOQUE DE LA NYMPHOSE. — Les espèces qui n'ont qu'une génération par an, ou encore la dernière génération des espèces qui ont plusieurs générations par an, demeurent à l'état larvaire et sans prendre de nourriture jusqu'au printemps ou l'été suivant. Certaines espèces, et peut-être toutes, sont même capables de demeurer en terre jusqu'à la

3^e et même la 4^e année, avant de se métamorphoser, fait non encore signalé jusqu'ici et qui doit être pris en considération quand il s'agit d'insectes nuisibles, tels que *Contarinia tritici* et *pirivora* (1). Voici comment je l'ai constaté. Quand j'avais mis des larves dans un vase rempli de terre, j'attendais jusqu'au printemps ou l'été suivant pour obtenir l'imago ; une fois ce délai passé, et que je n'avais rien obtenu, je supposais que les larves avaient péri et je vidais le récipient pour y remettre de la terre fraîche et l'utiliser de nouveau. Or une année, comme je voulais obtenir l'éclosion de *Putoniella marsupialis* Fr. Lw., j'avais vainement attendu jusqu'au mois de mai, c'est-à-dire jusqu'à l'époque de l'apparition de leurs galles. N'espérant plus en obtenir les insectes ailés, je mis de côté, par exception, le vase avec la terre qu'il contenait et je le laissai ainsi jusqu'au printemps suivant, c'est-à-dire de la troisième année. A cette époque, il m'arriva un jour, après avoir versé de l'eau sur la terre de tous les pots à éclosion, de vider le reste du liquide sur le récipient contenant les *Putoniella*, que je n'avais plus humecté depuis l'année précédente. A mon grand étonnement, je vis bientôt sortir de la terre ainsi inondée, de nombreuses larves rouges qui rampèrent dans toutes les directions et dont plusieurs sortirent même du vase. L'examen me fit voir que c'étaient bien des larves de *Putoniella*, et quinze jours plus tard, donc au printemps de la troisième année, j'obtins en grand nombre l'insecte ailé. Ces larves avaient-elles passé tout ce temps sans cocon ? C'est ce que je n'ai pu constater. Je sais seulement que bien des larves, par exemple celles de *Xylodiplosis praecox* Winn., font leur cocon plusieurs mois après qu'elles se sont réfugiées en terre. Une observation analogue eut lieu pour *Clinodiplosis galliperda* Fr. Lw. Un grand bocal en verre, renfermant de la terre dans sa moitié inférieure, fut rempli de feuilles de Chêne avec les galles abritant les larves des Cécidomyies. Une partie des larves se rendit en terre, dès septembre ; quelques-unes d'entre elles se fixèrent contre la paroi du verre, en s'y formant une petite excavation dans la terre, de sorte qu'il me fut facile de les observer. Le cocon ne commença à se former autour de ces larves qu'en décembre, et la nymphose eut lieu en mars. Pendant tout cet intervalle, jusqu'au mois de mars, on pouvait encore trouver, sous les galles de *Neuroterus*, des

(1) Quant à *Mayetiola destructor* Say, qui se métamorphose dans la cécidie, sur le chaume, B. Wagner [786] et Enock [108] ont déjà observé que si les chaumes sont exposés à la sécheresse, la métamorphose pouvait être retardée de un ou de deux ans. « Ces retards de un an et surtout de deux ans ne doivent jamais avoir lieu dans les champs », écrit M. Marchal [446, p. 39].

larves de Cécidomyies sans cocon, bien conservées et pénétrant en terre dès qu'on détachait la galle de la feuille.

Mais revenons à notre précédente observation. L'exemple des *Puto-niella* ne devait pas être unique. Je conservai pendant plusieurs années des vases contenant des larves de Cécidomyies et je fis encore les observations suivantes (en chambre non chauffée). De nombreuses larves de *Contarinia runcidis* H. Lw. furent mises en terre en juillet 1897; les insectes ailés firent leur apparition en juin 1898, en juin 1899 et en grand nombre en juin 1900. J'eus le même résultat pour *Clinorhyncha leucanthemi* Kieff.; l'insecte fit son apparition pendant trois années consécutives, et toujours à l'époque de la floraison de sa plante nourricière. *Contarinia tritici* Kirb., *psii* Winn., et *acetosae* Kieff. parurent pendant deux années consécutives. *Choristoneura sarothamni* Kieff. fit son apparition en partie en juillet de la 4^{re} année, en partie en mai et en juin et juillet de la seconde année, et j'espère en obtenir encore la troisième année. Il est à remarquer que dans tous ces cas, les larves n'étaient pas exposées à la sécheresse, mais la terre dans laquelle elles se trouvaient était toujours maintenue humide.

IV. CONDITIONS DE LA NYMPHOSE. — Pour qu'une larve puisse se changer en nymphe, il faut évidemment qu'elle soit arrivée à sa maturité, c'est-à-dire qu'elle ait achevé de se développer et de se nourrir. Peut-être faut-il encore ajouter qu'elle ne doit pas être parasitée. J'ai bien observé à plusieurs reprises une nymphe morte ou des débris de nymphe à côté d'un parasite dans une même galle, mais j'ignore si ce dernier, en sortant de l'œuf, s'est trouvé déjà en face d'une nymphe ou bien d'une larve prête à se métamorphoser.

Il est encore requis qu'une période de repos, qui varie suivant les espèces, se soit écoulée; nous venons d'en parler en traitant de l'époque de la nymphose. En conservant les larves dans une chambre chauffée, on peut abrégé cette période de repos et obtenir, dès janvier ou février, des insectes ailés qui, sans cette circonstance, n'auraient fait leur apparition que quelques mois plus tard.

Mais la principale condition pour la nymphose, c'est que la larve doit se trouver dans un milieu humide. L'expérience suivante, due à M. P. Marchal, le prouve pleinement : « Le 19 juillet, je pris 26 pupariums de quatrième génération sur un même rejet vert et je les divisai en deux lots égaux de 13 chacun. Chaque lot fut mis sur du sable dans un pot à fleurs. L'un des pots fut placé sur un plat creux qui, à partir de ce moment, fut toujours rempli d'eau. L'autre pot fut au contraire maintenu au sec; le soir seulement, de temps à autre, le

sable était très superficiellement humecté avec un pulvérisateur pour empêcher une sécheresse absolue. Dans le pot humide les éclosions eurent lieu au nombre de onze, du 1^{er} au 10 août; au contraire, dans l'autre pot il n'y avait encore à cette époque aucune éclosion. Ce pot fut ainsi maintenu depuis le 19 juillet jusqu'au 1^{er} septembre à la sécheresse, et, à partir de cette date, plongé dans une assiette remplie d'eau. Du 1^{er} au 4 octobre, je constatai 6 éclosions; 5 avortèrent; 2 avaient été sacrifiées pour être examinés » [446, p. 40]. Le même auteur a essayé d'en trouver le motif : « Pour que le stade de pronymphé prenne naissance, l'humidité est absolument nécessaire : l'animal ne se nourrissant pas, la turgescence de la larve ne peut vraisemblablement se produire que par un phénomène d'endosmose » (l. c., p. 27).

Pour bien des espèces, par exemple pour *Oligotrophus taxi* Inch., *juniperinus* D. G., *Panteli* Kieff., *Monarthropalpus buxi* Lab., etc., il est même nécessaire que la nymphe, une fois formée, continue encore à être préservée de la sécheresse, sinon elle périt. C'est ainsi que De Geer écrivait déjà au sujet d'*O. juniperinus* : « Bien que la nymphe soit incapable de se nourrir, il faut cependant, si elle doit demeurer en vie, qu'elle puisse être imprégnée de l'humidité que dégage la galle. Toutes celles que j'ai sorties de leurs galles, et mises à un endroit sec, ont péri, et il m'a fallu, pour obtenir l'insecte parfait, mettre un rameau avec les galles dans un vase d'eau » [96, p. 154]. Laboulbène écrit de même au sujet de *Mon. buxi* Lab. : « Au commencement de mai, M. Fallou vit éclore les insectes parfaits, tandis que les feuilles minées placées chez moi n'avaient rien produit. La raison en était que j'avais simplement déposé les plantes dans des boîtes de carton ou dans des bocaux de verre, tandis que M. Fallou avait placé les rameaux dans une petite bouteille pleine d'eau souvent renouvelée. L'humidité étant indispensable au Buis pour conserver sa fraîcheur, les nymphes étaient mortes chez moi pendant deux années sans pouvoir sortir de leur loge préparée à l'avance » [344, p. 314].

5^e Mouvements de la nymphe.

Les nymphes des Cécidomyines sont paresseuses et peuvent à peine se déplacer, si ce n'est au moment de l'éclosion. Il n'est pas rare alors de voir une nymphe, même après sa sortie de terre, continuer à se hisser le long des parois d'un bocal en verre.

Celles des Lestrémines sont au contraire remarquables par leur agilité; elles se déplacent avec facilité, même sur une lame de verre, soit en se roulant sur elles-mêmes, soit en rampant; à cette fin, la

larve se renverse sur le dos, retire les derniers segments, puis s'appuyant fortement sur les épines dont ceux-ci sont armés, elle pousse en avant la moitié antérieure de son corps et réussit ainsi à se déplacer assez rapidement. Cette manœuvre lui est d'un grand secours quand elle veut chercher un emplacement plus favorable mais surtout pour le moment de l'éclosion; elle peut ainsi s'avancer entre les fibres du bois ou de l'écorce, jusqu'à ce que sa partie antérieure arrive à être entièrement dégagée.

III. — Caractères généraux de la larve.

Les larves des Cécidomyies se reconnaissent aux caractères suivants : *Corps composé de 14 segments, péripneustique, avec neuf paires de stigmates réparties sur les segments 3 et 6 à 13. Tête non ou incomplètement différenciée, munie de deux palpes ou antennes bi-articulées, sans yeux et sans mandibules. Segment 3^e ordinairement pourvu d'une spatule en dessous et d'une double tache oculaire sur le dessus.*

Étudions successivement la morphologie, l'anatomie, la physiologie et la biologie des larves des Cécidomyies.

1^{re} Morphologie externe de la larve adulte.

L'étude de la morphologie externe des larves n'étant possible que sur une peau larvaire bien transparente, j'indiquerai d'abord la façon de préparer le sujet qui doit servir à l'étude. S'agit-il d'une larve vivante ou fraîche, on la pose sur la lame porte-objet, puis au moyen d'une épingle, on lui fait une entaille sur le côté, vers le milieu du corps; par l'ouverture ainsi formée, on extraira toutes les parties qui composent le corps de la larve, de sorte qu'il n'en restera plus que la peau. On arrivera facilement à ce résultat en comprimant doucement la larve, avec le côté de l'épingle, qu'on fait passer d'une extrémité du corps à l'autre; en ajoutant de temps à autre une gouttelette d'eau, les parties extraites sont entraînées par le liquide. Si l'on n'a pas encore obtenu la transparence nécessaire, on pourra ajouter une gouttelette de solution de potasse, qui donnera à la peau une transparence complète. Toute cette opération est l'affaire d'une ou de deux minutes. S'il s'agit de larves desséchées ou de larves conservées dans de l'alcool, on les ramollit d'abord dans une goutte d'eau, puis on agit comme précédemment.

Examinons maintenant : A. la forme et la couleur des larves, B. la

segmentation de leur corps, C. la tache oculaire, D. la spatule sternale, E. le revêtement cutané et les papilles, enfin F. les stigmates.

A. Forme et couleur des larves.

À l'état adulte, les larves ont une forme généralement allongée, c'est-à-dire plusieurs fois aussi longue que large, et variant d'ordinaire de 1 à 3 mill. La plus grande espèce que je connais, *Hormomyia* sp., qui forme des galles sur *Carex Davalliana*, mesure 7 mill. en longueur, sur 2 en largeur; celle d'*Hormomyia cornifex* Kieff., mesure 5 mill. sur 1,75; celle de *Rhabdophaga Pierrei* Kieff., 3 sur 1; *R. Karschi* Kieff., 2,75 sur 0,75; *R. dubia* Kieff., 2,75 sur 1; *R. rosaria* H. Lw., 2,50 à 3 sur 1,50 à 2; *R. clarifex* Kieff. et *pulvini* Kieff., 1,50 à 2 sur 0,80 à 1. D'autres offrent une forme encore plus ramassée que ces dernières, par exemple celle de *Clinorhyncha tanacetii* Kieff., qui mesure 1,25 en longueur et 0,75 en largeur. Leur corps est ordinairement un peu comprimé; chez quelques espèces, par exemple chez *Rhizomyia* Kieff. (*Coccomorpha* Rbs.), il est aplati et cocciforme; beaucoup d'autres espèces ont au contraire le corps à peu près cylindrique, ce qui est le cas pour les *Contarinia*, les *Camptomyia*, les *Winnertzia*, etc.

La couleur de ces larves est blanche, citrine, vitelline, orangée, rouge vif, rarement brune. Une larve peut être blanche à l'état jeune et devenir rouge plus tard, par exemple *Oligotrophus capreus*. Parfois une larve est blanche jusqu'à sa maturité, c'est-à-dire quand elle cesse de prendre de la nourriture, et devient rouge pendant sa période de repos, par exemple *Rhabd. nervorum* Kieff. D'autres fois des larves de la même espèce et provenant des mêmes galles peuvent présenter, les unes une couleur blanche, les autres une couleur jaune pâle; j'ai d'abord cru qu'il s'agissait là d'une différence de sexe, mais l'observation m'a prouvé que je faisais erreur. La couleur peut même changer rapidement sur les mêmes individus; il est arrivé que des larves blanches, sorties régulièrement de leurs galles et mises provisoirement dans une boîte en fer-blanc, parurent jaunes le lendemain.

Ganin fait une remarque semblable pour les larves d'Hétéropézines qu'il a décrites; celles qui étaient en liberté paraissaient blanches; celles qui s'étaient réfugiées dans le bois pourri, d'un jaune sale; enfin celles qui avaient pénétré dans du carton offraient une couleur orangée [202].

Cette coloration est indépendante de celle de l'œuf et de l'imago; la larve de *Winnertzia rubra* Kieff. est orangée, tandis que l'œuf est blanc; celle de *Perrisia piri* B. est blanche, tandis que l'œuf et l'imago

sont rouges. Elle n'a pas son siège dans la peau larvaire qui est toujours hyaline et transparente, mais dans le tissu adipeux. On voit souvent par transparence une ligne longitudinale et médiane, jaune ou verte, qui correspond au tube digestif lequel est rempli d'un suc de cette couleur.

B. Segmentation de la larve.

Le corps des larves de Cécidomyies se compose de quatorze segments (1), dont le premier représente la tête, le second le cou, les trois suivants le thorax, les neuf autres l'abdomen; le dernier segment abdominal porte le nom de segment anal. Certains auteurs, comme Dufour en 1845 [403], Mik, en 1883 [490] ne comptent que treize segments; pour eux, la tête et le cou ne forment qu'un seul segment, de sorte que le prothorax formerait le second segment et non le troisième. Cette manière de voir a l'avantage de faire rentrer les larves des Cécidomyies dans le cadre des autres Diptères, chez lesquels le prothorax forme le second segment.

Il peut arriver, mais rarement, que l'on pourra être dans le doute au sujet du segment anal, à savoir chez *Cecidomyia pini* D. G., *C. resinicola* O. S. et chez *Dicerura* Kieff. (*Iridomyza* Rbs.). Pour les deux premières larves, quand on les considère de dessus, on serait tenté de ne compter que sept segments abdominaux, outre le segment anal. Ratzeburg écrivait déjà de la première de ces espèces, que l'on pourrait être dans le doute au sujet du segment anal; et de fait, il s'est trompé. On peut se rendre facilement compte qu'ici encore l'abdomen se compose de huit segments outre le segment anal; en effet, sur le dessous on distingue nettement huit rangées de papilles ventrales correspondant donc aux huit segments abdominaux, sans y compter le segment anal; en outre les séries de verrues spiniformes mènent au même résultat. Il n'est donc pas possible de compter moins de segments abdominaux chez ces deux larves que chez les autres, quand on les examine de dessous. Quant au dessus, il suffit d'admettre que le huitième segment abdominal se prolonge jusqu'à l'extrémité du segment anal, où il se divise en deux lobes, dans lesquels viennent aboutir les deux derniers stigmates; le segment anal ne serait donc visible qu'en dessous et sur les côtés. Ce qui prouve que cette explication est réellement la seule vraie, et que c'est une erreur de considérer ces lobes comme appartenant au segment anal, ainsi que l'ont fait Ratzeburg et tout

(1) J'entends donc par segments *somatiques*, les quatorze segments dont se compose la larve; la tête est le premier segment.

récemment encore Rübsaamen en 1894 et en 1899 [626, p. 387; 642], c'est que 1° l'on voit de chaque côté des lobes à stigmates, et au-dessous d'eux, un des deux lobes du vrai segment anal; 2° la disposition des papilles sétigères dorsales sur les deux lobes supérieurs est exactement celle qui est particulière au 8° segment abdominal, et nullement celle d'un segment anal, comme nous le verrons plus loin en parlant des papilles; enfin 3° les lobes inférieurs, renflés en pelote, portent eux-mêmes les papilles sétigères terminales, qui sont caractéristiques pour le segment anal; ils servent en outre seuls à la locomotion, tandis que les lobes supérieurs n'y prennent point part (pl. 30, fig. 4-5). Que l'on s'imagine ces deux lobes à stigmates prolongés encore davantage et dépassant de beaucoup le segment anal, et l'on aura la forme que présentent les *Dicerura* (pl. 25, fig. 10).

La tête est ordinairement faiblement chitineuse et jaune, au moins en partie. Nous ne parlons ici que de sa forme et de ses parties externes, nous décrirons les parties internes en traitant de l'anatomie. La portion antérieure, vue de dessus, est moins élevée et parfois notablement plus rétrécie que la moitié ou le tiers postérieur (pl. 25, fig. 6-8). L'insecte peut à volonté la retirer en entier dans le second segment ou même encore avec le second segment dans le troisième, de sorte que l'extrémité libre de la spatule dépasse, en avant, la ligne transversale formant la limite antérieure du corps. Chez *Rhizomyia perplexa* Kieff., la tête de la larve peut demeurer fort longtemps retirée complètement avec le second segment dans le troisième qui est le segment prothoracique, de sorte qu'étant vu d'en haut, le bord antérieur de ce troisième segment, avec ses soies dorsales disposées en arc, paraît être l'extrémité antérieure de la larve, ce qui contribue encore à donner à celle-ci son aspect cocciforme. Je n'ai jamais réussi, malgré des essais réitérés, à voir la larve vivante autrement qu'en cet état (pl. 25, fig. 4).

De chaque côté de la tête se voit un petit tentacule, ayant la forme de palpe ou d'antenne. Ces palpes, comme nous les désignons ici, sont presque toujours bi-articulés; chez quelques Lestrémines on pourrait les appeler tri-articulés. Leur point d'insertion varie selon les genres; tantôt on le trouve tout près de l'extrémité antérieure de la tête, tantôt vers le milieu, tantôt plus rapproché de la base que du sommet.

Leur longueur est également variable; ordinairement les palpes ne dépassent pas ou guère l'extrémité antérieure de la tête, leur forme est cylindrique, le second article est à peine deux fois aussi long que gros, et hyalin, comme le premier. Chez certaines espèces cependant, surtout chez *Lestodiplosis* Kieff., le second article est subulé et parfois presque sétiforme, jaune ou brun, mobile, dépassant de beaucoup l'ex-

trémité antérieure de la tête et quatre à huit fois aussi long que gros. Une pareille conformation des palpes se retrouve encore chez plusieurs autres genres de Diplosides et chez quelques Lestrémines et Épidosides. Dans tous les cas on distingue avec un fort grossissement une ligne longitudinale, généralement oblique, passant d'un article à l'autre et s'arrêtant à l'extrémité du dernier article, à une minime papille tactile, qui est surtout bien distincte chez les *Contarinia* Rond.

Le segment anal ou neuvième segment abdominal est faiblement bilobé, rarement profondément bilobé à son extrémité. A sa surface inférieure apparaît, chez toutes les Cécidomyines, une fente médiane et longitudinale, limitée par un bourrelet elliptique; elle représente l'anus; chez les Lestrémines et les Hétéropézines, l'anus est au contraire situé à l'extrémité du segment anal, où il forme un tube infundibuliforme et rétractile, c'est-à-dire entrant et sortant alternativement pendant les mouvements de la larve.

C. Tache oculaire de la Larve.

Un des caractères distinctifs des larves des Cécidomyies est la tache oculaire, qui peut cependant faire défaut, par exemple chez *Arthrocnodax pseudo-gallarum* T., selon Targioni-Tozzetti. On appelle ainsi deux taches de couleur brune, en forme de virgule ou de croissant, à concavité externe, se touchant par leur côté convexe et interne; elles sont situées dans la profondeur des tissus sous le 2^e ou 3^e segment, mais placées dorsalement par rapport au tube digestif, de sorte qu'elles sont visibles par transparence sur le dessus de la larve. On l'appelle *tache oculaire*, parce qu'on lui attribue la signification d'ocelles, comme nous le verrons plus loin en traitant de l'anatomie (pl. 25, fig. 6, a; 8, a).

D. Spatule sternale de la Larve.

Un caractère particulier aux larves de Cécidomyies arrivées à leur maturité ⁽¹⁾ et qu'on ne retrouve chez aucun autre insecte, est la pré-

(1) Ganin écrit qu'il a vu sur toutes les larves la spatule tridentée [202]. Faut-il en conclure que toutes ces larves étaient arrivées à maturité? Ou bien y aurait-il réellement des larves immatures munies d'une spatule? Ce cas serait le seul que l'on connût jusqu'à présent. Dire que N. Wagner a fait la même observation est inexact. Cet auteur a trouvé dans une souche de Sorbier trois larves munies d'une spatule, mais plus grandes que celles de *Miastor*, auxquelles elles ressemblaient quant au reste; elles ne se sont pas multipliées. Il est probable qu'il s'agissait ici d'une autre espèce.

sence d'un organe chitineux spécial, de forme variable, situé sur la face ventrale du premier segment thoracique; c'est la *spatule sternale* (*spathula sternalis*, Mik [490, p. 213]), appelée *breast-bone* par les Anglais et *Brustbein* ou *Brustgräte* par les Allemands. Réaumur en fut le premier observateur. Dans ses Mémoires [587, p. 17, pl. XXXVI, fig. 5], cet auteur représente la larve de *Lasioptera rubi* Heeg., vue de dessous, avec cette explication au sujet de la spatule : « corps brun et écailleux, se terminant par une fourche », et dans le texte (p. 427), on lit : « Ce trait brun, bien examiné et tâté avec quelque pointe, est reconnu pour être d'une substance aussi dure que la corne et l'on parvient à voir que son bout le plus proche de la tête est non seulement plus gros que l'autre, mais qu'il est composé de deux parties droites, presque parallèles l'une à l'autre et qui ne se touchent pas. Le bout simple et le plus éloigné de la partie antérieure sort d'une fente qui est apparemment la bouche dans laquelle entrent les fragments de fibres qui ont été brisés par la partie fourchue ou le suc qu'elle en a exprimé. C'est sur quoi on ne peut encore que deviner ». Plus loin, la planche XXXVIII, fig. 16, nous montre la larve de *Mikiola fagi* Hart. vue de dessous, avec cette explication au sujet de la spatule : « deux espèces de tranchants avec lesquels le ver peut agir contre les parois de la galle ».

I. NATURE DE LA SPATULE. — Cet organe est constitué par une lame plus ou moins chitineuse et rigide; parfois presque hyaline, le plus souvent jaune ou brune, rarement d'un noir profond; elle prend naissance à la base de la partie ventrale du premier segment thoracique, dans un seul cas, au milieu du second segment thoracique, et s'applique longitudinalement contre cette face ventrale, dont elle n'atteint jamais le bord antérieur. Elle émerge à nu, à son extrémité antérieure, mais dans le reste de son étendue elle est recouverte par une strate cuticulaire superficielle, dont on voit l'extrémité sous forme de ligne ou pli transversal à l'endroit où émerge la partie libre de la spatule. Quand la larve est vue de profil, on voit distinctement cette partie libre dépasser la ligne du corps. Les auteurs ne s'accordent guère sur la nature de la spatule. Laissons encore la parole à M. Marchal [446, p. 23] : « Les coupes longitudinales que j'ai faites de la larve de *Cec. destructor*, m'ont montré que la spatule n'est qu'un simple épaississement de la cuticule, dans l'épaisseur de laquelle elle se trouve toute comprise. La couche qui voile la spatule sternale à sa base n'est qu'une strate cuticulaire superficielle séparée des strates profondes épaissies à ce niveau et qui constituent la spatule elle-même; en avant, au niveau de l'extrémité

libre, cette strate superficielle se soude avec le reste de la spatule; la ligne suivant laquelle se fait cette soudure correspond au repli dont nous avons parlé. La spatule ne présente ni apophyse interne, ni muscles spéciaux s'insérant sur sa base; ce sont les mêmes muscles longitudinaux existant sur tous les segments, qui en s'insérant sur l'hypoderme au-dessous d'elle, déterminent sa mobilité. On ne peut pas dire qu'il y ait une partie de la spatule sous-cutanée et l'autre libre, comme le font tous les auteurs (1), puisque cet organe est tout entier compris dans l'épaisseur de la cuticule ». L'observation de M. Marchal est parfaitement exacte; pour s'en convaincre, il suffit de séparer sur une peau larvaire la partie ventrale de la partie dorsale; si l'on examine la première successivement sur ses deux faces, l'on verra que la spatule est voilée des deux côtés et qu'elle n'est libre qu'à sa partie antérieure sur la surface externe de la peau. J'ignore pourquoi M. Rübsaamen s'obstine encore en 1899 [642, p. 533] à écrire que la spatule « est située sous la peau » et que son extrémité antérieure « émerge de dessous la peau ».

II. FORME DE LA SPATULE (pl. 28). — De même que l'absence de la spatule est généralement un caractère générique, comme je l'ai démontré pour *Lestodiplosis* Kieff., *Rübsaamenia* Kieff. et *Rhopalomyia* Rbs. (2), de même aussi la forme de la spatule est ordinairement caractéristique pour les genres et même pour les groupes. Cet organe a ordinairement l'aspect d'une lame plus ou moins longue, étroite dans ses deux tiers ou ses trois quarts inférieurs, élargie dans sa partie supérieure et généralement diversement incisée à son extrémité. Dans les genres *Campitomyia* Kieff. et *Winnertzia* Rond., la spatule est toujours simple et obtuse (pl. 32, fig. 4); chez *Porricondyla* Rond. (*Epidosis* H. Lw.), *Dicerura* Kieff. (*Iridomyza* Rbs.) et *Kiefferia* Mik, en fer de lance (pl. 32, fig. 10); chez la plupart des Cécidomyines, bilobée; chez *Asphon-*

(1) Un auteur italien avait pourtant remarqué, avant M. Marchal, que la spatule n'est pas sous-cutanée; c'est M. Targioni-Tozzetti [704, p. 463]. Il définit cet organe : « Organo chitinoso formato in generale da una parte posteriore allungata, contenuta in una guaina della epidermide et variamente terminata nella estremità anteriore libera esternamente, appena protrattile. »

(2) Dans mon travail sur les Larves de Cécidomyies, qui parut en janvier 1895 [290], j'ai indiqué formellement, dans le Synopsis des larves du groupe *Asphondylia*, p. 8, comme caractère des larves de *Rhopalomyia* : « Seulement quatre papilles ventrales. Larve dépourvue de spatule. » Cela n'a pas empêché M. Rübsaamen de donner ce même caractère deux années plus tard comme une découverte, et d'ajouter cette réflexion qui le caractérise : « M. Kieffer n'a pas connu ce caractère qui est pourtant si frappant! » [639].

dylia H. Lw., bilobée et chaque lobe muni d'une dent au côté interne (pl. 32, fig. 5); chez la plupart des Lestrémines, trilobée (pl. 32, fig. 6); chez *Oligotrophus Bergenstammi* Wachtl, quadrilobée (pl. 32, fig. 7); enfin chez *Braueriella phillyreae* Fr. Lw. avec des lobes encore plus nombreux (pl. 32, fig. 8). Ces deux dernières formes étaient inconnues jusqu'ici. La partie inférieure de la spatule, ou la tige, est très allongée dans le genre *Mycodiplosis* Rbs.; nulle ou très courte dans le genre *Dryomyia* Kieff. et chez *Hormomyia cornifex* Kieff., *Rhabd. rosaria* H. Lw., *rosariella* Kieff., *pulvini* Kieff., *pseudococcus* Rbs., *Oligotrophus-betulae* Winn., etc.

La partie évasée ou terminale est à peine plus large que la tige chez *Clinorrhyncha* H. Lw., tandis que pour les autres genres elle est généralement fortement évasée. L'extrême base de la spatule est également dans la plupart des cas un peu élargie; chez certaines espèces à spatule fortement marquée, par exemple chez *Rhabd. Pierrei* Kieff. et *Karschi* Kieff., la base s'élargit en forme d'ancre (pl. 31, fig. 3).

Dans bien des cas l'extrémité de la strate cuticulaire qui voile la spatule paraît chitineuse de chaque côté de celle-ci, mais en dehors d'elle, ce qui a fait croire à des muscles s'insérant transversalement à la base de la partie qui émerge. Cela peut se présenter aussi sur d'autres points de la spatule (pl. 32, fig. 9).

Chez *Rhabd. Pierrei*, la partie élargie de la spatule est traversée longitudinalement par deux arêtes parallèles, formant une double crête; en outre, de chaque côté de sa base s'élève un lobe réniforme, qui forme comme un repli de la spatule et qui n'est pas dans le même plan qu'elle. Ce lobe est sans doute recouvert par une strate superficielle de la cuticule, car on ne voit pas de solution de continuité de celle-ci. Nous représentons cette singulière forme vue de face (pl. 31, fig. 1) et de profil (fig. 2).

D'autres fois la spatule est entourée d'un espace cuticulaire large et cordiforme qui s'est chitinisé lui-même, paraît brun ou jaune et s'étend depuis les papilles pleurales jusque près de la base de la spatule, où il se rétrécit et cesse; tel est le cas pour *Asphondylia verbasci* Vall., *punica* March., *Borzii* De St., *echii* H. Lw. et *Stefanii* Kieff. Parfois encore un espace chitineux et brun s'étend plus haut, de chaque côté de la spatule, englobant les papilles sternales, tantôt séparé l'un de l'autre, comme chez *Asphondylia Hornigi* Wachtl, et chez quelques Lestrémines, tantôt se réunissant au-dessus de la spatule et ne formant ainsi qu'un espace chitineux unique, par exemple chez les cinq espèces d'*Asphondylia* qui viennent d'être cités (pl. 29, fig. 2, d).

III. VARIATIONS DE LA SPATULE. — Il est vrai que la spatule est sujette à varier sur des larves appartenant à la même espèce, mais cela n'empêche nullement de l'utiliser comme un élément important dans la détermination des larves. En effet, tantôt ces variations sont très faibles et insignifiantes, ne déviant pas sensiblement de la forme habituelle, tantôt elles se sont formées de telle façon que la spatule n'est plus symétrique et l'on se trouve alors devant un cas d'anomalie, comme il s'en présente aussi chez l'insecte parfait, ou enfin elles se produisent sur des larves parasitées et malades qui n'ont pu arriver à leur développement normal. M. Marchal qui a accordé une grande attention à ces variations de la spatule chez *Mayetiola destructor* Say, dit lui-même : « Les plus curieuses variations que j'ai rencontrées sont celles qui se présentent chez certaines larves attaquées par des Nématodes » [446, p. 25].

Il existe encore une autre variation, mais qui n'empêche pas davantage d'utiliser cet organe pour la détermination des espèces, c'est celle qui est le résultat du développement des larves. En effet, comme nous le verrons plus loin, quand la larve est parvenue à son dernier stade, c'est-à-dire à celui qui est caractérisé par la présence de la spatule, cette dernière n'est pas entièrement formée après la mue qui précède ce stade, mais sa partie évasée apparaît d'abord ⁽¹⁾ et elle est souvent déjà entièrement chitineuse et brune sans qu'il apparaisse encore trace de la tige; ce n'est que plus tard, et petit à petit, que celle-ci devient visible. C'est ainsi qu'en recevant de M. le Dr Massalongo, en 1890, des galles de *Monarthropalpus buri* Lab., contenant des larves prêtes à se métamorphoser et ayant une spatule à tige brune, j'ai cru d'abord que Laboulbène avait fait erreur en dessinant une spatule sans tige; l'éminent professeur de l'université de Ferrare ayant eu l'obligeance de m'envoyer l'année suivante, sur ma demande, des galles contenant des larves plus jeunes, je pus me convaincre de l'exactitude de l'observation de Laboulbène, mais, en même temps, de la variation à laquelle cet organe est régulièrement sujet pendant la croissance de la larve. J'ai eu depuis cette époque fréquemment l'occasion de constater le même fait. Chez *Rhabdophaga Pierrei*, les deux lobes latéraux de la partie évasée, non situés dans le même plan que le reste de la spatule, se chitinisent d'abord, ce qui a lieu au commencement de septembre ou à la fin d'août; la larve est encore relativement petite alors et sa couleur d'un jaune très clair; les deux lobes pointus qui termi-

(1) Cette partie évasée se forme petit à petit; au commencement elle est hyaline et passe ensuite insensiblement au jaune ou au brun.

nent la partie évasée se chitinisent ensuite, mais on ne voit pas encore trace de la tige.

J'ai cru autrefois qu'il existait peut-être encore une variation due à l'usure [280, p. 41], mais il est résulté de mes observations ultérieures que les deux spatules en question, dont l'une ne m'était connue que par un dessin, sont à rapporter à deux insectes différents, vivant tous deux dans la couche ligneuse du Saule, à savoir *Rhabd. saliciperda* Duf. et *Pierrei* Kieff.

IV. RÔLE DE LA SPATULE STERNALE. — Le rôle de la spatule sternale a été fort discuté par les auteurs et l'on a émis, à son sujet, des opinions très diverses que nous allons exposer successivement.

1^{re} Opinion. La spatule sternale considérée comme organe de perforation. Réaumur, le premier observateur de la spatule, fut aussi le premier qui essaya d'en expliquer l'usage. Comme nous venons de le voir plus haut, Réaumur, tout en avouant « qu'on ne pouvait encore que deviner » sur l'usage de cet organe, pensait qu'il servait « à briser les fibres de la galle » ou bien « à en exprimer le suc ». J'ai cru également ⁽¹⁾ que la spatule était un organe de perforation, et j'en ai donné les raisons suivantes [290].

1^o La spatule est le seul organe qui puisse servir au travail de perforation qui incombe à beaucoup de larves. En effet, « comme la plupart des galles (dans lesquelles a lieu la transformation de l'insecte) ne sont pas des pseudo-carpes déhiscent, mais bien indéhiscents, c'est-à-dire, ne s'ouvrant pas à la maturité, que deviendrait le frère Diptère se trouvant, au moment de son éclosion, captif dans une prison dont il ne pourrait briser les parois? Que deviendrait-il, si la nature n'était venue à son aide auparavant et voici comment. Avant de faire la morte pour se métamorphoser, la larve se met à entamer la paroi de sa prison et y pratique une sortie, en laissant comme séparation d'avec le dehors, ou, si l'on veut, comme porte, afin d'empêcher tout étranger de pénétrer chez elle pendant son sommeil, une mince pellicule circulaire, un peu transparente, laquelle sera brisée plus tard, au moment de l'éclosion, par la double armure céphalique de la nymphe; ou bien encore, comme je l'ai constaté pour celle de *Rhopalomyia syngenesiae* H. Loew., elle pratiquera au sommet de la galle une entaille circu-

(1) Mes observations ultérieures m'ont permis de trouver dans les parties buccales de la larve un double organe que je considère comme un vestige des crochets des larves de Muscides, et qui serait alors à considérer comme organe de perforation, mais je n'en ai pas la certitude (pl. 26, fig. 5, m).

laire, de sorte qu'au moment de l'éclosion la nymphe n'aura plus qu'à pousser contre le sommet de sa prison et celui-ci se détachera aisément en forme de calotte... Dans bien des cas cette opération doit être une rude besogne pour la larve.

« Qu'on songe, par exemple, aux *R. salicis* D. G., *saliciperda* Duf. et *medullaris* Kieff.! Quels efforts ne faut-il pas à ces vermineux pour traverser la couche ligneuse d'une branche ou d'un rameau de Saule et arriver jusqu'à l'épiderme de l'écorce! Or les parties buccales de l'animal ne sont aptes qu'à pomper des liquides, mais nullement à entamer un corps solide; la spatule seule peut donc donner l'explication du travail opéré.

« Afin que l'on en soit persuadé, j'envoie à la Société, avec cette note un rameau de Saule habité par *R. saliciperda* Duf. avec prière de vouloir bien l'examiner. On y trouvera, dans de petits conduits encore inachevés, la larve couchée sur le dos; autour d'elle, on remarque un amas grisâtre qui, examiné au microscope, se montre composé d'une multitude de fibres détachées par la larve; j'ai même vu une larve ayant de ces fibres dans l'angle formé par l'extrémité de la spatule avec le segment prothoracique, comme c'est le cas pour un rabot avec lequel on a passé sur une planche » (p. 39-40). Quant à d'autres espèces dont la galle n'est pas close ou devient déhiscente à la maturité, et qui sont néanmoins pourvues d'une spatule, il faut remarquer que cette spatule est faiblement chitineuse et que son rôle perforateur n'est pas encore exclu, vu qu'il reste encore un cocon à perforer. Les larves de *Rhopalomyia*, dont la plupart vivent dans des galles non entièrement closes ou déhiscentes à la maturité, ainsi que celles des *Lestodiplosis* qui sont zoophages, se métamorphosent sans cocon ⁽¹⁾; or elles n'ont point de spatule. Celles de *Bremia*, également zoophages, se métamorphosent dans un cocon et elles ont une spatule. On peut donc présumer que la spatule sert à préformer une ouverture dans ce cocon. Laissons ici la parole à Perris. Dans son Mémoire sur les Insectes du Pin maritime, 1870, p. 468, cet auteur dit du cocon de *Cécidomyia pini* : « La régularité de forme et de dimension de la calotte qui se soulève à l'extrémité antérieure de la coque résineuse, pour livrer passage à l'Insecte parfait, me donne la conviction qu'avant de filer son cocon soyeux, la larve prépare les voies en faisant une entaille circulaire dans l'épaisseur de la couche résineuse, au point de détacher presque complètement cette calotte que soulève le moindre effort ».

(1) Cela n'est pas le cas pour tous les *Lestodiplosis*.

2° En règle générale la spatule est le plus fortement développée chez les espèces qui ont des tissus à perforer, et elle fait défaut ou elle est faiblement marquée chez celles qui n'ont rien à perforer. C'est ainsi qu'elle est fortement chitineuse et entièrement d'un brun sombre, chez les espèces vivant dans une galle close et dure, par exemple chez les larves de *Clinorrhyncha*, la plupart des *Lasioptera*, celles de *Baldratia*, de *Choristoneura*, d'*Asphondylia*, de *Rhabd. salicis* D. G., *saliciperda* Duf., *Pierrei* Kieff., etc.

3° La spatule n'apparaît qu'à la dernière forme larvaire, c'est-à-dire au moment où la larve commence son travail de perforation.

Cette opinion a encore été partagée par les auteurs suivants :

Nic. Wagner, professeur à Kasan, en 1863 [790, p. 515-516] ; la spatule de *Miastor metraloas* Mein. ? est appelée *appareil de perforation* servant à la larve à entailler le bois pourri, pour s'y former un passage.

Laboulbène, en 1873 [344, pl. IX, fig. 5] ; la spatule de *Monarthropalpus buxi* Lab. est désignée sous le nom d'organe thoracique servant à décoller, à la manière d'un coin, les parties supérieure et inférieure des feuilles du Buis.

Mik, en 1883 [490, p. 40-41] ; l'auteur indique en cet endroit qu'il a eu occasion de se convaincre du rôle perforateur de la spatule.

Ormerod, en 1866 [548, p. 10] ; l'auteur dit de la spatule de *Mayetiola destructor* Say : « From my own observations I conjecture that it is used as a digger or scraper, and it may be that the reason why strong-stemmed wheat, or stems containing more silica, are not so much injured by attack as other kinds, is, that the fork is not strong enough in these instances to assist the excessively delicate mouth-parts to acquire their food from them ».

Lindemann, en 1887, dit de même dans sa description de cette larve, que la spatule sternale « sert d'appareil perforateur pour creuser la tige du blé » [369].

Valéry Mayet, en 1890 [468] dit de la spatule de la Cécydomyie de la vigne : « C'est évidemment là l'instrument perforant qui permet à cette larve à bouche inerme de déchirer les tissus ».

2° *Opinion. La spatule considérée comme organe de locomotion ou comme point d'appui.* Cette opinion a été émise d'abord par M. le baron von Osten-Sacken, dans sa Monographie des Diptères de l'Amérique du Nord [551, p. 182] : « It may be that this organ is used for locomotion, although I hardly would consider it as homologous to the pseudopods of the larvae of *Chironomus* and *Ceratopogon* ». J'avoue que j'ai au

contraire trouvé une grande analogie entre la spatule des larves de Cécidomyies et le pseudopode des larves d'un Chironomide que j'ai décrit sous le nom de *Wulpiella scirpi*; chez cette dernière, le pseudopode, qui est unique, offre l'aspect d'un lobe rétractile, appliqué à la face ventrale du segment prothoracique, et est en grande partie voilé par la peau ou par une strate de la peau, l'extrémité seule émergeant à nu. Il y a encore une certaine analogie entre la spatule et l'organe de locomotion qu'on voit sur la face ventrale du second segment ou segment prothoracique des larves des Simulides; ce dernier est entièrement libre et n'est fixé à la peau que par sa base; mais sa forme est celle d'un tube en cône tronqué. Cette analogie est également un argument pour l'opinion de ceux qui, comme J. Mik, considèrent le segment prothoracique des larves de Cécidomyies comme étant le 2^e et non le 3^e segment du corps.

Selon Ganin, en 1865 [202], la spatule servirait de point d'appui pour rentrer le premier segment dans le second, ou, selon Perris, en 1871 [576, p. 172], « pour soutenir les muscles qui mettent en mouvement les mandibules, la tête et le segment supplémentaire ». Selon M. Giard, en 1894, elle serait « un organe locomoteur lorsque les larves cherchent dans le sol un endroit pour se transformer en nymphe », ou elle servirait à la larve de point d'appui pour se mouvoir dans la galle [174, p. 341], ou pour se courber en arc et s'élancer ensuite [174, p. 83]. Selon Enock, en 1891 [408, p. 335] et, selon Marchal, en 1897, la spatule servirait à la larve de *Mayetiola destructor* Say pour se retourner dans le cocon au moment de la métamorphose. Voici comment s'exprime ce dernier : « Dans le cas qui nous occupe, la spatule a un rôle très spécial que Enock a été seul jusqu'ici à reconnaître. Il est d'abord manifeste que chez *C. destructor* la spatule sternale ne peut servir d'organe de locomotion puisqu'elle n'apparaît qu'après la formation du puparium. Elle ne peut non plus servir à la larve pour entamer le puparium et pour préparer ainsi la sortie de la nymphe, les pupariums qui renferment les nymphes sont intacts, et de plus la nymphe possède sur le vertex un rostre chitineux dont elle se sert pour briser le puparium. Le rôle réel de la spatule s'explique par ce qui suit : d'après ce que nous avons vu, la larve est toujours fixée sur le chaume, la tête en bas; or l'insecte adulte revêtu de la peau nymphale, qui sort du puparium, sort toujours, tête première, par l'extrémité supérieure de ce dernier. Comment expliquer ce renversement dans les positions respectives de la larve et de l'imago? Enock a résolu par l'observation ce point intéressant de la biologie de l'insecte. Il a constaté que, quelque temps après que la larve affectant la 3^e forme

larvaire s'est rétractée dans sa case pupale, elle se retourne à son intérieur de façon à mettre sa tête dans l'enveloppe cuticulaire qui tout à l'heure enveloppait son extrémité postérieure et réciproquement. Pour opérer cette remarquable évolution, la larve se sert de sa spatule sternale qu'elle utilise comme un levier en l'appuyant contre les parois de la case pupale; aussi Énock pense-t-il que cet organe n'a d'autre fonction, chez *C. destructor*, que de permettre à la larve de se retourner dans sa case pupale. Je ne puis que me ranger à son opinion, car les observations que j'ai faites confirment entièrement celles de cet auteur » [446, p. 24].

3^e Opinion. *La spatule considérée comme organe de filage*. J. Mik écrivait en 1883 [490, p. 40] : « Il n'est pas impossible que la spatule sternale, outre sa fonction de perforation, ne serve encore à la fabrication du cocon ». Et un peu plus tard, en 1891 [506, p. 4], le même auteur ajoutait : « Je suis à même d'ajouter aujourd'hui que la larve se sert en réalité de sa spatule quand elle se fabrique le cocon dans lequel elle doit se métamorphoser ».

4^e Opinion. *La spatule considérée comme organe buccal*. Cette opinion, qui est évidemment erronée, fut celle de Dufour, 1845 [103, p. 215-222]; la spatule y est considérée comme un « vestige des mandibules »; de Héeger, en 1856 [218, p. 336], la spatule est désignée comme « partie buccale brune et cornée »; de Laboulbène, en 1857 [343, p. 569], la spatule est nommée « pièce cornée annexée au tube digestif »; de Giraud, en 1861 [182], la spatule de *Lasioptera eryngii* Vall., *Arnoldia cerris* Koll. et *Dryomyia circinnans* Gir. est décrite comme « armure buccale située en arrière de la bouche »; enfin de Lindemann, en 1887 [369].

E. Revêtement cutané et papilles de la Larve.

Parlons successivement de l'un et des autres.

I. REVÊTEMENT CUTANÉ. — Beaucoup de larves de Cécidomyies sont nues, c'est-à-dire sans aucun revêtement cutané (1). Cela est la règle générale pour *Contarinia* Rond., *Camptomyia* Kieff., *Winnertzia* Rond., *Aprionus* Kieff., etc. Chez *Winnertzia*, la cuticule offre des stries longitudinales et parallèles, très rapprochées et par suite très nombreuses; c'est ainsi que chez une espèce j'en ai compté 280 sur

(1) Abstraction faite des verrues spiniformes qui, en ce cas, ne manquent jamais.

un segment abdominal. Chez *Xylodiplosis praecox* Winn. la peau est également striée finement, mais les stries sont transversales, moins serrées et moins régulières. Chez *Porricondyla* Rond. (*Epidosis* H. Lw.) le corps est densément velu.

1. *Verrues cingentes* (*Verrucae cingentes* Rübsaamen, 1891). La plupart des larves sont couvertes de verrues de conformation diverse, signalées d'abord par Dufour en 1845 et en 1846, et appelées par lui « points granuleux et ronds qui, sur les côtés, forment comme des aspérités », tandis que Wachtl les a nommées plus tard, en 1884, « écailles rondes portant un tubercule en leur centre » ; ce sont les *verrucae cingentes* (*verrucae cingentes* Rübsaamen, 1891). Leur forme est assez variable et l'on distingue, d'après elle, les verrues planes, dont la surface est dépourvue d'aspérités ; les verrues granulées, dont la surface est parsemée de petites granulations ; les verrues ombiliquées, dont le centre est relevé en ombilic ; les verrues coniques et les verrues corniculées. Sur le dessus du corps les verrues cingentes sont ordinairement plus petites et plus saillantes en avant du segment qu'en arrière.

2. *Verrues spiniformes* (*Verrucae spiniformes* Kieffer, 1894). Chez les larves de Cécidomyiides, la plupart des segments offrent sur la partie antérieure⁽¹⁾ de leur face ventrale un bourrelet transversal, qui, vu au microscope, se montre composé d'une multitude de minimes verrues pointues, rarement obtuses, dirigées d'avant en arrière et alignées de façon à former des lignes transversales plus ou moins régulières. Ce sont les verrues spiniformes, observées d'abord par Ratzeburg, en 1841 [583]. Tantôt elles ne paraissent que sur le dessous du corps, par exemple chez la plupart des *Perrisia* Rond. ; tantôt elles se trouvent aussi sur le dessus des segments, par exemple chez *Camptomyia* Kieff., *Winnertzia* Rond., *Miastor* Mein., etc. Chez les Cécidomyiines, elles sont rarement défaut sur le dessous ; elles commencent alors toujours au second segment thoracique, et se trouvent ensuite habituellement sur tous les segments suivants, y compris l'anal, rarement les deux derniers segments du corps en sont dépourvus. *Diallactes croceus* Kieff. fait seule exception, en ce sens que les verrues spiniformes ne commencent, chez cette espèce, sur le dessous du corps, qu'au troisième segment thoracique ; ce qui est le cas pour toutes les Lestrémines et pour plusieurs Hétéropézines. Chez les Cécidomyiines, on les voit encore le long de la fente anale, où elles forment de chaque côté plusieurs lignes longitudinales (pl. 28 et 29).

(1) Jamais près du bord postérieur, comme certains auteurs l'ont cru.

Chaque bourrelet ou chaque série de verrues spiniformes a la forme d'une ellipse transversale; chez les Lestrémines, les Hétéropézines et encore chez plusieurs Épidosides, le bord postérieur de cette ellipse est sinueux. Le nombre de rangées dont se compose une série est variable. Chez *Lestodiplosis* Kieff., les segments abdominaux n'ont que trois rangées transversales de verrues spiniformes; chez les autres genres le nombre est ordinairement de 10 à 30. Une seule rangée peut se composer de cent verrues. Le rôle de ces organes ne saurait être douteux : ils servent à donner des points d'appui à la larve quand elle se meut.

3. *Verrues granuliformes* (*Verrucae granuliformes*). J'appelle ainsi de minimes granulations que l'on remarque sur le tiers ou le quart postérieur du huitième segment abdominal. Elles existent chez toutes les espèces du genre *Contarinia* Rond. (pl. 28, fig. 2).

4. *Verrues en Crochets* (*Uncinuli ventrales* Kieffer, 1896). Ces organes que j'ai considérés comme pseudopodes, en les signalant pour la première fois, ne sont en réalité que des verrues spiniformes autrement conformées et plus fortement développées. Elles sont chitineuses, jaunes ou brunes, mobiles, et forment une rangée transversale avant les rangées des verrues spiniformes. Chez *Holoneurus* Kieff., elles sont siliiformes et parallèles au plan du segment, avec le tiers supérieur courbé en crochet vers le dehors, tandis que la moitié inférieure est reliée à la cuticule par une partie moins fortement colorée. Chez *Porricondyla albimana* Winn., elles ont la forme d'un croissant et sont fixées par la partie convexe. On trouve encore des verrues en crochets chez *Rhizomyia circumspinosus* Rbs. (pl. 33, fig. 2, a et 3, a).

Le but de ces organes est de permettre à la larve de se fixer fortement à son support. Ce qui le prouve, c'est que, si l'on veut détacher, au moyen d'une épingle, une larve munie de ces crochets, l'opération ne sera pas aussi facile que pour les larves dépourvues de semblables organes. J'ai même remarqué une fois, qu'après avoir détaché avec une épingle la moitié antérieure d'une larve de *Holoneurus fulvus* Kieff. fixée sur du bois pourri, l'insecte se maintenait encore cramponné dans sa moitié postérieure.

5. *Verrues en lamelles* (*Verrucae laminosae*). Cette forme ne m'est connue que pour deux espèces, *Clinodiplosis caricis* Kieff. et *Rhizomyia perplexa* Kieff. Chez cette dernière, les segments sont bordés latéralement par une rangée de verrues hyalines, lamelliformes, un peu plus longues que larges et avec l'extrémité échancrée en arc ou avec une incision aiguë. Chez la première, les segments offrent sur le dessus

trois rangées transversales de lamelles, aussi larges ou plus larges que longues et échancrées à l'extrémité; la rangée intermédiaire renferme les papilles dorsales. Le but de ces organes m'est inconnu (pl. 25, fig. 9).

II. PAPILLES ET PSEUDOPODES. — Quelle signification faut-il donner ici au terme de *papilles*? Je pose d'abord cette question, parce que c'est à ce sujet que M. Rübsaamen a fait tomber sur moi une véritable pluie de « grossièretés allemandes », pour me servir de l'expression par laquelle il a désigné lui-même une de ses polémiques. Les premières observations sur les papilles proprement dites, c'est-à-dire sans soies ni autre appendice, sont dues à l'Italien Géné [164] pour les papilles ventrales antérieures; à N. Wagner, professeur de l'Université de Kasan [789], pour les papilles sternales, que J. Mik a désignées plus tard de ce nom ⁽¹⁾ et à moi, en 1890, pour les papilles dorsales [268 p. 29]. Mais j'ai constaté plus tard que ces papilles pouvaient revêtir les formes les plus diverses, et passer insensiblement de l'une à l'autre, depuis celle d'une calotte sphérique, jusqu'à celle d'un cône effilé et presque sétiforme, qu'elles pouvaient en outre porter en leur centre une soie parfois à peine perceptible avec les plus forts grossissements, et offrant ensuite toutes les transitions jusqu'à celle d'une soie longue, rigide et brune. Faut-il étendre le terme de *papilles* à toutes ces formes? Dans le cas contraire comment faut-il limiter son extension? L'auteur allemand que nous venons de nommer considère comme *papilles* « de minimes verrues » auxquelles il conserve encore cette même dénomination de *papilles*, quand elles portent une « minime soie » [632, p. 339], mais la leur retire quand elles sont munies d'une « soie bien développée »! [l. c. et 626, p. 384]. C'est ainsi qu'il est amené à écrire que les larves de *Lestodiplosis necans* Rbs. et *vorans* Rbs. sont dépourvues de papilles.

Je considère toutes les larves de Cécidomyies comme formées plus ou moins d'après le même modèle. Les papilles peuvent différer quant à leur nombre, et c'est ce qui nous donnera les meilleurs caractères pour grouper les larves en genres et en sous-familles, comme je l'ai indiqué dans mon travail sur les larves [290], mais on les retrouve plus ou moins exactement avec la même disposition chez toutes les espèces. Il faut donc étendre le terme de *papillae* à toutes les formes, et c'est ce

(1) Dans mon travail « Ueber die Papillen der Gallmückenlarven » [292], j'ai attribué cette découverte à J. Mik. Grâce à l'obligeante communication de M. le baron von Osten-Sacken, qui est en possession d'un des rares exemplaires de l'ouvrage in-folio de N. Wagner, j'ai su que le professeur de Kasan avait signalé et dessiné les papilles sternales avant Mik.

que j'ai fait en écrivant : « papilles avec soies... ou papilles avec un appendice tubuleux ! etc. » D'après cette manière de voir, les *Lestodiplosis* Kieff. rentraient dans le cadre ordinaire, et je pouvais y décrire toutes les sortes de papilles qu'on trouve sur les autres larves de Cécidomyies.

J'entends donc ici par papilles des *mamelons à contour circulaire et portant en leur centre un ou plusieurs petits boutons, ou une soie, ou un appendice quelconque*. De même que les verrues spiniformes, les papilles offrent d'importants caractères pour la détermination des larves. Leur nombre, leur forme et parfois encore leur groupement varient selon les espèces, les genres, les groupes et même les sous-familles. Nous les répartissons de la façon suivante, basée sur leur disposition ou leur emplacement (1).

1. *Papilles céphaliques*. (*Papillae cephalicae* Kieffer, 1895). Chez toutes les larves de Cécidomyies, la tête est munie, sur le dessus et sur le dessous, de papilles extrêmement petites, difficiles à découvrir et dont le groupement et le nombre semblent varier avec les espèces, mais dont la forme est toujours la même, c'est-à-dire celle d'une papille simple et inerme. Ces papilles que j'ai signalées d'abord en 1894 [280, p. 44], ne sont guère utilisables pour la détermination, à cause de leur extrême petitesse.

2. *Papilles collaires* (*Papillae collares* Thomas, 1892; pl. 25, fig. 11, a). Chez les Cécidomyines, le second segment porte, sur le dessus et sur le dessous, deux papilles collaires, ordinairement simples et inermes, signalées d'abord par M. le docteur Fr. Thomas [722, p. 357]; on y voit en outre une papille collaire située de chaque côté, conformée comme les quatre autres, et que j'ai signalée en 1895 [290, p. 10 et 292, p. 118]; j'ai indiqué la même année que chez les Lestrémines les papilles du dessus du cou sont plus nombreuses, diversement conformées, c'est-à-dire avec la forme et le nombre des papilles dorsales et latérales des segments suivants [291].

(1) Quant à leur forme, nous distinguons les papilles *simples* (*p. simplices*), quand le mamelon ne porte qu'un bouton ou une soie, etc., en son centre; quand il en porte plusieurs, nous l'appelons *p. composée* (*p. compositae*). Les unes et les autres peuvent porter un ou plusieurs boutons sans aucun prolongement ni soie; c'est ce que nous nommons *p. inermes*; quant aux expressions de *papillae tubigeræ*, *bacilligeræ* (appendice en forme de bâtonnet), *squamigeræ* (appendice en forme de cônes de sapin), *penicillatae* (appendice en forme de pinceau), *corniculatae* (en forme de crochets ou de cornes), elles n'ont pas besoin d'autre explication.

3. *Papilles sternales et pleurales* (pl. 28, fig. 1 a, b). Le premier segment thoracique offre à la partie antérieure de sa face ventrale, de chaque côté de l'extrémité de la spatule ou même plus en avant que celle-ci, une papille simple et ordinairement inerme, rarement double et avec soie (pl. 28, fig. 6, a); ces deux papilles, découvertes par N. Wagner [789] (1) ont été nommées par J. Mik, *papillae sternales* [491, p. 213]. On les retrouve encore sur les deux autres segments thoraciques où elles sont ordinairement situées immédiatement en arrière du bourrelet portant les verrues spiniformes, rarement au milieu de ce bourrelet. Dans le genre *Asphondylia* et chez quelques *Lestrémines*, elles sont sétigères; dans les genres *Lestodiplosis* Kieff. et *Arthrocnodax* Rbs., elles ont pris la forme de pseudopodes aux derniers segments thoraciques, et paraissent complètement évanouies au premier segment thoracique, dans le premier genre, mais distinctes et de la forme ordinaire, dans le second.

De chaque côté de la spatule, un peu plus bas que les papilles sternales, apparaissent sur un bourrelet plus ou moins proéminent et étendu, trois papilles formant une ligne transversale faiblement arquée. Ces six papilles forment ensemble un arc de cercle ayant sa convexité dirigée par en bas. Nous les retrouvons avec la même disposition sur les deux autres segments du thorax. Ce sont les papilles pleurales (*papillae pleurales*). Entrevues par Perris [576, pl. I, fig. 35], elles ont été décrites plus tard distinctement par M. Rübsaamen [626, p. 384], mais cet auteur a encore confondu sous le même nom de *papilles pleurales* une des papilles latérales située plus en dehors sur les côtés de la larve (l. c., pl. XIV, fig. 1, g) (2). Nous pouvons maintenant distinguer pour les papilles pleurales les variations suivantes.

1^{er} Cas. Les quatre papilles pleurales internes (*p. pleurales interiores* Kieff., *p. laterales* Rbs.) sont composées; les deux externes (*p. pleurales exteriores* Kieff., *p. pleurales* Rbs. pr. p. et *laterales* Rbs. pr. p.), sont simples (pl. 28, fig. 1-4, b). Ici encore nous pouvons distinguer diverses variations, selon les divers genres ou les sous-familles: tantôt la *p. pl. externe* est inerme sur les trois segments thoraciques, ce qui est un caractère distinctif pour la plupart des genres de *Diplosides* (pl. 28, fig. 1, e); tantôt elle est sétigère sur ces trois mêmes

(1) Voir la note à la page précédente.

(2) La véritable papille pleurale externe, qui est simple et inerme, lui a échappé; cette papille sétigère qu'il appelle soie, tenant lieu de papille pleurale, se retrouve aussi au premier et au troisième segments thoraciques, ainsi qu'aux segments abdominaux, et forme une des deux papilles latérales.

segments, par exemple chez la plupart des *Oligotrophus* Latr., chez *Choristoneura sarothamni* Kieff., etc. (pl. 29, fig. 3, b); tantôt elle est inerte au premier segment thoracique et sétigère aux deux suivants, ce qui est un caractère distinctif pour les genres *Rhabdophaga*, *Perisia* Rond., *Dasyneura* Rond. (pl. 28, fig. 3, e).

De même les quatre pleurales *internes* sont tantôt inertes, ce qui est le cas pour la plupart des espèces (pl. 28, fig. 1, b); tantôt sétigères, ce qui a lieu pour *Asphondylia* H. Lw. et quelques autres espèces (pl. 29, fig. 3, b); d'autre part, elles peuvent être composées de différentes façons; parfois elles portent *trois* boutons tantôt inertes, ce qui est la règle générale pour les Cécidomyines, avec quelques genres qui font exception (pl. 28, fig. 1, b), tantôt sétigères, par exemple plusieurs Épidosides; d'autres fois elles ne sont munies que de deux boutons soit inertes, ce qui est la règle pour les Lestrémines (pl. 29, fig. 4, b), soit sétigères, par exemple dans le genre *Mikiola* Kieff. (pl. 29, fig. 3, b) et peut-être chez quelques *Asphondylia* H. Lw.

2^e Cas. Les six papilles pleurales sont simples. Ce second cas, bien moins fréquent que le premier, nous offre les trois variations suivantes : ou bien toutes les six papilles sont sétigères, ce qui est le cas pour *Lestodiplosis* Kieff. (pl. 29, fig. 9, b), ou bien elles sont toutes inertes, ce qui a lieu pour le premier segment thoracique de plusieurs larves, par exemple de celle qui vit dans le parenchyme des feuilles de *Quercus lusitanica*, et de celle qui forme des galles en urne sur les nervures d'*Ulmus campestris*; ou, enfin, les quatre papilles internes sont inertes et les deux externes sont sétigères, ce qui existe entre autres pour les deux derniers segments thoraciques des deux larves que nous venons de citer.

4. *Papilles ventrales* (*Papillae ventrales*, pl. 28, fig. 2, c, d). Les sept premiers segments abdominaux portent sur le dessous deux séries de papilles que je désigne toutes du nom de papilles *ventrales*. La première série, que j'ai appelée *p. v. anteriores*, forme une rangée transversale ordinairement composée de quatre grandes papilles situées au bord inférieur du bourrelet qui porte les verrues spiniformes ou même parfois sur celui-ci; chez *Rhopalomyia* Rbs. elles ne sont qu'à deux. Ces papilles ventrales antérieures, auxquelles M. Rübsaamen veut restreindre le nom de *papillae ventrales* Rbs., ont été signalées d'abord par Géné, en 1832, sous le nom de « minimos boutons charnus » (1), M. le Dr Fr. Thomas a montré que ces papilles se trouvent

(1) « A questo movimento di ascesa giovino certi minutissimi bitorzoletti

aussi en nombre égal, au 8^e segment abdominal, mais plus rapprochées du bord postérieur de ce segment.

En arrière de cette première rangée, et en arrière d'un pli transversal du segment, se voit une seconde série que j'ai signalée pour la première fois en 1894 et que j'ai appelée *p. v. postérieures* (*p. v. posteriores*). Chez les Cécidomyines (pl. 28, fig. 2, *d*), elle se compose de deux papilles situées dans la moitié postérieure de la face ventrale des sept premiers segments abdominaux et ne dépassant jamais le bourrelet aux verrues spiniformes, ce qui empêchera de les confondre avec les papilles latérales. Elles sont inermes chez la plupart des Diplosides, sétigères chez les Lasioptréides. Dans la sous-famille des Lestrémines et chez la plupart des Épidosides, les papilles ventrales postérieures forment une série transversale de quatre (pl. 29, fig. 10, *b*).

Le 8^e segment abdominal est toujours dépourvu de papilles ventrales postérieures. Dans les genres *Lestodiplosis* Kieff., *Arthrocnodax* Rbs. et *Rübsaamenia* Kieff., les papilles ventrales antérieures sont remplacées par des pseudopodes (pl. 29, fig. 9, *a*) ; mais, chose singulière, tandis que chez toutes les autres larves de Cécidomyies, les papilles ventrales antérieures représentent toujours un nombre pair, à savoir quatre, rarement deux, nous trouvons ici à leur place, chez les représentants des deux premiers genres, trois pseudopodes, et deux chez les représentants du troisième.

5. *Papilles anales* (*Papillae anales* Kieffer, 1895, pl. 27, fig. 4-7). Elles se trouvent sur le dessous du segment anal, au nombre de deux de chaque côté de la fente, chez les Lasioptréides ; de trois de chaque côté, chez la plupart des Diplosides, de quatre ou de cinq de chaque côté, chez les Épidosides et les Lestrémines. Elles sont toujours simples et inermes. Dans le genre *Winnertzia*, la dernière de ces papilles se prolonge parfois sous forme d'appendice plurilobé.

6. *Papilles ellipsoïdales* (*Papillae ellipsoidales* Kieffer, 1895, pl. 29, fig. 10, *c*). Comme leur nom l'indique, ces papilles ont toujours la forme d'une ellipse transversale ; elles sont petites, peu apparentes, et situées au nombre de quatre sur le dessous des huit premiers segments abdominaux, en avant du bourrelet aux verrues spiniformes, et au nombre de deux sur le dessus des mêmes segments, au bord antérieur. Chez les larves qui sont dépourvues de verrues spiniformes au 8^e segment

carnosi che parvemi di osservare alla parte sua inferiore » [164, p. 289]. Cela ne peut pas s'appliquer aux papilles ventrales postérieures qui, chez cette espèce, sont à peine proéminentes.

abdominal, comme c'est le cas pour *Winnertzia* Rond., *Camptomyia* Kieff., *Diallaetes* Kieff., ces verrues sont plus reculées du bord antérieur sur ce segment que cela n'est ordinairement le cas. Chez les Épidosides et les Lestrémines, on en voit encore deux sur le dessous et deux autres sur le dessus du cou, ainsi que sur les deux derniers segments thoraciques, mais celles du cou sont rapprochées du bord postérieur et celles du thorax se trouvent en arrière des verrues spiniformes, quand celles-ci existent.

7. *Papilles dorsales et latérales* (*Papillae dorsales et laterales* Kieffer, 1895, pl. 25, fig. 1-10). J'ai désigné sous le nom de papilles dorsales, la rangée transversale de papilles comprise sur la partie dorsale des segments thoraciques et des huit premiers segments abdominaux, entre les deux stigmates d'un segment. Les papilles situées de chaque côté en dehors des stigmates sont les papilles latérales. Les papilles dorsales sont ordinairement au nombre de six chez les Cécidomyines, rarement de huit, par exemple chez *Rhopalomyia* Rbs., ou de dix, par exemple chez *Camptomyia* Kieff. Sur le huitième segment abdominal, leur nombre n'est que de deux chez les Cécidomyies (pl. 27, fig. 1, 3), à l'exception des Épidosides, de quatre pour toutes les autres espèces (pl. 27, fig. 8). Cette disposition des papilles dorsales du 8^e segment abdominal est très importante pour la détermination des larves. L'unique exception que je connaisse est celle de *Rhizomyia perplexa* Kieff., où le huitième segment porte, entre les deux stigmates, quatre papilles dorsales, comme chez les Épidosides et les Lestrémines dont cette espèce ne fait nullement partie, mais comme ici on trouve encore une paire de stigmates sur le segment anal, et qu'entre ces deux stigmates il existe deux papilles dorsales comme chez les Diplosides et les Lasioptrérides, cette exception n'en est pas une en réalité. Il suffit de formuler autrement la règle et d'écrire : « deux papilles dorsales entre la dernière paire de stigmates », au lieu de dire : « deux papilles dorsales au 8^e segment abdominal » (pl. 25, fig. 4).

Les papilles latérales (pl. 29, fig. 8) sont au nombre de deux chez les Lasioptrérides, généralement de 3 ou de 4 chez les autres espèces. L'une ou l'autre peut être située sur la face ventrale du segment, mais toujours en dehors des verrues spiniformes et jamais derrière elles, ce qui empêche de les confondre avec les papilles ventrales postérieures.

Quant à la forme des papilles dorsales et latérales, elle est bien variée; elles sont tantôt inermes, chez la plupart des Diplosides, des Épidosides, etc., tantôt sétigères, comme chez tous les Lasioptrérides; d'autres fois tubigères, par exemple *Holoneurus* Kieff.; ou bacilliformes;

par exemple chez *Dicroneurus venustus* Winn. (pl. 25, fig. 2); ou en appendices coniques, comme chez *Rübsaamenia* Kieff.; ou en cône de sapin, par exemple *Clinodiplosis caricis* Kieff.; ou enfin connées par deux et renflées en vésicule, comme chez *Cecidomyia pini* D. G. (pl. 27, fig. 11) ou non renflées (pl. 27, fig. 12).

8. *Papilles terminales* (*Papillae terminales* Kieffer, 1895, pl. 26 et 27). Je désigne sous ce nom les papilles que l'on voit sur le dessus du segment anal, à l'extrémité. Elles servent encore plus que les autres papilles à caractériser les genres. Perris distinguait déjà [576, p. 183], d'après les papilles terminales, trois groupes de larves, selon que le segment anal était simple, quadridenté et à deux crochets. La première forme, par laquelle il entend l'absence de dents ou de crochets, mais non de soies, est dite l'ordinaire. La seconde reçoit comme type *Contarinia tritici*, ce qui est encore exact, si l'on considère que Perris ne fait pas mention des quatre petites soies alternant avec les quatre papilles cornées. Enfin, pour la troisième, il cite comme exemples, *Camptomyia populi* Duf. et *Winnertzia salicis* Bouché. Les papilles terminales offrent les formes que nous venons de mentionner pour les papilles dorsales, et en outre celle de crochets et celle de mamelon terminé par un bouquet de poils formant pinceau (pl. 26, fig. 13).

Quant à leur nombre, il est ordinairement de quatre de chaque côté, rarement seulement de trois de chaque côté, par exemple *Lestodiplosis* Kieff., ou de cinq de chaque côté, par exemple *Bryocrypta* Kieff.

9. *Pseudopodes* (pl. 29, fig. 5 et 9, a). Ce ne sont que des papilles ventrales antérieures ou des papilles sternales autrement conformées, c'est-à-dire prolongées en forme d'appendice pédiforme, à extrémité souvent évasée et recourbée ou munie de cils. On les a observés dans trois genres, qui sont : *Lestodiplosis* Kieff., *Arthrocnodax* Rbs. et *Rübsaamenia* Kieff. Bouché a décrit en 1834 [43, p. 25] les pseudopodes de *Lestodiplosis fuscicollis* Bouché; plus tard Perris signalait en 1855 les pseudopodes chez *Lest. entomophila* Perr. et en 1871 [576, p. 170] ceux de *Lest. septemguttata* Kieff. (*pictipennis* Perr. non Meig.) et pensait que la partie évasée « devait faire office de ventouse ». C'est par erreur que Bouché, et après lui Rübsaamen [623] pour *Lest. vorans* Rbs. et *necans* Rbs. indiquent deux pseudopodes pour les segments abdominaux comme pour les thoraciques; c'est de même par erreur que Perris en indique deux pour *Lest. entomophila* et trois pour *Lest. septemguttata*; toutes les observations que j'ai faites sur les larves de *Lestodiplosis* confirment ce que j'ai écrit en 1894 [289, p. 120], c'est-à-dire que le 1^{er} segment thoracique est toujours dépourvu de pseudopodes, les deux

segments suivants en portent deux et les sept premiers segments abdominaux en ont trois; au segment anal ils sont plus courts et autrement conformés; avec Perris je pense que l'extrémité évasée en entonnoir peut faire office de ventouse. Cette disposition des pseudopodes est encore la même dans le genre *Arthrocnodax* Rbs., chez lequel Targioni-Tozzetti les a d'abord observés et figurés [704] mais sans indiquer le nombre, tandis que dans le genre *Rübsaamenia* Kieff. les pseudopodes font défaut au thorax et se trouvent répartis par deux sur les sept premiers segments abdominaux, comme je l'ai écrit en 1894 [289].

F. *Stigmates de la Larve.*

Toutes les larves de Cécidomyies sont péripneustiques. On y trouve neuf paires de stigmates réparties de la façon suivante. La première paire est située sur le segment prothoracique, toujours en arrière de la rangée des papilles dorsales; les sept paires suivantes se trouvent sur les côtés des sept premiers segments abdominaux et toujours en avant de la rangée des papilles dorsales; enfin la dernière paire est placée sur le huitième segment abdominal, ordinairement éloignée des côtés et dans l'alignement des papilles dorsales. Parfois ces deux derniers stigmates aboutissent à l'extrémité de chacun des côtés du huitième segment, ce qui est le cas pour *Contarinia* Rond.; chez *Mycodiplosis boleti* Kieff. ils se trouvent au bord postérieur du 8^e segment, en arrière de la 1^{re} papille latérale (pl. 27, fig. 2); chez *Dicerura* Kieff. (*Iridomyza* Rbs.) chacun d'eux apparaît à l'extrémité du côté interne de deux longs appendices dépassant de beaucoup le segment anal; une disposition analogue a lieu encore pour les jeunes larves d'*Arnoldia* Kieff. (pl. 31, fig. 11). Chez *Cecidomyia pini* D. G. et *resinicola* O. S., ils sont fixés à l'extrémité de deux lobes du huitième segment recouvrant le segment anal, comme il a été expliqué plus haut, quand il était question de la segmentation; ils ont ici l'aspect d'un cône renversé et tronqué, d'un brun noir, bordé à son extrémité par quatre prolongements cylindriques de la même couleur, qui ne correspondent nullement aux huit papilles terminales des autres larves, comme l'a cru M. Rübsaamen [626, p. 387]. Chez la première de ces deux dernières larves, les stigmates des sept premiers segments abdominaux sont fixés à la base renflée de la première des deux papilles latérales (pl. 27, fig. 9-10). En règle générale, les stigmates des larves sont peu proéminents, à peine plus longs que gros, subcylindriques, avec la base un peu plus large que le sommet qui est tronqué, et traversés en leur milieu par la trachée qui aboutit à leur extrémité. Nous verrons plus loin, en parlant des changements que subissent les larves pendant leur phase de nutrition et de croissance,

que le sommet de leurs stigmates peut paraître bordé de prolongements cylindriques, comme cela a lieu pour les stigmates postérieurs de la larve adulte de *C. pini* D. G.

La seule larve qui fasse exception quant au nombre des stigmates, est celle de *Rhizomyia perplexa* Kieff., qui porte dix paires de stigmates, dont la dernière est située sur le segment anal (pl. 25, fig. 4). Je ne connais aucun autre cas où le segment anal soit muni de stigmates. On a cité encore, mais à tort, deux autres exemples. C'est ainsi que Ratzeburg [583] et tout récemment M. Rübsaamen [642, p. 536] ont écrit que chez *Cecidomyia pini* la dernière paire de stigmates se trouve sur le segment anal; nous venons de voir que c'est là une erreur. D'autre part, M. le baron von Osten-Sacken écrit de *Cecidomyia resinicola* O. S. : « No lateral spiracles were apparent, but in their stead, a pair of horny approximate tubes at the end of the body, not unlike the respiratory tubes of the larvae of *Syrphus* » [560, p. 345]. Désireux de connaître par autopsie une larve de Cécidomyie qui fût métapneustique et qui se distinguât de toutes ses congénères par l'absence de stigmates sur les huit premiers segments abdominaux, je m'adressai à plusieurs entomologistes des États-Unis, c'est-à-dire de la patrie de cette larve; grâce à l'obligeance de M. C. Marlatt, de Washington, je fus bientôt en possession des larves désirées, renfermées vivantes dans des amas de résine recouvrant des portions de branches de *Pinus inops*. Disons tout d'abord que cette résine abritait aussi des chenilles qui se métamorphosèrent au même endroit et qui avaient sans doute provoqué cette extravasation de la résine (1), comme cela est le cas en Europe pour la chenille de *Retinia resinella* L. Quant aux larves de Cécidomyies vivant au milieu de cette résine, elles ont neuf paires de stigmates, réparties comme chez *C. pini* D. G. Elles ne diffèrent du reste de cette dernière que par leurs papilles dorsales et latérales libres et non renflées, par l'absence de spatule et les verrues spiniformes.

Plusieurs anciens auteurs, et récemment encore Lindemann [369] et P. Marchal [446, p. 19] indiquent dix paires de stigmates pour la larve de *Mayetiola destructor*. C'est ainsi que ce dernier écrit : « Il y a donc en tout dix paires de stigmates, une paire pour le 1^{er} segment somatique et une paire pour chacun des segments de 3 à 11... Le 2^e segment somatique ne présente pas de stigmates ». D'après mes observations, la

(1) Comstock [72, p. 256-257] et récemment Townsend [756] ont trouvé dans la résine, en même temps que les larves de *Cecidomyia resinicola* O. S., les chenilles d'un Lépidoptère, que Fernald a décrit sous le nom de *Retinia Comstockiana*.

larve en question, aussi bien que les autres, est dépourvue de stigmates aux deux derniers segments thoraciques et n'a donc que neuf paires de stigmates. Meinert écrit de *Miastor metraloas* M. [482, p. 397] : « Je veux encore remarquer que j'ai toujours trouvé une paire de stigmates au 3^e segment ; il y a donc en tout dix paires de stigmates ». Je connais deux sortes de larves de *Miastor* ; elles n'ont que neuf paires de stigmates, comme les autres espèces. Bien que celle de *M. metraloas* Mein. me soit inconnue, et malgré l'autorité de Meinert, je crois qu'il y a eu erreur ici, et que cette erreur a été occasionnée par la ramification latérale de la grande trachée, au 3^e segment thoracique, comme nous allons le voir en traitant de l'appareil respiratoire.

2^e Anatomie des larves de Cécidomyies.

Nous traiterons successivement : I, de l'appareil respiratoire ; II, de l'appareil circulatoire ; III, de l'appareil digestif ; IV, du système nerveux ; V, du système adipeux.

I. APPAREIL RESPIRATOIRE (pl. 30, fig. 1 et 2). — Il est formé par deux troncs latéro-dorsaux et deux troncs plus faibles latéro-ventraux, qui s'étendent, sous forme de lignes brisées, de la première paire de stigmates à la dernière. Les premiers divergent à leur extrémité postérieure chez *Contarinia* et *Dicerura*, mais pas chez les autres espèces. Ils sont toujours reliés par dix paires d'anastomoses qui correspondent aux segments somatiques 4 à 13 ; les neuf premières paires de ces anastomoses émettent, après leur tiers supérieur, un rameau externe et transversal, qui, aux sept premiers segments abdominaux, aboutit à un stigmate ; quant au rameau externe et transversal du 2^e segment thoracique, il est très faible et s'arrête tantôt brusquement, tantôt en de fines anastomoses ; mais celui du 3^e segment thoracique est à peu près aussi gros que ceux des segments abdominaux et s'arrête brusquement, de sorte que l'on peut facilement être induit en erreur et croire qu'il aboutit à un stigmate ; mais on pourra toujours remarquer que son extrémité n'est pas en communication avec le dehors et qu'elle n'atteint pas la surface du corps. A chacune des dix anastomoses qui relient un tronc latéro-dorsal à un tronc latéro-ventral on constatera que ceux-ci sont comme tirés violemment vers le côté, en formant un angle.

D'autre part les deux troncs latéro-dorsaux sont reliés entre eux par sept anastomoses transversales et très droites, situées en arrière des anastomoses reliant les troncs latéro-dorsaux aux troncs latéro-ventraux (fig. 1). A leur point d'insertion, le tronc latéro-dorsal est comme tiré vers la médiane, ce qui lui donne l'aspect d'une ligne brisée. Ces sept

anastomoses correspondent aux sept premiers segments abdominaux. Elles ne forment pas un canal unique, mais chacune est formée de deux pièces d'égale longueur, et se touchant par leur bout qui est renflé en formant une ampoule réfringente; accidentellement ces deux pièces ne sont pas accolées l'une à l'autre par leur partie évasée, mais elles paraissent séparées, l'une étant dirigée par en haut, et l'autre par en bas (pl. 30, fig. 9). Un peu avant l'extrémité renflée en ampoule, chacune de ces pièces émet en avant une anastomose à divisions très fines et très nombreuses, ne pénétrant pas jusqu'au segment antérieur (fig. 9). Au premier segment thoracique, l'anastomose reliant les deux troncs latéraux fait tantôt défaut, comme aux deux suivants, par exemple chez *Mycodiplosis boleti* Kieff., tantôt elle existe, mais de la façon suivante : de chaque stigmate du segment prothoracique s'étend une anastomose dirigée en dedans ou vers le bord postérieur de ce segment; à cet endroit les deux pièces sont reliées entre elles par un court rameau transversal et droit, puis elles pénètrent, étant parallèles l'une à l'autre, jusqu'au tiers antérieur du segment suivant où chacune d'elles s'enfonce dans un des lobes du cerveau et s'y divise en des rameaux nombreux et très courts, enveloppant le cerveau; cela est le cas par exemple pour plusieurs *Bremia* et *Contarinia Steini* Karsch. La larve de *Mayetiola destructor* Say offre, selon M. Marchal, huit anastomoses transversales reliant les deux troncs latéro-dorsaux et correspondant aux huit premiers segments abdominaux. Celles de *Cecidomyia pini* et *resinicola* ont, comme les larves amphipneustiques, une grosse anastomose, presque aussi large que les troncs, et composée d'une seule pièce, à l'avant-dernier segment somatique (pl. 30, fig. 4). Les six segments précédents renferment chacun une anastomose extrêmement fine (1).

Si les troncs latéro-dorsaux ne sont pas réunis entre eux dans les segments thoraciques, mais seulement dans les segments abdominaux, les troncs latéro-ventraux (pl. 30, fig. 2) le sont au contraire dans les segments thoraciques et non plus dans les segments abdominaux; au premier segment thoracique, l'anastomose reliant les deux troncs latéro-ventraux se compose de deux pièces formant l'une avec l'autre un angle ouvert en avant, et terminées chacune par une ampoule par laquelle l'une est accolée à l'autre; un peu en avant de cette ampoule se voit, sur chaque pièce, une fine anastomose atteignant le segment suivant. Au second

(1) Ce n'est pas seulement par leur appareil respiratoire que ces deux larves ont une analogie avec celles des Muscides et des Syrphides, mais aussi par leurs mouvements qui rappellent ceux des larves de Syrphides, comme Osten-Sacken l'a remarqué fort justement pour *C. resinicola*.

segment l'anastomose ne diffère de celle du premier que par l'absence d'ampoule; elle ne se compose donc que d'une pièce continue; cela est encore le cas pour le 3^e segment thoracique, où l'anastomose diffère encore de celle des deux précédents, en ce qu'elle est droite. Bien qu'aux segments abdominaux les deux troncs latéro-ventraux ne soient plus reliés entre eux, ils émettent à chaque segment, au côté interne, un rameau plus ou moins long et courbé en angle à sa base; chez *Contarinia Steini* Karsch, ces rameaux sont presque parallèles au tronc et s'étendent en avant en traversant trois ou quatre segments.

Chez *Cecidomyia pini* D. G. et *resinicola* O. S., les deux troncs latéro-dorsaux ont la forme de lignes brisées dans leur partie antérieure; au 1^{er} segment abdominal ils s'élargissent fortement, deviennent très droits et demeurent ainsi jusqu'à leur extrémité où ils sont bien quatre fois aussi gros que les trachées des autres larves (pl. 30, fig. 4).

L'appareil respiratoire des larves des Lestrimines et des Hétéropézines se distingue facilement de celui des Cécidomyinés: les deux troncs latéro-dorsaux ne s'arrêtent pas à la dernière paire de stigmates, comme chez ces dernières, mais se prolongent sous forme de deux lignes presque droites, en diminuant insensiblement d'épaisseur et en convergeant faiblement l'un vers l'autre; ils traversent le segment anal et sont visibles jusqu'à l'extrémité du cône tronqué et rétractile qui porte l'anus. Au segment anal ils émettent au côté interne un rameau dirigé obliquement en arrière et se terminant par un faisceau capillaire commun.

II. APPAREIL CIRCULATOIRE (pl. 30, fig. 8 et 10). — Pour la larve de *Miastor metraloas* Mein., N. Wagner a trouvé que le cœur ou vaisseau dorsal s'étend depuis le 3^e segment jusqu'au 12^e, où il finit par une partie élargie en cul-de-sac et munie de deux orifices cardiaques garnis de valvules; il distingue encore, outre ce cul-de-sac, une succession de neuf ventricules qui correspondent aux neuf paires de stigmates et dont chacun est muni de deux paires d'orifices cardiaques. Des larves plus vieilles avaient sur la paroi du cœur des corpuscules réniformes, groupés par paires, que Wagner considère comme faisant probablement office de reins. Les pulsations observées étaient lentes, 30 à 40 par minute [790]. Pagenstecher observe au contraire 80 pulsations par minute chez la larve qu'il a décrite [568, p. 409]. Pour les larves de *Mycodiplosis Reaumuri* Kieff. et *Contarinia Steini* Karsch je n'ai observé que 25 à 30 pulsations par minute et seulement sept ventricules correspondant environ aux deux derniers segments thoraciques et aux cinq premiers segments abdominaux. M. le docteur Marchal a décrit la façon suivante l'appareil circulatoire de *Mayetiola destructor* Say :

« Pour bien voir le système circulatoire, il faut choisir de préférence une larve dont le développement ait été retardé par suite d'une nourriture insuffisante et dont le système adipeux se trouve réduit (1). En examinant alors la larve de profil, avec une légère compression, on pourra bien voir le vaisseau dorsal se contracter tout le long du corps. Il commence à la partie antérieure du 3^e anneau, la tête non comprise, et se termine dans la portion antérieure du 10^e. Il est formé d'une succession de sept ventricules élargis au milieu de chaque segment et rétrécis dans les parties intermédiaires. Au niveau des portions élargies se trouve de chaque côté un grand orifice en forme de boutonnière dont on voit bailler les lèvres à chaque pulsation. La partie antérieure du cœur forme un bulbe plissé (1^{er} ventricule) se continuant en avant par l'aorte et de chaque côté duquel se trouvent les orifices de la première paire. La partie postérieure se termine en un cul-de-sac et se trouve placée dans le petit quadrilatère que forment en arrière les trachées dorsales. Il est à remarquer que les orifices du cœur se trouvent au niveau de la portion élargie du ventricule et non pas de la portion rétrécie.

« Au-dessous du cœur s'étend le plancher péricardique sur lequel courent deux cordons cellulaires; ces cordons sont formés par des amas de grosses cellules péricardiques granuleuses correspondant aux expansions aliformes du diaphragme péricardique; chacun de ces amas s'effile par ses parties postérieure et antérieure pour se réunir au groupe suivant, ou bien pour en rester séparé par un intervalle plus ou moins grand. Les deux derniers amas de ces cellules péricardiques correspondent au 10^e et au 9^e segment et sont remarquables par leur épaisseur qui les rend facilement divisibles; ils sont formés par quatre masses cellulaires disposées en quadrilatère sur le plancher péricardique au-dessous du cœur; les deux dernières masses dépassent en arrière le cul-de-sac du cœur qui repose sur elles. Les expansions aliformes du péricarde et les masses péricardiques sont placées un peu en avant des orifices du cœur. Les orifices cardiaques sont garnis de valvules comme chez tous les insectes; mais les valvules opposées de chaque côté de la ligne médiane du corps ne paraissent pas s'accoler l'une à l'autre, au moment de la contraction du cœur; aussi je ne pense pas qu'elles aient un rôle dans la circulation à l'intérieur du vaisseau dorsal; leur rôle se borne à empêcher le sang qui est entré dans le cœur d'en sortir par un

(1) Ces conditions sont remplies, si l'on choisit une larve encore éloignée de sa maturité. Il est préférable aussi de prendre une larve dépourvue de téguments cutanés, par exemple celle de *Contarinia*.

autre orifice que par celui de l'aorte. De la partie antérieure du corps part l'aorte qui plonge immédiatement en se dirigeant obliquement de haut en bas vers le cerveau, entre les deux glandes salivaires; elle se termine entre les deux lobes cérébraux au niveau du collier œsophagien ».

III. APPAREIL DIGESTIF. — Les organes à examiner sont les parties buccales, l'œsophage, l'estomac, le tube intestinal, les glandes et les tubes de Malpighi.

1^{re} *Pièces buccales*. « La partie la plus importante de la tête de la larve est l'antérieure qui contient le squelette. Il ne faut y chercher que les parties buccales; mais quelles sont-elles? Je cherche vainement une pièce analogue des mâchoires supérieures qui, chez les Muscides, paraissent si nettement sous forme de deux crochets ressortant et mobiles... Impossible de trouver une explication pour les parties chitineuses du squelette ». C'est en ces termes que Ratzeburg [583, p. 238] s'exprime au sujet des parties buccales des larves de *Cecidomyiæ* D. G. et *brachyntera* Schw. Pas plus que Ratzeburg, les auteurs qui se sont occupés de cette question après lui n'ont réussi à en donner une explication satisfaisante. Récemment Büsgen, dans son Étude sur la larve et la galle de *Mikiola fagi* Hart., avoue qu'il « n'a pas pu voir distinctement les parties buccales » de cette larve. « Ce qui est certain, écrit-il encore, c'est que ces larves ne sucent pas à la façon des Aphides. Leur bouche obtuse et large peut bien s'appliquer à un tissu, mais elle ne possède pas d'organe capable de pénétrer dans ce tissu pour en pomper le suc. Il est probable que, pour se nourrir, la larve entame avec une pointe chitineuse extrêmement fine, qui devient visible si l'on se sert d'une solution de potasse, une cellule de la surface interne de la galle, et qu'en suite de cette blessure, il sort une minime gouttelette ».

Ce qu'on distingue le plus nettement, ce sont les pièces chitineuses qui forment la charpente de la tête. Elles existent chez toutes les larves de Cécidomyies, mais elles sont plus ou moins fortement chitineuses, tantôt d'un brun noir, d'autres fois presque hyalines, le plus souvent jaune clair; elles sont aussi plus ou moins longues, selon les espèces. Toutes sont situées dans l'épaisseur des tissus, ou au moins sous-cutanées. La principale de ces pièces a la forme d'un fer à cheval ayant son ouverture en arrière (pl. 26, fig. 1-3, a).

À la naissance de la tête, les deux bras de cette pièce qui sont situés dans la profondeur des tissus, paraissent reliés l'un à l'autre par une tige transversale et arquée, visible par transparence à la face supérieure de la tête (pl. 26, fig. 1, b; et 3, b); cette pièce en arc émet de chaque

côté, en arrière, une tige qui va rejoindre l'extrémité de la pièce en forme de fer à cheval (pl. 26, fig. 1, *c*; et 3, *c*) et une autre en avant aboutissant également à la même pièce (pl. 26, fig. 1-3, *d*). Sur le dessus de la tête se voit une tige longitudinale et médiane ayant son origine à l'arc qui relie supérieurement les deux branches de fer à cheval (pl. 26, fig. 1, *e*). Sur le dessous de la tête, apparaît de chaque côté une tige longitudinale et latérale, insérée à sa base au fer à cheval et convergeant l'une vers l'autre en se rendant au sommet de la tête (pl. 26, fig. 2-3, *f*). Cet appareil sert probablement à faire rentrer la tête dans le second segment.

Indépendamment de ces pièces, l'on voit encore sur la face inférieure de la tête un tube chitineux (pl. 26, fig. 2-3, *g*) qui s'étend aussi loin que les deux tiges longitudinales et latérales, et est, chez certaines espèces, distinct jusqu'à l'extrémité de la tête; c'est l'étui de l'oesophage, car il est traversé par l'oesophage et par le canal communiquant avec la glande salivaire. Enfin une autre pièce, encore plus rapprochée de la face inférieure de la tête, semble composée de deux tiges parallèles et juxtaposées, s'appuyant par leur base sur le fer à cheval et se touchant à leur extrémité où chacune paraît être munie d'un minime croc (pl. 26, fig. 5, *m*; et 2-3, *h*). Entre elles, à leur base, est un petit appendice en forme de ligule.

L'extrémité de la tête semble faire office de ventouse et paraît plus ou moins distinctement trilobée, étant vue de dessous. L'orifice buccal, que je n'ai jamais pu découvrir, doit se trouver là, parce que le tube ou étui de l'oesophage est parfois visible jusque-là, et parce que j'en ai vu sortir quelquefois une très petite bulle d'air; il est entouré de papilles réparties comme le montre la fig. 4 de la planche 26.

2° Oesophage, estomac et intestin (pl. 30, fig. 3). Après avoir traversé l'étui thoracique dont nous venons de parler, l'oesophage s'élargit au 3^e segment et forme un jabot ovoïdal; à ce jabot fait suite un grand sac, rempli de sève verte, jaunâtre ou rouge et qui s'étend jusqu'au 5^e ou 6^e segment abdominal, occupant sur son parcours environ les deux tiers de la largeur du corps: c'est l'estomac ou le ventricule chylifique. L'intestin qui fait suite à l'estomac se replie chez beaucoup d'espèces deux fois sur lui-même, la 1^{re} fois par en haut, la 2^e par en bas et débouche dans la grande ampoule rectale qui aboutit à la fente longitudinale de l'anus. Chez les larves mycophages, la première partie de l'intestin est beaucoup plus grosse que la suivante, parfois, par exemple chez *Mycodiplosis Reaumuri* Kieff., aussi grosse que l'estomac, dont elle ne se distingue que de la façon suivante: 1^o elle en est séparée par un

étranglement très étroit, où aboutissent les deux tubes de Malpighi; 2° tandis que l'estomac est rempli de globules très distincts, souvent colorés en rouge, cette première partie de l'intestin renferme une matière dans laquelle on ne distingue plus de globules et dont la couleur est toujours plus sombre que celle des globules contenus dans l'estomac; cela est surtout frappant quand on examine à la loupe des larves de *Mycodiplosis Reaumuri* non encore arrivées à leur maturité.

Selon N. Wagner, l'intestin de *Miastor metraloas* Mein. ne décrit qu'une boucle unique, et l'estomac est divisé en son milieu, par un rétrécissement, en deux parties, dont la première porte de chaque côté, immédiatement après le jabot, un appendice en forme de sac, appelé par Wagner « appendices de l'estomac ». Selon le même auteur, tout le conduit intestinal serait traversé par un tube plus étroit, assez droit au commencement, puis en forme de ligne sinueuse dans le second estomac, et faisant probablement office de muqueuse. Je n'ai jamais constaté l'existence d'un pareil tube interne, pas plus dans le genre *Miastor* que chez les espèces cécidogènes.

3° *Glandes* (pl. 30, fig. 3, *c* et fig. 6). Près de son origine, l'œsophage reçoit un canal étroit qui se bifurque bientôt pour aboutir à deux glandes de forme cylindrique, plus ou moins longues selon les espèces. On les aperçoit assez facilement, par exemple chez *Contarinia Steini*, car outre qu'elles sont relativement grosses, atteignant le tiers de la largeur de l'estomac, elles sont remarquables par leur contenu qui semble composé de très grandes cellules, arrondies, avec une sorte de noyau au milieu; entre ces cellules que l'on peut remarquer depuis le 3° segment somatique jusque vers le milieu de l'estomac, se voit, mais difficilement, le canal glandulaire qui, après avoir traversé ce renflement, se réunit au canal glandulaire situé de l'autre côté de l'œsophage; le canal unique, qui est ainsi formé, aboutit à l'œsophage dans la partie postérieure de la tête. D'après les observations de M. P. Marchal, le renflement des glandes, avec les volumineuses cellules, ne s'étend chez *Mayetiola destructor* Say que depuis le cerveau jusqu'en avant du jabot; à partir de cet endroit, la glande ne se compose plus que d'un long tube dont la cavité se trouve interrompue par des trabécules protoplasmiques; ces deux glandes s'allongent à mesure que la larve s'accroît et finissent par arriver à la partie postérieure du corps.

N. Wagner et P. Marchal considèrent ces glandes comme étant les glandes salivaires; Pagenstecher, au contraire [568, p. 45], veut y voir des glandes séricigères, et considère comme glandes salivaires ce que Wagner appelait les « appendices de l'estomac ».

4° *Tubes de Malpighi*. Immédiatement après son origine, l'intestin reçoit de chaque côté un tube de Malpighi dont le contenu est ordinairement verdâtre ou jaunâtre. Ces deux tubes forment avec l'intestin un T dont ils forment les branches horizontales, tandis que l'intestin en forme la branche verticale; à l'extrémité de la branche horizontale du T ainsi formé, chaque tube de Malpighi décrit une boucle et va s'étendre, sous forme de ligne sinueuse, jusqu'à l'extrémité postérieure de l'intestin. Telle est du moins la forme ordinaire de ces tubes. Pour la larve de *Miastor metraloas*, N. Wagner [790, p. 518] et Pagenstecher [568, p. 407-408] distinguent deux paires de tubes de Malpighi, de longueur à peu près égale et aboutissant toutes deux à l'origine de l'intestin.

IV. SYSTÈME NERVEUX (pl. 30, fig. 8, *b* et *c*). — D'après les observations de N. Wagner [790, p. 520, fig. 9], confirmées par Pagenstecher, le système nerveux de la larve de *Miastor metraloas* se compose de 14 ganglions qui ne correspondent nullement aux quatorze segments du corps. Le plus grand de ces ganglions, le cerveau, est situé dans la moitié postérieure du 1^{er} segment thoracique et dans la moitié antérieure du segment suivant; il est le plus distinct de tous les ganglions et est surtout bien apparent chez *Bremia*, *Mycodiplosis* et *Contarinia*; il est formé de deux moitiés accolées dans le sens de leur longueur; de sa partie antérieure part, de chaque côté, une paire de gros nerfs qui forment au bord antérieur du segment prothoracique un gros renflement cordiforme (pl. 26, fig. 1, *r*); deux nerfs relient celui-ci à chacun des palpes, et deux autres aux pièces chitineuses des parties buccales. Sur le dessus de ce renflement cordiforme ou sac céphalique, par conséquent à une grande distance du tissu cutané, apparaissent les deux taches oculaires brunes, dont la forme a été indiquée. Ces deux taches consisteraient, selon N. Wagner, Pagenstecher, etc., en deux petits sacs remplis d'un pigment brun, enchâssant dans leur concavité une masse réfringente comparable à un cristallin globuleux. « Je n'ai réussi que sur peu d'exemplaires à découvrir le cristallin globuleux », dit Wagner, et Pagenstecher dit de même que « ce cristallin est peu distinct ». Pour moi, j'avoue que je n'ai jamais pu le découvrir. Selon M. P. Marchal [446, p. 16 et 28], ces taches, d'abord accolées l'une à l'autre par leur partie convexe, « s'écartent graduellement, et, pendant la transformation de l'Insecte, elles deviennent latérales pour se placer ensuite chez la nymphe au niveau du bord inférieur des yeux... Chez la nymphe, les deux yeux portent à leur partie inférieure une tache noire allongée transversalement qui, ainsi que j'en

ai eu la preuve en étudiant le développement des histoblastes céphaliques, n'est autre chose que la tache oculaire de la larve. Cette tache oculaire opère une migration pendant la 3^e phase larvaire : d'abord située sur la ligne médiane et dorsale du sac céphalique, elle s'écarte graduellement de sa congénère pour devenir latérale, puis ventrale ; au moment de la dévagination du sac, elle accompagne le disque oculaire auquel elle se trouve fixée et se trouve projetée au dehors ».

V. SYSTÈME ADIPEUX. — On le voit sous la forme de deux rangées latérales de gros lobes, correspondant aux segments du corps, et d'une autre rangée qui est médiane et ventrale. Nous verrons, en traitant de la paedogénèse, quel rôle lui ont attribué plusieurs auteurs.

3^e Physiologie des larves de Cécidomyies.

Nous traiterons ici les questions suivantes : I, mues et changements des larves pendant leur développement ; II, modes de locomotion ; III, influence du milieu ambiant ; IV, paedogénèse. Quant à la façon dont les larves se nourrissent, nous en parlerons dans un article à part, sous le nom de Biologie.

I. MUES ET CHANGEMENTS DES LARVES. — En étudiant le développement de la larve de *Mayetiola destructor*, M. P. Marchal y distingua trois formes différentes et successives, la première correspondant à la phase de migration, la seconde à celle de nutrition et de croissance, et la troisième qu'il appelle phase intrapuparienne. On peut distinguer ces trois stades chez toutes les larves de Cécidomyies ; nous les adoptons donc ici, en changeant toutefois le nom de la troisième phase, ou phase intrapuparienne, en celui de phase de maturité.

1^{re} Phase de migration. Dans l'étude que nous venons de citer, M. Marchal décrit ainsi cette première phase : « La larve éclôt, d'après les auteurs, vers le 4^e jour ; mais le temps nécessaire pour son développement est en réalité très variable et peut être beaucoup plus long si la température est basse. L'œuf est disposé de telle sorte que la tête de la larve soit naturellement dirigée du côté de la racine. Cette larve, observée par Lindeman, mais décrite d'une façon inexacte et incomplète, est différente de la larve que nous allons trouver tout à l'heure fixée sur la tige et correspondant à la deuxième forme. Elle a, au début, une taille à peine supérieure à celle de l'œuf ; elle présente 13 segments dont le 1^{er} constitue la tête ; celle-ci se distingue principalement de la tête de la seconde forme larvaire par la présence de deux oreillettes charnues triangulaires légèrement incurvées inférieure-

ment, placées de chaque côté et comparables à de courts tentacules ; le bord antérieur prébuccal est trilobé, et en dessous l'on distingue la bouche sous forme d'une petite fente triangulaire. Le dernier segment est légèrement échancré postérieurement, et chacun des deux lobes ainsi formés porte quatre petites papilles sétiformes.

Grâce à la transparence de la larve, on aperçoit un certain nombre d'organes internes. Ce sont d'abord les taches oculaires... On voit encore par transparence le système adipeux formé dans chaque segment du corps de deux masses opaques placées une de chaque côté et irrégulièrement lobées. Le tube digestif se présente sous la forme d'un grand sac jaune, de chaque côté duquel se trouve une masse ovoïde allongée de grosses cellules hyalines qui constituent l'ébauche des glandes salivaires. Des granules de pigment jaune... se trouvent répartis par tout le corps auquel ils communiquent sa couleur jaune. A l'extrémité postérieure du corps on voit deux troncs trachéens latéraux qui aboutissent à deux stigmates placés à la partie postérieure de l'avant-dernier segment.

La larve ainsi constituée descend en rampant le long de la feuille aussitôt qu'elle est éclosée ; elle arrive à la base de la feuille, s'engage ensuite entre la gaine foliaire et la tige et va se fixer au niveau du nœud qui correspond à cette feuille, c'est-à-dire aussi loin qu'elle peut aller sans rencontrer d'obstacle. Une certaine humidité est nécessaire pour que cette migration s'opère dans de bonnes conditions. Enock fait, avec raison, observer que beaucoup de larves meurent pendant leur voyage par une trop grande sécheresse. Arrivée au nœud qui se trouve placé au-dessous d'elle, la larve se fixe la tête en bas par son extrémité buccale et commence à se nourrir ; elle restera dès lors ainsi fixée par sa bouche comme par une ventouse, en humant les sucres nourriciers, dans une immobilité à peu près complète, jusqu'à ce qu'elle ait atteint sa taille définitive.

A peine s'est-elle fixée, qu'elle opère une première mue, dont le résultat est de faire apparaître la seconde forme larvaire ; on peut trouver facilement de jeunes larves qui se trouvent encore enveloppées de la peau formée par cette mue ».

Ces observations s'appliquent à la généralité des larves de Cécidomyiides. Nous devons y ajouter cependant les remarques suivantes. Pour l'éclosion des larves, Winnertz [816, p. 194] dit avoir observé qu'elle avait lieu au bout de quelques heures quand la température était élevée. Dans des œufs pondus par *Contarinia pulchripes* Kieff., je vis apparaître l'embryon au second jour ; cet embryon ne remplissait pas tout l'œuf, mais les deux extrémités de celui-ci montraient

un vide assez considérable; la segmentation était encore peu distincte, de sorte que l'on ne pouvait compter le nombre de segments; une tache vitelline sombre et assez grande se remarquait au milieu. L'éclosion eut lieu le quatrième jour; la larve avait alors les mêmes dimensions que le corps de l'œuf; la segmentation, la tête avec les palpes bi-articulés, la tache oculaire et les verrues spiniformes étaient très distinctes; les stigmates et les papilles terminales apparaissaient mais peu distinctement; quant aux trachées, je n'en ai pas vu trace. Ganin dit de la larve d'Hétéropézine qu'il a observée, qu'après sa sortie de l'œuf elle est sans stigmates et sans trachées. Pour les larves fraîchement écloses de *Rhopalomyia palearum* Kieff., je n'ai pu trouver trace des trachées ni des stigmates, à l'exception des stigmates postérieurs, situés comme chez les larves adultes, au huitième segment abdominal, gros et proéminents, munis de deux soies plus longues que les soies des papilles dorsales et latérales du même segment; outre les papilles latérales et dorsales, on voit encore les papilles terminales; comme toutes ces papilles ne sont visibles qu'à cause de la minime soie qu'elles portent, il faut en conclure que les autres papilles non sétigères, ainsi que chez les larves dépourvues de soies à l'état adulte, par exemple *Contarinia pulchripes*, sont déjà présentes dès le premier stade, mais qu'on ne peut les découvrir à cause de leur extrême petitesse. Les espèces qui auront plus tard un tégument cutané offrent déjà quelques indices des verrues cingentes dans cette première phase.

Quant aux deux « oreillettes charnues et triangulaires » observées par Lindemann et Marchal, et considérées par le premier comme « des crochets qui servent à la locomotion de la larve quand elle se rend de la feuille à la gaine », ne seraient-elles pas la première forme des palpes? M. Marchal n'en dit rien, mais la figure qu'en donne Lindemann autorise à le croire, puisque ces oreillettes ou crochets sont situés à la place des palpes. En tout cas je n'ai jamais rien vu de semblable. J'ai observé des larves fraîchement écloses et appartenant aux genres *Dasyneura*, *Rhopalomyia* et *Contarinia*; j'y ai toujours trouvé deux palpes bi-articulés. Pour bien des espèces il est du reste facile de se procurer des larves pendant la période de migration, si l'on se rappelle, comme nous l'avons dit plus haut, que les femelles pondent même sur la paroi du bocal d'observation; si les œufs sont fécondés on obtiendra bientôt les petites larves de la première phase, qui commenceront leur migration. Quant au motif de cette migration, nous en parlerons plus loin, en expliquant la formation de la galle de *Mikiola fagi* Hart.

2^e Phase de nutrition et de croissance. Pendant cette phase, la

larve subit probablement une ou plusieurs mues, parce qu'elle est encore loin d'avoir atteint sa taille définitive. J'ai bien remarqué, pour *Contarinia pulchripes*, quelques peaux provenant d'une mue et situées à proximité d'un amas de petites larves, mais je n'ai pas pu reconnaître si ces peaux provenaient de la première mue ou d'une mue ultérieure. Les verrues cingentes, dont on voyait à peine des traces dans la phase précédente, apparaissent maintenant en règle générale, d'une façon distincte, à moins que la larve ne doive demeurer lisse; elles sont néanmoins encore moins proéminentes et moins rapprochées que dans la troisième phase; les stigmates et les trachées sont toujours visibles. Chez certaines espèces, nous trouvons des particularités qu'il faut mentionner ici. Ce sont de nouveaux organes qui se présentent et qui disparaissent à la troisième phase, ou bien certains organes revêtiront une forme qu'ils n'auront plus à leur phase de maturité.

A. Stigmates. Chez *Arnoldia cerris* Koll., *homocera* H. Lw., *Szepligetii* Kieff., etc., les stigmates des jeunes larves sont conformés comme l'indique la figure 12, pl. 31; ils sont relativement grands, bruns et bifurqués; au centre de la bifurcation, l'orifice du tube apparaît sous forme de petit mamelon. La dernière paire de stigmates offre une conformation très différente de celle des précédentes; le dessus de l'avant-dernier segment somatique porte de chaque côté un appendice conique, brun, lisse et dirigé un peu obliquement en dedans; c'est en dessous de la pointe de ces prolongements, au côté interne, que se trouve l'ouverture du stigmate (pl. 31, fig. 11). Plus tard, quand la larve est adulte et qu'elle est pourvue d'une spatule, les stigmates ont la forme ordinaire et les appendices stigmatifères ont disparu.

D'autres larves, par exemple celles de *Braueriella phillyreae* Fr. Lw. et de *Stefaniella atriplicis* Kieff., ont à l'état jeune le bord terminal des stigmates armé de trois appendices filiformes légèrement incurvés en dedans (pl. 29, fig. 6-7).

B. Appendices thoraciques. La jeune larve de *Mikiola fugi* Hart., au moment où les galls commencent à se montrer, c'est-à-dire vers la mi-mai, offre au second segment thoracique, de chaque côté, en arrière des papilles pleurales, un grand appendice d'un brun clair, cylindrique, aminci au bout, recouvert dans sa moitié terminale de larges verrues terminées par une pointe; ces deux appendices atteignent environ la longueur du segment (pl. 31, fig. 13). Quand la larve est adulte, on ne trouve plus trace de ces appendices, dont le rôle demeure énigmatique.

C. Verrues spiniformes. La plupart des larves ont à l'état jeune,

certaines même à leur sortie de l'œuf, les verrues spiniformes distinctes et dans le même nombre de séries qu'à l'état adulte. Chez *Minstor hastatus* Kieff. il en est autrement. Les jeunes larves, à leur sortie du corps d'une larve prolifère, ont, ainsi que cette dernière, onze séries de verrues spiniformes sur le dessous (depuis le segment prothoracique jusqu'au pénultième segment somatique), comme cela est le cas pour les Cécidomyines, et dix sur le dessus (à partir du premier segment thoracique jusqu'à l'antépénultième somatique), comme chez plusieurs genres de Cécidomyines, par exemple *Camptomyia* Kieff. En avril, les larves adultes, reconnaissables à leur spatule et à leur taille plus petite, n'ont plus que huit séries de verrues spiniformes sur le dessous (à partir du troisième segment thoracique jusqu'à l'antépénultième somatique) et sept seulement sur le dessus (du 3^e segment thoracique incl. à l'antépénultième somatique excl.).

D. Plaque dorsale (pl. 26, fig. 6). Chez les jeunes larves de *Schizomyia galiorum* Kieff., *nigripes* Fr. Lw., *ligustri* Rbs., *tami*, n. sp. et *phillyreae*, n. sp., on voit au pénultième segment somatique une plaque dorsale, plus ou moins chitineuse, plus large que longue, échancrée en arc ou bilobée, située entre les deux stigmates et tenant lieu des deux papilles sétigères dorsales de ce segment, car ces papilles font défaut ici, tandis qu'elles sont visibles sur les autres segments. Quand la larve fait rentrer le segment anal armé de ses deux crochets chitineux, on voit cette lamelle dépasser l'extrémité postérieure du corps. Chez celle de *S. phillyreae* elle est couverte de spinules et, ainsi que la majeure partie du segment anal, fortement chitineuse; par contre, cette larve était dépourvue de verrues cingentes et de verrues spiniformes distinctes. La larve de *S. nigripes* a la plaque dorsale presque hyaline et lisse; quand elle a atteint une taille de 1 millimètre, elle est encore munie de cette plaque bilobée, mais dépourvue de verrues cingentes; quant au reste, elle ne diffère de la larve adulte que par l'absence de la spatule.

E. Transformation des papilles terminales et du tégument cutané. Tandis que les larves de *Schizomyia* ont les crochets qui représentent les papilles terminales très bien développés dès la seconde phase, celles des *Clinodiplosis* ont au contraire pendant leur phase de nutrition, avant l'apparition de la spatule, six des huit papilles terminales très petites, coniques et hyalines; ce n'est qu'avec l'apparition de la spatule que ces papilles terminales se présentent sous forme d'appendices coniques, plus ou moins recourbés et chitineux; quant aux deux papilles externes et inférieures, elles sont pourvues d'une longue soie dès la se-

conde phase. Il est à remarquer encore que le tégument cutané subit une transformation après la seconde phase, chez certaines espèces du même genre *Clinodiplosis*. En effet, le dessus et les côtés du corps paraissent couverts, pendant la phase de nutrition, de minimes verrues hémisphériques, écartées les unes des autres et offrant ainsi l'apparence d'une granulation éparse et fine; avec l'apparition de la spatule, cette granulation fait place à des écailles de grande dimension, appliquées sur toute leur surface inférieure, ordinairement de 1 à 2 fois aussi longues que larges, et offrant sur leur surface supérieure une fine granulation tantôt groupée en leur centre, tantôt alignée le long de leurs bords.

Vers la fin de cette seconde phase, le tégument cutané a atteint tout son développement. La spatule commence à se dessiner; c'est d'abord l'extrémité libre qui devient visible sous forme d'un ou de plusieurs lobes hyalins, puis toute la partie élargie apparaît et se chitïnise, alors que l'on ne voit encore aucune trace de la tige; enfin celle-ci se dessine, puis se chitïnise et la larve est arrivée à sa troisième phase.

3^e Phase de maturité. Dans ce stade, la larve est munie d'une spatule entièrement développée, à moins qu'elle ne doive en demeurer toujours dépourvue. La croissance est terminée; l'insecte cesse de se nourrir et se prépare à la métamorphose. A cet effet, les larves qui étaient fixées à la plante nourricière la tête en bas, et qui doivent se métamorphoser au même endroit, par exemple les *Mayetiola* Kieff., *Rhabdophaga rosaria* H. Lw., *rosariella* Kieff., *clarifex* Kieff., *pulvini* Kieff., *Oligotrophus taxi* Incht., *juniperinus* D.G., *Panteli* Kieff., etc., se retournent dans leur puparium ou dans leur cécidie, de façon à avoir la tête en haut. Celles de *Rhopalomyia palearum* Kieff., *florum* Kieff., etc., opèrent ce retournement bien qu'elles soient dépourvues de spatule. Quant à celles qui sont renfermées dans une cécidie entièrement close et non déhiscence à la maturité, elles opèrent le travail de perforation et préparent le trou de sortie à la nymphe. C'est pendant ce stade enfin que s'observe la période de repos dont nous avons parlé en traitant de la Nymphose.

II. MODES DE LOCOMOTION. — Toutes les larves de Cécidomyiides peuvent se déplacer en rampant. Néanmoins les espèces renfermées dans une galle entièrement close, par exemple *Rhabdophaga saliciperda* Duf., *Pierrei* Kieff., etc., ne font guère usage de cette faculté en dehors de leur galle; elles demeurent habituellement couchées à l'endroit où on les a déposées, sans essayer de fuir, comme le font les autres. Quand une larve se meut sur une surface plane, par exemple sur une lame de

verre, voici ce que l'on peut observer. Les trois derniers segments somatiques subissent d'abord un mouvement de traction en avant, par suite duquel ils se raccourcissent, s'élargissent et rentrent plus ou moins l'un dans l'autre, de façon que la partie antérieure d'un segment, généralement armée de verrues spiniformes, passe par-dessus la partie postérieure du segment précédent, laquelle est toujours inerme; c'est ce qui a trompé le professeur de Kasan, quand il a écrit que la larve de *Miastor metraloas* Mein. avait les verrues spiniformes au bord postérieur des segments. Pendant ce mouvement de traction, la tête et la partie antérieure du corps sont appliquées au plan de position; on comprend aisément de quel secours sont, pendant cette traction, les verrues spiniformes du dessous des segments antérieurs. L'antépénultième segment ne se raccourcit pas autant que les deux autres, mais assez cependant pour imprimer au segment qui le précède un mouvement d'impulsion en avant, après quoi il se fixe solidement au moyen de ses verrues spiniformes. Ce mouvement d'impulsion se communique d'anneau en anneau jusqu'à la tête, laquelle se relève et est comme projetée en avant.

Quand la larve se trouve entre les fibres de l'écorce, les verrues spiniformes dorsales peuvent également lui servir de points d'appui pendant ce double mouvement. Nous croyons donc comprendre ainsi le rôle de ces organes : au moment de la traction, les segments qui ne la subissent pas se servent de leurs verrues spiniformes dirigées en arrière, ou, à leur défaut, des verrues cingentes — je ne connais aucune larve qui soit dépourvue des unes et des autres — pour donner des points d'appui au corps, et de leurs papilles ventrales ou pleurales ou des pseudopodes, pour se fixer solidement. Quant aux papilles dorsales et latérales, elles semblent être surtout des organes du toucher, aussi sont-elles souvent munies d'une soie tactile.

Outre ce mouvement de reptation, beaucoup d'espèces possèdent encore la faculté de sauter. A cette fin, la larve se courbe en ramenant l'extrémité du segment anal jusqu'à la face ventrale du segment prothoracique et forme ainsi un arc perpendiculaire au plan de position, puis, en se débandant comme un ressort tendu, elle est projetée à une distance de quelques centimètres, rarement de plus d'un décimètre. Ce fait est connu depuis longtemps, puisque Réaumur le mentionna déjà en 1737 pour la larve de *Contarinia pisi* Winn. [587, p. 301-303]. M. Giard chercha à l'expliquer de la façon suivante : « Deux crochets subcornés, ou tout au moins des papilles chitineuses, existent chez toutes les larves sauteuses de *Diplosis*; la larve les ramène en avant de l'anus, quand elle se recourbe ventralement pour se préparer au

saut. D'autre part, les deux lames saillantes de l'extrémité bifurquée de la spatule viennent prendre un point d'appui contre ces papilles, puis lâchent prise et le corps se débendant comme un ressort tendu, la larve est projetée au loin « [171, p. 82]. Il est à remarquer que toutes les larves de Cécidomyies sauteuses sont munies d'une spatule et, au segment anal, de deux crochets, rarement de deux papilles coniques et chitineuses. On connaît cette faculté pour le genre *Contarinia* Rond., si riche en espèces, et pour *Bremia aphidimyza* Rond., auxquels j'ai ajouté les genres *Xylodiplosis* Kieff. et *Endaphis* Kieff., tous du groupe des Diplosides; je puis y ajouter encore quelques représentants du genre *Clinodiplosis* Kieff. qui possèdent cette faculté, mais à un degré bien inférieur, pouvant à peine se projeter jusqu'à la distance d'un centimètre, et cela encore après bien des essais stériles; dans le genre *Mycodiplosis*, une espèce, *M. boleti* Kieff., se projette avec la plus grande vivacité à la distance d'un décimètre et au delà. Dans le groupe des Épidosides, nous avons à signaler les genres *Camptomyia* Kieff. et *Winnertzia* Rond.; enfin dans la sous-famille des Lestrémines, nous devons mentionner une larve dont le genre m'est inconnu, et dont nous avons reçu quelques exemplaires de M. Paul de Peyerimhoff, ce qui porte donc à neuf le nombre des genres comptant des représentants parmi les larves sauteuses.

Cette faculté de sauter a été observée rarement chez d'autres Diptères. En dehors de la famille des Cécidomyies, on ne la connaît que pour deux espèces, à savoir *Piophila casei* L. et *Liriomyza urophorina* Mik.

III. INFLUENCE DU MILIEU AMBIANT SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA LARVE. — Comme il a été dit plus haut pour les nymphes, des larves de Cécidomyies peuvent vivre un certain temps, et même se métamorphoser, quand elles ont été plongées dans l'eau. Cette observation, que j'ai publiée en 1894, vient d'être confirmée par M. Rühsaamen, qui écrit que les larves de *Thurauia aquatica* Rbs. passent une partie de leur existence dans l'eau. La même chose a lieu pour *Miastor subterraneus* Karsch, selon R. Schneider. J'ai également observé, dans une tourbière, des larves de Lestrémines d'un genre inconnu, vivant sous les gaines d'*Eriophorum* qui plongeaient dans l'eau. Mais l'exemple le plus frappant nous est fourni par *Cecidomyia vaccinii* Kieff., dont les galles se trouvent dans les tourbières et dont les larves sont obligées de se réfugier parmi les Sphaignes toujours imbibées d'eau. N'ayant pu réussir à obtenir l'éclosion de cette espèce, je mis plusieurs larves dans de l'eau, après leur sortie de la galle, c'est-à-dire au mois de juin; le

12 février suivant, par conséquent au bout de huit mois, je les sortis de là; elles commencèrent à se mouvoir, puis à se déplacer, l'une d'elles parvint jusqu'à la métamorphose.

Elles sont de même capables de supporter les plus grands froids. Un pot à fleurs contenant de la terre dans laquelle des larves de *Perrisia cardaminis* Winn. s'étaient ensevelies, fut exposé à une température de — 25°; cela n'empêcha pas ces larves d'arriver plus tard à leur métamorphose. Quant à l'influence de la sécheresse, il en a été question dans les conditions de la nymphose.

Winnertz fait la remarque suivante [816, p. 197] : « J'ai constaté qu'après un orage, certaines espèces, telles que *cardaminis* W., *saliceti* W., *terminalis* H. Lw., *acrophila* W. et *pavida* W. se montraient extrêmement agitées. Toutes celles qui s'étaient enfouies en terre, en sortirent de nouveau à la tombée de la nuit et rampèrent de tous côtés avec une grande vivacité et une apparente inquiétude. Je les recueillis dans des soucoupes que j'avais placées sous les pots à éclosion, et, le lendemain, lorsque je les remis sur la terre de ces pots, elles s'y enfoncèrent de suite ». Mes observations ne confirment pas celles de Winnertz sur ce point. Mais j'ai remarqué que pour certaines espèces, notamment pour *Perrisia cardaminis* Winn. et *Oligotrophus fagicola* Kieff., les larves sortaient de terre et se mettaient à voyager après chaque arrosage.

IV. PÆDOGÉNÈSE. — Un certain nombre d'Hétéropézines, toutes apparentées entre elles et remarquables par leurs ailes à nervures simples et ordinairement incomplètes, pondent seulement quatre à cinq œufs. Il semblerait d'après cela que leur progéniture devrait être moins nombreuse que celle des autres espèces, et pourtant c'est tout le contraire qui a lieu. La dimension de leurs œufs qui atteignent presque la longueur de leur abdomen est déjà une particularité remarquable. En suivant le développement de cet œuf, on verra qu'il donnera naissance à une larve relativement très grande, presque transparente et pourvue d'un double ovaire. Bientôt cette larve paraît considérablement grossie; en l'observant alors au microscope, on remarquera avec étonnement qu'elle renferme un grand nombre d'œufs. Ceux-ci sont d'abord sphériques, puis, à la maturité, ovalaires, ou en ellipse, et alors avec un vitellus commençant à se former au centre.

Les uns s'atrophient et n'arrivent pas à leur développement; les autres, au nombre d'environ 18-20 dans une espèce, de 7 à 9 seulement dans une autre, de 30 dans une 3^e, renferment chacun à sa maturité une petite larve, qui ressemble en tout à la larve mère. Celle-

ci ne donne plus alors que de faibles signes de vie. Au bout de deux ou de trois jours les jeunes larves brisent l'enveloppe de l'œuf et se meuvent en liberté dans le corps de la larve mère, lequel leur sert de nourriture ou se décompose; au bout de peu de temps il n'en reste plus que la peau et les trachées, de sorte que les jeunes larves peuvent la briser facilement et en sortir. Voilà donc une seconde génération provenant des larves de la première et comprenant environ 72 à 90 individus dans une espèce, 28 à 45 dans l'autre, de 120 à 150 dans la 3^e. Les larves de cette seconde génération se multiplient de la même façon que la première, mais sans en atteindre les dimensions. Ces générations se succèdent ainsi pendant l'automne, l'hiver et le printemps, de telle sorte cependant que les larves sont toujours plus petites à mesure que la génération est plus éloignée de la première. C'est ce qui explique comment on peut trouver, sous l'écorce de branches mortes, ou de troncs d'arbres desséchés ou dans des souches pourries, de véritables amas de larves, formant parfois une couche blanche et uniforme, d'une assez grande étendue, là où une seule femelle a déposé ses quatre ou cinq œufs. L'auteur de cette découverte évalue à une centaine de milles le nombre des larves vivant en mai, c'est-à-dire, après de nombreuses générations, dans une souche pourrie. Arrivées enfin au terme de ces générations, les larves cessent de produire des œufs, la spatule ⁽¹⁾ qui faisait défaut jusque-là, apparaît et les insectes subissent leur transformation en nymphe, pour se réveiller bientôt comme insectes ailés, les uns mâles, les autres femelles. Après la fécondation des femelles, la série des générations issues des larves recommence.

Ce curieux mode de reproduction durant ainsi même pendant la mauvaise saison, c'est-à-dire pendant que les larves des autres espèces sont au repos, a reçu le nom de *pædogénèse* (παῖς, enfant, γένεσις, génération). Découvert en 1861 par Nic. Wagner, professeur de Zoologie à Kasan, ce fait parut tellement incroyable que Ch. de Siebold auquel Wagner avait envoyé dès 1861, son mémoire destiné à la publicité, ne put se résoudre à l'insérer dans son Journal de Zoologie scientifique qu'en 1863. Un professeur de Copenhague, Meinert, fut le premier à confirmer la découverte de Wagner, en 1864, et décrivit le Diptère sous le nom de *Miastor metraloas*; plus tard, le même auteur publia encore deux espèces se reproduisant par *pædogénèse*, à sa-

1. Les trois larves munies de spatule, que Wagner trouva dans une souche de Sorbier, ne renfermaient pas d'œufs; comme elles étaient plus grandes que les autres, elles pouvaient appartenir à une autre espèce.

voir, *Oligarces paradoxus* Mein. et *Pero fasciata* Mein. De nombreuses et minutieuses observations ont été faites depuis sur des larves à pædogénèse, par des hommes compétents, tels que Ch. de Siebold, Ganin, professeur à l'Université de Charkow (larves vivant dans des balayures composées de matières organiques en décomposition), Pagenstecher (larves observées dans du résidu de betteraves), Leuckart, Mecznikoff, de sorte que ce fait reste définitivement acquis à la science. J'ai fait la même observation sur les larves de *Miastor hastatus* Kieff. et *similis* Kieff. ; dans l'un et l'autre cas, la larve mère ne renfermait, en novembre et en avril, que cinq à six jeunes larves, dont deux ou trois avaient la tête tournée vers la tête de la larve mère, les autres dans le sens opposé; toutes étaient presque aussi grandes que la larve mère. On peut encore ajouter à ces espèces *Frirenia tenella* Kieff. et *Leptosyna acutipennis* Kieff. pour lesquelles je n'ai pas observé les larves mères, mais l'abdomen de l'insecte parfait renfermait seulement quatre ou cinq œufs presque aussi grands que lui, ce qui est le caractère des espèces se multipliant par pædogénèse.

Quant à l'évolution des jeunes larves dans le corps de la larve prolifère, elle a trouvé autant d'explications différentes que d'observateurs. Nous ne pouvons qu'exposer brièvement ces diverses théories.

Selon N. Wagner [790], l'œuf d'abord sphérique, puis ellipsoïdal et rempli alors d'un vitellus qui apparaît d'abord au centre, se forme aux dépens des corps adipeux, et non point dans un ovaire.

Meinert pense également qu'il n'existe pas d'ovaire chez les larve de *Miastor metralous* et d'*Oligarces paradoxus*, mais que les œufs des larves qui doivent proliférer aussi bien que ceux de celles qui doivent arriver à la métamorphose, sont formés de cellules semblables et unies étroitement aux corps adipeux [482].

Pagenstecher [568] nie de même l'existence d'un ovaire chez ces larves; toutefois il croit que les œufs ne se forment pas aux dépens des corps adipeux, mais aux dépens du sang.

Mecznikoff [473] admet un ovaire propre, distinct des corps adipeux, dans lequel se forment les œufs, mais aux dépens des cellules polaires.

Ganin [202] arrive à la conclusion que les larves ne sont pas produites aux dépens des corps adipeux, mais qu'elles se forment d'œufs qui se développent dans deux ovaires de forme ovoïdale, situés chacun à la région du 11^e segment, dans le tissu adipeux.

Leuckart enfin [355] se rapproche de l'opinion de Ganin. Pour lui, les larves ne se forment pas aux dépens du tissu adipeux, comme le croyaient N. Wagner et Meinert, ni d'œufs contenus dans deux ovaires,

comme le disait Ganin, mais de germes pour lesquels il propose le nom de *pseudova*, et qui se développent dans deux organes spéciaux qu'il appelle « sacs à germes » (Keimstöcke).

Si l'on compare les différents modes de générations des insectes entre eux, on arrive au résultat suivant :

1^o Une larve produit d'autres larves qui lui sont semblables. PÆDOGÉNÈSE.

A. Une larve munie d'organes sexuels, produit de jeunes larves, sans cesser de vivre : *Aphides*.

B. Une larve peut-être dépourvue d'organes sexuels, meurt en produisant de jeunes larves qui déchirent son corps pour en sortir : *Hétéropézines*.

2^o L'auteur de la génération est un insecte parfait.

A. Une femelle non fécondée pond des œufs fertiles. PARTHÉNOGÉNÈSE.

a. Les œufs non fécondés produisent seulement des femelles.
Exemple : beaucoup de *Cynipides*.

b. Les œufs non fécondés produisent seulement des mâles.
Exemple : l'*Abeille*.

c. Les œufs non fécondés produisent des mâles et des femelles.
Exemple : certains *Lépidoptères*.

d. Les œufs non fécondés produisent des mâles et des femelles dont l'œuf fécondé produira de nouveau une femelle parthénogénétique. GÉNÉRATION ALTERNANTE. Exemple : la plupart des *Cynipides gallicoles*.

B. Une femelle non fécondée ne pond que des œufs stériles; en d'autres termes l'œuf ne produit un être vivant que s'il a été fécondé. GÉNÉRATION SEXUÉE. Exemple : les *Cécidomyines* et la plupart des autres insectes.

4^o Biologie des Larves des Cécidomyies.

D'après la conformation de leurs parties buccales, les larves qui nous occupent ne peuvent que sucer des liquides, aussi ne trouve-t-on jamais que des suc dans leur tube digestif.

Selon les observations de Büsgen [57, p. 16] « la nourriture de la larve de *Mikiola fagi* Hart. consiste en des matières sucrées et albu-

mineuses, car la présence de ces matières se prouve par le sulfate de cuivre et la solution de potasse. Elle est formée par le tissu de la galle, dont beaucoup de cellules renferment des grains de chlorophylle. On ne trouve aucune trace d'excréments dans la galle; la larve semble s'assimiler toute la nourriture qu'elle prend. La période de nutrition dure plusieurs mois ».

Mais je ne puis admettre ce que Beyerinck écrit de la larve de *Mayetiola poae* Bosc. Selon lui, la jeune larve, fixée si étroitement au tissu végétal qu'on peut à peine la détacher sans la blesser, se nourrirait probablement par toute la surface inférieure de son corps et il existerait ainsi un échange osmotique entre elle et la plante [24, p. 17].

D'après leur genre de vie, nous les distinguons en larves *zoophages*, *coprophiles* et *phytophages*. Beaucoup d'espèces qu'on trouve dans les endroits les plus divers, mènent un genre de vie encore inconnu; nous les rangeons provisoirement parmi les phytophages. Quant à celles qu'on a observées avec des chenilles, nous les plaçons parmi les coprophiles. Perris [577 bis, p. 221] a trouvé des larves de Cécidomyies avec des larves de *Phora* dans une fourmilière; cela ne doit pas surprendre outre mesure, si l'on considère que le Rév. P. Wasmann a observé dans une fourmilière des larves d'un Chironomide qu'il a décrit sous le nom de *Ceratopogon Braueri*. J'ai observé une larve à spatule lancéolée et dont le genre m'est inconnu, dans un nid d'Araignée; peut-être se nourrissait-elle des œufs de l'Araignée, peut-être aussi n'avait-elle pénétré dans ce nid que pour s'abriter et s'y métamorphoser.

A. Larves zoophages.

Parmi les larves qui vivent d'autres insectes, les unes sont *endoparasites*, c'est-à-dire vivant à l'intérieur de leur hôte; les autres sont *ectoparasites*, donc situées en dehors de lui.

I. LARVES ENDOPARASITES. — L'unique exemple de Cécidomyie zoophage vivant à l'état larvaire à l'intérieur de son hôte, est *Endaphis perfidus* Kieff. J'aperçus un jour au mois de septembre, dans le bois du château de La Grange, des femelles de ce Diptère, voltigeant autour des feuilles d'*Acer pseudoplatanus* et se posant sur la face inférieure de ces feuilles qui était occupée par des colonies d'*Aphis platanoïdes* Schr.; il me fut facile de remarquer qu'elles y pondaient leurs œufs sur les Pucerons. Cet œuf est d'un rouge vif, cylindrique et fixé par un de ses pôles au dos du Puceron, toujours à proximité des deux tubes externes. Tantôt le Puceron qui porte cet œuf est encore très petit, tantôt il est arrivé au terme de sa croissance, c'est-à-dire devenu

capable de mettre au jour d'autres Pucerons, mais dans tous les cas il est aptère; je n'ai pas observé d'œufs sur une forme ailée. Parfois l'œuf était fixé à un Puceron déjà parasité. Un peu avant l'éclosion de la larve, l'œuf s'incline et paraît alors fixé dans le sens de son grand axe au corps de l'Aphide. J'ignore comment la jeune larve pénètre dans le corps de son hôte; je soupçonne que c'est par le même chemin qu'elle suivra plus tard pour en sortir, car je n'ai pu découvrir aucune lésion externe sur le corps des pucerons renfermant une jeune larve. Comme celle-ci est d'un rouge vif et brillant et que le Puceron est d'un blanc verdâtre ou d'un vert très clair, il est facile de reconnaître les Aphides attaqués, le parasite étant visible par transparence. Quand elle est adulte, cette larve est un peu plus longue que l'abdomen de son hôte; elle est donc obligée de s'y tenir courbée sur elle-même, tantôt en forme de point d'interrogation, tantôt en forme d'U; elle s'y meut pourtant de temps à autre, et sa tête est tournée tantôt vers la partie antérieure, tantôt vers la partie postérieure du Puceron. Celui-ci ne paraît pas souffrir beaucoup de la présence de ce parasite, car il continue à sucer la feuille d'Érable et à s'y déplacer avec autant de facilité que ses congénères indemnes. Quand la larve est arrivée à sa maturité, elle sort par l'ouverture anale du Puceron; lorsqu'elle est entièrement dégagée, elle se courbe en arc sur le limbe de la feuille et s'élance avec la même agilité que les larves de *Contarinia*. On remarque aussi des Pucerons parasités qui ont une couleur brunnâtre; ceux-là paraissent malades, se meuvent à peine et meurent avant ou un peu après la sortie du parasite.

II. LARVES ECTOPARASITES. — Parmi les larves de Cécidomyies ectoparasites, c'est-à-dire qui se tiennent en dehors de l'hôte aux dépens duquel elles vivent, nous distinguons trois catégories : la 1^{re} comprend celles qui se nourrissent d'Aphides, de Psyllides ou de Coccides; la 2^e se rapporte aux espèces vivant d'Acarides; la 3^e renferme celles qui vivent de larves et de nymphes de Diptères et peut-être aussi de larves de petits Coléoptères.

1^o Larves *sternorhynchophages*. Cette catégorie comprend le genre *Bremia* Rond. et quelques *Lestodiplosis* Kieff. En effet, tous les *Bremia* dont le genre de vie est connu se nourrissent d'Aphides, plus rarement de Psyllides et de Coccides. Rondani [605, p. 443] fut le premier à observer que les larves d'une Cécidomyie, qu'il appela *Cecidomyia aphidimyza* et sur laquelle il fonda plus tard le genre *Bremia*, se nourrissaient des Pucerons du Pêcher, du Prunier, du Rosier, du Laitron et d'autres plantes encore. Il remarqua que ces larves surprenaient les

Pucerons, s'y fixaient et en suçaient les parties liquides, se distinguant pourtant, dans leur manière d'agir, des larves de Syrphides. Celles-ci, observées déjà par Réaumur, dévorent toutes les parties internes des Pucerons et n'en laissent que la peau ; celles de *Bremia*, au contraire, se contentent d'en sucer les parties liquides, de sorte que leur victime, bien qu'elle succombe et périsse par suite de cette succion, conserve encore la forme extérieure des Pucerons vivants et paraît seulement un peu froncée. H. Loew et Winnertz ne paraissent pas avoir ajouté foi à cette observation de l'auteur italien, car tous deux ont décrit des espèces de *Bremia*, sans en connaître les mœurs. Ce ne fut que bien plus tard, en 1878, que les observations de Rondani furent confirmées par Fr. Löw [415, p. 402-404], ce qui était du reste peu difficile, car ces larves se trouvent fréquemment. Selon Fr. Löw, ces larves seraient douées de la faculté de sauter, ce que je ne connais d'aucune espèce de ce genre. Ce qui paraît étonnant, c'est que les Pucerons au milieu desquels elles vivent ne semblent nullement connaître le danger dans lequel ils se trouvent, car ils ne cherchent pas à fuir devant ces larves qui en veulent à leur vie. Bien au contraire, chaque larve est ordinairement cachée par le grand nombre d'Aphides qui l'entourent et la couvrent ; elle se fixe à n'importe quelle partie du corps de sa victime qui demeure immobile et n'essaie même pas de se déplacer. On peut donc leur appliquer ce que Réaumur écrivait de celles des Syrphides : « Il n'est point dans la nature d'animal de proie qui chasse aussi à son aise que le fait notre ver. Couché sur une feuille ou sur une tige il est environné de toutes parts des insectes dont il se nourrit ; souvent même ils le touchent de tous côtés, il peut en prendre en quantité sans changer de place. Non seulement les pauvres petits Pucerons ne le fuient pas, mais on en voit même plusieurs à la fois qui passent sur son corps. Ce n'est qu'après avoir mangé ceux qui l'environnaient, qu'il a besoin de se transporter dans un autre endroit ».

Comme Fr. Löw l'a déjà remarqué, ces larves de Cécidomyies aphidophages ne sont pas réduites, ou du moins pas toutes, à vivre d'une espèce déterminée ; j'ai remarqué moi-même qu'une espèce peut vivre de Pucerons appartenant à diverses espèces. Habituellement cependant elles ne s'attaquent qu'à une espèce déterminée. Je citerai comme exemple *Bremia urticariae* Kieff. dont j'observe chaque année les larves en abondance sur *Aphis urticaria* ; à côté des Orties infestées par les Aphides, se trouvent des *Galium verum* L. tout aussi couverts d'*Aphis galii* L. ; or les larves de la Cécidomyie ne paraissent jamais que sur les Orties et on y trouve des individus de différentes phases, parfois réunis sur une même plante.

Plusieurs larves de Cécidomyies vivent de Psyllides; telles sont celles de *Lestodiplosis liviae* Rbs. qui se nourrissent de *Livia juncorum* Latr.; celles d'un autre *Lestodiplosis*, dont je n'ai pas obtenu l'éclosion, qui vivent aux dépens d'*Aphalara maculipennis* Fr. Lw.; celles d'un *Bremia* sp.? observées par Rübsaamen dans les galles de *Psyllopsis frazzini* L.

On connaît de même plusieurs espèces vivant aux dépens de Coccides; ce sont *Bremia abietis* Kieff., que j'ai obtenu de galles de *Chermes abietis*, et *Bremia* sp.? observé plus tard par Rübsaamen sur les larves de *Chionaspis vaccinii* Bouché et sur *Chermes corticalis*. On pourrait encore ajouter celles de *Lestodiplosis septemmaculata* Walsh, observées par Walsh aux États-Unis, dans des galles de Coccides, sur la Vigne; l'auteur dit encore qu'il a obtenu le même insecte de galles de *Rhabd. salicis-brassicoides* et de champignons des branches de *Prunus spinosa*; je pense que dans ces deux derniers cas, il s'agissait d'une espèce voisine, vivant de larves de Cécidomyies.

2° *Larves acarophages*. Vallot fut le premier qui signala des larves de Cécidomyies vivant d'Acarides, auxquelles il donna le nom de *Cecidomyia acarisuga* Wall. [764, p. 95]. Il écrit que les « larves apodes, à tête armée d'un crochet (1) » se trouvent sur la face inférieure des feuilles de *Chelidonium majus* où elles se nourrissent d'*Acarus* dont elles sucent l'intérieur; elles se métamorphosent à l'aisselle des nervures, dans un cocon blanc. Peut-être faut-il rapporter ici encore *Lestodiplosis Woeldickii* Cont. que Contarini a obtenu, en 1840, de larves vivant sous les plumes d'Oiseaux empaillés.

Divers auteurs ont observé des larves de Cécidomyies vivant parmi les Acarides de la sous-famille des Phytoptides, dans des cécidies occasionnées par ces dernières. La première de ces observations revient à Réaumur pour les galles corniculées du Tilleul. Bremi [50, p. 30] les indique pour l'*Erineum* de *Poterium sanguisorba* et pour l'étroit enroulement marginal des feuilles de *Salix alba*. H. Loew en découvre dans les galles rouges de la grosseur d'un grain de millet, éparses sur les feuilles des Saules. Winnertz [816, p. 159-160] communique la même observation et décrit en outre, sous le nom de

(1) A cause de cette expression, les auteurs du « Synopsis Cecidomyidarum » ont mis en doute l'assertion de Vallot, en écrivant que l'insecte renfermé dans le cocon n'était pas une Cécidomyie ou bien qu'il n'avait rien de commun avec la larve observée par Vallot. Il me semble que c'est à tort : Réaumur emploie la même expression de « crochet » pour les larves de *Clinodiplosis galliperda* Fr. Lw. et de *Perrisia tiliam volvens* Rbs. [587, p. 425].

Diplosis peregrina, une espèce dont les larves vivent dans les phytoptocécidies des feuilles du Prunier et du Saule. Le même auteur indique encore que les déformations de *Thymus serpyllum* dues à *Phytoptus Thomasi* Nal. renferment quelquefois des larves de Cécidomyies, comme Vallot et H. Loew l'avaient déjà remarqué avant lui, et Perris [576, p. 178] et Fr. Löw [411, p. 159] après lui. Perris cite encore quatre autres exemples de larves de Cécidomyies vivant dans des galles de Phytoptides sur *Origanum*, *Lysimachia*, *Mentha rotundifolia* et *Trifolium subterraneum* [l. c., p. 179]. Von Frauenfeld en observe avec des Phytoptides dans les galles d'*Eronynus* [147]. De même Fr. Löw cite encore les galles de *Phytoptus galiobius* Nal. sur *Galium verum*, de l'*Eri-neum alneum* sur *Alnus glutinosa* et de l'*Eri-neum betulinum* sur *Betula*, comme hébergeant de ces larves (l. c.). Au même endroit, il donne aussi une figure d'une de ces larves (pl. II, fig. 9). Quoique bien imparfait, ce dessin suffit pour nous convaincre que l'auteur avait bien une larve d'*Arthrocnodax* Rbs. sous les yeux. Un peu plus tard, en 1888, Targioni-Tozzetti obtint une espèce des phytoptocécidies des bourgeons de *Corylus avellana*, et la décrivit sous le nom de *Diplosis coryli-gallarum*, en faisant remarquer que la forme des antennes et la nervation alaire indiquaient un genre nouveau. Plus récemment, elles ont été observées en grand nombre dans diverses phytoptocécidies. — Quant à leur genre de vie, j'ai indiqué en janvier 1895 [290, p. 13] qu'elles se nourrissent des Acarides contenus dans ces galles, et j'ai donné au même endroit la première description détaillée d'une de ces larves. Les anciens auteurs les considéraient comme simples commensaux des Phytoptides. Toutefois Winnertz remarque [816, p. 196] : « J'ai observé plusieurs fois que les larves de *Diplosis peregrina* léchaient avec avidité les Acarides, mais jamais je n'ai trouvé dans une galle qu'elles habitaient la dépouille d'un Acaride. Il reste encore à découvrir si ces larves vivent des excréments des Acarides ou bien si elles partagent leur nourriture ».

Je communique ici une observation que j'ai faite au mois d'août 1894.

Sur la face inférieure des feuilles d'un Orme pleureur, j'avais remarqué de très petits vers rouges, immobiles, généralement fixés à l'angle formé par deux nervures, rarement éloignés de toute nervure. J'emportai alors plusieurs de ces feuilles afin de pouvoir observer à loisir. A l'aide de la loupe, je pus découvrir des Acarides à corps trapu (Phytoptides?), vivant sur le dessous de ces feuilles sans que leur présence fût trahie sur le dessus par une déformation ou par une décoloration. La plupart des larves de Cécidomyies paraissaient être au repos; quel-

ques-unes cependant, immobiles comme les autres, avaient devant la partie effilée de leur corps, c'est-à-dire à l'extrémité de leur tête, un minime corpuscule immobile qui semblait leur servir de nourriture. Enfin j'eus la bonne chance de voir une larve se mettre en quête d'une proie. Elle se mouvait lentement, tournant la tête à chaque fois qu'elle avançait, de droite et de gauche, comme pour sonder les alentours; parfois elle passait à côté d'un des Acarides, une fois même par-dessus, enfin je la vis s'arrêter : sa tête venait de heurter un Acaride; celui-ci ne parut pas s'en inquiéter; je crus distinguer qu'il fut jeté sur le côté et qu'il replia son corps en arc de façon à appuyer ses deux extrémités contre la tête de son agresseur. Je n'avais malheureusement pas de microscope à ma disposition, de sorte que mon observation ne put être complète. L'examen à la loupe me fit voir un certain nombre de dépouilles d'Acarides, preuves irrécusables de la voracité de ces larves. Le genre *Lestodiplosis* comprend également, selon M. Rübsaamen, une espèce acarivore, à savoir *L. tarsonemi* Rbs. qui se nourrit de *Tarsonemus* sp.?

3° *Larves diptérophages*. Les espèces dont il est question ici forment le genre *Lestodiplosis* Kieff. Leurs larves, munies de Pseudopodes, ont été décrites déjà par Bouché [43, p. 25] et Perris [576, p. 170], mais ces deux auteurs n'ont pas connu leur genre de vie. En 1891 [623, p. 6-7], Rübsaamen décrivait une larve de *Lestodiplosis*, en ajoutant qu'il l'avait trouvée dans une galle de *Galium*, dont l'auteur, c'est-à-dire « la larve de *Cecidomyia galii*, était morte dans la cécidie. Elle était molle encore, mais desséchée, et paraissait avoir été abandonnée par un parasite. N'ayant pas trouvé de larve d'Hyménoptère dans cette galle, je crois pouvoir admettre que la larve que je viens de décrire vivait comme parasite à l'intérieur de celle de *Cecidomyia galii* ». Une observation que j'avais faite antérieurement sur une larve semblable, contredisait l'observation de M. Rübsaamen; je la fis paraître dans les termes suivants, dans le courant de la même année [273, p. 265] : « J'ai observé, l'automne dernier, sous une écorce de Hêtre, un certain nombre de larves blanches d'*Epidosis* (1), qui étaient presque mortes ou fanées. Parmi elles se trouvaient trois larves rouges et vivantes, dont l'une était fixée, immobile, à une larve d'*Epidosis* et semblait la sucer. J'ai donc supposé que ces larves rouges étaient parasites des larves blanches et vivaient non point dans le corps de leur hôte, mais en dehors, le suçant comme le font les larves des Torymides ». J'ai eu, depuis cette époque, souvent oc-

1. C'est-à-dire *Camptomyia* Kieff., genre que j'ai plus tard détaché d'*Epidosis* H. Lw.

casion de constater que les larves de *Lestodiplosis* sont ectoparasites de larves d'autres Cécidomyies; j'ai même observé qu'elles le sont encore même quand ces dernières se sont déjà recouvertes de leur cocon pour se métamorphoser. Sous l'écorce d'une branche morte se trouvaient des larves de *Rübsaamenia* Kieff. dont plusieurs s'étaient déjà enveloppées de leur cocon. En déchirant un de ceux-ci, je fus fort étonné d'y trouver deux larves accolées l'une à l'autre, l'une, d'un jaune sale, était celle du propriétaire légitime, l'autre, d'un rouge sang, était celle d'un *Lestodiplosis*; comme les larves étaient encore vivantes toutes deux, j'en conclus que l'invasion devait être récente.

L'observation suivante me fit voir que les larves des *Lestodiplosis* attaquent encore les nymphes des Cécidomyies. J'avais recueilli un certain nombre de galles de *Rhopalomyia tanaceticola* Karsch, dans l'espoir d'y trouver la larve que je voulais soumettre à l'étude; mais je ne pus y trouver que des nymphes, dont plusieurs étaient desséchées, sans qu'il y eût trace de la cause de cette dessiccation, tandis que d'autres qui paraissaient seulement un peu froncées, portaient sur elles la larve d'un *Lestodiplosis* qui les suçait.

Ces prédateurs ne s'attaqueraient-ils pas aussi à des larves d'autres petits Diptères ou de Coléoptères? Cela me paraît probable, car j'ai observé leurs larves sous l'écorce de branches mortes et tombées à terre, plusieurs fois parmi les larves de *Cryphalus fagi*, d'autres fois parmi celles de Sciarines, sans qu'il me fût possible d'y voir une autre larve de Cécidomyie, qui aurait pu leur servir de proie, mais aussi sans qu'il me fût possible de prouver autrement que les larves de *Lestodiplosis* s'étaient attaquées à celles des petits Coléoptères ou des Sciarines, sinon par le fait que certaines larves de ces derniers étaient mortes et desséchées.

B. Larves coprophiles ⁽¹⁾.

On trouve fréquemment des larves de Cécidomyies parmi les déjections d'autres larves. Perris en parle le premier dans sa description de *Lestodiplosis entomophila*, de la façon suivante [575, p. 274-276] :

« En ouvrant mes boîtes d'insectes, il m'était arrivé fort souvent de voir voler avec agilité, à travers la forêt d'épingles fixées sur le liège,

(1) J'ignore ce qu'il faut penser de l'observation de Bouché, d'après laquelle les larves de *Cecid. bicolor* Meig. vivraient pendant l'hiver dans de la bouse de vache entrant en décomposition et s'y métamorphoseraient au printemps suivant [43, p. 25].

un Diptère presque microscopique, dont la présence en ces lieux m'avait surpris plus d'une fois... Rien n'indiquait dans les allures de ce petit insecte qu'il eût été enfermé malgré lui, car quoique sa prison fut grande ouverte, il ne manifestait aucun empressement à la quitter. M'étant emparé de plusieurs de ces petits Diptères, je reconnus en eux les deux sexes d'une espèce de Cécidomyie qu'après étude je considèrerai comme nouvelle... Le hasard m'ayant mis à même de connaître son histoire, je me décide à la publier.

« Tous les entomologistes savent qu'un maudit *Acarus* s'introduit et pullule souvent dans les collections, où il ronge les poils, le duvet des insectes et même leurs tendons. Comme j'observais, un jour de novembre, à la loupe, un *Onthophagus* sur lequel ce détestable aptère avait déposé ses excréments et laissé des dépouilles, je vis ramper au milieu de ces impuretés trois larves blanches qui, soumises au microscope, offrirent à mes yeux tous les caractères des larves de Cécidomyies. Il ne m'en fallut pas davantage pour expliquer la présence dans mes boîtes du Diptère dont j'ai parlé plus haut.

« Je savais depuis longtemps que les larves de Cécidomyies ne se développent pas toujours dans des galles, car j'en ai trouvé bien souvent sous les écorces des arbres et dans les tiges creuses de plusieurs plantes mortes ou sur le déclin... Je me mis à explorer mes boîtes et à chercher d'autres insectes sur lesquels les *Acarus* eussent laissé des traces, et j'observai sur quelques-uns des larves semblables. Je plaçai ces insectes, ainsi que l'*Onthophagus*, dans une petite boîte, et aux mois de mai et de juin j'obtins plusieurs Cécidomyies ». Ce qu'il y a de remarquable dans cette description, c'est que la larve de *Coprodiplosis entomophila* Perr. est blanche; toutes celles que j'ai observées jusqu'ici étaient rouges, comme celles de *Lestodiplosis*, dont du reste les *Coprodiplosis* ne forment qu'un sous-genre.

Les larves que j'ai observées le plus fréquemment dans les déjections des insectes, surtout dans celles des grosses larves de Tipulides qu'on trouve fréquemment dans le bois pourri, appartenaient aux Lestrémines, *Lestodiplosis* ou *Clinodiplosis*. Les larves de *Clinodiplosis coriscii* Kieff. vivaient parmi les excréments que contenaient les mines abandonnées, produites sur les feuilles de Chêne par la chenille de *Coriscium Brongniardellum*. D'autre part, j'ai reçu par l'entremise de J. Mik un *Clinodiplosis* dont la larve vivait dans le sac d'une chenille de *Psyche helix*, en même temps que la chenille; j'ai pensé qu'elle vivait peut-être des déjections de cette dernière, mais le lépidoptérologiste Hoffmann, qui l'avait obtenue, me fit savoir que les sacs des Psychides ne renfermaient point de déjections. Quel rapport la larve de Cécido-

myie avait-elle alors avec la chenille? Je l'ignore. Howard cite un cas semblable.

C. Larves phytophages.

La plupart des larves de Cécidomyies rentrent dans cette catégorie. Les unes provoquent sur leurs plantes nourricières des cécidies dans lesquelles elles vivent, les autres sont gallicoles, mais non cécidogènes; d'autres enfin ne produisent pas de déformation et ne vivent pas non plus dans une cécidie.

I. LARVES PHYTOPHAGES NON CÉCIDOGÈNES NI GALICOLLES. — Les unes vivent sur des plantes phanérogames, les autres sur des cryptogames.

1° Sur Phanérogames. Toutes les parties d'une plante peuvent héberger et nourrir des larves de Cécidomyies, sans qu'il y ait production de galle. Nous distinguons donc celles-ci de la façon suivante.

A. Larves floricoles. Beaucoup d'espèces vivent dans les épillets des Graminées. On connaît jusqu'à présent les suivantes : *Contarinia tritici* Kirb. et *Clinodiplosis mosellana* Géh. (*aurantiaca* Wagn.), sur le Blé, le Seigle et l'Orge; *Contarinia brizae* Kieff., sur *Briza media*; *Contarinia dactylidis* H. Lw., sur *Dactylis glomerata*; *Contarinia avenae* Kieff., sur *Avena pubescens* L.; *Contarinia arrhenatheri* Kieff., sur *Arrhenatherum elatius* Koch; *Stenodiplosis geniculati* Reut., sur *Alopecurus geniculatus*; *Oligotrophus alopecuri* Reut., sur *Alopecurus pratensis*; et *Perrisia airae* Kieff., sur *Aira flexuosa*. Curtis observa aussi une espèce sur *Alopecurus agrestis*. Bien que ces espèces ne produisent pas de galles, elles occasionnent cependant la chlorose des épillets et une atrophie de l'ovaire sur lequel elles sucent. D'après mes observations, je ne puis admettre qu'elles se nourrissent aussi de pollen, comme le disent les auteurs du « Synopsis » [22, p. 79]. Avec les Graminées, ce sont les fleurs des Composées qui nourrissent le plus fréquemment des larves de Cécidomyies. Perris [577, p. 69] signale de ces larves orangées dans les capitules d'*Achillea millefolium*, *Cirsium arvense*, *Crepis virens*, *Hypochaeris radicata* et *Leucanthemum vulgare*.

J'ai signalé les larves de *Clinodiplosis cilicrus* Kieff. dans les capitules de *Centaurea jacea* et *scabiosa*, de *Carduus nutans*, de *Cirsium arvense*, et de *Carlina vulgaris*; de *Clinodiplosis* sp. dans les fleurs de *Solidago virga aurea* et de *Tanacetum vulgare* [323, p. 37-38]; de *Perrisia compositarum* dans les capitules de *Hieracium murorum*, *pilosella* et *umbellatum* et d'*Hypochaeris radicata*; dans cette dernière fleur vit aussi *Contarinia nubilipennis* Kieff. et *hypochaeridis* Rbs. D'après les obser-

vations de Rübsaamen et les miennes, les larves de *Perrisia cirsii* Rbs. vivent dans les calathides de *Cirsium* et de *Carduus*; de *Perrisia crinita* dans les calathides de *Senecio silvatica* et *jacobaea*; de *Macrolabis achilleae* Rbs. dans celles d'*Achillea millefolium*; de *Rhopalomyia Magnusi* Rbs. dans celles d'*Artemisia vulgaris* et *campestris*; de *Clinodiplosis rosiperda* Rbs. dans celles des Rosiers. La larve d'un *Perrisia* n. sp. vit dans les fleurs d'*Aquilegia vulgaris*, sans les déformer, d'après le témoignage de M. Paul de Peyerimhoff; celle de *Perrisia riparia* Winn. vit de même dans les fleurs de *Carex riparia*.

B. Larves fructicoles. Diverses sortes de fruits nourrissent encore de ces larves, sans subir de déformation. Les cônes de l'Épicea et du Sapin nourrissent les larves de *Perrisia strobis* Winn. et de *Clinodiplosis strobis* Kieff. Les baies de *Polygonum multiflorum* renferment des larves d'une espèce encore inconnue, selon Mik [501, p. 311-316]; celles de la Pomme-de-terre, contiennent les larves d'*Asphondylia punica* March. La capsule du Coquelicot héberge celles de *Perrisia papaveris* Winn. J'ai observé des larves blanches de *Clinodiplosis* sur les fruits de *Stachys silvatica*, et des larves de *Contarinia* sur ceux de *Symphytum officinale*. Certaines espèces vivent dans des gousses ou dans des siliques, tantôt sans y produire d'autre déformation que des taches jaunâtres, tantôt en y provoquant de légères bosselures, de sorte qu'alors elles rentrent dans la catégorie des espèces cécidogènes; telles sont celles de *Contarinia Marchali* Kieff. et de *Clinodiplosis* sp.? dans les fruits de *Fraxinus excelsior*; de *Contarinia pisi* Winn. dans les gousses de *Pisum sativum*; de *Contarinia pulchripes* Kieff. et *Clinodiplosis* sp.? dans celles de *Sarothamnus scoparius* et de *Genista pilosa*; de *Contarinia silvestris* Kieff. dans celles de *Lathyrus silvestris*; de *Contarinia* sp.? dans les siliques de *Sinapis arvensis* et *Brassica rapa*; de *Dasyneura brassicae* Winn. dans les siliques du Colza; de *Contarinia asclepiadis* Gir. dans les fruits d'*Asclepias vincetoxicum*. Fr. Löw observa des larves dans les utricules non déformées d'un *Carex*.

C. Larves caulicoles. Beaucoup d'espèces intéressantes vivent sous les gaines de plantes Monocotylédones, sans y provoquer une déformation. Kaltenbach [248] a observé en 1874, sous les gaines d'*Iris Pseudacorus*, les larves de *Dicerura Kaltenbachii* Rbs. Sous les gaines de *Carex* j'ai observé [323 et 327] celles de *Clinodiplosis caricis* Kieff., *Clinodiplosis* sp. n., *Dasyneura* sp. n. et *Joannisia caricis* Kieff.; et M. Rübsaamen [642 et 642 bis], l'année suivante (1), celles de *Rhizo-*

(1) M. Rübsaamen se montre vraiment comique quand il écrit, le 31 mars 1899

myia circumspinoso Rbs., *Thurauia aquatica* Rbs., et *uliginosa* Rbs. et plus tard encore *Colomyia caricis* Rbs. et *Dasyneura corneola* Rbs. J'ai observé de même (l. c.), sous les gaines de *Scirpus* : *Dasyneura scirpi* Kieff., *Dicerura scirpicola* Kieff., *Wasmanniella aptera* Kieff., *Clinodiplosis* sp. n.; sous celles d'*Eriophorum*, une Lestrémine dont le genre m'est inconnu; sous celles d'*Acorus* une larve rouge de Cécidomyine; sous celles d'*Aira flexuosa*, la larve de *Lasioptera calamagrostidis* Rbs.; tandis que M. Rübsaamen a observé cette dernière antérieurement sous les gaines de *Calamagrostis epigeios*, puis celle d'*Octodiplosis glyceriae* Rbs., sur *Glyceria*; celle d'*Asynapta Thurau* Rbs., sur *Calamagrostis lanceolata* et des larves encore inconnues sur *Phragmites communis*, *Typha latifolia* et *Sparganium* [637].

D'autre part, M. von Moor [520] observa les larves de *Clinodiplosis oculiperda* Rbs. sur l'écusson des greffes, à l'endroit où les deux cambium se touchent, sur le Pêcher, l'Abricotier, le Poirier et le Rosier.

Enfin d'autres larves vivent non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur des tiges. Von Frauenfeld et Giraud observèrent celles de *Lasioptera flexuosa* Winn. à l'intérieur de la tige de *Phragmites communis*. Dans le chaume de *Calamagrostis lanceolata*, *Dactylis glomerata* et *Triticum repens* j'ai observé celles de *Lasioptera graminicola* Kieff.; dans les tiges sèches de *Senecio silvatica* et de *Centaurea jacea* j'ai constaté en hiver la présence de larves d'un *Clinodiplosis*.

D. Larves foliicoles. H. Loew signale des larves de Cécidomyies qui, selon lui, vivraient en liberté sur des feuilles de *Veronica beccabunga* [402, p. 25]. Quoi qu'il en soit de ce cas, nous devons à M. le baron von Osten-Sacken la connaissance d'une larve, *Cecidomyia* (?) *glutinosa* O. S., qui vit dans l'Amérique du Nord, sur les feuilles de *Carya* [550, p. 417]. Un fait analogue a été constaté plus tard pour l'Europe par M. le docteur Fr. Thomas, pour la larve de *Cecidomyia*

[642 bis, p. 58], donc plus d'une année après ma publication, une longue page pour expliquer au lecteur qu'il avait observé des larves sur *Carex* bien longtemps avant ma publication sur ce sujet; puis, renversant les rôles comme il le fait d'ordinaire, il ajoute : « Pendant que je continuais ainsi mes recherches, M. Kieffer, stimulé par moi (sic!), s'est mis aussi à chercher des Cécidomyies sur les *Carex* avec l'ardeur qu'on lui connaît, et il a réussi à obtenir quelques résultats qu'il a publiés dans sa « Synopse des Cécidomyies d'Europe et d'Algérie ». Le pauvre professeur de Berlin est vraiment bien à plaindre! Et pendant qu'il ne néglige aucune occasion de se rendre ridicule, il se lamente et écrit : « M. Kieffer veut me rendre ridicule » (*Entom. Nachr.* Berlin, 1896).

Pseudococcus Rbs., qui vit sous les feuilles de certains Saules et s'y forme une enveloppe avec les poils du limbe [720 bis].

E. Larves lignicoles et corticoles. La plupart des Epidosides, des Lestrémines et des Hétéropézines habitent le bois mort ou l'écorce. J'avais d'abord pensé que ces larves vivaient peut-être de champignons dont le mycelium s'étendrait sous l'écorce ou dans le bois mort ou pourri, mais je me suis convaincu que l'on trouve souvent ces larves là où il n'y a pas trace de champignon. Il faut donc admettre qu'elles vivent du suc qu'elles peuvent tirer du bois mort ou de l'écorce. Le Hêtre et le Chêne hébergent le plus d'espèces; le Charme et le Bouleau en nourrissent peu; les Conifères, le Peuplier, le Saule et les arbres fruitiers n'en renferment que rarement.

Un fait bien remarquable est celui de larves de Cécidomyies vivant dans du bois de Chêne fraîchement coupé et sans trace de décomposition, et cela sans s'y pratiquer de conduit. Cela paraît impossible et pourtant c'est vrai. Je connais cinq espèces qui sont dans ce cas, à savoir *Xylodiplosis praecox* (Winn.) Kieff., *Ledomyia lugens* Kieff., une larve que je crois être celle de *Dicrodiplosis longipes* n. sp., une larve de *Rübsaamenia* sp.? et une espèce dont je ne connais que la dépouille nymphale, trouvée en grand nombre dans les pores du bois; les trois premières se rendent en terre pour se métamorphoser. Prenons la première comme exemple, d'autant plus qu'elle abonde en Lorraine. Winnertz dit de cette espèce : « On la trouve communément, dès les premiers jours de mars, dans les forêts, surtout sur du bois de Chêne fraîchement coupé ». Comme Winnertz, j'ai été frappé de voir cette espèce rechercher exclusivement le bois de Chêne et il me fut bientôt possible d'en découvrir le motif. C'est ainsi que j'ai pu signaler en 1888 [263, p. 245] qu'on « trouve les femelles de cette espèce en grand nombre sur le bois de Chêne fraîchement coupé et empilé, parcourant la surface de section transversale du bois et y enfonçant profondément sa longue tarière dans les minimes pores du bois. A plusieurs reprises j'en vis qui ne parvenaient plus à retirer leur oviducte, de sorte qu'on pouvait les saisir facilement avec les doigts. Bien que cette espèce soit extrêmement commune dans les bois de Bitche, le mâle me demeure encore inconnu comme à Winnertz; je suppose que le mâle n'abandonne pas l'endroit où l'éclosion a eu lieu, tandis que les femelles s'empressent de chercher du bois de Chêne coupé, afin d'y déposer leurs œufs ». J'eus beau revenir souvent à ces tas de bois et examiner soigneusement les pores à la loupe, détacher même des morceaux du bois, je ne pus trouver aucune larve;

il me paraissait du reste impossible qu'une larve adulte pût être logée dans d'aussi étroits vaisseaux. Un jour, vers la fin du mois de mai, après une pluie abondante qui avait duré toute la matinée, passant en forêt près d'un tas de bois, je vis, à ma grande surprise, une foule de larves rouges sortant des pores de ce bois, sur la surface de section transversale de celui-ci, se courbant en arc et s'élançant au loin. L'opération de la sortie était pénible et longue; elle coûta la vie à plus d'une larve; çà et là on en voyait qui dépassaient de la moitié de leur corps la surface du bois et ne pouvaient plus sortir davantage; encore les jours suivants on pouvait voir leur corps desséché, engagé en partie entre les pores. D'autres, après avoir réussi à se dégager, tombaient dans une toile d'araignée, où elles trouvaient également la mort. Celles qui parvinrent heureusement jusqu'à terre se hâtaient de disparaître entre les feuilles et de s'enfoncer dans le sol, où elles demeuraient à une profondeur de un à deux centimètres.

Je recueillis alors un grand nombre de larves que j'emportai; en outre, comme le bois devait être enlevé de la forêt en été ou en automne, je notai exactement l'endroit. L'hiver suivant fut très rigoureux; depuis le 17 février jusqu'à la mi-mars, la neige recouvrit le sol; la température était descendue jusqu'à — 29° C, et, encore au commencement de mars, elle était à — 20°. A partir de la mi-mars le temps fut à la pluie. Le 28 du même mois, également après une pluie d'assez longue durée, je me rendis à l'endroit marqué, et comme les jours précédents, je soulevai les feuilles qui recouvraient le sol. Cette fois je découvris des *Xylodiplosis* fraîchement éclos, d'autres en train d'éclore. Un rayon de soleil suffit pour me faire voir bientôt une foule de mâles prenant leur essor, sans toutefois quitter l'espace assez restreint où les éclosions avaient eu lieu, s'élevant et s'abaissant alternativement, comme pour observer ce qui se passait sur le sol. L'accouplement eut lieu sur les feuilles mêmes, car les femelles dont l'éclosion avait été plus tardive que celle des mâles, s'étaient à peine dégagées de leur dépouille nymphale et ne pouvaient pas encore voler. Dès qu'une femelle fécondée était à même de prendre son essor, elle s'envolait au loin, cherchant du bois de Chêne coupé pendant l'hiver, pour lui confier ses œufs, tandis que les mâles demeuraient à l'endroit même où leur éclosion avait eu lieu. Cela explique comment les anciens auteurs qui se sont occupés de la Cécidomyie du Blé ne trouvaient jamais que des femelles parmi les Céréales.

Des observations répétées m'ont permis de conclure que les larves de *Xylodiplosis* ne pouvaient sortir du bois, qu'après que celui-ci eut été pénétré par la pluie; quand celle-ci se fait attendre, la sortie des

larves est retardée, parfois de tout un mois. La conformation du corps de ces larves, dont les segments sont finement striés transversalement (1), aide à opérer leur sortie au travers de vaisseaux moins larges que ne l'est le corps des larves. M. Paul de Peyerimhoff, me fit le 11 juin 1896, un envoi de larves de *Xylodiplosis* recueillies près de Nancy dans des circonstances analogues. « Les larves rouges, m'écrivait-il, se trouvaient sur les sections transversales des quartiers de Chêne empilés... Il pleuvait à verse et les larves semblaient d'autant plus animées que le milieu était plus humide ».

Les larves des deux autres espèces, que je n'ai observées qu'une seule fois, sortaient de même après une pluie abondante. Pour aucune de ces trois espèces je n'ai réussi à obtenir l'éclosion des exemplaires recueillis et conservés en chambre chauffée.

F. Larves résinivores. Quatre espèces sont à rapporter ici, à savoir *Cecidomyia pini* D. G., *resinicola* O. S., *pini-inopis* O. S. et *pini-rigidulae* Pack. Je ne connais que les deux premières. Jusqu'à présent, les mœurs du seul représentant pour l'Europe, c'est-à-dire de *Cecidomyia pini* D. G. étaient imparfaitement connues. Les divers auteurs qui s'en sont occupés, tels que De Geer, Ratzeburg et Perris, n'ont pas su dire autre chose, sinon qu'on trouve le cocon renfermant soit la larve, soit la nymphe, sur les aiguilles du Pin. Il est pourtant facile de trouver la larve en liberté et dans toutes ses phases, car cet insecte a plusieurs générations par an. Dans les plantations de *Pinus silvestris*, il arrive, pendant plusieurs années consécutives, que l'on fait avec une hachette une entaille au tronc des arbres que les bûcherons devront abattre l'hiver suivant. Par la suite cette entaille, une partie de l'écorce et du bois ayant été enlevée par la hachette, se couvre de résine. C'est sur le bord de cette blessure que la Cécidomyie vient déposer ses œufs. Les larves disparaissent sous la résine durcie, de façon à être en contact avec le bois qui exsude sans cesse de cette résine; plus tard on les voit par transparence au travers de celle-ci, tantôt solitaires, tantôt réunies par groupes de 2 à 6. On peut aussi les trouver plongées dans ou placées sur de la résine encore un peu liquide, sans être recouvertes de résine durcie. Pour la métamorphose, elles se rendent sur les parties avoisinantes de l'écorce; d'autres aussi se forment leur cocon sur la résine même, sans se déplacer. D'après ces observations, il est donc certain que les larves de *Cecidomyia pini* vivent de résine à l'état liquide. Comme les bourgeons, à l'extrémité des rameaux, exsudent toujours

(1) J'en ai donné une description en janvier 1895 [290, p. 15]. Voir aussi pl. 26, fig. 8.

une petite quantité de cette résine, la Cécidomyie y dépose également ses œufs; mais je n'y ai que rarement trouvé plus d'une larve; pour la métamorphose, celle-ci se rend sur une des aiguilles adjacentes ou bien encore elle demeure sur le bourgeon même.

Les trois autres espèces ont été observées dans l'Amérique du Nord, dans de la résine de Pins. Voir page 309 (129).

G. Larves radicales. Je ne connais que deux espèces vivant aux dépens de racines, mais sans y produire une déformation. L'une, *Dicrodiplosis radicola* n. sp., vit à l'état larvaire à l'intérieur des racines de *Ranunculus acer* L.; sans doute que les œufs sont pondus sur les feuilles radicales, au collet de la racine et que les larves pénètrent ensuite dans cette dernière qui finit par périr et se décomposer. Les plantes atteintes se reconnaissent parfois à leur aspect maladif, ce qui a lieu quand les larves sont bien nombreuses et que les racines commencent à se décomposer.

La seconde, *Rhizomyia perplexa* Kieff., vit sur les fines racines de *Carex*; on y trouve ses larves en grande société, appliquées si étroitement à la radicule, que je les avais tout d'abord prises pour des Coccides.

H. Larves vivant de matières végétales décomposées, non ligneuses. Dans des résidus de Betterave, Pagenstecher a observé des larves d'Hétéropézine [368]. Ganin en a recueilli d'un amas composé de débris de fruits et de différentes matières végétales entrant en décomposition. J'ai observé des larves de *Clinodiplosis* et de différentes Lestrémines parmi des feuilles pourries. Quant à *Lestodiplosis fuscicollis* Bouché, dont les larves vivaient dans des bulbes pourris de Tulipe et de Jacinthe, on peut supposer qu'elles y vivaient aux dépens de larves d'autres Diptères, puisque tel est le genre de vie des espèces de *Lestodiplosis* connues.

2° Sur *Cryptogames*. Les larves de Cécidomyies qui vivent aux dépens des Cryptogames, sans y produire une cécidie, se répartissent en mycophages et muscicoles.

A. Larves mycophages. Les unes vivent sur des champignons épiphytes appartenant aux Urédinées, Péronosporées et Ustilaginées; les autres se nourrissent de Mucorinées. On n'a jamais observé de ces larves à l'intérieur des gros champignons, tels que les Agarics et les Bolets (1). Winnertz dit bien qu'il a obtenu d'un *Polyporus* habité par de

(1) Je viens de trouver, non seulement sur la surface, mais encore dans les pores de plusieurs énormes Champignons (*Boletus confuens*), une multitude

nombreuses larves d'autres Diptères, une Cécidomyie qu'il a appelée *Diplosis polypori*, mais cette espèce, que j'ai obtenue également d'un *Pc-lyporus* ligneux, appartient au genre *Lestodiplosis* et vit à l'état larvaire de larves de Mycétophilides. Quant à *Joannisia pumila* Winn., dont Winnertz a obtenu un exemplaire d'un champignon habité par beaucoup d'autres larves de Diptères, je suis dans le droit de supposer qu'il avait les mêmes mœurs que *Joannisia fungicola* Kieff. dont il sera question tout à l'heure, puisque Winnertz ne dit pas si la larve, qui lui est sans doute demeurée inconnue, vivait sur le Champignon, ou à l'intérieur de ce dernier.

Les larves qui vivent d'Urédinées, de Péronosporées et d'Ustilagi-nées, forment le genre *Mycodiplosis* Rbs. C'est à Réaumur que nous devons la première observation sur une larve de Cécidomyie vivant d'Urédinées. « Sous les feuilles du Rosier, écrit-il en traitant des Galles, on voit souvent quantité de bouquets de filets chargés d'une poussière d'un jaune orangé, semblable à celle des feuilles du Tithy-male ⁽¹⁾ dont nous venons de parler. Dans ces petites forêts de poils j'ai presque toujours trouvé de très petits vers sans jambes et jaunes, qui apparemment occasionnent la naissance de toutes ces petites ex-croissances. Dans certaines places j'ai vu les poils chargés de grains noirs; ces grains noirs en sont-ils de jaunes qui ont noirci, ou sont-ils les excréments des vers? Je l'ignore. J'ai trouvé des vers semblables à ceux des galles en moisissure du Rosier dans celles des feuilles de Ronce et de Prunier ».

Winnertz a décrit deux espèces qu'il dit être mycophages et les a nommées *Diplosis caeomatis* et *Diplosis coniophaga*. Il écrit à ce sujet [816, p. 196] : « Les larves ne lèchent pas seulement le suc qui s'écoule des amas de spores, mais elles absorbent aussi avec beaucoup d'avi-dité les spores elles-mêmes et l'on trouve leur tube intestinal tout rempli de ces spores ». Winnertz s'est trompé doublement ici. Comme moi, j'ai observé sur les Urédinées des feuilles du Rosier des larves mycophages rouges, appartenant au genre *Mycodiplosis*; à mon grand étonnement j'en ai obtenu quelques *Lestodiplosis* femelles; observant alors plus attentivement les feuilles du même Rosier, j'y découvris plusieurs larves de *Lestodiplosis* suçant des larves de *Mycodiplosis* aux-quelles elles ressemblaient par la couleur et les dimensions. *Diplosis caeomatis* Winn. appartenant au genre *Lestodiplosis*, j'en conclus que

de larves appartenant à trois espèces différentes de *Diplosariae*, dont l'une est *Mycodiplosis boleti* Kieff. et l'autre *Lestodiplosis* n. sp.

(1) *Euphorbia cyparissias* L.

Winnertz a été induit en erreur et que la larve de cet insecte est zoophage et non pas mycophage. J'ai fait une observation analogue pour des larves mycophages de *Mycodiplosis tremulae* Kieff., servant de victimes à *Lestodiplosis fratricida* Kieff.

Comme Winnertz, Fr. Löw écrit, en 1888, que « les spores d'*Apiosporium pinophilum* Ns. formaient visiblement la masse noire que l'on voyait par transparence dans le tube intestinal de la larve » [423]. Encore tout récemment, en 1899, M. Rübsaamen écrit [642] : « Les larves de *Mycodiplosis* se nourrissent des spores de divers champignons parasites ». Mes observations contredisent celles de ces auteurs ; ici encore toutes les larves que j'ai observées n'avaient absorbé que des sucs. Je n'ai jamais pu trouver de spores dans leur tube intestinal. Ce qui a pu induire en erreur, c'est que l'on trouve, dans le tube digestif de la larve, des globules de la couleur des spores, mais si l'on se donne la peine de comparer ces globules aux véritables spores, dont la larve aura presque toujours quelques-unes sur son corps ⁽¹⁾, on verra de suite la différence. On trouve du reste de ces larves sur des *Erysiphe* stériles, n'ayant pas encore de spores.

On a observé des larves vivant d'Urédinées en Europe, en Amérique et en Australie. Cobb et Olliff les crurent, encore en 1891, identiques à celles de *Mayetiola destructor*, parce qu'ils les avaient observées sur la rouille du Blé ! [67].

Quant aux larves vivant sur les Mucorinées, toutes celles que j'ai observées jusqu'ici sont des Lestrémines. C'est ainsi que j'ai trouvé en grande quantité, les larves de *Joannisia fungicola* Kieff., sur des champignons du genre *Lactarius* entrant en décomposition, mais tous ces champignons étaient recouverts par une Mucorine, de laquelle les larves se nourrissaient [323, p. 48]. Un peu plus tard, M. le docteur Heim m'envoyait quelques larves de la même espèce, recueillies par lui près de Nancy, avec la mention : « larves se nourrissant d'une Mucorine sur *Lactarius piperatus* ». Je trouve de temps à autre sur des Mucorines recouvrant l'écorce des quartiers de bois empilés dans les forêts, des larves de Lestrémine de grande taille, avec une spatule de forme étrange ; mais je n'ai pas encore réussi à obtenir l'insecte parfait. C'est peut-être la même espèce que Vallot a citée en 1849 comme vivant sur *Mucor nireus* Vall. recouvrant du bois empilé.

(1) J'ai remarqué parfois que plusieurs de ces spores étaient hyalines, comme si le contenu en avait été absorbé par la larve. On pourrait, dans ce cas, dire que la larve se nourrit de spores, mais jamais qu'elle absorbe des spores.

B. Larves muscicoles. Bremi avait observé entre les feuilles de *Mnium palustre* une larve de Cécidomyie qu'il prit pour celle de *Cecid. palustris*; il fit ensuite mention de cette Mousse dans son tableau des plantes nourricières des Cécidomyies. H. Loew déclara plus tard que cette plante devait être rayée de la liste des plantes nourricières des Cécidomyies. En effet, le fait isolé d'une larve trouvée sur une Mousse, n'autorise pas encore à dire qu'elle vivait de cette plante. Néanmoins, mes observations publiées en 1895 [293] et continuées depuis ce temps, m'ont convaincu qu'il y a des larves de Cécidomyies qui vivent sur les Mousses et y trouvent leur nourriture. Qu'elles absorbent les sucres de ces plantes ou qu'elles y vivent des animaux microscopiques que celles-ci abritent, je ne saurais le dire. Ce qui est certain, c'est que l'on trouve des larves de Cécidomyies de tout âge, fixées aux tiges des Mousses, ou s'y déplaçant; elles sont donc réellement muscicoles. Si je n'avais fait cette observation que sur des larves adultes, j'aurais pu admettre qu'elles se sont réfugiées entre les Mousses pour s'y métamorphoser; c'est ainsi que l'on trouve fréquemment sous les Pins, les larves de *Thecodiplosis brachyntera* Schw. entre les folioles d'*Hypnum purum*; mais cette hypothèse doit être écartée, dès qu'il s'agit de larves non encore développées, ayant par conséquent encore besoin de se nourrir. Ces espèces appartiennent aux Lestrémines et au groupe des Épidosides, avec des représentants des inévitables genres *Clinodiplosis* et *Lestodiplosis*.

J'ai obtenu une Lestrémine, *Joannisia palustris* Kieff., dont la larve vivait entre le feutrage qui recouvre le dessous de certaines Hépatiques (*Pellia*, *Fegatella*, *Reboulia*), ainsi que parmi des Mousses. D'autres espèces, du groupe des Épidosides, ont été observées parmi des Lichens qui recouvraient le tronc des arbres.

II. LARVES PHYTOPHAGES GALLICOLES MAIS NON CÉCIDOGÈNES. — Bien des espèces sont, à l'état larvaire, gallicoles mais non cécidogènes, c'est-à-dire vivant dans ou sur une galle produite par un autre insecte et se nourrissant de cette galle; ces insectes sont donc commensaux du propriétaire légitime. Quant à ceux qui s'introduisent dans une galle pour y vivre aux dépens du propriétaire, il en a été question quand nous avons parlé des larves zoophages. Quatre sortes de galles doivent être mentionnées ici : celles des Coléoptères, des Cynipides, des Muscides et des Cécidomyies.

1° Pour les galles de Coléoptères, je ne connais qu'un seul exemple; c'est celui qu'indique Walker : cet auteur a trouvé des larves de Cé-

cidomyies dans des galles de *Mecinus collaris* sur *Plantago maritima* [795, p. 451].

2° Quant aux galles de *Cynipides* nourrissant des larves de Cécidomyies, on a observé jusqu'ici les suivantes :

A. Galles d'*Andricus fecundatrix* L. Entre les folioles de cette ex-croissance, vulgairement appelée *rose du Chêne*, vivent et se transforment des larves d'*Arnoldia gemmae* Rbs., comme Giraud l'a déjà remarqué [185, p. 112] et celles d'un *Clinodiplosis* dont je n'ai pas obtenu l'éclosion.

B. Galles de *Biorrhiza pallida* Ol. (*terminalis* Fabr.). On y trouve fréquemment les larves de *Clinodiplosis biorrhizae* Kieff. ainsi que leur parasite *Lestodiplosis* sp.?

C. Galles de *Neuroterus lenticularis* Ol., rarement aussi de *N. leviusculus* Schk. et de *N. fumipennis* Schk., abritant les larves de *Clinodiplosis galliperda* Fr. Löw. Par suite de la succion de ces dernières, la galle prend un tout autre aspect ; sa surface inférieure, au lieu de demeurer plane, devient concave et le dessus prend une forme irrégulière ; la larve du Cynipide périt. Ce fait était déjà connu de Malpighi [435, p. 425], Réaumur le cite en ces termes : « Entre la feuille et la surface un peu concave de la galle, il y avait de petits vers oblongs, de couleur d'ambre jaune, assez semblables par leur figure aux vers des rebords roulés des feuilles du Tilleul. Ils portent devant eux deux petits crochets noirs. Sous telle galle en champignons, il y a une douzaine de ces vers et on n'en trouve que deux ou trois et quelquefois qu'un seul sous d'autres. Au lieu que les autres vers se tiennent dans l'intérieur des galles, ceux-ci se contentent de se placer sous une galle qui leur forme un toit épais et solide, au-dessous duquel ils sont bien à couvert et bien cachés, et c'est apparemment de ce même toit qu'ils tirent leur aliment. Ils sont de ceux qui doivent se métamorphoser en mouches à deux ailes ; ils sont si petits qu'on a peine à les bien voir sans une loupe ; il n'est donc pas étonnant que je n'ai pas eu les mouches dans lesquelles ils se métamorphosent. Lorsque j'ai cherché de ces vers sous leurs galles après la fin de septembre, je n'y en ai plus trouvé ».

D. Dans la cavité supérieure de la galle d'*Andricus grossulariae*, Giraud dit avoir observé plusieurs fois « une petite larve de couleur jaune orangé qui ne nuisait en rien à son propriétaire légitime ; ces larves ont produit, quelque temps après, une petite Cécidomyie. La présence de cette larve sur des galles de Cynipides est un fait que l'on

peut observer chez la plupart des espèces dont la configuration est propre à leur offrir quelque abri » [184, p. 358].

3° On connaît aussi quelques galles de *Muscides*, dans lesquelles on a observé des larves de Cécidomyies. M. le docteur P. Marchal a obtenu des galles d'*Urophora cardui* L. des Cécidomyies ayant les crochets des tarsi simples, les antennes de 2 + 12 articles dans les deux sexes, l'oviducte avec lamelles, comme chez beaucoup de Diplosides, mais le bord alaire couvert d'écaillés et le cubitus n'atteignant pas la pointe alaire; elles seront décrites plus amplement sous le nom de *Marchalia cardui* Kieff.

En Amérique on a obtenu *Lasioptera solidaginis* O. S. de galles de *Trypeta solidaginis* Fitch et *Cecidomyia bigeloviae* Cock. de galles de *Trypeta bigeloviae* Cock. [69].

4° Mais c'est surtout dans les galles des Cécidomyies que l'on trouve fréquemment des larves appartenant à des espèces autres que celle du propriétaire légitime. On admet que ces espèces vivent également du suc de la plante, mais sans pouvoir produire elles-mêmes une cécidie. Dans bien des cas on a peine à distinguer laquelle des deux espèces est l'auteur de la galle. Parfois une même galle peut héberger trois ou quatre sortes différentes de Cécidomyies vivant toutes aux dépens de cette galle. C'est ainsi que dans les cécidies de *Contarinia acetosae* Kieff. j'ai observé, outre les larves du propriétaire, celles de *Perrisia rubicundula* Rbs., d'une Diploside nouvelle, et de *Perrisia* sp. ?; deux d'entre elles avaient déjà été remarquées par M. Rübsaamen. Parfois deux espèces, toutes deux cécidogènes, peuvent se trouver réunies dans une même galle. Tel est le cas pour *Perrisia tortrix* Fr. Lw. et *sodalis* Fr. Lw., que Fr. Löw trouva réunis, en Autriche, tandis qu'en Lorraine je trouve *P. sodalis* seul dans les cécidies du Prunellier. Il en est de même de *Contarinia lonicerearum* Fr. Lw. et de *Schizomyia nigripes* Fr. Lw. Cette dernière espèce a été considérée comme commensale de la première par Fr. Löw, parce qu'il avait trouvé des galles contenant les deux sortes d'insectes et d'autres ne contenant que la première toute seule; or en Lorraine on trouve fréquemment dans les fleurs du Sureau les larves de *Schizomyia nigripes* Fr. Lw., et jamais celles de *Contarinia lonicerearum* Fr. Lw.

III. LARVES PHYTOPHAGES ET CÉCIDOGÈNES. — La plupart des Cécidomyies, comme leur nom l'indique, rentrent dans cette catégorie, et produisent sur les plantes des déformations désignées du nom de cécidies. Par ce terme de « cécidie », ou de « galle » dans le sens large, nous enten-

dons non seulement les « *galles proprement dites* », c'est-à-dire les productions closes de toutes parts, et les « *galloïdes* » ou productions permettant de voir les larves par le simple écartement, le déroulement ou le soulèvement des parties qui les abritent, mais toute déformation d'une plante, produite par la réaction de celle-ci contre l'invasion d'un parasite. Les amas de résine que l'on trouve communément sur les rameaux des Pins et qui renferment une chenille de Lépidoptère, les feuilles minées par des chenilles ou diversement enroulées par des larves de Coléoptères, ne sont donc pas à considérer comme des cécidies, la plante n'ayant été que passive dans ces cas, et n'ayant pas réagi contre l'invasion du parasite. Jetons d'abord un coup d'œil sur les diverses sortes de cécidies produites sur les plantes par les Cécidomyies; nous parlerons ensuite de leur formation. Quant à leur anatomie, il en sera question à la suite de la description morphologique que nous donnerons de chaque espèce en particulier.

1^o *Aperçu des galles produites par les Cécidomyies.* Malpighi disait : « Il n'est point de partie d'une plante qui ne soit susceptible de devenir le siège d'une galle ». Cette parole s'applique tout particulièrement aux galles des Cécidomyies, comme nous allons le voir.

A. Fleurs, inflorescence et pétiole (pl. 39, fig. 7; 40, fig. 7; 36, fig. 7). La forme la plus fréquente qui se rapporte à ce cas est celle d'une fleur demeurant à l'état de bouton, c'est-à-dire ne s'ouvrant pas, apparaissant plus ou moins hypertrophiée, parfois teinte de rouge ou de violet, ordinairement d'une forme sphérique, ovoïdale ou allongée; ovaire et étamines plus ou moins déformés, parfois atrophiés ou nuls. Ces cécidies s'observent le plus fréquemment sur des Crucifères, des Papilionacées, des Silénées, des Ombellifères et des Labiées, moins souvent sur les Balsaminées (*Impatiens noli-tangere*), Rhamnées (*Rhamnus*), Térébinthacées (*Rhus*), Amygdalées (*Prunus*), Rosacées (*Potentilla*, *Rubus*), Pomacées (*Crataegus*), Onagrariées (*Epilobium*), Cucurbitacées (*Bryonia*), Lythrarées (*Lythrum*), Grossulariées (*Ribes*), Saxifragées (*Saxifraga*), Caprifoliacées (*Sambucus*, *Lonicera* et *Viburnum*), Hédéracées (*Hedera*), Rubiacées (*Galium*), Valérianées (*Valeriana*), Dipsacées (*Scabiosa*), Campanulacées (*Phyteuma* et *Campanula*), Oléacées (*Ligustrum*), Asclépiadées (*Vincetoxicum*), Borraginées (*Echium*, *Symphytum* et *Myosotis*), Solanées (*Solanum*), Verbascentes (*Scrophularia* et *Verbascum*), Antirrhinées (*Veronica*), Rhinanthacées (*Rhinanthus*), Primulacées (*Lysimachia*), Polygonées (*Rumex*), Capparidées (*Capparis*), Liliacées (*Lilium* et *Hemerocallis*) et Dioscorées

(*Tamus*). Pour les fleurs des Composées, c'est tantôt tout le capitule qui demeure fermé et paraît renflé, par exemple *Senecio*, *Chrysanthemum*, *Erigeron*, *Centaurea*, tantôt ce n'est qu'un des fleurons qui est déformé, par exemple les galles de *Rhopalomyia tubifex* Bouché et *florum* Kieff. sur *Artemisia*; ou encore une paillette du réceptacle est seule le siège d'une cécidie, par exemple *R. palearum* Kieff., ou une partie quelconque du capitule s'hypertrophie, par exemple *R. hypogaea* H. Lw. sur *Chrysanthemum*.

D'autres fois, c'est une galle de forme particulière qui est produite aux dépens des fleurs : tel est le cas pour les cécidies de *Rhopalomyia tanaceticola* Karsch. sur *Tanacetum*, *R. syngenesiae* H. Lw. sur *Anthemis* et *Chrysanthemum*, *Asphondylia Borzi* D. St. sur *Rhamnus alaternus* (pl. 36, fig. 11), et pour les fleurs d'*Euphorbia* changées en une sorte de capsule.

Les auteurs de ces galles se répartissent dans les genres *Perrisia*, *Dasyneura*, *Schizomyia*, *Arnoldia*, *Contarinia*, *Clinodiplosis*, *Rhopalomyia* et *Asphondylia*.

Les larves appartenant aux deux derniers genres vivent solitaires et se transforment dans la galle; celles des autres genres vivent en société dans la cécidie et se rendent généralement en terre pour y subir leur métamorphose.

Le pédoncule d'une fleur peut offrir un renflement diversement formé, uni- ou pluriloculaire, ce qui est le cas pour la galle de *Contarinia tiliarum* Kieff. (pl. 40, fig. 5). Les Ombellifères offrent fréquemment un renflement au point d'insertion des rayons des ombelles ou des ombellules, plus rarement sur les rayons eux-mêmes; les auteurs de ces déformations appartiennent au genre *Lasioptera*.

Parfois toute l'inflorescence est déformée, et changée tantôt en une galle spongieuse, irrégulièrement arrondie et multiloculaire, ce qui est le cas pour les cécidies de *Dasyneura sisymbrii* Schrk., *Rhopalomyia ptarmicae* Vall. et *Contarinia ruderalis* Kieff. (pl. 35, fig. 3), tantôt en production ressemblant à un fruit de Houblon, comme cela a lieu pour les galles de *Perrisia ericae-scopariae* Duf. (pl. 36, fig. 10), tantôt en une production couverte de feutrage, par exemple chez *Perrisia scabiosae* Kieff.

Sur *Corylus avellana* et *Quercus pubescens*, le chaton est déformé et renflé quand il héberge des larves de *Contarinia*. Sur *Salix purpurea*, les chatons sont également grossis et couverts d'une sorte de laine blanche, quand ils renferment les larves de *Rhabdophaga heterobia* (pl. 34, fig. 12, a; et pl. 40, fig. 3).

B. Fruits. Bien des fruits sont déformés quand ils renferment des larves de Cécidomyies. C'est ainsi que l'on trouve fréquemment, dans les capitules des Composées, des akènes gonflées et renfermant une larve de *Clinorhyncha*.

On trouve de même fréquemment des gousses de Papilionacées, rarement aussi des siliques de Crucifères, gonflées, en entier ou en partie, par des larves d'*Asphondylia*, de *Choristoneura* ou de *Contarinia*. Les fruits de beaucoup d'Ombellifères deviennent gonflés et globuleux quand ils renferment les larves de *Kiefferia*, d'*Asphondylia* et de *Clinodiplosis*. Les graines du Bouleau (pl. 44, fig. 6), et plus faiblement encore les fruits du Frêne, sont déformés par les larves d'*Oligotrophus* ou de *Contarinia*.

Les petites poires, immédiatement après la floraison, paraissent bosselées quand elles hébergent de nombreuses larves de *Contarinia*. Les fruits d'*Euphorbia* et de *Cerastium* peuvent également offrir une déformation due à des Cécidomyies. Enfin les fruits de *Myosotis palustris* sont renflés (pl. 36, fig. 8), et diverses sortes de *Carex* ont leurs utricules agrandies et grossies, quand elles sont habitées par des larves de *Perrisia*.

Dans tous ces cas, la larve vit à l'intérieur du fruit déformé. On connaît d'autre part des déformations de fruits, dues à des *Perrisia*, et où la larve vit à l'extérieur des graines déformées; cela a lieu pour les carpelles de *Pulsatilla* et de *Thalictrum*.

C. Feuilles, pétioles et stipules. Chez les Cynipides, toutes les galles rentrent dans la catégorie des galles proprement dites, c'est-à-dire des productions closes de toutes parts et ne s'ouvrant pas à la maturité. Pour les galles des Cécidomyies, il n'en est pas de même; la plupart d'entre elles sont ouvertes, ou imparfaitement closes, ou déhiscences à la maturité; un petit nombre seulement sont entièrement closes.

a) *Galles entièrement closes.* L'exemple le plus frappant est celui d'*Oligotrophus Reaumurianus* Fr. Lw., dont les cécidies se trouvent sur les feuilles du Tilleul et renferment une galle interne qui tombe à terre à la maturité (pl. 40, fig. 1). Je ne connais pas d'autre exemple d'une galle double et caduque. Quant aux galles simples et closes, elles sont toutes persistantes. Elles consistent tantôt en une production en cône allongé, par exemple celles d'*Asphondylia rosmarini* Kieff. sur les feuilles du Romarin, tantôt en une hypertrophie du pétiole ou de la nervure; pour celles de *Rhabdophaga salicis* D.G. et de *Lasioptera eryngii*, quand elles se trouvent sur les nervures ou sur le pétiole, cette hyper-

trophie est très forte et la cécidie est subligneuse ; pour celles de *Conlarinia tiliarum* Kieff., il en est encore de même, mais elles sont molles et se dessèchent après la sortie des larves ; pour les autres, l'hypertrophie est moins apparente : telles sont la cécidie de *Massalongia rubra* Kieff., sur les nervures des feuilles de *Betula*, celle de *Perrisia* n. sp., sur les feuilles d'*Achillea Millefolium*, celles de *Rhabdophaga nervorum* Kieff., sur les feuilles de divers Saules, ainsi que celle du pétiole d'*Acer campestre*. D'autres espèces produisent, sur le limbe des feuilles, des renflements de forme irrégulière, par exemple *Rhopalomyia hypogaei* Fr. Lw. sur *Chrysanthemum leucanthemum*.

Les feuilles de la Vigne, celles de diverses Composées, celles de *Buxus*, *Olea*, *Phillyrea*, *Atriplex*, *Centaurea*, *Acer*, *Quercus*, *Tilia*, *Corylus*, *Betula*, *Fagus*, *Fraxinus* et *Ulmus* offrent des exemples de galles du parenchyme ; la larve est logée dans le parenchyme qui subit une déformation et une multiplication de cellules. Extérieurement, c'est-à-dire sur les deux faces de la feuille, on ne remarque d'ordinaire qu'une tache circulaire jaunâtre ou rougeâtre, de quelques millimètres de diamètre, faiblement convexe ou parfois convexe sur une face et concave sur l'autre. Les Cécidomyies qui produisent ces galles appartiennent aux genres *Stefaniella*, *Perrisia*, *Cystiphora*, *Oligotrophus* et à divers Diplosides (pl. 39, fig. 8).

Une déformation assez semblable aux précédentes est la cécidie vitrée d'*Acer pseudoplatanus* et *opulifolium*. Elle se manifeste extérieurement par une tache à pourtour plus ou moins arrondi, d'un diamètre de 4 à 7 mill., de couleur d'abord à peine différente de celle du limbe, à l'exception du centre qui est d'un vert jaunâtre sur le dessus et blanchâtre en dessous ; plus tard, en juillet, elles brunissent et se dessèchent. Comme les galles du parenchyme, elle dépasse à peine la surface du limbe, et la loge larvaire est située dans le tissu foliaire, mais ce qui distingue cette espèce, c'est une membrane vitrée et convexe située à sa face inférieure, à l'endroit où elle offre la plus grande épaisseur, c'est-à-dire au centre. Cette membrane, produite peut-être par la larve, a un diamètre de 0,16 à 0,22 mill. et paraît tantôt hyaline (sur *A. pseudoplatanus*), tantôt brune (sur *A. opulifolium*) ; dans le premier cas, elle montre à sa surface 33 ou 40 corpuscules de forme ellipsoïdale et ayant tous le grand axe tourné du même côté [728].

Une autre forme de galles closes et fixées aux feuilles de *Carex*, est due à des insectes des genres *Hormomyia* et *Pseudohormomyia*, et offre l'apparence de grains de Blé (pl. 43, fig. 1-3).

(b) *Galles non entièrement closes ou déhiscentes à la maturité.* Les unes forment une production distincte de l'organe qui leur sert de support et auquel elles paraissent comme insérées, les autres consistent en une déformation du limbe sans former une production distincte de lui.

Pour celles qui forment une production distincte du limbe, plusieurs cas peuvent se présenter : ou bien ces galles sont munies d'un opercule qui tombe à la maturité, ou bien elles se détachent elles-mêmes à la maturité, ou enfin elles s'ouvrent à la maturité sans qu'aucune de ses parties se détache de la feuille.

Le premier cas, c'est-à-dire celui des galles munies d'un opercule situé à la face opposée du limbe et se détachant à la maturité, ne se présente que sur les Chênes. La forme de ces cécidies est variée : tantôt longuement cylindrique, tantôt hémisphérique ou subconique, tantôt à peine convexe ; toutes sont produites par des insectes du genre *Arnoldia* (pl. 38, fig. 1, 2 et 10).

Quant au second cas (pl. 42, fig. 5-7), nous avons deux exemples bien connus, à savoir, deux galles du Hêtre, situées sur une des faces de la feuille, tandis qu'à l'autre face leur présence ne se manifeste que par une sorte de disque. Entièrement closes quand elles sont fixées à la feuille, elles se détachent à leur maturité, et ont alors une ouverture circulaire à l'endroit où fut leur point d'attache ; chez *Mikiola fagi* Hart., elles sont glabres, dures et presque ligneuses ; chez *Majetiola annulipes* Hart., elles sont molles et feutrées. Les galles coniques et velues des feuilles de *Glechoma* diffèrent des deux précédentes par une ouverture fermée par des poils et située à leur base ; après leur chute, la feuille paraît trouée (pl. 42, fig. 6).

La plupart des espèces rentrent dans le troisième cas, étant persistantes et munies d'une ouverture qui devient plus ou moins béante à la maturité. Nous distinguons de nouveau deux catégories, selon que cette ouverture se présente sous forme d'orifice circulaire, ou de fente plus ou moins allongée.

Les galles dont l'ouverture est en forme d'orifice plus ou moins circulaire, sont tantôt fixées à une face de la feuille, avec l'ouverture à leur sommet, par exemple sur *Artemisia*, *Achillea*, *Tanacetum* ; ou bien avec l'ouverture à la face opposée, et alors leur forme est corniculée, par exemple les galles de *Contarinia subulifex* Kieff. sur *Quercus Cerris*, ou bien globuleuse, par exemple celles de plusieurs *Harmandia* sur *Populus Tremula*, ou bien en disque, par exemple celle de *Dryomyia cinnans* Gir. sur le Chêne ; tantôt elles sont visibles sur les deux surfaces de la feuille, soit en faisant saillie d'une façon égale sur le dessus et le des-

sous du limbe, par exemple les galles de *Lasioptera populnea* Wachtl, soit en dépassant un côté de la feuille sous forme d'hémisphère et l'autre côté sous forme de cône ou de cylindre, ce qui a lieu pour des galles d'*Oligotrophus* sur *Cornus*, *Acer tartaricum*, *Spiraea*, *Salix*, *Ulmus* (pl. 35, fig. 8; 41, fig. 7; 42, fig. 8). Quand l'ouverture d'une galle se présente sous forme de fente allongée, nous nous trouvons en présence d'une galle en bourse. Leur forme est généralement plus longue que large, tantôt fortement comprimée en crête de coq, par exemple chez *Dryomyia cocciferæ* March., tantôt à peine comprimée, ce qui est le cas pour *Dryomyia Lichtensteini* Fr. Lw. et *Harmandia cristata* Kieff. Pour celles de *Putoniella marsupialis* Fr. Lw. sur *Prunus*, de *Perrisia frazzini* Kieff. et *carpini* Fr. Lw., elles sont formées aux dépens de la nervure médiane, rarement d'une nervure latérale, tandis que chez *Perrisia urticae* Perr., elles sont formées tantôt aux dépens d'une nervure, tantôt aux dépens du limbe (pl. 40, fig. 6; 41, fig. 7).

Bien souvent la cécidie ne forme pas une production distincte du limbe, mais consiste en une déformation de toute la feuille ou d'une partie de la feuille. C'est ici qu'il faut rapporter la déformation des aiguilles de *Pinus* quand leur gaine renferme la larve de *Thecodiplosis brachyntera* Schw. Outre cet exemple, on peut distinguer cinq formes différentes, qui sont l'élévation, le reploiement, la crispation, le plissement et l'enroulement ; toutes ces formes sont accompagnées d'hypertrophie, et souvent de décoloration ou de pilosité anormale.

ÉLÉVATION. Cette déformation est produite par une larve qui vit solitaire à la face inférieure de la feuille. La succion de cette larve provoque à la face supérieure une élévation ou bosselure, d'un diamètre de quelques millimètres, à contour circulaire et accompagnée d'une faible hypertrophie et de décoloration ; à l'endroit où se trouve l'insert, correspond une concavité. On a observé ces déformations sur *Corylus*, *Acer* (pl. 39, fig. 6), *Spiraea*, *Heracleum*. Les auteurs appartiennent aux genres *Perrisia*, *Oligotrophus* et au groupe des Diplosides.

REPLOIEMENT (pl. 38, fig. 41). Il peut avoir lieu de plusieurs façons. Parfois une petite partie du limbe est repliée par en haut ou par en bas, avec une faible hypertrophie et une décoloration. Les galles de *Macrodiplosis dryobia* Fr. Lw., sur *Quercus*, et de *Perrisia pteridicola* Kieff., sur *Pteris*, nous en fournissent des exemples. D'autres fois tout le limbe participe à ce reploiement : la nervure médiane forme charnière ; de chaque côté d'elle, une moitié de limbe parait

relevée jusqu'à sa rencontre avec l'autre moitié, de sorte que toutes deux se touchent ainsi par leurs bords, avec une hypertrophie plus ou moins grande, et une coloration rouge, jaune ou vert pâle; en réalité, la feuille est restée pliée comme elle l'était, alors qu'elle se trouvait encore renfermée dans le bourgeon. A cause de leur ressemblance avec les gousses des Papilionacées, ces sortes de déformations seront désignées ici du nom de *galles en gousse*. Les *Papilionacées*, ainsi que le Rosier, le Frêne et le Sorbier des oiseaux, sont souvent déformées ainsi; dans tous ces cas, c'est la foliole d'une feuille composée qui est ainsi repliée. Les jeunes feuilles de *Betula*, *Alnus*, *Quercus* peuvent aussi offrir à leur base un repliement, mais accompagné de vésicules entre les nervures latérales et n'ayant plus l'apparence d'une gousse. Tous les repliements sont provoqués par des *Perrisia*, des *Macrolabis* et des *Contarinia*.

CRISPATION. Plusieurs insectes appartenant aux genres *Perrisia*, *Macrolabis* et *Contarinia* produisent sur les feuilles, une crispation accompagnée souvent d'un plissement irrégulier. On peut observer ces déformations sur *Rubus*, *Ribes*, *Acer*, *Quercus*, *Carpinus*, *Sorbus*, *Tilia*, *Lamium*, *Symphytum*, *Aquilegia*, *Urtica*, *Spiraea* et diverses Ombellifères (pl. 35, fig. 4).

PLISSEMENT. Cette déformation consiste en ce que la partie du limbe qui est située entre deux nervures latérales, est plissée par en haut ou par en bas, parallèlement à ces nervures; ces plis sont toujours hypertrophiés et souvent décolorés; ils sont provoqués par des *Perrisia* et des *Contarinia*. On les a observés sur *Fagus*, *Carpinus*, *Acer*, *Sorbus*, *Sanguisorba*.

ENROULEMENT (pl. 38, fig. 42). Des enroulements marginaux du limbe, avec hypertrophie, sont dus à des Hémiptères, à des Hyménoptères, à des Phytoptides et à des Cécidomyies. Les enroulements que produisent ces dernières se distinguent, de ceux des Hémiptères et des Hyménoptères, par leur forme moins lâche et plus étroite, mais ils sont plus lâches et moins étroits que ceux des Phytoptides. Ils se distinguent en outre de ces derniers par leur épiderme non ridé, comme cela a lieu pour les Phytoptocécidies.

L'enroulement d'une feuille est tantôt seulement marginal, tantôt il occupe tout le limbe. Ce dernier cas est le moins fréquent et se présente de nouveau sous deux formes: tantôt il a lieu de telle façon que la feuille offre l'aspect d'un cylindre, par exemple la cécidie de *Perrisia Schlechtendali* Kieff. sur *Orobus*; tantôt chaque moitié du limbe d'une feuille ou d'une stipule est enroulée depuis le bord jusqu'à la

nervure médiane et la feuille, ainsi déformée, a l'apparence d'un coquillage du genre *Cypræa*; telle est la déformation produite par *Cecidomyia Bellevoei* Kieff. sur *Lathyrus pratensis*.

L'enroulement marginal et partiel, soit involutif, soit révolutif, est le plus fréquent; on l'a observé sur *Quercus*, *Populus*, *Tilia*, *Salix*, *Pirus*, *Lonicera*, *Vaccinium*, *Epilobium*, *Viola*, *Solidago*, *Hieracium*, *Hypericum*, *Viscaria*, diverses Papilionacées et *Pteris*. Les auteurs des enroulements se rapportent aux genres *Perrisia*, *Macrolabis* et *Contarinia*.

D. Vrilles et coussinets. On ne connaît qu'une galle formée aux dépens d'une vrille, c'est le renflement des vrilles de la Vigne, signalé déjà par Malpighi, et renfermant une larve de Cécidomyie.

Plusieurs larves pénètrent dans le coussinet d'une feuille et y provoquent un renflement peu apparent, qui s'étend aussi aux parties avoisinantes du rameau. Tel est le cas pour les galles de *Rhabdophaga pulvini* Kieff. sur les Saules, et de plusieurs autres espèces sur *Abies* et sur diverses crucifères (pl. 34, fig. 7).

E. Pousses et bourgeons. Les pousses, tant axillaires que terminales, subissent diverses déformations sous l'influence de larves de Cécidomyies appartenant aux genres *Perrisia*, *Dasyneura*, *Macrolabis*, *Oligotrophus*, *Rhopalomyia* et *Contarinia*. Outre les cas où ces déformations n'ont pas une forme régulière, par exemple sur *Lotus*, *Viola*, etc., nous pouvons distinguer les formes suivantes.

GALLES EN TOUFFE (pl. 37, fig. 7). Cette forme affecte de préférence les pousses terminales d'une tige ou d'un rameau. A cet endroit l'axe de la plante a cessé de croître en longueur, mais s'est étendu en épaisseur; par suite du raccourcissement des espaces internodaux, les feuilles sont agglomérées, généralement agrandies et élargies, parfois diversement colorées; elles sont dressées, et forment ainsi une touffe au fond de laquelle vivent les larves. Ces déformations ont été observées sur *Stachys recta*, *Campanula*, *Euphorbia*, *Origanum*, *Linaria*, *Linum*, *Lithospermum*, *Genista*, *Hieracium*, *Senecio*, *Ballota*, *Stellaria holostea*, *Thymus*, *Cerastium*, *Erica*, *Galium*, *Daphne*, *Prunus*, *Juniperus*, *Taxus* et *Salix*. Parfois ces feuilles dressées se recouvrent mutuellement et forment une production fusiforme; citons comme exemple la galle de *Perrisia terminalis* H. Lw. (pl. 40, fig. 8).

GALLES EN TÊTE (pl. 37, fig. 8). Ici encore nous trouvons une agglomération de feuilles déformées, à l'extrémité d'une tige, d'un rameau, ou à l'endroit d'une pousse axillaire ou souterraine, mais ces

feuilles ne sont plus dressées, comme dans le cas précédent; elles sont, au contraire, incurvées, concaves, se recouvrant l'une l'autre, imitant ainsi une tête de chou. Cette forme s'observe sur *Euphorbia*, *Artemisia*, *Achillea*, *Hieracium*, *Pieris*, *Conyza*, *Scabiosa*, *Hypericum*, *Galeobdolon*, *Lamium*, *Helianthemum*, *Bryonia*, *Galium*, *Lychnis*, *Thymus*, *Erica* et *Salix*. Pour plusieurs espèces cette déformation est accompagnée d'une production anormale de poils formant feutrage.

Parfois les feuilles qui sont recourbées et se recouvrent mutuellement ne sont plus à distinguer les unes des autres et forment une masse unique et spongieuse, au centre de laquelle les larves sont renfermées. L'exemple le plus connu est celui de la cécidie de *Rhopalomyia ptarmicæ* Vall. sur *Achillea ptarmica*. On a observé encore de ces cécidies spongieuses sur *Asperula*, *Erigeron*, *Thalictrum*.

GALLES EN ROSETTE (pl. 34, fig. 2). Cette forme ne diffère des deux précédentes que par ses feuilles étalées en une rosette au centre de laquelle vivent les larves, soit en société, soit solitaires. L'exemple le plus connu est celui de la cécidie formée par *Rhabdophaga rosaria* H. Lw. sur les Saules et vulgairement désigné du nom de *rose du Saule*. D'autres exemples sont les galles de *Rhabdophaga rosariella* Kieff. également sur le Saule, et les rosettes de *Crataegus*, *Galium*, *Thymus*, *Atriplex*, *Erica*.

GALLES EN CÔNE DE PIN (pl. 34, fig. 4). Ces productions ressemblent aux galles en rosette, dont elles ne diffèrent que par un seul point : l'axe de la plante a continué à croître en longueur, mais pas autant qu'à l'état normal; les feuilles déformées sont donc rapprochées les unes des autres, mais elles n'ont plus un même disque comme point d'insertion; il en résulte donc une déformation qui n'a plus l'aspect d'une rosette, mais d'un fruit de Houblon ou d'un cône de Pin. Tel est le cas pour la cécidie de *Cecidomyia mediterranea* Fr. Lw. sur *Erica*, de *Perrisia aparines* Kieff. sur *Galium Aparine*, et de *Rhabdophaga rosaria* sur divers *Salix*.

GALLES DE FEUILLES ACCOLÉES. Dans les quatre exemples précédents, la cécidie se compose de nombreuses feuilles. Ici au contraire elle n'est formée que par deux ou quatre feuilles déformées, qui sont dressées ou incurvées, mais disposées toujours de telle façon qu'elles se touchent par leurs bords et forment ainsi une cavité interne occupée par les larves et par la pousse atrophiée. Cette forme est fréquente : on la connaît de *Veronica*, *Senecio*, *Stellaria*, *Glechoma*, *Teucrium chamaedrys*, *Brunella*, *Thymus*, *Hypericum*, *Cerastium*, *Juniperus*, *Stachys*, *Medicago*, *Trifolium*, *Bupleurum*; parfois, par exemple sur *Salicaria*

Sarothamnus, *Achillea*, *Tanacetum*, les feuilles sont soudées ensemble en forme de tube (pl. 36, fig. 5).

BOURGEONS GROSSIS. Cette déformation est peu fréquente : le bourgeon paraît grossi et agrandi, mais conserve sa forme quant au reste; après la sortie des larves, il se dessèche ordinairement. Citons, comme exemples, des cécidies de *Quercus*, *Carpinus* et *Larix* dues à des insectes des genres *Perrisia*, *Arnoldia* et *Contarinia* (pl. 43, fig. 8).

GALLES ENTIÈREMENT CLOSES. On trouve sur l'Euphorbe, à l'extrémité d'une pousse ou à l'aisselle d'une feuille, une galle en forme de capsule, fermée de toutes parts, mais dont les côtes longitudinales font voir qu'elle est constituée par la soudure des quatre dernières feuilles. Dans d'autres cas il se forme, aux dépens d'une pousse, une galle ovulaire ou fusiforme et ordinairement charnue; telles sont les galles de divers *Asphondylia* sur *Sarothamnus*, *Genista*, *Cytisus*, *Coronilla*, *Dorycnium*, *Ononis*, *Prunus*, *Campanula*, *Artemisia*, *Juniperus* (pl. 37, fig. 6; pl. 36, fig. 2 et 3).

F. Tige et rameaux. Les déformations produites par les Cécidomyïes sur la tige ou les rameaux des plantes sont de deux sortes; les unes sont entièrement closes, les autres s'ouvrant au moins à leur maturité. Dans le premier cas, elles peuvent être internes, sans qu'elles paraissent à l'extérieur, par exemple les galles en grain de blé formées par *Perrisia inclusa* Frauenf. à l'intérieur du chaume de *Phragmites communis* et les déformations du tissu ligneux à l'intérieur des branches de Saule par *Rhabdophaga Pierrei* Kieff. Le plus souvent, elles sont apparentes au dehors et consistent en un renflement de la partie attaquée (pl. 36, fig. 4; pl. 34, fig. 3, 6 et 10). Sur les plantes ligneuses on a observé de ces renflements sur divers Saules, où ils sont produits par *Rhabdophaga salicis* D. G., *saliciperda* Duf., *dubia* Kieff., *Karschi* Kieff.; sur *Rubus*, dus à *Lasioptera rubi* Herg.; sur *Berberis*, *Pirus*, *Sarothamnus*, *Phillyrea*, *Tilia*, etc. Sur les plantes herbacées on les connaît de *Salicornia*, *Eryngium*, *Alyssum*, *Genista tinctoria*, *Atriplex*, *Inula*, *Artemisia*, etc.; un petit nombre sont souterraines, consistant en une cécidie du collet de la racine, par exemple sur *Chrysanthemum*, *Inula* et *Galium*. Beaucoup d'espèces produisent des cécidies sur les tiges des Graminées et des Cypéracées : plusieurs *Hormomyia* et *Pseudohormomyia* forment à la base des *Carex* des galles en grain de blé ou ovoïdales; les *Mayetiola* vivent sous la gaine des feuilles de Graminées; les unes y produisent un léger renflement de la tige, les autres une agglomération de filaments contournés sur *Poa nemoralis* et *Agrostis lateriflora*, les autres enfin une galle en selle.

G. Racines. Je ne connais que trois exemples de galles de Cécidomyies formées aux dépens d'une racine; tous trois sont de l'Amérique du Nord. Ce sont les galles de *Perrisia rhois* Coq., sur les racines aériennes de *Rhus toxicodendron* et celles de Cécidomyies non décrites, sur les racines aériennes de deux Orchidées appartenant aux genres *Cattleya* et *Dendrobium*.

2° *Formation des galles des Cécidomyies*. Toute zoocécidie est le résultat de l'action combinée d'un animal sur un végétal. Il s'ensuit donc que les conditions qui président à sa formation sont à chercher dans l'un et l'autre de ces deux sortes d'êtres. Si nous considérons d'abord la plante, la condition essentielle pour qu'il s'y forme une production gallaire, c'est que ses tissus soient encore susceptibles de croissance. C'est le principe fondamental de la cécidologie ⁽¹⁾. Malpighi l'a établi dès 1679 [435 p. 39], en écrivant que toutes les parties d'une plante peuvent devenir le siège d'une galle, à la condition toutefois qu'elles soient encore à l'état de croissance et que leur tissu puisse ainsi s'hypertrophier ⁽²⁾.

C'est la même idée qu'exprima plus tard Réaumur : « Quand les Pucerons sucent les feuilles nouvelles du Prunier et par conséquent très tendres, leurs piqûres obligent ces feuilles à se courber, à se contourner, à se friser. Malgré les piqûres des Pucerons, des feuilles plus vieilles du même arbre, des feuilles devenues plus fermes, conservent leur forme, elles restent planes ». Réaumur a donc constaté par là que dans le cas particulier, il n'y avait pas production de galle, quand l'organe attaqué par l'insecte avait atteint toute sa croissance ⁽³⁾.

(1) A l'exemple de M. le docteur Fr. Thomas, j'écrivais autrefois : « cécidiologie », mais ce terme, créé par le professeur allemand, frise le barbarisme, étant composé d'un mot latinisé (*cecidium*) joint à un mot grec. Voilà pourquoi j'ai substitué aux termes de cécidiologie et de cécidiogène ceux de cécidologie et de cécidogène.

(2) *Popularis exaratorum tumorum morbus, non solas gemmas, folia et flores afficit, sed reliquas plantarum partes, dummodo vegetando intumescere possint, indiscriminatim tentare solet.*

(3) M. le docteur Fr. Thomas, de Saxe, semble avoir ignoré ces observations de Malpighi et de Réaumur, en revendiquant la priorité pour lui et en rappelant qu'il avait, dès 1872, fait connaître ce principe dans les termes suivants : « Une production gallaire n'est possible sur une plante que pendant la durée du développement de la partie attaquée » (*Eine Bemerkung zu J. Sachs' physiologischen Notizen den Fundamentalsatz der Cecidologie (sic) betreffend. Ber. der Deutschen Botanischen Gesellschaft, Berlin, 1898, p. 72-74*). Bien que

Une seconde condition, relative au végétal, c'est que toute formation gallaire exige une plante déterminée et un organe végétal déterminé. La même Mouche, par exemple un *Mikiola fagi*, pourra déposer une partie de ses œufs sur un bourgeon de Charme, et une autre partie sur un bourgeon ou un rameau de Hêtre; la galle dure et conique ne se formera que sur les feuilles du Hêtre, et les larves qui entreront dans le bourgeon du Charme n'y pourront rien produire, mais elles périront faute de nourriture. Pour les espèces végétales appartenant au même genre, une cécidie qui se forme sur l'une d'elles peut tantôt se former aussi sur les autres, par exemple le renflement des tiges de *Rubus* par *Lasioptera rubi* Heeg., tantôt au contraire exiger une espèce déterminée ou plusieurs espèces déterminées, à l'exclusion des autres espèces du même genre : c'est ainsi que les galles des diverses espèces d'*Harmandia* se trouvent sur *Populus tremula*, rarement aussi sur *P. alba*, mais jamais sur *P. pyramidalis* et *P. divaricata*. Les cécidies de *Macrodiplosis volvens* Kieff. et *dryobia* Fr. Lw. se trouvent en grande abondance, aux environs de Bitche, sur les feuilles de *Quercus pedunculata* et *sessiliflora*; je n'ai jamais pu en découvrir un seul exemplaire sur *Quercus rubra*, bien que cette espèce de Chêne soit mêlée aux deux autres.

S'agit-il de genres différents, en ce cas les exceptions à la règle sont encore moins fréquentes. M. le Dr P. Marchal a fait, à ce sujet, une observation fort intéressante, que nous reproduisons ici *in extenso*, parce qu'elle démontre encore que des Cécidomyies, à peine distinctes entre elles à l'état parfait, peuvent cependant différer spécifiquement les unes des autres. « Tout en reconnaissant la grande analogie qui existait entre la Cécidomyie du Blé et celle de l'Avoine, certains caractères importants, que j'avais constatés au commencement de juin sur les larves de l'Avoine, m'avaient empêché d'identifier les deux formes, et le 11 juillet, signalant à la Société, dans une courte note, les différences que la larve présentait avec celle de *Cecidomyia destructor*, je pensais devoir la considérer comme une espèce distincte. Toutefois, lorsque les adultes vinrent à éclosion, à la fin d'octobre, leur grande ressemblance avec ceux de *C. destructor* me fit douter de l'exactitude de ma première interprétation. Cette question se posa dès lors de savoir si la Cécidomyie de l'Avoine était une espèce distincte, ou une variété caractérisée surtout pendant la phase larvaire, et déterminée par la

cette erreur de M. Thomas eût été rectifiée en 1897, dans ma Monographie des Cynipides, M. Rübsaamen la reproduit encore en 1899 (*Biologisches Centralblatt*, t. XIX, p. 568).

plante nourricière. Bien que la Cécidomyie soit plus probable, l'expérience avait été faite, et mon définitive. M. J.-J. Kieffer, auquel je soumis les insectes à cette époque, me répondit que, pour lui, la Cécidomyie de l'Avoine devait constituer une espèce nettement distincte, bien que voisine de *C. destructor*. L'expérience lui donna entièrement raison.

« Le 19 mars, une caisse fut ensemencée presque entièrement en Avoine, et pour une faible partie en Blé. La caisse fut recouverte d'une cage de gaze, et de nombreux pieds de Blé secs et bourrés de puparia de Cécidomyies prêtes à éclore furent suspendus dans la cage; des éclosions eurent lieu à profusion dans la cage, du 5 au 29 avril. Les femelles pondirent à la fois sur l'Avoine et sur le Blé, mais elles montrèrent une très grande préférence pour ce dernier; aussi les feuilles de Blé furent-elles surchargées d'œufs, tandis que sur celles de l'Avoine ils restèrent fort clairsemés. Les larves sortirent des œufs et elles descendirent le long de la tige, sur l'une comme sur l'autre plante, pour aller se loger sous les gaines foliaires au niveau des nœuds inférieurs; mais tandis que, sur le Blé, ces larves continuèrent leur développement, sur l'Avoine elles ne dépassèrent pas la taille qu'elles avaient au sortir de l'œuf, et se desséchèrent au bout de quelques jours. Le 15 mai, tous les pieds de Blé de la caisse, arrêtés dans leur développement, étaient gonflés de puparia, ou de larves de Cécidomyies complètement développées; on pouvait en compter jusqu'à 30 et 40 dans le même pied, échelonnés tout le long de la tige, et certains d'entre eux éclataient sous leur pression en les laissant s'égrener à terre. Les pieds d'Avoine, par contre, étaient parfaitement indemnes, aucun ne présentait trace de la Cécidomyie.

« Une autre expérience sur une caisse qui contenait beaucoup de Blé et peu d'Avoine donna le même résultat : le Blé fut très fortement envahi; l'Avoine resta indemne. Je mets sous les yeux de la Société deux photographies faites le 24 mai, qui permettront de se rendre compte de l'aspect général de ces caisses à cette époque; on voit que dans les deux cas le Blé est resté chétif et avorté, atteignant environ le tiers de la hauteur de l'Avoine.

« L'expérience inverse était aussi à tenter. Une caisse ensemencée de Blé et ne présentant que quelques pieds d'Avoine fut recouverte d'une cage de gaze; des Avoines attaquées y furent introduites et les Diptères qui sortirent des pupes à la fin d'avril pondirent sur le Blé et sur l'Avoine, mais en témoignant une préférence pour cette dernière plante. Le 11 mai, m'enquérant du résultat de cette expérience, je ne trouvai plus sur aucun pied de Blé trace de la Cécidomyie; sur la plupart des

pieds d'Avoine, au contraire, se trouvaient quelques larves, petites encore, il est vrai, mais dont quelques-unes avaient dépassé de beaucoup la taille qu'elles ont au sortir de l'œuf.

« Il résulte de ce qui précède : 1° que la Cécidomyie destructive ne se développe pas sur l'Avoine; 2° que la Cécidomyie de l'Avoine ne se développe pas sur le Blé. Ces deux Cécidomyies forment donc deux espèces distinctes l'une de l'autre ». (*Bull. Soc. entom. Fr.*, 1895, p. 262-263). *

On connaît pourtant quelques exemples d'une même espèce de Cécidomyie produisant des galles sur des plantes appartenant à divers genres d'une même famille. C'est ainsi que *Dasyneura raphanistri* Kieff. déforme les fleurs de *Raphanistrum*, *Raphanus*, *Brassica* et *Sinapis*. Mais je ne connais aucune Cécidomyie qui produirait des galles sur des plantes appartenant à des familles différentes.

Généralement la formation gallaire exige un organe déterminé; celle de *Mikiola fagi* Hart. n'aura donc lieu que sur la feuille et non sur une autre partie du Hêtre.

Les exceptions sont cependant fréquentes : La 1^{re} génération de *Choristoneura sarothamni* Kieff. déforme les fleurs du Genêt à Balais; la 2^e, qui apparaît après la floraison, s'attaque aux gousses de cette plante. Les galles de *Rhopalomyia tanaceticola* Karsch peuvent même affecter trois différents organes de *Tanacetum*, à savoir la fleur, la feuille et les bourgeons axillaires.

Quant à l'influence de l'insecte sur la production d'une galle, on peut se demander si elle est due à l'insecte parfait ou bien à la larve. Un auteur allemand, le docteur Franck [134, p. 537], prétend que la formation gallaire chez les Cécidomyies n'est pas à attribuer à la larve, mais à une action de l'insecte parfait au moment de la ponte, et qu'elle est antérieure à la formation de la larve. Il cite deux observations à l'appui de son assertion : 1° dans l'enroulement marginal produit par *Periszia piri* B. sur les plus jeunes feuilles de *Pirus communis*, il ne trouva que des œufs fusiformes, brunâtres et longs d'un demi-millimètre, fixés à l'épiderme au nombre d'environ dix, alors que des enroulements un peu plus anciens contenaient déjà de jeunes larves blanches, longues de 1 mill.

Cette observation repose sans doute sur une erreur. En effet, les jeunes feuilles du Poirier offrent, à l'état normal, un enroulement marginal absolument semblable au premier stade de l'enroulement que produisent les larves de Cécidomyies, alors que celles-ci ne mesurent encore qu'un demi-millimètre. Mais en admettant même que cet enroulement des plus jeunes feuilles eût été différent de l'état normal d'enroule-

ment marginal que présente les jeunes feuilles avant leur développement, il nous paraît probable que l'auteur n'a pas observé les œufs de la Cécidomyie.

En effet, les œufs de l'insecte en question sont 1^o cylindriques, avec les bouts arrondis et non point fusiformes; 2^o d'un beau rouge et non point brunâtres; 3^o d'une taille inférieure à un demi-millimètre. Il est en outre probable que, dans le cas particulier, les larves minimes et hyalines, à peine sorties de l'œuf dont elles ne dépassent pas la longueur, ont échappé aux observations de Franck.

La seconde observation qui, au dire de l'auteur allemand, serait encore plus probante, est au contraire encore plus insignifiante et plus superficielle que la première. En effet, Franck cite le cas des folioles du Rosier offrant déjà un enroulement cylindrique par en bas, alors qu'elles ne renferment encore qu'un œuf; or, selon lui, cet enroulement serait dû à une Cécidomyie, *Perrisia rosarum* Hard., et ne peut plus, comme dans le cas précédent, être confondu avec l'état normal de la jeune feuille, puisqu'il a lieu dans le sens inverse du pli qu'offre la foliole au sortir du bourgeon. Il en conclut qu'il y a donc ici évidemment production gallaire à un moment où la larve n'existe pas encore. Malheureusement pour Franck, l'exemple qu'il cite ne s'applique nullement à une Cécidomyie; la déformation qu'il a observée est celle d'une Tenthredinide, *Blennocampa pusilla* Kl., tandis que *Perrisia rosarum* produit un repliement dans le sens du pli normal de la jeune foliole. L'argument ne prouve donc rien pour la formation gallaire des Cécidomyies.

Ajoutons encore qu'il ne vaut pas davantage pour la formation gallaire des Tenthredinides, car chez ces Hyménoptères l'œuf augmente de volume; la larve qui s'y forme et qui y est visible par transparence, agit sur le tissu végétal environnant à travers l'enveloppe de l'œuf, et il s'établit ainsi entre elle et la plante un échange osmotique; la formation gallaire ne commence qu'avec celle de l'embryon dans l'œuf, et s'arrête quand cet embryon périt ou quand on extrait l'œuf.

Il n'existe donc aucune observation prouvant que les galles des Cécidomyies soient à rapporter à une action de l'insecte parfait. Nous pouvons même aller plus loin et dire : Il est certain que cette production gallaire n'est pas à rapporter à l'insecte parfait. En effet, la Cécidomyie ne peut entamer les tissus avec son oviducte (1), comme

(1) Franck est encore évidemment dans l'erreur quand il veut trouver sur les galles de *Mikiola fagi* H., c'est-à-dire d'une Cécidomyie dont l'oviducte se termine par deux lamelles, les traces de la piqûre que l'insecte parfait aurait

nous l'avons vu plus haut pour la plupart des espèces en parlant de la ponte; d'autre part, l'endroit où elle dépose ses œufs n'est ordinairement pas celui où se forme la cécidie. Il faut donc chercher dans la larve elle-même la cause de la formation gallaire, d'autant plus que le développement de la galle est lié à celui de la larve et s'arrête quand celle-ci vient à périr. Mais quelle est cette cause? Est-ce la simple succion de la larve? Ou serait-ce une sécrétion de cette dernière? Comment se fait-il, par exemple, que trois larves, l'une de *Mikiola fugi* H., l'autre de *Mayetiola annulipes* H. et la dernière de *fugicola* Kieff., suçant sur la même feuille de Hêtre, produisent, la 1^{re} une galle conique, dure et glabre, la 2^e une galle cylindrique, molle et fentrée, et la 3^e un simple plissement du limbe? Pourquoi encore, si des larves de *Mayetiola Joannisi* Kieff. et de *M. ponce* Bosc. se rendent sous les gaines d'un même pied de *Poa nemoralis*, les premières produisent-elles un simple renflement de la tige, et les secondes cette curieuse déformation désignée par les anciens auteurs du nom de *galles chevelues du Gramen*? Personne n'a su l'expliquer jusqu'à présent. Nous devons donc nous contenter de montrer ici, par quelques exemples, le mode de ces formations gallaires, tout en avouant que la cause nous en demeure encore inconnue.

Nous considérerons d'abord deux galles caduques se formant à la face supérieure d'une feuille; puis deux galles persistantes, traversant la feuille et une galle à couverte; enfin un pli foliaire et un enroulement. Après ces galles de feuille, nous donnerons un exemple de la formation d'une galle de bourgeon et enfin d'une galle de la tige.

1^{er} Exemple. Formation de la galle de *Mikiola fugi* Hart.

(pl. 44, fig. 2; et 42, fig. 5).

Une des galles les plus communes est celle que l'on trouve sur la face supérieure des feuilles du Hêtre, et dont la forme est en ovale ou en cône terminé par une petite pointe. Sa surface est lisse et glabre, sa couleur rouge ou verdâtre, sa consistance subligneuse, sa longueur de 6 à 10 mill., sa largeur de 6 à 7 et l'épaisseur de la paroi de 4 mill. Elle est à peu près toujours située le long de la nervure médiane ou d'une nervure axillaire. Voici en quels termes Büsgen [57] explique sa formation : « Le premier insecte ailé fit son apparition au commencement de mars, d'autres suivirent en très grand nombre pendant

produite au moment de la ponte. D'autres auteurs, par exemple Fr. Thomas, B. Wagner, etc., sont tombés dans la même erreur, pour des espèces à oviducte terminé par une pochette ou par deux lamelles.

les quinze jours suivants. La plupart étaient des femelles... L'accouplement eut lieu bientôt après l'éclosion, et la ponte suivit de près ⁽¹⁾. Cette dernière n'a ordinairement pas lieu à proximité de terre, mais sur un objet situé plus haut et qui, dans le voisinage de l'insecte, se trouve ordinairement être une branche de Hêtre. Les Diptères volent vers la lumière et ont l'habitude de se rendre aux extrémités des branches; ces deux circonstances font qu'ils se reposent sur les bourgeons ou du moins très près des bourgeons et qu'ils y déposent leurs œufs. Une autre circonstance peut concourir à les faire parvenir sur un bourgeon pour y pondre, c'est que les écailles de ce dernier leur donnent des points d'appui pour se fixer, mieux que l'écorce du rameau ne pourrait le faire. Il ne peut pas être question d'un instinct particulier, amenant l'insecte à déposer ses œufs sur le bourgeon de Hêtre plutôt que sur un autre objet ⁽²⁾. Dans mes bocaux d'observation je trouvai les œufs aussi bien sur la paroi du verre et sur la gaze recouvrant les bocaux que sur les jeunes plants de Hêtre ⁽³⁾. Les œufs sont rouges, longs d'un tiers de millimètre et larges d'un sixième. Ils sont solitaires ou déposés par groupes, dont les parties sont alignées parallèlement l'une à l'autre... Pendant que cette ponte avait lieu en captivité, je trouvai au dehors, sur des bourgeons de Hêtre encore en repos comme en hiver, ou sur le rameau immédiatement en dessous du bourgeon, des œufs semblables qui venaient d'y être déposés. L'éclosion des larves sur les Hêtres des bocaux eut lieu le 4 avril et l'on pouvait aussi trouver à la même époque au dehors, l'enveloppe de l'œuf vide et les larves à l'intérieur des bourgeons. Pendant longtemps j'eus peine à admettre que les jeunes larves pussent pénétrer entre les écailles jusqu'à l'intérieur du bourgeon, mais j'eus bientôt occasion de m'assurer de ce fait. De jeunes larves que je déposai sur des bourgeons encore parfaitement fermés avaient disparu en peu de temps, et il me fut possible de les suivre à la loupe et d'observer comment elles pénétraient. C'est apparemment par crainte de la lumière qu'elles se réfugient à l'intérieur du bourgeon ⁽⁴⁾. Sans

(1) Si l'on veut réussir, il faut que les galles aient hiverné à l'air libre.

(2) Mes observations ne me permettent pas d'admettre ces conclusions de M. le Dr Büsgen, comme on peut le voir plus haut, à l'article : Ponte des Cécidomyies.

(3) Ceci ne prouve pas autre chose, sinon que l'instinct porte le Diptère à ne pas confier ses œufs à de jeunes plantes, ce que confirme l'observation à l'air libre, comme Büsgen l'a remarqué du reste quelques lignes plus haut.

(4) Je ne crois pas que ce soit le seul motif, car 1° dans ce cas elles devraient se contenter de se réfugier entre les écailles sans pénétrer plus avant; 2° j'ai

doute que ces larves, semblables en cela à beaucoup de plantes et d'animaux inférieurs, perçoivent la lumière par toute la surface de leur corps et qu'elles veulent la fuir. Leur rapport avec la lumière est donc l'inverse de ce qu'il sera plus tard, quand elles auront atteint l'état d'insecte parfait. Outre cette aversion pour la lumière, un second facteur, à savoir l'insuccès de tous les essais de succion que la larve tente sur les écailles, tient l'insecte en mouvement, jusqu'à ce qu'il soit parvenu aux petites feuilles qui forment l'intérieur du bourgeon. Celles-ci ont la surface, qui sera plus tard l'inférieure, tournée contre les écailles et sont disposées de telle façon que leurs nervures latérales sont placées l'une contre l'autre, dirigées vers le sommet du bourgeon et à peu près parallèles à la nervure médiane de laquelle elles sortent. Le tissu foliaire entre ces nervures forme la profondeur des plis et est tout à fait inaccessible aux larves qui viennent du dehors. Le dos des nervures est couvert de poils rigides, et les petites larves ne trouvent, pour s'y fixer, d'autre endroit que le parenchyme qui borde immédiatement la nervure et qu'elles peuvent encore atteindre avec la partie antérieure de leur corps. C'est ce qui explique pourquoi les galles sont situées le long des nervures. Leur disposition sur le limbe est donc une conséquence de la disposition des feuilles dans le bourgeon.

« Quand la larve a pénétré ainsi à l'intérieur du bourgeon, le tissu foliaire est encore peu différencié. On distingue néanmoins les deux épidermes; les futures cellules en palissade commencent à s'allonger, tandis que les autres sont plus arrondies et les nervures montrent quelques éléments des faisceaux libéro-ligneux. Toutes ces parties sont encore susceptibles de cloisonnement ». A partir du moment où la larve s'est fixée et où elle commence à sucer, on remarque les phénomènes suivants :

1^{re} Stade : Formation d'une tache. M. le Dr Focke, à qui nous devons la première étude du développement de cette galle, mais qui n'a observé ni la ponte ni les œufs déposés dans les bourgeons, décrit ainsi la première phase : « Si l'on examine vers la fin du mois de mai

observé des larves de *Rhopalomyia palearum* Kieff. qui étaient fraîchement écloses d'œufs pondus sur les capitules, les tiges et les feuilles d'*Achillea ptarmica* et qui voyageaient sur toutes les parties de cette plante sans pénétrer entre les fleurons qui les auraient soustraites à la lumière. Comme ces tiges étaient desséchées, les larves cherchaient évidemment une plante fraîche qui pût les nourrir. Ici encore il faut recourir à l'instinct, si l'on veut expliquer pourquoi la larve agit de telle façon, plutôt que de telle autre.

la face inférieure des feuilles de Hêtre, on remarque sur certaines d'entre elles de petites taches jaune verdâtre, correspondant à une légère voussure de la feuille vers la face supérieure. C'est au centre de ces petites taches, dans le fond des dépressions et à la face inférieure, que l'on trouve une larve rouge excessivement petite, accolée au limbe par sa face ventrale. Une coupe transversale de la feuille pratiquée à ce stade à travers la petite tache en question, montre que la coloration jaune verdâtre est due : 1° à la diminution des corps chlorophylliens contenus dans le mésophylle et, par ce fait, à une altération locale de ce tissu ; 2° à l'altération cellulosique des parois des deux épidermes » [425, p. 29]. Selon Büsgen (*l. c.*, p. 45), cette tache décrite par M. Focken se voit quelquefois, mais pas en règle générale.

2^e Stade. Formation du bourrelet. D'après M. Focken : « La tache d'un jaune-verdâtre que nous avons signalée au début prend bientôt une coloration brunâtre. Elle est limitée d'un côté par la nervure principale ou secondaire, et de l'autre par une des fines ramifications de ces nervures. Le parenchyme foliaire et les faisceaux libéraux qui l'entourent sont en ce point profondément modifiés.

« Dans le parenchyme foliaire se produisent, au niveau de la tache, des phénomènes chimiques assez complexes qui ont déjà débuté au 1^{er} stade et dont la manifestation la plus nette est la disparition complète des gros corps chlorophylliens, si abondants dans le parenchyme normal de la feuille de Hêtre. Les faisceaux libéro-ligneux qui constituent l'encadrement de la tache brune prennent pendant ce temps un développement considérable.

« Ce travail hyperplasique, qui apparaît d'abord uniquement dans la maille vasculaire entourant la larve, se transmet bientôt, de proche en proche, aux fines nervures qui l'avoisinent; il en résulte une aréole festonnée, de 2 à 3 millimètres de diamètre, formée par des faisceaux hypertrophiés. Il y a en somme, à ce niveau, une augmentation du système vasculaire rappelant en tous points le processus anatomique de réparation qui s'observe en pathologie animale.

« Jusqu'alors il n'y a pour ainsi dire, dans la feuille, presque aucune modification histologique; cependant l'accroissement des cellules épidermiques inférieures qui entourent la larve s'accroît davantage, et cet accroissement détermine en ce point un bourrelet qui finit par entourer la larve. Mais bientôt le parenchyme lacuneux sous-jacent se cloisonne très activement, le parenchyme en palissade conservant encore son aspect normal. Les petites cellules ainsi formées sont aplaties transversalement, elles contiennent un noyau et un protoplasma très riche

en granulations, et leur cloisonnement rappelle tous les caractères d'une zone génératrice. Cette zone génératrice se développe beaucoup plus vers la face inférieure et ne tarde pas à former, autour de la larve, une voûte qui la recouvre complètement en laissant toutefois au centre un petit orifice qui met la chambre larvaire en communication avec l'extérieur.

« Donc, avant que toute trace d'excroissance soit visible à la face supérieure de la feuille, la larve se trouve déjà englobée au milieu des tissus de la plante... Cette portion inférieure n'est pas destinée à acquérir un plus grand développement; cependant les cellules épidermiques bordant le petit orifice central s'accroissent encore légèrement et se prolongent en poils qui tapissent le vestibule d'entrée. L'air peut facilement pénétrer à travers ce feutrage, mais les parasites parviennent difficilement à le franchir. »

Englobement de la larve par les cellules épidermiques qui s'élèvent autour d'elle, formation d'une zone génératrice à l'intérieur des tissus de la feuille, tels sont les deux phénomènes de la 2^e phase du développement. Selon Büsgen, pendant ce stade, la partie postérieure de la larve émerge de la cavité; selon lui encore, l'absence de grains de chlorophylle et l'hypertrophie des faisceaux signalées par Fockeu n'existeraient pas en réalité; mais quand il écrit qu'il ne peut admettre « que les cellules de l'épiderme croissent dans la surface de la feuille — in die Blattfläche hineinwachsen — et que le parenchyme interne de la galle soit muni d'ostioles et de cellules subéreuses », je crois qu'il fait erreur, car je ne trouve rien de semblable dans l'Étude de M. Fockeu.

3^e Stade. Émergence de la galle sur le dessus de la feuille. M. Fockeu distingue encore, avant ce stade, une dissymétrie et une dépression en forme d'ombilic à la face supérieure (pl. 42, fig. 5, d) : « Du centre de l'ombilic fait maintenant saillie un petit mucron qui constituera plus tard la pointe de la galle adulte. La galle commence par s'accroître en longueur et prend dès lors un aspect conique. Cette elongation résulte du cloisonnement ultérieur de la zone génératrice ». Grâce à ce cloisonnement, la partie de la feuille sous laquelle suce la larve s'agrandit plus que les parties avoisinantes, et s'allonge nécessairement par en haut. Elle est donc à considérer, pour me servir de l'expression de Büsgen, « comme un pli foliaire qui a pris la forme d'un cône et qui est dû à ce que la surface a subi à cet endroit une augmentation de croissance ».

Après cette elongation de la galle, qui n'a pas lieu perpendiculairement à la surface de la feuille mais avec une légère inclinaison, on

remarque l'accroissement en diamètre; pendant cette seconde période du 3^e stade, la larve est fixée sur les côtés de la galle et non plus au sommet comme pendant la première. La limite entre la galle proprement dite et l'anneau situé à la face inférieure de la feuille est formée par une zone de parenchyme à cloisons très minces, laquelle permettra plus tard à la galle de se détacher de son support. La chute de la galle s'effectue comme pour l'espèce suivante, mais l'empreinte laissée sur la feuille offre la forme d'une cupule plus grande, de coloration plus foncée et elle est dépourvue de collerette; le centre est percé d'un orifice extrêmement petit, non visible à la loupe et garni de poils.

2^e exemple. Formation de la galle de *Mayetiola annulipes* H.
(pl. 42, fig. 7).

Ici encore la jeune larve se rend sur le dessous des feuilles et se fixe à l'aisselle d'une nervure, au milieu d'une des mailles vasculaires qui résultent de la ramification de la nervure principale. La maille vasculaire d'insertion n'est donc plus, comme dans le cas précédent, en contact avec une des nervures principales, ou rarement. Fr. Löw [421] et Fockeu [125] ont décrit la formation gallaire de cette espèce, mais ils n'ont observé ni la ponte de l'insecte parfait, ni la migration de la larve. Fockeu que nous allons suivre, en le résumant, distingue dans le développement de cette galle cinq phases successives.

Le 1^{er} Stade se manifeste par une tache brune accompagnée d'une dépression de la face supérieure de la feuille. Si l'on pratique une coupe transversale de la feuille de Hêtre à cet endroit, on constate une diminution dans l'épaisseur du limbe foliaire et une altération locale des tissus. A ce premier phénomène, que l'on peut à peine considérer comme faisant partie du développement de la galle, fait bientôt suite l'apparition de l'excroissance.

2^e Stade. Tout autour de la larve s'effectue un travail hypertrophique qui se manifeste extérieurement par l'apparition d'un bourrelet annulaire assez épais faisant saillie à la face inférieure de la feuille et bien visible à l'œil nu. Une coupe transversale montre dans le parenchyme lacuneux un cloisonnement très actif des cellules, allant du centre, c'est-à-dire de la larve à la périphérie, et par suite, la disparition complète des lacunes creusées au milieu de ce parenchyme. A partir de ce moment les tissus sont complètement modifiés; la formation de la galle commence. On se trouve ici en présence d'une véritable zone génératrice. Disposée en forme d'anneau, cette zone génératrice est limitée, vers l'intérieur, par la loge gallaire elle-même, et elle s'étend à la péri-

phérie, jusqu'aux faisceaux les plus proches de la feuille, qui s'hypertrophient, mais sans faire partie, à proprement parler, de la galle. L'augmentation du bourrelet annulaire qui entoure la larve finit par faire disparaître celle-ci, laissant au centre un petit orifice dans lequel on peut à peine introduire une très fine soie ⁽¹⁾. A ce moment la cavité gallaire est à peu près régulièrement sphérique; la jeune larve qui l'habite est enroulée en boule et la remplit complètement.

3^e Stade ⁽²⁾. Voici la larve complètement disparue dans le tissu foliaire hypertrophié. Par suite de l'excroissance annulaire formée à la face inférieure autour de l'orifice de la cavité gallaire, il se forme une légère incurvation de la face supérieure vers la face inférieure, une dépression visible à l'œil nu sous la forme d'une tache brunâtre et circulaire. Selon mes observations, cette dépression a un diamètre de 2 à 3 mill., et à l'époque où elle apparaît, c'est-à-dire à la mi-juin, les galles de *Mikiola fagi* H. sont parvenues depuis longtemps à leur hauteur définitive.

Bientôt le fond de cette sorte de cratère s'élève lentement et se met au niveau de la face supérieure de la feuille. Que s'est-il passé à l'intérieur des tissus? Le parenchyme en palissade, subissant la poussée qui lui est donnée de bas en haut par le cloisonnement du parenchyme lacuneux, presse contre l'épiderme supérieur qu'il soulève; ses cellules se cloisonnent activement et deviennent polyédriques. L'épiderme supérieur, trop faible pour résister à cette poussée, se décolle du centre à la périphérie et se sépare ainsi des cellules parenchymateuses. D'autre part l'épiderme inférieur qui tapisse la cavité gallaire, le canal et la plus grande partie du bourrelet annulaire, lignifie ses parois. De même les cellules du parenchyme lacuneux lignifient leurs parois et la zone scléreuse ainsi constituée forme une sorte de cupule qui englobe la base de la cavité gallaire, et s'étend, en diminuant d'épaisseur, jusqu'aux confins de la maille vasculaire qui entoure l'excroissance. Ce parenchyme lignifié est analogue à la zone protectrice des galles des Cynipides; le tissu protecteur enraye en quelque sorte la marche envahissante de l'insecte à travers la paroi de sa loge; il disparaîtra plus tard progressivement et ne sera plus représenté, dans la galle adulte, que par le bourrelet scléreux qui entoure l'orifice.

(1) Plus tard, cet orifice n'est plus en communication avec le dehors et la galle est complètement close.

(2) C'est à ce stade que se rapporte la fig. 9, pl. 38, t. III des Mémoires de Réaumur.

4^e Stade. Les deux premiers stades n'ont été décrits que par Fockeu; le 3^e et les suivants l'ont été aussi par Réaumur, Vallot, Breni et Fr. Löw. Deux phénomènes caractérisent cette quatrième phase : 1^o formation, à la face supérieure, d'une membrane percée d'un trou en son centre et ayant l'aspect d'une pupille; 2^o amas de poils d'un brun ferrugineux sous-jacent à la membrane. Ces poils, qui sont la prolongation des cellules du parenchyme dénudées par le décollement de l'épiderme supérieur, ne se ressemblent pas entre eux. Les uns sont minces, flexueux, pluricellulaires, à parois fines, colorées en brun et se terminant en pointe mousse; les autres sont épais, droits, à pointe fine, à parois épaisses et résistantes. Ils ont chacun un rôle et une destinée différents. Les premiers, sans consistance, ne tardent pas à tomber; les seconds, plus résistants, servent pour ainsi dire de levier, en pressant sur l'épiderme qu'ils soulèvent; on les retrouve plus tard garnissant la surface externe de la galle. Cette 4^e phase apparaît, du moins aux environs de Bitché, à la fin de juin et au commencement de juillet. C'est cette forme que Fée a prise pour un *Erineum* et qu'il a décrite sous le nom d'*Erineum inclusum*, dans les termes suivants : « Epiphyllum; caespitibus sparsis, rotundis, a membranula glauco-albida tectis; floccis longissimis, intense ferrugineis. Habitat in foliis Fagi silvaticae, Europae. On trouve au-dessous de la petite membrane blanche, mince et papyracée, un groupe de filaments très longs, mêlés, fort déliés et d'une couleur de rouille très prononcée. Cette espèce est anormale ». (Mémoire sur le groupe des Phyllériées et notamment sur le genre *Erineum*, 1834, p. 30, pl. V, fig. 4).

5^e Stade. L'excroissance gallaire émerge du fond du cratère où elle était primitivement située; la fine membrane qui la recouvre, déjà perforée en son centre, est rejetée de toutes parts et on la retrouve, à la périphérie de la galle, où elle forme une mince collerette qui se flétrit au fur et à mesure du développement de l'excroissance. Cette émergence résulte du cloisonnement de la zone génératrice annulaire et la galle s'accroît par sa base. Si l'on veut considérer ce phénomène comme une sorte d'élasticité des tissus, on peut se ranger à l'opinion de ceux qui considèrent les galles des Cécidomyies comme le résultat d'une invagination des tissus normaux de la feuille. Mais en réalité les tissus de l'excroissance gallaire sont des tissus nouveaux, ayant des caractères propres, absolument différents de ceux de la feuille, de sorte qu'il paraît plus logique de considérer la galle comme une *production secondaire* de la feuille.

Arrivée à sa maturité, la galle se détache de son support : sa partie

basale qui a la forme d'un cône tronqué et renversé, et qui était enfoncée dans le limbe, devient visible maintenant et offre une ouverture arrondie à son extrémité. En se détachant, elle laisse sur la feuille une impression circulaire de la forme d'une cupule, dont le centre porte un petit cylindre fermé à sa base, auquel la galle adhéraît avant sa chute; le bord de cette cupule est muni de quatre ou cinq lobes desséchés et réfléchis, qui sont les débris de l'épiderme, et sa face inférieure présente au centre un minime mamelon brunâtre qui est la cicatrice de l'ouverture primitive.

3^e Exemple. Formation de la galle d'*Oligotrophus capreae* Winn.

Bremi [50, p. 67], Franck [434] et Mik [504] ont décrit sommairement quelques états du développement de cette galle. Fockeu [425], dont nous allons résumer l'étude, en a décrit toutes les phases de développement.

Phénomènes antérieurs à l'apparition de la galle. Aucun auteur n'a observé la ponte de la Cécidomyïe en question. Fockeu trouva les œufs de l'Insecte aussitôt après l'épanouissement complet des bourgeons, sur la face inférieure des feuilles, fixés aux poils qui garnissent le dessous du limbe. L'interprétation donnée par Franck, d'après laquelle la larve pénétrerait dans les tissus, est fautive, comme le remarque Fockeu. Les jeunes larves, de forme ovoïde, avec une légère proéminence à la partie antérieure et une segmentation distincte, exécutent des mouvements très lents, et rampent à la surface de la feuille sans s'écarter beaucoup de certains points; ce sont surtout des mouvements de rotation qu'elles effectuent. Ces phénomènes s'observent surtout au début, aussitôt après l'éclosion; on peut alors détacher facilement les larves de la feuille avec l'extrémité d'un pinceau ou d'une fine aiguille.

Elles ne contractent pas d'adhérence avec la feuille et celle-ci ne présente aucune lésion, même épidermique.

Plus tard, on trouve les larves fixées au point où apparaîtront les galles et leur aspect a changé. Elles sont plus globuleuses, comme enroulées en boule, et leur proéminence antérieure paraît effacée. Il est difficile alors de les détacher de la feuille. Elles sont au repos et fixées par leur extrémité antérieure à l'épiderme de la feuille; on ne peut même pas les en séparer sans léser cet organe, les fines pièces buccales de l'animal étant engagées au milieu des cellules épidermiques.

Dès ce moment, la vie et le développement de la jeune larve sont intimement liés à l'accroissement de la feuille.

Voyons maintenant comment la plante réagit contre la présence du parasite à sa surface. Tout d'abord on peut facilement remarquer, en détachant la larve, qu'elle a produit une lésion toute locale des cellules épidermiques. Cette lésion, qui paraît être la cause primordiale et le début de la galle, consiste en une excoriation, une dénudation de la cuticule des cellules, dont le protoplasma jeune sert de nourriture à la larve. La lésion primitive ne porte que sur une ou deux cellules épidermiques, mais son action se transmet, de proche en proche, aux cellules voisines, sur un espace équivalant aux dimensions de la jeune larve. Ces dernières cellules ne sont pas excoriées, ni vides de protoplasma, mais elles manifestent un certain degré de mortification qui se traduit surtout par la disparition de la chlorophylle et la cutinisation plus complète de la paroi externe. Il en résulte une tache jaune sous-jacente à la jeune larve qui, à ce moment, est gorgée de nourriture, renflée en boule, la partie antérieure engagée au milieu des cellules épidermiques.

Cette tache jaune n'est pas à attribuer au simple contact de la larve, car si on détache celle-ci de sa place primitive pour l'appliquer en un point nouveau, il ne se produit plus de coloration épidermique sous elle; cette décoloration est du reste toujours postérieure à la lésion.

La décoloration de l'épiderme est bientôt suivie par le décollement de ce tissu au niveau de la tache jaune. L'épiderme se détache des tissus sous-jacents dont il ne peut suivre l'accroissement. A ce stade commence véritablement la production objective de la cécidie, les phénomènes précédents ne se manifestant par aucun épaissement des tissus ni aucune voussure de la surface.

Point d'insertion de la galle. La galle d'*Oligotrophus capreae* s'insère au voisinage des nervures, surtout des nervures secondaires. Cette localisation est à peu près générale dans toutes les cécidies foliaires des Cécidomyies. La larve qui se fixe sur la feuille n'a qu'un but, c'est de chercher sa nourriture. Elle est guidée, en cette circonstance, par l'instinct et s'installe là où elle a chance de trouver le maximum de nourriture, au voisinage des régions qui sont chargées spécialement de faire circuler la sève. Le plus souvent, la galle occupe le centre d'une des fines mailles vasculaires formées par les nervures tertiaires.

Apparition et développement de la galle. Le décollement de l'épiderme inférieur en contact avec le corps de la larve, précède donc la formation de la galle; celle-ci n'est pas une production épidermique, elle procède du mésophylle de la feuille. L'épiderme décollé est percé d'un petit orifice pupillaire. Au point correspondant à cet orifice, le tissu sous-

épidermique est entamé par la larve qui a exercé son action jusqu'aux cellules du parenchyme en palissade les plus externes. Ces dernières sont en effet vides de protoplasma et complètement dépourvues de chlorophylle.

La lésion portant sur les cellules du parenchyme lacuneux paraît être le vrai point de départ de l'excroissance gallaire. Aussitôt après le soulèvement de l'épiderme inférieur, les cellules du parenchyme lacuneux immédiatement en contact avec le tissu sous-épidermique se cloisonnent activement et forment une zone génératrice annulaire au pourtour de la larve. Le cloisonnement de ces cellules, qui présente son maximum d'intensité au centre, va en diminuant vers la périphérie. La région centrale entourée par la zone génératrice est formée par les cellules du parenchyme lacuneux en voie de mortification qui servent de nourriture à la larve et qui ne sont nullement susceptibles de se cloisonner.

Il résulte de la forme même de la zone génératrice et de son mode de cloisonnement qui s'opère vers la face inférieure, que ce tissu de néoformation finit par entourer complètement la larve. La galle est alors visible à l'extérieur sous la forme d'une éminence discoïde faisant saillie à la face inférieure de la feuille. En s'accumulant autour de la larve, les cellules génératrices ne forment pas une cavité complètement close, mais elles limitent un orifice infundibuliforme donnant accès dans un pertuis qui met en communication la chambre larvaire avec l'extérieur. Dans la suite du développement, les parois du pertuis se rapprochent tellement qu'elles finissent par se toucher et que la galle paraît complètement close; mais en réalité il existe toujours une solution de continuité entre les cellules adjacentes de ce canal, comme on peut s'en rendre compte sur des coupes longitudinales passant par l'axe de la cécidie. L'orifice infundibuliforme qui précède le pertuis constitue une sorte de chambre, que Mik n'a nullement considérée comme une seconde chambre larvaire, ainsi que l'écrit M. Fockeu ⁽¹⁾.

Le cloisonnement de la zone génératrice s'effectue d'abord vers la

(1) La description morphologique que Mik donne de la galle concorde avec mes observations, avec cette seule différence que la cavité externe est beaucoup plus petite que la cavité interne ou chambre larvaire. La paroi qui sépare les deux cavités et qui touche parfois l'orifice circulaire et bordé de rouge, rendant alors la cavité externe à peine sensible, est évidemment ce que Bremi appelait « une membrane lisse, brillante, verdâtre et demi-transparente qui recouvre le sommet de l'excroissance comme un tympan... et qui disparaît à la maturité en laissant à l'insecte une ouverture circulaire comme porte de sortie ».

face inférieure de la feuille seulement. C'est ainsi que se trouve formée la première région de la galle, bien avant que toute trace d'excroissance ne soit visible sur la face supérieure.

Au pourtour de la galle existe un bourrelet qui fait saillie à la face supérieure surtout et se traduit, sur les coupes transversales, par deux élévations qui circonscrivent les tissus gallaires. Ce bourrelet se produit, dès le début, pendant le cloisonnement de la zone génératrice, et joue un rôle très important dans le développement de la galle. Il résulte de l'hypertrophie des fines nervures qui avoisinent le point d'insertion de la galle.

Quant à la partie supérieure qui constitue le fond de la cavité gallaire et qui est beaucoup moins importante, elle résulte en partie du cloisonnement du parenchyme en palissade. Les cellules de ce tissu se segmentent activement après avoir perdu leur chlorophylle. Dès ce moment la galle a acquis ses caractères morphologiques définitifs. Elle fait saillie inégalement des deux côtés de la feuille et son développement dépend de l'accroissement corrélatif de l'organe sur lequel elle est insérée.

Le stade suivant est caractérisé par la différenciation des tissus gallaires et surtout par le développement d'une zone protectrice qui limite vers l'extérieur les tissus tendres de la feuille. Cette zone protectrice résulte de la lignification des parois des cellules les plus superficielles et par conséquent les plus anciennement produites par la ligne génératrice.

La lignification des parois de ces cellules se produit en même temps que celle de la gaine protectrice des faisceaux ; ces deux couches ont entre elles des relations évidentes. C'est d'abord vers la face supérieure que s'effectue ce processus anatomique ; il se forme de la sorte une lentille scléreuse, peu épaisse, à concavité inférieure, disposée immédiatement en dessous du tissu sous-épidermique.

Vers la face inférieure, cette zone est beaucoup plus épaisse et vient tapisser l'orifice de la galle. La zone protectrice une fois produite, la cécidie ne peut plus s'accroître, son développement s'arrête et sa structure reste identique jusqu'à la mort de la galle.

Cavité larvaire. La chambre larvaire passe par différentes phases pendant le développement de la cécidie. Au début, elle est largement ouverte et limitée par l'épiderme inférieur à peine modifié. Elle a, à ce moment, la forme d'une cuvette, au fond de laquelle vit la larve nullement protégée par les tissus foliaires qui ne sont pas encore hypertrophiés. Plus tard, par suite du cloisonnement de la zone génératrice, les bords de cette cuvette se rapprochent et la larve est complè-

tement enfermée dans une cavité dont les parois se moulent sur son corps. L'hypertrophie des tissus continuant à se produire, la loge gallaire se trouve prolongée par un mince canal dont les bords sont accolés l'un à l'autre et qui s'ouvre à l'extérieur dans un infundibulum assez vaste. A ce stade la larve n'est plus en communication directe avec l'extérieur. L'air lui arrive néanmoins du dehors en pénétrant dans l'intervalle des cellules qui bordent le conduit gallaire.

Selon Fockeu, c'est en détruisant les cellules de la couche nutritive puis celles du conduit gallaire que la larve quitte sa prison végétale pour se métamorphoser. Voici ce que j'ai remarqué à ce sujet. La larve, dont Mik écrit qu'elle quitte la galle dans la seconde quinzaine d'août, demeure au contraire, du moins aux environs de Bitché, renfermée encore dans les cécidies paraissant complètement closes, jusqu'à la mi-novembre, c'est-à-dire tant que les feuilles sont encore vertes; or, dès la fin d'août ou le commencement de septembre, les larves avaient atteint leur croissance normale et avaient donc cessé de prendre de la nourriture. Ce fait semble déjà indiquer que la larve ne détruit pas elle-même la paroi qui la sépare du dehors, mais qu'elle attend que la dessiccation de la feuille amène cette destruction. Ce qui le prouve suffisamment, c'est l'observation suivante. Le 18 octobre j'avais cueilli sur un même arbre un certain nombre de feuilles de Saule couvertes de galles encore fermées. Une partie de ces feuilles fut laissée à l'air libre pendant une journée, tandis que les autres furent renfermées dans une boîte en fer-blanc qui empêchait leur dessiccation. Le résultat fut que toutes les galles des premières feuilles, c'est-à-dire de celles qui s'étaient desséchées à l'air libre, paraissaient maintenant complètement ouvertes; celles des secondes étaient demeurées fermées. J'ai renouvelé sur d'autres feuilles la même expérience avec le même résultat. C'est donc à la dessiccation de la feuille et non à l'action de la larve qu'il faut attribuer la cause de l'ouverture de la galle.

4^e Exemple. Formation de la galle de *Harmandia cristata* Kieff.

Selon Fr. Löw [414, p. 160], la femelle de cette Cécidomyïe dépose ses œufs en avril sur la face supérieure des feuilles du Tremble sortant du bourgeon. Les petites larves qui éclosent bientôt se rendent à une nervure secondaire et y produisent, par leur succion, une hypertrophie de forme particulière. Comme cette hypertrophie atteint son maximum d'intensité sous la larve, il en résulte, à la face opposée de la feuille, une éminence un peu plus longue que large; en même temps l'endroit occupé par la larve s'enfonce et finit par descendre au-

dessous du niveau du limbe, de sorte que l'insecte paraît maintenant logé dans un enfoncement en forme de maie. Cependant les bords de cet enfoncement continuent à s'hypertrophier; ils s'allongent par-dessus le dos de la larve et finissent par se rejoindre en emprisonnant complètement cette dernière. Une fois arrivée à maturité, la larve cessant de prendre de la nourriture, cesse aussi d'agir sur la plante et d'attirer la sève dans la galle; celle-ci commence par suite à se dessécher, et comme cette dessiccation se fait d'abord sentir aux parties supérieures et moins épaisses de la galle, il en résulte que les deux bords qui s'étaient rejoints par-dessus la larve se séparent de nouveau l'un de l'autre et forment ainsi une ouverture en fente, par laquelle la larve pourra quitter sa prison, pour aller subir sa métamorphose en terre.

5° Exemple. Galle d'*Arnoldia cerris* Koll.

Giraud a publié, sur cette espèce, l'observation suivante : « Le 9 mai, je me rendis sous l'arbre infesté, l'année précédente, par ce petit Diptère; j'eus le même spectacle qui s'était déjà offert à Kollar, plusieurs années auparavant. Des millions de ces animalcules couvraient le gazon qui commençait à pousser sous l'arbre, ou voltigeaient sous les branches basses, évidemment très occupés de l'accouplement. En portant mes regards sur les branches, j'en vis beaucoup d'autres posés sur les feuilles, paraissant plus tranquilles, mais non oisifs : c'étaient des femelles occupées à leur ponte. J'en suivis les mouvements et je m'assurai que cet acte s'opérait rapidement et que la même mère le répétait souvent sur la même feuille. Je cueillis un certain nombre de ces feuilles encore très petites et à peine épanouies, sur lesquelles j'avais vu travailler le plus grand nombre de Diptères, et les transportai chez moi pour les examiner à la loupe. Cet examen me démontra que les œufs, déjà déposés en grand nombre, étaient simplement engagés dans le duvet des jeunes feuilles et jamais dans leur parenchyme. Ils ressemblaient d'ailleurs à ceux des Cécidomyies en général.

Dès la fin de mai ou au commencement de juin, les nouvelles galles commencent à se montrer sous la forme de très petits points pâles qui se couvrent bientôt d'une pubescence blanche. Leur développement est fort lent ».

6° Exemple. Galle d'*Oligotrophus fagicola* Kieff.

Comme Fr. Löw l'a observé [441, p. 156], on trouve au printemps sur la face supérieure des jeunes feuilles de Hêtre, dès que les bourgeons se sont ouverts, les minimes larves récemment écloses d'*Oligotrophus*

fugicola. Les nervures secondaires, sur lesquelles les larves se sont fixées, commencent à s'hypertrophier, ainsi que la partie avoisinante du limbe. Le pli dont la nervure secondaire formait le fond, alors que la jeune feuille était encore renfermée dans le bourgeon, ne disparaît pas quand le limbe se développe; tout au contraire, ses bords qui participent à l'hypertrophie, se rejoignent l'un l'autre, de façon à fermer la cécidie. Ces plis qui sont ordinairement à plusieurs sur une feuille et dont la longueur occupe la moitié, parfois la totalité de celle de la nervure, ne forment pas carène à leur face inférieure, mais un de leurs côtés est appliqué à la feuille, dans la direction du pétiole. Arrivées à leur maturité, les larves qui vivent en société dans ces déformations, et non solitaires comme le dit Fr. Löw, cessent d'agir sur le tissu foliaire qui commence à se dessécher à sa partie la plus éloignée des larves, c'est-à-dire à l'endroit où les deux bords du pli se touchent; il en résulte que ceux-ci se séparent et permettent ainsi la sortie des larves. Verte au début, la cécidie prend ensuite une teinte jaune, puis rouge, pour se dessécher complètement plus tard, quand les larves l'ont abandonnée.

7^e Exemple. Galle de *Perrisia marginemtorquens* Wilm.

Selon Fockeu, que nous allons encore suivre ici (*l. c.*, p. 100-106), la ponte de cette espèce a lieu en mai dans les bourgeons de *Salix viminalis*. L'insecte dépose ses œufs entre les écailles, sans les fixer par une matière agglutinante et sans produire de piqure. Les premiers vestiges de la cécidie apparaissent une quinzaine de jours après l'épanouissement des bourgeons et coïncident avec l'éclosion des œufs. La jeune larve, aussitôt éclos, se fixe à la face inférieure des feuilles et sur les bords; à la face inférieure, probablement à cause des poils qui garnissent la feuille de ce côté et qui lui servent de point d'attache, la face supérieure étant absolument glabre; sur les bords, parce qu'elle trouve en cette région un abri naturel, le bord de la jeune feuille étant normalement recroquevillé vers la face inférieure.

La présence de la larve à la surface du limbe se traduit d'abord par une certaine décoloration : la feuille est décolorée à ce niveau par le fait de la disparition de la chlorophylle qui est remplacée par de l'amidon. En dehors de cela on ne constate aucune autre modification histologique ni dans l'épiderme inférieur ni dans les parenchymes, et les stomates ne présentent pas non plus de changement de structure.

Au stade suivant, on constate l'enroulement du limbe qui ne com-

mence pas avant que la larve ait atteint une certaine taille équivalente à peu près au tiers de sa taille définitive.

L'enroulement du limbe foliaire vers la face inférieure résulte de l'augmentation de calibre des cellules du parenchyme en palissade et de l'épiderme supérieur, par un processus analogue, en partie du moins, à celui que l'on observe dans l'enroulement marginal produit sur les mêmes feuilles par un Phytoptide, *Cecidophyes truncatus* Nal. Chaque cellule grandit pour son compte, mais ici le bord de la feuille ne subit aucune elongation. Les tissus gallaires sont formés par les tissus foliaires modifiés pendant leur développement; il n'y a à aucun moment formation d'une zone génératrice. Il en résulte que les feuilles qui sont ainsi enroulées paraissent plus étroites que les autres, leur propre substance contribuant à former l'enroulement marginal. Cette différence est la caractéristique essentielle de ces deux espèces d'enroulements. Dans l'acarocécidie, il s'établit une zone génératrice subterminale, parce que les tissus situés entre le faisceau le plus proche du bord de la feuille et le sclérenchyme marginal se transforment en méristème; le cloisonnement de cette zone génératrice produit la cécidie; la feuille subit un accroissement dans le sens du limbe; cette elongation est visible à la loupe et même à l'œil nu, parce que les denticules du limbe sont modifiés dans leur disposition régulière, l'un d'eux est remplacé par un méplat légèrement épaissi, correspondant au faisceau hypertrophié.

L'enroulement produit par la Cécidomyie se complique d'un autre phénomène qui se produit en même temps et qui se traduit par l'irrégularité du galloïde. L'augmentation des cellules du parenchyme en palissade et des cellules épidermiques atteint, en effet, son maximum aux endroits qui sont en contact avec la larve. Or un même galloïde peut renfermer plusieurs larves alignées les unes à la suite des autres; il s'ensuit qu'il se produit une série de bosselures séparées par des dépressions.

Comme la feuille grandit en même temps que la larve se développe, et que la cécidie s'accroît simultanément, il faut donc, dans le développement de cette dernière, tenir compte de deux facteurs : l'accroissement propre des tissus foliaires, et l'accroissement local exagéré des cellules en contact avec la larve cécidogène.

Quand l'enroulement renferme plusieurs larves, on peut dire en somme qu'à chaque larve correspond une cécidie qui se traduit à l'extérieur par un renflement. Entre les différents renflements existe une dépression, et dans cette dépression, le limbe n'est pas modifié au

point de vue histologique, mais coloré en rouge lorsque la cécidie est arrivée à maturité.

8^e Exemple. Formation de la galle d'*Asphondylia ononidis* Fr. Lw.

L'oviducte des *Asphondylia* paraît apte à perforer un tissu. Néanmoins, d'après les observations de Fr. Löw (*l. c.*, p. 161), *Asphondylia ononidis* n'entame pas plus que les autres Cécidomyies le tissu de la plante à laquelle ses œufs sont contiés ⁽¹⁾. Au moyen de son oviducte long et grêle, cet insecte peut déposer un œuf à l'intérieur d'un bourgeon, sur la jeune feuille en voie de formation, c'est-à-dire à l'endroit où s'insèrent les deux stipules. Celles-ci s'hypertrophient, se courbent, et leurs bords se soudent les uns aux autres, tandis que la feuille elle-même cesse de se développer davantage. Il en résulte une galle ovoïdale entourant la larve et couronnée par la minime feuille arrêtée dans son développement.

9^e Exemple. Formation de la galle de *Majetiola poae* Bosc
(pl. 43, fig. 10-11).

Prillieux [582] et Beyerinck [24] ont suivi le développement de cette cécidie. Franck a reproduit plus tard les observations de l'auteur français, mais sans rien y ajouter. Ici comme chez les autres *Majetiola*, l'insecte dépose ses œufs sur la face supérieure des feuilles de la Graminée (*Poa nemoralis*), et toujours sur la nervure médiane, de telle façon que leur grand axe est parallèle aux nervures. Les jeunes larves se rendent de là à la gaine, et parcourent ainsi une distance de 10 à 20 centimètres. Elles s'arrêtent sous la gaine, immédiatement au-dessus du nœud de la tige et s'y fixent. Le phénomène le plus remarquable qui apparaît maintenant dans la formation gallaire, c'est que cette formation ne commence pas autour de la larve, mais à une distance notable d'elle, sous forme de renflement en arête. Ce renflement est produit en majeure partie par les cellules épidermiques qui s'agrandissent. Un peu plus tard, les cellules sous-épidermiques prennent part à cet accroissement et la déformation s'étend sur une longueur de 1 à 2 centimètres. En cet état, elle présente des bords lobés et un peu incurvés. Quant à la larve, elle demeure immobile et paraît comme collée à l'épiderme par un liquide gluant. La gaine ne tarde pas à se

(1) J'ai observé que *Schizomyia galiorum* Kieff., dont l'oviducte paraît également apte à perforer un tissu végétal, n'entame pas davantage les fleurs de *Galium* auxquelles elle confie ses œufs.

fendre, et par cette déchirure sortent des filaments qui, en se recourbant, l'enveloppent elle-même en même temps que la tige. Par suite du développement des filaments, la gaine se trouve rejetée sur la partie de la tige opposée à celle en face de laquelle s'était produite la fente. Aussi la voit-on repoussée sur un des côtés du chaume aux parois duquel elle ne touche que par les bords de sa déchirure. Celle-ci ne se fait pas indifféremment sur un point quelconque de la gaine, elle se produit toujours à sa face ventrale. Il en résulte que la gaine se trouve placée vis-à-vis de la paroi de la tige qui correspondait à sa partie dorsale. Entre elle et la tige existe toujours un intervalle, c'est là qu'est l'insecte, et l'on peut considérer l'espace qu'il occupe comme constituant une sorte de loge insectifère, dont les parois sont formés d'un côté par la gaine et de l'autre par la tige.

Quand on observe seulement à l'extérieur la masse des nombreux filaments qui lient la gaine contre la tige, on peut croire, au premier abord, qu'ils naissent uniquement de la face de la tige, opposée à celle où est logée la larve, mais si on fait une coupe transversale, on voit aussitôt que de pareils filaments naissent de toute la surface de la tige, hormis l'endroit où est l'insecte, c'est-à-dire de tous les points qui ne sont pas couverts par la gaine. Il n'est pas rare cependant de voir quelques filaments ramper contre les parois de la partie de la tige située à l'intérieur de la loge. Comme ces filaments se recourbent tous vers la gaine, ils se recouvrent les uns les autres, et ainsi ceux qui naissent du point opposé à celui où est la loge sont au-dessus des autres, les cachent à la vue et apparaissent seuls à l'extérieur.

Selon Prillieux, les auteurs qui ont assimilé ces filaments à des racines ont basé leur opinion sur la considération de leur position auprès des nœuds et de leur aspect extérieur. Or, d'une part, ces filaments ne naissent pas au niveau même des nœuds, comme cela a lieu pour les racines, mais le plus souvent à une hauteur de 1 à 10 millimètres au-dessus. D'autre part la structure de ces filaments est différente de celle des racines : les filaments renferment au centre un faisceau de fibres à parois épaisses et ponctuées, qui émanent de la tige et sont semblables à celles de la tige, mais ce faisceau ne contient ni cellules médullaires ni vaisseaux en son centre; les racines montrent également un faisceau fibreux constitué des mêmes éléments que celui des filaments, mais on voit au centre de ce faisceau quatre ou cinq tubes ponctués fort gros. Prillieux en conclut qu'une pareille différence ne peut permettre d'identifier les filaments avec les racines.

Beyerinck prouve au contraire que ces filaments, de formation endogène, sont à considérer comme des racines adventives, parce qu'ils

sont capables de remplir les fonctions des véritables racines. L'auteur hollandais coupa une tige immédiatement au-dessous de l'amas de filaments et la planta ensuite en terre. Or les filaments se mirent à croître comme des racines ordinaires, et à l'aisselle de la feuille en contact avec la galle il se forma une pousse nouvelle.

IV. Les œufs des Cécidomyies (pl. 33).

On peut distinguer deux sortes d'œufs de Cécidomyies : les uns sont susceptibles de fécondation et produits par l'insecte parfait; les autres ne sont pas susceptibles de fécondation et sont produits par des larves. Comme nous avons parlé de ces derniers en traitant de la paedogénèse, il ne sera question ici que des premiers.

L'œuf des Cécidomyides est entièrement occupé par le vitellus qui se compose de minimes granulations mêlées à des gouttelettes adipeuses plus grosses et tenues en suspension dans une matière liquide. Comme les bords et les deux extrémités de l'œuf paraissent vides, on en peut conclure que l'on se trouve en présence d'une double enveloppe, une interne, entourant le vitellus, et une externe, détachée de l'interne et, comme celle-ci, transparente, molle et peu résistante. Ils varient suivant les espèces et peuvent différer par la forme, la couleur, le nombre et les dimensions.

1^{re} FORME. Si l'on compare entre eux les œufs des diverses espèces de Cécidomyies, on est frappé de la grande diversité de forme qu'on leur trouve. Tous ont cependant cela de commun qu'ils sont toujours plus longs que gros; il en est du moins ainsi pour toutes les espèces connues jusqu'à ce jour. Il est vrai que M. Rübsaamen dit avoir observé des œufs sphériques chez deux Cécidomyies qu'il a décrites comme nouvelles, mais dont l'une, nommée *Schizomyia propinqua*, est identique à *Schizomyia nigripes* Fr. Lw., et l'autre, appelée d'abord *Epidosis sociabilis* n. sp. i. l., puis publiée sous le nom de *Schizomyia sociabilis*, n'est autre chose que *Clinodiplosis Liebeli* Kieff.; mais comme j'ai examiné ces deux Diptères, j'ai pu me convaincre qu'ici encore l'auteur allemand a fait erreur. Les principales formes que j'ai observées jusqu'ici sont l'ovoidale, l'ellipsoïdale, la forme en fuseau, la cylindrique et la forme pédiculée.

La forme *ovoidale* est la moins allongée que je connaisse. Elle est peu fréquente. Je l'ai observée chez les espèces du genre *Cystiphora*, dont les œufs sont une fois et demie aussi longs que gros, avec un gros bout arrondi et une extrémité amincie. Nous trouvons encore cette forme, mais un peu plus allongée, chez quelques autres espèces;

c'est ainsi que les œufs d'*Oligotrophus Hartigi* Lieb., de *Winnertzia obscura* Kieff., de *W. rubra* Kieff. et de *Lestodiplosis rosea* Kieff. sont de 2 à 3 fois aussi longs que gros.

La forme *ellipsoïdale* est plus fréquente; la longueur égale alors de deux à trois fois la largeur et les deux bouts sont également gros et arrondis. Nous la remarquons entre autres dans le genre *Stefaniella*, chez *Oligotrophus capreae* Winn. et *major* Kieff., *Monarthropalpus buxi* Lab., *Lestodiplosis septemguttata* Kieff., *Camptomyia binotata* Kieff., *Peromyia Leveillei* Kieff., etc.

La forme *en fuseau*, c'est-à-dire amincie aux deux bouts, paraît encore rare. Citons comme exemple les œufs de *Mikiola fagi* Hart. et *Oligotrophus juniperinus* D. G. qui sont trois fois aussi longs que gros, ceux de *Perrisia lupulinae* Kieff., *Rhabdophaga clavifex* Kieff. et *Winnertzia pictipes* Kieff. qui sont quatre fois aussi longs que gros, ceux de *Perrisia persicariae* L. et *pratricula* Kieff. qui sont environ cinq fois aussi longs que gros. L'œuf d'*Asphondylia prunicola* Wachtl offre la transition entre la forme pédiculée et celle en fuseau.

La forme *cylindrique* est la plus fréquente. Les œufs que nous comprenons dans cette catégorie ont la forme d'un cylindre dont les deux bouts sont également arrondis. Citons comme exemples ceux de *Maye-tiola destructor* Say, *Clinodiplosis equestris* Wagn., *Cl. mosellana* Géh., *Joannisia sanguinea* Kieff. et *Brachyneura squamigera* Winn. qui sont trois à quatre fois aussi longs que gros; ceux de *Rhabdophaga pulvini* Kieff., *rosaria* H. Lw., *Perrisia tiliamrolvens* Rbs., *P. perichlymeni* Rbs., *Contarinia rumicis* H. Lw. qui sont de quatre à cinq fois aussi longs que gros; ceux de *Pseudohormomyia granifex* Kieff., *Rhabdophaga medullaris* Kieff., *Rhopalomyia Kiefferi* Trott. et *Colomyia clavata* Kieff. qui sont de cinq à six fois aussi longs que gros; ceux de *Rhabdophaga Pierrei* Kieff. et *Xylodiplosis praecox* Winn. dont les premiers sont six à sept fois, et les seconds sept à huit fois aussi longs que gros.

Fréquemment la forme cylindrique est combinée avec la forme ovoïdale; on y remarque alors un gros bout arrondi et une extrémité amincie. Tel est le cas pour les œufs d'*Asphondylia Hornigi* Wachtl et de *Hurmandia tremulae* Winn. qui sont trois à quatre fois aussi longs que gros, et pour ceux de *Janetiella thymicola* Kieff., *Winnertzia nigripennis* Kieff., *Frirenica tenella* Kieff. et *Leptosyna acutipennis* Kieff., tous quatre à cinq fois aussi longs que gros.

D'autres fois la forme cylindrique est combinée avec celle en fuseau; les deux bouts sont alors également amincis. Nous trouvons cette forme chez *Contarinia sorbi* Kieff., *Macrolabis Marteli* Kieff., *Perrisia*

galii H. Lw., *piri* Bouché et *scabiosae* Kieff., tous cinq à six fois aussi longs que gros (pl. 33, fig. 24).

La forme *pédiculée*, que j'ai signalée comme très rare en 1894, est au contraire celle que l'on trouve chez la plupart des nombreuses espèces qui composent le genre *Contarinia* (pl. 33, fig. 10-11, 13-14); je l'ai observé en outre dans le genre *Stenodiplosis* Reut. Dans ces cas l'œuf est cylindrique, ordinairement quatre à cinq fois aussi long que gros, et se prolongeant en un pédicule de longueur variable, qui se termine en pointe. Tantôt ce pédicule est très court, par exemple chez *Contarinia pisi* Winn., où il n'atteint que le huitième de la longueur de l'œuf, *C. picridis* Kieff. où il égale un sixième, et *C. ballotæ* Kieff. où il mesure le cinquième; tantôt il atteint le quart de cette longueur, par exemple chez *Stenodiplosis geniculati* Reut. et *Contarinia lonicerearum* Fr. Lw., ou le tiers, comme chez *C. aprilina* Kieff. et *C. scabiosae* Kieff., ou la moitié, ce qui est le cas pour *C. aequalis* Kieff., *C. corylina* Fr. Lw., *C. pulchripes* Kieff. et *C. pilosellæ* Kieff., ou les deux tiers, comme chez *C. Schlechtendaliana* Rbs., où enfin les quatre cinquièmes, comme chez *C. dactylidis* H. Lw. et *C. anthonoma* Kieff.; tantôt il égale presque la longueur de l'œuf, ce qui est le cas pour *C. avenae* Kieff. où la dépasse même, par exemple chez *C. arrhenatheri* Kieff., *viburni* Kieff. et *tritici* Kirb. (1).

2° COULEUR. Les œufs des Cécidomyies offrent une coloration blanchâtre, ou d'un rouge variant du rouge pâle au rouge sang. A peu d'exceptions près, ils sont blanchâtres toutes les fois que l'abdomen du Diptère offre une couleur blanchâtre, citrine ou vitelline, et ils sont rouges quand l'abdomen est lui-même de cette couleur. Nous avons vu plus haut, en parlant des larves, que la coloration de celles-ci est indépendante de celle de l'œuf, et que l'on peut voir une larve rouge éclore d'un œuf blanchâtre et vice versa; peut-être la coloration varie-t-elle, dans ces cas, avec l'âge de l'œuf? C'est ainsi que l'œuf de *Clinodiplosis equestris* Wagn. est, selon Wagner, blanc au début, puis rosé et enfin d'un rouge sang.

3° NOMBRE ET DIMENSIONS. L'abdomen d'une Cécidomyie femelle renferme en moyenne de 80 à 100 œufs. J'ai trouvé, pour beaucoup d'espèces, un chiffre bien supérieur, par exemple 126 chez *Perrisia per-*

(1) Il est étonnant que parmi les nombreux auteurs qui ont traité jusqu'ici de cette Cécidomyie du Blé, aucun n'ait signalé la forme pédiculée des œufs. B. Wagner en indique même la forme, les dimensions et la couleur, mais n'a pas remarqué le pédicule; il est probable que cet auteur a observé et décrit les œufs de *Clinodiplosis mosellana* Géh. (*aurantiaca* Wagn.) et qu'il les a pris pour ceux de *Contarinia tritici*.

sicariae L. ; 145 chez *Rhabdophaga Pierrei* Kieff. ; 180 chez *Porricondyla albimana* Winn. ; 190 chez *Janetiella thymicola* Kieff. ; 200 chez *Rhabdophaga clavifex* Kieff. et *Oligotrophus Hartigi* Lieb. ; 220 chez *Perrisia piri* B. ; 280 chez *Rhabdophaga rosaria* H. Lw. ; environ 300 chez *Winnertzia nigripennis* Kieff. ; entre 300 et 400 chez *Perrisia inclusa* Fraenkel. J'en ai trouvé moins de soixante chez peu d'espèces, par exemple chez *Winnertzia rubra* Kieff., *W. obscura* Kieff. et *Clinorhyncha tanacetii* Kieff. qui en renfermaient de 50 à 60 ; et chez *Campatomyia binotata* Kieff. qui n'en contenait qu'une vingtaine. Selon Laboulbène, les œufs de *Monarthropalpus buxi* Lab. ne seraient qu'au nombre de 10 à 12 ; j'ai observé le même insecte et j'ai toujours trouvé 60 à 80 œufs.

Les œufs des espèces à génération paedogénétique sont remarquables par leur petit nombre, qui est seulement de quatre ou cinq, et par leurs grandes dimensions qui atteignent presque la longueur de l'abdomen du Diptère (pl. 33, fig. 8).

Quant aux œufs des autres espèces, on peut dire que leur longueur atteint en moyenne un tiers de millimètre. Laboulbène indique 0,1 mill. pour la longueur de l'œuf de la Cécidomyie du Buis, mais c'est sans doute par erreur ; d'après mes observations, ces œufs, de forme ellipsoïdale, comme le dit bien Laboulbène, mesurent 0,24 sur 0,11. Les plus petits que j'ai vus, appartiennent au genre *Cystiphora* ; chez *C. taraxaci* Kieff., ils mesurent 0,17 en longueur sur 0,09 en largeur au gros bout ; chez *Perrisia filicina* Kieff., 0,25 sur 0,05. Ceux de *Stefaniella atriplicis* Kieff. atteignent 0,26 sur 0,09 ; de *Dasyneura raphanistri* Kieff. et de *Perrisia rubicundula* Rbs. 0,30 sur 0,06 ; de *Contarinia corylina* Fr. Lw. et de *C. picridis* Kieff. 0,30 sur 0,05, sans le pédicule ; de *C. scabiosae* Kieff. 0,30 sur 0,07 ; de *C. acetosae* Kieff. et de *Rhabdophaga pulvini* Kieff. 0,32 sur 0,07 ; de *Contarinia pulchripes* Kieff. 0,33 sur 0,08 ; de *Rhabdophaga medullaris* Kieff. 0,35 sur 0,06 ; de *Contarinia ballotae* Kieff. 0,35 sur 0,07 ; de *Perrisia lychnidis* Heyd. 0,35 sur 0,09 ; de *Rhabdophaga Pierrei* Kieff. 0,40 sur 0,06 ; de *Rhabdophaga rosaria* H. Lw., *Perrisia lupulinae* Kieff. et *P. piri* Bouch. 0,40 sur 0,08 ; de *Contarinia rumicis* H. Lw. 0,40 sur 0,09 ; de *Harmandia cristata* Kieff. 0,40 sur 0,15 ; de *Perrisia capitigena* Bremi 0,42 sur 0,12 ; de *Contarinia arenae* Kieff. 0,43 sur 0,08 ; de *C. arrhenatheri* Kieff. 0,44 sur 0,08, tous deux à l'exclusion du pédicule ; de *Dicerura scirpicola* Kieff. 0,50 sur 0,09. Les plus grands appartiennent au genre *Hormomyia* ; ceux de *H. cornifer* Kieff. mesurent 0,60 sur 0,20. On voit par ce tableau que ce ne sont pas toujours les petites espèces qui ont les plus petits œufs. La femelle de *Rhabdophaga rosaria* est

plus de deux fois aussi grande que celle de *Perrisia piri*, et les œufs de ces deux espèces ont pourtant les mêmes dimensions.

Remarque. Dans trois cas, à savoir pour un *Winnertzia*, pour *Xylo-diplosis* et pour *Choristoneura*, j'ai observé, outre les œufs de forme très allongée, des corps ovoïdaux, ayant environ un tiers de millimètre en longueur, et offrant parfois une tache plus claire à leur gros bout.

§ 3. — DÉGATS ET REMÈDES.

Nous venons de voir, en décrivant les mœurs des Cécidomyies, que la plupart des espèces vivent aux dépens des plantes. A cette particularité de leurs mœurs se rattache une question d'entomologie appliquée, que nous abordons maintenant. Un certain nombre d'espèces de Cécidomyies occasionnent des dégâts considérables à la culture; on a essayé différentes méthodes pour arrêter leurs ravages; mais jusqu'à présent, comme l'expérience l'a démontré, le meilleur remède a été celui que fournit la nature, quand elle suscite un nombre suffisant de parasites qui anéantissent la redoutable armée des moucheron dévastateurs. Nous examinerons donc d'abord les Cécidomyies nuisibles et les moyens de les combattre, puis nous dirons quelques mots de leurs ennemis naturels.

I. — Cécidomyies nuisibles et moyens de les combattre.

Il ne peut être question ici que des Cécidomyies phytophages, et encore faut-il en éliminer toutes celles dont la plante nourricière n'offre aucune utilité à l'homme. Les espèces phytophages étant restreintes de la sorte, on peut dire de la plupart d'entre elles qu'elles n'occasionnent que des dégâts insignifiants.

Citons comme exemple *Mikiola fugi* Hart. Le poids de quinze galles de cette espèce correspond, selon Büsgen [57] à celui de six feuilles; trois galles absorbent par conséquent autant de substance qu'une feuille. Or, certaines années, ces galles sont tellement nombreuses sur le Hêtre, que le limbe des feuilles en est tout couvert; celles-ci paraissent alors courbées par en bas ou diversement contournées et ne peuvent sans doute plus être de grande utilité à l'arbre. J'ai constaté en Lorraine une invasion semblable à celle qu'observa Altum, en 1871, en Allemagne et dans le Tyrol, et qu'il décrivit ainsi : « Les feuilles étaient tellement couvertes de ces galles, que les arbres jusqu'à une hauteur de dix mètres, offraient un aspect étrange, et que leurs branches pliaient sous le poids de plusieurs millions de galles. L'année suivante, les galles étaient plus rares que d'ordinaire » [2, t. III, p. 296].

Il y a cependant un nombre plus restreint d'espèces qui occasionnent des dégâts considérables et parfois de véritables désastres, quand elles apparaissent en grande quantité. Les unes s'attaquent aux produits des jardins; les autres, aux arbres des forêts; les dernières enfin, de beaucoup plus redoutables, nuisent à l'agriculture.

1^o Cécidomyies nuisibles à l'horticulture.

Parmi les espèces à rapporter ici, les unes s'attaquent aux fruits, ou aux fleurs, c'est-à-dire aux poires, aux groseilles et aux fleurs des Rosiers cultivés; les autres font périr les greffes, ou nuisent d'une autre façon aux arbres fruitiers ou aux arbrisseaux des jardins.

***Contarinia pirivora* Riley.**

Cet insecte vit, à l'état larvaire, à l'intérieur des jeunes poires dont il occasionne la perte. « Vers le 12 du mois d'avril, écrit Schmidberger [668], au moment où les pétales des fleurs du Poirier commençaient à apparaître entre les sépales du calice, j'observai la première Cécidomyie occupée à y déposer ses œufs. Posée sur le milieu du bouton à fleur, elle perceait ⁽¹⁾ les pétales au moyen de son oviducte long et grêle, et déposait ses œufs sur les étamines de la fleur encore fermée. L'opération dura environ sept minutes et demie. Après qu'elle se fut envolée, je coupai en deux le bourgeon qu'elle avait percé, et j'y trouvai les œufs entassés sur les anthères. Ils étaient blancs, allongés, pointus à un bout, transparents et au nombre de 10 à 12. J'aperçus ensuite, du 12 ou 18 avril, d'autres femelles occupées à pondre; j'en vis même une qui s'était posée sur le côté de la fleur, de sorte qu'elle eut à percer non seulement la corolle, mais encore le calice ⁽²⁾. Une autre, pour laquelle l'opération avait duré plus longtemps qu'à l'ordinaire, demeura fixée à la fleur, ne pouvant plus en dégager son oviducte... Le nombre des œufs déposés dans une fleur est variable : tantôt je n'en trouvai que quelques-uns, d'autres fois plus de vingt. » Ce chiffre peut encore être dépassé, car Géhin écrit [163] : « Dans certaines poires on n'en compte que 15 à 20, tandis que dans d'autres, en 1858 surtout, j'en ai trouvé jusqu'à 70 et même 80. » L'éclosion se fait rapidement,

(1) L'insecte introduit sans doute son oviducte grêle et flexible entre les pétales, mais sans les blesser.

(2) Elle a peut-être déposé ses œufs sur le calice, ou profité d'une ouverture qu'un autre insecte, par exemple un Rhynchophore, aura pratiquée à cet endroit.

surtout quand le temps est chaud. « Dès le quatrième jour qui suivit la ponte, continue Schmidberger, je trouvai les jeunes larves fraîchement écloses et en train d'émigrer vers l'ovaire, où on les trouve complètement installées avant l'épanouissement de la fleur; de cette façon, elles évitent le contact des rayons du soleil qui leur sont très nuisibles. Arrivées au centre de l'ovaire, elles commencent à en dévorer l'intérieur (1). Quand elles ont mangé toute la pulpe de la poirette, elles ont aussi atteint tout leur développement et n'attendent plus qu'une occasion favorable pour déloger. Cette occasion se présente à la première pluie; les poirettes pourrissent alors, se fendillent et laissent sortir les jeunes larves qui se courbent en arc et s'élancent au loin, pour se rendre ensuite en terre. Je me suis convaincu que ces larves ne se faisaient aucun mal en sautant de la sorte. Une d'elles, qui avait sauté à trois reprises d'une hauteur de 9 pieds sur le plancher d'une chambre, pénétra en quelques secondes dans la terre sur laquelle je la déposai.

« S'il ne pleut pas, elles attendent que la poirette se détache, tombe à terre, et y pourrisse par son contact avec le sol humide, de manière à permettre ainsi aux jeunes larves d'en sortir, ou bien celles-ci se fraieront un chemin à travers la paroi de leur prison, ce qui n'a lieu qu'exceptionnellement. En règle générale, elles demeurent longtemps renfermées dans la poirette couchée à terre, sans pouvoir en sortir. Je ramassai un jour quelques poirettes qui, à l'extérieur, ne paraissaient nullement déformées et je les déposai, les unes dans ma chambre, les autres sur la terre d'un pot de fleurs; or, à la mi-juillet, en ouvrant ces poires couvertes de moisissure, j'y trouvai à l'intérieur les larves entassées et pleines de vie; après avoir extrait ces dernières, je les mis en contact avec de la terre humide et la plupart d'entre elles se hâtèrent de s'y enfoncer. » Schmidberger ne fut pas le seul à remarquer que les larves attendent une pluie pour se rendre en terre. Géhin fait la même remarque, et Riley la confirma. « Il semble, dit ce dernier, que les larves quittent le fruit de préférence pendant une pluie d'orage ou que peut-être la pluie en pénétrant à travers les fentes jusqu'à l'intérieur du fruit, les force à déloger. L'extrait suivant d'une lettre de M. Col le prouve : Nos ouvriers s'occupaient un jour de la cueillette des poires attaquées par la Cécidomyie, lorsqu'une violente pluie d'orage les força d'interrompre leur ouvrage pendant une heure ou deux.

(1) Il est évident que les larves de Cécidomyies ne peuvent pas dévorer l'intérieur d'un fruit. Celles-ci, comme toutes les autres, se contentent de sucer les parties liquides.

Retournant à leur occupation à la fin de l'orage, ils constatèrent qu'un panier rempli au delà de la moitié de poirettes infestées, fourmillait de larves qui sautillaient dans toutes les directions. Toutes avaient quitté les fruits et cherchaient à sortir du panier. Les ouvriers examinèrent ensuite les poires attaquées, encore fixées à l'arbre, et constatèrent qu'elles étaient vides : toutes les larves en étaient sorties pendant la pluie » [596, p. 284]. « Si le temps est sec, écrit Géhin, il arrive que des poires qui contiennent des larves de *Cécidomyies* se dessèchent complètement et que cette sécheresse, jointe à la contraction que subissent les poirettes, font périr toutes les larves contenues dans ces jeunes fruits. Cette dernière circonstance a surtout été très facile à observer en 1858 dans certains jardins des environs de Metz, où, dès la fin de mai, le Doyenné d'hiver avait la moitié de ses fruits desséchés et où l'on trouvait dans l'intérieur durci et racorni les petites larves mortes et desséchées (1). »

Il est à remarquer que ni Schmidberger ni Géhin ne parlent d'une déformation du fruit; bien plus, le premier, comme nous venons de le voir, dit expressément qu'il a trouvé des larves « dans des poirettes qui, à l'extérieur, ne paraissaient nullement déformées ». Riley dit au contraire : « Les fruits attaqués croissent et offrent bientôt une forme un peu contournée, ou irrégulière et un peu bosselée, ou d'autres fois arrondie d'une façon anormale. Si l'on ouvre une de ces jeunes poires, le dedans paraît creusé, les graines écartées et comme rongées et tout l'intérieur désorganisé. Les larves d'un blanc jaunâtre, au nombre de 10 à 30, paraissent entourées de déjections en forme de granulations, et sont fixées à la chair du fruit; en grandissant, elles absorbent la

(1) Je n'ai jamais trouvé de larves de *Sciarines* dans les envois qui m'ont été faits. Il n'est pas étonnant que les *Sciara* qui déposent leurs œufs sur toutes les matières végétales en décomposition les pondent aussi sur les poirettes qui commencent à pourrir, mais on a tort de leur attribuer ensuite des dégâts qu'ils n'occasionnent pas. Le *Sciari piri* Schmidb. et le *Sciara Schmidbergeri* Koll. ne sont donc absolument pas à considérer comme nuisibles au Poirier. Quiconque s'occupe de l'élevage des *Cécidomyies*, sait qu'on obtient souvent avec les *Cécidomyies* des éclosions de *Sciara* en plus ou moins grand nombre. Quant à la larve que Schmidberger décrit comme étant celle de *Sciari piri* et dont la tête « est pointue, avec deux taches noires sur le devant », c'est évidemment celle de la *Cécidomyie* et non celle d'un *Sciara* ; c'est ce que Géhin a déjà remarqué, quand il a écrit : « En rapprochant ce qui précède de ce qui a été dit à propos de la larve de la *Cécidomyie*, on voit que, sauf la taille qui est différente, on peut croire qu'il s'agit du même insecte. »

pulpe, mais d'ordinaire elles ne parviennent pas à absorber tout l'intérieur du fruit » [l. c., p. 283-284]. On serait tenté de croire, d'après cela, que l'espèce observée en Amérique, est différente de celle d'Europe. Il n'en est rien; car toutes les poirettes que j'ai reçues des localités indiquées par Géhin, ainsi que celles que M. Ferrand m'a envoyées du Luxembourg, avaient une forme bosselée et très irrégulière, avec une grande cavité interne, et les larves qu'elles contenaient, concordaient en tous points avec celles que Riley m'a envoyées. Le seul point pour lequel Riley ait fait erreur, c'est quand il parle des déjections granuleuses de la larve; pas plus ici que chez les autres larves de Cécidomyïes on ne voit trace de déjections.

Notons encore que les différentes sortes de poires ne sont pas également attaquées. D'après une citation de Riley (p. 285), l'insecte aurait sa poire favorite. « Je n'ai pas trouvé une seule larve, dit-il, dans les poires d'Anjou et de Seckel, et seulement un petit nombre dans les variétés autres que celles de Lawrence. Quant aux 125 arbres appartenant à cette dernière variété, ils avaient un sixième de leurs fruits infesté. »

C'est vers la mi-mai, par conséquent au bout de quatre à cinq semaines, que les larves, arrivées à leur maturité, cessent de prendre de la nourriture et cherchent à gagner le sol. La profondeur à laquelle on les trouve en terre est en moyenne de 2 à 3 centimètres, selon Riley; de 8 à 10 centimètres, selon Géhin [163, p. 325, note]; elles y demeurent un temps plus ou moins long, avant de se former un cocon. Celui-ci est blanchâtre, mince, ovoïdal et couvert de terre qui y adhère. Le changement en nymphe se produit quinze jours avant l'apparition de l'insecte parfait. Cette espèce n'a qu'une génération par an.

Historique. — Schmidberger observa le premier, en Allemagne, vers 1830, la Cécidomyïe des poirettes et crut y reconnaître l'espèce décrite par Meigen sous le nom de *Cecidomyia nigra* Meig. La description donnée par Meigen ne permet nullement de reconnaître l'insecte qu'il a eu sous les yeux. De là vient que Macquart s'est également trompé, en croyant voir *Cecidomyia nigra* Meig., une première fois, dans une espèce qui vit sur les chatons du Bouleau [429, p. 436], et, une seconde fois, dans une autre qui vit sur le Charme [ibid., p. 448]. Plus tard, après que Nördlinger l'eut encore une fois signalée pour l'Allemagne, Géhin l'observa pendant les années 1857 et 1860 en Lorraine, aux environs de Metz, et trouva que, dans certains jardins, la moitié des jeunes poires périssaient sous l'influence de l'insecte.

En 1885, Smith, et l'année suivante Riley, la signalèrent aux États-

Unis. D'après ce dernier, l'insecte leur aurait été importé d'Europe. Cela paraît en effet fort probable, car d'une part l'insecte est le même, comme je m'en suis convaincu par les types de l'imago, que Riley m'a envoyés; et, d'autre part, il paraissait d'abord confiné, en Amérique, dans un verger situé près de Meriden; or le propriétaire de ce verger avait fait venir de France, en 1874, un grand nombre de jeunes poiriers sur lesquels il fit greffer des variétés américaines; avant cette époque, il n'y avait pas trace de la Cécidomyie des poires, mais une année ou deux après cette date, il constata, pour la première fois, la présence du parasite.

Plus tard, Bloomfield l'a encore signalé à Hastings, en Angleterre, et tout récemment M. Ferrand l'a découvert dans le grand-duché du Luxembourg. Le nom de *pirivora* Ril. doit demeurer à cet insecte, puisqu'il n'est nullement prouvé que *Cecid. nigra* Meig. lui soit identique.

Remède. — Le moyen le plus simple et en même temps le plus efficace pour détruire la Cécidomyie des poirettes, consiste, selon Riley, à cueillir, un peu avant la mi-mai, toutes les poires bosselées, et à les brûler ou bien à en nourrir les porcs, avant que les larves n'aient eu le temps d'en sortir.

***Clinodiplosis piricola* Nördl.**

Cette espèce a les mœurs du précédent, et c'est sans doute pour ce motif que Riley, selon l'avis que Mik lui en avait donné, l'a considérée comme probablement identique à *pirivora* Ril. Pour moi, l'insecte décrit par Nördlinger sous le nom *Cecidomyia piricola* diffère de *pirivora* Ril. et doit faire partie du genre *Clinodiplosis* Kieff. En effet : 1° la coloration est autre chez *piricola*, la partie postérieure de la poitrine et l'abdomen étant d'un rouge vif; 2° la tarière ne paraît pas être protractile, car Nördlinger n'en fait aucune mention, tandis que dans sa description de *Cecid. nigra* Meig., il écrit : « tarière aussi longue que le corps »; 3° comme des poirettes recueillies aux environs de Metz, renfermaient quelques larves rouges de *Clinodiplosis* mêlées aux larves jaunâtres de *Conturinia*, je crois pouvoir rapporter ces larves rouges à l'insecte décrit par Nördlinger. Géhin a probablement aussi observé ces deux sortes de Cécidomyies et confondu l'une avec l'autre; il parle, en effet, de « larves blanches, jaunes ou rougeâtres et de taille variable, qui se trouvent dans les jeunes poires » [l. c., p. 325]. D'autre part, il écrit : « Au sortir des jeunes poires, les jeunes larves n'ont qu'à se laisser tomber sur le sol, ce qu'elles font sans se blesser »; ceci est vrai

pour les larves du *Clinodiplosis*, mais non point pour celles de *Contarinia pirivora*, qui sont douées de la faculté de sauter.

Perrisia piri Bouché.

Les larves blanches de *P. piri* forment un enroulement marginal sur les feuilles du Poirier. Selon Macquart, « elles sont quelquefois très nuisibles au Poirier en racoquillant l'extrémité des jeunes tiges et en occasionnant la courbure du tronc ». H. Loew dit du même insecte : « Si l'année est sèche, les pousses dont les feuilles sont déformées de la sorte se dessèchent et périssent. » D'après mes observations, cet insecte est généralement inoffensif, à moins qu'il ne s'attaque aux pousses des greffes, ce qui amène alors le dessèchement de celles-ci.

Une Cécidomyie encore inconnue s'attaque de la même façon à l'Abricotier selon H. Loew [404, p. 376].

Perrisia mali Kieff.

Les larves rouges de cette espèce produisent sur le Pommier des dégâts analogues à ceux que nous venons de voir pour le Poirier, c'est-à-dire un enroulement marginal des feuilles et le dessèchement des jeunes greffes, quand celles-ci ont été attaquées.

Oligotrophus Bergenstammi Wachtl.

Cet insecte, qui n'a encore été signalé qu'en Italie et à Corfou, déforme les bourgeons et les pousses du Poirier et de *Pirus salicifolius* Lois. Les bourgeons dans lesquels la femelle a déposé ses œufs se changent en une production entièrement ligneuse, conique ou sphérique, de la couleur de l'écorce, laissant reconnaître plus ou moins distinctement, à sa surface, les vestiges des feuilles entre lesquelles se trouvent les loges larvaires. Celles-ci sont ovalaires, tapissées d'un cocon brun et brillant et enfoncées dans la couche ligneuse; chacune d'elles fait saillie au dehors, sous forme d'élévation hémisphérique, un peu aplatie, d'un diamètre de 2 mill. et entourée d'un anneau de feutrage gris; cette élévation hémisphérique, ombiliquée en son centre, forme en quelque sorte le couvercle de la loge larvaire, et se trouve soulevée et détachée par la nymphe au moment de l'éclosion. Quand plusieurs bourgeons voisins se trouvent déformés de la sorte, il en résulte un renflement et un raccourcissement de l'espace internodal.

Asphondylia pruniperda Rond.

Observée seulement en Italie, cette espèce, comme son nom l'in-

dique, fait avorter les fruits du Prunier domestique (*Prunus domestica*). Elle dépose ses œufs dans une fleur qui se change en galle. On ne l'a plus retrouvée depuis Rondani.

Contarinia ribis Kieff.

Les larves blanches et sauteuses de *C. ribis* vivent dans les fleurs du Groseillier épineux. Les fleurs attaquées grossissent, demeurent fermées, et se dessèchent après la sortie des larves, sans donner de fruit. Les larves se rendent en terre vers la fin d'avril ou au commencement de mai, et en sortent comme insectes ailés, en mars de l'année suivante.

Pour empêcher leur multiplication, il faut cueillir et détruire, avant la sortie des larves, toutes les fleurs gonflées.

Lasioptera rubi Heeg.

Les renflements variqueux, de forme irrégulière, que l'on voit sur les tiges et les rameaux du Framboisier sont dus à *L. rubi*. Comme la métamorphose a lieu dans les galles, il suffit de couper celles-ci en automne ou en hiver, c'est-à-dire avant la sortie des insectes, et de les jeter au feu.

Clinodiplosis oculiperda Rbs.

Cet insecte est nuisible aux greffes. La première mention qui en a été faite, est due à E. von Moor [520, p. 105-107]. Cet observateur avait remarqué, en juillet et août, sur des greffes à écusson pratiquées sur des Pêchers, des Abricotiers et des Poiriers, de petites larves rouges logées entre les points de jonction des deux cambiums et arrêtant la croissance de la greffe. Un peu plus tard, mais encore dans le courant de la même année 1881, une communication anonyme [520, p. 175], signala ces mêmes « vers rouges » sur les greffes de Rosiers et l'on fit savoir qu'ils provenaient d'œufs déposés par une Cécidomyie dans les fentes de la greffe.

Le docteur Karsch les signala de nouveau en 1889 dans les termes suivants : « M. C. Schaufuss m'envoya en décembre 1887, de Dresde, des larves d'un Diptère encore inconnu qui, selon lui, sont très nuisibles à la culture du Rosier. Elles rongent ⁽¹⁾ l'insertion de l'œil dormant et détruisent totalement la greffe. Dans le courant des mois de septembre

(1) Cette expression est inexacte, puisque les parties buccales des larves de Cécidomyies ne leur permettent pas de ronger.

et d'octobre 1887 elles ont ruiné toute une pépinière de Rosiers. J'ai réussi à les détruire en partie avec de la ouate imprégnée de naphthaline. — La larve apode, péripneustique, a neuf paires de stigmates, deux lobes anaux pointus dépourvus de soies, une peau transparente couverte d'écailles chitineuses et une taille de 4 mill. Il ne peut être question que d'une Cécidomyie, mais je ne connais aucune espèce de cette famille ayant de semblables mœurs, de sorte que nous nous trouvons ici probablement en présence d'un nouvel ennemi de la culture des Rosiers. Déjà l'an dernier, des dégâts semblables m'ont été signalés d'une autre localité » [254 bis].

Clinodiplosis (?) rosivora Coquill.

Aux États-Unis, on a signalé de divers côtés la larve de cette Cécidomyie comme très nuisible aux Rosiers des serres. Elle vit au nombre de 4 à 6 dans les bourgeons à feuilles et les boutons à fleurs, qui jaunissent et se dessèchent. Les Rosiers étaient infestés à un degré tel que, dans plusieurs serres, certaines variétés n'avaient pu développer une seule fleur dans le courant de l'année. On a remarqué que l'insecte ne s'attaquait qu'à des variétés déterminées, à savoir, aux Rosiers nommés *Météore*, *Wootton*, *La France*, *Duchess of Albany*; aucune autre variété n'a été attaquée, bien que croissant parfois à côté d'une de ces quatre variétés dont tous les bourgeons étaient desséchés. Comme on n'a jamais trouvé ces larves en plein air, on en conclut qu'elles proviennent probablement des contrées tropicales. On en a fait mention pour la première fois en 1886, dans une lettre qui ne fut publiée qu'un peu plus tard (*Insect Life*, 1889, p. 284, et 1891, p. 294).

Neocerata rhodophaga Coquill.

Les mœurs de cet insecte sont absolument identiques à celles de l'espèce précédente. Les larves ont été observées par Dorsett sur les Rosiers appelés *Météore* et *La France*, dans des serres près de Washington [97 bis].

Clinodiplosis rosiperda Rbs.

Cette espèce, observée jusqu'ici en Westphalie par Rübsaamen, en Saxe par Thomas et en Lorraine par moi, s'attaque également aux fleurs des Rosiers cultivés, comme les deux précédentes, mais en pleine terre. Sa présence se reconnaît aisément aux roses entr'ouvertes qui se dessèchent sans s'ouvrir davantage. Les larves, de couleur rouge, vivent à la base des pétales et se métamorphosent en terre ou dans la fleur.

2^e Cécidomyies nuisibles à la silviculture.

Les espèces que nous mentionnerons ici nuisent aux arbres résineux et aux saussaies.

Perrisia abietiperda Hensch.

Les pousses terminales de *Picea excelsior*, habitées par les larves de cette Cécidomyie, paraissent en avril privées presque entièrement de leurs aiguilles, renflées par endroits, contournées, avec des bourgeons terminaux ordinairement atrophiés. Les loges larvaires, contenant alors une larve ou une nymphe, se voient le long de ces pousses déformées, partant du coussinet d'une aiguille et se dirigeant obliquement par en bas, traversant les couches corticale et ligneuse et atteignant sur de faibles pousses jusqu'à la couche médullaire. En même temps la base de ces pousses porte de nombreux trous de sortie, ce qui indique que l'insecte a deux générations par an, dont la première, éclore en avril ou en mai, forme des galles à la base de la pousse, et la seconde, apparaissant en juin ou en juillet, en forme vers le haut de la pousse. Cet insecte a été découvert en 1880 par Czech, en Autriche, et M. Martel l'a découvert plus tard en France.

Perrisia piceae Hensch.

La femelle de cette espèce dépose ses œufs dans les bourgeons des Épicéas. Quand ceux-ci commencent à s'ouvrir, les jeunes larves fraîchement écloses se rendent à la base des aiguilles inférieures et s'y fixent au côté qui touche l'axe de la nouvelle pousse. Par suite de leur succion, la base de l'aiguille s'élargit et forme une galle vésiculaire, dont les bords se rejoignent par-dessus la larve qu'ils emprisonnent complètement. On ne trouve au plus que sept galles à la base d'une pousse, et leur présence y détermine un renflement considérable. L'insecte arrive à sa maturité en automne et se métamorphose dans un cocon blanc, en avril; l'insecte ailé apparaît dans le courant du même mois. Mik soupçonne que *P. piceae* n'est que la forme hivernale de *P. abietiperda*.

Perrisia laricis F. Lw.

Cette espèce, comme son nom l'indique, vit aux dépens du Mélèze, auquel elle est parfois très funeste. Au printemps, quand les bourgeons du Mélèze commencent à s'ouvrir, la femelle dépose un œuf à la base du faisceau d'aiguilles entr'ouvert. Immédiatement après son éclosion,

la jeune larve se fixe au sommet du bourgeon qui se forme au centre de ce faisceau. Comme cet arbre ne produit de bourgeons au printemps qu'à l'extrémité de ses courtes pousses latérales, tandis que ses pousses terminales n'en formeront qu'à la fin de leur croissance en longueur, c'est-à-dire en automne, il s'ensuit qu'on ne trouvera jamais la larve que dans le bourgeon d'une pousse latérale. Au commencement d'août la larve n'a encore atteint que la moitié de sa croissance. Arrivée à maturité, à la fin de l'automne, elle se forme un mince cocon, dans lequel elle se changera en nymphe, en mars ou en avril de l'année suivante. Au moment de l'éclosion, selon von Tubeuf, le bourgeon s'ouvre en calice pour laisser passage à la nymphe.

Les bourgeons habités par une larve subissent la déformation suivante. Ils s'agrandissent et atteignent parfois un diamètre de 5 mill., grâce à une modification de leurs parties internes. Les minimes rudiments d'aiguilles, entourés par les écailles brunes du bourgeon, s'hypertrophient à leur base, s'élargissent et s'appliquent étroitement l'un à l'autre, donnant ainsi au bourgeon l'aspect d'une masse verte, compacte et charnue. Au milieu de cette galle, par conséquent au sommet du cône de végétation, se voit une excavation arrondie qui renferme la larve. Tous les bourgeons attaqués paraissent revêtus à leur extrémité d'une mince couche de résine transparente, ce qui les distingue encore facilement des bourgeons normaux. En hiver, selon Fr. Löw, ou ordinairement déjà en été, selon von Tubeuf, cette couche de résine subit une transformation : elle devient opaque, blanche et cassante.

Henschel [221], Fr. Löw [415] et Nitsche n'ont observé ces déformations que sur des bourgeons à aiguilles; ce dernier indique encore que les bourgeons attaqués réussissent parfois à continuer leur croissance et qu'ils prennent alors une forme cylindrique et allongée. Plus récemment, en 1897, le professeur von Tubeuf a publié sur ce sujet des observations nouvelles, qui complètent celles qui avaient été faites avant lui [754]. Henschel et Fr. Löw avaient observé les dégâts en Styrie, Nitsche à Tharand, en Prusse, et R. Hartig à Méran, dans le Tyrol, où les Mélèzes offraient un aspect étrange, parce que des branches en très grand nombre étaient entièrement mortes. De son côté, von Tubeuf les observa près de Munich également en telle abondance que des branches entières paraissaient desséchées et que d'autres contenaient la larve dans toutes leurs pousses latérales. Il remarqua que non seulement les bourgeons à aiguilles, mais encore les bourgeons à fleurs hébergeaient la larve. Sur certains rameaux à fleurs mâles tous les bourgeons paraissaient attaqués; leur forme toutefois n'était pas hémisphérique, comme celle des galles provenant de bourgeons à

aiguilles, mais en ovale allongé et avec des dimensions beaucoup plus grandes. « On ne trouve ordinairement les galles, dit cet auteur, que sur les pousses de la seconde année, celles de la première année n'ayant pas encore de pousse latérale et la mouche ne pondant que sur l'extrémité d'une pousse latérale qui vient de former son faisceau d'aiguilles. La pousse de l'année produit dans le courant de l'été, à l'aisselle des aiguilles, des bourgeons qui, au printemps de la seconde année, se développeront en des pousses latérales : ce sont principalement celles-ci que les Diptères choisissent pour y effectuer leur ponte ; mais comme, dans l'intervalle, le bourgeon situé à l'extrémité de la pousse terminale s'est développé lui-même en une pousse terminale, les galles se trouveront donc sur la pousse de l'année précédente.

« En règle générale la pousse attaquée ne se développe plus davantage. Mais il arrive parfois, pour cette pousse latérale, un fait analogue à celui qui se produit sur une pousse quelconque, quand on éloigne le bourgeon terminal. On sait, en effet, que si on enlève le bourgeon terminal, il en résulte pour les bourgeons latéraux une affluence de sève, grâce à laquelle les bourgeons les plus rapprochés de l'extrémité produiront une pousse allongée comme une pousse terminale. La même chose se produit ici : le bourgeon terminal et unique de la pousse latérale étant anéanti par la larve, il se forme à l'aisselle des aiguilles, et parfois en grand nombre, des bourgeons axillaires, auparavant déjà plus ou moins préparés, et visibles maintenant tout à l'entour de la cavité qu'occupait précédemment la larve et qu'ils finissent par envahir complètement. Ces petits bourgeons axillaires, qui se forment ainsi au printemps après la sortie de la larve, produisent des aiguilles normales, quand ils ne sont qu'au nombre de 1 ou 2, ou bien élargies, épaissies et courtes, quand ils se présentent en grand nombre. Dans le premier cas, ils forment des pousses axillaires normales qui peuvent de nouveau être attaquées au printemps suivant et se changer en galles. Parfois ils s'allongent considérablement ; on peut voir alors une pousse latérale portant sur ses côtés plusieurs pousses axillaires, et ces dernières, attaquées par la Cécidomyie, peuvent elles-mêmes produire plus tard des pousses axillaires. En outre, ces pousses axillaires, formées sur des pousses latérales, sont susceptibles de produire des fleurs mâles et femelles. »

***Cryptodiplosis brachyntera* Schw.**

On remarque bien des fois à l'automne que les rameaux des jeunes Pins, moins souvent de grands arbres, ont la plupart de leurs aiguilles jaunes, courtes et plus grosses que les normales. Si l'on en-

tr'ouvre la gaine de ces aiguilles, on y trouvera une larve rouge, qui se rend en terre ou sous les mousses au commencement de l'hiver. Quand les rameaux sont fortement infestés, il n'est pas rare qu'ils se dessèchent et périssent.

Rhabdophaga saliciperda Duf.

Les larves de cet insecte vivent dans les grosses branches et dans le tronc des Saules à feuilles étroites. La première mention qui en ait été faite, est due à Dufour, qui a observé ces déformations, en 1840, dans le Sud-Ouest de la France : « Les larves, dit-il, étaient logées dans un espace dénudé et malade d'un troac de Saule vivant. » H. Loew les signala pour l'Allemagne en 1851, et leur donna le nom de *Cecid. terebrans* n. sp. Dix ans plus tard Giraud les mentionna pour l'Autriche : « J'ai observé plusieurs fois, écrit ce dernier, sur les rives du Danube, près de Vienne, sur les Saules, et entre autres sur *Salix purpurea*, des espaces du tronc ou des grosses branches habités, en prodigieuse quantité, par cette espèce. A l'époque de l'éclosion de cette Tipulaire, le bois était comme lardé de ces robes de nymphes blanches, à moitié engagées dans l'écorce et exactement conformées comme l'indique M. Dufour. L'écorce des parties attaquées paraissait quelquefois dans des conditions normales; mais dans d'autres parties, la couche superficielle se détachait. Dans un cas, je remarquai un espace qui paraissait avoir été antérieurement ravagé et ensuite abandonné par l'insecte, mais, tout autour de cette place, se trouvaient de nombreuses dépouilles de nymphes; la dévastation allait progressivement en s'étendant. Un tronçon de saule conservé dans le Musée impérial de Vienne, est aussi à peu près dans les mêmes conditions » [182, p. 479-480]. D'après les exemplaires que M. l'abbé Pierre m'a envoyés de Moulins, on constate un renflement fusiforme très apparent, plus ou moins allongé, atteignant en moyenne de 1 à 2 décimètres en longueur; rarement ce renflement est unilatéral, en forme de bosselette et n'atteignant que quelques centimètres en longueur. Après la sortie de l'insecte, l'écorce criblée de trous se dessèche, puis se soulève et finit ordinairement par se détacher complètement et tomber, de sorte que les loges larvaires apparaissent au dehors. Celles-ci, de forme ellipsoïdale, longues de 1,5 à 2 mill., sont situées dans la couche ligneuse immédiatement en-dessous de l'écorce, et comme chacune d'elles correspond à un des trous dont cette dernière est criblée, elles sont donc tellement rapprochées, qu'elles ne seront souvent séparées l'une de l'autre que par une cloison, ce qui donne à la surface du bois l'apparence d'un réseau.

Comme Franck l'a remarqué, le bois dont se compose ces cloisons est brunâtre, et composé de fibres contournées qui offrent une autre direction que les fibres normales, aussi Ratzeburg (Waldverderbniss, II, p. 320) les considérait-il avec raison comme des excroissances qui se sont élevées autour et au-dessus des larves. Une coupe transversale du bois donne, selon Franck, le résultat suivant : à la couche ligneuse de l'année précédente succède une portion annulaire très mince offrant encore la constitution normale ; c'est la portion de couche qui s'est formée au printemps avant l'action des larves ; après cette portion normale, il s'en est formé une autre beaucoup plus épaisse, dans laquelle sont situées les loges larvaires ; celle-ci a subi une hypertrophie et se compose de cellules parenchymateuses lignifiées, relativement grandes, de forme irrégulière et contenant une masse brunâtre.

Rhabdophaga Giraudiana Kieff.

Cette espèce, très voisine de la précédente avec laquelle elle a été confondue, n'est connue que d'Autriche et de Lorraine. Giraud, qui l'a découverte, la décrit ainsi : « J'ai recueilli au mois de mars... plusieurs tiges de *Populus alba* vivantes, mais paraissant en souffrance et déformées par un gonflement fusiforme de plusieurs pouces de longueur. Ces tumeurs ont produit, du 1^{er} au 10 avril suivant, une quantité considérable de petites mouches qui ne se distinguent en rien de celles du Saule. Les dépouilles de leurs nymphes ont la conformation caractéristiques des premières et toute la surface de l'écorce en est comme entrelardée. Dans ce cas, comme dans le précédent, la couche ligneuse sous-corticale se trouve altérée et comme cariée, mais ici l'écorce est encore solidement adhérente partout » [l. c., p. 480].

Rhabdophaga Pierrei Kieff.

Cette espèce encore vit à l'état larvaire dans le bois des grosses branches et du tronc, mais elle n'a été trouvée jusqu'ici qu'en Lorraine, sur les Saules à feuilles larges et velues (*Salix aurita*, *cinerea* et *caprea*). La déformation n'offre jamais l'aspect d'un renflement fusiforme, comme chez les deux précédentes, mais seulement des bosselures irrégulières et peu visibles ; parfois même sa présence n'est trahie à l'extérieur que par les trous de sortie de l'insecte. Les loges larvaires sont moins rapprochées et autrement disposées que chez *R. saliciperda*, leur grand axe n'étant pas parallèle à l'axe de la branche, comme chez cette dernière, mais perpendiculaire à lui ; les larves sont donc enfoncées plus profondément dans la couche ligneuse. L'écorce, criblée de

trous, se dessèche au bout de la 2^e ou de la 3^e année, mais je n'ai pas remarqué qu'elle se fendille ou se détache. La branche ou le tronc se dessèchent un peu plus tard.

Rhabdophaga clavifex Kieff.

L'extrémité des pousses terminales des Saules est parfois renflée en massue, couverte de feuilles agglomérées et d'une pilosité anormale. Cette agglomération de feuilles est due à un raccourcissement des espaces internodaux. De nombreux bourgeons se trouvent donc rapprochés l'un de l'autre; chacun d'eux est déformé et contient une larve qui se métamorphose au même endroit. Cette déformation, visible surtout en hiver, produit la dessiccation de la pousse; c'est pour ce motif qu'Altum a donné à l'insecte qui l'occasionne, mais qu'il n'a pas décrit, le nom de *Cecidomyia apiciperda*.

Rhabdophaga medullaris Kieff.

La couche médullaire des pousses de divers Saules est souvent habitée par la larve de *R. medullaris*; la partie de la pousse qui est située au-dessus de la loge larvaire se dessèche.

Rhabdophaga salicis D.G., **dubia** Kieff. et **Karschi** Kieff.

Ces trois espèces forment des renflements ovoïdaux, fusiformes ou sphériques sur les rameaux des Saules, rarement encore sur un pétiole ou une nervure. Nous donnerons plus loin, en décrivant ces insectes, une description détaillée de leurs galles, ce qui est aussi le cas pour les espèces qui suivent.

Rhabdophaga rosaria H. Lw. et **rosariella** Kieff.

Ces deux espèces produisent sur les Saules une déformation des pousses terminales ou axillaires, connue sous le nom de rose du Saule.

Rhabdophaga pulvini Kieff., **superna** Kieff.
et **gemicola** Kieff.

Ces espèces vivent dans les bourgeons des Saules, et en occasionnent la perte. La première est située en dessous du bourgeon desséché sous le coussinet de la feuille; la seconde et la troisième sont logées dans le bourgeon même.

3^e Cécidomyies nuisibles à l'agriculture.

On peut classer ces espèces dans trois catégories différentes : les unes nuisent aux légumes, les autres au fourrage, les dernières aux céréales.

Contarinia pisi Winn.

Les larves sauteuses de cette espèce vivent dans les gousses des Pois et y font avorter les fruits. On les trouve aussi bien dans les Pois cultivés dans les champs que dans les diverses variétés cultivées dans les jardins.

Dasyneura brassicae Winn.

On trouve les larves de cette Cécidomyie, ordinairement en grand nombre, dans les siliques du Colza, où elles font avorter les graines. On les a signalées dans divers pays comme très nuisibles à la récolte du Colza.

Contarinia nasturtii Kieff. et **Perrisia raphanistri** Kieff.

Toutes deux vivent dans les fleurs d'un grand nombre de Crucifères, telles que les Choux, les Navets, les Radis, le Colza, etc., elles y provoquent un renflement et empêchent la formation du fruit.

Contarinia onobrychidis Kieff. et **medicaginis** Kieff.

Ces deux espèces sont nuisibles au fourrage. La première vit à l'état larvaire dans les fleurs du Sainfoin, et la seconde dans celles de la Luzerne. J'ai observé en Lorraine des champs de Sainfoin aussi bien que de Luzerne, dont les fleurs étaient en majeure partie attaquées, paraissant gonflées et demeurant fermées ; la récolte de la semence était par suite complètement manquée.

Perrisia flosculorum Kieff.

Celle-ci déforme d'une façon analogue les fleurs du Trèfle (*Trifolium pratense*) et y empêche de même la formation des graines.

Lasioptera devastatrix Skuse.

Selon Skuse, cette Cécidomyie est extrêmement funeste aux récoltes de foin en Australie. Les Graminées attaquées jaunissent et se dessèchent. On a constaté que des localités, auparavant indemnes, ont été envahies par le fléau après qu'on y avait importé du foin infesté.

Cecidomyia sorghicola Coquil.

Le Dr Coquillet cite cette espèce, propre au Nord de l'Amérique, comme nuisible au Sorghum, plante fourragère dont la culture est une source de revenus très importante pour certaines parties des États-Unis. La larve vit et se métamorphose dans le fruit, entre l'écorce et la graine, et occasionne la perte de cette dernière.

Contarinia tritici Kirb.

Cette espèce, ainsi que les suivantes, s'attaque aux Céréales. On trouve ses larves dans les épillets du Blé et du Seigle.

Plante nourricière. — Après l'accouplement des insectes ailés, les femelles quittent l'endroit de leur éclosion pour se rendre dans un champ de Blé ou de Seigle, afin d'y déposer leurs œufs. Il est à remarquer que cette ponte a lieu sur des épis qui commencent à sortir de la feuille qui leur servait de gaine avant la floraison. Une fois que le Blé entre en fleur et que les étamines paraissent, les Cécidomyies cessent d'y pondre, car le grain serait trop avancé lorsque les œufs donneraient naissance aux larves. Si dans un champ de Blé quelques épis sur les bords sont en retard pour la floraison, on trouvera encore sur eux les Cécidomyies occupées de la ponte. Selon B. Wagner, les premiers Diptères qui éclosent, alors que le Blé n'est pas encore entré en épi, confient leurs œufs au Seigle qui est plus précoce; un peu plus tard, le Seigle, étant entré en fleur, ne pourra plus leur convenir; les insectes qui suivront seront donc obligés de se rendre sur le Blé, dont l'épi commence alors à apparaître. Plus tard, après la floraison du Blé, les retardataires parmi les Cécidomyies n'auraient plus d'autre ressource que de confier leurs œufs au Chiendent (*Triticum repens*). Comme on ne cultive que le Seigle aux environs de Bitché, je n'ai pas pu constater si les indications de B. Wagner sont exactes. Je ferai remarquer seulement que la larve qui habite le Seigle a les papilles dorsales dépourvues de soie, tandis que celles des épillets du Blé aurait, selon M. P. Marchal [446, p. 66, fig. 2 et p. 68], ces papilles prolongées en une courte soie : « Chez *mosellana*, écrit-il, d'après les dessins de Wagner, les soies latérales et dorsales paraissent être notablement plus longues que chez *tritici*. »

Mais il est possible que le Dr Marchal ait fait son observation sur une larve différente de *C. tritici*; en tout cas, le segment anal qu'il représente à la figure 2 n'est pas celui d'un *Contarinia*.

Certains auteurs ont indiqué que *C. tritici* vit aussi sur l'Avoine et sur l'Orge. Il est probable qu'alors il y a eu confusion. Je trouve en

abondance des larves de Cécidomyies non point dans l'Avoine cultivée, mais dans l'Avoine pubescente (*Avena pubescens*) et dans l'Avoine Grande-Herbe (*Arrhenatherum elatius*); or ces larves appartiennent à deux espèces différentes entre elles et différentes de *C. tritici*, à savoir *Contarinia avenae* Kieff. et *arrhenatheri* Kieff. B. Wagner écrit de même qu'il ne peut ajouter foi aux assertions des auteurs, d'après lesquelles les larves de *C. tritici* vivraient aussi dans les épillets de l'Avoine et de l'Orge. Il s'appuie surtout sur l'observation suivante. On avait ensemencé avec de l'Avoine et de l'Orge des champs qui avaient porté, l'année précédente, du Blé infesté par la Cécidomyie. En juin, à l'éclosion des Diptères, Wagner constata dans ces champs d'Avoine et d'Orge des nuées de Cécidomyies fraîchement écloses, mais il ne put découvrir plus tard une seule larve dans les épillets de ces céréales.

Temps de la ponte. — En Angleterre, en France, en Prusse et en Lorraine, c'est au mois de juin qu'a lieu la ponte de cette espèce. Elle commence une ou deux heures avant la nuit, selon que le temps est plus ou moins serein. Si le temps est couvert ou pluvieux, quelques-unes se hasarderont en plein jour à vaquer à l'occupation de la ponte. Kirby écrivait déjà à ce sujet : « Depuis le 3 juin 1798 jusqu'à la fin du même mois, on pouvait voir chaque soir, sur les épis du Blé, les femelles du Diptère; avant sept heures on n'en apercevait ordinairement que peu, mais vers huit heures elles se montraient en extrême abondance et s'occupaient à déposer leurs œufs; enfin vers neuf heures elles disparaissaient de nouveau. Leur nombre était tel, que si chacune d'elles avait déposé ses œufs dans un épillet différent, plus de la moitié des grains aurait été perdue. J'ai observé sur un même épi douze femelles pondant simultanément. Et parmi ces myriades de femelles, pas un mâle! Le matin tout a disparu; mais si l'on secoue les tiges de Blé, on s'apercevra aisément que les insectes n'ont pas quitté l'emplacement, car ils apparaissent alors en grand nombre, en s'élevant de la base des tiges sur laquelle ils se tiennent cachés pendant le jour. » Asa Fitch et Bazin disent au contraire que la ponte dure toute la nuit. Tel est aussi l'avis de B. Wagner. « J'ai remarqué, écrit ce dernier, que le nombre des pondeuses ne diminuait jamais à l'approche de la nuit et j'ai encore observé celles-ci à plusieurs reprises, à quatre heures du matin. Mais ce qui acheva de me convaincre, ce fut une visite nocturne faite à un champ de Blé. Le 11 juin, à une heure du matin, je me rendis dans une localité où j'avais remarqué, la veille au soir, une multitude de Cécidomyies. Le ciel était couvert; çà

et là un éclair sillonnait les nues. Arrivé au but de ma promenade, j'allumai ma petite lanterne et je vis à ma stupéfaction, presque sur chaque épi, au moins une demi-douzaine de Cécidomyies occupées à pondre. Jamais je ne les avais vues en pareil nombre le soir. La lumière de la bougie parut les effaroucher, car elles mirent fin à leur occupation et voltigèrent autour de moi, comme pour m'exprimer leur mécontentement d'avoir été dérangées pendant leur œuvre des ténèbres. »

Écllosion et larves. — Les œufs sont déposés en paquet sur la face interne d'une glumelle. Au bout de huit ou de neuf jours ils donnent naissance à des larves qui sont d'abord blanches, puis d'un jaune vitellin. A peine écloses, celles-ci commencent leur migration vers l'ovaire. Selon Bazin, « le commencement de juillet est l'époque du plus grand concours de larves, la fin du même mois, l'époque de leur disparition. Pendant leur séjour, leur présence est accusée ordinairement à l'intérieur par une couleur livide que prend la glume à l'endroit où elles résident, c'est-à-dire vers sa base. On comprend que par un séjour assez prolongé et continu, cette place soit flétrie. » On trouve d'ordinaire de 5 à 10, rarement jusqu'à 20 ou même 40 de ces larves sur un ovaire. Elles s'y nourrissent des sucs qui sont attirés dans l'ovaire pour former le grain, et non point du pollen, comme le croyait Kirby. Si elles sont nombreuses, elles absorbent tous les sucs, et le grain fait complètement défaut; si elles sont au contraire en petit nombre, elles partagent avec le grain l'aliment qui devait revenir à celui-ci seul; dans ce cas, le grain sera amaigri, contourné ou tronqué, et formera ce que l'on appelle le *petit blé*.

Quand elles ont atteint leur entier développement ⁽¹⁾, les larves quittent l'épi, et, se courbant en arc, elles s'élancent dans l'espace pour aller subir leur métamorphose en terre, dans une profondeur de 2 à 10 centimètres, selon Wagner. La manœuvre du saut projette toujours la larve en avant à une distance de 6 à 20 centimètres et à une hauteur de 2 à 4 centimètres. Selon Wagner, les larves ne sortiraient qu'après

(1) A en croire B. Wagner, la larve, après sa sortie de l'épi, subirait encore deux mues importantes. Après la première, qui aurait parfois aussi lieu dans l'épi, la peau larvaire ne serait plus lisse, mais parsemée d'aspérités pointues et très petites, à l'exception de la tête et du segment anal; après la seconde, elle serait couverte de verrues en forme d'écailles, se couvrant par leurs bords. L'auteur a sans doute confondu ici la larve de *Contarinia tritici* avec celle de l'espèce suivante, car je n'ai jamais pu découvrir d'autres aspérités sur les larves de *C. tritici* sorties de l'épi que celles des verrues spiniformes.

une pluie et ne quitteraient pas les épis qu'on place sur de la terre humide, sans les humecter eux-mêmes; Omerod et P. Marchal font la même remarque. J'ai au contraire toujours observé que les larves quittent les épis que l'on a coupés, dès qu'elles sont arrivées à leur maturité; celles qui y demeurent sont parasitées.

La plupart des auteurs se sont trompés de même en indiquant que quelques larves se métamorphosaient dans les épillets qui les ont nourries, qu'elles étaient ainsi transportées avec les gerbes dans les granges, où elles échappaient au danger du battage et pouvaient devenir insectes parfaits l'année suivante. Comme nous l'avons vu plus haut, ces larves sont toutes parasitées.

Historique. — La plus ancienne mention de cette Cécidomyie remonte à l'année 1771 et se trouve consignée dans les « Philosophical Transactions » de Londres. Un peu plus tard, en 1797 et en 1800, deux autres Anglais, Marsham et Kirby, appelèrent de nouveau l'attention sur les ravages occasionnés par la Cécidomyie dans leur pays. Environ trente années plus tard, Gorrie évalue, pour quelques comtés d'Écosse, les dégâts occasionnés par le Diptère, à la somme de 20.000 livres sterling en 1827, de 30.000 en 1828 et de 36.000 en 1829 (*Encycl. of Agric. London*, p. 820). Bell écrit de Perthshire à la même date : « Encore une année ou deux comme celle-ci, et le Diptère qui ravage nos Blés aura mené à la banqueroute les deux tiers de nos fermiers » (*London's Magaz. of Nat. Hist.*, vol. II, p. 292). Vers la même époque, selon Buel (Judge Buel's Report, in *The Cultivator*, vol. VI, p. 26), ou dès 1820, selon Jewett (*New England Farmer*, vol. XIX, p. 304), on enregistrait aux États-Unis des dégâts considérables occasionnés par le même moucheron. Le fléau y rayonna de l'ouest de Vermont dans différentes directions; en 1832, il gagna les environs de New-York et y sévit avec tant de rigueur, que la plupart des fermiers renoncèrent pour quelques années à la culture du Blé. En évaluant ces pertes à prix d'argent, on a trouvé pour l'État du Maine seul qu'il perdit cette année pour plus de 5 millions de francs.

En France, le redoutable insecte fut observé pour la première fois en 1846 par le docteur Herpin, de Metz [226], puis signalé en 1856 par Bazin dans sa « Notice sur un insecte qui a causé les plus grands ravages dans nos dernières récoltes de Blé sur pied ». Hagen et B. Wagner en firent mention pour l'Allemagne en 1860 et en 1866.

Remède. — Asa Fitch et B. Wagner indiquent comme remède préventif de semer le Seigle plus tôt et le Blé plus tard, de sorte que le Seigle puisse fleurir avant juin et le Blé entrer en épi en juillet. Wagner re-

marque à ce sujet : « J'ai constaté une année que presque la moitié des épis de Blé offraient un aspect étrange; toute la moitié ou tout le tiers supérieur de ces épis était vide, tandis que la partie inférieure était remplie de grains. Je ne puis expliquer cela qu'en admettant qu'au moment où les épis du Blé commençaient à apparaître, les Cécidomyies se trouvaient à la fin de leur essaimage; si ce Blé avait donc été semé quelques jours plus tard, il aurait été complètement épargné, mais si on l'avait au contraire semé quelques jours plus tôt, les épis auraient été entièrement attaqués. » J'ai fait une observation analogue, à plusieurs reprises, aux environs de Bitche, mais l'aspect des glumes indiquait que la gelée était cause du dégât; comme la moitié inférieure de l'épi était encore recouverte par la dernière feuille au moment de la gelée, elle fut épargnée et put produire plus tard des fleurs et des grains, tandis que la partie supérieure, qui eut à subir les atteintes du froid, demeura vide.

Géhin indique une autre méthode préventive, qui consisterait à faire choix de variétés de Blé barbuës, et à glumes tomenteuses. Il remarqua que sur 308 épis, dont 259 étaient atteints par *Clinodiplosis mosellana* Géh., donc 85 0/0, il n'y en avait que deux appartenant à une variété barbuë qui fussent atteints par la Cécidomyie, tandis que 43 en étaient exempts.

Le meilleur moyen préventif me semble être l'alternance des cultures, comme elle a lieu dans beaucoup de communes en Lorraine, où le ban est divisé en trois parties, dont l'une est ensemencée en Blé ou en Seigle, l'autre en Orge ou en Avoine et la troisième en Trèfle, ou en Pommes de terre ou demeure en friche. Les Cécidomyies sortant de terre, dans des champs portant de l'Orge ou de l'Avoine, à une très grande distance des champs de Blé, perdront leur temps à chercher des tiges de Blé et périront pour la plupart avant d'être arrivées à ces dernières.

Quant aux moyens de destruction, Bazin conseille la chasse au filet pratiquée le soir au moment de l'essaimage. Cette méthode semble au premier abord peu pratique; pourtant l'auteur a déclaré dans une lettre à Géhin, avoir obtenu par là des résultats étonnants. B. Wagner préconise cette méthode comme étant la seule efficace et va jusqu'à demander que l'on fasse une loi obligeant chaque propriétaire à capturer avec un filet les Cécidomyies qui s'abattront sur son Blé!

Bazin propose encore le brûlis des éteules et le labour profond après la moisson. Je doute que le brûlis des éteules puisse incommoder les larves enfouies en terre. Quant au labour profond, il n'empêchera pas les larves, avant la métamorphose, ni la nymphe, au moment de l'é-

cllosion, de remonter vers la surface du sol. J'ai observé des larves déjà entourées de leur cocon, au fond d'un grand bocal, appliquées à la paroi du verre. Le bocal fut ensuite rempli de terre. Plus tard, au moment de l'éclosion, les nymphes se hissèrent à travers une couche de terre d'environ un décimètre et demi de hauteur, et parvinrent jusqu'à la surface, où l'éclosion eut lieu. B. Wagner écrit également : « Les myriades de Cécidomyies que j'ai vues voltiger au-dessus des champs labourés qui avaient porté, l'année précédente, du Blé ou du Seigle infesté, ne permettent pas de considérer le labour profond comme un moyen de destruction. »

B. Wagner recommande encore la destruction des résidus du battage, qui doivent renfermer un grand nombre de pupes. Cette méthode manque son but, puisque ces pupes produiront non point des Cécidomyies, mais des parasites.

***Clinodiplosis mosellana* Géh. (*aurantiaca* Wagn.)**

On trouve les larves de *C. mosellana*, avec celles de *C. tritici*, dans les épillets du Blé et du Seigle. Comme le genre de vie de ces deux espèces est le même, on comprendra qu'on ait pu confondre l'une avec l'autre, ou encore, comme l'a fait Bazin, considérer la seconde comme le mâle de la première. Un entomologiste de Metz, Géhin, a su reconnaître l'espèce nouvelle, et l'a décrite en 1857. Un peu plus tard, B. Wagner la signala pour les environs de Francfort et la décrivit sous un nouveau nom ⁽¹⁾.

Le dégât occasionné par cette espèce dans le département de la Moselle, en 1856, fut évalué par Géhin à deux millions de francs au minimum, c'est-à-dire à un chiffre représentant l'alimentation de la ville de Metz pendant deux années. Géhin ajoute que si les autres parties du département avaient été infestées au même degré que les environs de Metz, la perte se serait élevée à sept millions. Quant à *C. tritici*, il dit expressément que, pendant cette année, il ne l'a pas observée en Lorraine.

Remèdes. — Le genre de vie étant le même que celui de *Contarinia tritici*, les moyens préventifs et de destruction seront donc les mêmes que pour cette espèce.

(1) Selon Wagner, la larve de cette espèce, quand elle quitte l'épi, serait lisse comme celle de *C. tritici*; après une mue subséquente, elle serait parsemée d'aspérités pointues et munie de papilles avec soie, que Wagner appelle des spinules. Cette observation est erronée et démontre que Wagner a confondu les larves des deux espèces.

Mayetiola destructor Say.

Cet insecte, connu encore sous le nom de *Mouche de Hesse* (Hessian Fly des Anglais et des Américains), vit, à l'état larvaire, caché sous la gaine d'une feuille, fixé à la base de la tige du Blé, du Seigle, et, à en croire B. Wagner, encore de l'Orge, et y produit un faible renflement. Des espèces voisines de celles-ci, mais en différant spécifiquement, ont été observées sur l'Avoine cultivée et sur les Graminées sauvages; divers auteurs les ont confondues avec la Mouche de Hesse et en ont conclu que *C. destructor* pourrait vivre aussi sur les herbes sauvages. Les expériences avec résultat négatif que Forbes a essayées sur *Phleum pratense*, *Agrostis vulgaris*, *Poa pratensis*, *Dactylis glomerata* et *Setaria* (sans pieds de Blé témoins) et surtout celles du docteur P. Marchal sur *Bromus pratensis*, *Bromus mollis*, *Dactylis glomerata*, *Festuca pratensis*, *Alopecurus pratensis* et *Holcus lanatus* (avec pieds de Blé qui se trouvaient au nombre de un ou de deux dans la même caisse et qui furent contaminés) prouvent que la Mouche de Hesse ne peut pas se développer sur ces différentes sortes d'herbes sauvages.

Selon les observations de Marchal, il peut y avoir jusqu'à quatre, cinq et même six générations par an. La dernière génération pond ses œufs sur les feuilles des jeunes pieds de Seigle ou de Blé. Comme ces plantes n'ont pas encore de tige articulée au moment de l'invasion, et que la gaine des feuilles sort du collet de la racine, on y trouvera donc les larves sous ces gaines, au collet de la racine. D'après les observations de B. Wagner, les jeunes pieds d'Orge, provenant de grains qui sont tombés à terre pendant la moisson et qui ont germé dès le mois d'août, hébergent les larves en plus grande quantité que les jeunes pieds de Seigle provenant de grains semés à la mi-septembre. A défaut de jeunes tiges, les œufs seront déposés sur les rejets qui se forment à la base des éteules. Les jeunes plantes atteintes paraissent bientôt jaunâtres et finissent par se dessécher complètement. A la fin de décembre, quand elles entrent en décomposition, les larves qu'elles abritent ont cessé de prendre de la nourriture et se trouvent désormais dans une puppe qui les protège, et en contact avec le sol qui leur procure l'humidité nécessaire à leur conservation.

La première génération du printemps trouve des plantes déjà plus robustes, et ayant une tige articulée. Elle ne déposera plus ses œufs sur les feuilles radicales, et les jeunes larves ne seront donc plus fixées au collet de la racine, mais sous la gaine, au-dessus du premier ou du second nœud. Les plantes attaquées ne se dessècheront pas, mais comme l'endroit occupé par les larves devient plus faible par

la succion de ces dernières, il s'ensuit que la tige n'est plus assez forte pour porter un épi et qu'elle se brisera plus tard à l'endroit infesté.

Historique. — Ce fut en 1778 ou en 1779, lors des désastres occasionnés aux récoltes de Blé dans les diverses parties des États-Unis, que la Mouche de Hesse fit parler d'elle pour la première fois. On lui donna ce nom, parce qu'on la considérait comme importée en Amérique avec de la paille, par les troupes hessoises, pendant la guerre de sécession. Elle fit en effet sa première apparition à l'endroit où les troupes de Hesse avaient abordé. B. Wagner a essayé de prouver que cette dénomination n'était pas justifiée. D'après lui, les troupes hessoises qui sont parties d'abord sous les ordres du général Heister, ont quitté Cassel en mars 1776 et ont abordé à Long-Island le 12 août. La paille qu'elles avaient emportée devait donc provenir de la récolte de 1775, et, par suite, les Cécidomyies auraient dû éclore toutes en avril et en mai, c'est-à-dire pendant le trajet, et non après le débarquement. Il serait donc prouvé par là que les Hessois n'ont pas pu importer cette peste en Amérique ⁽¹⁾. Comme P. Marchal le remarque avec raison, cette conclusion, reproduite depuis par Hagen [192], ne s'impose nullement, car, sous l'influence de la sécheresse, l'éclosion des Cécidomyies peut être retardée pendant des mois et même pendant des années.

Depuis son apparition en Amérique, le fléau n'a pas cessé de ravager les Céréales. On y constata souvent une perte de 20 à 25 et parfois même de 75 pour cent de la récolte. En 1846, dans la section Ouest de l'État de New-York, on évalua la perte à 500.000 boisseaux; en 1885, le dégât pour tout l'État de New-York fut évalué à 100.000 dollars.

En Europe on n'a constaté, pour la première fois, la présence et les ravages de la Mouche de Hesse, qu'en 1834. Dana ⁽²⁾ la trouva sur les Blés de l'île de Minorque; il rapporte que cet insecte, au dire des Maho-

(1) A en croire l'auteur allemand, il serait bien plus probable que l'importation du redoutable insecte serait à attribuer aux Français. Les raisons qu'il fait valoir dans son chapitre : « Essai d'une nouvelle théorie sur l'importation de *Cecid. destructor* en Amérique » sont les suivantes : 1° l'existence de cet insecte en France depuis une date très reculée; 2° les rapports de la France avec l'Amérique du Nord, où elle avait des colonies très étendues; 3° la distance relativement courte qui la sépare du Nouveau-Monde et qui permettait d'y importer de la paille contaminée, avant l'éclosion de la Cécidomyie.

(2) Herrick publia les observations de Dana dans *Sillimann's Journal*, t. XII, p. 154.

nais, existait chez eux de temps immémorial et qu'il occasionnait de grands dégâts dans leur ile ainsi qu'en Espagne. Dans le courant de la même année, Dana la découvrit encore en Italie, près de Naples, et en France (1), près de Toulon. H. Loew la signala en 1859 pour l'Allemagne, sous le nom de *Cecid. secalina*, n. sp. Un peu plus tard on constata sa présence en Autriche, en Hongrie, et, en 1880, au sud de la Russie.

En 1886, on commença à la remarquer en Angleterre et en Écosse, et dans le courant de la même année, le nombre des insectes était devenu si considérable que, de tous côtés, ils attiraient l'attention des fermiers. Partout ils semblaient apparaître pour la première fois et partout aussi on signalait la rapidité avec laquelle ils se propageaient et l'intensité des dégâts qu'ils causaient. Comme on y trouva des pupes mêlées au grain, après le vannage du Blé, Ormerod en conclut que l'insecte a pu leur arriver avec du blé importé.

Pour l'Asie Mineure, elle fut indiquée dès 1850 par H. Loew. B. Wagner considère même comme probable que l'Asie, et en particulier les pays que traverse l'Euphrate, étant considérés comme patrie de nos Céréales, seraient aussi le pays d'origine de la Mouche de Hesse.

Remèdes. — On a indiqué les méthodes suivantes : 1° *Supprimer les semis spontanés et les rejets, en brûlant les éteules.* De cette façon on détruit beaucoup de larves ou de nymphes, et on supprime aux insectes qui éclore pendant cette période leur plante nourricière. On réservera donc l'ensemencement en Trèfle pour les champs préalablement occupés par de l'Avoine ; ou bien s'il s'agit d'une attaque de la Cécidomyie de l'Avoine, dont nous allons parler plus loin, on n'ensemencera en Trèfle que des champs occupés par des Céréales autres que l'Avoine. Quant aux brûlis des éteules, il ne devra avoir lieu que si le nombre des Cécidomyies non encore écloses est considérable, et le nombre des parasites très faible ; il faut donc avoir recours à un entomologiste expert, qui devra se rendre sur les lieux contaminés.

2° *Ensemencement tardif.* Les Blés semés tardivement lèvent à une époque où il y a beaucoup de chances pour qu'il y ait peu ou point de Cécidomyies adultes, les derniers essaimages étant passés.

3° *Alternances des cultures.* Nous en avons parlé plus haut, en traitant de *Contarinia tritici*.

(1) Récemment le fléau sévit en Vendée avec une intensité telle que l'on évalua à environ la moitié de la récolte le déficit pour l'année 1894. « Un hectare qui aurait donné 22 hectolitres en temps ordinaire n'en a donné que 12 après l'attaque de la Cécidomyie. Beaucoup de champs ont été complètement anéantis » (Marchal, l. c., p. 9).

4° *Destruction des résidus du battage ou du vannage.* Nous avons vu que, si le Blé est infesté par *C. tritici*, la destruction des résidus du battage est inutile et même nuisible. Il n'en est plus de même pour le cas où les Céréales seraient attaquées par la Mouche de Hesse ou par celle de l'Avoine, parce qu'alors les pupes ne renferment pas nécessairement des parasites.

5° *Faire choix de semence de variété à paille dure et résistante* (voir P. Marchal, l. c., p. 60), et augmenter la force du Blé par l'emploi des engrais.

6° *Faire pâturer le jeune Blé par les Moutons*, soit à l'automne, aussitôt que l'on remarque les œufs des Cécidomyies sur le Blé nouvellement levé, soit au printemps. Si la terre est fertile, le Blé après avoir été pâturé, repoussera sans en souffrir.

7° *Faucher le Blé lorsqu'il est encore vert et que l'épiage n'est pas commencé.* Selon Asa Fitch, cette opération ne nuit pas à la récolte, mais la retarde seulement, à condition que le sol soit fertile.

8° On indique encore l'emploi du rouleau que l'on ferait passer sur les Blés au moment de la ponte des Cécidomyies, et celui des insecticides tels que la chaux éteinte que l'on répandrait sur les champs attaqués; la pluie entraînant la chaux sous les gaines des feuilles, y ferait périr les larves. Ces deux méthodes ne paraissent pas offrir une chance de succès.

Mayetiola avenae March.

Cette espèce est à l'Avoine (*Avena sativa*) ce que la précédente est au Blé et au Seigle. Voici en quels termes le docteur P. Marchal, qui l'a signalée d'abord, décrit les rapports de cet insecte avec la plante nourricière : « Les pupes sont logées au niveau du 1^{er}, du 2^e ou plus rarement du 3^e ou du 4^e nœud. Au niveau des nœuds supérieurs elles sont généralement isolées ou peu nombreuses et logées dans une petite fossette ovale déterminée dans la tige par la succion de la larve. La tige peut alors devenir mince et cassante à ce niveau; mais, si elle est suffisamment vigoureuse, elle continue sa croissance et le dommage causé est sans importance. Pour les nœuds inférieurs, et notamment à fleur de terre, le nombre des pupes peut être considérable : on en rencontre fréquemment de 18 à 20, toutes de grosse taille. La jeune plante attaquée est renflée à sa base en forme de bulbe et se termine à son extrémité supérieure par une pointe formée par les feuilles qui se sont desséchées avant de s'épanouir; elle se dessèche alors le plus sou-

vent, après avoir à peine atteint quelques centimètres de hauteur... Ces bulbes peuvent être considérés comme caractéristiques de l'attaque de la Cécidomyie de l'Avoine » [l. c., p. 48].

Quant aux dégâts causés par cet insecte, nous trouvons chez le même observateur les renseignements suivants : « Les Avoines d'hiver ont été seules attaquées d'une façon capable d'attirer l'attention, parmi toutes les céréales, dans le Poitou. Elles ont été attaquées par plaques et ces plaques se sont peu à peu élargies. A Rambaud, l'Avoine semée en octobre 1893 a été à peu près détruite par la Cécidomyie ; mais elle est repartie du pied, donnant des rejets qui ont été à leur tour attaqués par les générations printanières ; ce sont les larves qui se trouvaient sur l'Avoine en juin qui ont attiré l'attention. Il est à noter que pendant cette attaque, les Blés, les Seigles et les Orges sont restés entièrement indemnes dans le Poitou. La récolte des Blés a donné 33 hectolitres à l'hectare ; la récolte des Avoines d'hiver au contraire, qui s'annonçait très bonne et qui promettait 40 hectolitres à l'hectare, est tombée à 19 hectolitres, soit une moitié » [l. c., p. 47].

Remèdes. — Ce sont les mêmes qui ont été indiqués plus haut pour l'espèce précédente.

Phytophaga cerealis Rond. (frumentaria Rond.)

On ne peut dire avec certitude ce qu'il faut entendre par cet insecte. Rondani l'a décrit en 1843 sous le nom de *Phytophaga cerealis* ; il ajouta qu'après l'avoir comparé avec des exemplaires de *Cecidomyia destructor*, il y avait reconnu une espèce nouvelle. Plus tard, en 1864, il changea le nom de *P. cerealis* en celui de *Cecidomyia frumentaria* Rond., sans en indiquer le motif. Comme il écrit encore que « la larve vit en société sur le Blé, au-dessus d'un des premiers nœuds, entre la gaine et la tige et qu'elle se métamorphose au même endroit », on serait autorisé à considérer néanmoins cet insecte comme identique à *Mayetiola destructor*, si Rondani ne donnait pas expressément comme caractère générique de *Phytophaga* : « palpes composés de trois articles », ce qui exclut le genre *Mayetiola*, et comme autre caractère : « antennes d'environ 20 articles », ce qui ne convient pas non plus à *M. destructor*.

Cecidomyia culmicola Morris.

Nous considérons également cette espèce comme synonyme douteux de *M. destructor*. Selon Miss Morris, qui a observé cet insecte en Pensylvanie, la Cécidomyie déposerait ses œufs en juin sur le grain. Ceux-

ci n'écloraient que quand le grain vient à germer. La jeune larve monterait dans la tige qui commence à pousser et y demeurerait jusqu'à sa maturité; elle en sortirait alors au niveau de la racine pour se fixer ensuite à la paroi externe du chaume, et s'y transformer dans un puparium analogue à celui de la Mouche de Hesse. Selon Harris, les exemplaires adultes qui lui furent envoyés ressemblaient un peu à *C. tritici*, mais étaient encore plus petits; leur mauvais état de conservation ne permit pas d'en donner une description.

***Clinodiplosis equestris* Wagn.**

Cet insecte n'a encore été observé jusqu'ici qu'aux environs de Fulda par B. Wagner. Comme les précédents, il vit à l'état larvaire sur la tige d'une céréale, c'est-à-dire du Blé, mais il y produit une déformation grâce à laquelle il s'en distingue aisément. Selon B. Wagner que nous allons suivre ici, on peut remarquer à la fin du mois de juillet et au commencement d'août, soit un peu avant et pendant la moisson, que la gaine de la feuille supérieure des tiges de Blé se montre fréquemment gonflée d'une façon extraordinaire. Si l'on écarte cette gaine, on remarquera au-dessus du dernier nœud, à des hauteurs différentes, des larves rouges occupant chacune un enfoncement en forme de selle. Cette déformation consiste en un renflement de couleur verte, faisant saillie sur un côté du chaume, de forme allongée, fortement proéminent en forme de bourrelet aux deux extrémités, et sillonné dans le sens de sa longueur par un faible enfoncement ou cavité larvaire, qui est limité à chaque bout par le bourrelet transversal que nous venons de mentionner et qui lui donne l'apparence d'une selle. Les cellules dont se compose cette déformation sont agrandies, de forme irrégulière et traversent tout le parenchyme du chaume jusqu'au creux. La larve occupe toute la partie enfoncée de sorte que la distance qui sépare les deux bourrelets correspond exactement à la longueur de la larve. Toutes ces cécidies sont parallèles à l'axe de la tige, et paraissent alignées l'une à la suite de l'autre, ordinairement sans se toucher. Rarement deux ou trois d'entre elles se touchent par un de leurs bourrelets : les deux bourrelets qui se touchent se fusionnent alors en un seul ou peuvent aussi disparaître entièrement, de sorte que l'on aura une cécidie unique, terminée à chaque extrémité par un bourrelet, comme la forme normale, mais deux ou trois fois aussi grande que d'ordinaire, et renfermant deux ou trois larves alignées. On les trouve presque exclusivement à la partie du chaume enveloppée par la gaine supérieure et à quelque distance au-dessus du

nœud. Il arrive rarement qu'on les voit encore échelonnées le long de l'entre-nœud qui précède, ou même uniquement sur ce dernier. La même tige porte d'ordinaire 3 à 10 larves, parfois aussi jusque 40 et au-delà. Les galles se dessèchent avec les tiges, et les larves attendent la pluie pour quitter leur plante nourricière et se rendre en terre, où elles hivernent. L'éclosion des insectes parfaits a lieu en mai et en juin. La femelle dépose ses œufs sur le dessus de la feuille supérieure, de sorte que les larves doivent faire une migration après leur sortie de l'œuf. Les chaumes attaqués par cette espèce, loin de dépérir, demeurent au contraire plus longtemps verts et paraissent plus vigoureux que les autres, mais l'insecte n'en est pas moins nuisible à la récolte, car tous les chaumes voisins et non attaqués sont privés de la sève qui afflue dans le pied attaqué, de sorte qu'ils donnent un rendement de paille et de grain très inférieur. Wagner fait remarquer qu'un fait analogue a été constaté pour *C. tritici* aux États-Unis où les fermiers avaient cru d'abord que ce redoutable ennemi des céréales pouvait être considéré comme bienfaisant, parce que dans les épis attaqués les grains demeurés intacts atteignaient un développement plus fort.

Clinodiplosis marginata Ros.

Cette espèce, observée par Nowicki aux environs de Cracovie [547], forme sur l'Orge des galles analogues à celles de *C. equestris* sur le Blé. D'après une communication faite par B. Wagner dans une lettre adressée à Nowicki, elle est distincte de la précédente et devrait être rapportée, d'après l'examen de l'imago, à *Diplosis marginata* Roser.

On a observé sur *Holcus* et *Calamagrostis* des galles semblables, mais qui sont dues à des *Mayetiola*.

Diplosis flava Meig.

Tout ce nous savons des mœurs de cet insecte, c'est que Roser prétend l'avoir observé dans les chaumes des céréales.

Lasioptera cerealis Lind. (1).

Lindeman a signalé cette espèce pour la première fois en 1880, puis une seconde fois en 1881. Selon lui, on l'aurait observée en Russie de-

(1) *Cecidomyia cerealis* A. F., qu'Asa Fitch considère à tort comme nuisible au Blé, parce qu'il l'a capturé dans les champs de Blé en société de *C. tritici*, aux États-Unis, est à considérer comme parasite des Cécidomyies. Il fait partie du genre *Lestodiplosis*, ce qui est encore le cas pour *Cecidomyia ornata* Say. et *caliptera* A. F.

puis 1847 et elle y aurait causé plusieurs fois des dégâts considérables dans les champs de Seigle où elle s'est multipliée, anéantissant le quart et même le tiers de la récolte. Elle serait à considérer, dit-il encore, comme importée d'Amérique, ce que confirmerait encore la grande localisation de cet insecte observé seulement dans les gouvernements de Mohilew et d'Orel. Cette dernière assertion est basée sur une erreur, car cet insecte paraît assez répandu. Je l'ai découvert, il y a quelques années, sur *Triticum repens*, en Lorraine, et j'en ai communiqué les larves, ainsi qu'un exemplaire de la plante attaquée, au docteur von Schilechtendal, qui les a envoyés à M. Rübsaamen. Plus tard Rübsaamen l'a trouvé aussi en Allemagne sur *Calamagrostis lanceolata*. C'est par erreur encore que Lindeman dit de la larve qu'elle n'a qu'une courte soie sur le côté de chaque segment; chaque segment porte sur le dessus six soies dorsales et de chaque côté deux soies latérales.

Les chaumes des Graminées attaqués par cet insecte offrent au-dessus du premier, rarement du second nœud, une grande tache noire, irrégulière, recouverte par la gaine foliaire. Cette tache est formée par une membrane noire et très mince, qui s'applique à la surface du chaume. Elle recouvre une fossette allongée, située dans le chaume, tapissée elle-même par une membrane noire et brillante et renfermant une ou plusieurs larves d'un rouge brique. Les tiges ainsi attaquées finissent souvent par se briser au niveau des loges larvaires, comme cela a lieu pour les chaumes infestés par *Mayetiola destructor*.

Epidosis cerealis Saut.

Cette espèce a été observée pour la première fois par Sauter, en 1813, dans le grand-duché de Bade et en Wurtemberg. Elle causa de grands dégâts sur l'Orge et le *Triticum spelta* pendant les années 1813 à 1816; quelque temps après, le même auteur constata sa présence sur l'Avoine et sur le Seigle. La larve, d'un rouge brique, et longue de 3 millimètres, porte à son extrémité postérieure un appendice quadri-lobé. La métamorphose a lieu en terre, et l'insecte ailé apparaît en mai ou en juin. La femelle pond ses œufs en petites masses sur les parties supérieures de la tige; les larves vivent en sociétés nombreuses sous les gaines foliaires, et, d'après le dessin, même au côté interne de la feuille; les tiges attaquées se dessèchent et périssent.

Plus tard, en 1869, Cohn trouva sur le Blé, en Silésie, un insecte qui fut rapporté à la même espèce. Voici comment P. Marchal résume les observations de Cohn, d'après H. Loew : « Les chaumes qui étaient attaqués par les larves présentaient les deux entre-nœuds inférieurs

indemnes; mais les entre-nœuds supérieurs, ainsi que l'épi arrêté dans son développement, étaient d'un brun noir et racornis, moisés à leur intérieur, et entièrement renfermés dans des gaines foliaires jaunes ou brunes; entre le chaume mortifié et la gaine foliaire la plus interne, généralement juste contre le dernier nœud, se trouvaient les larves d'un rouge vermillon et d'une longueur de 1 à 2,5 mill. L'extrémité antérieure de la larve, atténuée en pointe, présentait deux taches oculaires noires et au-dessous de la pointe il y avait deux palpes courts; l'extrémité postérieure au contraire était arrondie et terminée par deux appendices fortement développés, chitineux, lamelliformes et présentant deux dentelures inégales; cette structure rappelait assez celle qui caractérise les larves des galles du Tremble (*Populus tremula*). Il était à noter que, à côté des larves rouge cinabre ayant atteint toute leur croissance, se trouvaient simultanément des larves toutes petites, encore très pâles, présentant la même structure que les précédentes et trouvées dans des circonstances qui pouvaient donner à penser qu'elles étaient peut-être engendrées par paedogenèse. Une larve ayant toute sa croissance et trouvée le 29 juin, s'était au 15 juillet transformée en une pupa de couleur chair, un peu plus fusiforme que n'était la larve. Au bout de 48 heures survenait déjà l'éclosion de la Mouche, qui appartient au genre *Epidosia*. Celle-ci est la première espèce de ce genre dont la larve ait été observée sur une plante vivante. » La nymphose se fait dans le chaume.

La réunion de larves mûres avec des larves très jeunes me fait soupçonner que la Cécidomyie n'était pas l'auteur de la déformation, et qu'elle vivait des parties antérieurement décomposées de la plante.

II. — Ennemis naturels des Cécidomyïes.

1° *Oiseaux*. Certaines galles de Cécidomyïes sont recherchées par les oiseaux. C'est ainsi que celles de *Mikiolu fagi* sont brisées en hiver par les Roitelets et les Mésanges qui en mangent la larve ou la nymphe. A en croire Asa Fitch, un Passereau, *Fringilla tristis* L., serait un des plus actifs destructeurs des larves de la Cécidomyie du Blé (*C. tritici*) aux États-Unis. « Posé sur la tige, immédiatement au-dessous de l'épi, l'oiseau entr'ouvre les épillets avec son bec et en sort rapidement les petites larves dont il se nourrit. Le même oiseau débarrasse ainsi successivement plusieurs épis de leurs parasites, avant de terminer son repas. » L'auteur fait remarquer qu'un examen attentif des épis lui démontra que l'oiseau dévorait en réalité les larves de Cécidomyïes et non point les grains de Blé.

2° *Araignées*. B. Wagner a remarqué qu'une foule de Cécidomyies du Blé (*C. tritici*) devenaient la proie des Araignées. Comme ces mouches se rendent à la base des tiges des céréales pour y passer le jour au repos, beaucoup d'entre elles se prennent aux toiles que les Araignées ont tendues à ces endroits et y trouvent la mort.

3° *Insectes*. Voici en quels termes M. P. Marchal, d'accord en cela avec tous les observateurs, a jugé le rôle des insectes parasites des Cécidomyies : « Le rôle bienfaisant des parasites des Cécidomyies est absolument capital. C'est grâce à eux que l'on voit le fléau s'enrayer subitement, après avoir sévi de la façon la plus cruelle pour nos céréales. Après le désastre causé en Vendée par la Cécidomyie destructive en 1894, après les ravages occasionnés dans le Poitou la même année par la Cécidomyie de l'Avoine, on vit en 1895 les Cécidomyies disparaître d'une façon presque complète. Or l'énorme majorité des pupariums que j'ai recueillis ou que j'ai reçus dans la première partie de l'année étaient parasités » [*l. c.*, p. 97].

On remarque en général qu'une année pendant laquelle les galles d'une espèce de Cécidomyie étaient très nombreuses est suivie d'une autre pendant laquelle ces mêmes galles sont devenues rares ou même très rares. Les parasites se sont multipliés parallèlement aux insectes cécidogènes, et, après avoir occasionné la perte de ceux-ci, ils disparaissent eux-mêmes, faute de victimes auxquelles ils pourraient confier leurs œufs.

D'ordinaire les galles caduques demeurent fixées au support quand elles sont parasitées. Veut-on par exemple obtenir l'éclosion de *Mikiola fugi* Hart., il faudra recueillir, à la fin de l'automne ou dans le courant de l'hiver, les galles tombées à terre et dont l'ouverture, correspondant à leur point d'insertion, sera fermée par une mince pellicule blanche, formée par la larve. Quant aux galles qui demeurent fixées aux feuilles pendant l'hiver, elles ne renferment que des parasites; ceux-ci en sortiront par un trou circulaire que l'imago se forme dans la paroi de la galle.

Les insectes parasites des Cécidomyies se répartissent entre les Hyménoptères et les Diptères. On pourrait encore y ajouter les Thrips qui s'attaquent parfois aux œufs des Cécidomyies, comme Lintner l'a remarqué [380]. Les Hyménoptères fournissent le contingent ordinaire des parasites des Cécidomyies; leurs représentants appartiennent d'habitude aux Chalcidites et Proctotrupides, rarement aux Braconides et et aux Ichneumonides. Les larves de Chalcidites sont pour la plupart ectoparasites; celles des autres familles, endoparasites. Le docteur

P. Marchal a fait une observation très curieuse sur la biologie d'un Proctotrupide. *Trichacis remulus* Walk., parasite des larves de *Mayetiola destructor* [445 bis].

Lorsqu'elles sont encore jeunes et immobiles, non sorties des kystes qui les contiennent, les larves de ce parasite sont toujours en connexion intime avec le système nerveux de la Cécidomyie et y déterminent une prolifération consistant en un énorme bouquet de cellules claviformes gigantesques, qui, à lui seul, remplit la majeure partie de la cavité générale de la larve parasitée. Ces groupes de cellules géantes sont évidemment destinés à accumuler les matériaux nutritifs nécessaires au parasite. Ce sont des sortes de galles animales internes produites par l'action du Proctotrupide.

Quant aux Diptères, nous avons vu, en traitant de la biologie des larves, que les représentants du genre *Lestodiplosis* sont zoophages et vivent ordinairement aux dépens des larves ou des nymphes d'autres Cécidomyies.

4° *Helminthes*. Les Cécidomyies sont parfois infestées aussi par des Nématodes. On peut trouver ces derniers dans la larve et dans l'insecte parfait.

La première indication d'un Nématode vivant dans le corps d'une larve de Cécidomyie est due à Leuckart (1). Cet auteur découvrit le type du genre *Asconema*, *A. gibbosum* Lk., dans les larves d'une Cécidomyie vivant à terre au milieu des aiguilles de Pin en décomposition, et qu'il appelle par erreur *Cecidomyia pini* (2). Il supposa que les jeunes *Asconema* pénétraient par l'anus dans les larves de la Cécidomyie. Dans mon travail sur le Groupe *Epidosis* paru en 1894 (p. 143), j'ai indiqué qu'une anguillule de très grande taille s'est détachée d'une larve de *Winnertzia*, au moment où j'humectai cette dernière. Plus récemment, en 1897, M. P. Marchal publia l'observation suivante : « Sur de jeunes Blés attaqués par la Cécidomyie destructive, il y avait un certain nombre de larves atrophiées, fortement rétractées dans leur puparium qui était lui-même plissé et le plus souvent d'une coloration pâle; d'autres étaient ridées et petites sans avoir formé de puparium.

Ces larves étaient entourées d'une couche de matière gélatineuse dans laquelle se trouvaient de nombreux Nématodes, et ces vers étaient en rapport direct avec les larves contre lesquelles ils étaient accolés et

(1) *Zoologischer Anzeiger*, 1886, p. 745.

(2) C'est probablement de *Criptodiplosis brachyntera* qu'il s'agit; la larve de cette espèce se trouve en effet parmi les aiguilles du Pin ou entre les feuilles des mousses pendant l'hiver.

auxquelles ils adhéraient parfois. Quelques-uns même furent trouvés à l'intérieur des pupariums; mais je n'ai pu en découvrir à l'intérieur des larves; certains pupariums ne renfermaient plus qu'un magma dans lequel s'agitaient une énorme quantité de ces animaux. Quelle que puisse être la relation de ces Nématodes avec les larves des Cécidomyies, il importe de signaler les intéressantes modifications de ces dernières. Les larves avortées présentaient de très grandes modifications dans leur spatule sternale, et l'on rencontrait nettement chez elles, au lieu de la spatule bifurquée, la spatule hastiforme et toutes les formes intermédiaires entre elle et la spatule bifurquée.

Chez ces mêmes larves atrophiées, nous voyons l'extrémité postérieure du segment anal subir également des variations corrélatives conformes à celles présentées par la Cécidomyie de l'Avoine, si bien que chez certaines on voit les papilles dorsales du segment anal s'implanter directement sur lui, sans l'intermédiaire du processus bilobé que l'on trouve normalement chez la Cécid. destructive » [l.c. p. 96-97].

Quant à l'insecte parfait, j'ai signalé en 1894 [273, p. 266, fig.] la présence d'Anguillules parasites dans une femelle de *Winnertzia citrina* Kieff., que j'avais obtenue d'éclosion. Étourdie par la nitrobenzine, cette Cécidomyie avait émis, par son oviducte, un faisceau compact d'Anguillules qui s'agitèrent vivement après avoir été humectées. Après avoir décapité le Diptère, je vis également des Nématodes sortir de son cou. Plus tard, en 1894, j'ajoutai que j'avais observé la même chose pour diverses autres espèces du même genre. Tout récemment j'ai constaté la présence des mêmes Nématodes dans le corps d'une Cécidomyie vivant à l'état larvaire dans les fleurs et les fruits du Genêt mais se rendant en terre pour la métamorphose, *Choristoneura sarothammi* Kieff. J'ai examiné un grand nombre de femelles, toutes avaient la cavité générale remplie de ces vers filiformes, à tel point qu'il me fut impossible de trouver un seul œuf chez les exemplaires observés. Pour cette dernière espèce j'ai remarqué encore la présence de corps ellipsoïdaux qui paraissaient d'abord sans mouvement et qui finirent par se dérouler en offrant alors la forme des autres Anguillules. M. Giard, qui a observé en 1893 un cas de parasitisme similaire chez une Cécidomyie à larve subcorticale, ajoute les détails complémentaires suivants [173]: « Une dissection délicate montre que les Anguillules émises par l'Insecte sont des embryons appartenant à un Nématode du genre *Asconema*, voisin des *Sphaerularia*. Le parasite adulte, avec sa progéniture, remplit presque toute la cavité générale de la Cécidomyie. Les ovaires du Diptère sont atrophiés par castation parasitaire. Les œufs de l'*Asconema* se développent jusqu'à la

formation de l'embryon à l'intérieur de l'Insecte, et celui-ci pond les petites Anguillules en plongeant sa longue tarière entre les fissures des écorces pourries et humides, de même que les Criquets infestés par des *Gordius* vont pondre ces parasites dans les mares ou les ruisseaux où ils pourront se développer. Je n'ai pas trouvé d'Anguillules dans le tube digestif et je crois que celles que M. Kieffer a vu sortir par le cou provenaient de la cavité générale. Mis en liberté, les embryons d'*Asconema* se comportent comme ceux de *Sphaerularia bombi*, c'est-à-dire qu'ils pénètrent dans les larves de Cécidomyies, vraisemblablement après avoir subi une mue et acquis des organes génitaux. »

J'ai observé encore [291, p. 5] dans le corps de *Joannisia aurantiaca* Kieff., une autre sorte de Nématode, non plus filiforme comme les précédents, mais en forme de virgule ou presque de têtard de Grenouille, avec l'extrémité antérieure du corps élargi et obtuse. Cette espèce aussi avait produit chez son hôte l'atrophie des ovaires.

§ 4.

ÉLEVAGE ET CONSERVATION DES CÉCIDOMYIES.

L'étude des Cécidomyies trouverait sans doute plus d'amateurs, si on ne s'exagérait pas les difficultés de l'élevage des larves et de la conservation de l'insecte parfait. Bosc d'Antic écrivait déjà en 1838 (*) qu'un grand nombre de Cécidomyies gallicoles demeuraient encore inconnues parce que « la difficulté d'obtenir l'insecte parfait des larves qu'on renferme à la maison et l'impossibilité de les conserver entiers dans les collections les ont fait négliger par les naturalistes ». L'élevage de ces insectes demande de la patience, il est vrai ; mais, pour la plupart des espèces, il se fait sans grande difficulté. Nous allons indiquer la méthode que nous avons suivie depuis 1885. Disons tout d'abord que si l'on veut se servir de l'insecte parfait pour des essais de ponte, l'élevage devra se faire en plein air ; en dehors de ce cas, il pourra avoir lieu indifféremment dans une chambre froide ou dans une chambre chauffée. Le grand froid ne nuit nullement aux larves ; il n'en est pas de même de la grande chaleur ; des vases à éclosion que j'ai exposés au soleil, n'ont donné que des résultats négatifs.

I. — Élevage des Cécidomyies.

Il faut avant tout s'assurer si les larves qu'on veut mener à éclosion sont arrivées à leur maturité ou du moins si elles en sont proches.

(1) *Nouveau cours complet d'Agriculture*. Paris, Roret, t. XV, p. 412.

Avec des larves jeunes on n'arrivera ordinairement à aucun résultat. La raison en est qu'on ne peut pas ici, comme pour les chenilles des Lépidoptères, donner chaque jour, aux larves qu'on veut élever, des plantes fraîches pour les nourrir; leur vie est liée intimement à celle de la galle qu'elles habitent ou de l'organe végétal ou animal auquel elles sont fixées; ceux-ci viennent-ils à se dessécher ou à se couvrir de moisissure, c'en est fait aussi des insectes qui y sont renfermés. Il faut donc faire choix de larves mûres ou à peu près mûres, afin que la plante nourricière puisse demeurer fraîche jusqu'à leur sortie ou leur métamorphose. Mais comment reconnaître qu'une larve est arrivée à sa maturité? C'est principalement d'après la taille de l'insecte, mesurant en moyenne de 2 à 3 mill. à la maturité, que l'on pourra en juger. L'examen à la loupe indiquera encore la présence de la spatule, qui est un caractère particulier à l'état de maturité et manque rarement. Si donc en ouvrant une galle, on y trouve des larves encore très petites, il faut en remettre la récolte à une huitaine de jours plus tard.

Il y a deux manières de récolter et de conserver les galles dont on veut obtenir les larves ou l'insecte parfait. La première, en même temps la plus simple et que l'on peut employer dans la plupart des cas, consiste à les cueillir avec une partie de leur substrat, par exemple la feuille avec les galles qu'elle porte, et de les déposer dans une boîte en fer-blanc, dont on se sera muni préalablement. Dans une boîte en métal, lors même que la fermeture n'est pas hermétique, les plantes et les galles demeurent suffisamment fraîches pendant quelques jours, soit jusqu'à la sortie des larves ou de l'imago. Cette méthode a encore l'avantage d'empêcher les larves de s'échapper à leur sortie des galles, avant qu'on ait eu le temps de les apercevoir. Il suffira d'ouvrir la boîte chaque matin; si des larves opèrent leur migration, on les trouvera ordinairement sur le fond de la boîte, parfois agglomérées. Bien des espèces se métamorphosant d'habitude en terre, par exemple *Perisia mali*, *Oligotrophus capreae*, etc., se fixeront même à la paroi interne du métal, s'y formeront un cocon et s'y transformeront en nymphe et en insecte parfait.

La seconde méthode consiste à couper des rameaux de la plante avec les galles et à plonger leur partie inférieure dans un vase rempli d'eau, et à col assez étroit pour que les larves, sortant des galles, ne puissent y tomber. Pour maintenir le végétal plus longtemps frais, il sera bon de le couper sous l'eau, à une hauteur de 4 à 5 cent. au-dessus de la première section. Notons encore qu'il faut bien examiner les plantes, afin de s'assurer qu'elles ne portent pas d'autres sortes de galles, ou bien encore des Urédinées ou des Aphides servant de nourriture à une

autre espèce de Cécidomyie. Ce vase avec les plantes sera posé sur une feuille de papier blanc ou sur le fond d'une boîte en carton. Cette méthode a un double inconvénient : elle oblige d'abord à examiner le récipient plusieurs fois par jour, afin de voir si les larves ou les insectes ailés n'opèrent pas leur sortie ; et, d'autre part, il y aura toujours un certain nombre de larves sauteuses ou d'insectes ailés qui réussiront à s'échapper. On pourra obvier à ce dernier inconvénient, quant aux insectes ailés, si l'on veut se donner la peine d'entourer les plantes d'une gaze légère.

Quand les larves quittent leur plante nourricière, il faut s'assurer si elles appartiennent toutes à la même espèce, c'est-à-dire si elles ont la même forme, la même couleur et les mêmes dimensions. Dans le cas contraire, on ouvrira une ou plusieurs galles, afin de s'assurer si, parmi les larves qui y demeurent encore, on trouve réunies les deux ou trois espèces dont on a constaté la présence.

Il s'agit ensuite de mettre les larves en contact avec la terre dans laquelle aura lieu leur métamorphose. A cette fin, on les touche avec l'extrémité d'un chaume ou de la pointe d'un crayon légèrement humectée ; il sera facile alors de les saisir et de les déposer là où l'on voudra. Quand on ne connaît pas le genre auquel appartiennent les larves, il faut évidemment se garder de mettre avec elles, dans le même récipient, des larves appartenant à une autre espèce ou à un autre genre également inconnu. Mais si l'on est renseigné à ce sujet, il n'y aura aucun inconvénient à mettre ensemble des larves appartenant à des genres différents, par exemple des larves de *Contarinia* avec celles de *Perrisia*, de *Clinodiplosis*, de *Bremia*, etc.

Quant au récipient, je me sers de petits pots à fleurs, remplis de terre et recouverts avec une cloche en verre ⁽¹⁾ ; cette dernière n'est autre chose qu'un verre à calice, dont le pied a été brisé. Fr. Löw a indiqué qu'on doit avoir soin de chauffer préalablement la terre que l'on emploie, afin d'y faire périr toute autre larve, s'il devait s'y en trouver. J'ometts cette précaution, parce que la terre dont je remplis les récipients est recueillie dans un endroit situé à distance de toute plante pouvant héberger les larves de Cécidomyies. Comme il est de toute nécessité que cette terre soit maintenue humide, on devra l'humecter de temps à autre. Certaines larves ne pénètrent pas immédiatement en terre, mais veulent demeurer quelques semaines à la surface, sous les

(1) M. le docteur Marchal emploie des « pots à fleurs recouverts d'un court manchon de verre fermé à son extrémité supérieure par un rond de mouseline maintenu à l'aide d'un caoutchouc ».

feuilles mortes ou sous la mousse. Il faudra donc, quand les larves voyagent à la surface de la terre sans vouloir y pénétrer, couvrir celle-ci de feuilles mortes ou de mousses qu'on aura examinées soigneusement à l'avance, afin de s'assurer qu'elles n'hébergent pas déjà des larves de Cécidomyies. Quelques espèces habitant les marécages demandent à avoir les conditions qu'elles trouveraient à l'état de liberté, à savoir, des Sphaignes imprégnées d'eau ou même immergées. Enfin un numéro dont on aura marqué le vase ou la cloche qui le recouvre, empêchera qu'il y ait confusion; le même numéro, inscrit dans un cahier, sera accompagné des renseignements nécessaires, tels que le nom de la plante, la forme de la galle, et la date de sortie des larves. Au bout de huit à quinze jours, les insectes ailés pourront faire leur apparition.

Si au bout de 3 ou 4 semaines aucun insecte ailé n'a fait son apparition, il faut en conclure que l'éclosion n'aura lieu qu'au printemps ou à l'été suivant, à moins qu'on n'opère dans une chambre chauffée, où les éclosions commencent dès le mois de janvier et parfois même plus tôt.

Quand l'insecte parfait apparaît, il faut le laisser prendre ses ébats pendant une heure ou deux, afin qu'il ait atteint sa coloration complète, puis on l'asphyxie. Dans ce but, je verse une minime gouttelette de nitrobenzine sur une feuille de papier blanc et je l'étends afin que l'évaporation se produise plus rapidement et que les insectes n'y puissent être retenus; saisissant ensuite délicatement, mais sans la retourner ni l'incliner, la cloche de verre sous laquelle les Diptères prennent leurs ébats ou à la surface de laquelle ils se sont posés, je la mets sur le papier, à l'endroit où la nitrobenzine commence à s'évaporer ⁽¹⁾. Dans l'espace d'une ou de deux minutes, tous les insectes tombent étourdis sur le papier; on peut alors les saisir, les examiner au microscope ⁽²⁾ ou les préparer pour la conservation. On peut aussi remplacer la nitrobenzine par la fumée de tabac; une bouffée de cette fumée suffit pour asphyxier l'insecte parfait, tandis qu'elle ne nuit pas aux larves.

Nous venons de considérer le cas d'espèces qui se métamorphosent en terre. S'agit-il, au contraire, de larves qui se transforment dans la galle ou dans l'organe qui les nourrit, et dans le courant de la même année, il faut alors, si c'est possible, attendre pour la récolte que la

(1) Dans l'intervalle, on recouvrira le pot à éclosion avec une autre cloche, pour empêcher que les Diptères posés sur la terre ne s'échappent.

(2) L'examen au microscope doit se faire de préférence après que l'insecte a rempé pendant quelques heures dans l'alcool, parce qu'il est alors moins mou et il n'y a plus à craindre de l'écraser.

nymphose ait eu lieu; il suffira de conserver ces galles dans une boîte en fer-blanc ou sur de la terre humide et sous cloche; les Diptères en sortiront en peu de jours. Si on les récolte avant la nymphose, il faut couper les rameaux et les plonger dans un vase d'eau, comme il a été expliqué plus haut.

La métamorphose qui se fait dans la galle ne doit-elle avoir lieu que l'année suivante, il faut alors, si ces galles sont persistantes, comme cela a lieu pour les renflements des Saules dus aux *Rhabdophaga*, ceux des Ronces, des *Eryngium* et de diverses autres Ombellifères, dus aux *Lasioptera*, ceux des graines de *Tanacetum*, d'*Achillea*, de *Matricaria* dus aux *Clinorrhyncha*, etc., ne les récolter qu'à la fin de l'hiver ou au commencement du printemps et les traiter comme il vient d'être dit pour les espèces qui se transforment dans la galle de la même année. Certaines plantes sont difficiles à maintenir fraîches, telles sont le Genévrier, l'If, les Chênes verts; aussi l'élevage des Cécidomyies qui forment des galles sur ces espèces, ne pourrat-il guère réussir que si on attend la nymphose.

Si les galles sont caduques, comme c'est le cas, par exemple, pour celles de *Mikiola fagi* Hart., *Oligotrophus bursarius* Br., *O. betulæ* Winn., *O. Reaumurianus* Fr. Lw., on les mettra dès l'automne sur de la terre maintenue humide et on pourra les recouvrir de mousse ou même d'un peu de terre, afin d'empêcher qu'elles ne se dessèchent ou ne se couvrent de moisissure.

Après avoir obtenu l'insecte parfait, il faut avoir soin de recueillir aussi les dépouilles nymphales qu'on verra fixées par leur partie inférieure dans la terre ou dans la galle, après la sortie de l'imago. Comme nous l'avons dit en traitant de la nymphe, elles offrent des caractères très utiles pour la détermination des espèces.

Si l'on veut se procurer les nymphes vivantes et si la métamorphose a lieu dans les galles, il n'y a qu'à ouvrir une de celles-ci, quand les éclosions commencent, ou bien on saisit une nymphe avec une épingle humectée, au moment où elle se hisse hors de sa prison. S'agit-il au contraire d'espèces qui se métamorphosent en terre, on pourra employer le moyen suivant. On prend un tube de verre long d'environ 5 centimètres et large de 1 centimètre; après l'avoir rempli de terre humide, dans sa moitié inférieure, on pratique entre la paroi du verre et la masse de terre, au moyen d'une aiguille, des enfoncements étroits mais profonds, puis on y dépose les larves qui doivent se métamorphoser. Au bout de quelques instants la plupart des insectes auront pénétré dans ces fossettes et comme elles y demeurent visibles à travers la paroi du verre, on n'aura qu'à les sortir lorsqu'elles seront transformées en nymphes.

Si les larves ne doivent se métamorphoser que l'année suivante, le procédé sera encore le même, avec cette différence que le tube devra être ouvert aux deux bouts ⁽¹⁾, et la moitié inférieure qui contient la terre avec les larves plongera dans la terre du récipient dans lequel on a mis les autres larves. Quand, au printemps, les éclosions commenceront à se produire, on sortira le tube et on y trouvera les nymphes formées.

II. — Conservation des Cécidomyies.

En se desséchant, les Cécidomyies perdent leur forme et leurs couleurs. Leur corps se racoquille et revêt une teinte sombre; les nodosités des antennes se rétrécissent, prennent un autre aspect et deviennent parfois difficiles à distinguer les unes des autres. Ajoutons à cela que la petitesse de ces Diptères ne permet pas de reconnaître leurs caractères au moyen d'une loupe et exige l'emploi du microscope. Voilà pourquoi l'ancienne méthode de piquer les Cécidomyies en leur traversant le thorax au moyen d'une épingle, comme cela a lieu pour les autres Diptères, est à rejeter comme défectueuse. Il en est de même de la méthode consistant à les piquer à l'extrémité d'un fil de platine ou à les coller, car elle ne permet pas davantage l'examen au microscope. Les types que l'on conserve dans les Musées, et qui sont piqués ou collés, n'ont donc à peu près aucune signification, tant qu'on ne les aura pas rendus aptes à être examinés au microscope. Cela est surtout le cas pour les types de Meigen et de Walker, dont on ne peut, dans la plupart des cas, pas même reconnaître le genre, parce que les diagnoses sont absolument insuffisantes ⁽²⁾.

(1) Si la terre y est un peu tassée, elle ne tombera pas hors du tube; dans le cas contraire, on peut se servir d'un bouchon fermant imparfaitement et laissant ainsi une communication entre la terre du tube et celle du vase.

(2) C'est pour ce motif qu'on n'a pas hésité, au Musée de Berlin, à ramollir dans l'alcool et à extraire des épingles, les débris des types de H. Loew, bien que les descriptions données par cet auteur soient plus détaillées que celles de Meigen. On a pu ainsi les faire examiner au microscope et en donner une description plus détaillée. M. Brauer, de Vienne, m'a permis également de préparer de la même façon deux types de la collection de Fr. Löw, que j'avais désirés. Au Muséum de Paris, où l'on conserve les types de Meigen, on n'a pas été d'avis de permettre l'emploi de cette méthode. Les démarches que j'ai faites à ce sujet m'ont obtenu seulement l'assurance qu'on me permettrait d'examiner ces types à la loupe, si je voulais me rendre à Paris. Mais comme l'examen à la loupe ne me permettrait guère d'en dire plus que ne l'a fait Meigen, ces types continueront à être inutiles, en attendant que les années aient achevé de les

Pour conserver les Cécidomyies à l'état d'insecte parfait ou de nymphe, j'emploie le procédé suivant. Je mets les Diptères, après les avoir asphyxiés, avec leurs nymphes, dans un petit tube en verre, étroit, long d'environ 3 centimètres, et contenant de l'alcool additionné d'un peu de glycérine.

Chaque tube porte le nom de l'espèce qu'il renferme. Ce procédé a l'avantage de se faire rapidement et sans perte de temps, et de permettre à tout moment l'examen au microscope. Il a d'autre part un double inconvénient : les couleurs et les écailles disparaissent et l'alcool demande à être renouvelé au bout de quelques années.

S'il s'agit de préparer d'après cette méthode des insectes piqués ou collés sur papier, il suffit de les plonger pendant quelque temps dans de l'alcool; puis on les détachera doucement, ce qui se fera sans difficulté, s'ils sont piqués à un fil de platine ou collés sur papier; mais si leur thorax est traversé par une épingle, on devra couper celle-ci, après le ramollissement, le plus près possible de l'insecte; il arrivera alors fréquemment que l'insecte se brisera en deux parties pendant qu'on le détache de l'épingle.

Au Musée de Berlin, on conserve les Cécidomyies d'après un autre procédé. L'insecte, qu'on a d'abord plongé quelque temps dans l'alcool, après lui avoir enlevé une aile conservée à part, est déposé ensuite sur une mince lamelle de verre (comme les lamelles couvre-objet), de forme carrée, et mesurant 18 mill. de chaque côté. On laisse l'alcool s'évaporer un peu, puis on le remplace par une gouttelette de glycérine. S'il se forme alors des bulles d'air autour du Diptère, il faut les faire disparaître en comprimant doucement. On aura soin d'étaler ensuite l'aile de l'insecte et de donner à la tête, à l'oviducte ou à la pince, une position permettant de bien distinguer ces parties. Cela fait, on recouvre avec une autre lamelle mince et carrée, mesurant 12 à 15 mill. de chaque côté, puis on met le tout sur un bout de papier portant le nom de l'insecte et on le laisse ainsi pendant huit jours sous une cloche en verre, pour que l'alcool achève de s'évaporer. On sera obligé d'ajouter alors un peu de glycérine pour remplacer l'alcool qui s'est évaporé. On termine en entourant la lamelle supérieure d'un bord de « Gold-Size » (1). Au bout de 24 heures ce bord est suffisamment durci pour qu'on puisse mettre la préparation dans un sachet de papier.

détériorer. Je suis obligé de relever cela ici, afin d'éviter le reproche d'avoir ignoré les types, en considérant les espèces de Meigen comme *nomina nuda* n'ayant qu'un intérêt historique.

(1) Fabriqué par W.-M. West, Horton Lane, 15, Bradford, et fourni par Klönne et Müller, Berlin, Luisenstrasse, 49.

Ce sachet est fermé sur trois côtés et se compose de deux bouts de papier un peu épais, de forme carrée, distants l'un de l'autre d'environ 2 mill. et mesurant de chaque côté 24 mill. ; leur milieu est percé d'une ouverture circulaire, dont le diamètre mesure 10 mill. Après avoir déposé la préparation dans ce sachet, qu'on pourra faire fabriquer par un relieur quelconque ⁽¹⁾, on transperce le côté demeuré ouvert avec une forte épingle qui empêche ainsi la préparation de glisser hors du sachet et permet de la ranger dans la Collection.

Cette méthode a également deux inconvénients : d'une part, elle demande beaucoup de temps et de soins, et d'autre part, l'insecte ne peut être examiné que sous la forme qu'on lui a donnée une fois pour toutes.

Quant à la conservation des peaux larvaires ⁽²⁾ et des dépouilles nymphales, on emploie, au Musée de Berlin, le même procédé que pour les insectes parfaits. Je trouve plus avantageux de conserver ces sujets d'étude dans de minimes sachets de papier portant chacun le nom de l'espèce qu'il renferme. On peut, de cette façon, examiner à tout moment ces objets au microscope, en ayant soin de les laisser, pendant quelques instants, plongés dans une gouttelette d'eau sur la lamelle porte-objet, afin de les ramollir.

§ 3.

CLASSIFICATION DES CÉCIDOMYIES.

Nous avons vu au commencement de ce travail (p. 2) comment les insectes qui nous occupent ont été rangés primitivement dans le genre *Tipula*, par Linné, parmi les *Chironomus*, par Fabricius, parmi les *Scatopse*, par Geoffroy, et que Meigen a créé pour eux un genre (*Cecidomyia*) et Zetterstedt, une famille (*Cecidomyzidae*). Il nous reste maintenant à classer cette famille, c'est-à-dire à chercher la place qu'elle doit occuper dans l'ordre des Diptères; puis, après avoir examiné ainsi ses affinités avec les autres familles du même ordre, nous considérerons les affinités de ses représentants entre eux, en établissant la division des Cécidomyies.

(1) Le relieur Hoffmann, Berlin, Müllerstr. 160, les vendait en 1891 à 15 francs le mille.

(2) Nous avons indiqué, en parlant de la larve, comment on prépare ces peaux.

I. — Rapports des Cécidomyies avec les autres familles des Diptères.

Le tableau suivant indique la place à assigner aux Cécidomyies dans le cadre des Diptères proboscides.

1. Antennes composées seulement de trois articles. (Brachycères).
— Articles des antennes au minimum de six (Nematocères). 2
2. Prothorax séparé du mésothorax par une suture en forme de bourrelet transversal. Ailes à nervures nombreuses.
..... *Tipulidae*
— Prothorax et mésothorax non séparés par un bourrelet transversal..... 3
3. Hanches plus ou moins prolongées. Tibias terminés par deux épérons. Ocelles présents..... 4
— Hanches non prolongées. Tibias inermes, rarement avec épérons et alors les ocelles font défaut..... 5
4. Hanches fortement prolongées..... *Mycetophilidae*
— Hanches faiblement prolongées..... *Sciaridae*
5. Avec une cellule discoïdale et des ocelles. Antennes nues et subulées..... *Rhyphidae*
— La cellule discoïdale manque, ou bien, si elle est présente, les ocelles font défaut..... 6
6. Nervure costale bordant toute l'aile..... 7
— Nervure costale nulle au bord postérieur de l'aile..... 9
7. Ailes à nervures peu nombreuses (six longitudinales au maximum et une seule transversale). Avec ou sans ocelles..... *Cecidomyidae*
— Ailes à nervures nombreuses (plus de six longitudinales et plus d'une transversale)..... 8
8. Ailes formant toit au repos, pointues au bout et n'ayant de nervures transversales qu'à la base..... *Psychodidae*
— Ailes planes au repos, arrondies au bout, avec des nervures transversales à la base et au milieu..... *Culicidae*
9. Antennes plus courtes que le thorax, à articles plus gros que longs et dépourvues de panache et de verticille... 10
— Antennés aussi longues ou plus longues que le thorax, com-

posées d'articles ordinairement munis d'un panache chez le mâle ou d'un verticille chez la femelle; ou bien les articles sont plus longs que gros. Ocelles nuls. *Chironomidae*

10. Avec ocelles. Cuisses un peu épaisses..... *Bibionidae*

— Sans ocelles. Tibias et tarses élargis et déprimés.... *Simulidae*

En considérant les larves ou les nymphes, leur place dans l'ordre des Diptères sera indiquée par le tableau suivant, d'après le système de Brauer et Schiner.

1. Larve avec une tête complètement différenciée ou du moins avec une charpente céphalique plus ou moins rudimentaire et chitineuse. Nymphelibre et en momie, ou bien renfermée dans la peau larvaire; celle-ci se fendant au moment de l'éclosion, sous forme de fente dorsale ou en forme de T, du moins dans la grande majorité des cas. (Orthorhaphes)..... 2
- Larve acéphale, c'est-à-dire sans tête différenciée et même sans rudiment de charpente céphalique; mandibules souvent indiquées par une paire de crochets chitineux et parallèles servant à forer et impropres à la mastication. Nymphedormante, renfermée toujours dans la peau larvaire ou puppe; celle-ci cylindrique, arrondie aux deux bouts, s'ouvrant circulairement, au moment de l'éclosion, au pôle antérieur, et jamais en fente dorsale..... *Cyclorhapha*
2. Mandibules broyeuses, c'est-à-dire se mouvant l'une vers l'autre, ou bien rudimentaires. (*Nematocera*)..... 3
- Mandibules se mouvant parallèlement ou en dehors, en forme de crochets; tête allongée..... *Brachycera*
3. Mandibules rudimentaires. Tête non différenciée, mais avec une charpente plus ou moins chitineuse et rudimentaire et avec deux palpes. Corps péripneustique, de 14 segments, avec une double tache oculaire et ordinairement une spatule sternale. Nymphelibre, rarement dans la peau larvaire. (*Oligoneura*)..... *Cecidomyiidae*
- Mandibules bien développées..... 4
4. Tête bien différenciée et arrondie, ordinairement pourvue

- d'yeux. Corps de 12 à 13 segments. Nymphé libre. (*Eucephala*) 5
- Tête moins développée, à pièces libres en partie et formant seulement une charpente mandibulaire. (*Polyneura*)..... 13
5. Second segment somatique avec un ou deux appendices faisant office de pseudopode..... 6
- Second segment somatique sans pseudopode..... 7
6. Appendice du 2^e segment unique, formant un tube en cône tronqué. Corps gros, plus mince au milieu; tête horizontale, avec une paire de taches oculaires sur chaque côté. Nymphé dormante..... *Simulidae*
- Appendice unique ou double, non en forme de tube. Larve amphipneustique ou avec vessies à trachées. Tête inclinée et pourvue d'yeux. Nymphé dormante ou se mouvant..... *Chironomidae*
7. Céphalothorax et les cinq segments suivants munis chacun, en dessous, d'une ventouse médiane. Corps en forme de Cloporte, lisse et dur. Tête pourvue d'yeux et connée aux segments suivants. Tous les segments munis, de chaque côté, d'un appendice conique et velu..... *Blepharoceridae*
- Point de ventouses sur le dessous des segments; corps autrement conformé..... 8
8. Larve péripneustique..... 9
- Larve amphipneustique ou avec vessies à trachées..... 10
9. Larve nue. Nymphé dormante..... *Mycetophilidae* (à l'exception de *Mycetobia*) et *Sciaridae*
- Larve velue, à tête inclinée. Nymphé dormante... *Bibionidae*
10. Corps en forme de serpent; tête grêle; dernier segment muni de deux pointes..... *Rhyphidae* (et *Mycetobia*) .
- Corps non anguilluliforme; tête pourvue d'yeux..... 11
11. Tête horizontale, les segments suivants épaissis; extrémité postérieure du corps avec appendices. Nymphé nageante. Larve amphipneustique ou avec vessies à trachées. *Culicidae*
- Tête inclinée. Larve toujours amphipneustique..... 12

12. Extrémité postérieure du corps avec un tube respiratoire court. Nymphé dormante..... *Psychodidae*
- Extrémité postérieure du corps avec un tube respiratoire long et filiforme. Nymphé munie, sur le devant, d'un long tube respiratoire..... *Ptychopteridae*
13. Mandibules minces, en forme de crochets et ordinairement simples; palpes très grands, coniques et rétractiles. 2^e segment souvent avec un pseudopode rétractile. Corps amphipneustique..... *Limnobiidae*
- Mandibules grosses, fortement dentées au côté interne; mâchoires avec un palpe court. Jamais de pseudopode. Extrémité postérieure du corps souvent avec des appendices étoilés autour des stigmates. Larve méta- ou amphipneustique..... *Tipulidae*

On a constaté que, chez les Diptères, le nombre des nervures des ailes augmente dans la même proportion que celui des articles des antennes diminue. Chez les Brachycères, les ailes sont richement pourvues de nervures, mais les antennes ne se composent que de trois articles. Dans la famille des Cécidomyiées nous trouvons au contraire, d'une part, la plus faible nervation alaire, et, d'autre part, le plus grand nombre d'articles antennaires. C'est pour ce motif qu'on a formé pour elle la tribu des *Oligoneura*, et qu'on la place au commencement de l'ordre des Diptères. Chez *Leptosyna* Kieff., les balanciers sont démesurément allongés, comprimés, à bords ciliés, à surface couverte de poils microscopiques comme ceux de l'aile; ils offrent un peu l'apparence d'une seconde paire d'ailes.

Nous considérons donc la famille des Cécidomyiées comme formant le premier anneau de la chaîne des Diptères. Les familles qui la suivent de plus près sont celles des Sciarides et des Bibionides, puis, d'une façon moins rapprochée, celle des Chironomides, enfin d'une façon plus éloignée encore celles des Psychodides et des Ptychoptérides.

En effet, si nous la comparons d'abord à celle des *Sciaridae*, nous remarquons que la nervation de ces dernières est la même que celle des derniers genres de Cécidomyiées, tels que *Lestremia* et *Catocha*; c'est pour ce motif que Meigen n'a pas cru devoir séparer *Lestremia* de *Sciara*, en 1818. L'abdomen, et notamment l'oviducte de la femelle et la pince anale du mâle, sont formés de la même façon chez les Lestrémines et chez les Sciarides. Si ces dernières ont ordinairement des antennes à articles cylindriques et sans verticilles, on sait que cette

forme se retrouve aussi dans les genres *Asphondylia* et *Polystepha* qui appartiennent aux Cécidomyies. De même, si les Sciarides ont d'habitude une pilosité alaire microscopique et non appliquée, on n'ignore pas que, d'une part, cette même pilosité se retrouve chez plusieurs Cécidomyies appartenant aux Hétéropézines, et que d'autre part, certaines Sciarides, par exemple *Trichosia* et *Metangela*, ont les ailes velues comme les Cécidomyies. Nous n'avons pour les séparer les unes des autres, à l'état d'imago, qu'un seul caractère à peu près constant : chez les Sciarides, les hanches sont un peu prolongées et les tibias armés d'éperons à leur extrémité; mais encore ce dernier caractère se retrouve-t-il chez une Cécidomyie, *Choristoneura sarothamni* Kieff.; j'aurais, pour ce motif, exclu cet insecte de la famille des Cécidomyies, si sa larve n'offrait pas tous les caractères de ces dernières.

Le genre *Zygoneura*, que l'on a classé tantôt parmi les Cécidomyies tantôt parmi les Sciarides, se rapproche des premières non seulement par sa nervation alaire, mais encore par ses antennes moniliformes, munies de verticilles, et par ses tibias qui, chez *Z. tenella* H. Lw., sont à peu près inermes. C'est donc avec raison que H. Loew a écrit : « On pourrait placer *Zygoneura* parmi les Cécidomyies comme genre formant frontière, puisque *Z. tenella* a les éperons extrêmement faibles et qu'on trouve aussi chez *Lasioptera* un vestige de ces éperons, leur tibia portant à leur extrémité une soie plus forte. La principale différence entre les *Zygoneura* et les Cécidomyies qui s'en rapprochent le plus, consiste dans la pilosité alaire qui, chez le premier, est uniformément microscopique (1); *Zygoneura* est, pour ce motif, exclu des Cécidomyies, ce qui paraît parfaitement justifié si on élève le genre *Sciara* au rang d'une famille... Mais si on place le genre *Sciara* parmi les Mycétophilides, il me paraîtrait plus rationnel de classer *Zygoneura* parmi les Cécidomyies que parmi les Mycétophilides. Ce n'est qu'après la découverte et l'examen de l'état larvaire de cet insecte, qu'on pourra trancher définitivement la question » [402 p. 19]. Nous sommes entièrement de l'avis de H. Loew : les larves des Sciarides et des Mycétophilides avec leur tête ronde et armée de mandibules broyeuses, se distinguent à première vue de celles des Cécidomyies; il faut donc attendre la découverte de la larve de *Zygoneura* pour assigner avec certitude une place à ce genre, et nous considérons provisoirement cet insecte comme appartenant aux Sciarides, mais formant frontière avec les Cécidomyies. Nous en dirons autant du genre *Planetella* Westw. (*Planetes* Walk.)

(1) Cette différence n'existe pas, puisqu'on connaît plusieurs genres de Cécidomyies à pilosité alaire microscopique.

que Walker et Westwood classaient parmi les Cécidomyies, tandis que H. Loew n'ose se prononcer, et que Schiner rejette cet insecte parmi les Sciarides.

Si nous comparons ensuite la famille qui nous occupe avec celle des *Bibionidae*, nous trouvons une affinité tout aussi frappante entre les mêmes genres *Lestremia* et *Catocha* d'une part, et le groupe des Scatopsines d'autre part. Ici encore la nervation alaire est la même; en outre, les tibias sont inermes; la forme des antennes des *Scatopse* se retrouve dans le genre *Choristoneura* qui appartient aux Cécidomyies gallicoles et dont les articles du funicule sont, même chez le mâle, beaucoup plus gros que longs, rapprochés et dépourvus de verticilles, tandis que le scape est très allongé et l'article suivant obconique; enfin la métamorphose, qui a lieu dans une puppe, chez *Scatopse*, se fait de la même façon chez plusieurs Cécidomyies, à l'exclusion de toutes les autres familles des Diptères nématocères. Cette parenté qui relie les deux familles explique comment *Anarete* Hal. a pu être classé par un diptérologiste éminent, H. Loew, parmi les Lestrémines, dans la famille des Cécidomyies, et par un autre diptérologiste non moins compétent, Schiner, parmi les Scatopsines, dans la famille des Bibionides. Ce dernier écrit à ce sujet : « Il me paraît tout à fait impossible de trouver, pour *Anarete*, une place dans la famille des Cécidomyies. La présence des ocelles, la forme des antennes, la nervation alaire, le bord inférieur de l'aile ressortant fortement à la base et le facies général le défendent absolument. Je comprendrais encore plutôt qu'on leur assignât une place parmi les Sciarines comme l'a fait Zetterstedt » [659, p. 354, note]. Tous les motifs indiqués par Schiner sont insuffisants. Toutes les Lestrémines sont pourvues d'ocelles, ce que Schiner ignorait; quant à la forme des antennes, nous venons de voir qu'un genre de Cécidomyies gallicoles les a conformées comme les Scatopsines; du reste, les antennes d'*Anarete albipennis* ressemblent à celles de *Catocha* et nullement à celles des *Scatopse*; pour la nervation alaire, on la retrouve chez *Lestremia* et *Catocha*; il en est de même de leur facies général; enfin leur base alaire ressort à peine plus brusquement que chez plusieurs Lestrémines.

Nous rejetons néanmoins l'opinion de H. Loew et adoptons celle de Schiner, en considérant *Anarete* comme appartenant aux Bibionides, mais formant frontière avec les Cécidomyies; nous nous appuyons pour cela sur le motif suivant : chez les Bibionides, la nervure costale ou épaississement du bord antérieur ne fait jamais le tour de l'aile et cesse complètement après sa jonction avec le cubitus ou un peu après elle; chez les Cécidomyies, au contraire, elle se continue, quoique plus

faiblement, sur le bord postérieur de l'aile. Or *Anarete albipennis* offre sous ce rapport le caractère des Bibionides, ce qu'aucun auteur n'avait constaté jusqu'ici. Toutefois, ici encore, nous ajoutons qu'on ne pourra en décider définitivement qu'après la découverte et l'examen de la larve de cet insecte.

La parenté qui relie les Cécidomyies aux *Chironomidae* est moins grande. Elle est indiquée par la nervation alaire qui, chez ces derniers, s'écarte peu de celle des Cécidomyies, bien qu'elle ne soit pas la même. La pilosité alaire est souvent semblable. Le prothorax, qui s'avance fréquemment par-dessus la tête sous forme de capuchon, se retrouve dans un genre de Cécidomyie, à savoir *Hormomyia*. Les antennes des femelles du groupe *Chironomus* ont des verticilles de soies et divers appendices, comme c'est le cas pour les Cécidomyies. L'habitude qu'ont ces mêmes insectes de tenir, au repos, les deux pattes postérieures relevées et légèrement recourbées, se trouve aussi chez *Choristoneura sarothamni* Kieff., c'est-à-dire chez cette Cécidomyie gallicole qui, à elle seule, relie les Cécidomyies aux Bibionides dont elle a les antennes, aux Sciarides dont elle a les éperons, et aux Chironomides comme nous venons de le dire. Ajoutons encore que la spatule sternale des Cécidomyies offre une certaine analogie avec le pseudopode unique ou double des larves des Chironomides. Parmi les genres dont la place est incertaine, nous signalons d'abord *Limnophyes* Eat. J'avais d'abord [291, p. 133] adopté l'opinion d'Eaton, de P. Löw et de Bergenstamm, qui le considéraient comme faisant partie des Cécidomyies et lui assignaient sa place parmi les Lestrémines; je crois plus rationnel de le placer parmi les Chironomides, comme l'a fait Mik. Il en est de même des genres *Psychosphaena*, *Spaniotoma*, *Pentaneura* et *Tetrephora* Phil. que Philippi a classés parmi les Cécidomyies [578], tandis que Schiner les place dans les Chironomides.

La distance qui sépare les Cécidomyies des *Psychodidae* et des *Ptychopteridae* est plus grande encore. Les nervures alaires sont nombreuses chez ces dernières, et c'est ce qui les éloigne des Cécidomyies; mais, d'autre part, leurs antennes moniliformes, ornées de verticilles de poils, l'absence d'une cellule discoïdale, le petit nombre de nervures transversales, la pilosité alaire qui est présente encore, quoique restreinte au bord et aux nervures sous forme d'écailles, enfin la conformation de la nymphe les en rapprochent.

Il ne faut donc pas trop s'étonner si Haliday (Westwood's Introduction) a placé parmi les Cécidomyies les genres *Psychoda*, *Saccopteryx*, *Trichomyia* et *Sycorax*.

II. — Affinités des Cécidomyies entre elles.

Nous venons de voir comment la famille des Cécidomyies se rattache aux autres familles des Diptères. Il nous reste à considérer quelles affinités relient ses représentants entre eux. Dans ce but nous exposons les essais de classification qui ont été tentés jusqu'en 1890, puis nous établirons la division que nous avons adoptée.

1^o Revision critique des genres établis jusqu'en 1890.

CECIDOMYIA Meig. — Ce genre, le plus ancien de tous, a été établi en 1803 par Meigen dans les termes suivants : « *Antennes dirigées en avant, courbées par en haut, à articles nouveaux et munis de soies; celles du mâle composées de 24 articles* ⁽¹⁾; *celles de la femelle, de 12 articles. Ailes planes et parallèles, traversées par 3 nervures. Tipula pini D. G.* » [475, p. 261]. — Cette diagnose, avec l'indication d'une espèce typique bien connue, ne permet pas de confondre ce genre avec aucun autre. Quinze ans plus tard, Meigen, en établissant les genres *Lusioptera* et *Campylomyza*, donna au genre *Cecidomyia* une extension égalant presque celle de la sous-famille des *Cecidomyiinae*. Tous les diptérologistes antérieurs à H. Loew, à savoir Latreille, Macquart, Rondani en 1840 et en 1846, et Zetterstedt, suivis plus tard par Walker, ont pris le genre *Cecidomyia* dans le sens primitif que lui donna Meigen. Cet exemple ne fut malheureusement pas suivi en 1850 par H. Loew. Sous le prétexte futile et faux ⁽²⁾ que les insectes auxquels s'adaptent la diagnose de Meigen ne produisent pas de galles et portent par suite une dénomination imméritée [402, p. 20], il imposa le nom de *Cecidomyia* aux espèces que Rondani et Westwood avaient réunies antérieurement dans les genres *Dasyneura* Rond. et *Rhabdophaga* Westw., et créa le nom de *Diplosis* avec la diagnose générique de *Cecidomyia* Meig. Quelque injuste qu'elle fût, la nomenclature de H. Loew fut adoptée par la plupart des auteurs. En vain, le docteur F. Karsch essaya-t-il de rétablir le genre *Cecidomyia* dans le sens primitif de Meigen, et de lui donner comme synonyme le nom de *Diplosis* H. Lw. [250], cette louable tentative échoua, parce que l'on craignait de semer la confusion dans l'étude

(1) Comme d'habitude, Meigen compte seulement les articles du funicule.

(2) En effet, bien des *Diplosides* forment de véritables galles, par exemple *Cont. tiliarum* Kieff., *Acodiplosis inulae* H. Lw., etc. Ce prétexte, qui n'est donc pas fondé, est d'autant plus incompréhensible que H. Loew, avait décrit lui-même, trois ans auparavant et encore une fois en 1850, une *Diploside* (*inulae* H. Lw.) qui forme des galles proprement dites.

de ces insectes, en renversant une nomenclature universellement adoptée (1). Actuellement cet inconvénient n'est plus à craindre; le genre *Cecidomyia* Meig. ayant été démembré, on peut laisser ce nom à l'espèce typique, *C. pini* D. G., d'autant plus que ce genre ainsi restreint ne comprend que quelques espèces.

A la suite du docteur F. Karsch nous considérerons donc dans ce travail le nom de *Diplosis* H. Lw. comme un simple synonyme de *Cecidomyia* Meig.; cela ne nous empêchera pas de conserver au groupe le nom de *Diplosides* (*Diplosurinae*).

OLIGOTROPHUS Latr. 1805. — « Trompe n'étant point saillante; antennes moniliformes, tête transversale. Je rapporte à ce genre la Tipule des galles du Genévrier de Gêr [v. 6, pl. XXV, fig. 7, 8]. Cet insecte est brun, les ailes sont ovales, velues, à trois nervures » [354, p. 285-286]. Bien que cette diagnose soit insuffisante, on maintient avec raison le genre *Oligotrophus*, parce que Latreille a donné comme type un insecte connu.

LASIOPTERA Meig. 1818. — Ce genre est pris universellement dans le sens restreint que lui donna Meigen (*Lasioptera* A. Premier article des tarses court). Il est à remarquer que, sous le nom de *Lasioptera*, l'auteur a compris aussi des *Lasiopteryx* Westw. (*Lasioptera* B. Premier article des tarses plus long que le second) et *Choristoneura stygia* Meig., en indiquant toutefois que cette dernière espèce devait probablement former un genre spécial [477, p. 88].

CAMPYLOMYZA Meig. 1818. — « Antennes dirigées en avant, de 14 articles (♀) y compris les deux basaux qui sont plus gros, les autres courts et cylindriques. Trois ocelles. Ailes velues, à trois nervures. Premier article des tarses plus long que le 2^e. » Le dessin alaire représente la forme ordinaire des ailes des insectes du groupe *Campylomyza*. Les quatre espèces énumérées sont : *flavipes*, *bicolor*, *atra* et *aceris* [477, p. 101-102].

La diagnose donnée par Meigen s'applique à tout un groupe. Le nom de *Campylomyza* doit donc rester à un des genres dont se compose ce groupe.

LESTREMIA Macq. 1826. — « Tête hémisphérique. Antennes de 15 articles globuleux et pédicellés chez le mâle, cylindriques chez la femelle. Pieds longs et grêles. Balanciers à long pédicule. Ailes couchées et

(1) Voir la polémique qui eut lieu à ce sujet entre le docteur Fr. Löw et le docteur F. Karsch [253 et 416].

larges; une cellule marginale divisée par une nervure transversale; quatre postérieures, la 2^e pétiolée, non élargie à sa base » [428].

CATOCHA Hal. 1833. — « Antennes du mâle de 16 articles globuleux, distants et velus; celles de la femelle de 10 articles plus courts; les deux articles basilaires plus gros. Trois ocelles. Chez la femelle, les 4 derniers articles des tarsi dilatés, ovalaires, diminuant graduellement. Ailes velues, semblables à celles de *Campylomyza*, à l'exception de la nervure marginale courbée en arrière et émettant une nervure fourchue au bord, et des deux dernières qui ne se réunissent qu'à la base de l'aile » [200].

En 1840, Rondani proposa la division suivante qui, quelque imparfaite qu'elle soit, dénote cependant que l'auteur italien avait bien su distinguer les genres [603].

I. CECIDOMYINAE (1). Article 1^{er} des tarsi très court, etc.

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Articles des antennes sessiles dans les deux sexes..... | 2 |
| — Articles des antennes pétiolés chez le mâle..... | 3 |
| 2. Parties buccales allongées et perpendiculaires, larges à leur base et mucronées à l'extrémité..... | <i>Ozirhynchus</i> Rond. |
| — Bouche très courte..... | <i>Lasioptera</i> Meig. |
| 3. Première nervure aboutissant au bord antérieur avant l'extrémité alaire..... | 4 |
| — 1 ^{re} nervure aboutissant au bord postérieur de l'aile..... | 5 |
| 4. Antennes de 14-15 articles? ♂, ou de 11-12? chez la femelle..... | <i>Brachyneura</i> Rond. |
| — Antennes de 14 articles dans les deux sexes..... | <i>Dasyneura</i> Rond. |
| 5. Antennes de 14 articles dans les deux sexes..... | <i>Porricondyla</i> Rond. |
| — Antennes de 20 articles dans les deux sexes..... | <i>Phytophaga</i> Rond. |
| — Antennes de 24-26 articles chez le ♂, de 14-15? chez la ♀..... | <i>Cecidomyia</i> Meig. |

(1) Rondani écrit : *Cecidominae*, *Ozirhinchus*, *Brachineura*, *Dasineura*; nous reproduisons ces dénominations en les corrigeant, autant que cela est possible. On devrait écrire aussi : *Oxyrhynchus*, mais comme cette dénomination a été employée déjà antérieurement, il faut conserver le nom défectueux d'*Ozirhynchus*.

II. LESTREMINAE. — Article 1^{er} des tarsi très allongé, etc.

1. Ailes sans nervure médiane ou avec une nervure médiane formant une ligne presque invisible..... 2
- Ailes avec une nervure médiane et fourchue..... 3
2. Antennes de 10 articles ♂..... *Micromyia* Rond.
- Antennes de 15 articles ♂..... *Neurolyga* Rond.
3. Articles des antennes du ♂ longuement pétiolés..... 4
- Articles des antennes à peine pétiolés ♀ ♂..... *Sciara* Meig.
4. Fourche dilatée à sa base..... *Zygoneura* Meig.
- Fourche à base aiguë..... 5.
5. Ocelles nuls..... *Lestremia* Macq.
- Ocelles distincts..... 6
6. Deux ocelles..... *Mimosciara* Rond.
- Trois ocelles..... 7
7. Tarsi des mâles dilatés..... *Catocha* Hal.
- Tarsi non dilatés..... *Anarete* Hal.

Les nouveaux genres sont établis de la façon suivante :

OZIRHYNCHUS. — « Bouche longue, perpendiculaire, large à sa base et mucronée à son extrémité. Antennes de 12 articles sessiles et arrondis, à l'exception du 1^{er} qui est conico-cylindrique. Palpes de 4 articles, dont le 1^{er} petit, les suivants allongés et subégaux. Ailes munies seulement de deux nervures qui sont les postérieures; moitié basale du bord antérieur de l'aile épaissie. Type : *O. longicollis* Rond. [l. c. p. 16]. D'après la fig. 4 les deux nervures postérieures de l'aile sont simples; cela concorde avec la diagnose qu'il donne de nouveau en 1846 : « Seulement 2 nervures qui atteignent le bord postérieur et sont séparées depuis leur base jusqu'à leur sommet » [604 bis, p. 375]. Ce genre dont je ne connais pas de représentant, et que H. Loew et Karsch ont cru être identique à *Clinorhyncha* H. Lw., doit être maintenu; il diffère de *Clinorhyncha* H. Lw. comme *Choristoneura* Rbs. de *Lasioptera* Meig. Plus tard Rondani proposa de remplacer ce nom par celui d'*Acorhynchus* [608, p. 287].

BRACHYNEURA. — « Antennes du ♂ de 11-15 (?) articles pétiolés et en ovale arrondi; celles de la ♀ de 11 articles sessiles et globuleux.

Palpes de 3 articles. Seulement 2 nervures; la 1^{re} atteint le bord antérieur avant l'extrémité de l'aile, la 2^e ne se prolonge pas jusqu'au bord postérieur. Type : *fusco-grisea* n. sp. » [l. c., p. 17]. Le même genre a été décrit plus tard par Winnertz sous le nom de *Spaniocera*.

DASYNEURA. — « Antennes de 14 articles dans les deux sexes, ceux du mâle pétiolés. Palpes de 4 articles. Trois nervures alaires (ou, si l'on préfère, deux dont la postérieure est fourchue); la 1^{re} aboutit au bord antérieur avant l'extrémité de l'aile, les rameaux de la postérieure prolongés jusqu'au bord. Types : *luteo-fusca* Rond. et *obscura* Rond. » [l. c. p. 17]. Le dessin alaire (1840 et 1846) représente le cubitus très distinct du bord et aboutissant à une grande distance de l'extrémité alaire, ce qui exclut tous les autres genres des Cécidomyines et ne permet pas de confondre celui-ci avec n'importe quel autre (1). Les deux types demeureront toujours énigmatiques, mais, en 1860, il ajouta un insecte connu, *D. sisymbrii* Schrk.

H. Lœw agit en 1850 envers Rondani comme envers Meigen; il rejeta le genre *Dasyneura*, et le considéra comme synonyme de *Cecidomyia* H. Lw. non Meig., en alléguant les motifs suivants : *Dasyneura* ne serait pas suffisamment distinct de *Phytophaga* Rond., les deux types sont méconnaissables, le nom de *Dasineura* est mal formé, il aurait fallu écrire *Dasyneura*; enfin le nom de *Dasyneura* a été donné en 1841 par Saunders à un autre genre de Diptère.

Aucun de ces prétextes ne peut disculper l'auteur allemand. En effet, comme le docteur F. Karsch l'a remarqué déjà, si Saunders s'est servi du nom de *Dasyneura* en 1841, ce n'est pas une raison pour rejeter la dénomination employée par Rondani en 1840. Que les types soient méconnaissables, on l'accorde, mais la diagnose générique suffit. Le vice de formation pouvait tout au plus autoriser H. Lœw à corriger *Dasineura* en *Dasyneura*. Enfin, si en réalité *Dasyneura* n'était pas suffisamment distinct de *Phytophaga*, cela n'autorisait pas à rejeter les deux dénominations pour recourir à une troisième (2).

Nous conservons donc le genre *Dasyneura* pour toutes les Cécidomyines dont le cubitus est éloigné du bord et aboutit en deçà de la pointe alaire, et dont les articles antennaires sont pédicellés chez le mâle et ne paraissent pas deux fois aussi nombreux que ceux de la

(1) Pas plus pour ce genre que pour les précédents Rondani ne mentionne la première nervure longitudinale. En 1846, il répare cet oubli.

(2) H. Lœw a fait de même vis-à-vis de Bremi, en confondant deux espèces bien distinctes, *subpatula* Bremi et *capitigena* Bremi, et en choisissant la nouvelle dénomination *Cecid. euphorbiae* H. Lw.

femelle; les synonymes seront *Cecidomyia* H. Lw. pr. p. et *Dichelomyia* Rbs.

PHYTOPHAGA. — Sans diagnose générique. Les deux types sont : *salicina* D. G. et *cerealis* Rond., cette dernière espèce décrite plus tard. H. Lœw a fait observer que le nom de *Phytophaga* avait été employé antérieurement pour désigner d'autres insectes; il a donc eu raison en le rejetant.

PORRICONDYLA. — « Type : *albitarsis* Meig. Cette espèce diffère des autres Cécidomyies non seulement par le nombre des articles, mais encore par la forme des antennes. Celles-ci sont ossiformes chez le mâle et offrent au point de jonction d'un article avec le suivant une nodosité subglobuleuse, munie d'un sillon annulaire; celles de la ♀ sont allongées, cylindricofusiformes [l. c. p. 14]. La fig. 14 indique la forme ordinaire des articles du genre *Epidosis* H. Lw. Point de diagnose générique. En 1846, il indique que *Porricondyla* se distingue de tous les autres genres de *Cecidomyiinae* par la présence d'une nervure transversale [604 bis, p. 370]. H. Lœw a rejeté le nom de *Porricondyla* et l'a remplacé par *Epidosis*, sous prétexte que cette dénomination était mal formée, le type mal déterminé ⁽¹⁾ et que la nervure transversale existait aussi chez d'autres genres ⁽²⁾. A l'exemple de M. F. Karsch, nous rangeons donc *Epidosis* H. Lw. comme synonyme à la suite de *Porricondyla* Rond. ⁽³⁾, mais nous maintiendrons la dénomination « *Epidosides* » (*Epidosariae*) pour le groupe.

MICROMYIA. — « Antennes de 10 articles, dont le 1^{er} est subcylindrique, le 2^e sphérique et très gros, les suivants globuleux et munis d'un court pétiole. Palpes de 3 articles, dont le 2^e est le plus long et le 3^e très petit. Trois nervures longitudinales; la 1^{re} bifide à l'extrémité ⁽⁴⁾, la dernière fourchue; une nervure intermédiaire sous forme de ligne presque invisible. Trois ocelles disposés en arc. Type : *lucorum* Rond. » [l. c. p. 23]. D'après la fig. 14, reproduite de nouveau en 1846, cet insecte différerait de tous ceux du même groupe par la nervure

(1) C'est inexact; Meigen écrit, il est vrai, que les antennes d'*albitarsis* se composent de 12 articles; mais qu'on y ajoute les deux basaux que Meigen omet ordinairement et on aura les 14 articles indiqués par Rondani.

(2) C'est vrai, mais elle n'est marquée aussi fortement qu'une nervure longitudinale que dans le groupe des *Epidosides* et dans les *Lestrémines*.

(3) Plus tard [404, p. 377] H. Lœw a donné une plus grande extension à son genre *Epidosis* en y comprenant un *Camptomyia*.

(4) Le rameau inférieur n'est autre chose que la base du cubitus ou nervure transversale dans le sens de H. Lœw.

transversale aboutissant à la nervure discoïdale très près de la base de l'aile. Je ne connais pas de représentant de ce genre.

NEUROLYGA. — « Antennes du mâle de 14 articles globuleux et longuement pétiolés; celles de la femelle de 12 articles rapprochés et subcylindriques. Palpes de 4 articles subégaux. Trois ocelles en triangle. Trois nervures; les deux premières réunies par une ligne transversale; la 3^e bifurquée. Nervure intermédiaire sous forme de ligne presque invisible. Types : *fenestralis* Rond., *silvalis* Rond. [*l. c.*, p. 24] et *turmalis* Rond. » [*l. c.*, p. 25]. D'après la fig. 23, les articles des antennes sont tout à fait sessiles chez la femelle. Je ne connais aucune espèce de *Campylomyza* offrant ces caractères et je suis tenté de croire que l'auteur a décrit le mâle d'un genre (*Joannisia*?) et une femelle appartenant à un autre genre (*Prionellus* ou *Aprionus*?).

MIMOSCIARA. — « Antennes du mâle de 16 articles subsphériques et pétiolés; celles de la femelle, de 12 articles en ovale cylindrique et presque sessiles. Palpes de 4 articles, dont le 1^{er} est plus gros et plus court. Seulement deux ocelles rapprochés des yeux. Nervure intermédiaire fourchue, ayant son origine à la nervure transverso-marginale. Type : *molobrina* Rond. [*l. c.*, p. 25] et *lestremia*. Les mâles de ce genre ont le faciès des *Lestremia* et les femelles celui de *Sciara*, voilà pourquoi j'ai nommé une espèce *lestremia* et l'autre *molobrina*, et pourquoi j'ai créé le nom générique de *Mimosciara*. Il est voisin de *Catocha* Hal. et de *Lestremia* Macq. » [*l. c.*, p. 26]. Nous verrons un peu plus loin, au genre *Furcinerra* Rond., ce qu'il faut penser de *Mimosciara*.

DIOMYZA Westw. 1840. — Le nom de *Diomyza* apparaît une première fois chez Meigen, écrivant de *Lasioptera picta* Meig. que cet insecte lui a été envoyé par Megerle sous le nom de *Diomyza juniperi* [477, p. 89]. Une seconde fois nous trouvons ce nom chez Stephens (1), employé dans le même sens (*Lasioptera* A. Meig.), avec les espèces *fuliginosa*, *rubra* et *gigantea*, mais sans aucune diagnose. Un peu plus tard, en 1840, Westwood [805, p. 126] donne la première diagnose générique de *Diomyza* qu'il a pris dans le même sens que Stephens : « *Diomyza* Meig. (*Lasioptera* A. Meig.) 3 espèces. *D. fuliginosa* Steph. Bord antérieur de l'aile épaissi; une nervure longitudinale et bifurquée; tarses très longs, l'article basal court; antennes courtes, articles non verticillés. Steph., pl. 42, fig. 4. » En 1851, dans une seconde édition de l'ouvrage que nous venons de citer (t. 1, p. 70), Meigen nomme *Dio-*

(1) A Systematik Catalogue of British Insects. London, 1829, p. 240.

myza comme synonyme de *Lasioptera*. Enfin le même nom paraît en 1864 chez Schiner, mais dans un sens tout opposé, avec la diagnose « métatarse plus long que l'article suivant » [659, p. 410]. Il suit de là que *Diomyza* Meig., Steph., Westw. est à ajouter comme synonyme à *Lasioptera* Meig., et que *Diomyza* Schin. doit être donné comme synonyme à *Lasiopteryx* Westw.

LASIOPTERYX Westw. 1840. — Ce nom se trouve également d'abord chez Stephens en 1829 [l. c p. 240] avec la synonymie : *Lasioptera* B. Meig. et les espèces *obfusca*, *pusilla* Wiedm., *confinis*, *elegantissima* et *inops* Steph., mais sans diagnose générique ni spécifique. Westwood donne en 1840 [l. c.] la diagnose générique suivante : « *Lasipteryx* (*Lasioptera* B. Meig.) 5 espèces, *L. obfusca* Meig. Diffère de *Diomyza* par l'article basal des tarsi qui est allongé. » Comme il vient d'être dit, il faut ajouter à ce genre, comme synonyme, *Diomyza* Schin. nec Meig., Steph., Westw.

CECIDOGONA H. LW. 1844 [399]. — L'auteur ne donne pas de diagnose générique. D'après la description détaillée de l'insecte, qui est probablement une femelle, nous voyons que la nervation alaire est celle de *Lestremia leucophaea* et que ce genre ne diffère de *Lestremia* que par l'absence d'ocelles. Nous admettons que l'auteur s'est trompé sur ce dernier point, comme cela a eu lieu auparavant pour Macquart, dans sa description de *Lestremia*; nous considérerons donc *Cecidogona* comme synonyme de *Lestremia*.

FURCINERVA Rond. (1) 1846. — Sous cette dénomination, Rondani propose de réunir les quatre genres *Zygoneura* Mg., *Lestremia* Macq., *Mimosciara* Rond. et *Catocha* Hal. [604 bis, p. 369 et annotation]. Plus tard, en 1856, il sépara de nouveau *Catocha* des trois genres précédents et réunit ceux-ci dans un genre unique qu'il appela *Yposataea* [606, p. 198]. *Mimosciara* paraît en effet ne pas différer de *Lestremia*, auquel nous le réunirons comme synonyme, mais les deux autres genres demeurent bien différents de *Lestremia*.

PERRISIA Rond. 1846. — Rondani propose de créer le genre *Perrisia* pour la Cécidomyie de l'Ortie (*urticae* Perr.) « à cause des caractères des antennes » [604 bis, p. 371, note]. Bien que cette diagnose soit tout à fait insuffisante, nous maintiendrons *Perrisia* comme sous-genre de

(1) C'est par erreur que H. Lœw écrit : « Plus tard dans une note, Rondani proposa de réunir les quatre genres *Zygoneura*, *Lestremia*, *Mimosciara* et *Catocha* dans un genre unique, pour lequel il créa le nom de *Molobraea* » [402, p. 12].

Dasyneura, parce que l'auteur a donné comme type un insecte connu.

HETEROPEZA Winn. 1849 [814]. — « Antennes moniliformes, de 2 + 9 articles pédiculés chez le mâle, et de 2 + 8 articles sessiles chez la femelle; articles basaux épaissis. Bouche très petite. Palpes de 4 articles inégaux. Yeux en croissant; point d'ocelles. Article 3^e des tarses très long, le 4^e et le 5^e très courts. Ailes nues, lancéolées à la base, arrondies à l'extrémité, avec deux nervures longitudinales simples. Sp. typ. *pygmaea* Winn. »

RHABDOPHAGA ⁽¹⁾ Westw. 1847. — Westwood a fondé ce genre sur un insecte qu'il a nommé *R. viminalis* et qu'on a considéré jusqu'ici comme identique à *saliciperda* Duf. Il a observé les larves de cette espèce dans les rameaux de *Salix viminalis*; parmi elles, quelques-unes sont sorties des rameaux qu'il avait coupés et rapportés chez lui, et se sont métamorphosées sur le sol; les autres ont subi leur transformation dans le rameau. Il n'est cependant pas certain que cet insecte soit à rapporter à *saliciperda*, vu que *Pierrei* et *medullaris* vivent également dans les rameaux des Saules. L'auteur ne donne pas de diagnose générique, mais une assez longue description de l'insecte, dans laquelle nous relevons ce caractère générique du genre *Rhabdophaga*, que le corps est couvert de poils argentés. Nous ajouterons comme synonymes à ce genre : *Phytophaga* Rond. pr. p. 1840 et 1846, *Cecidomyia* Rond. 1860, *Bertieria* Kieff.

MONODICRANA H. LW. 1850 [402, p. 32]. — Genre fondé sur un insecte fossile, trouvé dans l'ambre. « L'insecte n'atteint que 1,4 mill., a des ailes à bords ciliés et à surface non velue, des antennes moniliformes, dont le funicule se compose de huit articles globuleux et d'un article terminal de forme ovulaire, enfin des tarses de quatre articles. Il est difficile de décider si cet insecte appartient aux Diptères ou aux Coccides; souvent je voulais me prononcer pour cette dernière hypothèse à cause des grands balanciers qui sont très reculés. Mais, d'autre part, toutes les parties de son corps rappellent tellement le genre *Heteropeza* que je dois le citer aussi sous le nom de *Monodicrana terminalis*. »

La même année 1850, H. Lœw établit la division suivante [402, p. 20-21] :

(1) Westwood a écrit : « *Rabdophaga*. » Je dois à l'obligeance de M. Carpenter, de Dublin, une copie de la description de ce genre.

A. 2^e nervure longitudinale éloignée du bord.

1. Trois nervures longitudinales..... 2
— Quatre nervures longitudinales..... *Asynapta* H. Lw.
2. Thorax s'avancant plus ou moins en capuchon par-dessus la tête. Ailes non irisées..... *Hormomyia* H. Lw.
— Thorax non prolongé par-dessus la tête..... 3
3. Nervure transversale manquant ou médiocrement oblique. 4
— Nervure transversale tellement oblique que la 2^e nervure paraît avoir deux racines..... 6
4. Mâle avec les articles du funicule deux fois aussi nombreux que chez la femelle..... *Diplosis* H. Lw.
— Articles du funicule également nombreux dans les deux sexes..... 5
5. Antennes munies de verticilles de soies... *Cecidomyia* H. Lw.
— Antennes sans verticilles, mais à pilosité simple et courte...
..... *Asphondylia* H. Lw.
6. Articles du funicule sessiles dans les deux sexes.....
..... *Dirhiza* H. Lw.
— Articles du funicule pédiculés dans les deux sexes.....
..... *Epidosis* H. Lw.

B. 2^e nervure longitudinale rapprochée du bord.

1. Parties buccales courtes..... *Lasioptera* Meig.
— Parties buccales prolongées en forme de bec dirigé obliquement vers la poitrine. Thorax prolongé en col comme chez *Asynapta*..... *Clinorhyncha* H. Lw.

Observations sur les nouveaux genres.

HORMOMYIA H. Lw. — « Les espèces de ce genre se distinguent encore par leur forme alourdie; une partie d'entre elles ont la tête entièrement dépassée par le thorax, et les articles du funicule doubles, p. ex. *fasciata* Meig., d'autres ont la tête insérée moins bas et les articles simples, p. ex. *fagi* Hart., et on peut les diviser de nouveau d'après l'absence ou la présence d'un oviducte rétractile (*piligera* m. — *cornuta* Br.) » [402, p. 20]. Le genre *Hormomyia* H. Lw. n'est pris actuellement que dans un sens restreint et n'est employé que pour la 1^{re} catégorie d'insectes indiqués par H. Lœw. — Sous le nom d'*Angelinia* Ron-

dani a établi plus tard un genre qui est synonyme de *Hormomyia* H. Lw. : « Antennes du mâle de 26 à 28 articles alternativement globuleux et obovoïdaux; celles de la femelle de 14 à 16 articles égaux, en ovoïde allongé. Ailes comme chez *Cecidomyia*; thorax comme chez *Hormomyia*, s'avancant par-dessus la tête » [608].

DIPLOSIS H. Lw. [*l. c.* p. 20-21]. — « La forme des antennes est très caractéristique. La femelle a un funicule de 12 articles assez longuement pédiculés et composés chacun d'une partie basale, sphérique, et d'une partie supérieure cylindrique; l'une et l'autre partie munies d'un verticille de poils. Le funicule du mâle se compose de 24 articles qui sont alternativement simples et doubles. Dans le cas où les articles doubles ne se reconnaissent pas à leur forme, ils sont indiqués par la présence d'un verticille en plus. » Cette diagnose exclut donc les espèces du genre *Contarinia*. Il est à noter encore que l'auteur ne donne de diagnose générique que pour les mâles. Comme nous l'avons vu plus haut, *Diplosis* H. Lw. n'est qu'un synonyme de *Cecidomyia* Meig.

ASPHONDYLIA H. Lw. [*l. c.*, p. 24]. — « Articles des antennes cylindriques, avec une pilosité uniforme et courte. Insectes remarquables par leur oviducte très allongé, rétractile, avec le second article corné et aciculaire, sans lamelles. » *Phyllophaga* Rond. et *Cylindrocera* Lioy sont synonymes d'*Asphondylia*.

DIRHIZA H. Lw. [*l. c.* p. 24]. — « Ce genre, comme aussi *Epidosis*, se distingue par sa nervure transversale qui est tellement oblique qu'elle paraît être le commencement de la 2^e nervure longitudinale, tandis que le véritable commencement de cette nervure paraît en former comme une seconde racine; par cette racine non sinuée, et par les articles du funicule qui sont sessiles ou presque sessiles, même chez le mâle, ce genre se distingue d'*Epidosis*. »

EPIDOSIS H. Lw. [*l. c.*, p. 24]. — « Outre les deux caractères indiqués, ces espèces se reconnaissent à leurs pattes allongées et grêles, et à la forte courbure de la 2^e nervure longitudinale; la femelle a un funicule de 10 à 12 articles allongés, pédiculés et plus ou moins distinctement doubles; chez le mâle, toujours quelques articles en plus, ceux-ci très longuement pédiculés, arrondis et à verticilles très longs. » Le nom d'*Epidosis* est synonyme de *Porricondyla*.

ASYNAPTA H. Lw. [*l. c.*, p. 24]. — « Facile à reconnaître à la dernière longitudinale bifurquée à partir de sa base. Thorax plus ou moins prolongé en col. Comprend des espèces différant beaucoup entre elles :

celles à thorax prolongé en col ont la nervation alaire d'*Epidosis*, p. ex. *longicollis* m. »

COLPEDIA Winn. 1853 [816, p. 188-189]. — « Base de la seconde nervure deux fois sinuée; nervure transversale longue, oblique, ne sortant pas de la base de la 1^{re} nervure, mais de cette nervure même, loin de la base. La femelle a les articles du funicule pédiculés, l'oviducte court, un peu rétractile et muni de deux lamelles. » D'après le dessin alaire le cubitus aboutit en-dessous de la pointe de l'aile et la nervure posticale est simple. Mâle inconnu.

SPANIOCERA Winn. 1853. — Comme nous l'avons vu plus haut, ce genre est synonyme de *Brachyneura* Rond.

PHYLLOPHAGA Rond. 1856. — « Antennes à articles non distinctement pédiculés, allongés en cylindre. Sp. typ. *fusca* Meig. » [606, p. 199]. Plus tard, en 1860, Rondani indique lui-même que *Phyllophaga* est synonyme d'*Asphondylia* H. Lw. [608, p. 287 et 292].

ANGELINIA Rond. 1860 [608, p. 287 et 293]. — « Antennes du mâle de 26 à 28 articles, alternativement globuleux et obovoïdaux; celles de la femelle de 14 à 16 articles égaux, en ovoïde allongé. Ailes comme chez *Cecidomyia* ⁽¹⁾, thorax comme chez *Hormomyia*. » Rien ne distingue ce genre de *Hormomyia* H. Lw. dont il est synonyme.

BREMIA Rond. 1860 [*l. c.*, p. 287 et 294]. — « Diffère de *Diplosis* par les antennes à verticilles composés de poils inégaux, ceux du dessus étant plus longs que les autres. Sp. typ. *decorata* Winn. Il faut aussi y rapporter *aphidinyza* Rond. » Ce genre est bien distinct; il en est de même des deux suivants.

CONTARINIA Rond. 1860 [*l. c.*, p. 287 et 294]. — « Articles du funicule tous égaux entre eux; chez le mâle environ deux fois aussi nombreux que chez la femelle. Sp. typ. *loti* D. G. Il faut encore y ajouter *Cecid. hyperici* Gené et *Cecid. Woeldickii* Contar. » Les deux dernières espèces ne font nullement partie du même genre que *Cont. loti*.

WINNERTZIA Rond. 1860 [*l. c.*, p. 287 et 293]. — « Les deux dernières nervures séparées jusqu'à leur base. La seconde nervure longitudinale n'est pas sinuée ni rapprochée de la première. Sp. typ. *lugubris* Winn. »

TRITOZYGA O. S. 1862 [551, p. 178]. — Ce genre, qui revient à l'Amérique du Nord, ne diffère de *Lestremia* que par un seul caractère : en

(1) Ici Rondani prend *Cecidomyia* dans le sens de *Rhabdophaga*.

dessous de la nervure discoïdale dont le rameau supérieur est fortement sinué, l'aile n'offre plus qu'une seule nervure, la posticale, qui est simple. D'après un insecte mutilé, non dénommé, à antennes brisées.

CYLINDROCERA Lioy 1863 [397]. — L'auteur italien crée ce genre pour les espèces à articles antennaires très rapprochés les uns des autres et au nombre de douze. Sp. typ. *Cecid. ribesii* Meig. Ce genre est donc synonyme d'*Asphondylia* H. Lw.

MIASTOR Mein. 1864. — « Palpes biarticulés, très courts. Tarses de 4 articles. Antennes moniliformes, de 11 articles. Ailes à 3 nervures simples, dont la médiane n'atteint pas l'extrémité alaire. Sp. typ. *metralous* Mein. » [481].

OLIGARCES Mein. 1864-1865. — « Trompe et palpes nuls. Tarses de 2 articles. Antennes moniliformes, de 11 articles. Ailes à deux ou trois nervures simples et plus ou moins évanescences. Sp. typ. *paradoxus* Mein. » [481].

PERO Mein. 1869-1870. — « Trompe apparente; palpes de 3 articles assez longs. Tarses de cinq articles. Antennes moniliformes, avec verticilles. Ailes à trois nervures dont la médiane atteint l'extrémité. Larve prolifère. Sp. typ. *metralous* Mein. » [485].

HAPLUSIA Karsch 1878. — « Ailes à 3 nervures longitudinales simples; nervure transversale distincte et oblique, située après le milieu de la première; 2^e longitudinale un peu sinuée derrière la nervure transversale, courbée par en bas à l'extrémité. Nervures hyalines comme la surface alaire; bord alaire cilié. Articles du funicule pédiculés. Tarses de 5 articles, dont le 1^{er} est petit, de moitié aussi long que le dernier; le 2^e très long, aussi long que les 4 suivants réunis; tous d'inégale longueur. Sp. typ. *plumipes* Karsch. » Rübsaamen a ajouté à cette diagnose, que les crochets des tarses sont simples [250, p. 334].

CHASTOMERA Skuse 1888. — « 1^{re} nervure longitudinale éloignée du bord; la 2^e aboutissant en dessous de la pointe de l'aile; la 3^e simple. Nervure transversale longue, un peu oblique, située à une faible distance de l'extrémité de la première. Antennes de la femelle à articles pédicellés et avec verticilles. Sp. typ. *bella* Sk. » [680]. Ce genre est probablement synonyme de *Haplusia* Karsch.

GONIOCLEMA Skuse 1888 [l. c.]. — « Antennes de la femelle de 2 + 11 articles pédicellés, subcylindriques et avec verticilles de poils. 2^e nervure longitudinale aboutissant à la pointe de l'aile; nervure transversale distincte; 3^e nervure longitudinale simple. Articles 1, 3, 4 et 5 des tarses courts. Sp. typ. *pauvillula* Sk. »

NECROPHLEBIA Skuse 1888 [l. c.]. — « 2^o nervure longitudinale droite avant la transversale, aboutissant en dessous de la pointe alaire; la 3^e simple; nervure transversale pas très oblique. Antennes de la femelle de 2 + 12 articles subcylindriques et pédicellés, munis chacun de deux verticilles. Sp. typ. *volitans* Sk. »

SCHIZOMYIA Kieff. 1889 [264, p. 183]. — 1^{er} article des tarses beaucoup plus court que le 2^o. Palpes de 4 articles. Antennes moniliformes, avec des verticilles de soies; leurs articles également ou à peu près également nombreux dans les deux sexes (peut-être toujours de 2 + 12 articles). Thorax non fortement convexe. Nervation alaire des *Diplosis*. Extrémité abdominale prolongée sur le dessous, ce qui la fait paraître découpée, caractère visible surtout chez la femelle, d'où le nom de *Schizomyia*. Sp. typ. *galiorum* Kieff. ». L'oviducte de la femelle est décrit, trois pages plus loin, comme « aciculaire et dépourvu de lamelles ».

2^o Division de la famille des Cécidomyies.

Schiner [661, p. 5] a divisé les Cécidomyies dans les trois sous-familles suivantes : 1^o *Cecidomyiinae*, comprenant toutes les espèces dont le premier article des tarses est plus court que le second; 2^o *Leptotremiinae*, avec les espèces à métatarse plus long que le second article et avec plus de trois nervures alaires; 3^o *Heteropezinae*, ne différant de la précédente que par la nervation alaire qui se compose seulement de deux ou trois nervures simples. Cette division ainsi établie a l'inconvénient de placer dans les *Cecidomyiinae*, des genres tels que *Pero*, *Frirenina*, *Leptosyna*, qui ne peuvent être séparés des *Heteropezinae*. Nous la modifions donc de la façon suivante :

1. Ailes à surface couverte de soies microscopiques et dressées; nervures simples, au nombre de 1, de 2 ou de 3; tarses de 2 à 5 articles, le 1^{er} tantôt plus long, tantôt plus court que le second. Larves se propageant par pædogénèse.....
..... 1^{re} sous-famille. HETEROPEZINAE.

← 2. Ailes à surface couverte de poils appliqués, entremêlés parfois de soies microscopiques, rarement couverte d'écailles; nervures au nombre de 3 à 6, dans le 1^{er} cas la posticale est ordinairement bifurquée, et la surface alaire est toujours couverte de poils ou d'écailles; tarses de 5 articles. Larves connues ne se propageant pas par pædogénèse... 2.

2. Premier article des tarses plus court que le second; ordinairement

rement trois, rarement quatre nervures. Jamais d'ocelles. Larves à ouverture anale en fente et située sur le dessous du dernier segment somatique; verrues spiniformes ventrales commençant ordinairement au 2^e segment thoracique. Espèces en majorité gallicoles. 2^e sous-famille. CECIDOMYINAE.

- Premier article des tarses plus long que le second; 4 à 6 nervures et trois ocelles (à l'exception du genre douteux *Lasiopteryx* Westw.). Larve à ouverture anale circulaire et située à l'extrémité du dernier segment somatique; verrues spiniformes ventrales ne commençant qu'au troisième segment thoracique. 3^e sous-famille. LESTREMINAE.

A ne considérer que les larves des Hétéropézines, il paraîtrait plus rationnel de les placer entre les Cécidomyines et les Lestrémines. Il en est encore de même si on tient compte de l'oviducte de la femelle. Mais, comme nous avons vu plus haut que les affinités des Cécidomyies avec les autres familles des Diptères se reconnaissent surtout à leur nervation alaire, il faut donc aussi, pour les affinités des Cécidomyies entre elles, tenir surtout compte de leur nervation alaire. En ce cas la place des Hétéropézines est évidemment en tête de la famille. Nous trouvons, en effet, chez elles, la nervation alaire la plus faible; tantôt on n'y remarque qu'une nervure unique et simple ⁽¹⁾, tantôt deux nervures, simples toutes deux, à savoir la sous-costale et la posticale (pl. 22, fig. 1); tantôt le cubitus apparaît comme troisième nervure; mais, dans ce cas, la base du cubitus fait toujours défaut, et la nervure transversale, qui semble être la base du cubitus, s'évanouit avant d'atteindre la nervure posticale (pl. 22, fig. 2). *Brachyneura* est l'anneau qui relie les Hétéropézines aux Cécidomyines; comme la première, l'aile est traversée seulement par trois nervures simples (pl. 22 et fig. 3) et c'est sans doute pour ce motif que H. Lœw a écrit en 1864 que le genre *Brachyneura* (*Spaniocera*) est très proche sinon identique à *Miastor*, qui est une Hétéropézine. Les ailes, recouvertes d'écailles et non de soies microscopiques, font rentrer *Brachyneura* dans la sous-famille des Cécidomyines; il en est de même de *Holoneurus* Kieff. et des genres exotiques *Gonioclena* Sk., *Necrophlebia* Sk. et *Haplusia* Karsch

(1) Cela est le cas pour *Stenoptera Kiefferi* Meun. que le docteur F. Meunier vient de découvrir dans le copal fossile de l'Afrique (Nouvelles recherches sur quelques *Cecidomyiidae* et *Mycetophilidae* de l'ambre et description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de *Cecidomyiidae* du copal de l'Afrique. *Ann. Soc. scient. Bruxelles*, 1901, V, 25, pl. I-II).

(*Chastomera* Sk.), qui n'ont également que trois nervures simples, mais la surface alaire couverte de poils appliqués.

Chez les Cécidomyiines, nous trouvons toujours au moins trois nervures, dont la dernière est ordinairement bifurquée (pl. 22, fig. 5); dans les trois premiers groupes de cette sous-famille, la bifurcation de la nervure posticale se fait vers le milieu (pl. 22, fig. 5), dans les cinq derniers genres du quatrième groupe, elle se fait au contraire dès la base, de sorte que l'aile se compose de quatre nervures (pl. 22, fig. 7); trois genres du premier groupe, *Baldratia*, *Choristoneura* et *Ozirhynchus* offrent le même caractère. Enfin, dans le genre *Diallactes*, qui est le chaînon reliant les Cécidomyiines aux Lestrémines, nous remarquons outre une ramification située entre la costale et la sous-costale, une nouvelle nervure, la discoïdale (pl. 22, fig. 8); cette nervure qui apparaît ici pour la première fois, ne manquera plus dans la sous-famille suivante, c'est-à-dire dans celle des Lestrémines ⁽¹⁾, ni dans aucune des familles qui suivent celle des Cécidomyiies. Remarquons encore que la base du cubitus ou nervure transversale dans le sens de H. Lœw, nulle chez les Hétéropézines, et peu distincte ou nulle dans les trois premiers groupes des Cécidomyiines, paraît dans le quatrième groupe, celui des Épidosides, aussi bien marquée que les nervures longitudinales.

Les Lestrémines ont une nervation composée au moins de quatre nervures ⁽¹⁾. Dans le groupe des *Campylomyzariae*, la discoïdale est simple et la posticale se bifurque vers son milieu (pl. 22, fig. 10); dans le groupe des *Strobliariae* (pl. 22, fig. 9), cette dernière se bifurque dès sa base, de sorte qu'on y trouve cinq nervures; dans le groupe des *Lestremiariae* la discoïdale se bifurque à son tour, d'abord faiblement chez *Catocha* (pl. 23, fig. 3), puis profondément chez *Lestremia* (pl. 23, fig. 1-2), réalisant ainsi la forme que nous retrouvons dans la famille des Sciarides, des Bibionides, etc. En outre, chez diverses espèces, apparaît une sixième nervure longitudinale située près du bord postérieur (pl. 23, fig. 4).

(1) A l'exception du genre douteux *Lasiopteryx* Westw., dont je ne connais pas de représentants.

EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE 15.

(Les fig. 1-3 agrandies 25 fois, les autres 480 fois, toutes exécutées à la chambre claire).

- Fig. 1. *Hormomyia Lambertoni* Kieff. ♂.
 2. *Clinorhyncha leucanthemi* Kieff. ♀.
 3. *Rhabdophaga clavifex* Kieff. ♀.
 4. Portion d'aile de *Joannisia fungicola* Kieff.
 5. — *Oligotrophus taxi* (Inchb.) Kieff.
 6. — *Lestremia leucophaea* Meig.
 7. Écaille du bord alaire de *Clinorhyncha leucanthemi* Kieff.
 8. — — *Perrisia veronicae* Vall.

PLANCHE 16.

(Toutes les figures agrandies, exécutées à la chambre claire).

- Fig. 1. Parties buccales de *Clinorhyncha tanaceti* Kieff. vues de dessous; *t*, pièce triangulaire inférieure; *li*, lèvre inférieure; *p*, palpes; *m*, mandibules.
 2. Les mêmes vues de dessus; *t*, pièce triangulaire supérieure; *ls*, lèvre supérieure (la partie terminale a été enlevée pour laisser apparaître les autres pièces); *l*, ligule; *p*, palpes; *m*, mandibules.
 3. Tête du même insecte vue de côté; *ls*, lèvre supérieure; *m*, mandibules.
 4. Parties buccales de *Colomyia clavata* Kieff.; *ls*, lèvre supérieure; *m*, mandibules; *p*, palpes.
 5. Deux articles terminaux des antennes d'*Asphondylia conglomerata* D. St. ♀ avec les verticilles de filets.
 6. Verticilles de filets sinueux sur un article du funicule de *Schizomyia* (*Kiefferia*) *pimpinellae* (Fr. Lw.) ♂.
 7. Les deux premiers articles du funicule de *Bremia urticariae* Kieff. ♂ avec les filets arqués et les verticilles de soies.

8. Filets arqués d'un article antennaire de *Perrisia veronicae* Vall. ♀.
9. Deux derniers articles d'une antenne de *Polystephu quercus* Kieff. ♂.

PLANCHE 17.

(Toutes les figures agrandies).

- Fig. 1. Article du funicule d'*Aprionus Miki* Kieff. avec les verticilles de crêneaux.
2. Deux de ces crêneaux avec la base de deux soies.
 3. Deux articles du funicule de *Prionellus villosus* Kieff. ♀.
 4. Trois derniers articles de l'antenne de *Monardia stirpium* Kieff. ♂.
 5. Un article du funicule de *Xylodiplosis praecox* (Winn.) ♂.
 6. Deux derniers articles de l'antenne de *Bryomyia Bergrothi* Kieff. ♀, vus de dessous.
 7. Un des articles du funicule du même insecte, vu de côté.
 8. Article du funicule de *Catocha muscicola* Kieff. ♀.
 9. Deux premiers articles du funicule de *Monardia stirpium*.
 10. *Bremia aphidisuga* Rbs. ♂, selon Rübsaamen.
 11. *Wasmanniella aptera* Kieff. ♀, grossi 25 fois.
 12. a d, figures théoriques expliquant la transition d'une lamelle au filet arqué, selon Ch. Janet.

PLANCHE 18.

(Toutes les figures agrandies).

- Fig. 1. *Choristoneura sarothamni* Kieff. ♂, grossi 25 fois (camera lucida).
2. Deux articles basaux et trois premiers articles du funicule du même.
 3. Aile normale et balancier du mâle de *Monardia van-der-Wulpi* Meij., selon de Meijere.
 4. Métatarse de *Choristoneura sarothamni* Kieff. avec l'articulation et l'éperon (après l'enlèvement des écailles).

5. Les deux premiers articles du funicule de *Contarinia aprilina* Kieff. (exemple d'articles soudés).
6. Aile du mâle brachyptère de *Monardia van-der-Wulpi* Meij. avec le cubitus sortant du bord antérieur de l'aile (selon de Meijere).
7. Anomalie des articles 10-12 du funicule de *Clinodiplosis caricis* Kieff.
8. Deux articles basaux et les deux premiers articles du funicule de *Lestodiplosis alternans* Kieff. ♂ (nodosités alternativement noires et blanches).
9. Deux articles basaux et les trois premiers articles du funicule de la ♀ du même (articles avec une moitié noire et l'autre blanche).
10. Pince anale de *Macrolabis pilosellae* (Binn.), vue de dessus.
11. — *Bremia cardui* Kieff., vue de dessus.
12. Deux premiers articles du funicule de *Braueriella phillyreae* (Fr. Lw.) ♀ (exemple d'articles non soudés).
13. Deux premiers articles du funicule de *Contarinia* (*Stictodiplosis*) *corylina* (Fr. Lw.) (articles soudés).
14. Écaille de l'abdomen de *Choristoneura sarothamni* Kieff., grossie 480 fois.
15. Métatarse de *Colomyia appendiculata* Kieff., avec l'appendice terminal.

PLANCHE 49.

(Toutes les figures agrandies).

- Fig. 1. Pince de *Rhabdophaga pulvini* Kieff., vue de côté.
- 2 Pince de *Rhabdophaga clavifex* Kieff., vue d'en haut; *a*, lamelle supérieure (bilobée); *c*, lamelle inférieure (double); *d*, stylet; *e*, article basal; *f*, ongle.
3. Pince du même avec la lamelle supérieure (*a*) repliée, de sorte que la lamelle intermédiaire et bilobée (*b*) devient visible.
4. Pince d'*Asphondylia sarothamni* H. Lw.
5. — de *Clinorhyncha tanaceti* Kieff.
- 6 — de *Perrisia praticola* Kieff.

7. Pince de *Schizomyia galiorum* Kieff.
8. — *Clinodiplosis Liebeli* Kieff. (*Schizomyia sociabilis* Rbs.)
9. — *Clinodiplosis coriscii* Kieff.; *a*, lamelle supérieure; *b*, lamelle intermédiaire; *d*, stylet.
10. *Clinodiplosis galliperda* (Fr. Lw.); *a*, lamelle supérieure; *b*, lamelle intermédiaire; *d*, stylet.
11. *Lestodiplosis septemguttata* Kieff.; *a*, lamelle supérieure; *b*, lamelle intermédiaire; *d*, stylet; *m*, appendice de l'article basal, remplaçant la lamelle inférieure des *Dasyneura*.
12. Extrémité de l'article basal avec l'ongle de la pince de *Stenodiplosis geniculati* O. Reut.
13. Pince de *Cystiphora taraxaci* Kieff.
14. Article basal et ongle de la pince de *Clinodiplosis caricis* Kieff.; *m*, appendice de l'article.

PLANCHE 20.

(Toutes les figures agrandies).

- Fig. 1. Oviducte de *Schizomyia ligustri* Rbs.
2. — *Cystiphora taraxaci* Kieff.
 3. — *Contarinia tritici* (Kirb.)
 4. — *Dasyneura raphanistri* Kieff., pendant la ponte et vu de dessous.
 5. Le même vu de profil.
 6. Abdomen du même avant la ponte, et vu de dessus.
 7. Extrémité de la tarière d'*Asphondylia conglomerata* D. S.
 8. — l'oviducte d'*Oligotrophus juniperinus* (L.).
 9. — de *Perrisia ericae-scopariae* (Duf.) vue de côté, avec l'œuf sortant au moment de la ponte.
 10. Extrémité de l'oviducte de *Clinorhyncha leucanthemi* Kieff., vue de profil.
 11. — de *Contarinia tritici* (Kirb.), vue de dessus.
 12. — de *Stefaniella atriplicis* Kieff., vue de côté; *a*, conduit ou canal interne vu par transparence; *b*, pochette; *c*, pointe chitineuse.

PLANCHE 21.

(Toutes les figures agrandies).

- Fig. 1. Oviducte de *Ledomys lugens* Kieff., vu de côté.
 2. — *Baldratia salicorniae* Kieff., vu de côté.
 3. — *Myricomyia mediterraneus* (Fr. Lw.), vu de côté.
 4. Extrémité de l'abdomen de *Porricondyla microcera* Kieff. ♀
 avec lamelle biarticulée, vue de dessous.
 5. — *Dicrodiplosis fasciata* Kieff., vue de côté.
 6. — *Porricondyla venusta* (Winn.), vue de dessus.
 7. — *Colomyia appendiculata* Kieff., vue de côté.
 8. — *Clinodiplosis longiventris* Kieff., vue de côté.
 9. — *Prionellus villosus* Kieff., vue de dessus.
 10. Métatarse antérieur de *Colpodia anomala* Kieff.
 11. Oviducte de *Dicerura scirpicola* Kieff., vu de dessous.
 12. — *Colpodia anomala* Kieff., vu de côté.

PLANCHE 22.

(Toutes les figures agrandies).

- Fig. 1. Aile de *Heteropeza pygmaea* Winn., selon Winnertz.
 2. — *Leptosyna acutipennis* Kieff.
 3. — *Brachyneura squamigera* (Winn.)
 4. — *Lasioptera rubi* Heeg.
 5. — *Dasyneura* (*Perrisia*).
 6. — *Asphondylia*.
 7. — *Winnertzia nigripennis* Kieff.
 8. — *Diallactes croceus* Kieff.
 9. — *Strobliella intermedia* Kieff.
 10. — *Prionellus villosus* Kieff.
 11. Crochets et empodium de *Prionellus pini* Kieff.
 12. — — *Peromyia Leveillei* Kieff.

13. Crochets et empodium de *Perrisia veronicae* (Vall.); après l'enlèvement des écailles.
 14. — — *Harmandia cristata* Kieff.
 15. — — *Stenodiplosis geniculati* Reut.

PLANCHE 23.

(Toutes les figures agrandies).

- Fig. 1. Aile de *Lestremia defecta* Winn., selon Winnertz.
 2. — *Lestremia leucophaea* Meig. —
 3. — *Catocha latipes* Hal. —
 4. — *Lestremia angustipennis* Kieff.
 5. Empodium en forme de corne de cerf.
 6. Dernier article des tarsi de *Monardia stirpium* Kieff.
 7. Nymphe de *Camptomyia recta* Kieff., vue de face.
 8. — *Holoneurus fulvus* Kieff., vue de côté.
 9. — *Winnertzia nigripennis* Kieff., vue de côté.
 10. Moitié supérieure de la nymphe d'*Asphondylia Trabuti* March., vue de côté, d'après P. Marchal.
 11. — de *Hormomyia Rosenhaueri* Rbs., vue de côté, selon Rübsaamen.
 12. — de *Rhabdophaga salicis* Schrk.
 13. — de *Rhabdophaga dubia* Kieff.
 14. Nymphe de *Joannisia intermedia* Kieff., vue de face.
 15. — d'*Aprionus Miki* Kieff., vue du dos.
 16. Partie supérieure de la nymphe d'*Acodiplosis inulae* (H. Lw.), selon Rübsaamen.
 17. — de *Rhabdophaga saliciperda* Duf.

PLANCHE 24.

(Toutes les figures agrandies).

- Fig. 1. Nymphe de *Peromyia Leveillei* Kieff., vue de face.
 2. Partie supérieure de la même, vue de côté.

3. Masque facial de la nymphe d'un *Clinodiplosis*.
4. Stigmate thoracique de la nymphe d'un *Winnertzia*.
5. Stigmate abdominal de la nymphe d'*Aprionus Miki* Kieff.
6. Stigmate thoracique de la nymphe de *Monardia stirpium* Kieff.
7. Trois derniers segments de la nymphe d'*Aprionus Miki* Kieff.,
vus de dessus.
8. Stigmate thoracique de la nymphe de *Dasyneura raphanistri*
Kieff., vu de côté.
9. — de *Perrisia Broteri* Tav., vue de face.
10. Trois derniers segments de la nymphe de *Xylodiplosis praecox*
Winn., vus de dessus.
11. Deux spinules dorsales de la même.
12. Masque facial de la nymphe d'*Aprionus monilicornis* Kieff.
13. Cornes céphaliques de la nymphe d'*Asphondylia rosmarini*
Kieff.
14. Cornes céphaliques et papilles cervicales de la nymphe de
Oligotrophus Bergenstammi (Wachtl).
15. — de *Rhabdophaga saliciperda* (Duf.).
16. Base de la gaine antennaire avec une corne céphalique de la
nymphe de *Rhabdophaga medullaris* Kieff.
17. Partie supérieure de la nymphe de *Rhabdophaga Pierrei*
Kieff., vue du dos.
18. Masque cervical avec l'arête transversale (*a*) de la nymphe de
Rhabdophaga Karschi Kieff.

PLANCHE 25.

(Larves vues de dessus, exc. la fig. 11, et agrandies).

- Fig. 1. Larve de *Monarthropalpus buxi* (Lab.).
 2. — *Porricondyla (Dicroneurus) venusta* (Winn.).
 3. — *Rhabdophaga pseudococcus* Rbs.
 4. — *Rhizomyia perplexa* Kieff.
 5. — *Oligotrophus caprae* (Winn.).

6. Tête, cou et 1^{er} segment thoracique de la larve d'*Arthrocnodax fagi* Kieff.; *a*, tache oculaire.
7. Tête d'un *Lestodiplosis* acarivore.
8. Tête, cou et 1^{er} segment thoracique de la larve de *Lestodiplosis* (*Coprodiplosis*) *cryphali* Kieff.; *a*, tache oculaire.
9. Portion du bord latéral d'un segment de la larve de *Rhizomyia perplexa* Kieff.
10. Larve de *Dicerura scirpicola* Kieff.
11. Tête et cou de la larve de *Contarinia ribis* Kieff., vus de dessous; *a*, papilles collaires.
12. Tête de la larve de *Braueriella phillyreae* (Fr. Lw.).

PLANCHE 26.

(Parties de larves agrandies).

- Fig. 1. Tête de la larve de *Mycodiplosis Reaumuri* Kieff., vue de dessus; *a*, pièce en fer à cheval; *b*, pièce arquée reliant la précédente; *c*, tige qui rejoint la pièce en fer à cheval; *d*, tige reliant la première pièce à la seconde; *e*, tige longitudinale et médiane; *r*, sac céphalique.
2. Tête de la même, vue de dessous; *f*, les deux tiges longitudinales et latérales; *g*, étuis de l'œsophage.
3. La même vue de côté; *h*, pièces parallèles et terminées par un croc; *b*, *c*, *d*, *f* et *g*, comme plus haut.
4. Tête de la larve d'*Atrichosema aceris* Kieff. qui renfle le pétiole des feuilles d'*Acer campestre* L., vue de dessous.
5. Tête de la larve de *Contarinia tritici* Kirb., écrasée et vue de dessous; *f*, les deux tiges longitudinales et latérales; *m*, extrémité de ces tiges faisant office de crochet, séparées l'une de l'autre et étalées par l'écrasement; *g*, étui de l'œsophage.
6. Portion de l'avant-dernier segment somatique de la larve de *Schizomyia nigripes* (Fr. Lw.) avec la plaque dorsale, un des stigmates et la 1^{re} papille latérale.
7. Segment anal de la larve de *Contarinia tritici* Kirb. vu de dessus.

8. Segment anal de la larve de *Xylodiplosis praecox* (Winn.), vu de dessus.
9. Segment anal de la larve d'*Arthrocnodax fugi* Kieff., vu de dessus.
10. Segment anal de la larve de *Dicrodiplosis ranunculi* Kieff., vu de dessus.
11. Segment anal de la larve de *Cecidomyia Giardi* Kieff., vu de dessus.
12. Segment anal de la larve d'un *Lestodiplosis* Kieff., vu de dessus.
13. Segment anal de la larve de *Clinodiplosis caricis* Kieff., vu de dessous.
14. Palpes tri-articulés d'une larve de Lestrémine.

PLANCHE 27.

(Papilles et segments anaux de larves, agrandis).

- Fig. 1. Deux derniers segments de la larve de *Schizomyia taxi* Kieff., vus de dessus.
2. Deux derniers segments de la larve de *Mycodiplosis boleti* Kieff., vus de dessus.
3. Deux segments de la larve de *Clinodiplosis* sp. n., vus de dessus.
4. Segment anal de la larve de *Thurauia aquatica* Rbs., vu de dessous.
5. Segment anal de la larve de *Winnertzia striaticollis* Kieff., vu de dessous.
6. Segment anal de la larve de *Winnertzia levicollis* Kieff., vu de dessous.
7. Trois derniers segments de la larve de *Bremia abietis* Kieff., vus de dessous.
8. Segment anal et extrémité du dernier segment abdominal de la larve de *Winnertzia* sp. n., vus de dessous.
9. Papille stigmatifère de la larve de *Cecidomyia pini* (D. G.).
10. — — — de *Dicrodiplosis longipes* Kieff. ?

11. Deux papilles dorsales soudées, de la larve de *Cecidomyia pini* (D. G.).
12. Deux papilles dorsales soudées, de la larve d'un *Lestodiplosis* acarivore.

PLANCHE 28.

(Papilles des larves, agrandies).

- Fig. 1. Premier segment thoracique de la larve de *Contarinia pirivora* (Ril.) vu de devant et grossi 480 fois; *a*, papilles sternales; *b*, papilles pleurales internes composées de trois; *e*, papille pleurale externe; *f*, une des papilles latérales (*papillae laterenses* Kieff.)(¹); *sp*, spatule sternale; *v. sp*, verrues spiniformes.
2. Larve de *Contarinia pirivora* (Ril.), vue de dessous et grossie 50 fois; *t*, tête; *th*, thorax; *abd*, abdomen; *s. a*, segment anal, *c*, papilles ventrales antérieures; *d*, papilles ventrales postérieures.
3. Partie du 2^e et du 3^e segments thoraciques de *Perrisia* n. sp. qui gonfle les fruits de *Myosotis palustris* L.; *a*, papilles sternales; *v. sp*, verrues spiniformes; *sp*, spatule; *b*, papilles pleurales internes et composées; *e*, papille pleurale externe et simple (grossie 480 fois).
4. Portion du 1^{er} segment thoracique de la larve d'*Asphondylia conglomerata* D. St., vue de dessous; *a*, papilles sternales; *b*, papilles pleurales internes, simples et avec une soie; *e*, papille pleurale externe avec soie.
5. Larve de *Contarinia pirivora* (Ril.), vue de dessus et grossie 50 fois; *st*, stigmate; *p. d*, papilles dorsales; *s. a*, segment anal.
6. Portion du 1^{er} segment thoracique de *Stefaniella atriplicis*; *sp*, spatule; *a*, papilles sternales, composées de deux soies.

PLANCHE 29.

(Papilles des larves agrandies).

- Fig. 1. Portion du 1^{er} segment de la larve de *Lasioptera populnea* Wachtl vue de dessous (camera lucida).

(1) [311, p. 188].

2. Portion du 1^{er} segment thoracique de la larve de *Asphondylia punica* March., vue de dessous (camera lucida); *a*, papilles sternales; *b*, papilles pleurales; *c*, partie circulaire tenant lieu de papille pleurale externe; *d*, espace chitineux et brun.
3. Portion du 1^{er} segment thoracique de la larve de *Mikiola fagi* (Hart.); *a*, papilles sternales; *b*, papilles pleurales.
4. Portion du 1^{er} segment de la larve d'une Lestrémine; *a*, papilles sternales; *b*, papilles pleurales.
5. Pseudopode d'une larve de *Lestodiplosis* (camera lucida).
6. Stigmate de la larve de *Stefaniella atriplicis* Kieff., vu de profil.
7. Le même vu de face.
8. Segment ventral d'une larve de *Clinodiplosis cilicrus* Kieff., vu de côté; *a*, deux des quatre papilles ventrales antérieures; *b*, une des deux papilles ventrales postérieures.
9. Deux premiers segments thoraciques de la larve d'un *Lestodiplosis*, vus de dessous; *a*, pseudopodes; *b*, papilles pleurales.
10. Segment ventral d'un *Winnertzia*; *a*, quatre papilles ventrales antérieures; *b*, quatre papilles ventrales postérieures; *c*, quatre papilles ellipsoïdales.

PLANCHE 30.

(Appareil respiratoire et appareil digestif agrandis).

- Fig. 1. Larve de *Mycodiplosis Reaumurii* Kieff.; appareil respiratoire vu d'en haut; les deux troncs latéro-dorsaux avec leurs ramifications transversales.
2. Appareil respiratoire de la même, vu d'en bas; les deux troncs latéro-ventraux avec leurs ramifications transversales.
3. Appareil digestif de la même larve; *a*, estomac; *b*, gros intestin; *c*, intestin grêle; *d*, tubes de Malpighi; *e*, glandes salivaires.
4. Trois derniers segments somatiques de la larve de *Cecidomyia pini* (D. G.), vus de dessus; *a*, segment anal; *b*, avant-dernier segment somatique recouvrant le segment anal et portant la dernière paire de stigmates; *c*, papilles dorsales

soudées et renflées; *d*, troncs latéro-dorsaux vus par transparence; *st*, stigmates.

5. Les trois mêmes segments vus de dessous; *a*, segment anal; *b*, avant-dernier segment somatique.
6. Globules contenus dans les glandes salivaires.
7. Stigmate abdominal de la larve de *Mycodiplosis boleti* Kieff.
8. Larve de *Mycodiplosis Reaumuri* Kieff., vue de côté; *a*, cœur ou vaisseau dorsal; *b*, cerveau; *c*, système nerveux.
9. Partie des troncs latéro-dorsaux de la même montrant deux tubes transversaux dont les extrémités renflées en ampoule sont écartées l'une de l'autre, par anomalie.
10. Portion du vaisseau dorsal d'une larve avec deux valvules; *a*, avant la contraction; *b*, pendant la contraction; d'après P. Marchal.

PLANCHE 31.

(Dessins agrandis : les fig. 1-3 faites à l'aide de la camera lucida).

- Fig. 1. Spatule subsessile de la larve immature de *Rhabdophaga Pierrei* Kieff., grossie 480 fois; larve extraite d'une branche de *Salix aurita* L., le 15 septembre.
2. La même spatule vue de profil.
3. Spatule de la larve du même insecte, grossie 480 fois; larve arrivée à maturité, extraite de la branche de Saule le 6 mars, alors qu'elle avait achevé le travail de perforation et qu'elle n'était plus séparée du dehors que par l'épiderme de l'écorce; *a*, papilles sternales, en cône effilé, imitant une soie obtuse; *b*, papilles pleurales; *c*, pleures avec granulation; *d*, verrues spiniformes.
4. Deux premiers segments thoraciques, et commencement du 3^e, d'une Lestrémine; papilles, spatule et protubérances chitineuses.
5. Spatule de *Mayetiola lanceolatae* (Rbs.), d'après Rübsaamen ainsi que les cinq suivantes.
6. Spatule de *Mayetiola* sp.? sur *Calamagrostis lanceolata*, dans un léger enfoncement sous une des gaines supérieures.
7. Spatule de *Mayetiola bimaculata* (Rbs.).

8. Spatule de *Mayetiola molinae* (Rbs.).
9. Spatule de *Mayetiola* sp.? sur *Molinia coerulea* Mönch., sous une des gaines supérieures, fortement renflée.
10. Spatule de *Mayetiola radifica* (Rbs.).
11. Trois derniers segments de la jeune larve d'*Arnoldia cerri* (Koll.), vus de dessus.
12. Stigmate abdominal de la même très grossi.
13. Appendice thoracique de la jeune larve de *Mikiola fagi* (Hart.).
14. Un des crochets d'une larve d'*Holoneurus fulvus* Kieff., vu de côté.
15. Papille dorsale changée en appendice squamigère, et deux lamelles dorsales de la larve de *Clinodiplosis curicis* Kieff.
16. Spatule de la même larve.

PLANCHE 32.

(Toutes les figures agrandies).

- Fig. 1. Spatule de la larve de *Schizomyia galiorum* Kieff.
2. — de *Schizomyia tami* Kieff.
 3. — de *Hormomyia* n. sp. (renflement basal des feuilles de *Carex*).
 4. — de *Colpodia anomala* Kieff.
 5. — d'*Asphondylia pilosa* Kieff.
 6. — de *Hormomyia* n. sp. (galles en grains de blé à la base de *Carex Davalliana*.)
 7. — d'*Oligotrophus Bergenstammi* (Wachtl).
 8. — de *Braueriella phillyreae* (Fr. Lw.).
 9. — de *Winnertzia fuscus* Kieff.
 10. — de *Schizomyia* (*Kiefferia*) *pimpinellae* (Fr. Lw.).
 11. — de *Hormomyia cornifex* Kieff.
 12. Papilles collaires supérieures et pièce cornée du cou de la larve de *Dicrodiplosis longipes* Kieff.? (la pièce cornée est située en dessous et vue par transparence.)

• PLANCHE 33.

(Toutes les figures agrandies).

- Fig. 1. Spatule, papilles pleurales et sternales de la larve de *Baldratia salicorniae* Kieff.
2. Spatule, papilles pleurales et sternales, et crochets de *Holoneurus fulvus* Kieff.
3. Spatule et papilles sternales de *Porricondyla albimana* (Meig.); a, crochets.
4. Spatule, papilles pleurales et sternales de *Lasioptera arundinis* Schin., selon Rübsaamen.
5. Spatule, papilles pleurales et sternales, verrues cingentes et spiniformes de *Mayetiola Joannisi* Kieff.
6. Idem de *Mayetiola dactylidis* Kieff.
7. Idem de *Mayetiola holci* Kieff.
8. Abdomen de *Frirenia tenella* Kieff., les œufs vus par transparence.
9. Idem d'un *Dasyneura*.
10. Œuf de *Contarinia (Stictodiplosis) anthonoma* Kieff.
11. — *Contarinia aprilina* Kieff.
12. — *Pseudohormomyia granifex* Kieff.
13. — *Contarinia tritici* Kirb.
14. — *Contarinia scabiosae* Kieff.
15. — d'*Oligotrophus Hartigi* (Lieb.).
16. — d'*Asphondylia serpylli* Kieff.
17. — de *Cystiphora taraxaci* Kieff.
18. — d'*Asphondylia prunicola* Wachtl.
19. — de *Winnertzia nigripennis* Kieff.
20. — *Perrisia praticola* Kieff.
21. — *Perrisia piri* (Bouché).
22. — *Xylodiplosis praecox* (Winn.).

PLANCHE 34.

(Grandeur naturelle).

- Fig. 1. Galle de *Rhabdophaga rosaria* (H. Lw.), sur *Salix purpurea* L.
 2. Galle du même insecte sur *Salix aurita* L.
 3. Galles de *Rhabdophaga Karschi* Kieff., sur *Salix aurita* L.
 4. Deux galles de *Rhabdophaga rosariella* Kieff. — — .
 5. Galles de *Rhabdophaga clavifera* Kieff., sur *Salix Caprea* L.
 6. Galle de *Rhabdophaga dubia* Kieff., sur *Salix aurita* L.
 7. Galle de *Rhabdophaga pulvini* Kieff. (*salicina* Gir. non Schrk.).
 8. Galle de *Rhabdophaga* sp. ?
 9. Section d'une branche dénudée de *Salix purpurea* L. avec les loges de *Rhabdophaga saliciperda* (Duf.).
 10. Galles de *Rhabdophaga salicis* Schrk. sur *Salix purpurea* L.
 11. Partie d'une branche de *Salix aurita* L. avec les loges de *Rhabdophaga Pierrei* Kieff.
 12. Galle de *Rhabdophaga heterobia* (H. Lw.), sur *Salix purpurea* L.; a, galle du même insecte sur un chaton du même Saule.

PLANCHE 35.

(Grandeur naturelle).

- Fig. 1. Cécidie de *Perrisia plicatrix* (H. Lw.) sur *Rubus coesius* L., selon H. Loew, comme les deux suivantes.
 2. Une gousse normale de *Medicago fulcata* L. et deux gousses déformées par *Asphondylia nigripes* Kieff.
 3. Galle de *Dasyneura sisymbrii* (Schrk.) sur *Nasturtium silvestre* R. Br.
 4. Galle d'*Oligotrophus juniperinus* (L.) avant la sortie de l'insecte, sur *Juniperus communis* L.; a, la même après la sortie de l'insecte.
 5. Galle d'*Oligotrophus Panteli* Kieff. avant la sortie de l'insecte, sur *Juniperus communis* L.; a, la même après la sortie de l'insecte.

6. Galle d'*Oligotrophus* sp. ? sur la même plante.
7. Galle d'*Oligotrophus sabinæ* Kieff., sur *Juniperus Sabina* L.
8. Galle d'*Oligotrophus* n. sp., sur *Ulmus campestris* L.
9. Galle de *Perrisia* sp. n., sur *Salix aurita* L.; a, section.
10. Galle de *Rhopalomyia Kiefferi* Trott., sur *Artemisia camphorata*; a, section.
11. Galles d'*Acodiplosis inulæ* (H. Lw.), sur *Inula britannica* L.

PLANCHE 36.

(Grandeur naturelle).

- Fig. 1. Deux galles de *Contarinia globuli* (Rbs.), sur *Sarothamnus scoparius* L.
2. Galle d'*Asphondylia pilosa* Kieff., sur la même plante.
 3. Deux galles d'*Asphondylia sarothamni* (H. Lw.), sur la même plante.
 4. Renflements de *Sarothamnus scoparius* L. produits par *Janetiella tuberculi* (Rbs.)
 5. Deux galles de *Perrisia tubicola* Kieff., sur *Sarothamnus scoparius* L.; a, section d'une galle.
 6. Galle de *Contarinia quercicola* (Rbs.), sur *Quercus cerris* L.
 7. Fleurs de *Myosotis palustris* L. renflées et déformées par *Perrisia* n. sp.
 8. Fruit de la même plante gonflé par *Perrisia* n. sp.
 9. Renflement d'une feuille d'*Echinophora spinosa* produit par *Lasioptera* sp. n.
 10. Galle de *Perrisia ericæ-scopariæ* (Duf.), sur *Erica scoparia* L.; a, une des écailles avec la petite galle interne qu'elle recouvre.
 11. Galles d'*Asphondylia Borzi* D. St. sur *Rhamnus alaternus* L.
 12. Agglomération de galles d'*Asphondylia conglomerata* D. St., sur *Atriplex halimus* L.; a, section d'une des galles de l'agglomération.
 13. Section de la galle d'*Asphondylia punica* March., sur la même plante.

PLANCHE 37.

(Grandeur naturelle).

- Fig. 1. Galles d'*Oligotrophus Bergenstammii* Wachtl, sur un rameau de *Pirus* selon Wachtl.
2. Galles de *Rhopalomyia* ? sur *Genista scorpius* DC.; a, section.
3. Rejet de *Galeobdolon luteum* Huds. avec trois galles de *Perrisia galeobdolonitis* (Winn.).
4. Tige de *Salicornia herbacea* L. avec deux galles de *Baldratia salicorniae* Kieff.
5. Section d'une galle de *Stefaniella atriplicis* Kieff., sur *Atriplex halimus* L.
6. Galle de *Perrisia* sp. ? sur *Euphorbia cyparissias*, d'après Mik, ainsi que les deux suivantes.
7. Galle de *Perrisia subpatula* (Bremi), sur la même plante.
8. Galle de *Perrisia capitigena* (Bremi), sur la même plante.
9. Galle d'*Oligotrophus taxi* (Inchb.), sur *Taxus baccata* L.

PLANCHE 38.

(Grandeur naturelle).

- Fig. 1-3. Feuille de *Quercus cerris* L. vue de dessous.
1. Trois galles d'*Arnoldia homocera* (Fr. Lw.), vues de dessus et quatre vues de dessous; a, section agrandie.
2. Quatre galles d'*Arnoldia cerris* (Koll.), vues de dessus et six vues de dessous; a, section d'une galle agrandie.
3. Trois galles de *Dryomyia circinnans* (Gir.), vues de dessous; a, six galles vues de dessous.
- 4-5. Feuille de *Quercus cerris* L., vue de dessous.
4. Quatre galles de *Contarinia subulifex* Kieff., vues de dessus; a, section d'une galle agrandie.
5. Galles d'une Cécidomyie nouvelle, vues de dessus; a, les mêmes vues de dessous; b, section d'une galle agrandie.
- 6-7. Feuille de *Quercus ilex* L., vue de dessous.

6. Galles de *Dryomyia Lichtensteini* (Fr. Lw.), vues de dessous ;
a, les mêmes vues de dessus.
7. Galles de *Contarinia ilicis* Kieff., vues de dessous ; a, section
agrandie.
8. Galle de *Contarinia* sp. n., sur *Quercus suber* L.
9. Galles de *Dryomyia cocciferae* (March.), sur *Quercus cocci-
fera* L. ; les mêmes vues de dessous.
10. Galle d'*Arnoldia* n. sp., sur *Quercus cerris* L. (section).
11. Feuille de *Quercus pedunculata* Ehrh. avec trois galles de
Macrodiplosis dryobia (Fr. Lw.).
12. Feuille du même avec quatre galles de *Macrodiplosis volvens*
Kieff.

PLANCHE 39.

(Grandeur naturelle).

- Fig. 1. Galles de *Perrisia trachelii* Wachtl, sur *Campanula rotundi-
folia* L.
2. Galles de *Rhopalomyia baccarum* (Wachtl), sur *Artemisia
scoparia* L., selon Wachtl.
 3. Galles de *Perrisia bupleuri* (Wachtl), sur *Bupleurum falcatum*
L., selon Wachtl.
 4. Cécidies de *Rhopalomyia artemisiae* (Bouché), sur *Artemisia
campestris* L., selon Fr. Löw.
 5. Galle de *Perrisia genisticola* (F. Lw.), sur *Genista tinctoria* L.,
selon Fr. Löw.
 6. Feuille d'*Acer campestre* L. avec les cécidies en ocelle d'une
Diploside nouvelle, selon Fr. Löw.
 7. Galles de *Rhopalomyia tubifex* (Bouché), sur *Artemisia cam-
pestris* L., selon H. Löw.
 8. Galles de *Monarthropalpus buxi* (Lab.), sur des feuilles de *Bu-
xus sempervirens* L., d'après Laboulbène.

PLANCHE 40.

(Grandeur naturelle).

- Fig. 1. Galles d'*Oligotrophus Reaumuriannus* (Fr. Lw.), sur une feuille
de *Tilia grandifolia* Ehrh. ; a, section d'une galle agrandie,
d'après Fr. Löw, comme les fig. 2, 4, 6, 8 et 9.

2. Galle de *Perrisia asperulae* (Fr. Lw.), sur *Asperula tinctoria* L.; a, section.
3. Chaton normal de *Corylus avellana* L. et chaton déformé par *Contarinia* (*Stirtodiplosis*) *coryli* (Fr. Lw.).
4. Rameau d'*Erica arborea* L. avec trois cécidies de *Myricomyia mediterranea* (Fr. Lw.).
5. Fleurs de *Tilia grandifolia* Ehrh. avec les galles de *Contarinia tiliarum* Kieff., selon Mik.
6. Feuille de *Prunus domestica* L. avec deux galles de *Putoniella marsupialis* (Fr. Lw.).
7. *Potentilla argentea* L. avec des galles de *Perrisia potentillae* Wachtl, selon Wachtl; a, section.
8. Rameau de *Salix fragilis* L. avec la cécidie de *Perrisia terminalis* (H. Lw.).
9. *Erica carnea* L. avec une galle de *Perrisia ericina* (Fr. Lw.).

PLANCHE 41.

(Grandeur naturelle).

- Fig. 1. Pousse de *Daphne cneorum* L. déformée par *Perrisia daphnes* Kieff.
2. Pousse de *Genista tinctoria* L. déformée par *Perrisia* sp.?
 3. Cécidie de *Perrisia genistam colvens* Kieff. sur *Genista pilosa* L.
 4. Pousse de *Cytisus sagittarius* L. déformée par *Perrisia* sp.?
 5. Galle de *Rhopalomyia ptarmicae* (Vall.), sur *Achillea Ptarmica* L.
 6. Fruit de *Betula alba* L. gonflé par *Oligotrophus betulae* (Winn.); a, fruit normal; selon Fr. Löw.
 7. Feuille de *Salix aprica* L. avec des galles d'*Oligotrophus capreae* (Winn.), selon Mik; a, section agrandie.
 8. Feuille d'*Urtica dioica* avec des galles de *Perrisia urticae* Perr.

PLANCHE 42.

(Grandeur naturelle).

- Fig. 1. Tige de *Galium aparine* L. avec des galles de *Perrisia aparines* Kieff.

2. Déformation de l'inflorescence produite par le même insecte.
3. Galle de *Perrisia galii* (H. Lw.) sur l'inflorescence de *Galium uliginosum* L.
4. Galles du même insecte sur *Galium verum* L.
5. Feuilles de *Fagus silvatica* L. avec deux galles de *Mikiola fagi* (Hart.); *a-e*, dessins schématiques montrant cette galle à ses différents stades; *d*, phase d'élongation; *e*, phase d'accroissement diamétral, selon Fockeu.
6. Feuille de *Glechoma hederaceum* L. avec les galles d'*Oligotrophus bursarius* (Bremi).
7. Feuille de *Fagus silvatica* L. avec les galles d'*Oligotrophus annulipes* (Hart.) = *piliger* (H. Lw.); *a-e*, différents stades de développement, d'après Fockeu; *f*, section longitudinale d'une galle mûre et détachée, agrandie.
8. Feuille de *Cornus sanguinea* L. avec les galles d'*Oligotrophus corni* (Gir.), vue de dessous.

PLANCHE 43.

(Grandeur naturelle).

- Fig. 1. Galles de *Pseudohormomyia granifex* Kieff. sur *Carex stellulata* Good.
2. Galles de *Hormomyia*? sur *Carex stellulata* Good.
 3. Galles de *Hormomyia* sp.? sur *Carex stricta* Good.
 4. Galles de *Hormomyia cornifex* Kieff. sur *Carex pallescens* L.
 5. Galle d'une Cécidomyine sur *Sweda vermiculata*.
 6. Utricules de *Carex muricata* L. déformées par *Perrisia muricatae* (Mad.).
 7. Utricules de *Carex acuta* Fr. déformées par *Perrisia* sp. n.
 8. Rameau de *Larix decidua* Mill. avec un bourgeon normal et un bourgeon déformé par *Perrisia laricis* (Fr. Lw.).
 9. Galles de *Contarinia* n. sp. sur *Quercus coccifera* L.
 10. Galle de *Mayetiola poae* (Bosc.) sur *Poa nemoralis* L.; 11, section transversale; *t*, tige; *g*, gaine; *f*, fibres; *l*, larve; figures agrandies, d'après Prillieux.

PLANCHE 44.

(Grandeur naturelle).

- Fig. 1. Galle de *Harmandia petioli* Kieff. sur *Populus tremula* L. ;
1 a, section d'une galle corticole grossie.
2. Coupe transversale d'une portion de jeune feuille de *Fagus silvatica* L. avec le premier stade de la galle de *Mikiola fagi* (Hart.), selon Büsgen.
3. Galles de *Harmandia globuli* Rbs. sur *Populus tremula* L., selon Rübsaamen, ainsi que les trois suivantes.
4. Galles de *Harmandia cristata* Kieff. (*cavernosa* Rbs.).
5. Galles de *Lasioptera populnea* Wachtl.
6. Galles de *Harmandia tremulae* Winn. (*Löwii* Rbs.).
7. Fleur d'*Origanum vulgare* L. déformée par *Asphondylia Hornigi* Wachtl, selon Wachtl (fig. grossie).
8. Rameau de *Salix nigra* L. avec les galles de *Rhabdophaga salicis* Schrk., après la sortie des insectes.
9. Trois fleurs d'*Artemisia herba-alba* déformées par des larves de Cécidomyies, d'après Houard.
10. Feuille d'Olivier avec les galles de *Perrisia oleae* Fr. Lw.
11. Feuille d'*Epilobium angustifolium* L. avec enroulement marginal produit par *Perrisia Kiefferiana* Rbs., d'après Rübsaamen.
12. Galles d'*Asphondylia rosmarini* Kieff. sur *Rosmarinus officinalis* L.
13. Galle de *Perrisia ignorata* Wachtl, sur *Medicago sativa* L., d'après Wachtl.

Revislon des Coléoptères de la famille

des

BOSTRYCHIDES

PAR P. LESNE.

4^e Mémoire (1).

BOSTRYCHINAE *sens. strict.* — II. Les **Xylopertha**.

CARACTÉRISTIQUE SOMMAIRE DES XYLOPERTHA.

Parmi les Bostrychines oxygnathes dont les femelles possèdent un long oviscapte, les *Xylopertha*, pris au sens le plus large du mot, se distinguent principalement par la conformation de la saillie intercoxale du premier segment apparent de l'abdomen. Le cas très particulier du *Bostrychus capucinus* mis à part, cette saillie est constituée, dans les genres du type *Bostrychus*, par une lame chitineuse dilatée en une sorte de plateau sur sa tranche ventrale, au niveau de la surface abdominale (fig. 253 à 255). Il n'en est pas ainsi chez les *Xylopertha* où la même saillie, tout en formant une lame mince et élevée, n'est aucunement épaissie le long de son bord libre ventral (fig. 256 à 258).

Tel est le seul caractère permettant de séparer nettement la série si variée des *Xylopertha* de l'ensemble plus homogène des *Bostrychus*.

On peut ajouter que la taille moyenne des *Xylopertha* est sensiblement inférieure à celle des *Bostrychus*, que la massue antennaire des premiers comparée à celle des seconds montre une tendance à prendre un plus grand développement, qu'il est fort rare de voir chez les *Xylopertha* le prothorax se prolonger en cornes aux angles antérieurs, qu'il est fréquent, au contraire, de constater chez eux des modifications sexuelles parfois très remarquables, affectant soit les derniers segments abdominaux, ce qui est plus particulièrement le cas de la femelle, soit les pièces mêmes de l'armure génitale, surtout dans le cas du mâle. Cette diversité de conformation des régions postérieures de l'abdomen contraste avec la structure uniforme des mêmes parties dans la longue suite des *Bostrychus*. Les stigmates de la première paire, par leur grandeur et leur position variable chez les *Xylopertha*, donnent lieu à la même remarque.

(1) Voyez 1^{er} Mémoire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 95; 2^e Mémoire, *id.*, 1897, p. 319; 3^e Mémoire, *id.*, 1898, p. 438.

Du côté des *Sinoxylon*, la limite du groupe, établie à l'aide des caractères fournis par la forme des mandibules et par leur jeu, n'est pas absolument tranchée. Dans le genre *Xylopsocus*, on peut suivre d'espièce à espèce la gradation insensible des caractères qui, de la confor-




Fig. 253 à 258. — Conformation de la saillie intercoxale du 1^{er} segment apparent de l'abdomen chez les *Bostrychus* et les *Xylopertha*. 1^{er} segment abdominal chez les *Lichenophanes varius* Ill. (fig. 253), *Bostrychopstis uncinata* Germ. (fig. 254) et *Xylothrips flavipes* Ill. (fig. 256 et 257). Coupes transversales schématisques de la même saillie chez les *Bostrychus* (fig. 255) et chez les *Xylopertha* (fig. 258).

mation buccale typique des *Bostrychines* oxygnathes, conduisent presque exactement à celle des pachygnathes.

TABLEAU DES GENRES.

- 1-40 — Prothorax dépourvu de suture latérale, ou montrant seulement sur les angles postérieurs une courte carène légèrement arquée, non angulée à la base.
- 2-31 — Cinq petits articles entre le 2^e article de l'antenne et le 1^{er} de la massue (fig. 261, 285, etc.). Pas de couronne de soies dressées sur le front (1).
- 3-10 — Articles de la massue antennaire hérissés de poils raides perpendiculairement dressés, au moins le long de leur bord interne, et munis chacun, outre les pores senso-

(1) Sauf chez les femelles de certaines espèces des genres *Xylobosea* et *Xyloprista*.

riels normaux, de grandes dépressions à contour parfaitement délimité (fig. 261, 270, 271, etc.). Bord antérieur de l'épistome finement denté de chaque côté de la base du labre. Mandibules toutes deux pointues au sommet. — ♂ Dernier segment visible de l'abdomen sans pièces pleurales apparentes.

4-5 — Massue antennaire de quatre articles. Stigmates de la première paire très grands, latéraux. Bord antérieur du prothorax armé de chaque côté d'une dent uncinée chez le ♂ (fig. 263), inerme chez la ♀ (fig. 264).....
..... G. **Tetrapriocera** Horn.

5-4 — Massue antennaire de trois articles. Stigmates de la première paire petits, ventraux.

6-9 — 1^{er} et 2^e articles de la massue antennaire munis sur chaque face de grandes dépressions nombreuses (fig. 271, 285, 286).

7-8 — Déclivité apicale des élytres bituberculée de chaque côté. — ♀ Front glabre, explané ou concave (fig. 272, 274). Mandibule gauche dentée en dessus près de l'apex (fig. 272, 274)..... G. **Dendrobiella** Casey.

8-7 — Déclivité apicale des élytres trituberculée de chaque côté. — ♀ Front convexe, orné d'une pilosité dressée (fig. 287, 288). Mandibules simples.... G. **Xyloprista** n. g.

9-6 — 1^{er} et 2^e articles de la massue antennaire présentant seulement deux grandes dépressions sur chaque face (fig. 292). Déclivité apicale trituberculée de chaque côté. — ♀ Front très grand, largement explané (fig. 294). Mandibules dentées en dehors près de la base.....
..... G. **Xylomeira** n. g.

10-3 — Articles de la massue antennaire sans revêtement ni frange interne de poils raides perpendiculairement dressés.

11-14 — Bord antérieur de l'épistome muni d'une petite dent spiniforme de chaque côté de la base du labre. Articles de la massue antennaire munis de grandes dépressions parfaitement délimitées (fig. 296) ⁽¹⁾. Bord apical des

(1) En outre, les stigmates de la première paire sont de dimensions moyennes, au moins chez les *Xylobiops*. Nous n'avons pas examiné le *Xylobtaptus quadrispinosus* sous ce rapport.

- élytres simple, sans lobes, ni dents, ni échancrures. — ♂ Dernier segment abdominal sans pièces pleurales apparentes.
- 12-13 — Déclivité apicale des élytres tridentée de chaque côté. Sillon marginal des élytres brusquement interrompu avant l'apex. — ♀ Dernier segment abdominal non échancré au milieu. G. **Xylobiops** Casey.
- 13-12 — Déclivité apicale des élytres bituberculée de chaque côté. Sillon marginal des élytres insensiblement atténué en arrière en passant sur la déclivité. — ♀ Dernier segment abdominal très grand, profondément échancré au milieu (fig. 302). G. **Xyloblaptus** n. g.
- 14-11 — Bord antérieur de l'épistome sans denticules spiniformes. Articles de la massue antennaire dépourvus de grandes dépressions sensorielles (fig. 319, 324, 335, etc.), sauf dans le genre *Xylionulus* où les élytres sont lobés, dentés ou échancrés au bord apical (fig. 304, 306) et chez lequel les ♂ ont le dernier segment de l'abdomen muni de larges pièces pleurales (1).
- 15-16 — 1^{er} et 2^e articles de la massue antennaire munis chacun, sur chaque face, de deux grandes dépressions parfaitement délimitées (fig. 303). Bord apical des élytres denté et en outre échancré ou lobé (fig. 304, 306), non conformé en fausse-épipleure. Tibias antérieurs normaux. Pas de carène sur le front ni sur les angles postérieurs du prothorax. — ♂ Dernier segment apparent de l'abdomen avec de larges pièces pleurales. G. **Xylionulus** n. g.
- 16-15 — Articles de la massue antennaire dépourvus de grandes dépressions sensorielles et montrant seulement, sur chaque face, deux zones de condensation des pores habituels (fig. 324, 342, 343, etc.).
- 17-30 — Tibias antérieurs normaux, plus larges à l'apex qu'en leur milieu, sans denticulation particulière sur la face postérieure, leur face externe plus ou moins large, sou-

(1) Les stigmates de la première paire sont très grands, latéraux, chez tous les types génériques de ce groupe qui ont pu être examinés sous ce rapport : *Xylionulus*, *Xylodelets*, *Xylopertha*, *Xylodectes*, *Xylian*.

vent sillonnée. Front convexe, constamment dépourvu de soies dressées.

- 18-19 — Massue antennaire bicoudée (fig. 310). — ♂ Dernier segment apparent de l'abdomen avec de larges pièces pleurales. — ♀ Bord postérieur du même segment frangé de longs poils claviformes (fig. 315). G. **Xylocis** n. g.
- 19-18 — Massue antennaire droite.
- 20-21 — Angles antérieurs du prothorax prolongés en cornes infléchies et uncinées au bout (fig. 317). Épistome largement échancré au bord antérieur. — ♂ Dernier segment apparent de l'abdomen muni de pièces pleurales.
..... G. **Xylodrypta** n. g.
- 21-20 — Angles antérieurs du prothorax plus ou moins accusés, non prolongés en cornes.
- 22-27 — Bord inféro-apical des élytres large, conformé en faux-épipleure.
- 23-24 — Bord antérieur du prothorax inerme. Pas de pli sur l'angle postérieur du prothorax. — ♂ Dernier segment abdominal muni de pièces pleurales... G. **Xylodeleis** n. g.
- 24-23 — Angles antérieurs du prothorax munis chacun d'une dent uncinée insérée au bord même. — ♂ Dernier segment de l'abdomen sans pièces pleurales apparentes.
- 25-26 — Bord antérieur de l'épistome faiblement échancré en arc de cercle dans sa partie médiane correspondant à l'insertion du labre. Angle postérieur du prothorax sans pli. Dernier article de la massue antennaire seulement un peu plus long que chacun des précédents. Sculpture élytrale en partie granuleuse. Yeux gros. — ♀ Angle sutural des élytres appendiculé (fig. 325 et 332 à 334). Dernier segment apparent de l'abdomen sans relief médian..... G. **Xylopertha** Guér.
- 26-25 — Bord antérieur de l'épistome un peu avancé au milieu et légèrement bilobé dans la région correspondant à l'insertion du labre. Flancs du prothorax marqués d'un pli sur l'angle postérieur (fig. 336). Dernier article des antennes beaucoup plus long que le précédent. Sculpture élytrale nullement granuleuse. Yeux petits. — ♀ An-

- gle sutural des élytres simple. Dernier segment abdominal avec un relief médian. G. **Xylodectes** n. g.
- 27-22 — Bord inféro-apical des élytres non conformé en faux-épipleure.
- 28-29 — Bord apical des élytres entier, très finement denticulé. Épistome tronqué au milieu de son bord antérieur. — ♂ Dernier segment apparent de l'abdomen sans pièces pleurales. G. **Xylotillus** n. g.
- 29-28 — Bord apical des élytres échancré ou lobé (sauf chez le *X. collaris* ♂), non denticulé. — ♂ Dernier segment abdominal muni de pièces pleurales. . . G. **Xyllon** n. g.
- 30-17 — Tibias antérieurs comprimés, plus larges au milieu qu'à l'apex, armés de nombreuses dents sur leur face postérieure, leur face externe amincie, sans pan coupé (fig. 390 à 392). Front déprimé dans toute sa hauteur. Prothorax nullement élargi en arrière, sans uncus marginal aux angles antérieurs. Bord apical des élytres non conformé en faux-épipleure. — ♂ Dernier segment de l'abdomen muni de pièces pleurales. — ♀ Tarses antérieurs avec de longues soies au côté interne. G. **Xylobosca** n. g.
- 31-2 — 4 ou 3 petits articles entre le 2^e article de l'antenne et le 1^{er} de la massue.
- 32-39 — 4 petits articles au funicule antennaire (antennes de 9 articles) (fig. 407, 423, etc.). Des soies dressées sur le front. — ♂ Dernier segment de l'abdomen muni de pièces pleurales.
- 33-34 — Articles de la massue antennaire dépourvus de grandes dépressions sensorielles (fig. 408 et 410). Région frontale entièrement couverte de soies dressées. — ♀ Élytres fortement échancrés à l'apex. Dernier segment abdominal bidenté. G. **Xylonites** n. g.
- 34-33 — Articles de la massue antennaire avec de grandes dépressions bien délimitées, circulaires (fig. 423, 443, etc.). Soies frontales disposées en couronne ou suivant deux rangées latérales (fig. 452, 465). — ♀ Bord postérieur des élytres entier.
- 35-36 — Suture élytrale fortement épaissie en bourrelet sur la

déclivité (fig. 425 à 429, 441, etc.). Stigmates de la première paire très grands, latéraux (fig. 260). *G. Scobicia* n. g.

36-35 — Suture élytrale simplement élevée sur la déclivité. Stigmates de la première paire petits, ventraux (fig. 259).

37-38 — Bord antérieur de l'épistome inerme. Mandibules toutes deux pointues au sommet. Élytres dentés en arrière. — ♀ Dernier segment apparent de l'abdomen entier..... *G. Enneadesmus* Muls.

38-37 — Bord antérieur de l'épistome finement denté de chaque côté de la base du labre. Mandibules dyssymétriques, celle de droite largement arrondie au sommet. Élytres inermes. — ♀ Dernier segment abdominal échancré au milieu du bord postérieur..... *G. Xylogenes* n. g.

39-32 — 3 petits articles au funicule antennaire (antennes de 8 articles) (fig. 466). Pas de soies dressées sur le front. Dents de la râpe prothoracique sans denticules interposés. — ♂ Dernier segment de l'abdomen sans pièces pleurales. — ♀ 4^e segment abdominal bidenté au milieu du bord postérieur, le 5^e profondément échancré (fig. 469, 470)..... *G. Octodesmus* n. g.

40-41 — Suture latérale prothoracique très nette, plus ou moins longue, brusquement coudée sur l'angle postérieur et brièvement prolongée suivant la base (fig. 476, 480). Articles de la massue antennaire dépourvus de grandes dépressions sensorielles.

41-42 — Articles de la massue antennaire allongés (fig. 473). Front garni de poils dressés. — ♂ Dernier segment apparent de l'abdomen muni de pièces pleurales..... *G. Xylothrips* n. g.

42-41 — 1^{er} et 2^e articles de la massue antennaire transverses (fig. 478, 479). Front sans poils dressés. — ♂ Dernier segment de l'abdomen sans pièces pleurales..... *G. Xylopsocus* n. g.

Observations. — Les organites sensoriels de la massue antennaire fournissent, ici comme chez les *Bostrychus* ⁽¹⁾, des caractères de grande

(1) *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 444-445.

valeur, qui sont le meilleur guide du systématique parmi les formes très variées du groupe actuel (1).

La présence ou l'absence sur le front d'une couronne semi-circulaire de longues soies dressées est aussi un bon élément de distinction des types génériques, que cette couronne soit entière ou qu'elle soit réduite aux deux rangées latérales côtoyant le bord interne des yeux.

Les stigmates de la première paire, situés sur la membrane unissant




Fig. 259 et 260. — Prothorax de l'*Enneadasmus trispinosus* Ol. (fig. 259) et du *Scobicia Chevieri* Fabr. (fig. 260), vus par la face postérieure, pour montrer la grandeur et la position des stigmates de la première paire.

le prothorax au mésothorax, atteignent, dans certains genres, des dimensions inusitées. Leur longueur exagérée les oblige alors à se disposer verticalement suivant les flancs du prothorax, et, de ventraux qu'ils étaient, à devenir latéraux (fig. 259 et 260).

Auteurs généraux : Guérin-Méneville, 1845, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1845, *Bull.*, p. xvii. — Lacordaire, 1857, *Gen. des Col.*, IV, p. 534 et 539. — J. Duval et Fairmaire, 1863, *Gen. des Col.*, III, p. 229. — Kiesenwetter, 1877, *Nat. Ins. Deutschl., Col.*, V, p. 37. — G.-H. Horn, 1878, *Proc. Am. phil. Soc.*, XVII, p. 541-545 (2). — Zoufal, 1894, *Wien. ent. Zeit.*, XIII, p. 34. — Th.-L. Casey, 1898, *Journ. of the New York*

(1) Chez les individus conservés à sec, ces caractères ne sont généralement pas perceptibles sans une préparation spéciale. Pour les mettre en évidence, il est nécessaire d'examiner l'antenne par transparence dans un liquide, après qu'elle a été privée par ébullition dans l'eau, de l'air contenu dans sa cavité.

(2) G.-H. Horn et la plupart des auteurs américains donnent aux *Xylopertha* du Nouveau Continent le nom de *Sinoxylon*. Ce genre est cependant tout à fait étranger à l'Amérique.

Ent. Soc., VI, p. 66-67. — J. Schilsky, 1899, *Die Käf. Eur.*, XXXVI Heft, 36 UU et XXXVI 90 à XXXVI 95 ⁽¹⁾.

Genre **Tetrapriocera**.

(Voir tabl. des genres 1, 2, 3, 4).

Horn, 1878, *Proc. Am. Phil. Soc.*, XVII, p. 544. — Casey, 1898, *Journ. of the New York Ent. Soc.*, VI, n° 2, p. 66.

Front dépourvu de couronne de soies dressées. Bord antérieur de l'épistome avec une très petite dent spiniforme de chaque côté de la base du labre. Mandibules toutes deux pointues au sommet. Yeux gros, très fortement détachés des tempes. Antennes de 11 articles, dont quatre pour la massue, les articles 3-7 pris ensemble un peu plus




Fig. 261. — Antenne du *Tetrapriocera tridens* ♀, vue par la face antérieure.

longs que la moitié du 8^e; massue légèrement coudée entre son premier et son second articles, ses articles graduellement décroissants en largeur, hérissés de longs poils perpendiculairement dressés, les trois premiers présentant chacun, sur chaque face, au moins deux grandes dépressions circulaires, parfaitement délimitées ⁽²⁾. Pas de suture laté-

(1) Nous avons déjà appelé l'attention (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 47), sur l'erreur grave commise dans cet ouvrage, et concernant la caractéristique des *Xylopertha* et celle des *Apate*.

(2) Chez les exemplaires de *T. tridens* et de *T. oceanina* que nous avons examinés sous ce rapport, il y a trois grandes dépressions sur la face antérieure du premier article de la massue et deux dépressions sur la même face des deux articles suivants. Ces dépressions sont très rapprochées du bord apical de l'article; elles se trouvent quelquefois fusionnées en une seule beaucoup plus grande. Sur la face postérieure, les dépressions sont moins rapprochées du bord apical de l'article. Celles du *T. defracta* sont semblablement disposées, mais plus grandes; il y en a tantôt deux, tantôt trois sur la face antérieure du premier article de la massue et les dépressions de la face postérieure sont situées presque au milieu de la longueur de l'article.

rale prothoracique (1). Stigmates prothoraciques très grands, latéraux. Déclivité apicale des élytres présentant de chaque côté trois tubercules ou trois calus marginaux quelquefois peu marqués. Suture saillante sur la déclivité. Bord inféro-apical des élytres simple. Dernier segment apparent de l'abdomen simple dans les deux sexes. Face externe des tibias antérieurs normale, à peine rétrécie vers l'apex (2).

♂ Prothorax armé d'un fort uncus à chaque angle antérieur.

♀ Prothorax sans uncus, inerme le long de son bord antérieur.

Genre très particulier par suite des caractères de la massue antennaire et des modifications sexuelles des angles antérieurs du prothorax. Des quatre formes qui le composent, trois se rencontrent dans l'Amérique centrale et méridionale; la quatrième, très voisine de l'espèce centre-américaine, a été trouvée aux îles Marquises.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- 1-4 — Tubercules marginaux de la déclivité apicale parfaitement distincts les uns des autres, plus ou moins saillants, costiformes, et dirigés parallèlement à la suture (fig. 265 et 266). Apex des élytres légèrement redressé (fig. 262). Chacune des deux dents frontales plus rapprochée de son homologue que du bord interne de l'œil. Des poils dressés au côté externe des articles de la massue antennaire (fig. 261). — ♀ Bord latéral du front plus saillant que chez le ♂ au-dessus de l'insertion antennaire. Prothorax moins large que celui du ♂. Calcar des tibias antérieurs plus grand et plus fortement recourbé que chez le ♂.
- 2-3 — Élytres environ deux fois aussi longs que larges (fig. 265). Tubercules marginaux de la déclivité apicale plus ou moins saillants et élevés en arrière (fig. 262). Long.
3 1/2-6 mill. **T. tridens** Fabr.
- 3-2 — Élytres moins d'une fois et demie aussi longs que larges

(1) Les petits grains saillants des flancs du prothorax se disposent en arrière de façon à figurer une sorte de fausse suture, visible chez les *T. tridens* et *oceanina*, nulle ou à peine marquée chez les deux autres espèces.

(2) Les *Tetrapriocera* ont en outre le milieu de l'aire postérieure du pronotum couvert d'une ponctuation râpeuse et leurs tibias postérieurs portent d'assez longues soies à demi dressées à la face externe.

(fig. 266). Tubercules marginaux de la déclivité apicale fort peu élevés, ne formant pas de saillie dentiforme en arrière. — Long. 4 $\frac{1}{3}$ -5 mill. **T. oceanina** n. sp.

- 4-1 — Tubercules marginaux de la déclivité apicale disposés dans le prolongement l'un de l'autre en une côte interrompue, le long des bords supérieur et latéraux de cette déclivité (fig. 268). Apex des élytres avec un rebord en saillie. Dents frontales interoculaires absentes ou, lorsqu'elles existent, chacune d'elles plus rapprochée du bord interne de l'œil que de son homologue. Bord externe des articles de la massue antennaire sans poils dressés (fig. 267 et 270).
- 5-6 — Front bidenté entre les yeux. Premier article de la massue non lobé à la base (fig. 267). — ♂ Suture fronto-clypéale bien marquée. Aire suscéphalique du pronotum⁽¹⁾ triangulaire, déprimée, râpeusement et très finement ponctuée. — Long. 3 $\frac{2}{3}$ -4 $\frac{1}{3}$ mill. **T. defracta** n. sp.
- 6-5 — Front inerme entre les yeux. Premier article de la massue antennaire lobé à la base (fig. 270). Côte marginale de la déclivité apicale des élytres moins saillante. — ♀ Front largement aplani, lisse et très brillant, limité en arrière par une faible dépression en arc de cercle et prolongé de chaque côté, au-dessus de l'insertion antennaire, en un lobe dentiforme redressé (fig. 269). Suture fronto-clypéale obsolète. Aire suscéphalique nullement triangulaire, concave, brillante, éparsement et très finement ponctuée. Calcar des tibias antérieurs de grandeur normale. — Long. 4 $\frac{1}{3}$ mill. **T. laevifrons** n. sp.

Tetrapriocera tridens.

(Voir tabl. des espèces 1, 2. — Fig. 261 à 265 du texte).

, Fabricius, 1792, *Ent. Syst.*, I, pars 2, p. 362⁽²⁾.

(1) Ce que nous appelons aire suscéphalique est la portion du pronotum qui s'étend le long de son bord antérieur et qui est dépourvue de dents de râpe.

(2) M. le professeur Meinert a bien voulu examiner, sur notre demande, le type de cette espèce, conservé au Musée de Copenhague, et les renseignements qu'il nous a obligamment adressés nous ont permis d'identifier la courte diagnose de Fabricius.

longicornis Olivier, 1795, *Ent.*, IV, n° 77, p. 15, pl. III, f. 18. — Gorham, 1883, *Biol. Centr.-Am.*, Col., III, part. 2, p. 218, pl. X, f. 20.

Schwarzi Horn, 1878, *Proc. Am. phil. Soc.*, XVII, p. 545, fig. (♂) ⁽¹⁾.

Long. 3 1/2-6 mill. — Parallèle, d'un brunroussâtre brillant, plus clair sur les parties postérieures du prothorax et sur les deux tiers basilaire des élytres; région de la déclivité apicale souvent brun foncé; appendices roux ⁽²⁾; tibias antérieurs bruns. Front légèrement convexe, plus ou moins rugueusement ponctué, présentant entre les yeux deux denticules plus rapprochés entre eux que du bord interne des yeux. Suture fronto-clypéale bien marquée, fortement enfoncée au milieu. Épistome plus finement et moins densément ponctué que le front. Premier article des antennes hérissé de soies dressées en dessus, le premier article de la massue non lobé à la base. Prothorax présentant une fausse suture latérale en arrière; aire suscéphalique finement râpeuse. Milieu de l'aire postérieure du pronotum avec des grains râpeux assez forts et assez denses, mais un peu variables et quelque-




Fig. 262 à 264. — *Tetrapriocera tridens*. Déclivité apicale des élytres vue de trois quarts (fig. 262); tête et parties antérieures du prothorax vues de trois quarts chez le ♂ (fig. 263) et chez la ♀ (fig. 264).

fois semblables à ceux de l'espèce suivante. Sillon marginal des élytres marqué seulement en arrière, abrégé à l'angle apical externe. Ponctuation dorsale des élytres variable, plus ou moins fine, généralement atténuée en arrière; ponctuation de la déclivité apicale très forte, dense, sauf dans la région de l'angle sutural qui est dépourvue de gros points enfoncés. Tubercules marginaux de la déclivité postérieure généralement dentiformes en arrière, le tubercule inférieur un peu

(1) *Apate rufescens* * et *A. fulvescens* * Dejean, *Cat.*, 3^e éd., p. 334.

(2) Sauf les mandibules qui sont noires comme chez tous les *Bostrychinae*.

moins saillant que les supérieurs. Bord apical des élytres légèrement redressé; déclivité bordée au côté inféro-latéral par une carène atteignant presque le tubercule marginal inférieur. Abdomen finement et densément pubescent, très finement ponctué. Cuisses antérieures robustes, avec un large lobe apical.

♂ Corps plus court que chez la ♀. Dents frontales interoculaires plus petites. Prothorax légèrement transverse.

♀ Bord latéral du front plus saillant que chez le ♂ au-dessus de l'insertion antennaire. Prothorax aussi long que large. Calcar des tibias antérieurs plus grand et plus fortement recourbé que chez le ♂.

Nous avons mentionné la variabilité de la sculpture de l'aire postérieure du pronotum et celle de la ponctuation des élytres; les tubercules marginaux de la déclivité varient aussi et ils sont quelquefois très émoussés.

Distribution géographique. — Amérique chaude, depuis la Floride et le Mexique méridional jusqu'en Colombie et dans le Brésil oriental. Habite aussi les Antilles et les îles Galapagos (¹).

(1) Floride : Biscayne (*Coll. Oberthür*); Fort Capron, Miami River et Key West (*E.-A. Schwarz*).

Cuba (*Coll. Thorey* > *Oberthür*). Haïti (*Olivier*; *Coll. Boutarel*); Saint-Domingue (*G.-H. Horn*; *Coll. Laferté* > *de Marseul*; *Coll. Sallé* > *Oberthür*). Porto-Rico (*Muséum de Paris*). Saint-Thomas (*Coll. Schestedt* > *Musée de Copenhague*). Grenade (*Gorham* in *Proc. zool. Soc Lond.*, 1898, p. 329). [Le *Tetraplocera longicornis* de la *Liste des Coléoptères de la Guadeloupe* de MM. Fleutiaux et Sallé est le *Xylomeira torquata* Fabr.]

Mexique [*J. Flohr* in *Musée de Berlin*; *Musée de Vienne*; *Coll. Bedel*; *Coll. Fairmaire*; *Coll. Oberthür* (ex *Klingelhöffer*)] : Cordoba, Teapa, Tuxtla (*A. Sallé* sec. *Gorham*). Honduras anglais (*Blancaneaux* sec. *Gorham*). Guatemala : El Reposo, Zapola, Torola, Rio Maria Linda (*Champion* sec. *Gorham*); Nicaragua (*Coll. Sallé* sec. *Gorham*) : Chontales (*Janson* sec. *Gorham*). Costa Rica (*De Lafon* in *Muséum de Paris*) : Cachi (*H. Pittier* et *P. Biolley*; *Rogers* sec. *Gorham*).

Colombie : Panama (*Coll. Rothschild* > *Oberthür*); Bugaba (*Champion* sec. *Gorham*); Malachin, dans le département de Panama, en juillet (*Dr O. Thieme* in *Coll. Oberthür*); entre le Rio Magdalena et Bogota, en août-septembre (*Dr O. Thieme* in *Musée de Berlin* et *Coll. Oberthür*); Muzo, en octobre-novembre (*Dr Thieme* in *Coll. Oberthür*); vallée du Rio Cauca (*Dr Thieme* in *Musée de Berlin*); Mariquita (*Chaffanjon* in *Muséum de Paris*). Venezuela (*Coll. Oberthür*).


Brésil (*Coll. Dejean*; *Coll. de Marseul*; *Coll. Bedel*). Bahia (*Coll. de*

Biologie. — D'après une observation de E.-A. Schwarz, faite en Floride (1), cette espèce se développe sous terre dans les racines mortes de *Smilax*. Les terrains récemment soumis au défrichement par incendie sont particulièrement favorables à sa multiplication, car il semble que l'insecte ait une préférence pour les racines à demi brûlées et ayant acquis une grande dureté. L'adulte, comme ceux des *Amphicerus* nord-américains, se plaît à creuser de galeries le tronc et les branches en vie de divers arbres. Schwarz qui l'a trouvé en abondance en avril et mai perforant le bois du *Rhus metopium* (Térébinthacée) n'a pu découvrir de larves dans les arbres ainsi attaqués.


***Tetrapriocera oceanina* n. sp.**

(Voir tabl. des espèces 1, 3. — Fig. 266 du texte).

Long. 4 1/3-5 mil. — Testacé rougeâtre, un peu rembruni sur la déclivité apicale des élytres; plus large et plus court que le *tridens* dont il est très voisin. En diffère en outre par les caractères suivants :



265



266

Fig. 265 et 266. — *Tetrapriocera tridens* ♂ et *T. oceanina* ♂.

Prothorax plus fortement rétréci en avant. Sculpture du milieu de l'aire postérieure du pronotum plus fine. Tubercules marginaux de la déclivité apicale réduits à des callos costiformes à peine saillants (surtout l'inférieur) et nullement pointus en arrière.

♀ Prothorax nettement transverse.

Distribution géographique. —

Iles Marquises : Nouka Hiva (*Muséum de Paris*). — 3 ♂ et 2 ♀.

Marseul; Coll. Bedel). Cachimbo et Villa Victoria, dans l'État de Bahia (*Ch. Pujol* in Coll. Oberthür).

Iles Galapagos : Ile Indefatigable (Expédition de l'*Albatros* sec. Linell).

(1) Voyez H.-G. Hubbard, *Entomologica americana*, IV, avril-décembre 1888, p. 96.

Tetrapriocera defracta n. sp. (♂).

(Voir tabl. des espèces 4, 5. — Fig. 267 et 268 du texte).

Long. 3 $\frac{2}{3}$ -4 $\frac{1}{3}$ mill. — Parallèle, de forme générale un peu plus courte que le *tridens* ♂; brun, avec les épaules et les appendices roux ou rougeâtres; tibias antérieurs bruns. Front très finement ponctué, brillant, avec deux denticules interoculaires plus écartés entre eux qu'ils ne le sont chacun du bord interne de l'œil; en arrière de ces denticules le front est aplani et il est limité postérieurement ⁽¹⁾ par une très légère impression arquée. Pas de lobe en saillie au-dessus de l'insertion antennaire. Premier article de la massue très obliquement tronqué à la base, mais non prolongé en lobe comme dans l'espèce suivante. Prothorax légèrement transverse, légèrement arqué sur les côtés, faiblement échancré en avant; aire suscéphalique triangulaire, finement et rugueusement ponctuée, déprimée longitudinalement au milieu; aire postérieure du pronotum couverte de grains râpeux au milieu, finement ponctuée sur les côtés. Ponctuation des élytres forte et un peu rugueuse près de la base, graduellement atténuée en arrière, leur pubescence très fine et peu dense, assez longue. Sillon marginal des élytres nul. Déclivité apicale à peine convexe, régulièrement circulaire, nettement rebordée sur toute sa périphérie, densément et très fortement ponctuée. Dans les deux tiers supérieurs, le rebord de la déclivité est constitué, de chaque côté, par les trois tubercules marginaux habituels; mais ces tubercules, au lieu d'être nettement séparés, ont la forme de calus allongés, disposés transversalement dans le prolongement l'un de l'autre, de façon à former une côte marginale interrompue; intérieurement la même déclivité présente un rebord plus large sur les côtés que près de l'angle sutural. Suture légèrement saillante sur la déclivité. Élytres non redressés à l'apex.




Fig. 267 et 268. — *Tetrapriocera defracta* ♂. Funicule et 1^{er} article de la massue antennaire, vus par la face antérieure (fig. 267); déclivité apicale, vue de trois quarts (fig. 268).

(1) Nous bornons le front en arrière, à la ligne suivant laquelle se termine la sculpture en carinules longitudinales qui orne le vertex.

L'exemplaire provenant de Matto-Grosso diffère de ceux de Goyaz par la ponctuation de la déclivité apicale plus forte le long de ses bords supérieur et supéro-latéraux et par l'angle sutural des élytres légèrement saillant.

Distribution géographique. — Brésil central : États de Matto-Grosso (P. Germain in Coll. Oberthür) et de Goyaz (Ch. Pujol in Muséum de Paris) ⁽¹⁾. — 3 ♂.

***Tetrapriocera laevifrons* n. sp. (♀).**


(Voir tabl. des espèces 4, 6. — Fig. 269 et 270 du texte).

Long. 4 1/3 mill. — Étroit, parallèle, plus allongé que le *T. tridens* ♀. Brun roussâtre; élytres (sauf la déclivité apicale) et flancs du prothorax roux; appendices roux, à part les tibias antérieurs qui sont bruns; tête noire. Front grand, aplani, très lisse et très brillant, limité en arrière par une légère impression arquée, inerte entre les yeux,

mais prolongé de chaque côté, au-dessus de l'insertion antennaire, en une forte dent redressée. Suture fronto-clypéale obsolète. Premier article de la massue antennaire lobé en dedans à sa base. Prothorax subcarré, ses côtés presque parallèles; aire suscéphalique presque lisse, finement ponctuée, légèrement concave; milieu de l'aire postérieure du pronotum avec des grains râpeux. Ponctuation des élytres dense et assez forte en avant, atténuée en arrière. Sillon marginal des élytres nul. Déclivité apicale régulièrement circulaire, nettement délimitée, légèrement convexe, fortement et densément



269



270

Fig. 269 et 270. — *Tetrapriocera laevifrons* ♀. Avant-corps, vu de profil (fig. 269); portion du funicule et premier article de la massue antennaire, vus par la face antérieure (fig. 270).

ponctuée sur toute sa surface. Dans plus de la moitié supérieure, le rebord de la déclivité est fourni, de chaque côté, par les trois calus mar-

(1) Dans l'État de Matto-Grosso, M. Germain a surtout exploré les régions voisines de Cuyaba. Les exemplaires de *T. defracta* récoltés par M. Pujol, viennent de Jatahy, à la pointe méridionale de l'État de Goyaz.

ginaux habituels disposés comme chez le *T. defracta*, mais fort peu saillants; inférieurement il existe aussi un rebord en saillie, mais celui-ci est plus étroit que dans l'espèce précédente. Les élytres ne sont pas redressés à l'apex et leur suture est légèrement et également saillante sur toute la longueur de la déclivité. Ponctuation abdominale extrêmement fine, éparse. Calcar des tibias antérieurs notablement moins développé que chez les autres femelles connues de *Tetrapriocera*.

Il paraît improbable que cette femelle appartienne à la même espèce que le ♂ décrit précédemment sous le nom de *defracta*. Les raisons qui nous font adopter cette opinion sont les suivantes : 1° le premier article de la massue antennaire est très différent dans les deux formes; 2° la saillie du rebord de la déclivité apicale est beaucoup moindre chez le *laevifrons* que chez le *defracta*; 3° le front du *laevifrons* est inerne entre les yeux, tandis qu'il est bidenté dans la même région chez le *defracta*. Or, chez les *Tetrapriocera* dont les deux sexes sont connus, ni le premier article de la massue, ni la déclivité apicale ne fournissent de caractères sexuels, et, quant aux dents frontales, la variation sexuelle a lieu dans le sens précisément inverse de celui qui s'observerait chez les formes *defracta-laevifrons*, dans l'hypothèse de l'identité spécifique de celles-ci.

Distribution géographique. — Paraguay (Dr Bohls in Coll. Rothschild > Oberthür). — Type unique ♀.

Genre **Dendrobiella**.

(Voir tabl. des genres 1, 2, 3, 5, 6, 7).

Casey, 1898, *Journ. of the New York Ent. Soc.*, VI, p. 66.

Forme courte, oblongue. Front dépourvu de couronne de longues soies dressées, ses angles antérieurs faisant saillie au-dessus de l'insertion des antennes. Suture fronto-clypéale sulciforme, approfondie au milieu dans les deux sexes. Bord antérieur de l'épistome présentant de chaque côté de la base du labre un denticule très aigu, plus petit et peu apparent au côté gauche. Mandibules toutes deux pointues au sommet. Yeux gros, fortement détachés des tempes. Antennes de dix articles, les articles 3-7 pris ensemble notablement moins longs que le premier article de la massue. Les 3 articles qui composent celle-ci sont couverts de poils dressés assez denses et présentent sur chacune de leurs faces deux séries longitudinales de grandes dépres-

sions sensorielles, à contour circulaire parfaitement délimité ⁽¹⁾. Prothorax transverse, dépourvu de suture latérale, légèrement rétréci dans sa moitié antérieure, ses côtés parallèles ou presque parallèles en arrière, son bord antérieur largement tronqué. Aire postérieure du pronotum avec un très fin sillon longitudinal. Stigmates prothoraciques médiocres. Sillon marginal des élytres abrégé à l'angle




Fig. 271. — Antenne du *Dendrobiella sericans* ♀, vue par la face postérieure.

apical externe. Déclivité apicale munie de chaque côté de deux tubercules marginaux mousses, et, inférieurement, d'un rebord en saillie ⁽²⁾. Bord inféro-apical des élytres simple. Dernier segment apparent de l'abdomen simple dans les deux sexes. Tibias antérieurs de largeur normale ⁽³⁾.

♂ Dessus de la tête assez convexe, plus ou moins pubescent. Mandibule gauche simple ou très obtusément dentée à son bord supérieur.

♀ Tête explanée ou concave en dessus. Front glabre, plus grand que chez le ♂, constamment bidenticulé en arrière. Yeux un peu plus gros que chez le ♂. Mandibule gauche fortement dentée avant l'apex sur sa face supérieure. Dernier segment apparent de l'abdomen un peu plus grand que chez le ♂ ⁽⁴⁾.

(1) Les dépressions de la rangée interne sont plus nombreuses que celles de la rangée externe. Chez une ♀ de *D. pubescens* Cas., nous observons 5 à 7 grandes dépressions à la rangée interne et 2 à 3 à la rangée externe.

(2) La déclivité apicale est dépourvue de grosse ponctuation chez les quatre espèces connues.

(3) Autres caractères communs aux *Dendrobiella* : Dents de la râpe prothoracique mêlées de denticules, la dent antéro-latérale du prothorax légèrement uncinée, submarginale. Aire suscéphalique finement râpeuse, non concave. Tibias intermédiaires et surtout les postérieurs avec de longues soies dressées à la face externe. Deuxième article des tarses notablement plus large que le dernier.

(4) Les auteurs américains ont décrit le ♂ comme étant la ♀ et inversement.

Les quatre espèces de ce genre, très voisines entre elles, sont de coloration brune; leur ensemble constitue une remarquable série linéaire. Elles habitent l'Amérique centrale et les contrées voisines.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- 1-6 — Premier article de la massue antennaire de forme normale, convexe au bord interne (fig. 271). Élytres ponctués seulement dans leur moitié dorsale antérieure. Saillie du tubercule supérieur de la déclivité apicale plus faible ou seulement un peu plus marquée que celle du tubercule inférieur. — ♀ Dernier segment apparent de l'abdomen à peine plus grand que chez le ♂.
- 2-3 — Ponctuation des élytres subobsolette, localisée sur le tiers basilaire dorsal. — ♂ Front faiblement pubescent. — ♀ Dent antéapicale de la mandibule gauche moins grande que la pointe même de la mandibule (fig. 272).
- 3-4 — Milieu de l'aire postérieure du pronotum simplement ponctué. Tubercule inférieur de la déclivité apicale plus saillant que le supérieur. Dessus de la tête présentant un très court sillon médian longitudinal entre les denticules frontaux (♀) (fig. 277) ou un peu en arrière de ceux-ci (♂) (fig. 276). Long. 5-6 1/2 mill. **D. sublaevis** Casey
- 4-3 — Milieu de l'aire postérieure du pronotum orné d'une sculpture subécailleuse ⁽¹⁾. Tubercule inférieur de la déclivité apicale très émoussé, moins saillant que chez l'espèce précédente. Pas de sillon au voisinage des dents frontales (♂ ♀). Chez la ♀, ces dents sont reliées entre elles et à une faible côte longitudinale par deux autres côtes arquées disposées en accolade (fig. 279). Long. 5-7 mill. **D. sericea** Muls. et Wach.
- 5-2 — Ponctuation des élytres nette et forte, s'étendant sur leur moitié antérieure. Sculpture du milieu de l'aire postérieure du pronotum simulant des écailles imbriquées. Tubercule inférieur de la déclivité très émoussé, moins saillant que le supérieur. — ♂ Pubescence du front à demi dressée, abondante, masquant le tégument (fig. 280). —

(1) Chaque élément de cette sculpture comprend deux très courts sillons formant un angle aigu dont la pointe est dirigée en avant.

♀ Dent mandibulaire antéapicale aussi grande que la pointe même de la mandibule située au delà de cette dent.
— Long. 4 1/3-7 1/3 mill. **D. sericans** Lec.

6-4 — Premier article de la massue antennaire sécuriforme, sinué au bord interne (fig. 284). Élytres très fortement ponctués (surtout en arrière) dans toute leur région dorsale. Tubercule supérieur de la déclivité apicale beaucoup plus saillant que l'inférieur (fig. 275). — ♀ Front plus étendu que chez les espèces précédentes (fig. 274). Dernier segment apparent de l'abdomen notablement plus grand que chez le ♂. — Long. 5-6 1/2 mill. **D. aspera** Lec.

Dendrobiella sublaevis.

(Voir tabl. des espèces 1, 2, 3. — Fig. 272, 273, 276, 277 du texte).

Casey, 1898, *Journ. of the New York Ent. Soc.*, VI, p. 68 ⁽¹⁾.

Long. 5-6 1/2 mill. — Brun, avec les élytres parfois teintés de roux près de la base ⁽²⁾; antennes et pattes rousses; cuisses souvent rembrunies. Côtés du prothorax et élytres couverts d'une pubescence couchée très dense et extrêmement fine, à reflets dorés. Premier article de la massue antennaire nullement sécuriforme. Aire postérieure du pronotum nettement mais peu densément ponctuée au milieu. Élytres finement et presque obsolètement ponctués sur près de leur tiers antérieur, lisses pos-




Fig. 272 à 275. — *Dendrobiella sublaevis* ♀. Tête vue de profil (fig. 272) et saillie des tubercules marginaux de la déclivité apicale (fig. 273). — *Dendrobiella aspera*. Tête de la ♀, vue de profil (fig. 274) et saillie des tubercules de la déclivité apicale (fig. 275) (*).

(1) *Apate puberula* * Dejean, *Cat.*, 3^e éd., p. 334.

(2) Le mode de coloration est semblable chez les autres *Dendrobiella*.

(*) La déclivité apicale est examinée de dessus, suivant son plan.

térieurement ⁽¹⁾. Tubercules marginaux de la déclivité apicale mousses, l'inférieur plus saillant et plus gros que le supérieur.

♂ Front bidenté au niveau du bord postérieur des yeux. En arrière des dents frontales existe un court sillon longitudinal qui aboutit antérieurement dans leur intervalle (fig. 276) ou qui le dépasse un peu. Pubescence frontale peu abondante, ne masquant pas le tégument.

♀ Le front, densément et assez finement granuleux, est un peu plus étendu que chez le ♂ et ses denticules sont par suite reportés un peu plus en arrière. Le sillon longitudinal est situé entre les deux denticules (fig. 277) et non au delà; il est parfois à peine marqué. La dent de la mandibule gauche est plus courte que la pointe même de la mandibule. Le dernier segment apparent de l'abdomen est à peine plus grand que celui du ♂.

La ponctuation de l'aire postérieure du pronotum montre quelquefois une légère tendance à devenir râpeuse. Chez la ♀ on observe dans certains cas une très faible carinule longitudinale au milieu du front.

Distribution géographique. — Grandes Antilles ⁽²⁾.

Dendrobiella sericea.

(Voir tabl. des espèces 1, 2, 4. — Fig. 278 et 279 du texte).

Mulsant et Wachanru, 1852, *Mém. de l'Acad. de Lyon*, 2^e sér., II, p. 14 (*Opusc. ent.*, 1^{er} cahier, 1852, p. 174) ⁽³⁾.

Long. 5-7 mill. — Coloration et faciès de l'espèce précédente dont

(1) Sans tenir compte de la ponctuation générale extrêmement fine qui couvre les élytres.

(2) Cuba (*Coll. Oberthür*). Haïti (*Coll. Guérin-Ménéville > de Marseul et Oberthür*). Saint-Domingue (*Coll. Dejean; Coll. Guérin-Ménéville; Coll. de Marseul*). La Jamaïque (*Casey; Coll. Dejean; Coll. Guérin-Ménéville; Coll. Oberthür; Coll. Bedel*).

(3) Nous n'avons pas vu le type de cette espèce. Il ne paraissait pas exister dans la collection Wachanru, acquise en partie par M. E. Abeille de Perrin. Aussi est-ce avec quelque doute que nous attribuons le nom de *sericea* à l'espèce actuelle; la description originale s'applique en effet à peu près également bien au *D. sericans* Lec. (*pubescens* Casey). Au moins la solution que nous avons adoptée évite-t-elle la création d'un nom nouveau. Quant à la provenance « Caramanie » donnée par Mulsant, elle est évidemment fausse, à moins qu'il ne s'agisse d'une capture accidentelle.

celle-ci est très voisine. Elle en diffère par la sculpture du milieu de l'aire postérieure du pronotum subécailleuse ⁽¹⁾, par les tubercules de la déclivité apicale moins saillants, notamment le tubercule inférieur qui est très émoussé.

♂ Front bidenté en arrière, sans sillon longitudinal dans cette région. Pubescence frontale plus longue que chez le *sublaevis* ♂ et paraissant plus abondante.

♀ Pas de sillon entre les denticules frontaux. En avant de ceux-ci existe une carène longitudinale faiblement marquée qui se bifurque en arrière en deux branches se reliant chacune à l'un des denticules (fig. 279). Ponctuation du front dense et assez forte, un peu râpeuse. Dent antéapicale de la mandibule gauche un peu plus grande que chez le *sublaevis* ♀. Dernier segment apparent de l'abdomen comme chez ce dernier.

Distribution géographique. — Amérique centrale (région des isthmes) et Colombie orientale ⁽²⁾.

Dendrobiella sericans.

(Voir tabl. des espèces 1, 5. — Fig. 271, 280 et 281 du texte).

Leconte, 1858, *Proc. Ac. Phil.*, 1858, p. 73 ⁽³⁾.

pubescens Casey, 1898, *Journ. of the New York Ent. Soc.*, VI, n° 2, p. 67 ⁽⁴⁾.

Long. 4 1/3-7 1/3 mill. — Ressemble beaucoup aux deux espèces précédentes. S'en distingue par la sculpture du milieu de l'aire postérieure du pronotum simulant des écailles imbriquées et par la

(1) Voir plus haut p. 491, note 1.

(2) Costa Rica (*de Lafon in Muséum de Paris*) : La Uruca (*Biolley in Coll. Bedel*). Colombie orientale (*Petersen in Coll. Steinheil > Oberthür*). Colombie? (*Coll. Mniszech > Oberthür*).

(3) La description de Leconte est très explicite et ne s'applique nullement à la ♀ de son « *Sinoxylon asperum* » comme G.-H. Horn et Th.-L. Casey l'admettent. — Sous le nom de *Xylop. sericans* Lec., M. Gorham (*Biol. Centr.-Am.*, Col., III, 2, p. 215 et 353) a confondu cette espèce et la précédente; aussi les indications géographiques relevées par cet auteur ne pourront être utilisées qu'après un nouvel examen des insectes. La figure de la *Biologia* (*loc. cit.*, pl. X, f. 21), exécutée d'après un exemplaire guatémaltèque, ne permet pas d'identification.

(4) *Apate mexicana** Dejean, *Cat.*, 3^e éd., p. 334 (♂).

punctuation forte et bien distincte de la moitié dorsale antérieure des élytres (1). Comme chez le *D. sericea*, le tubercule inférieur de la déclivité est très émoussé; le tubercule supérieur est plus saillant que l'inférieur.

♂ Denticules frontaux extrêmement réduits et cachés sous la pubescence. Celle-ci est assez longue, mi-dressée; les poils qui la composent convergent vers l'emplacement des denticules (fig. 280) et masquent le tégument. Vertex avec un court sillon médian ou dépourvu de ce sillon.

♀ Front brillant, assez finement et assez densément ponctué, plus étendu que chez les ♀ des espèces précédentes (en sorte que les denti-




Fig. 276 à 283. — Figures schématiques montrant le mode d'ornementation du front (dents, carinules, fossettes et pubescence) chez les *Dendrobiella* ♂ et ♀.

cules sont reportés plus en arrière), mais orné de la même carène faiblement indiquée et bifurquée en arrière (fig. 281). Épistome renflé par rapport au front. Dent antéapicale de la mandibule gauche notablement plus forte que chez les espèces précédentes, aussi grande que la portion de la mandibule qui s'étend au delà.

Distribution géographique. — Mexique septentrional et Texas méridional (2).

(1) A l'opposé de ce qui a lieu dans l'espèce suivante, cette punctuation disparaît donc bien avant le bord de la déclivité apicale.

(2) De Durango au Pacifique (*Coll. Rothschild* > *Oberthür*); Sierra de

Dendrobiella aspera.

(Voir tabl. des espèces 6. — Fig. 274, 275 et 282 à 284 du texte).

Leconte, 1858, *Proc. Acad. Phil.*, 1858, p. 73.

sericans ± Horn (non Leconte), 1878, *Proc. Am. phil. Soc.*, XVII, p. 542. — Casey, 1898, *Journ. of the New York Ent. Soc.*, VI, n° 2, p. 67.

Long. 5-6 1.2 mill. — Diffère des précédents par le premier article de la massue antennaire sécuriforme, par le prothorax un peu plus grand, de forme moins courte, par les élytres moins densément pubescents, couverts sur toute leur région dorsale d'une ponctuation très forte grossissant graduellement en arrière, par la forte saillie du tubercule supérieur de la déclivité. La sculpture du milieu de l'aire postérieure du pronotum simule des écailles imbriquées.



Fig. 284. — Articles 2-8 de l'antenne chez le *Dendrobiella aspera*.

♂ Front armé de deux petits denticules peu distincts sous la pubescence; celle-ci semblable à celle du front du *pubescens* ♂ (fig. 282).

♀ Le front (fig. 274 et 283) ressemble à celui de la ♀ du *pubescens*; mais il est encore plus grand, légèrement excavé, et est nettement impressionné en accolade en arrière, au niveau des denticules. Ceux-ci sont très éloignés de la suture fronto-clypéale. La surface du front est très brillante, très finement et peu densément ponctuée. L'épistome est renflé en bourrelet par rapport au front. Comme chez le *pubescens* ♀, la dent mandibulaire asymétrique est très forte. Le dernier segment apparent de l'abdomen est notablement plus grand que chez le ♂.

Quelquefois le front de la ♀ présente un denticule accessoire très petit situé en dehors du denticule normal et inséré comme lui sur l'impression en accolade.

Durango (*Muséum de Paris*). État de Sinaloa : Presidio (*A. Forrer* in *Musée de Berlin* et *Coll. Oberthür*). Texas : Ringgold Barracks (*Haldeman* sec. *Leconte*); Brownsville (*Casey*).

L'espèce a été rapportée assez fréquemment du Mexique et elle figure dans diverses collections sans indications précises de localités (*Ghiesbreght*, etc., in *Muséum de Paris*; *J. Flohr* in *Musée de Berlin*; *Heller* in *Musée de Vienne*; *Nap. Boyer* in *Coll. Oberthür*, etc.).



Distribution géographique. — Californie méridionale et Basse-Californie; Arizona (1).

Genre **Xyloprista** n. g.

(Voir tabl. des genres 1, 2, 3, 5, 6, 8).

Front légèrement convexe, ses angles antérieurs non en saillie au-dessus de l'insertion antennaire. Bord antérieur de l'épistome avec un

286



285

Fig. 285 et 286. — Antenne du *Xyloprista hexacantha* ♂, vue par la face postérieure (fig. 285) et antenne de *X. praemorsa* ♀ (fig. 286) [les deux premiers articles de la dernière antenne n'ont pas été figurés].

fin denticule de chaque côté de la base du labre. Mandibules toutes deux pointues au sommet, simples dans les deux sexes. Yeux fortement détachés des tempes. Antennes de dix articles, leur premier article avec de longues soies sur la face antérieure, les articles 3-7 pris ensemble plus courts que le premier article de la massue; celle-ci très longue, ses articles hérissés de poils raides et présentant sur chaque face des grandes dépressions circulaires nombreuses. Prothorax dépourvu de suture latérale, armé d'une dent marginale à chacun de

(1) Désert du Colorado : New River (*Leconte*). Basse-Californie (*Xanthus* sec. *Leconte*; *L. Digue* in *Muséum de Paris*); Cap San Lucas (*G.-H. Horn*; *Coll. Sallé* > *Oberthür*). Arizona (*Morrison* in *Coll. Oberthür*). Phoenix (*Coll. Oberthür*).

ses angles antérieurs. Stigmates de la première paire médiocres. Déclivité apicale des élytres munie de chaque côté de trois tubercules marginaux et présentant en outre un rebord inférieur, leur bord inféro-apical large; sillon marginal des élytres abrégé à l'angle apical externe. 5^e segment apparent de l'abdomen simple dans les deux sexes, sans pièces pleurales visibles. Tibias antérieurs normaux (1).

♂ Pubescence du front très courte, couchée sur le tégument. Front bidenté en arrière.

♀ Front configuré comme chez le ♂, denté ou inerme en arrière, mais couvert d'une pilosité dressée rebroussée vers le haut et atteignant son maximum de développement en arrière. Soies dressées du premier article des antennes plus longues et plus fournies que chez le ♂.

Petit groupe très naturel dont les espèces se rencontrent dans les parties chaudes de l'Amérique du Sud, à l'est des Andes.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- 1-2 — Aire postérieure du pronotum fortement et densément ponctuée au milieu, non râpeuse. Déclivité apicale des élytres assez finement et assez éparsement ponctuée. Premier article de la massue antennaire notablement plus large que les suivants. Forme courte, robuste. — ♀ Front orné en arrière d'une rangée arquée de longues soies dressées (fig. 287), la pubescence rebroussée des parties antérieures du front très courte et peu apparente. — Long. 5 1/2-6 mill. **X. arcellata** n. sp.
- 2-1 — Milieu de l'aire postérieure du pronotum couvert d'une ponctuation finement râpeuse. Déclivité apicale des élytres imponctuée. — ♀ Pilosité frontale homogène, quoique plus longue en arrière (fig. 288).
- 3-4 — Ponctuation élytrale fine, quelquefois atténuée en arrière. Tubercules marginaux de la déclivité apicale courts et très épais (fig. 290); rebord inférieur de la déclivité étroit (même fig.). Base des élytres rousse. Forme courte. — ♀ Front inerme, couvert d'une pilosité roux doré très dense, masquant le tégument (fig. 288). — Long. 5-7 mill. **X. praemorsa** Er.

(1) Les *Xyloprista* ont en outre en commun une aire suscéphalique râpeuse, sans limites nettes, les dents de la râpe prothoraciques entremêlées de denticules et les tibias postérieurs ornés de longues soies à la face externe.

- 4-3 — Ponctuation élytrale forte, nullement atténuée en arrière. Tubercules marginaux de la déclivité apicale longs, aigus, spiniformes (fig. 291); rebord inférieur de la déclivité très large (même fig.). Corps assez allongé. — ♀ Front bidenté, couvert d'une pilosité grisâtre peu épaisse, ne masquant pas le tégument. — Long. 4-6 mill.
..... **X. hexacantha** Fairm.

***Xyloprista arcellata* n. sp.**

(Voir tabl. des espèces 1. — Fig. 287 et 289 du texte).

Long. 5 1/2-6 mill; largeur aux épaules 2 1/4 mill. env. — Court, parallèle, brun, avec les antennes rousses et les pattes roussâtres. Ressemble surtout au *praemorsa*. Premier article de la massue antennaire notablement plus large que les suivants. Prothorax transverse, faiblement arqué sur les côtés en arrière. Milieu de l'aire postérieure du pronotum fortement et densément ponctué, non râpeux. Élytres finement pubescents sur les côtés et en arrière, plus fortement ponctués que chez le *praemorsa*. Déclivité apicale finement et densément pubescente, assez finement et assez éparsément ponctuée, sauf au voisinage de la suture, ses tubercules marginaux tous également sailants ou ceux des deux paires supérieures un peu plus faibles.




Fig. 287. — Tête du *Xyloprista arcellata* ♀, vue de trois quarts.

♂ Front présentant de chaque côté, de part et d'autre des dents médianes, un ou deux denticules accessoires plus petits. Pubescence frontale blonde, couchée, fine et assez dense, convergeant vers les dents médianes.

♀ Front inerme, finement et densément granuleux, orné en arrière d'une rangée arquée de longues soies dressées (couronne frontale); pubescence rebroussée du reste du front très courte et peu apparente. Les longues soies dorées du premier article des antennes sont très développées; divergentes dans leur région basilaire, elles se recourbent à l'apex en convergeant vers un même point et figurent ainsi une sorte de berceau ovoïde.

Distribution géographique. — Brésil : État de Matto Grosso (P. Germain in Coll. Oberthür et Muséum de Paris). — 1 ♂, 2 ♀.

***Xyloprista praemorsa**.**

(Voir tabl. des espèces 2, 3. — Fig. 286, 288 et 290 du texte).

Erichson, 1847, *Wieg. Arch. für Naturg.*, 1847, I, p. 87 ⁽¹⁾.

Long. 5-7 mill. — Assez court, parallèle. Brun, avec le prothorax, la région antérieure des élytres et l'abdomen roux ou roussâtres; antennes et pattes rousses, à part les tibias antérieurs qui sont bruns. Massue antennaire longuement villeuse. Prothorax transverse, assez fortement arrondi sur les côtés, fortement rétréci en avant. Milieu de l'aire postérieure du pronotum glabre, sa ponctuation râpeuse, assez dense, plus ou moins fine. Écusson densément pubescent. Élytres glabres dans leur région dorsale, présentant une ponctuation assez fine s'étendant jusqu'aux bords de la déclivité apicale en s'atténuant quelquefois en arrière; déclivité imponduée, couverte d'une pubescence dense, couchée, d'un blond doré, ses tubercules marginaux épais, courts, l'inférieur plus saillant que les deux supérieurs qui sont souvent égaux. On observe en outre, sur chaque élytre, au bord supérieur de la déclivité, un calus situé contre la suture. Bord inférieur réfléchi de la déclivité assez étroit. Suture légèrement saillante sur la déclivité. Corps densément pubescent en dessous.



Fig. 288. — Tête du *Xyloprista praemorsa* ♀, vue de trois quarts.

♂ Front bidenté ou quadridenté, sillonné longitudinalement en arrière.

♀ Front inerme, densément couvert de soies rousses dressées, rebroussées vers le haut et masquant le tégument.

La longueur et la densité des poils de la massue antennaire, la densité de la pubescence sur la déclivité apicale, la saillie des tubercules marginaux de cette déclivité et celle de son rebord apical varient légèrement et d'une façon toute individuelle.

Distribution géographique. — Répandu dans l'Amérique du Sud

(1) *Apate dentata** Dejean, *Cat.*, 3^e éd., p. 334.

depuis le Venezuela et la Colombie jusqu'en Bolivie et dans l'État de Sao Paulo ⁽¹⁾.

***Xyloprista hexacantha**.**

(Voir tabl. des espèces 2, 4. — Fig. 285 et 291 du texte).

Fairmaire, 1892, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1892, p. 245.

Long. 4-6 mill. — Parallèle, plus allongé que les précédents. Brun, avec le calus huméral, les antennes et les pattes roux; tibias antérieurs bruns; segments abdominaux marginés de roux en arrière. Front bidenté en arrière dans les deux sexes. Prothorax subcarré, un peu




Fig. 289 à 291. — Déclivité apicale des élytres, vue de trois quarts, chez les *Xyloprista arcellata* (fig. 289), *X. praemorsa* (fig. 290) et *X. hexacantha* (fig. 291).

transverse, légèrement arqué sur les côtés en arrière. Milieu de l'aire postérieure du pronotum glabre, couvert de points enfoncés transverses, arqués, déterminant une sculpture un peu râpeuse. Ponctuation des élytres dense, forte, non atténuée en arrière; pubescence élytrale absente dans la région dorso-basilaire, extrêmement fine et peu apparente sur les côtés et en arrière. Déclivité apicale impunctuée, densément et très finement pubescente, ses tubercules marginaux aigus et très saillants, subégaux, son rebord inférieur très large, échancré à angle aigu à la suture. Dessous du corps modérément pubescent.

♀ Denticules frontaux plus grands que chez le ♂; au-devant d'eux

(1) Colombie (*Coll. Thorey* > *Oberthür*). Venezuela (*D^r Moritz* in *Musée de Vienne*): Caracas (*Coll. Sallé* > *Oberthür*). Pérou oriental (*Erichson*). Bolivie (*Balzan* in *Musée de Gènes*; *Songo* in *Coll. Oberthür*). Brésil (*Erichson*; *Coll. Dejean*; *Coll. Mniszech*; etc.). État de Pernambuco: Pery Pery (*E. Gounelle*); Rio Janeiro (*Castelnau* in *Muséum de Paris*); État de Sao Paulo: vallée du Rio Pardo, affluent du Parana Panema (*E. Gounelle*).

le front est couvert de fins poils dressés, rebroussés vers le haut et ne masquant pas le tégument qui est granuleux.

Distribution géographique. — Brésil moyen et méridional, Bolivie, Paraguay, République Argentine, Uruguay (1).

Genre **Xylomeira** *n. g.*

(Voir tabl. des genres 1, 2, 3, 5, 9).

Front dépourvu de couronne de soies dressées, ses angles antérieurs non saillants au-dessus de l'insertion des antennes. Bord antérieur de l'épistome muni d'un denticule aigu de chaque côté de la base du labre. Mandibules toutes deux pointues au sommet. Yeux très gros,




Fig. 292. — Antenne du *Xylomeira torquata* ♀, vue par la face postérieure.

très fortement détachés des tempes. Antennes de 10 articles, les articles 3-7 pris ensemble plus courts que le 8^e; massue hérissée de longs poils perpendiculairement dressés, ses deux premiers articles présentant chacun, sur chaque face, deux grandes dépressions dont le contour est parfaitement délimité (2). Prothorax subcarré, dépourvu de suture la-

(1) État de Bahia : Cachimbo et Villa Victoria (*Ch. Pujol* in *Coll. Oberthür*); Cidade de Conderiba (S. Antonio da Barra) (*E. Gounelle*). Matto Grosso (*Rohde* in *Musée de Berlin*). Bolivie : Cochabamba (*Germain* in *Muséum de Paris*). Paraguay (*P. Germain* in *Coll. Oberthür*; *D^r Bohls* in *Coll. Oberthür*; etc.) : Asuncion (*Balzan* in *Musée de Gênes*), Porto 14 de Mayo (*G. Boggiani* in *Musée de Gênes*). République Argentine : Chaco (*Spegazzini* in *Musée de Gênes*); Corrientes (*D'Orbigny* in *Muséum de Paris*); Resistencia (*Balzan* in *Musée de Gênes*); province de Rioja (sec. *Fairmaire*); Rio Cuarto (*A. Breuer* in *Musée de Berlin*); La Plata (*Balzan* in *Musée de Gênes*). Uruguay : Rio Negro (*Coll. Oberthür*).

Un exemplaire de la Coll. Fairmaire porte la provenance « Colombie » qui nous paraît très douteuse.

(2) Il existe en outre une dépression médiane accessoire sur le premier article de la massue.

térale; aire suscéphalique large et peu élevée, concave, limitée en arrière par une rangée de dents assez régulière. Stigmates prothoraciques de grandeur normale. Trois tubercules marginaux de chaque côté à la déclivité apicale. Sillon marginal des élytres abrégé à l'angle apical externe. Tibias antérieurs de forme normale.

♂ Front normal, convexe. Mandibules sans apophyses en dehors. Dernier segment apparent de l'abdomen simple.

♀ Front explané, concave, beaucoup plus grand que chez le ♂. Mandibules munies chacune d'une apophyse dentiforme près de la base. Bord postérieur du dernier segment abdominal présentant de chaque côté une échancrure correspondant à un tubercule de la face interne de l'élytre.

Genre très intéressant à raison de ses affinités multiples. Il ne contient qu'une seule espèce appartenant à la faune antillienne.

Xylomeira torquata.

(Fig. 292 à 295 du texte).

Fabricius, 1801, *Syst. Eleuth.*, II, p. 382 (♀).

sextuberculata ± Gorham (non Leconte), 1898, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, 1898, p. 329 (1).

Long. 3 1/2-4 3/4 mill. — Parallèle, assez allongé. Corps entièrement brun ou avec la base du prothorax et celle des élytres plus ou moins largement teintées de roux; antennes et pattes rousses à part les tibias antérieurs qui sont bruns. Plan de l'épistome situé dans le prolongement de celui du front. Prothorax un peu transverse, légèrement arqué sur les côtés dans ses deux tiers postérieurs, fortement rétréci en avant; aire suscéphalique rugueuse; dent de l'angle antérieur du prothorax marginale. Milieu de l'aire postérieure du pronotum densément couvert de petits reliefs cunéiformes. Élytres assez fortement et assez densément ponctués, leur ponctuation devenant brusquement plus forte et très serrée entre les tubercules marginaux de la déclivité. Ceux-ci émoussés au sommet et costiformes en avant, le supérieur plus saillant



Fig. 293. — Déclivité apicale du *Xylomeira torquata*, vue de trois quarts.

(1) *Apate planifrons** Reiche in Coll. Dejean.

que les inférieurs. Déclivité apicale fortement et densément ponctuée, densément et très finement pubescente, avec la suture légèrement élevée et un rebord inférieur assez étroit. Abdomen très finement ponctué et pubescent. Face externe des tibias intermédiaires et postérieurs avec de longues soies à demi couchées.

♂ Front convexe, inerme ou avec les faibles rudiments de deux denticules dans sa région postérieure, sa ponctuation très fine, sa pubescence extrêmement courte et très fine, couchée, peu abondante. Suture fronto-clypéale sulciforme, fortement enfoncée et comme fovéolée au milieu. Mandibules montrant un tubercule près de leur base au côté dorso-externe. Bord antérieur du prothorax sans poils dressés. Bord apical des élytres simple en dedans.

♀ Front très brillant, largement aplani, excavé en arrière où il est limité par une forte impression arquée, et complètement privé de denticules; sa ponctuation fine et peu dense, sa pubescence très fine. Suture fronto-clypéale très finement indiquée, non enfoncée. Soies dressées du premier article des antennes plus longues et plus fournies que chez le ♂. Aire suscéphalique du prothorax bordée en arrière, dans toute sa largeur, par une rangée de longues soies rousses dressées. Abdomen très convexe, le pénultième et l'antépénultième segments largement sinués au bord postérieur, le dernier segment ascendant en arrière et assez profondément échancré de chaque côté d'un lobe médian brièvement bifide; ce lobe est séparé du reste du segment par un sillon transverse. Apex de chaque élytre muni en dedans, non loin de la suture, d'un fort épaississement en forme de tubercule attenant au bord apical et correspondant à l'échancrure paire du dernier segment abdominal.




Fig. 294 et 295. — *Xylomeira torquata* ♀. Tête et portion antérieure du prothorax, vues de trois quarts (fig. 294) et derniers segments abdominaux (fig. 295).

Le ♂ de cette espèce reproduit exactement le faciès du *Xylobiops concisus*. Les nombreux caractères sexuels de la ♀ lui sont en partie propres, en partie communs avec les femelles des *Dendrobiella*, des *Xyloprista* et des *Xylobiops*.

Distribution géographique. — Antilles ⁽¹⁾.

(1) Cuba (Coll. Dejean > de Marseul; Musée de Berlin; Coll. Bedel; Coll. Abeille de Perrin). Saint-Domingue (Coll. Sallé > Oberthür). Porto-

Genre **Xylobiops**.

(Voir tabl. des genres 1, 2, 10, 11, 12).

Casey, 1898, *Journ. of the New York Ent. Soc.*, VI, p. 66.

Front normal, semblable dans les deux sexes, dépourvu de couronne de soies dressées. Bord antérieur de l'épistome muni de chaque côté de la base du labre d'une petite dent spiniforme.

Mandibules toutes deux pointues au sommet.

Yeux assez gros, bien détachés des tempes. An-

tennes de 10 articles, dont 3 pour la massue; articles 3-7 pris en-

semble plus courts que le premier article de l'antenne et que chacun de ceux de la massue; celle-ci modérément longue, sans vestiture de poils dressés, présentant sur chaque face de chacun des articles deux grandes dépressions parfaitement délimitées. Prothorax subcarré, arrondi aux angles postérieurs, dépourvu de suture latérale. Stigmates de la première paire de grandeur normale. Sillon marginal des élytres brusquement interrompu avant l'apex. Déclivité apicale des élytres munie de chaque côté de 3 tubercules marginaux et, inférieurement, d'un rebord en saillie; bord inféro-apical des élytres simple. Tibias antérieurs normaux (1).



Fig. 296. — Antenne du *Xylobiops basilaris* ♀, vue par la face postérieure.

♂ Dernier segment abdominal sans pièces pleurales apparentes.

Rico (*Muséum de Paris*); Saint-Thomas (*Smidt sec. Fabricius; Coll. de Marseul; Musée de Bruxelles; Coll. Sallé > Oberthür*); Antigua (*Purves in Musée de Bruxelles et Muséum de Paris*). La Guadeloupe (*Muséum de Paris; Coll. Fleutiaux*). Sainte-Lucie (*Bonnecour in Muséum de Paris*). Grenade (*Corham, sub Xylop. sextuberculata Lec.*)

Nous avons vu deux individus étiquetés « Mexique », l'un dans la collection du Musée de Vienne, l'autre dans celle de M. René Oberthür.

Les exemplaires de la collection Fleutiaux sont ceux qui ont été signalés dans la *Liste des Coléoptères de la Guadeloupe* de MM. Fleutiaux et Sallé (*Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1889, p. 419) sous le nom de *Tetrapriocera longicornis* Ol.

(1) Tous les *Xylobiops* ont en outre les dents de la râpe prothoracique mélangées de denticules et les tibias postérieurs avec de longues soies au côté externe.

Les *Xylobiops* sont répartis dans l'Amérique septentrionale et centrale et dans le Nord de l'Amérique méridionale. Les caractères sexuels externes affectent, chez eux, soit le dernier segment apparent de l'abdomen, soit la sculpture de la déclivité apicale.

TABLEAU DES ESPÈCES (1).

- 1-6 — Tubercules élytraux de la paire moyenne non terminés en épine acérée (fig. 297 et 298). Ponctuation dorsale des élytres plus ou moins renforcée en arrière près des bords de la déclivité apicale.
- 2-3 — Front inerme. Les deux derniers articles des palpes maxillaires subégaux. Ponctuation de la déclivité apicale très forte, surtout chez le ♂. Dernier segment apparent de l'abdomen semblable dans les deux sexes. Nervure suturale épaissie et saillante dans la région scutellaire. Long. 3 3/4-7 mill. **X. basilaris** Say
- 3-2 — Front avec deux denticules entre les yeux. Pénultième article des palpes maxillaires plus court que le dernier. Ponctuation de la déclivité apicale notablement moins forte que chez le *X. basilaris*. Dernier segment apparent de l'abdomen beaucoup plus grand chez la ♀ que chez le ♂.
- 4-5 — Bord externe des élytres roux dans sa moitié basilaire. Ponctuation dorsale des élytres notablement plus grosse près du bord de la déclivité apicale. Long. 3 1/2-4 1/3 mill. **X. concisus** n. sp.
- 5-4 — Bord externe des élytres rembruni dans toute sa longueur. Ponctuation dorsale des élytres à peine plus forte près du bord supérieur de la déclivité apicale. Pubescence frontale très peu apparente. Long. 4-4 1/2 mill. **X. parilis** n. sp.
- 6-1 — Tubercules élytraux de la paire moyenne terminés en pointe acérée (fig. 299). Ponctuation dorsale des élytres non renforcée en arrière.
- 7-8 — Déclivité apicale des élytres avec de gros points enfoncés

(1) Le « *Sinoxyton floridanum* » de G.-H. Horn, qui fait très probablement partie du genre actuel, ne figure pas dans ce tableau. La description originale de cette espèce est reproduite plus bas.

(quelquefois peu distincts), situés presque tous au-dessus du niveau des dents inférieures. Sculpture du milieu de l'aire postérieure du pronotum plus dense que chez l'espèce suivante. — ♀ Dernier segment ventral apparent simple, obtusément angulé en arrière, non membraneux sur les côtés ni retroussé le long de son bord postérieur.

— Long. 3 1/3-4 mill. **X. texanus** Horn

- 8-7 — Déclivité apicale des élytres sans grosse ponctuation au moins dans la moitié supérieure. — ♀ Dernier segment ventral tronqué en arrière, membraneux sur les côtés, et légèrement retroussé le long de son bord postérieur apparent (1). — Long. 3-4 1/2 mill. **X. sextuberculatus** Lec.

Xylobiops basilaris.

(Voir tabl. des espèces 1, 2. — Fig. 296 et 297 du texte).

Say, 1824, *Journ. Acad. Philad.*, III, p. 321 (*Œuv. ent.*, traduction Gory, 1837, p. 324) (♂). — Riley, 1872, *Fourth Ann. Rep. on the nox., benef. and other Insects of the state of Missouri*, p. 53-54, fig. — Horn, 1878, *Proc. Am. phil. Soc.*, XVII, p. 542 (2).

Long. 4 3/4-7 mill. — Allongé, parallèle; brun foncé avec les élytres tachés de roux ou de rougeâtre à la base; épistome souvent teinté de rougeâtre; antennes, palpes et tarses ferrugineux; hanches, cuisses et tibias d'un brun roussâtre. Tête densément granuleuse en dessus. Front inerme dans les deux sexes, couvert d'une pilosité extrêmement fine et peu apparente, rebroussée vers le haut. 1^{er} article des antennes avec de longues soies. Les deux derniers articles des palpes maxillaires sub-égaux. Prothorax subcarré, plus étroit en avant qu'en arrière, ses côtés légèrement et régulièrement arqués, avec de longs poils dressés dans la région antéro-latérale; dent de l'angle antérieur insérée très près du bord. Milieu de l'aire postérieure du pronotum assez densément râpeuse. Élytres fortement et densément ponctués, plus fortement le long de la suture; nervure suturale épaissie et saillante dans la région scutellaire, où elle est très lisse et très brillante. Déclivité apicale très for-

(1) V. plus bas p. 512-513 et la note 1 de la page 513.

(2) V. en outre Packard, *Ins. inj. to forest and shade trees*, Washington, 1890, p. 296, n° 33 et 34.

Les *Apate basalis** Dejean (*Cat.*, 3^e éd., p. 334) et *A. humeralis* Knoch (in *Cat. de Melsheimer*) se rapportent au *Xylobiops basilaris*.

tement ponctuée et présentant une pubescence blonde, couchée, très fine, peu dense et peu apparente; tubercule marginal de la paire moyenne plus rapproché du tubercule supérieur que de l'inférieur, émoussé ou pointu au sommet, mais non terminé en épine acérée. Suture légèrement saillante sur la déclivité. Ponctuation de l'abdomen excessivement fine et peu dense, sa pubescence très fine, assez éparse. Ailes enfumées.

♂ Points enfoncés de la déclivité apicale très gros, fovéiformes, peu nombreux, ménageant un espace lisse de chaque côté de la suture.

♀ Points enfoncés de la déclivité apicale moins gros que chez le ♂ et répartis sur toute la surface de cette déclivité.

L'étendue de la tache rouge élytrale est variable. Quelquefois cette tache occupe la moitié antérieure des élytres, sans toutefois en atteindre le bord latéral. Lorsqu'elle décroît, la teinte brune s'étend antérieurement le long de la suture sur une largeur plus ou moins grande, en sorte que la dernière portion demeurant claire est le calus huméral. D'après Riley, on trouve des individus dont les élytres sont entièrement noirs.

Distribution géographique. — Canada sud-oriental ⁽¹⁾ et États-Unis orientaux jusqu'au Texas ⁽²⁾.

Biologie. — Cette espèce paraît se développer surtout dans le bois mort (E.-A. Schwarz). Harris et Riley ont parlé d'arbres de diverses espèces qui auraient été tués par elle; mais il n'y a pas de certitude que ces indications soient basées sur des observations précises ⁽³⁾. Quoi qu'il en soit, le *Xylobiops busilaris* vit aux dépens du bois d'essences très variées appartenant aux familles des Juglandées (*Carya alba*, d'après T.-W. Harris et G.-H. Horn), des Légumineuses (*Prosopis* sp., d'après F.-M. Webster), des Rosacées (*Pyrus malus* et *Amygdalus persica*, d'après Riley), des Ébénacées (*Diospyros caroliniana*, d'après E.-A. Schwarz).

(1) Au Canada l'espèce est rare, d'après Alva-H. Kilman.

(2) Pensylvanie (*Musée de Berlin*); Washington (*Department of agriculture*); Ohio (*Coll. Oberthür*); Caroline du Nord (*Morrison in Coll. Oberthür*); Géorgie (*Musée de Vienne*); Floride : Enterprise (*Schwarz*); Louisiane (*Coll. Bedel*) : Nouvelle-Orléans (*Coll. Sallé > Oberthür*); Texas (*Belgrave in Coll. Bedel*) : Dallas (*Reverchon in Coll. Oberthür*), Burnet County (*Webster*). « Sur l'Ohio, le Mississippi et l'Arkansas » (*Say*); Missouri (*Riley*, etc.).

(3) Riley ne fait que rapporter à ce sujet les renseignements envoyés par un correspondant.

Les larves se plaisent dans les parties centrales les plus dures du tronc ou des branches. La nymphose a lieu sans apprêt et est de très courte durée. La galerie de sortie est coudée presque à angle droit sur celle creusée par la larve ⁽¹⁾.


Xylobiops concisus n. sp.

(Voir tabl. des espèces 1, 3, 4. — Fig. 298 du texte).


Long. 3 1/2-4 1/3 mill. — Assez allongé, parallèle; d'un brun souvent roussâtre, avec les élytres roux dans toute leur largeur sur leur moitié basilaire; palpes, antennes et pattes roux, à part les tibias antérieurs qui sont bruns; dernier segment apparent de l'abdomen roux.

Diffère du *basilaris* par les points suivants : Front présentant entre les yeux deux denticules très courts, peu écartés (♂ ♀), sa pubescence rousse, couchée, assez dense mais extrêmement fine, convergeant vers les denticules. Pénultième article des palpes maxillaires un peu plus court que le dernier. Prothorax un peu plus court que chez le *basilaris*, un peu élargi en arrière; sculpture du milieu de l'aire postérieure du pronotum composée de grains râpeux en avant, et de fins reliefs cunéiformes en arrière. Ponctuation dorsale des élytres forte et dense, renforcée en arrière près du bord supérieur de la déclivité apicale. Nervure suturale moins saillante dans la région scutellaire. Déclivité apicale moins largement rebordée inférieurement, sa pubescence bien apparente, rendant peu distincte la grosse ponctuation ⁽²⁾; les tubercules marginaux des deux paires supérieures émoussés au sommet, ceux de la paire inférieure plus grands, très pointus.


♂ Dernier segment apparent de l'abdomen à peine plus long que le



297



298



299

Fig. 297 à 299. —
Forme des tubercules
de la déclivité apicale
chez les *Xylobiops*
basilaris (fig. 297),
concisus (fig. 298) et
sextuberculatus (fig.
299). La déclivité est
vue de dessus, sui-
vant son plan.

(1) Bibliographie : G.-H. Horn, *Proc. Ent. Soc. of Philad.*, vol. 1, 1861, n° 1, p. 29. — T.-W. Harris, *A Treatise on some of the Ins. inj. to vegetation*, 2^e éd., 1862, p. 92. — C.-V. Riley, *Fourth Ann. Rep. of the nox., ben. and oth. Ins. of Missouri*, 1872, p. 53-54, fig. — F.-M. Webster, *Ins. Life*, I, 1888, n° 5, p. 162. — E.-A. Schwarz, *Proc. ent. Soc. of Washington*, I, 1890, p. 177. — A.-S. Packhard, *Ins. inj. to for. and shade trees*, 1890, p. 296.

(2) Ces points enfoncés sont d'ailleurs moins gros que chez le *basilaris* ♀.

précédent. Points enfoncés de la déclivité apicale localisés dans la région tout à fait supérieure de celle-ci.

♀ Dernier segment apparent de l'abdomen plus de deux fois aussi long que le précédent. Grosse ponctuation de la déclivité apicale s'étendant sur presque toute la longueur de celle-ci.

Distribution géographique. — Venezuela et Colombie (¹).

Forme voisine insuffisamment connue. — On trouve en Colombie (²) une forme extrêmement voisine de la précédente, un peu plus allongée, avec la déclivité apicale un peu plus fortement ponctuée, un peu convexe inférieurement et dont les tubercules marginaux sont plus épais que chez le *concisus*. Le dernier article des antennes, comparé à celui de cette dernière espèce, est un peu plus large. Par sa grandeur, le dernier segment abdominal, qui est brun, semble indiquer que l'unique individu examiné est un ♀. — Long. 4 1/3 mill.

Xylobiops parilis n. sp.

(Voir tabl. des espèces 1, 3, 5).

Long. 4-4 1/2 mill. — Ressemble beaucoup au *X. concisus*. On l'en distingue à sa pubescence frontale à peine apparente, à son prothorax non élargi en arrière, à ses élytres dont le bord latéral est brun dans toute sa longueur. La déclivité apicale est un peu moins large que chez le *concisus* par suite d'un léger empiètement des tubercules marginaux sur son plan. La longueur de la portion visible du dernier segment abdominal est, chez la ♀, à peu près triple de celle du segment précédent (³).

Distribution géographique. — Mexique; Basse-Californie (⁴).

(1) Cumana (*Coll. de Marseul*), 7 indiv. ♂ ♀; Colombie (*Coll. Thorey > Oberthür*), une ♀.

(2) Rostaine in *Coll. Fairmaire*, un individu probablement ♀.

(3) Le dernier segment se prolonge en outre de chaque côté, à son bord antérieur, dans la cavité abdominale, en deux larges lobes qui atteignent en avant le bord antérieur du segment précédent. Les mêmes lobes ne sont représentés que par de faibles rudiments chez la ♀ du *X. concisus*. C'est surtout cette particularité qui nous a décidé à séparer spécifiquement les deux formes, dont les caractères extérieurs peuvent sembler bien faibles.

(4) Mexique (*J. Flohr in Musée de Berlin*), 1 indiv.; Guanajuato (*Dugès in Muséum de Paris*), une ♀; Basse-Californie (*Diguet in Muséum de Paris*); une ♀.

Xylobiops texanus *.

(Voir tabl. des espèces 6, 7).

Horn, 1878, *Proc. Am. phil. Soc.*, XVII, p. 543.

Long. 3 1/3-4 mill. — Cette espèce est très voisine de la suivante, *X. sextuberculatus* Lec. Comme chez celle-ci la forme générale du corps est plus courte que chez les espèces décrites plus haut. La coloration est rousse ou roux brunâtre, avec la tête, le prothorax et l'extrémité des élytres souvent plus foncés. Elle diffère du *sextuberculatus* par les caractères suivants :

Front bidenticulé entre les yeux dans les deux sexes ⁽¹⁾. Milieu de l'aire postérieure du pronotum couvert de petites saillies cunéiformes plus fines et un peu plus denses que chez le *sextuberculatus*. Déclivité apicale des élytres un peu plus abrupte et montrant de chaque côté, dans sa région supérieure, quelques gros points enfoncés, parfois presque obsolètes ⁽²⁾.

♀ Dernier segment apparent de l'abdomen obtusément angulé en arrière, brun à la base, divisé en deux parties par une sorte de fausse suture transverse, arquée. L'illusion est produite par une rangée assez nette de poils couchés, courts et serrés, au delà de laquelle le segment est roux et légèrement déprimé.

Distribution géographique. — États-Unis orientaux ⁽³⁾; La Jamaïque ⁽⁴⁾.

Un exemplaire du Musée de Bruxelles provenant de Guanajuato (*E. Dugès*) appartient vraisemblablement à cette espèce.

(1) Les deux denticules frontaux existent chez tous les individus (au nombre de dix) que nous avons examinés, et parmi eux se trouvent certainement plusieurs ♂, reconnaissables à l'absence de toute différenciation du dernier segment abdominal; mais la détermination sexuelle rigoureuse n'a pu être faite que pour deux ♀.

(2) On n'en observe quelquefois qu'un ou deux de chaque côté.

(3) Environs de Washington, d'après E.-A. Schwarz (*Ins. Life*, I, 1888, p. 162; *Proc. ent. Soc. of Washington*, I, 1890, p. 177). Texas (*G.-W. Belfrage in Coll. Bedel et Coll. Oberthür*; *Muséum de Paris*; *Musée de Gènes*); Texas sud-occidental (*G.-H. Horn*).

(4) D'après G.-H. Horn, *in litteris*. Nous avons quelques doutes sur l'exactitude de ce renseignement.

Gorham (*Biol. Centr.-Am., Col.*, III, 2, p. 353) parle d'un *Xylopertha sextuberculata* provenant d'Almolonga (Mexique) et dont la déclivité apicale serait « strongly punctured ». Il s'agit vraisemblablement du *Xylobiops texanus*.

Xylobiops sextuberculatus.

(Voir tabl. des espèces 6, 8. — Fig. 299 et 300 du texte).

Leconte, 1858, *Proc. Acad. Philad.*, 1858, p. 73. — Horn, 1878, *Proc. Am. phil. Soc.*, XVII, p. 543. — Gorham, 1883, *Biol. Centr.-Am.*, Col., III, part. 2, p. 216; id., 1886, *loc. cit.*, *suppl.*, p. 353 ⁽¹⁾.

Long. 3-4 1/2 mill. — Assez court, parallèle. Brun, avec le prothorax teinté de roussâtre et la moitié antérieure des élytres (sauf le bord latéral) d'un roux obscur; antennes, palpes et pattes roux; tibias antérieurs bruns. Pubescence du dessus de la tête peu apparente, celle



Fig. 300. — Les deux derniers segments apparents de l'abdomen chez le *Xylobiops sextuberculatus* ♀. m, portion latérale membraneuse.

située au-dessous des denticules frontaux rebroussée vers le haut. Denticules frontaux disposés en ligne transverse, généralement au nombre de quatre. Dernier article des palpes maxillaires un peu plus long que le précédent. Prothorax légèrement transverse, régulièrement arqué sur les côtés, la dent de l'angle antérieur insérée à distance du bord. Milieu de l'aire postérieure du pronotum râpeux en avant et montrant en arrière de fins reliefs cunéiformes. Ponctuation des élytres assez fine et assez dense, non renforcée près des bords de la déclivité apicale. Nervure suturale non saillante dans sa région scutellaire. Déclivité apicale aussi longue que la partie dorsale des élytres, finement et densément pubescente, montrant quelques fins points épars; tubercule marginal supérieur plus petit que les deux inférieurs qui sont à peu près également développés et tous deux terminés en épine acérée; rebord inférieur plus large que chez le *concisus*. Suture saillante sur la déclivité.

♂ Denticules interoculaires médians nuls ou rudimentaires et très peu apparents; denticules latéraux très petits. Dernier segment visible de l'abdomen normal, à peine plus long que le précédent.

♀ Front assez fortement quadridenté, les deux dents médianes plus grandes que les latérales. Dernier segment visible de l'abdomen bien plus grand que le précédent et présentant en arrière une large portion

(1) Dans ce travail M. Gorham paraît avoir confondu les *Xylobiops sextuberculatus* et *texanus*. L'espèce à laquelle le même auteur donne le nom de *Xylop. sextuberculata* Lec. dans les *Proc. of the Zool. Soc. of Lond.*, 1898, p. 329, est indubitablement le *Xylometra torquata* F.

médiane brune fortement chitinisée dont le bord postérieur est légèrement retroussé. De chaque côté de cette partie médiane le segment est membraneux ⁽¹⁾.

Cette espèce est sans doute la plus variable du genre. La largeur relative du corps varie chez elle dans des proportions assez considérables. Nous avons déjà parlé des denticules médians du front tantôt absents, tantôt très petits chez le ♂. Le tubercule marginal supérieur de la déclivité est généralement très pointu au sommet; cependant, chez une ♀ de Guanajuato, il est réduit à un tubercule moussu. Rarement la déclivité apicale présente une ponctuation sensible; mais nous avons sous les yeux une ♀ du Mexique où cette région montre quelques assez gros points enfoncés, localisés surtout en dessous du niveau du tubercule marginal inférieur.

Distribution géographique. — Californie méridionale, Basse-Californie, Arizona, Mexique ⁽²⁾.

Xylobiops floridanus.

Horn, 1885, *Trans. Am. Ent. Soc.*, XII, p. 155.

Cette espèce ne nous est connue que par la description de Horn. Il semble bien qu'elle fasse partie du genre actuel ⁽³⁾; mais ses caractères distinctifs n'ont pas été suffisamment précisés.

Description originale : « *Sinoxylon floridanum* n. sp. — Cylindrical, piceous, moderately shining, elytra castaneous. Antennae pale yellow, 10-jointed, the five joints of the female very small. Head closely punctate, subopaque. Thorax broader than long, slightly narrower in front, declivity in front roughly tuberculate and with the tubercles at the front angles slightly hooked, disc at middle closely punctate, posteriorly and at the hind angles quite smooth. Elytra a little narrower than the thorax, moderately coarsely but

(1) Chez les individus desséchés cette membrane est ployée en dedans, en sorte que le dernier segment paraît échancré sur les côtés. En même temps la portion du lobe médian située en arrière de la carène transverse se trouve repliée en dessus.

(2) Désert du Colorado (Californie méridionale) (*Leconte*) : Fort Yuma (*G.-H. Horn*). Basse-Californie (*Xanthus* sec. *Leconte*) ; Arizona (*Morrison in Coll. Oberthür*). Mexique (*Muséum de Paris*) : Guanajuato (*E. Dugès in Muséum de Paris et Coll. Bedel*).

Pour les localités de la *Biologia Centrali-Americana* voir la note 4 de la page 511 et la note de la page 512.

G.-H. Horn présume que l'espèce vit dans un « Mesquit » (*Prosopis* sp.).

(3) M. Casey la range comme nous dans le genre *Xylobiops*.

not closely punctate, declivity flat, on each side trituberculate, the surface coarsely and evenly punctate. Body beneath sparsely punctate and pubescent. — Length... 3 mm.

« This species is related to and should be associated with *texanum* and *sextuberculatum*. In the former the punctures of the declivity are few in number and arranged near the suture, leaving a smooth space near the tubercles. In the second species the declivity is quite smooth and the suture well elevated. In the present species the declivity is very flat and the coarse punctures very evenly disposed over its entire surface. »

Distribution géographique. — Floride (1); La Jamaïque (2).

Genre **Xyloblaptus** n. g.

(Voir tabl. des genres 1, 2, 10, 11, 13).

Front simple, non explané ni pourvu d'une couronne de soies dressées. Bord antérieur de l'épistome denté de chaque côté de la base du labre. Mandibules toutes deux pointues au sommet. Yeux fortement détachés des tempes. Antennes de dix articles, les articles 3-7 pris ensemble presque aussi longs que le 8°; articles de la massue sans revêtement de poils dressés, présentant chacun, sur chaque face, deux grandes dépressions parfaitement délimitées. Prothorax sans suture latérale. Déclivité apicale des élytres munie de chaque côté de deux tubercules submarginiaux et présentant un léger rebord inférieur. Sillon marginal des élytres non brusquement abrégé en arrière, mais passant, en s'atténuant, sur la déclivité apicale. Tibias antérieurs normaux.

♂ Dernier segment apparent de l'abdomen simple.

♀ Les quatre premiers segments apparents de l'abdomen plus courts que chez le ♂, le cinquième très agrandi et profondément échancré au milieu.

Genre américain comme les précédents et apparenté surtout aux *Xylobiops*. On n'en connaît encore qu'une seule espèce.

Xyloblaptus quadrispinosus.

(Fig. 301 et 302 du texte).

Leconte, 1866, *New. Spec. of N.-Am. Col.*, I, p. 100. — Horn, 1878, *Proc. Am. phil. Soc.*, XVII, p. 543 (3).

(1) F.-G. Schaupp, d'après Horn; exemplaire type.

(2) J. Hamilton sec Schwarz (*Proc. ent. Soc. Washington*, I, 1890, p. 177).

(3) Le « *Xylopertha quadrispinosa* Lec. » de la *Biologia Centrali-Ame-*

Long. 3-4 mill. — Parallèle, brun, modérément brillant, avec la base des élytres et celle du prothorax rousses ou roussâtres; antennes, labre, palpes et pattes roux. Front granuleux ou râpeusement ponctué, couvert d'une pubescence rebroussée vers le haut, l'épistome presque glabre et simplement ponctué. Yeux de grandeur médiocre. Prothorax un peu transverse, rétréci tout à fait en avant, ses côtés parallèles ou presque parallèles en arrière; aire suscéphalique brillante, finement et peu densément ponctuée; dents de la râpe mêlées de denticules, la dent antéro-latérale un peu écartée du bord. Marques cunéiformes du milieu de l'aire postérieure du pronotum fines, assez denses. Ponctuation dorsale des élytres dense et assez fine, la moitié antérieure du dos des élytres glabre et brillante, la moitié postérieure et la déclivité mates et couvertes d'une pubescence couchée très courte. Déclivité apicale imponctuée, munie de chaque côté, en dedans de son bord externe, de deux tubercules assez gros, mamilliformes, avec la suture très légèrement saillante et un rebord inférieur faible, non détaché latéralement du bord même de l'élytre. Bord inféro-apical des élytres lisse. Face externe des tibias postérieurs avec de longues soies.



302



301

Fig. 301 et 302. — *Xyloblaptus quadrispinosus*. Déclivité apicale, vue de trois quarts (fig. 301) et abdomen de la femelle, vu en dessous, de trois quarts (fig. 302).

♂ Corps notablement plus court que celui de la ♀. Pilosité frontale couchée, plus courte que chez la ♀. Denticules frontaux très petits ou nuls. Dernier segment apparent de l'abdomen grand, presque aussi long que les deux précédents réunis, simple, les segments 2-4 aussi longs sur la ligne médiane que sur les côtés.

♀ Corps assez allongé. Front bidenté en arrière et couvert d'une pilosité rousse mi-dressée, assez longue, rebroussée vers le haut. Les quatre premiers segments apparents de l'abdomen plus courts au milieu que sur les côtés; le cinquième très grand, plus long que les précédents réunis, mat, glabre, et couvert de très fins granules contigus qui le font paraître comme poreux, son bord postérieur profondément en-

ricana est une espèce toute différente de celle de Leconte, mais appartenant peut-être au même genre. Ses téguments sont très brillants, son prothorax élargi et ventru en arrière, sa déclivité apicale obsolètement ponctuée et bordée de tubercules terminés en pointe acérée.

taillé par une échancrure médiane qui s'avance jusqu'au voisinage de la base (fig.).

Distribution géographique. — Arizona et Basse-Californie (1).

Genre **Xylionulus** n. g.

(Voir tabl. des genres 1, 2, 10, 14, 15).

Front simple, convexe, sans soies dressées ni carène transverse, très faiblement déprimé entre les yeux. Épistome très légèrement échancré en arc de cercle à son bord antérieur sur une largeur égale à celle du labre. Mandibules normales, toutes deux pointues au sommet. Yeux bien détachés des tempes. Antennes de dix articles, les articles 3-7 pris ensemble un peu plus longs que le 8^e; premier et deuxième articles de la massue à

Fig. 303 — Antenne du *Xylionulus transvena* ♀, vue par la face antérieure.

peine transverses, munis chacun, sur chaque face, de deux grandes dépressions parfaitement délimitées (2). Prothorax subcarré, tronqué en avant, dépourvu de suture latérale. Stigmates de la première paire très grands, latéraux. Déclivité apicale des élytres bidentée de chaque côté au bord supérieur. Tibias antérieurs normaux, les postérieurs sans soies dressées en dehors. 2^e article des tarses postérieurs beaucoup plus long que le dernier.

♂ Pièces pleurales du dernier segment apparent de l'abdomen bien développées.

♀ Bord apical des élytres échancré et lobé. Dernier segment apparent de l'abdomen échancré au milieu, le pénultième profondément impressionné et échancré en arrière; les autres segments normaux.

Genre sud-africain apparenté aux *Xylion*. L'une des espèces a été transportée au Brésil où elle paraît s'être acclimatée.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1-2 — ♀ Bord externe de l'élytre échancré au tournant postérieur (fig. 308); bord inféro-apical bidenté (fig. 304,

(1) Arizona (G.-H. Horn in *Muséum de Paris*; Morrison in *Coll. Oberthür*); Cap San Lucas (Leconte).

(2) Elles sont quelquefois fusionnées en une seule qui est très large. Le dernier article de la massue n'a pas de grandes dépressions à contour accusé.

308). Dernier segment de l'abdomen présentant au milieu de son bord postérieur une échancrure profonde dont les bords sont relevés et saillants (fig. 305). — ♂ Bord inférieur de la déclivité apicale légèrement renflé en bourrelet. Bord inféro-apical des élytres faiblement unidenté de chaque côté; angle sutural non lobé. — Long. 3-4 1/2 mill. **X. transvena** Lesn.

2-1 — ♀ Bord externe de l'élytre sans échancrure au tournant postérieur (fig. 309); bord inféro-apical portant un lobe infléchi, bifide ou non (fig. 306, 309); angle sutural lobé. Dernier segment de l'abdomen sans profonde échancrure, mais comme bilobé au milieu du bord postérieur (fig. 307). — ♂ Bord inférieur de la déclivité apicale nullement renflé en bourrelet; dent du bord inféro-apical des élytres plus forte; angle sutural en forme de lobe. — Long. 3-4 1/2 mill. **X. pusillus** Fähr.

Xyllionulus transvena*.

(Voir tabl. des espèces 1. — Fig. 303 à 305 et 308 du texte).

Lesne, 1900, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIV, p. 426.

Long. 3-4 1/2 mill. — Allongé, parallèle; d'un fauve testacé brillant, avec la tête et la région de la râpe prothoracique rembrunies et la déclivité apicale des élytres brune; appendices roux; tibias brunâtres. Front granuleux en arrière, légèrement déclive et finement ponctué au bord antérieur. Épistome densément ponctué. Suture fronto-clypéale bien marquée. Prothorax à peine plus large que long, très légèrement élargi en arrière du milieu; dents de la râpe mêlées de denticules, la dent antéro-latérale insérée au bord même; aire suscéphalique finement ponctué. Milieu de l'aire postérieure du pro-




Fig. 304 à 307. — Bord apical des élytres et derniers segments de l'abdomen chez les femelles des *Xyllionulus transvena* (fig. 304 et 305) et *pusillus* forme type (fig. 306 et 307).

notum marquée d'une ponctuation très fine, râpeuse en avant, simple en arrière. Élytres près de deux fois et demie aussi longs que larges, densément et assez finement ponctués, sauf en arrière, près des bords de la déclivité apicale où la ponctuation est à la fois forte et très serrée. Déclivité apicale un peu concave, fortement et assez densément ponctuée dans ses deux tiers supérieurs; dent interne du bord supérieur plus petite que l'externe; bord latéral de la déclivité formant une côte atténuée au milieu et épaissie dans sa partie inférieure. Suture renflée sur la déclivité en un bourrelet lisse et brillant. Abdomen finement ponctué, peu densément pubescent.

♂ Déclivité apicale plus excavée que chez la ♀, avec la suture plus saillante. Bord externe de l'élytre non échancré au tournant postérieur. Bord inférieur de la déclivité légèrement renflé en un bourrelet qui fait suite à la côte marginale externe. Bord inféro-apical de chaque élytre faiblement unidenté. Angle sutural non lobé. Dernier segment de l'abdomen avec deux larges pièces pleurales entre lesquelles le bord postérieur du sternite est légèrement échancré.

♀ Bord externe de l'élytre échancré au tournant postérieur; bord inféro-apical bidenté, la dent externe large, arrondie. 4^e segment abdominal échancré et fortement impressionné triangulairement au milieu du bord postérieur; 5^e segment avec une échancrure médiane profonde, arrondie, dont les bords sont relevés, saillants.

Tantôt la déclivité est fortement ponctuée dans toute sa région supérieure, tantôt elle est lisse au-dessus du niveau de la dent marginale externe. Ce caractère est seulement individuel.

Distribution géographique. — Guinée méridionale et Afrique du Sud ⁽¹⁾. Brésil oriental ⁽²⁾.

Xylionulus pusillus*.

(Voir tabl. des espèces 2. — Fig. 306, 307 et 309 du texte).

Fåhræus, 1872, *Öfv. Vet.-Akad. Förh.*, 1871, p. 667 (♀) ⁽³⁾.

(1) Congo belge : Kinchassa (Stanley-Pool) (*Waelbroeck* in *Musée de Bruxelles et Muséum de Paris*), 8 indiv. ♂ ♀ pris le soir aux lumières. Loanda (*Coll. Fairmaire*), 1 ♂. Colonie du Cap et notamment Cape-Town (*Péringuey* in litt.; *Musée de Cape-Town*) ♂ ♀.

(2) État de Pernambuco : Pery Pery (*E. Gounelle*), 1 ♂; État de Bahia : Cidade de Conderiba (San Antonio da Barra) (*E. Gounelle*), 2 ♀. En outre un exemplaire ♂ trouvé par M. A. Grouvelle dans les tabacs de provenance brésilienne (*Coll. Bedel*). — Tous ces spécimens sont également typiques.

(3) *Apate ustulata* Dejean, *Cat.*, 3^e éd., p. 334 (♂).

Cette espèce, extrêmement voisine de la précédente, en diffère par les caractères mentionnés ci-après :

♂ Déclivité apicale des élytres nullement rebordée inférieurement. Dent du bord inféro-apical des élytres assez allongée, infléchie subverticalement. Angle sutural en forme de lobe.

♀ Bord externe des élytres non échancré au tournant postérieur; bord inféro-apical portant un lobe plus ou moins nettement bifide. Angle sutural nettement lobé. 4^e segment abdominal impressionné et échancré comme chez le *transvena*; le 5^e marqué en avant d'une impression médiane faisant suite à celle du segment précédent, et présentant au milieu du bord postérieur une échancrure dont le pourtour est réfléchi comme chez le *transvena*, mais qui est beaucoup moins profonde, en sorte que ce bord postérieur a plutôt l'apparence d'être bilobé au milieu.

On trouve à Madagascar une forme dont la femelle diffère de celle de l'espèce actuelle seulement par le lobe du bord inféro-apical des élytres simple au lieu d'être bifide et par le redressement de toute la région médiane du bord postérieur du dernier segment abdominal, les bords de l'échancrure n'étant plus en saillie sur cette portion réfléchie.

La ponctuation de la déclivité apicale des élytres varie chez le *X. pusillus* comme chez le *transvena*.

Distribution géographique. — Afrique australe; Madagascar (*var. aut sp. aff.*) ⁽¹⁾.

Genre *Xylocis* n. g.

(Voir tabl. des genres 1, 2, 10, 14, 16, 17, 18).

Tête régulièrement convexe en dessus. Front simple, sans couronne

(1) Cap de Bonne-Espérance (*Coll. Dejean; Coll. Laferté; Gritsch in Coll. Oberthür; Coll. Thorey > Oberthür*); Afrique australe (*Drège in Muséum de Paris et Coll. Oberthür*). Cafrerie (*J. Wahlberg in Musée de Stockholm*). Dunbrody (Port Elisabeth) (*Coll. Bedel*) 1 ♀.

var. aut sp. aff. : Nossi-Bé (*Pierron in Muséum de Paris*) 1 ♀.



308



309

Fig. 308 et 309. — Déclivité apicale des élytres, vue de trois quarts, chez les femelles des *Xylionulus transvena* (fig. 308) et *pusillus*, forme de Madagascar (fig. 309).

de soies dressées. Bord antérieur de l'épistome faiblement échancré en arc de cercle au milieu et obtusément angulé de part et d'autre de cette échancrure, un peu en dedans des côtés du labre. Mandibules dyssymétriques, celle de droite moins pointue au sommet. Antennes de dix articles, les articles 3-7 pris ensemble plus longs que le 8^e; massue bicoudée, composée de 3 articles épais, assez courts, légèrement transverses, sans grandes dépressions ni groupes serrés de pores. Prothorax dépourvu de suture latérale. Élytres inermes et sans tubercules, nettement tronqués en arrière. Tibias antérieurs normaux.




Fig. 340. — Antenne du *Xylocis tortilicornis* ♀, vue par la face externe (supérieure).

♂ Déclivité apicale des élytres simple. Dernier segment apparent de l'abdomen bordé de larges pièces pleurales.

♀ Région de l'angle apical des élytres séparée du reste de la déclivité par une carène oblique. Dernier segment apparent de l'abdomen largement tronqué et frangé de longues soies au bord postérieur.

Genre indien représenté par une espèce unique mais fort curieuse.

***Xylocis tortilicornis* n. sp.**

(Fig. 340 à 345 du texte).

Long. 2 1/2-2 3/4 mill. (1). — Allongé, parallèle, très légèrement élargi en arrière, d'un fauve clair avec la poitrine et l'abdomen parfois plus foncés et les élytres rembrunis à l'apex. Antennes rousses, à part l'article moyen de la massue qui est brun. Tibias antérieurs brunâtres. Front densément et finement râpeux. Suture fronto-clypéale fortement enfoncée au milieu. Yeux gros, bien détachés des tempes. Massue antennaire bicoudée et comme enroulée en avant sur elle-même, son premier article normalement convexe sur sa face postérieure, excavé au contraire sur sa face antérieure; la portion concave, occupant à peu

(1) Voici la taille exacte et les dimensions du prothorax et des élytres de la femelle typique appartenant au Muséum de Paris : longueur du corps prise du bord antérieur du prothorax à l'extrémité des lobes apicaux des élytres 2,71 mill.; longueur du prothorax 0,81 mill.; largeur maxima du prothorax 0,92 mill.; largeur des élytres au tiers antérieur 0,95 mill.; largeur maxima des élytres prise près de l'apex 0,99 mill.

près la moitié de cette face, s'étend jusqu'aux bords apical et interne de l'article, et elle est limitée d'autre part par une ligne oblique qui figure assez bien la diagonale joignant l'angle apical externe à l'angle basilaire interne de l'article. Bord interne du premier article de la massue aminci et coupant; 2^e article plus fortement chitinisé que les deux autres, plus épais vers la base qu'à l'apex, membraneux sur sa tranche apicale; 3^e article de forme normale, fortement chitinisé près de la base, presque membraneux à l'apex et montrant une ligne arquée obscure, concentrique par rapport au contour apical de l'article (1). Prothorax un peu transverse, tronqué au bord antérieur, faiblement arqué sur les côtés, légèrement élargi en arrière et arrondi aux angles postérieurs; dent de l'angle antérieur insérée au bord même, un peu uncinée; dents de la râpe mêlées de denticules. Sculpture de l'aire postérieure du pronotum réduite à quelques petits reliefs épars, cunéiformes, pointus en avant, et localisés dans la partie médiane, sur une faible largeur. Écusson petit. Élytres inermes et sans nervures en saillie, leur ponctuation dorsale dense, assez forte (2). Déclivité apicale plus nettement et plus fortement ponctuée que le dos des élytres et bordée d'une mince carène sur presque tout son pourtour. Suture saillante mais non renflée en bourrelet sur la déclivité. Pubescence de l'abdomen extrêmement fine et peu dense; pas de ponctuation abdominale apparente. Tibias postérieurs sans longues soies à la face externe.

♂ Dernier segment de l'abdomen arrondi en arrière, ses pièces pleurales largement apparentes sur les côtés et en arrière, logées chacune dans une échancrure latérale du sternite; ce dernier est par suite comme




Fig. 311 et 312. — *Xylocis tortilicornis* ♂. Contour dorsal et extrémité postérieure du corps, vue en dessous.

(1) Il y aurait lieu d'examiner à nouveau cette ligne obscure, indice probable d'un mode de groupement particulier des organites sensoriels. Nous n'avons pu faire cette recherche sur les deux spécimens que nous avons eus sous les yeux.

(2) Également marquée dans toute la longueur chez l'individu ♀, presque obsolète en arrière chez le ♂.

prolongé en arrière en un lobe tronqué. Élytres conjointement arrondis à l'apex. Déclivité apicale lisse et imponctuée dans son tiers inférieur. Angle sutural des élytres simple. Bord inféro-apical des élytres conformé en faux-épipleure ⁽¹⁾.

♀ Dernier segment apparent de l'abdomen largement tronqué en ar-




Fig. 313 à 315. — *Nylocis tortilicornis* ♀. Déclivité apicale, vue de derrière (fig. 313); bord apical des élytres, vu de dessus (fig. 314); extrémité postérieure du corps, vue de profil (fig. 315).

rière, son bord postérieur abondamment frangé de longues soies renflées au bout. Sous cette frange émergent les sommets amincis en pointe de deux lames chitineuses dépendant du 8^e urite et dont le bord externe porte de longues soies renflées au bout. Au niveau du tiers inférieur de la déclivité, le bourrelet sutural s'écarte obliquement de la suture en s'épaississant et atteint presque, latéralement, le bord inférieur de la déclivité, délimitant ainsi une surface triangulaire privée de bourrelet sutural et dont la surface est brillante et imponctuée. Angle apical des élytres fournissant deux lobes aplatis, dirigés horizontalement, finement denticulés sur les bord. Bord inféro-apical des élytres coupant, non conformé en faux-épipleure.

(1) Les tarsi antérieurs sont frangés au côté interne de soies blondes qui paraissent plus longues chez le ♂.

Distribution géographique. — Ceylan (1).

Genre **Xylodrypta** n. g.

(Voir tabl. des genres 1, 2, 10, 14, 16, 17, 19, 20).

Front simple, convexe, sans soies dressées. Épistome légèrement échancré au milieu de son bord antérieur sur une largeur correspondant à celle du labre. Mandibules toutes deux pointues au sommet. Yeux gros, fortement détachés des tempes. Antennes de dix articles, les articles 3-7 pris ensemble un peu moins longs que le premier de la massue; articles 1 et 2 de la massue non ou à peine transverses, privés de grandes dépressions. Prothorax subtrapézoïde, fortement rétréci en avant, dépourvu de suture latérale, prolongé aux angles antérieurs en deux cornes infléchies uncinées au bout. Élytres trituberculés de chaque côté aux bords supérieur et latéraux de la déclivité apicale; bord inféro-apical non conformé en faux-épipleure. Face externe des tibias antérieurs fortement sillonnée, non rétrécie vers l'apex. Tibias postérieurs sans soies dressées en dehors.

♂ Dernier segment apparent de l'abdomen muni de pièces pleurales formant de chaque côté un large bourrelet marginal parvenant en arrière jusqu'au voisinage de la ligne médiane.

Genre indien, remarquable surtout par la présence de véritables cornes prothoraciques, semblables à celles des mâles hétéromorphes des *Bostrychopsis* et des *Schistoceros* proprement dits. Ce type paraît se rapprocher surtout des *Xylion*.



Fig. 316 et 317. — *Xylodrypta bostrychoides* ♂. Tête et partie antérieure du prothorax, vues de trois quarts, et déclivité apicale, vue de profil.


Xylodrypta bostrychoides n. sp. (♂).

(Fig. 316 à 318 du texte).

Long. 7 mill. — Allongé, parallèle, d'un brun rougeâtre avec les an-

(1) Musée de Berlin et Muséum de Paris. Nous avons eu sous les yeux un spécimen de chaque sexe.

tennes et les cuisses rousses. Épistome finement ponctué. Front finement et densément rugueux en avant. Suture fronto-clypéale bien marquée, fine sur les côtés, fovéiforme au milieu. Prothorax moins long que large à la base, subtrapézoïde, plus de deux fois aussi large



à la base qu'entre les cornes antérieures, ses côtés modérément arrondis; aire suscéphalique ponctuée et râpeuse; dents de la râpe mêlées de denticules. Aire postérieure du pronotum légèrement gibbeuse au milieu en arrière, ornée d'une sculpture dense et bien marquée simulant des écailles acuminées en avant. Élytres environ trois fois aussi longs que le prothorax, densément et assez finement ponctués à la base, très fortement et densément sur le reste de leur surface. Déclivité apicale munie de chaque côté, aux bords supérieur et supéro-latéraux, de trois tubercules mousses dont l'inférieur est le plus gros, et [présentant en outre un rebord inférieur; angle sutural réfléchi, subarrondi. Suture saillante sur la déclivité. Sillon marginal des élytres brusquement abrégé avant l'apex; bord inféro-apical des élytres simple, très obtusément angulé. Pubescence de l'abdomen extrêmement fine, ne masquant pas le tégu-
ment. 2^e et 3^e articles des tarsi postérieurs subégaux, le 3^e deux fois aussi long que le 4^e.

Fig. 318. — *Xylo-drypta bostrychoides* ♂.

♂ Bord postérieur du dernier segment abdominal tronqué entre les extrémités des pièces pleurales.

Distribution géographique. — Assam : Monts Khasia, en juillet (Coll. Rothschild > Oberthür). — Type unique ♂.

Genre *Xylodeleis* n. g.

(Voir tabl. des genres 1, 2, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23).

Front régulièrement convexe, très faiblement déprimé en arrière, sans soies dressées ⁽¹⁾. Bord antérieur de l'épistome légèrement échancré au milieu sur la largeur correspondant à la base du labre. Mandibules toutes deux pointues au sommet. Yeux gros, bien détachés

(1) A part une ou deux soies latérales, situées au voisinage du bord interne de l'œil.

des tempes. Antennes de dix articles, les articles 3-7 pris ensemble presque aussi longs que les deux premiers réunis et plus longs que le premier article de la massue; articles 8 et 9 transverses, densément et uniformément pubescents, munis chacun, sur chaque face, de deux légères impressions préapicales dont le fond est garni de pores sensoriels très serrés, mais qui ne présentent aucune limite nette.



Fig. 319. — Antenne du *Xylodeleis obsipa* ♂, vue par la face antérieure.

Prothorax sans suture latérale, inerme le long de son bord antérieur. Stigmates de la première paire très grands, latéraux. Déclivité postérieure marginée sur une grande partie de son pourtour. Bord inféro-apical des élytres conformé en faux-épipleure. Tibias antérieurs normaux, sillonnés à la face externe.

♂ Pièces pleurales du dernier segment de l'abdomen bien apparentes.

♀ Dernier segment abdominal échancré au bord postérieur, sans pièces pleurales apparentes.

Ce genre renferme une seule espèce, originaire d'Australie, et assez voisine des *Xylopertha* proprement dits.

***Xylodeleis obsipa*.**

(Fig. 40 et 319 à 323 du texte).

Germar, 1848, *Linn. Ent.*, III, p. 222.

rufescens Murray, 1867, *Ann. and Mag. of Nat. Hist.*, XX, p. 94 (*Col. Old Cal.*, 1878, p. 117) ⁽¹⁾.

serratus A.-M. Lea, 1893, *Proc. Linn. Soc. of New South Wales*, 2^e sér., VIII, p. 317.

subcostatus A.-M. Lea, 1893, *loc. cit.*, p. 317.

retusus A.-M. Lea, 1893, *loc. cit.*, p. 320 ⁽²⁾.


Long. 3-6 mill. — Allongé, parallèle, d'un rouge ou d'un roux bru-

(1) Nous n'avons pas vu le type de Murray; mais nous considérons cette synonymie comme extrêmement probable.

(2) Nous avons pu examiner, grâce à l'obligeance de M. Lea, des individus des trois formes considérées d'abord comme distinctes par l'entomologiste australien.

nâtre plus foncé sur la tête; front et épistome rougeâtres; parties postérieures des élytres souvent brunes; poitrine, abdomen, antennes, palpes et pattes roux, les cuisses plus claires. Suture fronto-clypéale bien marquée, fovéiforme au milieu. Épistome assez finement et assez

320



322

323

321

Fig. 320 à 323. — *Nylodeleis obsipa*. Profil dorsal de la ♀ (fig. 320); extrémité des élytres, vue en dessus, chez le ♂ (fig. 321) et chez la ♀ (fig. 322); extrémité de l'abdomen ♀ (fig. 323).

densément ponctué. Ponctuation du front assez fine, un peu râpeuse. Prothorax subcarré, ses côtés parallèles en arrière ou légèrement arrondis; dents de la râpe mêlées de denticules. Aire suscéphalique finement râpeuse, mal délimitée. Aire postérieure du pronotum finement ponctué au milieu. Ponctuation des élytres forte et assez dense près de la base, devenant graduellement plus forte et plus serrée en arrière, grossière et confluyente près du bord de la déclivité apicale, très forte mais non confluyente sur cette dernière. Déclivité apicale bordée sur la plus grande partie de son pourtour par une carène qui, vue de profil, décrit vers le milieu de la hauteur de la déclivité, une courbe faisant saillie en arrière (fig. 320). La suture est élevée sur la déclivité et celle-ci présente un large rebord inférieur. Abdomen très finement et très densément ponctué, sa pubescence très fine, ne masquant pas le tégument. Tibias postérieurs sans soies dressées au côté externe.

♂ Élytres légèrement rétrécis vers l'apex, l'angle sutural non saillant. Déclivité apicale brillante et faiblement pubescente. Bord antérieur du faux-épipleure muni d'une dent obtuse située à distance de la suture. Dernier segment apparent de l'abdomen régulièrement arrondi en arrière.

♀ Élytres légèrement élargis jusqu'au niveau des bord latéraux de la déclivité apicale et conjointement angulés à l'apex. Déclivité postérieure mate, un peu moins densément ponctuée que chez le ♂ et couverte d'une pilosité rousse plus apparente, sa carène marginale plus longue et plus saillante. Bord antérieur du faux-épipleure bituberculé de chaque côté près de l'angle sutural. Dernier segment apparent de l'abdomen biimpressionné à la base et échancré au milieu du bord postérieur.

La ponctuation du milieu de l'aire postérieure du pronotum est variable, plus ou moins fine, plus ou moins dense, râpeuse ou non. Chez le ♂, les élytres sont arrondis conjointement ou séparément au bout et la dent du bord inféro-apical est quelquefois remplacée par un large lobe.

Distribution géographique. — Australie orientale : Queensland, Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Australie du Sud ⁽¹⁾.

Ceylan?

Genre *Xylopertha*.

(Voir tabl. des genres 1, 2, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25).

Guérin-Ménéville, 1845, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1845, *Bull.*, p. xvii.

Corps assez court, oblong. Front simple, convexe, sans soies dressées. Bord antérieur de l'épistome faiblement échancré en arc de cercle




Fig. 324. — Antenne du *Xylopertha picea* ♀.

(1) Cooktown (*Eichhorn in Coll. Oberthür*), Port Denison (*Muséum de Paris; Coll. Bedel*), Port Bowen (*British Museum*). Rockhampton (*Thoret in Muséum de Paris; Coll. Laferté; Coll. de Marseille*); Toowoomba (*Coll. Rothschild > Oberthür*); Tamworth, Gosford, Galston et Sydney (*A.-M. Lea*); Victoria (*Coll. Bedel*); Adélaïde (*German*).

Le type du *Xylopertha rufescens* Murr. provenait de Port-Phillip.

Le Musée de Vienne possède deux femelles de *X. obsipa* étiquetées : Ceylan, *Novara Reise*, 1857-59.

D'après A.-M. Lea (*loc. cit.*, p. 317) il semble que cette espèce vive aux dépens des *Eucalyptus* et qu'elle ait des mœurs nocturnes.

au milieu et nettement angulé de chaque côté de cette échancrure. Mandibules toutes deux pointues au sommet. Yeux fortement détachés des tempes. Antennes de dix articles, les articles 3-7 pris ensemble notablement plus longs que le premier de la massue; articles de la massue sans grandes dépressions sensorielles. Prothorax transverse, assez fortement rétréci en avant, dépourvu de suture latérale et muni de chaque côté d'une dent uncinée, à son bord antérieur. Stigmates de la première paire très grands, latéraux. Déclivité apicale rebordée inférieurement. Bord inféro-apical des élytres conformé en faux-épipleure. Tibias antérieurs normaux, leur face externe non rétrécie vers l'apex. Tarses postérieurs avec de longues soies au côté interne (1).

♂ Dernier segment de l'abdomen entier, sans pièces pleurales apparentes.

♀ Dernier segment abdominal échancré au milieu du bord postérieur. Angle sutural des élytres appendiculé.

Le genre *Xylopertha*, tel qu'il est restreint ici, se trouve être l'un des types les plus moyens de l'ensemble des *Xylopertha s. lat.* Il comprend seulement 3 espèces africaines étroitement apparentées. L'une d'elles est acclimatée dans l'Amérique du Sud.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- 1-2 — Bord latéral de la déclivité postérieure des élytres muni d'un calus; bord supérieur de la même déclivité armé de chaque côté de deux fortes épines terminées en pointe très aiguë (fig. 330). Bord inféro-apical des élytres sans tubercules bien accusés. — ♀ Angle apico-sutural des élytres non conformé en cupule, précédé d'une dent plate insérée au bord inférieur de l'élytre (fig. 332). — Long. ♂ 2/3 - 9 2/3 mill. **X. crinitarsis** Imh.

(1) En outre, les *Xylopertha* présentent en commun les caractères suivants: Suture fronto-clypéale bien marquée, surtout au milieu. Dents de la râpe prothoracique mêlées de denticules. Aire suscéphalique granuleuse. Aire postérieure du pronotum brillante et semée de petits grains râpeux au milieu. Sillon marginal des élytres brusquement abrégé au niveau du bord latéral de la déclivité postérieure. Tibias postérieurs sans longues soies dressées au côté externe.

Le système de coloration est à peu près le même pour les trois espèces, brun roussâtre ou roux teinté de brun en avant du prothorax et dans la partie postérieure des élytres.

- 2-1 — Pas de calus au bord latéral de la déclivité postérieure; celle-ci inerme (fig. 331) ou munie seulement de chaque côté, près du bord supérieur, d'une ou de deux spinules très aiguës mais fort courtes (fig. 329). — ♀ Angles apico-suturales des élytres creusés conjointement en une sorte de cupule : des deux lobes provenant du dédoublement de l'angle apical, l'antérieur porte une mince apophyse au côté interne (fig. 325, 333, 334).
- 3-4 — Bord inféro-apical des élytres fortement tuberculé. Déclivité apicale très rarement inerme. Long. 3 $\frac{1}{2}$ -8 mill. **X. picea** Ol.
- 4-3 — Bord inféro-apical des élytres sans tubercules ou à tubercules à peine marqués. Sculpture des parties postérieures des élytres moins forte que chez le *picea*. Déclivité apicale inerme, plus densément ponctuée que chez le *picea*. Long. 4-5 $\frac{1}{2}$ mill. **X. scutula** n. sp.

Xylopertha picea.

(Voir tabl. des espèces 2, 3. — Fig. 324 à 327, 329 et 333 du texte).

Olivier, 1790, *Enc. Méth., Ins.*, V, p. 110, pl. II, f. 10. — Id., 1795, *Ent.*, IV, n° 77, p. 14, pl. II, f. 10. — Rey, 1887, *Rapp. présenté à la Chambre de Commerce de Lyon par la Commiss. adm. du labor. d'études de la soie* (Tirage à part sous le titre : *Description du Dermestes cada-verinus*, Lyon, 1887, p. 15) (1).

femorata Klug, 1833, *Abhandl. der. Akad. zu Berlin*, XIX, *Physik. Abhandl.*, p. 203. — Id., 1833, *Ber. über eine auf Madag. veranst. Saml. v. Ins. aus d. Ord. Col.*, 1833, p. 115.

cultrata Thomson, 1858, *Arch. ent.*, II, p. 83.

*fumata** Murray, 1867, *Ann. and Mag. of Nat. Hist.*, XX, p. 94 (*Col. Old Cal.*, p. 117).

crinitarsis ± Gerstäcker (non Imhoff), 1871, *Arch. für Naturg.*, XXXVII, 1, p. 57. — Id., 1873, *Decken's Reisen in Ost-Afr.*, III Band, II Abth., p. 161.

(1) C'est à mon savant et érudit collègue M. L. Bedel que je dois la connaissance de cette description de Rey, perdue dans une publication où certes personne ne songerait à la chercher; elle est inexacte en ce qui concerne les tarses.

Heydeni Schilsky, 1899, *Käf. Eur.*, XXXVI, 92 et 36 YY (1).

Long. 3 1/2-8 mill. — Assez court, parallèle, roux fauve, avec la région de la râpe prothoracique et la partie postérieure des élytres généralement rembrunies; appendices roux. Front présentant quelques grains râpeux très fins et une pubescence éparsée à peine apparente. Prothorax assez fortement arrondi sur les côtés; milieu de l'aire postérieure du pronotum marqué de grains râpeux fins et peu denses. Sculpture des élytres constituée, près de la base, par une ponctuation dense et assez fine, mêlée dès le quart antérieur de grains râpeux qui vont grossissant graduellement en arrière, tout en restant de petites dimensions; au voisinage du bord supérieur de la déclivité apicale cette sculpture devient grossière et confluyente. Là aussi les grains râpeux prennent leur maximum de saillie, tandis qu'ils font défaut sur les côtés des élytres et sur la déclivité postérieure. Celle-ci abrupte, nettement délimitée par une carène circulaire interrompue seulement vers le haut au voisinage de la suture, et sculptée seulement de gros points enfoncés partiellement confluentes. Suture épaissie et saillante sur la déclivité, déterminant un bourrelet dont la surface est ponctuée. La pubescence des élytres consiste en poils blonds assez courts et peu denses, couchés, sauf près des bords de la déclivité apicale où ils sont dressés. Bord inféro-apical des élytres plurituberculé. Abdomen très finement et peu densément ponctué, finement pubescent.

♂ Angles apicaux des élytres non ou faiblement disjoints au sommet, non excavés en cupule ni appendiculés.

♀ Angles apicaux des élytres légèrement disjoints et redressés, creusés conjointement en une sorte de cupule incomplète. Deux lobes de l'angle apical de chaque élytre concourent à former cette cupule (fig. 325 et 333) : 1° le lobe postérieur, correspondant au bord inférieur de la déclivité apicale, lobe qui est légèrement écarté de son homologue et légèrement redressé par rapport au plan de la déclivité; 2° le lobe antérieur, correspondant au bord épipleural de l'élytre, et comportant une sorte de dent obtuse, noire et brillante, à la base interne de laquelle s'insère une apophyse digitiforme, généralement un peu plus courte qu'elle et pubescente au sommet. Dernier segment apparent de l'abdomen entaillé au milieu du bord postérieur d'une très

(1) *Apatе frenata* Klug et *A. truncața** Dej. (Dejean, *Cat.*, 3^e éd., p. 334).

petite échancrure dont les angles limitants sont très aigus, dentiformes, convergents ⁽¹⁾.

La forme générale du corps, les dimensions relatives du prothorax, la sculpture des élytres varient d'une façon très sensible chez cette



Fig. 325. — Angle apico-sutural de l'élytre gauche chez le *Xylopertha picea* ♀, vu du côté sutural.



327




Fig. 326 à 328. — Déclivité apicale des élytres, vue de dessus, chez un *Xylopertha picea* ♂ du Sénégal (fig. 326), chez un *X. picea* ♀ de Tunis (fig. 327) et chez un *X. scutula* ♀ (fig. 328).

espèce. Les petits grains râpeux de la région dorsale des élytres remontent parfois le long de la suture jusqu'àuprès de l'écusson; la ponctuation des parties latérales est généralement plus grosse postérieurement qu'antérieurement, mais ce caractère n'est pas constant. La déclivité apicale est plus ou moins concave; la carène qui la limite la laisse immarginée dans sa partie supérieure sur une étendue plus ou moins grande, parfois sur près de la moitié de son pourtour, d'autres fois seulement sur un faible intervalle près de la suture ⁽²⁾. Il existe presque toujours sur la déclivité apicale, près de son bord supéro-latéral, deux épines très petites et généralement très aiguës, ne dépassant pas en longueur les poils mi-dressés du voisinage; le plus souvent la spinule supérieure est un peu plus grande que l'inférieure, mais l'une d'elles, tantôt l'inférieure, tantôt la supérieure, peut disparaître et il arrive que toutes deux fassent défaut. Parfois elles se prolongent chacune antérieurement en une sorte de côte à

(1) Cette échancrure est masquée par les longs poils de la région postérieure du dernier segment abdominal.

(2) Ce dernier caractère ne s'observe que chez les spécimens provenant des régions chaudes de l'aire d'habitat.

surface inégale rappelant beaucoup les côtes homologues du *X. crinitarsis*.

Ces diverses variations ne sont pas sexuelles. Plusieurs d'entre elles paraissent être en rapport avec les particularités de la distribution géographique. Ainsi les individus du bassin méditerranéen montrent une tendance à constituer une race distincte caractérisée par une forme générale plus allongée, un prothorax plus petit, une carène marginale de la déclivité postérieure moins saillante et plus courte, des élytres mutiques; mais ces caractères ne sont pas exclusifs et il n'en est aucun qui ne puisse s'observer, assez rarement il est vrai, chez les exemplaires provenant des contrées intertropicales ⁽¹⁾.

Dans des cas très rares la conformation de l'angle apical des élytres chez la ♀ est presque identique à celle du *X. scutula* ⁽²⁾.

Le *Xylopertha picea* prend place comme terme moyen entre les *X. crinitarsis* et *scutula*.

Distribution géographique. — Cette espèce se rencontre dans presque toute l'Afrique. Elle est surtout répandue dans les régions intertropicales ⁽³⁾, sans paraître dépasser vers le sud le pays Ovampo et le bassin du Zambèze ⁽⁴⁾. Elle existe à Madagascar, aux Seychelles et aux îles du Cap-Vert ⁽⁵⁾. Dans le Nord, on la trouve dans tout le Tell algérien et tunisien ⁽⁶⁾, sans qu'elle ait été encore signalée dans

(1) S'il y avait utilité à donner un nom à cette race méditerranéenne, on pourrait lui réserver celui de *Heydeni*.

(2) Ouari (*D^r Roth* in *Coll. Oberthür*).

(3) Sénégal et bassin du Niger; toute la région guinéenne; Congo indépendant; Loanda (*Coll. Fairmaire*; *Coll. Oberthür*); Afrique orientale allemande; pays des Gallas et pays des Somalis; Abyssinie; Erythrée: Massouah, Keren, etc. (*Issel*, *Beccari*, *Ragazzi*, etc. in *Musée de Gènes*). L'espèce n'a pas encore été rencontrée sur la côte française des Somalis; elle existe à Berbera (*Coll. Argod-Vallon*).

(4) Ovampoland (*Eriksson* in *Musée de Cape-Town*); Zambèze (*Durand* in *Muséum de Paris*), Zomba et Fort Johnston (Haut-Chiré) (*D^r P. Rendall* in *Coll. Oberthür*).

(5) Diégo-Suarez, Nossi-Bé, Majunga, Antsianaka, baie d'Antongil, Mevata-tana, Andriba; Madagascar S.-O. (*Coll. Oberthür*); environs de Tullear (*G. Grandidier* in *Muséum de Paris*). Seychelles (*Ch. Alluaud*). I. du Cap Vert (*Olivier*).

(6) Bou Kanefs (dép. d'Oran) (*M. de Vauloger*); Mostaganem (*Cordier* in *Muséum de Paris*); Ouarsenis (*M. de Vauloger*); Oued Deurdeur, entre Affreville et Teniet et Had (*M. de Vauloger*); Margueritte, près Miliana (*Coll. Abeille de Perrin*); Alger (*L. Bedel*; *J. Künckel d'Herculais*); Boghari (*Ancy sec. Schilsky*); Bou Saada (*Leprieur* in *Coll. Pic*); Djidjelli (*Le-*

le Sahara septentrional. Elle a été prise sur la côte arabe de la mer Rouge et en Palestine ⁽¹⁾. Sa présence en Andalousie et en Sardaigne ⁽²⁾ est peut-être accidentelle.

Dans l'Amérique du Sud, où elle a été évidemment importée, l'espèce existe dans la majeure partie du Brésil, dans la Guyane française, dans le Pérou oriental et peut-être aussi en Colombie. Elle atteint vers le Sud la partie septentrionale de l'État de Saint-Paul ⁽³⁾.

Biologie. — Au Soudan français, le *Xylopertha picea* se développe de préférence, semble-t-il, dans le bois des arbres du genre *Acacia* (*A. Verek*, *A. albicans*, *A. Adansoni*, *A. tortilis*) ⁽⁴⁾; il vit aussi dans des *Ziziphus* et dans le Baobab (*Adansonia digitata*). En Algérie, il a été trouvé par H. Lucas dans le Chêne Zéen (*Quercus Mirbecki*) ⁽⁵⁾ et M. Künckel d'Herculais l'a observé, aux environs d'Alger, dans les douves en Chêne des tonneaux qu'il taraudait de ses galeries ⁽⁶⁾.

Cet insecte est attiré le soir par les lumières. La femelle, comme celle du *Scobicia Chevrieri*, vient fréquemment mourir à l'entrée de sa galerie, dont elle obture très exactement l'orifice à l'aide de sa déclivité apicale.

prieur); Ain Smara (*D^r Reboud* in *Muséum de Paris*); Bône et Sainte-Anne (*Abeille de Perrin*; *Desbrochers* sec. *Schilsky*); La Calle (*H. Lucas*); Souk el Arba (*D^r Normand*); Tunis (*D^r Normand*, etc.).

(1) Arabie, côte de la mer Rouge (*Arnaud* in *Muséum de Paris*). Jaffa (*E. Abeille de Perrin*). Olivier avait déjà signalé l'espèce comme se trouvant en Syrie.

(2) Cordoue (*Coll. Pérez Arcas* > *Musée de Madrid*), un indiv.; Sardaigne : Sarrabus (*N. Ferrari* in *Musée de Gènes*), un indiv.

(3) Colombie (*Le Bas* in *Musée de Bruxelles*; *Coll. Thorey* > *Oberthür*); Cayenne (*Coll. Dejean*); Brésil : États de Para (*Coll. Oberthür*), d'Amazonas (*M. de Mathan*; *Hahnel*), de Matto-Grosso (jusqu'à la frontière de Bolivie) (*Castelnau*), de Parahyba (*Germain*), de Pernambuco (*E. Gounelle*), de Bahia (*A. Grouvelle*), de Minas Geraes (*Castelnau*, *Germain*, *Torgue*), de Sao Paulo (*Muséum de Paris*). Rio de Janeiro (*Castelnau*). Pérou oriental : Pebas (*M. de Mathan* in *Coll. Oberthür*).

L'introduction de cette espèce en Amérique paraît être bien antérieure au dix-neuvième siècle.

(4) A son retour d'une mission scientifique au Sénégal et au Soudan, M. A. Chevalier a bien voulu nous laisser examiner la collection de bois rassemblée par lui dans ces contrées, ce qui nous a permis de prendre note de plusieurs des essences nourricières du *Xylopertha picea* citées plus haut.

(5) *Expl. scient. de l'Algérie, Ins.*, t. I, 1849, p. 467.

(6) *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1893, p. cccvii.

***Xylopertha crinitarsis*.**

(Voir tabl. des espèces 1. — Fig. 330 et 332 du texte).

Imhoff, 1843, *Verh. Naturf. Ges. Basel*, V, p. 177.

pubescens * Murray, 1867, *Ann. and Mag. of Nat. Hist.*, XX, p. 93
(*Col. Old Cal.*, 1878, p. 116).

Long. ♂ 2/3-9 2/3 mill. — Outre sa taille en moyenne plus grande, cette espèce se distingue du *picea*, par les caractères suivants :

Coloration plus foncée, brune, avec la base des élytres et la partie postérieure du prothorax roussâtres, le corps étant quelquefois entièrement roussâtre. Pubescence générale plus fine et plus dense que chez le *picea*. Sculpture des élytres plus forte. Près de la base, les élytres sont finement et assez densément ponctués ; à partir du tiers




Fig. 329 à 331. — Déclivité apicale, vue de profil, chez les *Xylopertha picea* ♀ (fig. 329), *X. crinitarsis* ♀ (fig. 330) et *X. scutula* ♀ (fig. 331). c, carène marginale.



Fig. 332. — Angle apico-sutural de l'élytre gauche chez le *Xylopertha crinitarsis* ♀, vu du côté sutural.

antérieur apparaissent des grains saillants d'abord espacés, puis devenant plus gros et plus rapprochés en même temps que la ponctuation devient grosse et très dense, en sorte que la sculpture de la région avoisinant le bord supérieur de la déclivité est très forte. La déclivité apicale est rebordée dans un peu moins de sa moitié inférieure ; elle est très fortement et très densément ponctuée dans toute son étendue ⁽¹⁾. En dedans de son bord supérieur, d'ailleurs peu nettement marqué, existent, de chaque côté, deux épines fortes et très aiguës,

(1) Plus fortement et plus densément que chez le *picea*.

homologues à celles du *picea*, mais beaucoup plus grandes. Latéralement un calus marginal fait suite au bout libre de la carène limitante. Suture saillante sur les deux tiers inférieurs de la déclivité. Bord inféro-apical des élytres à tubercules obsolètes ou peu marqués.

♂ Bord inféro-apical des élytres simple.

♀ Tranche apicale des élytres moins large que chez le *picea*. Angles suturaux non conformés en cupule. Vu de derrière, le bord apical de l'élytre est échancré au niveau de la suture et présente, de chaque côté de cette échancrure, une dent plate, glabre ⁽¹⁾, qui semble représenter le lobe antérieur de la cupule élytrale du *picea*. Le lobe postérieur serait constitué par l'angle sutural lui-même qui est légèrement redressé. Échancrure du dernier segment apparent de l'abdomen notablement plus grande que chez le *picea* et limitée par deux dents spiniformes convergentes.

Distribution géographique. — Espèce très répandue dans la région guinéenne depuis la colonie de Sierra Leone jusqu'au Loanda ⁽²⁾. Se rencontre à l'île San Thomé ⁽³⁾.

Xylopertha scutula n. sp.

(Voir tabl. des espèces 2, 4. — Fig. 328, 331 et 334 du texte.)

Long. 4-5 1/2 mill. — Très voisin du *picea* dont il a la forme générale. Sa coloration est aussi très semblable, roux brun, avec la partie postérieure du prothorax et la région basilaire des élytres un peu plus claires.

Granulation de la partie dorso-postérieure des élytres moins développée qu'elle ne l'est généralement chez le *picea*. Ponctuation des flancs des élytres non ou à peine renforcée en arrière. Déclivité apicale légèrement convexe de part et d'autre de la suture, sur le disque de

(1) La largeur de cette dent varie presque du simple au double.

(2) Nous citons seulement ci-après les localités extrêmes de l'aire d'habitat : Sierra-Leone (*Musée de Stockholm*) ; Baoulé (*Pobéguin in Muséum de Paris* ; *Bonhoure in Coll. Bedel*) ; Bismarckburg (*L. Conradt in Musée de Berlin*) ; bassin de la Haute-Sangha (*Ferrière in Muséum de Paris*) ; Ibembo, sur le Haut-Umbiri (*Duvivier in Musée de Bruxelles*) ; bassin du Kassaï (*L. Cloëtens in Musée de Bruxelles*) ; Angola (*British Museum*) : Loanda (*Coll. W. Rothschild* > *Oberthür*).

L'insecte vole le soir et est attiré par les lumières.

(3) *A. Mocquerys in Coll. Oberthür*.

chacune des moitiés latérales, limitée dans son tiers inférieur par une carène très peu saillante et n'offrant pas de spinules près de son bord supérieur (1); sa ponctuation plus dense que chez le *picea*. Suture à peine saillante sur la déclivité chez le ♂, plus renflée chez la ♀. Angle sutural nullement redressé (♂ ♀). Pas de tubercules au bord inféro-apical des élytres. Abdomen densément et assez fortement ponctué, densément pubescent.




Fig. 333 et 334. — Cupule apicale des élytres, vue de dessous, chez les *Xylopertha picea* (fig. 333) et *scutula* (fig. 334) ♀.

Chez la ♀, l'angle sutural de chaque élytre est creusé en cupule comme dans le *picea*; mais ici les lobes formant la cupule sont moins grands et l'apophyse interne du lobe antérieur dépasse celui-ci en longueur.

Distribution géographique. — Sénégal : Thiès (*Coll. Oberthür*), un ♂; Sierra-Leone : Free Town (*A. Mocquereys in Coll. Oberthür*), une ♀; Soudan français : région de la Haute Volta, entre Sikasso, Bobo-Dioulassou et San (*A. Chevalier in Muséum de Paris*), un ♂; Abyssinie (*A. Raffray in Musée de Madrid*), un individu (2).

Genre *Xylodectes* n. g.

(Voir tabl. des genres 1, 2, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26).

Portion visible de la tête régulièrement globuleuse, régulièrement convexe en dessus. Front sans couronne de soies dressées. Bord antérieur de l'épistome inerme, légèrement avancé au milieu et échancré de chaque côté de cette portion médiane. Mandibules dyssymétriques, celle de droite obtuse, arrondie au sommet, celle de gauche pointue au bout. Yeux relativement petits, bien détachés des tempes. Antennes de

(1) Dans l'individu de Thiès il existe un très faible rudiment de spinule sur chaque élytre.

(2) En outre, dans la collection Bedel, deux exemplaires ♂ sans indication de provenance.

dix articles, les articles 3-7 pris ensemble à peine aussi longs que le 8^e; massue environ une fois et demie aussi longue que le funicule, ses articles dépourvus de grandes dépressions et présentant seulement sur chaque face deux centres de condensation des pores sensoriels sans pubescence protectrice spéciale (1). Prothorax fortement rétréci en avant, dépourvu de suture latérale; angles antérieurs saillants, terminés chacun en une dent uncinée, le bord antérieur échancré entre eux; angles postérieurs marqués d'une côte légèrement arquée. Râpe prothoracique circulaire, parfaitement délimitée. Aire postérieure du pronotum lisse (2). Stigmates de la première paire très grands, latéraux. Déclivité apicale des élytres ornée de chaque côté d'une épine courte située au bord supérieur, non loin de la suture et d'une autre épine beaucoup plus grande insérée au bord latéral. Bord inféro-apical des élytres conformé en faux-épipleure. Dernier segment apparent de l'abdomen plus long que les précédents. Tibias antérieurs non sillonnés à la face externe. Tarses postérieurs portant de longues soies au côté interne.




Fig. 335. — Antenne du *Xylodectes venustus* ♂, vue par la face antérieure.

♂ Dernier segment apparent de l'abdomen entier, sans pièces pleurales visibles, frangé de très longs poils blonds à son bord postérieur, sans relief ni tubercule sur le disque. Apophyses latérales de la déclivité postérieure longues, minces, incurvées en dedans.

♀ Dernier segment apparent de l'abdomen profondément échancré au milieu du bord postérieur et présentant un relief ou un tubercule lisse et brillant en avant de cette échancrure. Apophyses latérales de la déclivité postérieure non ou à peine arquées, plus courtes et plus épaisses que chez le ♂.

Ce genre ne renferme que deux espèces habitant la région indo-malaise et l'Australie et dont le système de coloration est très particulier.

(1) Ces centres de condensation des pores correspondent sur les articles 8 et 9 à de faibles impressions du tégument dont la limite proximale est légèrement accusée.

(2) Sauf dans sa partie antéro-médiane.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- 1-2 — Flancs des élytres bruns ou tachés de brun dans leur moitié antérieure (fig. 336); massue antennaire brune ou brunâtre; poitrine brune au moins en partie. — ♂ Apophyses latérales de la déclivité insérées au niveau du milieu de la hauteur de celle-ci (fig. 336). — ♀ Échancrure du dernier segment abdominal non ou à peine plus profonde que large. — Long. 3 1/2-6 mill. **X. ornatus** Lesn.
- 2-1 — Flancs des élytres sans teinte ni tache brunes dans leur moitié antérieure; massue antennaire rousse; dessous du corps entièrement roux ⁽¹⁾. — ♂ Apophyses latérales de la déclivité insérées au-dessus du milieu de la hauteur de celle-ci (fig. 339). — ♀ Échancrure du dernier segment abdominal plus profonde que large. — Long. 4 2/3-5 mill. **X. venustus** n. sp.

Xylodectes ornatus *.

(Voir tabl. des espèces 1. — Fig. 336 à 338 du texte).

Lesne, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 49 ⁽²⁾.

Long. 3 1/2-6 mill. — Assez allongé, parallèle, jaune roussâtre, avec le dessus de la tête, la râpe prothoracique, la déclivité apicale, la poitrine, au moins en partie, et la base de l'abdomen noirs ou bruns; élytres tachés de brun vers le tiers antérieur de leur bord externe; appendices roux; massue antennaire brune ou brunâtre.

Front très court, à peine plus long que l'épistome, granuleux et couvert de fines soies dressées, blondes, peu serrées. Suture fronto-clypéale sulciforme, bien distincte. Épistome assez finement ponctué. Prothorax transverse, fortement rétréci en avant, très faiblement en arrière; aire suscéphalique râpeuse. Élytres glabres et brillants dans leur région dorsale et sur les côtés; déclivité apicale circulaire, mate, fortement ponctué, au moins sur le disque, couverte d'une pubescence blonde, très fine, à demi dressée, et bordée par une mince carène interrompue seulement entre les denticules marginaux supérieurs; ceux-ci courts, larges à la base, aplatis dans le sens dorso-ventral et très pointus au sommet. Suture saillante sur la déclivité, surtout au voisi-

(1) Sauf l'apex des élytres.

(2) Les caractères sexuels donnés dans cette description sont inexacts.

nage de l'angle apical qui est relevé et saillant. Abdomen densément et très finement ponctué et pubescent. Tibias postérieurs portant en dehors des soies assez courtes. Dernier article des tarses antérieurs plus long que chacun des précédents; deuxième article des tarses intermédiaires et postérieurs plus long que chacun des autres.

♂ Dent marginale latérale de la déclivité postérieure insérée au milieu de la hauteur de celle-ci.

♀ Dent marginale latérale de la déclivité postérieure insérée au-des-




Fig. 336 à 339. — *Xylodectes ornatus* ♂, vu de profil (fig. 336); *X. ornatus* ♀, vu de dessus (fig. 337); extrémité postérieure des élytres du *X. ornatus* ♂, vue de dessus (fig. 338); déclivité apicale du *X. venustus* ♂, vue de profil (fig. 339).

sus du milieu de la hauteur de celle-ci. Échancrure du dernier segment abdominal aussi large que profonde, limitée par deux angles dentiformes et précédée sur la ligne médiane d'un tubercule pointu.

Chez le *Xylodectes ornatus*, les pièces métathoraciques sont généralement brunes; mais il arrive que le métasternum soit roux presque en entier. La tache latérale des élytres est parfois réduite à une légère teinte brune peu étendue (Sumatra, coll. Bedel); dans d'autres cas, cette teinte brune envahit complètement les élytres et s'étend même sur le milieu de l'aire postérieure du pronotum (Nilghiri, coll. Oberthür).

La ponctuation des élytres varie beaucoup. D'ordinaire elle est nulle ou extrêmement fine dans la région dorsale, forte, au contraire, et assez serrée sur les flancs, au voisinage du bord de la déclivité postérieure;

mais quelquefois les élytres sont entièrement couverts d'une ponctuation assez fine qui s'accroît sur les côtés et qui devient serrée et très forte près des bords de la déclivité. Sur la déclivité elle-même existe d'une façon constante une ponctuation forte, au moins sur le disque, ponctuation qui tantôt s'étend sur toute la surface de la déclivité (sauf sur l'angle apical), et tantôt reste cantonnée dans les deux tiers supérieurs.

Distribution géographique. — Inde, Indo-Chine et Insulinde : Inde, Birmanie, Tonkin, Sumatra, Bornéo ⁽¹⁾.

Xylodectes venustus n. sp.

(Voir tabl. des espèces 2. — Fig. 335 et 339 du texte).

Long. 4 2/3-5 mill. — Cette espèce est très voisine de l'*ornatus*. Il n'y a que peu de choses à ajouter à ce qui en a été dit plus haut. Dans les deux sexes, la déclivité apicale des élytres est impunctuée sur plus de sa moitié inférieure et la ponctuation des parties supérieures est assez fine et peu dense. Dans les deux sexes aussi, les grandes épines latérales de la déclivité s'insèrent au-dessus du milieu de sa hauteur.

Le dernier segment ventral du ♂ est bidenté au bord postérieur ⁽²⁾; celui de la ♀ présente un relief médian peu élevé et son échancrure est notablement plus profonde que chez l'*ornatus* ♀.

Distribution géographique. — Australie orientale : Queensland ⁽³⁾.

Genre **Xylotillus** n. g.

(Voir tabl. des genres 1, 2, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 27, 28).

Front simple, convexe, sans trace de couronne pileuse. Épistome tronqué au milieu de son bord antérieur. Mandibules toutes deux pointues au sommet. Yeux gros, fortement détachés des tempes. Au-

(1) Province de Bombay : Kadegaon, en novembre, aux lumières (H.-E. Andrewes), type; Madras (Coll. E. Seeldrayers), type; Nilghiri (Coll. de Mar-seul > Muséum de Paris, type; Musée de Bruxelles, types; Coll. Sallé > Oberthür); Birmanie : Bhamo, en juillet-août (L. Fea in Musée de Gênes et Coll. Oberthür), Tarraouaddi (G.-Q. Corbett in Coll. Andrewes); Tonkin : Lien Son (Coll. Bedel). Sumatra, dans les tabacs (A. Grouvelle in Coll. Bedel); Bornéo : Sarawak (G. Doria in Musée de Gênes et Coll. Fairmaire).

(2) Caractère difficile à constater sans préparation spéciale.

(3) Port Denison (Muséum de Paris; Coll. Bedel); Australie (Coll. Abeille de Perrin). — 3 ♂ et 4 ♀.

tennes de dix articles, les articles 3-7 réunis plus longs que le premier de la massue; les deux premiers articles de la massue transverses, sans grandes dépressions ni taches pileuses tranchées. Prothorax subcarré, dépourvu de suture latérale et muni d'une dent marginale uncinée à chacun des angles antérieurs. Élytres épineux sur les bords de la déclivité postérieure, leur sillon marginal non interrompu au tournant apical externe. Bord inféro-apical mince, non conformé en faux-épipleur, finement denticulé. Tibias antérieurs normaux, leur face externe légèrement sillonnée, non rétrécie vers l'apex.

♂ Dernier segment de l'abdomen régulièrement arrondi en arrière et sans pièces pleurales apparentes.

♀ Dernier segment abdominal légèrement échancré au milieu de son bord postérieur.

Une seule espèce australienne, isolée, et cependant sans caractères extérieurs très remarquables.

***Xylotillus* Lindi*.**

(Fig. 340 et 341 du texte).

Blackburn, 1890, *Proc. of the Linn. Soc. of New South Wales*, 2^e sér., vol. IV (1889), p. 1263 (1).

Long. 3-3 1/2 mill. (?). — Assez court, parallèle, les élytres légèrement rétrécis vers l'apex; d'un brun rouge plus clair sur le prothorax et sur la tête; antennes et cuisses rousses. Épistome très finement ponctué. Suture fronto-clypéale fortement marquée, plus enfoncée au milieu. Front rugueux, granuleux latéralement. Articles 3-7 des antennes croissant graduellement en largeur, le 7^e plus de deux fois aussi large que le 3^e. Prothorax transverse, faiblement arrondi sur les côtés; dents de la râpe mêlées de denticules; aire suscéphalique finement râpeuse, sans limites nettes. Milieu de l'aire postérieure du pronotum avec des points râpeux écartés et très fins. Ponctuation dorsale des élytres assez forte et assez dense, devenant très forte et confluyente au voisinage du bord supérieur de la déclivité apicale. Celle-ci très fortement et très densément ponctué (sauf dans l'angle apical où la ponctuation est moins forte) et légèrement rebordée inférieurement, avec les

(1) Grâce à l'extrême amabilité de M. le Rév. Blackburn nous avons sous les yeux un spécimen typique de cette espèce.

(2) De 1 à 2 lignes, d'après Blackburn¹

angles suturaux un peu en saillie. Bords de la déclivité apicale présentant de chaque côté, supérieurement, une épine comprimée assez forte, et, latéralement, une autre épine beaucoup plus grande, du double plus longue que la précédente, comprimée dans le sens dorso-ventral, incurvée en dedans et très pointue au bout; au-dessous de la base de cette grande épine et un peu en dehors existe un tubercule peu saillant. Suture élevée sur la déclivité. Mésternum très convexe. Ponctuation et pubescence abdominales extrêmement fines et peu denses. Tibias postérieurs sans soies dressées en dehors.




Fig. 340 et 341. — *Xylotillus* Lindi. Femelle, vue en dessus (fig. 340) et apex des élytres, vu de profil, chez le mâle (fig. 341).

♀ Corps plus étroit que chez le ♂. Tubercule latéral de la déclivité postérieure moins saillant. Échancrure du dernier segment abdominal en forme d'angle très obtus.

Distribution géographique. — Australie orientale : Territoire du Nord, Australie du Sud, Nouvelles Galles du Sud (1).

Biologie. — M. Blackburn a trouvé plusieurs individus de cette espèce dans des galeries creusées dans le bois d'un *Eucalyptus* vivant.

Genre *Xyllon* n. g.

(Voir tabl. des genres 1, 2, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 27, 29).

Front régulièrement convexe ou très légèrement déprimé transversalement entre les yeux (*X. cylindricus*) et dépourvu de longues soies dressées. Mandibules chevauchant à l'apex lorsqu'elles sont fermées. Yeux fortement détachés des tempes. Antennes de dix articles, les articles 3-7 pris ensemble aussi longs ou plus longs que le 8^e; ce dernier, ainsi que le 9^e, à peu près aussi large que long ou un peu transverse. Articles de la massue sans grandes dépressions nettement délimitées, montrant seulement des condensations de pores. Prothorax sans suture latérale angulée sur la base; dents de la râpe mêlées de denticules. Stigmates de la première paire très grands, latéraux. Déclivité apicale

(1) Australie du Sud : Territoire du Nord (A.-M. Lea in litt.); Port Lincoln (Blackburn). Nouvelle-Galles du Sud : Tamworth (A.-M. Lea in litt.).

munie au moins, sur chaque élytre, de deux dents marginales à son bord supérieur; bord inféro-apical des élytres presque toujours échancré dans les deux sexes. Tibias antérieurs normaux, plus larges à l'apex qu'en leur milieu, leur face externe assez large. Tibias postérieurs sans soies dressées en dehors (1). Deuxième article des tarses postérieurs généralement plus long que le dernier (2).

♂ Abdomen normalement conformé, son dernier segment apparent muni de pièces pleurales plus ou moins développées.

♀ Abdomen subissant des modifications variées, le plus souvent très remarquables.

Le genre *Xylion*, qui renferme les espèces les plus curieuses de tout le groupe des *Xylopertha*, est répandu dans l'Afrique intertropicale et australe ainsi qu'en Australie. Il se divise en trois sections de la façon suivante :




Fig. 342 et 343. — Antennes des *Xylion falcifer* ♀ (fig. 342) et *collaris* ♀ (fig. 343), vues par la face antérieure.

I	II	III
<i>X. luceratus</i>	<i>X. plurispinis</i>	<i>X. cylindricus</i>
<i>X. falcifer</i>		<i>X. collaris</i>
<i>X. adustus</i>		<i>X. perarmatus</i>
<i>X. inflaticauda</i>		
<i>X. securifer</i>		
Afrique intertropicale et australe		Australie.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1-10 — Front caréné le long de son bord antérieur. Flancs du prothorax marqués d'une carène courte et légèrement arquée sur les angles postérieurs. Tibias antérieurs non

(1) Chez les *X. collaris* et *perarmatus* les tibias postérieurs portent de longues soies à la face postérieure.

(2) Chez les *X. plurispinis* et *perarmatus* le 2^e article est à peine plus long que le dernier.

sillonnés, convexes à la face externe. Épistome faiblement échancré au milieu de son bord antérieur. Mandibules toutes deux pointues au sommet. Articles 3-7 des antennes pris ensemble à peu près aussi longs que le 8^e (fig. 342). Prothorax allongé, parallèle ou subparallèle sur les côtés, la dent de l'angle antérieur insérée à quelque distance du bord. Déclivité apicale munie sur chaque élytre de 4 apophyses ou tubercules marginaux ⁽¹⁾. Bord apical des élytres échancré dans les deux sexes (fig. 353; 356, etc.). Corps étroit, allongé. — ♂ Dernier segment abdominal fovéolé ou silloné au milieu, ses pièces pleurales courtes, largement séparées en arrière. Apophyse inféro-latérale de la déclivité postérieure grande, plus ou moins falquée; apophyse supéro-latérale moins longue, digitiforme ou conoïde (fig. 352, 354, 364, etc.). Angle sutural saillant, mais non lobé. — ♀ 1^{er} et 2^e segments abdominaux agrandis, le second d'invagination modifié (fig. 346, 354, 360), bidenté en arrière et rattaché au premier segment par une large membrane permettant aux parties postérieures de l'abdomen de se rabattre horizontalement au-dessus de l'arrière-corps tout en demeurant sous les élytres (fig. 359) ⁽²⁾; 3^e et 4^e segments très courts. Apophyses élytrales moins développées que chez le ♂ (fig. 355, 357, 363, etc.); angle sutural lobé et redressé (mêmes fig.). — (*Xylion sens. str.*).

2-3 — Bord antérieur de l'épistome échancré sur une largeur égale à celle du labre. Parties dorsales des élytres nettement ponctuées. — ♀ 2^e segment abdominal sans partie excavée.

3-4 — ♀ Bord externe des élytres non échancré en arrière (fig. 345). Apophyse inféro-latérale de la déclivité postérieure formant un large lobe horizontal situé à un ni-

(1) Savoir : 1° une dent supérieure; 2° une apophyse supéro-latérale; 3° un tubercule ou un calus latéral; 4° une apophyse inféro-latérale. Cette dernière fournit de bons caractères spécifiques. Chez la femelle, l'angle sutural forme en outre un large lobe réfléchi et saillant.

(2) Dans cette figure, la membrane intersegmentaire dont nous parlons n'est pas complètement tendue et les derniers segments abdominaux sont seulement relevés verticalement.

veau peu élevé au-dessus de l'angle sutural (fig. 344, 345). 2^e segment de l'abdomen régulièrement convexe; 5^e segment presque aussi long que le second, largement et faiblement échancré au bord postérieur (fig. 346).

— ♂ inconnu. — Long. 5 2/3 mill. . . . **X. laceratus** n. sp.

4-3 — ♀ Bord externe des élytres présentant une profonde échancrure oblique en arrière (fig. 350). Apophyse inféro-latérale de la déclivité postérieure moins large, située à un niveau plus élevé au-dessus du lobe sutural (fig. 350). 2^e segment abdominal gibbeux, renflé le long de son bord antérieur en une sorte de genou articulaire (fig. 351); dernier segment échancré de chaque côté au bord postérieur. — ♂ Apophyses inféro-latérales de la déclivité postérieure presque aussi larges que longues, modérément épaisses, plus ou moins sinuées au bord apical (fig. 347, 348). — Long. 5-5 1/2 mill. **X. falcifer** n. sp.

5-2 — Bord antérieur de l'épistome échancré au milieu sur une largeur moindre que celle du labre. — ♀ 2^e segment apparent de l'abdomen présentant au milieu une partie concave limitée en avant par un relief ou par une carène arquée (fig. 360). Bord externe des élytres avec une échancrure oblique profonde en arrière (fig. 357, 364).

6-9 — ♀ 2^e segment abdominal présentant un relief semilunaire à tranche plane ou obtuse; pas de carènes entre les extrémités de ce relief et le bord postérieur du segment (fig. 360). — ♂ Apophyses inféro-latérales de la déclivité, vues de profil, aussi épaisses au milieu qu'à leur base (fig. 354, 362).

7-8 — ♂ Apophyse inféro-latérale de la déclivité postérieure étroite, deux fois aussi longue que large à la base, nettement arquée au bord interne, d'épaisseur modérée (fig. 352, 354). — ♀ Relief semilunaire du 2^e segment abdominal plus saillant, son plan terminal limité en avant par une arête vive (fig. 360); angle sutural un peu plus fortement redressé (fig. 357). Ponctuation des élytres assez fine mais bien marquée, notamment le long des nervures. — Long. 3 1/2-6 mill. **X. adustus** Fähr.

8-7 — ♂ Apophyses inféro-latérales de la déclivité à la fois
Ann. Soc. Ent. Fr., LIX, 1900.

très larges et très épaisses, renflées, une fois et demie aussi longues que larges et moins de deux fois aussi longues qu'épaisses (fig. 361, 362). — ♀ Relief du 2^e segment abdominal moins accusé, sans arête vive. Angle sutural plus brièvement redressé (fig. 364). Côtés du prothorax plus parallèles. Ponctuation des élytres extrêmement fine. — Long. 3 1/2-5 mill. **X. inflaticauda** *n. sp.*

9-6 — ♀ 2^e segment abdominal muni en avant d'une forte carène arquée dont les extrémités sont séparées chacune du bord postérieur du segment par une courte carène longitudinale. — ♂ Apophyses inféro-latérales de la déclivité, vues de profil, graduellement amincies de la base au sommet (fig. 366). — Long. 3-4 1/2 mill. **X. securifer** *n. sp.*

10-1 — Front sans carène le long de son bord antérieur. Prothorax sans trace de carène latérale. Tibias antérieurs légèrement sillonnés à la face externe.

11-12 — Déclivité postérieure munie sur chaque élytre de trois épines marginales et d'une épine discoïdale insérée près de la suture; angle sutural lobé et réfléchi parallèlement à l'axe du corps (fig. 367 à 369) ⁽¹⁾. Prothorax transverse, subcarré, sans angles antérieurs accusés, la dent antéro-latérale insérée à quelque distance du bord. Articles 3-7 des antennes pris ensemble à peine plus longs que le 8^e. Mandibules faiblement dyssymétriques. Épistome largement échancré en avant. Bord apical des élytres échancré dans les deux sexes. Corps large, court. — ♂ Pièces pleurales du dernier segment abdominal bien développées, rapprochées en arrière. — ♀ Dernier segment abdominal seul échancré au bord postérieur (fig. 370). — Long. 6-7 mill. **X. plurispinis** Lesn.

12-11 — Déclivité postérieure munie seulement sur chaque élytre de deux dents marginales et dépourvue d'épines discoïdales (fig. 372, 385, etc.); angle sutural non brusquement réfléchi. Prothorax subtrapézoïde, ses angles antérieurs marqués et armés d'un uncus au sommet. Articles 3-7 des antennes pris ensemble sensiblement plus longs que le 8^e (fig. 343). Mandibules dyssymétriques,

(1) Ici la conformation de la déclivité apicale est semblable dans les deux sexes.

celle de gauche pointue, celle de droite arrondie au sommet. Épistome faiblement échancré au milieu du bord antérieur. — ♂ Pièces pleurales du dernier segment abdominal bien développées, rapprochées ou contiguës en arrière. — ♀ 5^e segment visible de l'abdomen plus ou moins profondément modifié, largement échancré au bord postérieur, et laissant normalement apparaître les pièces d'un 6^e segment ⁽¹⁾.

- 13-14 — Aire postérieure du pronotum nettement et finement ponctuée au milieu. Dessus de la tête très légèrement déprimé transversalement entre les yeux. — ♀ Élytres non appendiculés au bord apical (fig. 374, 375). 5^e segment apparent de l'abdomen non soudé au segment précédent en son milieu, simplement échancré au bord postérieur, ses lobes latéraux situés dans le plan du reste de l'abdomen; pièces tergaux du 6^e segment apparent recourbées en crochet en dessus (fig. 376). Tarses postérieurs sans pilosité spéciale au côté interne. — ♂ Bord externe des élytres formant un pli au tournant postérieur (fig. 371). Pièces pleurales du dernier segment abdominal séparées en arrière (fig. 373). — Long. 6-9 1/2 mill. **X. cylindricus** Mac Leay.

- 14-13 — Aire postérieure du pronotum lisse ou marquée d'une fine sculpture râpeuse. Tête non déprimée en dessus. — ♀ Élytres munis d'un appendice xyphoïde au bord inféro-apical (fig. 378, 385). 5^e segment apparent de l'abdomen soudé au 4^e en son milieu et profondément modifié (fig. 382, 383, 387, 388). Articles 2 et 3 des tarses postérieurs ciliés de longues soies au côté interne.

- 15-16 — Aire postérieure du pronotum lisse au milieu. Élytres généralement bruns, et prothorax rouge. — ♀ Bord apical de l'élytre sans incision profonde, mais formant un lobe aigu qui porte inférieurement l'appendice xyphoïde (fig. 378, 380); bord de l'élytre denté de chaque côté de la base de ce lobe (fig. 380). 3^e segment apparent de l'abdomen visible sur la ligne médiane; 5^e segment très largement et très profondément échancré en arrière, et portant au fond

(1) Le 8^e segment morphologique de l'abdomen.

de cette échancrure deux faisceaux obliquement dressés de soies rigides, parallèles (fig. 383); lobes latéraux du même segment redressés subverticalement en manière de volets (fig. 383); pièces tergaes du 6^e segment apparent épaisses, subdigitiformes, non uncinées. 2^e article des tarsi postérieurs renflé à l'apex, deux fois aussi long que le dernier (fig. 384). — ♂ Pièces pleurales du dernier segment abdominal larges, contiguës en arrière (fig. 379). — Long. 4 1/2-7 1/2 mill. **X. collaris** Er.

- 16-15 — Aire postérieure du pronotum marquée au milieu d'une fine sculpture râpeuse, en écailles. Yeux plus gros et ponctuation des élytres plus forte que chez le *collaris*. — ♀ Déclivité apicale concave, ses dents marginales supérieures un peu plus longues que chez le *collaris*. Bord apical des élytres très profondément incisé latéralement, et présentant par suite une longue épine accolée au bord externe du lobe qui porte l'apophyse xyphoïde; le fond même de l'incision forme comme une petite fenêtre percée près du bord latéral de la déclivité (fig. 385); le lobe portant l'appendice est arrondi à l'extrémité et assez fortement renflé en dessus. L'angle sutural, situé au fond de l'échancrure profonde limitée par les deux lobes, a la forme d'une petite épine. 3^e segment apparent de l'abdomen visible seulement sur les côtés, et précédant immédiatement une large plaque qui paraît dépendre du 5^e segment et qui est prolongée en arrière, à ses extrémités, en deux longues lames pointues fortement recourbées en dessus (fig. 387, 388); cette lame donne aussi naissance à une longue apophyse médiane également recourbée vers le haut. Pièces tergaes du 6^e segment apparent très développées, en forme de hoyau, leur pointe dorsale faisant saillie contre l'angle sutural, au fond de l'échancrure limitée par les lobes appendiculés des élytres. 2^e article des tarsi postérieurs à peine plus long que le dernier, non renflé à l'apex (fig. 386). — ♂ inconnu. — Long. 4 1/2 mill. . . **X. perarmatus** n. sp.

Xylion laceratus n. sp. (♀).

(Voir tabl. des espèces 1, 2, 3. — Fig. 344 à 346 du texte).

Long. 5 2/3 mill. — Voisin du *X. adustus* décrit plus bas; même

coloration. En diffère par l'épistome un peu moins court, échancré en avant sur une largeur égale à celle du labre, et par la plupart des caractères suivants, qui sont propres à la femelle.

Bord latéral des élytres non échancré en arrière. Dents et apophyses de la déclivité apicale respectivement plus longues que chez l'*adustus* ♀ ; apophyse inféro-latérale notablement plus large, située à un niveau peu élevé au-dessus du lobe formé par l'angle apical ; celui-ci portant à la base, au côté externe, une petite dent pointue. Échancrure apicale des élytres plus rapprochée de l'axe du corps que chez



514



515

Fig. 344 et 345. — *Xylion laceratus* ♀.
Déclivité apicale des élytres, vue de
dessus (fig. 344) et de profil (fig. 345).




Fig. 346. — Arrière-
corps du *Xylion la-
ceratus* ♀, vu en
dessous.

l'*adustus*. 2^e segment apparent de l'abdomen plus long que le 1^{er} sur la ligne médiane, plus court au contraire sur les côtés ⁽¹⁾, faiblement et régulièrement convexe sur toute sa surface, bidenté au bord postérieur ; segments 3 et 4 très courts, à peine visibles sur la ligne médiane, le 5^e segment grand, presque aussi long que le 2^e, un peu excavé, très largement et peu profondément échancré au bord postérieur.

La largeur de l'apophyse inféro-latérale de la déclivité postérieure est variable et peut dépasser la moitié de la largeur d'un élytre.

Distribution géographique. — Afrique sud centrale : région du lac Tanganyika et district de Mossamedes ⁽²⁾.

Xylion falcifer n. sp.

(Voir tabl. des espèces 1, 2, 4. — Fig. 342 et 347 à 351 du texte).

Long. 5-5 3/4 mill. — Comme tous les *Xylion sens. str.*, cette es-

(1) Caractère commun à tous les *Xylion sens. str.*

(2) Moliro (J. Duvivier in *Musée de Bruxelles*), un individu ♀ ; env. de Huilla : Humpata (v. d. Kellen in *Musée de Leyde*), une ♀.

pèce présente le système de coloration décrit plus bas à propos du *X. adustus*. L'épistome est échancré en avant sur une largeur égale à celle du labre.

♂ Apophyse inféro-latérale de la déclivité postérieure large, moins d'une fois et demie aussi longue que large à la base, sinuée à l'apex et pointue au bout interne, son épaisseur moindre que la moitié de sa longueur.

♀ Bord latéral des élytres présentant en arrière une profonde échancrure oblique. Apophyses supéro- et inféro-latérales de la déclivité postérieure presque de même longueur, la dernière formant une large dent aplanie horizontalement, arquée au bord interne et située à un niveau notablement supérieur à celui de l'angle sutural. Lobe sutural




Fig. 347 à 350. — *Xylion falcifer*. Déclivité apicale des élytres, vue de dessus et de profil chez le ♂ (fig. 347 et 348) et chez la ♀ (fig. 349 et 350).




Fig. 351. — Abdomen du *Xylion falcifer* ♀, vu de trois quarts, en dessous.

portant lui-même au côté externe un petit lobe très court. 2^e segment apparent de l'abdomen convexe et transversalement gibbeux le long de sa base en une sorte de genou articulaire, son bord postérieur fortement denté de chaque côté d'une large échancrure médiane dont le fond est brièvement retroussé; 3^e segment explané au milieu, le 4^e non visible sur la ligne médiane; dernier segment très court, légèrement échancré de chaque côté au bord postérieur et paraissant par suite largement lobé au milieu.

Distribution géographique. — Afrique sud-centrale : région du lac Tanganyika, Machonaland ⁽¹⁾.

Xylion adustus*.

(Voir tabl. des espèces 1, 5, 6, 7. — Fig. 352 à 360 du texte).

Fähracus, 1872, *Öfv. Vet.-Akad. Förh.*, 1871, p. 667 (♀).




Fig. 352 à 359. — *Xylion adustus*. Déclivité apicale des élytres, vue en dessus et de profil, chez le ♂ (fig. 352 et 354) et chez la ♀ (fig. 355 et 357); bord inféro-apical des élytres, chez le ♂ (fig. 353) et chez la ♀ (fig. 356); abdomen de la ♀, vu de dessous (fig. 358) et de profil (fig. 359); *m*, membrane intersegmentaire.

Pierroni, Fairmaire, 1880, *Le Nat.*, II, p. 246; *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 333, pl. X, f. 7 a, b (♂ ♀) ⁽²⁾.

(1) Mollro et Kamozi (*J. Duvivier in Musée de Bruxelles et Muséum de Paris*); Salisbury (*Musée de Cape-Town*). — Plusieurs exemplaires des deux sexes.

(2) *Apate excisa** Dejean, *Cat.*, 3^e éd., p. 334 (♀).

Long. 3 1/2-6 mill. — Allongé, parallèle; d'un roux fauve brillant, plus clair en dessous, avec la tête, la région de la râpe prothoracique et les tibias rembrunis; déclivité apicale brune. Front et épistome




Fig. 360. — Abdomen du *Xylion adustus* ♀ vu de trois quarts, en dessous.

finement ponctués, le dernier échancré au bord antérieur sur une largeur moindre que celle du labre. Aire sus-céphalique du prothorax nettement délimitée, plus large que haute, déprimée au milieu et assez densément ponctuée. Sculpture du milieu de l'aire postérieure du pronotum fine, simulant des écailles. Élytres finement ou très finement et assez densément ponctués dans leur moitié antérieure, très fortement ponctués près des bords de la déclivité apicale, celle-ci couverte d'une ponctuation forte et assez dense (1).

♂ Apophyse inféro-latérale de la déclivité postérieure étroite, deux fois aussi longue que large à la base, non renflée ni sinuée à l'apex.

♀ Apophyse supéro-latérale de la déclivité postérieure plus longue que l'apophyse inféro-latérale; celle-ci for-

mant un lobe horizontal court, droit en dedans, arqué au bord externe, situé à un niveau notablement supérieur à celui de l'angle sutural. Angle sutural conformé comme chez l'espèce précédente. Échancrure apicale des élytres plus grande que chez le ♂. 2^e segment abdominal avec un relief semilunaire à concavité postérieure, dont la tranche, plane, est limitée en avant par une arête vive. La portion médiane du segment située en arrière de ce relief est excavée et brillante et forme une surface déclive. Le bord postérieur du même segment, relevé transversalement en carène en son milieu, est largement échancré, avec les angles limitants de l'échancrure dentiformes. 3^e segment explané au milieu, le 4^e n'étant guère visible que sur les côtés; 5^e petit, triangulaire, obtusément pointu en arrière.

La sculpture de l'aire postérieure du pronotum, la ponctuation dor-

(1) La sculpture de l'aire postérieure du pronotum et des parties postérieures des élytres est semblable chez tous les *Xylion* s. str.

sale des élytres et la forme de leur échancrure apicale chez la ♀ présentent quelques variations qui ne paraissent pas avoir d'intérêt particulier ⁽¹⁾.

Distribution géographique. — Afrique équatoriale et australe; Madagascar ⁽²⁾.

Les points les plus septentrionaux où cette espèce a été capturée jusqu'ici sont l'île de San Thomé, à l'ouest, et la vallée de la rivière Daoua (nord de l'Afrique orientale anglaise), à l'est.

Xylion inflaticauda n. sp.

(Voir tabl. des espèces 1, 5, 6, 8. — Fig. 361 à 364 du texte).

Long. 3 1/2-5 mill. ⁽³⁾. — Très voisin de l'*adustus*, avec le prothorax

(1) Nous avons vu deux ♂, qui proviendraient l'un du Sénégal (Dumoulin in Coll. Dejean, sub *Apate quadrispinosa* Dej.), l'autre de Casamance (Coll. Fleutiaux) et qui se font remarquer par la courbure plus régulière et de forme plus surbaissée des apophyses inféro-latérales de la déclivité. Ces deux individus appartiennent sans doute à une forme spéciale.

(2) Ile San Thomé (*A. Mocquers* in Coll. Oberthür), 3 ind. ♂ ♀. Congo indépendant : Kinchassa (Stanley-Pool) (*Waelbroeck* in Musée de Bruxelles), ♀ (il nous reste quelques doutes sur l'identification de cette femelle, examinée à une époque où nous ne connaissions pas celle de l'*inflaticauda*); Boma Sundi (*P. Rollin* in Musée de Bruxelles); Moliro, région du lac Tanganyika (*J. Duviols* in Musée de Bruxelles). Loanda : Malanjé (*Buchner* in Musée de Berlin). Afrique australe (voyages de *Delalande* et de *Drège*, Muséum de Paris). Colonie du Cap : Dunbrody (Port Elisabeth) (*O'Neil* in Coll. Bedel; Coll. Clavareau); Cafrerie (*J. Wahlberg* in Musée de Stockholm). Natal (*D^r Ch. Martin*). Mozambique : Delagoa Bay (Coll. Rothschild > Oberthür). Nyassaland : Blantyre, Zomba et Fort Johnston (*D^r P. Rendall* in Coll. Oberthür). Afrique orientale allemande, Ousegouha : Mhonda (*A. Hacquard* in Coll. Oberthür); Ousambara : Derema (*L. Conradt* in Musée de Berlin). Zanzibar (Musée de Vienne). Afrique orientale anglaise, cours de la Daoua : Bela et Avatchio (*E. Ruspoli* in Musée de Gènes). Madagascar (*Goudot*, *Grandidier* in Muséum de Paris) : Diégo-Suarez (*Ch. Alluaud*; Coll. Bedel; Coll. Oberthür); Nossi Bé (*Pierron* in Coll. Fairmaire, Muséum de Paris, Coll. Bedel; *D^r Suzor* in Muséum de Paris); Mevatanana (*D^r Decorse* in Muséum de Paris); baie d'Antongil (*A. Mocquers* in Muséum de Paris, Coll. Oberthür); Andevorante (*Mathiaux* in Muséum de Paris); Morondava (*G. Grandidier* in Muséum de Paris).

(3) Apophyses élytrales non comprises.

un peu plus allongé, à côtés plus parallèles. Élytres très brillants, presque lisses dans leur région dorsale.




Fig. 361 à 364. — *Xylion inflaticauda*. Déclivité apicale des élytres, vue de dessus et de profil, chez le ♂ (fig. 361 et 362) et chez la ♀ (fig. 363 et 364).

sans arête vive.

Distribution géographique. — Gabon et bassin du Congo (1).

***Xylion securifer* n. sp.**

(Voir tabl. des espèces 1, 5, 9. — Fig. 365 et 366 du texte).

Long. 3-4 1/2 mill. — Très voisin de l'*adustus*, mais de forme plus allongée chez la ♀. Élytres très brillants, lisses dans leur région dorsale, leur ponctuation étant le plus souvent à peine perceptible.

♂ Apophyse inféro-latérale de la déclivité postérieure large, affectant la forme d'un couperet, régulièrement arrondie à son pourtour externe, droite ou arquée au bord interne, déprimée et légèrement excavée à la base, au côté externe. Vue de profil cette apophyse s'amincit gra-

(1) Gabon (Coll. Fairmaire; Coll. Oberthür); Benito (Muséum de Paris; Coll. Bedel); Cameroun, vallée de la N'Goko (Jobit in Coll. Fleutiaux); Congo intérieur (Coll. Oberthür); Brazzaville (Coll. Bedel); Bas-Congo: Lemba (Gilmont in Musée de Bruxelles). — 7 ♂ et 6 ♀.

duellement de la base au sommet, tandis que dans les deux espèces précédentes la partie moyenne de l'apophyse est presque aussi épaisse que la base.

♀ Apophyse supéro-latérale de la déclivité postérieure un peu plus courte que l'inféro-latérale. Angle sutural plus brièvement réfléchi que chez l'*adustus*. 1^{er} segment abdominal moins court sur la ligne médiane. Relief du 2^e segment remplacé par une carène arquée, plus élevée, dont les deux bouts postérieurs sont séparés chacun du bord postérieur du segment par une très courte carène longitudinale. La portion du 2^e segment qui s'étend en avant de la carène arquée est inégale et alutacée, tandis que la partie concave est très brillante.




Fig. 365 et 366. — *Xylion securifer* ♂. Déclivité apicale des élytres, vue de dessus et de profil.

Distribution géographique. — Guinée septentrionale, de Sierra-Leone au Cameroun (1).

Xylion plurispinis*.

(Voir tabl. des espèces 10, 11. — Fig. 367 à 370 du texte).

Lesne, 1895, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, p. 177.

Long. 6-7 mill. — Corps court, parallèle. Tête, prothorax et poitrine noirs ou brun foncé; base des élytres, abdomen, antennes et pattes roux; parties postérieures des élytres et tibias antérieurs bruns. Front régulièrement convexe, finement et densément ponctué ainsi que l'épistome et couvert, comme celui-ci, de soies blanchâtres couchées. Yeux assez petits. 1^{er} et 2^e articles de la massue antennaire un peu moins longs que larges. Prothorax transverse, légèrement arrondi sur les côtés; aire suscéphalique ponctuée, sans limites nettes. Aire postérieure du pronotum couverte au milieu d'une ponctuation râpeuse assez dense. Ponctuation élytrale forte et dense devenant gra-

(1) Sierra-Leone : Free Town (*A. Mocquerys* in *Coll. Oberthür*); Rhobomp (*Coll. Fairmaire*). Côte d'Ivoire : Assinie (*Chaper* in *Muséum de Paris*; *Ch. Alluaud*); Baoulé : Audoumié, cercle de Bouaké (*Capitaine Le Magnen* in *Coll. François*). Cameroun : « Johann Albrechts Höhe » (*L. Conradt* in *Coll. Bedel et Coll. Oberthür*). — 5 ♂ et 3 ♀.

duellement plus forte et plus dense en arrière. La déclivité apicale est conformée de même dans les deux sexes; sa surface fortement ponctuée, et entièrement couverte d'une pubescence couchée, dense, très fine et extrêmement courte. A son bord supérieur, la déclivité présente de chaque côté deux fortes épines costiformes dont l'externe est plus grande; au bord latéral, au niveau du milieu de la hauteur de la




Fig. 367 à 370. — *Nylion plurispinis*. Déclivité apicale des élytres, vue de dessus (fig. 367), de profil (chez le ♂) (fig. 368) et de trois quarts (chez la ♀) (fig. 369). Derniers segments abdominaux de la ♀ (fig. 370).

déclivité, existe une autre épine, plus grande que les précédentes, conoïde, et dont la pointe est incurvée en dedans. Le bord inférieur de la déclivité est profondément échancré de chaque côté. Chacune de ces échancrures, dont les bords sont légèrement en saillie, est limitée par deux lobes, l'un externe, légèrement réfléchi au bout, l'autre sutural brusquement réfléchi parallèlement à l'axe du corps en une pointe aiguë, émoussée au sommet. Suture largement renflée en bourrelet dans la moitié inférieure de la déclivité et munie à la limite supérieure de ce renflement de deux fortes épines coniques, contiguës à la base. Abdomen densément et finement pubescent. 2^e et 3^e articles des tarses postérieurs subégaux, l'un et l'autre à peine plus longs que le dernier.

♂ Ponctuation de la déclivité apicale plus forte et moins régulière que chez la ♀. Épines élytrales un peu plus épaisses. Échancrure apicale de l'élytre simple. Pièces pleurales du dernier segment abdominal larges, rapprochées en arrière.

♀ Lobe apical externe de l'élytre faiblement denté au bord interne, plus nettement réfléchi au sommet que chez le ♂. Dernier segment ab-

dominal peu largement mais très profondément échancré au milieu; angles limitants de cette échancrure spiniformes et échancrés en dehors.

Distribution géographique. — Afrique orientale, depuis l'Afrique orientale allemande jusqu'au Transvaal ⁽¹⁾.

Xylion cylindricus.

(Voir tabl. des espèces 10, 12, 13. — Fig. 371 à 376 du texte).

Mac Leay, 1872, *Trans. Ent. Soc. of New South Wales*, II, p. 277 (♂) ⁽²⁾.

Long. 6-9 1/2 mill. — Allongé, parallèle; brun rouge ou roussâtre avec la région de la déclivité apicale plus foncée; dessous du corps




Fig. 371 à 376. — *Xylion cylindricus*. Déclivité apicale des élytres, vue de dessus et de profil, chez le ♂ (fig. 371 et 372) et chez la ♀ (fig. 374 et 375); derniers segments abdominaux du ♂ (fig. 373); abdomen de la ♀, vu en dessous (fig. 376).

plus clair; cuisses et antennes rousses. Labre très large. Épistome fine-

(1) Ousegouha : Mhonda (*A. Hacquard in Coll. Oberthür*), ♀ type; Nyasaland : Fort Johnston (*D^r P. Rendall in Coll. Oberthür* > *Muséum de Paris*), ♂; Transvaal : Makapan (*E. Simon*), ♀ type. — 3 individus.

(2) Précédemment j'avais attribué à tort à cette espèce le nom d'*obsipa* Germ.

ment et densément ponctué, largement mais très faiblement échancré en avant. Front sans carène le long de son bord antérieur, légèrement déprimé transversalement entre les yeux. Yeux gros. Prothorax plus large que long, assez fortement arqué sur les côtés, fortement rétréci en avant, ses angles antérieurs en saillie et armés chacun au sommet d'une dent uncinée; aire suscéphalique rugueusement ponctuée, sans limites nettes. Aire postérieure du pronotum assez finement et peu densément ponctuée, les points enfoncés non râpeux. Ponctuation des élytres fine et peu dense en avant, devenant graduellement plus forte et plus serrée jusqu'aux bords de la déclivité apicale, forte et très dense sur celle-ci, sauf dans sa région inférieure qui est très finement ponctuée. Déclivité apicale munie de chaque côté au bord supérieur de deux épines dont l'extérieure est la plus forte. Abdomen finement et densément ponctué et pubescent. 2^e article des tarses postérieurs beaucoup plus long que le dernier.

♂ Épines élytrales plus grandes. Bord externe de l'élytre formant au tournant apical un pli saillant qui correspond à une profonde échancrure de ce bord. Angle sutural arrondi, non lobé. Déclivité apicale sans grosse ponctuation dans son tiers inférieur, son bord inférieur réfléchi. Dernier segment apparent de l'abdomen avec de larges pièces pleurales très rapprochées en arrière, le bord postérieur du sternite étant angulé entre elles.

♀ Pli apical des élytres moins marqué que chez le ♂, semblable à ceux des *Xylion sens. str.* ♀. Échancrure apicale des élytres plus large, plus rapprochée de l'angle sutural, celui-ci formant un large lobe qui, seul, ne présente pas de grosse ponctuation. 1^{er} segment abdominal plus long que chez le ♂; 3^e et 4^e segments très courts sur la ligne médiane, surtout le 4^e qui est largement échancré en arrière; 5^e segment profondément échancré au milieu du bord postérieur. Le fond de cette échancrure, plus large que l'entrée, forme au milieu une sorte de lobe large, anguleux, redressé, caréné sur la face externe, denté ou non au sommet; les angles limitants de l'échancrure sont spiniformes. Les pièces tergales d'un 6^e segment abdominal apparent font normalement saillie au-delà de l'échancrure du 5^e segment, sous forme de deux crochets recourbés vers le haut et fortement chitinisés.

Distribution géographique. — Australie sud-orientale : Queensland, Nouvelle-Galles du Sud, Australie du Sud; Tasmanie (?) (1).

(1) Queensland : Gayndah (*Mac Leay*). Nouvelle-Galles du Sud : Clarence River (*Coll. de Marseul*), Tamworth, Gosford, Sydney, Galston, Forest Reefs

Xylion collaris.

(Voir tabl. des espèces 10, 12, 14, 15. — Fig. 343
et 377 à 383 du texte).

Erichson, 1842, *Wiegmann Arch. für Naturg.*, VIII, 1, p. 148 (♂). — Froggatt, 1895, *Proc. Linn. Soc. of New South Wales*, 2^e sér., IX, 1894, p. 123 (♀).

excavatus A.-M. Lea, 1893, *Proc. Linn. Soc. of New South Wales*, 2^e sér., VIII, 1893, p. 318 (♀).

bicolor A.-M. Lea, 1893, *loc. cit.*, p. 319 (♂).

Long. 4 1/2 - 7 1/2 mill. — Allongé, parallèle; prothorax d'un rouge roussâtre; tête brune; élytres, poitrine et base de l'abdomen généralement d'un noir un peu bleuâtre, quelquefois bruns ou même rous-




Fig. 377 à 381. — *Xylion collaris*. Extrémité postérieure du corps, vu de profil, chez le ♂ (fig. 377) et chez la ♀ (fig. 378); extrémité de l'abdomen du ♂, vue en dessous (fig. 379); bord inféro-apical des élytres chez la ♀ (fig. 380); extrémité du tibia et tarse de la patte postérieure chez la ♀ (fig. 381).

sâtres; parfois la base des élytres seulement est teintée de roux; antennes et pattes rousses. Bord antérieur de l'épistome assez largement

(A.-M. Lea in litt.). Australie du Sud : Adélaïde (*Coll. de Marseul*), un indiv. Tasmanie (*Coll. de Marseul*), un indiv.

L'espèce est assez répandue dans les collections. La collection Lanaberge > Oberthür en possède un individu provenant de Mac Leay lui-même.

échancré en avant. Suture fronto-clypéale fortement enfoncée et comme fovéolée au milieu. Front régulièrement convexe, nullement déprimé. Yeux assez petits. Prothorax non ou à peine transverse, régulièrement arqué sur les côtés, fortement rétréci en avant, ses angles antérieurs en saillie, armés chacun d'une dent uncinée. Aire postérieure du pronotum brillante et lisse, à part quelques fins points râpeux dans




Fig. 382 et 383. — Abdomen du *Xylion collaris* ♀, vu en dessous et de profil.

sa région médio-antérieure. Ponctuation dorsale des élytres dense et assez fine, légèrement renforcée près du bord de la déclivité apicale. Celle-ci densément et assez fortement ponctuée dans ses deux tiers supérieurs et munie de chaque côté, à son bord supérieur, de deux dents très pointues dont l'externe est la plus forte; bord inféro-latéral de la déclivité caréné. Élytres légèrement réfléchis à l'apex. Abdomen finement ponctué et pubescent. 2^e article des tarses postérieurs très long, arqué.

♂ Élytres conjointement angulés à l'apex, les angles suturaux à peine écartés, aigus. Bord apical des élytres entier, montrant seulement au côté externe l'indication d'une échancrure homologue de celle du *cylindricus* ♂. Pièces pleurales du dernier segment abdominal très larges, se joignant en arrière sur la ligne médiane.

♀ Forme générale plus étroite; prothorax moins court, avec la dent uncinée de l'angle antérieur un peu moins forte; ponctuation de la déclivité apicale un peu plus grosse que chez le ♂. Bord apical des élytres conformé de chaque côté en un lobe triangulaire, pointu au

bout, et plus ou moins nettement denté en dehors de ce lobe; angle sutural marqué, obtus. Le lobe apical des élytres porte, inséré au-dessous de sa pointe, un appendice long et mince, conoïde, de couleur testacée, qui est légèrement coudé et redressé vers le milieu. 3^e et 4^e segments apparents de l'abdomen largement échancrés en arrière; le 4^e, beaucoup plus profondément échancré que le 3^e, est en outre soudé au 5^e segment en son milieu. 5^e segment très largement et très profondément échancré, ses lobes latéraux dressés subverticalement en manière de volets. La vaste cavité ainsi délimitée présente sur sa paroi antérieure une crête transverse fortement chitinisée qui donne naissance à deux faisceaux obliquement dressés de longues soies raides, ayant l'aspect de deux haguettes rectilignes. Pièces tergaux du 6^e segment apparent épaisses, subdigitiformes, légèrement infléchies vers le bas. Apex des tibias postérieurs et des 2^e-4^e articles des tarses de la même paire frangés au côté interne de soies denses et très longues. 2^e article des tarses postérieurs renflé à l'apex.

Distribution géographique. — Australie sud-orientale : Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Australie du Sud. Tasmanie (1).

Biologie. — La larve de cette espèce vit dans le bois mort de divers *Eucalyptus*. On la trouve surtout dans l'aubier qu'elle crible entièrement de ses galeries généralement parallèles, mais souvent entrecroisées et se coupant l'une l'autre. La nymphose a lieu dans une loge ovale, à l'extrémité de la galerie larvaire. A peine sortis, les adultes se mettent à creuser dans l'aubier, immédiatement au-dessous de l'écorce, des galeries circulaires dans lesquelles pond la femelle. On peut trouver à la fois larves et nymphes à tous les stades du développement (2).

(1) Nouvelle-Galles du Sud : Clarence River (*Coll. de Marseul* > *Muséum de Paris*); Tamworth, Sydney, Galston, Forest Reefs (A.-M. Lea, Froggatt, etc.). Victoria : Port Phillip (*Musée de Berlin*); Melbourne (*Coll. de Marseul*); Darnum (Ph. François). Australie du Sud : env. d'Adélaïde (Blackburn); Port Lincoln (J. Anderson, sec. Blackburn). Tasmanie (Verreaux in *Muséum de Paris*; A.-M. Lea; *Coll. de Marseul*; *Musée de Bruxelles*) : Hobart (J.-J. Walker in *Coll. Bedet*).

(2) Cf. W.-W. Froggatt, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, 2^e sér., IX., 1894, p. 123.

T. Blackburn (même recueil, 2^e sér., IV, 1889, p. 1261) a extrait d'un *Eucalyptus* vivant un exemplaire de *Xylion collaris*.

***Xylion perarmatus* n. sp. (♀).**

(Voir tabl. des espèces 10, 12, 14, 16. — Fig. 384 à 388 du texte).

Long. 4 1/2 mill. — Allongé, parallèle; d'un roux testacé; poitrine plus claire; déclivité apicale des élytres et base de l'abdomen brunes; cuisses d'un testacé clair. Voisin du *X. collaris* dont il diffère par ses yeux plus gros, par la présence sur le milieu de l'aire postérieure du pronotum d'une fine sculpture râpeuse simulant des écailles, par la ponctuation des élytres plus forte, par la déclivité apicale des élytres excavée, très fortement ponctuée vers le haut, et dont les épines supérieures sont plus longues et plus aiguës, par le second article des tarses postérieurs à peine plus long que le dernier, enfin par les caractères sexuels suivants que présente la ♀.



Fig. 384 à 386. — *Xylion perarmatus* ♀. Déclivité apicale des élytres, vue de profil (fig. 384) et de trois quarts (fig. 385); tibia et tarse postérieurs (fig. 386).

♀ Élytres légèrement rétrécis en arrière avant la déclivité apicale. Suture déprimée dans le haut de la déclivité et formant une saillie graduellement plus large et plus élevée vers le bas. Bord apical des

élytres très profondément incisé au côté externe par une fente étroite qui pénètre jusque vers le milieu de la hauteur de la déclivité, où elle s'élargit en une sorte de petite fenêtre subcirculaire (1). L'apex de l'élytre est ainsi divisé en deux parties : 1° en dehors, une longue et mince épine légèrement incurvée; 2° en dedans, un lobe large et épais, comme renflé, arrondi au sommet, dont la surface est densément et finement ponctuée et qui donne naissance, au-dessous de son extrémité, à un appendice grêle, ensiforme. L'épine externe, prolongée en avant, le long du bord latéral de la déclivité, en une carène saillante, enveloppe étroitement le bord externe du lobe appendiculé. L'angle sutural, situé au fond de l'échancrure profonde limitée par les deux

(1) La déclivité étant examinée de derrière suivant l'axe du corps.

lobes, est représenté par une très petite épine. 2^e article des tarses postérieurs à peine plus long que le dernier, cilié au côté interne, ainsi que les deux suivants, de très longues soies raides. Soies du bord interne des tibias postérieurs peu nombreuses.

L'abdomen du *Xylion perarmatus* ♀ est d'apparence fort compliquée. Des segments 3, 4 et 5 on ne voit que les parties latérales; encore




Fig. 387 et 388. — Abdomen du *Xylion perarmatus* ♀, vu en dessous et de profil.

celles des deux derniers sont-elles soudées. Au milieu, immédiatement en arrière du 2^e segment, s'étend une large plaque transverse, lisse et brillante, qui paraît dépendre du 5^e segment et qui se prolonge en arrière à chacune de ses extrémités latérales en une longue lame pointue fortement recourbée en crochet vers le haut. La même plaque qui donne naissance à ces lames unciformes fournit, sur la ligne médiane, une grande apophyse cylindroïde, recourbée elle aussi vers le haut. De chaque côté, entre l'apophyse médiane et les lames unciformes, se montre, à un niveau un peu supérieur, l'extrémité d'un appendice très finement villos, recourbé également en dessus. Les pièces tergaux du 6^e segment apparent affectent exactement la forme d'un hoyau dont le manche correspond au point d'insertion, dont le talon, supérieur, est arrondi au bout et fait saillie au fond de l'échancrure médiane apicale des élytres, et dont la lame, large, recour-

bée vers le bas et très pointue au bout, embrasse la portion arquée de l'apophyse médiane dont nous avons parlé plus haut.

Distribution géographique. — Australie orientale : Rivière Clarence Coll. Laferté > Muséum de Paris). — 3 ind. ♀.

Genre **Xylobosca** n. g.

(Voir tabl. des genres 1, 2, 10, 14, 16, 30).

Front plus ou moins déprimé. Épistome faiblement échancré au milieu de son bord antérieur. Mandibules pointues, normales. Antennes de 10 articles, les articles 3-7 pris ensemble égalant à peu près le 8^e; 1^{er} et 2^e articles de la massue à peu près aussi longs que larges, dé-




Fig. 389 à 392. — Antenne du *Xylobosca Leai* ♀, vue par la face postérieure (fig. 389) (les deux premiers articles n'ont pas été figurés); tibia et tarse antérieurs du *Xylobosca bispinosa* ♂, vus par la face postérieure (fig. 390); patte antérieure du *Xylobosca Leai* ♀, vue par la face postérieure (fig. 391); tibia antérieur du *X. Leai* ♀, vu par la face externe (fig. 392).

pourvus de grandes dépressions sensorielles. Prothorax subcarré ou subrectangulaire, nullement élargi en arrière, dépourvu de suture latérale et de dents uncinées aux angles antérieurs. Élytres sans sillon marginal au bord externe, leur déclivité apicale inerme au bord supérieur. Tibias antérieurs élargis et comprimés, moins larges à l'apex

que vers le milieu, costiformes et non aplatis en facette au côté externe, leur face postérieure couverte de dents nombreuses qui se disposent en une rangée régulière le long du bord externe de cette face. Tarses postérieurs très grêles.

♂ Suture fronto-clypéale bien marquée, enfoncée au milieu. Élytres plus nettement tronqués en arrière que chez la ♀, leur bord apical simple, non échancré ni denté. Dernier segment abdominal avec de larges pièces pleurales rapprochées en arrière. Tarses antérieurs normaux, sans pilosité spéciale.

♀ Corps beaucoup plus allongé que chez le ♂. Suture fronto-clypéale très fine ou indistincte. Front plus ou moins garni de poils dressés. Bord apical des élytres le plus souvent échancré ou denté. Dernier segment abdominal diversement échancré en arrière. Tarses antérieurs avec de longues soies en dedans.

Genre propre à l'Australie et remarquable par la conformation spéciale des tibias antérieurs et par les particularités du dimorphisme sexuel (1).

TABLEAU DES MALES.

- 1-2 — Déclivité apicale des élytres armée de deux épines longues et fortes, divergentes, insérées côte à côte sur la suture (fig. 393, 394). Long. 2 1/2-3 1/2 mill. **X. bispinosa** Mac Leay
- 2-4 — Déclivité apicale des élytres inerme. Long. 4 mill. env. **X. mystica** Blackb.

TABLEAU DES FEMELLES.

- 1-8 — Déclivité apicale des élytres gibbeuse supérieurement ou régulièrement convexe.

(1) Les auteurs qui se sont occupés des espèces réunies ici sous le nom de *Xylobosca*, leur ont affecté 5 noms spécifiques, savoir : deux pour des formes ♂ (*bispinosa* Mac Leay, *canina* Blackb.), deux pour des formes ♀ (*elongatula* Mac Leay, *hirticollis* Blackb.), un seul relatif aux deux sexes (*mystica* Blackb.). Il est probable que les deux premiers noms s'appliquent au même ♂. Peut-être ce ♂ appartient-il à la même espèce que la ♀ décrite sous le nom d'*elongatula*; l'un et l'autre ont été capturés par les mêmes entomologistes dans les mêmes localités (à Gayndah par Mac Leay et à Tamworth par M. A.-M. Lea).

- 2-7 — Pronotum sans touffes de poils en avant, son aire postérieure ponctuée au milieu. Déclivité apicale des élytres présentant dans sa moitié supérieure une gibbosité médiane subhémisphérique (fig. 396, 397).
- 3-6 — Bord antérieur du prothorax, vu de devant, presque rectiligne (fig. 396). Yeux faiblement détachés des tempes (même figure). Front dépourvu de longues soies dressées (même figure). Pas de carène oblique dans l'angle sutural des élytres.
- 4-5 — Bord apical des élytres largement et profondément échancré en dehors; angle sutural lobé et légèrement replié en dessous (fig. 397). 3^e segment abdominal visible seulement sur les côtés; 5^e segment largement et profondément échancré en arrière et montrant, au fond de l'échancrure, deux petites lames quadrangulaires, contiguës au bord interne (fig. 397). Long. 4 mill. *X. elongatula* Mac Leay
- 5-4 — Bord apical des élytres simple, l'angle sutural très faiblement dentiforme. 3^e segment abdominal visible sur toute sa largeur; 5^e segment étroitement entaillé au milieu du bord postérieur et obliquement sillonné de part et d'autre de l'entaille (fig. 398). Long. 3 1/2 mill. *X. gemina* n. sp.
- 6-3 — Bord antérieur du prothorax, vu de devant, anguleusement échancré (fig. 400). Yeux nullement détachés des tempes (fig. 400), à peine surélevés au bord postérieur. Front avec une couronne beaucoup plus haute que large de longues soies rousses dressées (fig. 400, 401). Angle sutural des élytres séparé du reste de la déclivité par une carène oblique (fig. 402). Bord externe des élytres échancré en arrière; bord apical unidenté de chaque côté. Long. 4 mill. *X. Leai* n. sp.
- 7-2 — Prothorax portant en avant deux touffes de longues soies rousses recourbées en dessous et en dedans (fig. 404 à 406). Aire postérieure du pronotum imponctuée. Déclivité apicale régulièrement convexe, faiblement décline (fig. 405). Couronne frontale représentée de chaque côté par une rangée de soies très longues, recourbées en dessus et en dedans et entrecroisées avec celles

de la rangée opposée (fig. 405 et 406). Bord apical des élytres simple. Long. 4 1/2 mill..... **X. hirticollis** Blackb.

- 8-1 — Déclivité apicale des élytres concave de part et d'autre de la suture. Pas de couronne de longues soies dressées sur le front. Élytres séparément mucronés à l'apex. Long. 4 mill. env..... **X. mystica** Blackb.

Xylobosca bispinosa (♂).

(Voir tabl. des mâles 1. — Fig. 390, 393 et 394 du texte).

Mac Leay, 1872, *Trans. Ent. Soc. of New South Wales*, II, p. 276.

? *canina* Blackburn, 1893, *Trans. Roy. Soc. of South Austr.*, XVII, p. 131 (1).

Long. 3-3 1/2 mill. — Assez court, parallèle; brun, rougeâtre sur le prothorax et à la base des élytres; antennes et pattes rousses; tibias brunâtres. Suture fronto-clypéale bien marquée, plus enfoncée au milieu. Front brillant, assez densément et assez finement ponctué, râpeux-granuleux sur les côtés, sans poils dressés. Yeux assez gros, bien détachés des tempes. Prothorax subcarré, légèrement transverse, un peu élargi en avant, faiblement arrondi sur les côtés; aire suscéphalique finement râpeuse. Aire postérieure du pronotum marquée de points enfoncés assez fins et assez denses, râpeux dans la région médiane. Élytres densément et assez fortement ponctués sur ses parties dorsale et latérales, subgranuleux et comme chagrinés près des bords de la déclivité apicale; celle-ci fortement et très densément ponctuée (sauf dans l'angle sutural) et bordée sur la presque totalité de son pourtour par une carène circulaire régulièrement saillante. Déclivité apicale armée de deux très fortes épines divergentes, très larges à la base, graduellement amincies vers la pointe qui est émoussée et s'insérant




Fig. 393 et 394. — *Xylobosca bispinosa* ♂.

(1) La description de Blackburn conviendrait parfaitement aux spécimens que nous avons sous les yeux, s'il n'y était indiqué que la tête porte de longues soies (*capite..... longe setoso*).

côte à côte sur la suture, un peu au-dessous du milieu de la déclivité. Bord inféro-apical des élytres simple, coupant; angle sutural simple. Abdomen peu brillant, son tégument finement rugueux; 1^{er} segment abdominal deux fois aussi long que le suivant; 4^e segment à peine visible et seulement sur les côtés, le 5^e très court. Cuisses antérieures courtes et larges. 3^e article des tarses antérieurs deux fois aussi long que le 4^e.

. *Distribution géographique.* — Cette forme paraît être répandue dans toute l'Australie (¹).

***Xylobosca elongatula* (♀).**

(Voir tabl. des femelles 1, 2, 3, 4. — Fig. 395 à 397 du texte).

Mac Leay, 1872, *Trans. Ent. Soc. of New South Wales*, II, p. 276.

Long. 4 mill. — Allongée, parallèle; d'un brun foncé, brillant en dessus, avec la base des élytres à peine teintée de roussâtre; antennes




Fig. 395 à 397. — *Xylobosca elongatula* ♀. Corps vu en dessus (fig. 395); tête et bord antérieur du prothorax, vue de trois quarts (fig. 396); extrémités postérieures des élytres et de l'abdomen, vues de derrière (fig. 397); a, dernier segment apparent de l'abdomen; ov, oviscapte.

(1) Territoire du Nord : Rivière Adélaïde (*J.-J. Walker in Coll. Bedel*). Queensland : Cap York (*Coll. Oberthür*); Gayndah (*Mac Leay*). Nouvelle-Galles du Sud : Tamworth (*A.-M. Lea*). Australie du Sud et Australie occidentale (*British Museum*).

Le *X. canina* Blackb. provient des Blue Mounts (Nouvelle-Galles du Sud).

et pattes rousses; tibias brunâtres. Dépression frontale très haute, limitée supérieurement par une impression arquée, sa surface assez fortement ponctuée, plus densément vers le bas et hérissée de poils raides et courts dirigés vers le haut, qui se disposent le long de chaque bord latéral en une rangée longitudinale. Yeux assez fortement détachés des tempes. Prothorax allongé, subparallèle, non échancré au bord antérieur; aire suscéphalique râpeuse. Aire postérieure du pronotum densément et assez finement ponctuée. Élytres densément et assez fortement ponctués, légèrement rétrécis vers l'apex; déclivité apicale présentant dans sa moitié supérieure une gibbosité subhémisphérique, diamétralement traversée par la suture; celle-ci élevée et saillante vers le milieu de la déclivité. Bord apical des élytres largement et profondément échancré en arc de cercle en dehors, et frangé de longues soies rousses sur le pourtour de cette échancrure. Angle sutural lobé, légèrement replié en dessous. 1^{er} segment apparent de l'abdomen très grand, au moins aussi long que l'ensemble des suivants; 2^e segment légèrement explané au milieu et sinué au bord postérieur; 3^e et 4^e segments visibles seulement sur les côtés sur une faible largeur; 5^e segment largement et profondément échancré en arrière. Les angles limitants de cette échancrure sont spiniformes et le fond donne naissance à deux lamelles chitineuses rectangulaires contiguës au bord interne. Tibias postérieurs avec quelques longues soies en dehors. Pilosité de la face interne des tarses antérieurs très longue.

Distribution géographique. — Australie orientale (1).

***Xylobosca gemina* n. sp. (♂).**

(Voir tabl. des femelles 1, 2, 3, 5. — Fig. 398 du texte).

Long. 3 1/2 mill. — Allongée, parallèle; d'un brun foncé assez brillant sur les élytres, très brillant sur l'aire postérieure du pronotum; base des élytres et déclivité apicale teintées de roussâtres; antennes et pattes rousses. Dépression frontale très haute, glabre, éparcement ponctuée et brillante dans sa moitié supérieure, densément ponctuée et revêtue de poils raides très courts dans sa partie inférieure. Yeux faiblement surélevés au bord postérieur. Bord antérieur du prothorax

(1) Queensland : Gayndah (*Mac Leay*). Nouvelles Galles du Sud : Tamworth (*A.-M. Lea*).

C'est grâce à une très obligeante communication de M. A.-M. Lea que nous avons pu étudier nous-même cette espèce.

tronqué. Aire postérieure du pronotum marquée d'une ponctuation fine, assez dense, nullement râpeuse. Ponctuation des élytres assez dense, très fine, subobsolette, mieux marquée en arrière sur la déclivité apicale et au voisinage du bord supérieur de celle-ci. La moitié supérieure de la déclivité est en grande partie occupée par une gibbosité subhémisphérique à la limite inférieure de laquelle la suture est saillante et très obtusément dentée. Déclivité limitée au bord latéral par une carène peu élevée se continuant vers le bas jusqu'à l'angle sutural; celui-ci légèrement dentiforme. Bord apical des élytres entier. 1^{er} segment apparent de l'abdomen près de deux fois aussi long que le suivant, mais plus court que le reste de l'abdomen; 3^e segment visible dans toute sa largeur, le 4^e visible seulement sur les côtés; 5^e segment court, profondément entaillé au milieu du bord postérieur, les angles limitants de cette entaille saillants, dentiformes, marqués au côté externe d'un sillon oblique court et profond.

Fig. 398. — Échancrure du dernier segment abdominal chez le *Xylobosca gemina* ♀.

Distribution géographique. — Australie orientale (1).

***Xylobosca Leai* n. sp. (♀).**

(Voir tabl. des femelles 1, 2, 6. — Fig. 389, 391, 392 et 399 à 403 du texte).

Long. 4 mill. — Allongée, parallèle; corps un peu moins étroit que chez les deux espèces précédentes. D'un brun foncé avec la région dorsale basilaire des élytres et la déclivité apicale teintées de roux; aire postérieure du pronotum d'un noir brillant; antennes rousses; pattes d'un brun roussâtre avec les cuisses antérieures plus claires. Tête ornée en dessus d'une couronne de soies rousses, dressées, s'étendant des angles antérieurs de l'épistome jusque très avant sur le vertex, sur une longueur beaucoup plus grande que sa largeur; l'espace limité par cette couronne pileuse est déprimé, assez fortement ponctué et couvert de poils fins rebroussés vers le haut. Yeux peu convexes, à peine surélevés au bord postérieur. Dernier article des antennes étroit, allongé. Prothorax subcarré, parallèle sur les côtés, rétréci tout à fait en avant et anguleusement échancré au bord antérieur. Milieu de l'aire

(1) Queensland : Cooktown, en août (Meek in Coll. Oberthür). — Type unique ♀.

postérieure du pronotum avec une ponctuation fine, peu dense, non ou faiblement râpeuse. Élytres peu brillants, d'aspect subchagriné, couverts dans leurs régions dorsale et latérales d'une ponctuation dense et assez fine. Au voisinage du bord supérieur de la déclivité apicale le tégument devient mat et comme feutré par suite de la présence d'une pubescence très fine et très courte. Déclivité un peu plus densément et moins finement ponctuée que le reste des élytres, mate, offrant dans sa partie supérieure une gibbosité commune aux deux élytres, au-dessous de laquelle la suture devient saillante et forme comme deux lèvres obtusément dentées au milieu. Ces lèvres, au lieu de se continuer jusqu'à l'angle sutural, se détachent de la suture vers le tiers inférieur de la déclivité, rejoignent le bord apical de l'élytre au niveau d'une dent aiguë dont celui-ci est armé et se raccordent chacune à la côte marginale inféro-latérale. Par suite de la présence de la côte oblique l'angle sutural, qui est lui-même émoussé et faiblement saillant, est comme déprimé. Bord externe de l'élytre assez fortement sinué au tournant postérieur, immédiatement contre la côte latérale de la déclivité; les bords du sinus sont garnis de longues soies rousses. 1^{er} segment abdominal plus de deux fois aussi long que le suivant; celui-ci et le 3^e normaux, courts; 4^e segment fournissant en arrière (1), sur la ligne médiane, un lobe rectangulaire assez large dont le bord apical est échancré dans toute sa largeur. Ce lobe fait saillie au fond de l'échancrure large et profonde qui entame en arrière le 5^e segment. Cuisses antérieures larges, très courtes, moins d'une fois et demie aussi longues que




Fig. 399 à 403. — *Xylobosca Leai* ♂. Corps, vu en dessus (fig. 399); tête et portion antérieure du prothorax, vues de devant et de profil (fig. 400 et 401); déclivité apicale des élytres, vue de trois quarts (fig. 402); abdomen, vu en dessous (fig. 403).

(1) L'origine du lobe dont nous parlons est difficile à déterminer et nous conservons quelques doutes sur son attribution au 4^e segment apparent.

larges. Tibias postérieurs avec quelques longues soies en dehors. 2^e article des tarses antérieurs plus large que les suivants.

Cette espèce présente plusieurs caractères très remarquables. Le plus exceptionnel est la convexité relativement très faible des yeux, qui ne sont aucunement détachés des tempes en arrière.

Distribution géographique. — Tasmanie (A.-M. Lea) (1).

Xylobosca hirticollis (♀).

(Voir tabl. des femelles 1, 7. — Fig. 404 à 406 du texte).


Blackburn, 1897, *Trans. Roy. Soc. of South Austr.*, 1897, p. 92.

Long. 4-4 1/2 mill. — Forme moins allongée que chez les espèces précédentes; prothorax grand, un peu plus large que les élytres. Tête, prothorax, poitrine et abdomen d'un noir brillant; élytres et région de la râpe prothoracique châtain; antennes et pattes rousses. Yeux assez gros, très fortement détachés des tempes. Front très finement ponctué, portant de chaque côté un large faisceau de très longues soies rousses qui s'insèrent immédiatement contre le bord interne de l'œil et contre celui de la fossette antennaire. Chaque faisceau, formé de soies très serrées, s'élève d'abord perpendiculairement au front, s'infléchit ensuite vers le haut en convergeant avec l'autre faisceau, puis, se recourbant vers l'œil du côté opposé, il entrecroise ses soies avec celles du faisceau symétrique. Le prothorax présente aussi sur sa face déclive antérieure deux faisceaux de longues soies rousses, qui s'insèrent suivant deux lignes transverses, situées immédiatement en avant des premières dents latérales de la râpe. Ces faisceaux prothoraciques sont convergents et le bout de leurs soies atteint le point de croisement des faisceaux céphaliques. Prothorax allongé, rectangulaire, ses côtés rectilignes; portion du pronotum située en avant des faisceaux pileux brillante et presque lisse, verticale; râpe réduite à quelques dents très courtes, toutes situées à distance du bord antérieur. Aire postérieure du pronotum lisse et brillante. Élytres finement, râpeusement et assez densément ponctués et couverts d'une pubescence dense et très fine, à demi dressée. Déclivité apicale très régulièrement convexe, non séparée de la région dorsale des élytres, finement carénée au bord inféro-latéral, ponctuée et pubescente comme le dos des élytres; suture non élevée sur la déclivité; bord apical simple, coupant; angle sutural

(1) Les types, que nous avons déposés au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, nous ont été aimablement envoyés par M. A.-M. Lea.

marqué, un peu obtus, non en saillie. Hanches postérieures saillantes. Abdomen finement pubescent, ses 3^e et 4^e segments visibles seulement sur les côtés, le 5^e segment subtectiforme, très profondément et assez largement échancré au milieu, les bords de l'échancrure étant légèrement relevés. Trochanters antérieurs présentant en avant une facette

406



404



405

Fig. 404 à 406. — *Xylobosca hirticollis* ♀. Corps, vu en dessus et de profil (fig. 404 et 405); tête et prothorax, vus de devant (fig. 406).

très lisse et très brillante. Cuisses courtes, robustes, surtout les antérieures. Tibias postérieurs sans soies dressées en dehors. Calcar des tibias allongés, dépassant le milieu du 2^e article tarsien.

Par ses caractères insolites, cette espèce compte parmi les plus curieuses de la famille.

Distribution géographique. — Australie occidentale ⁽¹⁾.

(1) Baie du Roebuck (French, sec. Blackburn). King George's Sound.

Xylobosca mystica.

(Voir tabl. des mâles 2 et tabl. des femelles 8).

Blackburn, 1890, *Proc. Linn. Soc. of New South Wales*, 2^e sér., IV, p. 1263 ⁽¹⁾.

Nous n'avons pas vu cette espèce; mais la description qu'en a donnée M. Blackburn permet de la ranger avec certitude dans le genre actuel et de la distinguer des formes congénères. Nous transcrivons ici cette description ⁽²⁾ :

« ♀ *Elongata*; *cylindrica*; *sat nitida*; *glabra*; *picea*, *antennis*, *palpis tarsisque testaceis*, *femoribus tibiisque rufescentibus*; *capite sat elongato*, *longitudinaliter sat crebre strigato*, *antennis prothorace vix brevioribus*; *prothorace elytrorum latitudine, quam latiori fere longiori*, *antice sat angustato*, *postice subtilius sparsim conspicue punctulato*, *antice crebre granulato rugoso tuberculis nonnullis majoribus intermixtis (praecipue latera versus)*, *utrinque unco supra oculum haud armato*; *elytris crebrius fortius vix rugulose (apicem versus vix magis fortiter) punctulatis*, *postice minus abrupte declivibus apice singulatim valde productis et intus acute angustatis*, *parte declivi ad latera carinata et utrinque concava*, *sutura antice plana in parte declivi sat fortiter carinata*, *apice minute spinoso-producta*; *humeris laevibus*; *tarsis posterioribus 4 gracilibus compressis, supra visis fere capilliformibus, tarsis anticis pertonge pilosis*; *tibiis anticis subtus minute denticulatis*.

« *Long.* 1 4/5; *lat.* 2/5 lin.

« La portion non déclive des élytres est exactement deux fois aussi longue que la partie déclive. Les denticulations du dessous des tibias antérieurs sont à peine perceptibles sans l'aide d'un microscope composé.

« En compagnie du spécimen décrit j'ai trouvé un exemplaire qui, je n'en doute pas, était le ♂ de la même espèce; mais, par infortune, je l'ai brisé en essayant d'examiner ses organes buccaux. Il diffère de la ♀ par sa forme beaucoup plus courte et plus large, avec les tarses antérieurs non pileux et la déclivité postérieure des élytres plus grande, plus fortement délimitée et presque plane. La partie postérieure déclive des élytres était prolongée vers le bas au delà du niveau de la face inférieure du corps (comme dans la ♀), mais les élytres étaient conjointement arrondis ou peut-être un peu angulés à l'apex, non comme dans la ♀ séparément mucronés à l'extrémité avec la suture elle-même prolongée en une petite épine faisant saillie dans l'échancrure trian-

(A.-M. Lea); un exemplaire de cette espèce nous a été très aimablement envoyé par M. A.-M. Lea.

(1) M. Blackburn a décrit la ♀ comme étant le ♂ et inversement.

(2) En intervertissant les sexes.

gulaire entre l'apex des élytres. Il était en apparence si différent de la ♀ que ses rapports avec elle ne nous eussent probablement pas été suggérés si je n'avais pris les deux spécimens dans de semblables galeries dans la même pièce de bois ; mais tous deux, lorsqu'ils sont placés côte à côte, se ressemblent par beaucoup de caractères frappants, ayant des antennes identiques et la sculpture de toutes les parties semblable de même que l'absence assez peu fréquente d'épine dentiforme au bord antérieur du prothorax, la structure très inhabituelle des quatre tarses postérieurs et le prolongement vers le bas de l'apex des élytres. »

Distribution géographique. — Australie du Sud : Pétersbourg (T. Blackburn) (1).

Genre **Xylonites** n. g.

(Voir tabl. des genres 1, 31, 32, 33).

Forme allongée. Front simple, légèrement déprimé, couvert de soies dressées. Mandibules assez pointues, normales. Yeux assez petits, bien détachés des tempes. Antennes de neuf articles, les articles 3-6 pris




Fig. 407 à 410. — Antennes des *Xylonites retusus* ♀ (fig. 407) et *praeustus* ♀ (fig. 409), vues par la face antérieure ; articles 2-6 de l'antenne et 1^{er} article de la massue, vus par la face postérieure, chez le *X. retusus* ♂ (fig. 408) ; 1^{er} article de la massue, vu par la face antérieure, chez le *X. praeustus* ♀ (fig. 410).

(1) « Extrait du bois d'un arbre vivant. »

ensemble presque aussi longs que le premier de la massue ; articles de la massue sans grandes dépressions nettement délimitées ⁽¹⁾. Prothorax dépourvu de suture latérale, assez fortement arrondi sur les côtés, la dent redressée de ses angles antérieurs insérée à quelque distance du bord. Aire postérieure du pronotum lisse et brillante. Sillon marginal des élytres brusquement interrompu au tournant apical. Bord inféro-apical des élytres non conformé en faux-épipleure. Tibias postérieurs portant de longues soies en dehors. Tarses ornés de longs poils au côté interne ⁽²⁾.

♂ Élytres conjointement arrondis ou angulés au bord apical, non échancrés en arrière. Pièces pleurales du dernier segment de l'abdomen bien visibles, prolongées en arrière jusqu'auprès de la ligne médiane.

♀ Bord apical des élytres fortement échancré de chaque côté. Dernier segment de l'abdomen sans pièces pleurales apparentes, bidenté au milieu de son bord postérieur.

Ce genre, qui constitue l'un des types les plus curieux de *Xylopertha*, ne renferme que deux espèces habitant la région paléarctique.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1-2 — 1^{er} et 2^e articles de la massue antennaire aussi larges que longs (fig. 407). Prothorax à peine moins long que large. Élytres sans épines ni tubercules sur les bords de la déclivité apicale (fig. 414 et 415). 2^e et 3^e articles des tarses notablement plus larges que les suivants (fig. 411). Élytres, cuisses et tibia bruns. — ♂ Bord supérieur de la déclivité apicale avec de longs poils dressés (fig. 414). — ♀ Lobes suturaux de l'apex des élytres avec de longues soies rousses en dessus. Bords de l'échancrure apicale des élytres parallèles, non renflés en bourrelet (fig. 415, 416). Dernier segment apparent de l'abdomen fortement sillonné sur la ligne médiane et offrant au milieu du bord postérieur deux grandes dents très pointues au sommet (fig. 412). — Long. 3-6 mill. **X. retusus** Ol.

(1) Les aires de condensation des pores sont limitées seulement sur une faible portion, au côté proximo-interne (fig. 382 à 385).

(2) En outre la suture fronto-clypéale est très enfoncée au milieu et les dents de la râpe prothoracique sont mêlées de denticules.

2-1 — 1^{er} et 2^e articles de la massue antennaire plus longs que larges (fig. 409). Prothorax nettement transverse. Déclivité apicale des élytres munie latéralement, de chaque côté, d'une épine ou d'un tubercule (fig. 420 et 421). 2^e et 3^e articles des tarses antérieurs à peine plus larges que les suivants (fig. 417). Élytres roux châtain; cuisses rousses. — ♂ Pubescence du bord supérieur de la déclivité apicale très courte. — ♀ Lobes suturaux des élytres sans poils dressés en dessus. Bords de l'échancrure apicale des élytres non parallèles, renflés en un large bourrelet (fig. 421 et 422). Dernier segment abdominal sans sillon médian, les dents de son bord postérieur émoussées au sommet (fig. 419). — Long. 4-8 mill. **X. praeustus** Germ.

Xyloniites retusus.

(Voir tabl. des espèces 1. — Fig. 407, 408 et 411 à 416 du texte).

Olivier, 1790, *Enc. Méth., Ins.*, III, p. 110. — Id., 1795, *Ent.*, IV, n° 77, p. 14, pl. I, f. 2. — Bedel, 1887, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1887, p. 197. — Zoufal, 1894, *Wien. ent. Zeit.*, XIII, p. 38. — Schilsky, 1899, *Käf Eur.*, XXXVI Heft, 95 et YY.

sinuatus * Fabricius, 1792, *Ent. Syst.*, I, 2, p. 362 (♀) ⁽¹⁾. — Id., 1801, *Syst. Eleuth.*, II, p. 381. — Germar, 1817, *Faun. Ins. Eur.*, XX, 10. — Duftschmid, 1825, *Faun. austr.*, III, p. 84. — Bach, 1851, *Käferf.*, I, p. 118 (♀). — Redtenbacher, 1858, *Faun. Austr.*, 2^e éd., p. 570. — J. Duval, 1863, *Gen. des Col.*, III, pl. 56, f. 278 (♀). — Kiesenwetter, 1877, *Naturg. Ins. Deutschl., Col.*, V, p. 38. — V. Mayet, 1890, *Ins. de la Vigne*, p. 392. — Seidlitz, 1891, *Faun. transsylv.*, p. 529. — I. Chewireuv, 1893, *Description des Insectes nuisibles aux forêts de steppes*, p. 75, (en russe) ⁽²⁾.

(1) Le type de Fabricius, qui faisait partie de la collection Bosc, est conservé au Muséum de Paris.

(2) Les auteurs ont constamment décrit la ♀ comme étant le ♂ et inversement.

aterrimus Falderman, 1837, *Faun. ent. transcauc.*, pars II, p. 250 (♀) ⁽¹⁾.

Long. 3-6 mill. — Allongé; noir ou brun foncé, assez brillant, avec les antennes et les tarsi roux; une teinte brune plus claire existe souvent dans la partie postérieure des élytres. Épistome finement et densément ponctué, non convexe en avant, sa troncature médiane légèrement débordée par le labre sur les côtés. Front marqué d'une ponctuation moins fine et moins dense que celle de l'épistome, un peu râpeuse, et couvert d'une pilosité assez longue, rebroussée vers le haut. 1^{er} et 2^e articles de la massue antennaire aussi larges que longs. Prothorax à peine moins long que large, assez fortement rétréci dans son tiers antérieur, portant de longues soies dressées dans la région de ses angles antérieurs; aire suscéphalique finement et plus ou moins râpeusement ponctué. Ponctuation dorsale des élytres dense et assez fine, non renforcée en arrière. Bord supérieur de la déclivité apicale garni d'une pilosité dressée assez longue, plus fournie chez le ♂. Suture saillante sur la déclivité, plus fortement vers l'apex. Face externe des tibia antérieurs largement sillonnée, non rétrécie vers l'extrémité apicale. 2^e et 3^e articles des tarsi antérieurs notablement plus larges que les suivants.

♂ Élytres élargis en arrière. Déclivité apicale plus grande, brusquement tronquée, un peu concave, bordée au côté inféro-latéral par une carène n'atteignant pas l'angle sutural, et présentant en outre latéralement, dans le prolongement de cette carène, un calus marginal costiforme. Déclivité plus ou moins finement ponctué dans sa moitié supérieure, presque lisse inférieurement, parfois transversalement ridée sur une grande partie de sa surface. Suture simplement élevée sur la déclivité. Angles suturaux aigus, conjointement saillants ou légèrement écartés au sommet.

♀ Élytres parallèles. Déclivité apicale moins grande que chez le ♂, reliée aux parties dorsales des élytres par une large surface courbe, subgibbeuse au bord latéral, avec une côte faiblement indiquée au bord inférieur. Déclivité tout entière fortement et densément ponctué. Suture renflée en bourrelet sur la déclivité. Échancrure apicale profonde, à bords parallèles, les lobes suturaux portant en dessus une

(1) Le catalogue de Dejean (3^e éd., p. 334) porte en outre en synonymie le nom inédit de « *capillatum* Dahl ».

pilosité rousse à demi dressée. 4^e segment de l'abdomen très court au milieu, de longueur normale sur les côtés; 5^e segment plus long que




Fig. 411 à 416. — *Xylonites retusus*. Tarse antérieur du ♂ (fig. 411); abdomen de la ♀, vu en dessous et de profil (fig. 412 et 413); déclivité apicale des élytres, vue de trois-quarts, chez le ♂ (fig. 414) et chez la ♀ (fig. 415); bord inféro-apical des élytres, chez la ♀ (fig. 416).

2-4 pris ensemble, fortement sillonné longitudinalement au milieu, et muni au bord postérieur de deux grandes dents contiguës à la base, très aiguës et légèrement recourbées vers le haut à la pointe; le bord postérieur du même segment est échancré en demi-cercle de part et d'autre de ces dents.

Les articles 4 et 5 des antennes sont parfois soudés au côté interne (fig. 383).

Distribution géographique. — Europe moyenne et méridionale, Maghreb, Chypre.⁽¹⁾

(1) D'après Baudi. Il y a lieu de faire ici les mêmes réserves qu'au sujet du *Scobicia pustulata* (v. p. 590, fin de la note de la page précédente).

Les points les plus septentrionaux où la présence du *Xylonites retusus* a été constatée sont les forêts d'Andaine (Orne), de Saint-Germain (Seine-et-Oise) et de Compiègne (Oise), en France; la vallée moyenne de la Sarre, le Taunus et le Barnim, en Allemagne; la vallée de la rivière Samara, en Russie ⁽¹⁾.

Biologie. — Cette espèce vit à la fois dans le bois mort du Chêne ⁽²⁾,

(1) En France, l'espèce paraît faire défaut en Bretagne, dans la plus grande partie de la Normandie, ainsi que dans les pays situés à l'ouest de la vallée de l'Oise et au nord de celle de l'Aisne; mais les renseignements que l'on possède sont bien incomplets. Voici ceux que nous avons réunis :

Orne : La Ferté-Macé (*A. Lèveillé*). Seine-et-Oise : forêt de Saint-Germain (*A. Lèveillé*, juin 1864; *Ch. Brisout de Barneville*; *D^r Ch. Martin*). Seine : Saint-Mandé (*E. Allard*). Oise : forêt de Compiègne (*G.-A. Poujade*, juillet 1877; *D^r Ch. Martin*). Seine-et-Marne : forêt de Fontainebleau (*A. Lèveillé*). Aube : Palis (*Laverdet*). Vosges (*Géhin*). Indre-et-Loire : Tours. Loiret : forêt d'Orléans (*H. Rouyer*); Sully (*E. Gounelle*). Yonne : Coulanges-la-Vineuse (*D^r Populus*). Côte-d'Or : env. de Dijon (*Rouget*). Rhône : Lyon (*Coll. Aubé*; *V. Mayet*). Ain (*Guillebeau*). Allier (*E. Olivier*). Puy-de-Dôme : Mont-Dore, Salon du Capucin (*A. Fauvel*). Haute-Vienne : Saint-Barbant (*L. Mesmin*); Limoges et La Jonchère (*Bleuse*). Dordogne (*Coll. Guérin-Méneville* > *Oberthür*). Landes (*Perris*; *Gobert*). Gers et Lot-et-Garonne (*Delherm et Lucante*). Vallée du Tarn (*D^r Ch. Martin*). Pyrénées-Orientales : Massane (*V. Mayet*). Ria (*Xambeu*). Vernet-les-Bains (*H. Oberthür*). Collioure (*Ch. Brisout*). Bouches-du-Rhône : Sainte-Baume (*D^r Ch. Martin*). Basses-Alpes : Digne (*Bellier*). Var : Draguignan (*Jaubert et Robert*).

Sarrelouis (*L. von Heyden*). Wiesbaden (*L. von Heyden*). Strasbourg (*Musée de Bruxelles*; *Coll. Javet*). Erlangen (*Rosenhauer*). Munich (*Musée de Madrid*). Brandebourg : forêt de Dubrow (*Schilsky*); environs d'Eberswalde (*Ratzeburg*; *M. Bach*). Silésie allemande (*Seidlitz*).

Suisse (*Germar*) : Mont Pilate (*M. de Vauloger*). Ligurie, Piémont et Lombardie (*Baudi, Villa, Musée de Gènes*). Tyrol méridional (*Gredler*). Istrie : Görz (*Ludy* sec. *Schilsky*). Fiume (*Coll. Fleutiaux*). Autriche et Hongrie (*Redtenbacher*, etc.). Transylvanie (*Seidlitz*). Herzégovine (*Apfelbeck*).

Samara (sec. *Schilsky*). Crimée (*Coll. Mniszech* > *Oberthür*). Transcaucasie (*Falderman*, etc.). Chypre (*Truqui* sec. *Baudi*).

Algérie : Teniet el Had (*M. de Vauloger*); Djebel Edough (*L. Bedel*; *M. Pic*). Tunisie : Aïn Draham (*M. Pic*).

(2) Dans les Landes (*Perris*), dans les Pyrénées (*L. Dufour*), en Allemagne (*Nördlinger. Lebensw. von Forstk.*, 1880, p. 13; *J. Schilsky*).

du Châtaignier ⁽¹⁾, du Figuier ⁽²⁾ et de la Vigne ⁽³⁾. On l'a trouvée aussi dans le Chêne Vert ⁽⁴⁾ et dans l'Erable ⁽⁵⁾.

L'adulte se rencontre en mai, juin et juillet; il a des mœurs diurnes. La femelle creuse, dans les rameaux, des galeries circulaires semblables à celles du *Sinoxylon sexdentatum*, mais d'un diamètre plus petit, et y dépose ses œufs. Les galeries larvaires, longitudinales, sont surtout nombreuses dans la région médullaire ⁽⁶⁾. Pendant la mauvaise saison, la larve poursuit son développement et elle ne se transforme en nymphe qu'en mai-juin du printemps suivant.

On signale comme ennemis naturels de cette espèce un Malachide, l'*Axinotarsus pulicarius* Fabr. et plusieurs Clérides (*Denops albofusiata* Charp., *Tillus unifasciatus* Fabr., *Opilus mollis* L. et *O. domesticus* Sturm) ⁽⁷⁾, et, comme parasites, un Braconide (*Calyptus angustinus* Ruthe) et deux Chalcidides (*Pteromalus bimaculatus* Nees et *Perilampus laevifrons* Dalm.) ⁽⁸⁾.

Xylonites praeustus.

(Voir tabl. des espèces 2. — Fig. 409, 440 et 447 à 422 du texte).

Germar, 1817, *Reise nach Dalm.*, 2^e éd., p. 226, pl. VIII, f. 40-42

(1) Dans les Landes (Perris) et aux environs de Wiesbaden (L. von Heyden, *Käf. von Nassau*).

(2) Dans les Landes (Perris) et dans le bassin moyen de la Garonne (Delherm et Lucante).

(3) Dans les Landes (Perris).

(4) Dans le Var (Jaubert et Robert).

(5) Dans les Pyrénées-Orientales (V. Mayet *in coll.*).

En Algérie, cet insecte doit vivre notamment dans le *Quercus Mirbecki*, d'après une observation de M. L. Bedel qui en a capturé plusieurs individus en battant un jeune Chêne de cette espèce récemment coupé.

Le *X. retusus* vit probablement aussi dans le Hêtre.

(6) Ces renseignements biologiques sont empruntés presque tous à Perris (*Inn. Soc. ent. Fr.*, 1850, p. 562 et 564) qui observait l'espèce actuelle dans les sarments coupés réunis en fagots et dans les tiges mortes de la Vigne sauvage.

(7) Cf. Perris, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1850, p. 565-566 et *Larv. de Col.*, p. 220; Nördlinger, *Lebensw. von Forstk.*, 1880, p. 9.

(8) Cf. Ratzeburg, *Ichn. der Forstins.*, III, p. 249; Gobert, *Cat. des Col. des Landes*, p. 201. Ratzeburg indique aussi comme parasite probable l'*Helicon carinator* Nees (Braconide).

(♀). — Zoufal, 1894, *Wien. Ent. Zeit.*, XIII, p. 39. — Schilsky, 1899, *Käf. Eur.*, XXXVI Heft, 94 et YY (1).

*appendiculatus** Lucas, 1849, *Expl. scient. de l'Algérie, Ins.*, I, p. 466, pl. 39, f. 3 et 3a-3f (♀) (2).

Long. 4-8 mill. — Allongé, parallèle. Tête, prothorax et poitrine noir brillant; élytres roux châtain, rembrunis à l'extrémité; abdomen




Fig. 417 à 422. — *Xylonites praeustus*. Tarse antérieur de la ♀ (fig. 417); dernier segment abdominal du ♂ (fig. 418); abdomen de la ♀, vu en dessous (fig. 419); déclivité apicale des élytres, vue de trois quarts, chez le ♂ (fig. 420) et chez la ♀ (fig. 421); apex de l'élytre, vu de derrière, chez la ♀ (fig. 422).

brun roussâtre; antennes et pattes rousses, à part les tibias antérieurs qui sont bruns. Épistome finement et densément ponctué, convexe le long de son bord antérieur, sa troncature médiane aussi large que la base du labre. Front moins densément ponctué que l'épistome, couvert d'une pilosité assez longue, rebroussée vert le haut. Premier et

(1) Les auteurs ont interverti les sexes comme pour l'espèce précédente.

(2) *Apate appendiculata** Dejean, *Cat.*, 3^e éd., p. 334.

deuxième articles de la massue antennaire légèrement allongés. Prothorax transverse, sans longue pilosité antéro-latérale; aire suscéphalique finement ponctuée. Ponctuation des parties dorsales et latérales des élytres dense et forte, non renforcée en arrière. Pubescence de la déclivité apicale fort courte, dressée, rousse, appréciable surtout près du bord supérieur où elle est formée de poils moins courts. Face externe des tibias antérieurs étroitement sillonnée, légèrement rétrécie vers l'apex. 2^e et 3^e articles des tarses antérieurs à peine plus larges que les suivants. Les autres caractères spécifiques communs aux deux sexes sont identiques à ceux du *X. retusus*.

♂ Déclivité apicale des élytres plus grande que chez la ♀, couverte d'une ponctuation excessivement fine et très dense, et souvent ridée obliquement dans sa partie supérieure. Bords de la déclivité armés latéralement, au-dessus du milieu de la hauteur de celle-ci, d'une épine robuste, dirigée en dedans, fortement renflée en dehors à la base, fine et très pointue au sommet, et pourvus inférieurement d'un large rebord qui prend naissance à l'angle sutural et qui remonte sur les côtés jusque auprès de l'épine latérale. Suture uniformément saillante sur la déclivité. Angles suturaux non en saillie, émoussés au sommet.

♀ Déclivité apicale moins nettement tronquée que chez le ♂, fortement ponctuée, ses épines latérales plus petites ou remplacées chacune par un tubercule; suture renflée sur la déclivité. Échancrure apicale des élytres largement ouverte, bordée d'un épais bourrelet; lobes suturaux sans poils dressés en dessus. Dernier segment apparent de l'abdomen densément pubescent sur les côtés, non sillonné au milieu; bord postérieur du même segment armé de deux grandes dents médianes émoussées au sommet et échancré de chaque côté de ces dents.

Chez cette espèce, le 5^e article des antennes présente fréquemment une encoche au côté externe (fig. 384). Ce fait n'est pas constant ni particulier à l'un des sexes (1).

Distribution géographique. — Région méditerranéenne occidentale: Provence, Italie, Corse, Sardaigne, Dalmatie, Nord du Maghreb (2).

(1) J. Duval (*Gen. des Col.*, III, p. 230), qui avait déjà signalé cette particularité, la considérait comme propre au mâle.

(2) Bouches-du-Rhône: Marseille (*Coll. de Marseul*; *Coll. Lévêillé*); Sainte-Baume (*Ancey in Coll. Pic*); Basses-Alpes: Digne (*Coll. Bellier* > *Oberthür*). Var (*Jaubert et Robert*); Toulon (*Coll. Ch. Brisout*). Lombardie

Biologie. — Le *Xylonites praeustus* se développe surtout dans les Chênes : *Quercus Ilex* ⁽¹⁾, *Q. suber* ⁽²⁾, *Q. robur* ⁽³⁾, *Q. Mirbecki* ⁽⁴⁾. Il vit aussi dans le Figuier ⁽⁵⁾, dans le Lentisque ⁽⁶⁾ et dans le Gommier ⁽⁷⁾. Comme son congénère *X. retusus*, on ne le trouve que dans le bois mort, de préférence dans les branches de faible diamètre.

L'adulte se rencontre depuis le mois de mai jusqu'en août. Il sort aux heures chaudes de la journée et vole avec facilité ; par les temps sombres il reste blotti dans sa galerie (L.-G. Seurat).

Les galeries creusées par les larves sont, comme à l'ordinaire, longitudinales, la galerie de sortie de l'adulte transverse. La nymphose a lieu près de la surface de la branche, à une profondeur de moins d'un centimètre ⁽⁸⁾.

Genre *Scobleia* n. g.

(Voir tabl. des genres 1, 31, 32, 34, 35).

Front déprimé, orné d'une couronne de longues soies rousses dressées. Bord antérieur de l'épistome inerme. Mandibules toutes deux pointues au sommet. Yeux bien détachés des tempes. Antennes de neuf articles, les articles 3-6 pris ensemble plus courts que le premier

(*Villa*; *Coll. Steinheil* > *Oberthür*); Gênes (*Doria et Gestro in Musée de Gênes*). Corse (*Gougelet in Coll. Bedel*; *Coll. de Marseul*; *Coll. V. Mayet*; *Coll. Pic*). Sardaigne (*Baudi*) : *Sarrabus* (*Gestro et Traverso in Musée de Gênes*). Dalmatie : *Cherso* (*German*).

Algérie : *Sebdou* (*D^r Ch. Martin*); *Daya* (*Munier in Coll. Bedel*); *Teniet el Had* (*M. de Vauloger*); *Blida et l'Arba* (*Ch. Lallemant*); *Yakouren* (*M. Pic*); *Djebel Edough* (*L. Bedel*; *M. Pic*); *La Calle* (*H. Lucas*). Tunisie : *Aïn Draham* (*L.-G. Seurat*); *El Fedja* (*M. Sédillot*); forêt de *Gardimaou* (*M. de Vauloger*); *Teboursouk* (*D^r Normand*); *Bled Thala*, forêt de *Gommiers* (*M. de Vauloger*).

Sous le nom inédit d'*Apate humeralis*, Dahl aurait signalé cette espèce comme se trouvant en Sicile.

Nous avons sous les yeux un individu étiqueté « Espagne » sans autres indications.

(1) Dans la France méridionale (Perris; V. Mayet; Jaubert et Robert).

(2) En Algérie et en Tunisie (H. Lucas; L.-G. Seurat).

(3) V. Mayet.

(4) L.-G. Seurat.

(5) V. Mayet.

(6) En Tunisie (D^r Normand).

(7) Dans la forêt de Bled Thala (Tunisie) (M. de Vauloger).

(8) Cf. L.-G. Seurat, *Ann. des Sc. nat.*, 8^e sér., XI, 1900, p. 32.

article de la massue; chaque face des articles de la massue présente tantôt deux grandes dépressions parfaitement délimitées aux bords interne et proximal (formes paléarctiques), tantôt deux séries de grandes dépressions semblables (*S. declivis*). Prothorax dépourvu de suture latérale. Stigmates de la première paire très grands, latéraux. Suture élytrale épaissie en bourrelet sur la déclivité postérieure. Tibias antérieurs normaux, ceux des paires intermédiaire et postérieure un peu élargis (1).

♂ Dernier segment apparent de l'abdomen bordé de pièces pleurales sur les côtés.

♀ Dernier segment abdominal simple, sans pleurites visibles (2).

Les *Scobicia* habitent à la fois la Région méditerranéenne et les parties occidentales et sud-centrales de l'Amérique du Nord. Outre les espèces continentales, le genre renferme trois formes insulaires très étroitement localisées aux îles Canaries et à Madère.




Fig. 423 et 424. — Antenne du *Scobicia Chevrieri* ♀ (fig. 423) et antenne du *S. declivis* ♀, vue par la face postérieure (fig. 424).

TABLEAU DES ESPÈCES.

1-10 — Bourrelet sutural de la déclivité postérieure dépourvu de dents ou de tubercules (fig. 434 à 436). — Espèces paléarctiques.

2-7 — Déclivité apicale sans limites nettes vers le haut, graduellement reliée au dos des élytres par une surface régulièrement convexe (fig. 434).

(1) Tous les *Scobicia* ont en outre les dents de la râpe prothoracique mélangées de denticules et les tibias postérieurs munis de longues soies mi-dressées à la face externe.

(2) Sauf chez la ♀ du *Scobicia declivis* dont le dernier segment abdominal montre sur les côtés des pièces pleurales beaucoup moindres il est vrai que chez le ♂. Cette particularité se retrouve chez les *Xylotrips*.

- 3-6 — Déclivité apicale sans nervures en saillie dans la région de son bord supérieur. Milieu de l'aire postérieure du pronotum très finement ponctué.
- 4-5 — Suture déprimée dans la région supérieure de la déclivité apicale. Yeux assez petits (fig. 431) ⁽¹⁾. Prothorax rétréci en avant seulement à partir du milieu (fig. 427). Long. 2 2/3-4 1/2 mill. **S. pustulata** Fabr.
- 5-4 — Suture non déprimée dans la région supérieure de la déclivité apicale. Yeux gros (fig. 430) ⁽²⁾. Prothorax rétréci en avant à partir de son tiers postérieur environ (fig. 428). Long. 4 1/4-5 mill. **S. barbata** Woll.
- 6-3 — Déclivité apicale présentant de chaque côté trois côtes saillantes, parallèles à la suture, dans la région de son bord supérieur (fig. 429); entre ces côtes la ponctuation est très grosse et confluyente. Milieu de l'aire postérieure du pronotum avec des grains râpeux assez gros. Côtés du prothorax avec de longs poils dressés. Soies dressées de la face externe des tibias postérieurs très longues, atteignant presque la longueur des tibias. Long. 3 3/4-4 mill. **S. barbifrons** Woll.
- 7-2 — Déclivité apicale brusquement coupée (fig. 435 et 436), nettement délimitée dans sa région supérieure.
- 8-9 — Déclivité apicale sans rebord latéral en saillie. Angle sutural des élytres à peine saillant (fig. 425). Massue antennaire rousse ou d'un brun roussâtre. Long. 2 1/4-4 1/3 mill. **S. Chevrieri** Villa
- 9-8 — Déclivité apicale rebordée latéralement sur les deux tiers environ de sa hauteur. Angle sutural redressé et saillant (fig. 426). Massue antennaire brune. Prothorax plus fortement rétréci en avant (fig. 426). Long. 3 3/4-5 1/2 mill. **S. fuscicola** Woll.
- 10-1 — Bourrelet sutural de la déclivité apicale muni de chaque côté d'une épine ou d'un tubercule dentiforme (fig. 438, 440, 441). — Espèces néarctiques.
- 11-12 — Prothorax élargi en arrière du milieu (fig. 437). Dents du bourrelet sutural des élytres contiguës, insérées sur

(1) et (2) Nous donnons plus bas un tableau des dimensions de l'œil chez les *Scobicia* paléarctiques.

- la suture même, à mi-hauteur de la déclivité (fig. 438); celle-ci sans espaces lisses le long de la suture, mais présentant de chaque côté deux calus marginaux à son bord inféro-latéral (fig. 438). Long. 4 mill. **S. suturalis** Horn
- 12-11 — Prothorax non élargi en arrière du milieu (fig. 439). Dents subsuturales des élytres insérées au-dessus du milieu de la déclivité (fig. 440 et 441).
- 13-14 — Dents subsuturales des élytres petites, contiguës, insérées contre la suture; bourrelet sutural de la déclivité étroit, très légèrement élargi vers le haut, sans strie circonscrivante, mais longé de chaque côté par un assez large espace déprimé, lisse et très brillant. Pas de calus ni de tubercule au côté latéral de la déclivité. Angle sutural des élytres non saillant (fig. 440). Corps noir avec les angles postérieurs du prothorax et le calus huméral teintés de rouge. Long. 5-7 mill. **S. declivis** Lec.
- 14-13 — Dents subsuturales des élytres fortes, coniques, insérées à distance de la suture sur un large bourrelet sutural circonscrit, dans la moitié supérieure de la déclivité, par une strie fortement enfoncée (fig. 441). Bord latéral de la déclivité présentant de chaque côté un calus et un tubercule. Angle sutural des élytres redressé et saillant (fig. 441). Corps brun roussâtre. Long. 4 mill. **S. bidentata** Horn

DIMENSIONS DE L'OEIL CHEZ LES *Scobicia* PALÉARCTIQUES.

NOM DE L'ESPÈCE	TAILLE de l'individu mesuré.	SEXE.	PROVENANCE.	Diamètre transversal de l'œil (diamètre maximum).	Diamètre longitudinal de l'œil (diamètre minimum).
	m'llim.			millim.	millim.
<i>S. pustulata</i> ..	4 1/2	♀	Hyères.....	0,35	0,28
<i>S. barbata</i> ...	4 1/4	♀	Madère	0,42	0,37
<i>S. barbifrons</i> .	3 3/4	♂	Palma	0,34	0,25
<i>S. Chevrieri</i> ..	4 1/3	♀	Akbès (Syrie)..	0,46	0,35
id.	3 1/2	♀	?	0,35	0,28
<i>S. fìcicola</i>	4 1/2	♀	Canaries	0,39	0,35

Scobicia pustulata.

(Voir tabl. des espèces 1, 2, 3, 4. — Fig. 427, 431, 432 et 434 du texte).

Fabricius, 1801, *Syst. Eleuth.*, II, p. 381. — Lesne, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 10.

humeralis Lucas, 1843, *Rev. Zool.*, 1843, p. 159. — Id., 1849, *Expl. scient. de l'Algérie, Insectes*, I, p. 463, pl. 40, f. 1 ⁽¹⁾.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ -4 $\frac{1}{2}$ mill. — Allongé, parallèle, assez robuste. Brun, avec les antennes, les cuisses, les tarses, la base du prothorax et celle




Fig. 425 à 429. — *Scobicia Chevriéri* (fig. 425); *S. fscicola* (fig. 426); *S. pustulata* (fig. 427); *S. barbata* (fig. 428); *S. barbifrons* (fig. 429).

(1) *Apate humeralis** Dejean, *Cat.*, 3^e éd., p. 334.

des élytres roux clair; très souvent la teinte rousse est nettement rougeâtre sur le prothorax et sur les élytres; souvent aussi les tibias intermédiaires et postérieurs sont roux. Couronne frontale médiocrement fournie, dépassant à peine en arrière le niveau du bord postérieur des yeux, l'espace qu'elle circonscrit finement ponctué, finement et densément pubescent. Bord antérieur de l'épistome très obtusément angulé de chaque côté de la base du labre. Yeux modérément développés. Prothorax notablement plus large que long, régulièrement et assez fortement arrondi sur les côtés, son maximum de largeur se trouvant vers son milieu; dent antéro-latérale insérée au bord même. Aire postérieure du pronotum très brillante, présentant une ponctuation extrêmement fine, éparse, non râpeuse. Élytres très finement pubescents, fortement et densément ponctués, plus fortement sur la déclivité apicale sans que les points soient confluent dans cette région. La troncature de la déclivité apicale n'est pas brusque; le plan de la déclivité se relie insensiblement aux parties dorsales des élytres par une large surface courbe. Suture fortement épaissie et comme bilabiée sur la déclivité. Dans la partie supérieure de celle-ci la région suturale est déprimée et le fond de cette dépression est occupé par le prolongement antérieur très atténué du bourrelet sutural. Bords latéraux de la déclivité montrant de chaque côté les rudiments de deux calus marginaux, le bord inférieur nullement saillant; angle apico-sutural non redressé. Abdomen finement et densément ponctué, très finement pubescent. Tibias intermédiaires et postérieurs comprimés, aussi larges en leur milieu qu'à leur extrémité.

Il est assez fréquent que la teinte rousse ou rouge de la base du prothorax se réduise à deux taches voisines des angles postérieurs; c'est le cas, par exemple, du type de Fabricius. On constate aussi des variations dans l'étendue de la teinte rousse basilaire des élytres et dans la coloration de la massue antennaire qui est tantôt rousse tantôt brunâtre. La variation des sillons frontaux, suture fronto-clypéale et sillon médian longitudinal, ne paraît offrir aucun intérêt. Le rudiment d'un calus existe parfois au bord supéro-latéral de la déclivité postérieure.

Distribution géographique. — Le *Scobicia pustulata* se rencontre dans une grande partie de la Région méditerranéenne ⁽¹⁾, dont il ne pa-

(1) Espagne : Cordoue (*Musée de Madrid*). France mérid. : Collioure (*Grenier in Coll. Lévillé*); Ria (Pyrénées-Orient.) (*Xambeu*); Narbonne (*V. Mayet*); Roquebrun (Hérault) (*V. Mayet*); Montpellier (*V. Mayet*); Marseille, Aix-en-Provence et Ste-Baume (*E. Abeille de Perrin*); Mérindol (Vaucluse) (*E. Abeille de Perrin*); Ste-Tulle (Basses-Alpes) (*Guérin-Ménéville*); St-Za-

rait pas franchir les limites. Sa présence n'a été signalée ni en Tripolitaine, ni en Égypte, ni dans les contrées situées à l'Est de la Syrie.

Biologie (1). — Cette espèce se développe dans le bois mort du Chêne vert (*Quercus Ilex*) (2) et fort probablement aussi dans celui d'autres essences. On la trouve surtout dans les branches petites ou moyennes; elle ne dédaigne pas le bois un peu carbonisé (Xamheu).

Les œufs sont pondus en nombre dans une même branche. Les galeries larvaires cylindriques et remplies de fine sciure tassée, s'étendent parallèlement dans le sens des fibres, se côtoyant sans se confondre. Le travail de forage, commencé en automne, se poursuit en hiver pour s'arrêter au printemps, au terme de l'accroissement de la larve (fin mars ou avril). La nymphose a lieu sans apprêt à l'extrémité de la galerie larvaire. Elle dure une quinzaine de jours (Xamheu), mais elle

charie (Var) (V. Mayet); Hyères et Gien (E. Abeille de Perrin); La Siagne et Vaugranier, près Antibes (A. Grouvelle); Digne (Martin in Musée de Madrid). Corse (Damry, etc.). Sardaigne : Burgos et Gonnos (Damry in Coll. Oberthür). Sarrabus (R. Gestro et Traverso in Musée de Gênes). Sicile (Coll. Ch. Brisout). Illyrie (Coll. Noualhier). Tunisie : Tunis et Souk el Arba (Dr Normand); Djedida (M. Pic). Algérie : Bône (Leprieur); Teniet el Had (L. Bedel; M. de Vauloger); région du mont Ouarsenis (M. de Vauloger); Oran (V. Mayet); Miserghin et Tlemcen (L. Bedel); Mecheria (M. Pic). Maroc : Tanger (Schousboë sec. Fabricius). Haute-Syrie : Akbès (Delagrangé). — Depuis mai jusqu'en août.

On remarquera que pour le bassin oriental de la Méditerranée nous ne citons que la seule localité d'Akbès; cela tient sans doute à ce que les collections consultées par nous étaient pauvres en insectes de l'Europe sud-orientale. Quant à l'indication donnée par Th. Köppen (*Die Schäd. Ins. Rüssl.*, 1880, p. 191), qui parle du *Xylopertha humeralis* Luc. comme vivant dans le *Punica granatum* sur la côte méridionale de Crimée, il n'y a pas de certitude qu'elle ait trait à l'espèce actuelle plutôt qu'au *Chevrieri*.

On en peut dire autant du « *Xylop. pustulata* F. » signalé par M. Baudi di Selve comme existant à Chypre (*Berl. Ent. Zeit.*, 1873, p. 336). Encore cette dernière provenance serait-elle douteuse, car M. L. Bedel nous apprend que les récoltes de Truqui, étudiées par M. Baudi, avaient été en parties effectuées sur le continent.

(1) Cf. Xamheu, *Le Naturaliste*, 1892, p. 66 et *Ann. Soc. Linn. de Lyon*, 1893, p. 34. — Lesne, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 12. — M. Xamheu nous écrit que les observations publiées par lui ont bien trait au *S. pustulata* et non au *Chevrieri*.

(2) C'est dans ces conditions que M. Xamheu l'a observée à Ria et M. Valéry Mayet à Narbonne, Roquebrun et Montpellier. M. L. Bedel l'a trouvée aussi dans un Chêne à Teniet el Had.

peut se prolonger si le temps est froid ou humide. L'adulte, ayant creusé le trou de sortie, se tient de préférence dans sa galerie. Par les nuits calmes il sort pour s'accoupler (1).

Scobicia barbata*.

(Voir tabl. des espèces 1, 2, 3, 5. — Fig. 428 et 430 du texte).

Wollaston, 1860, *Ann. and Mag. of Nat. Hist.*, V, p. 359. — Id., 1865, *Col. Atlant.*, p. 231 et *Append.*, p. 38.

Cette forme est très voisine du *S. pustulata*. Elle n'en diffère guère que par les caractères suivants :

Front plus largement et plus nettement déprimé, la couronne frontale plus ample et plus fournie (au moins chez la ♀). Yeux beaucoup plus gros (plus gros encore que chez le *Chevrieri*, v. le tableau de la p. 587). Prothorax plus fortement rétréci en avant, son maximum de largeur nettement situé en arrière du milieu. Suture élytrale non déprimée dans la région supérieure de la déclivité. Long. 4 1/3 mill. (2).

On peut ajouter que la ponctuation de la déclivité apicale est moins dense que chez le *pustulata* et que les calus de ses bords latéraux sont un peu plus marqués. Dans le voisinage du bord supérieur de cette déclivité, la ponctuation dorsale des élytres est aussi plus grosse et moins dense que chez le *pustulata*. L'un des individus examinés a la massue antennaire brune, ses articles étant un peu plus grands que ceux du *pustulata*. La poitrine et l'abdomen sont bruns.

Distribution géographique. — Madère (Wollaston, Fauvel); Porto Santo (Fauvel).

(1) A. Bertì (*Atti delle Adun. dell' Istit. Veneto di Scienze, lett. ed art.*, 3^e sér., IV, 1858-59, p. 152 et suiv.) a attribué avec vraisemblance à l'« *Apate humeralis* Dej. » la perforation de tubes en plomb servant de conduites pour le gaz d'éclairage, dans une imprimerie de Venise. Le plomb avait été percé sur une épaisseur de 3 à 4 millimètres. On ne sait si l'observation a trait réellement au *Scobicia pustulata*, ou bien au *Chevrieri*; mais la détermination spécifique précise n'a pas une grande importance ici.

(2) La taille varierait de 2 lignes à 3 lignes 1/3 d'après Wollaston. Le dernier chiffre paraît bien élevé.



430



431

Fig. 430 et 431. — Têtes du *Scobicia barbata* (fig. 430) et du *S. pustulata* (fig. 431), vues de face.

Scobicia barbifrons*.

(Voir tabl. des espèces 1, 2, 6. — Fig. 429 du texte).

Wollaston, 1864, *Cat. Can. Col.*, p. 252. — Id., 1865, *Col. Atlant.*, p. 231 et *Append.*, p. 37.

Long. 3 3/4-4 mill. — Par sa troncature élytrale mal délimitée, cette espèce appartient comme la précédente au type du *S. pustulata*. Elle est caractérisée surtout par la longueur et le nombre des poils dressés des flancs du prothorax, par la présence de grains râpeux sur l'aire postérieure du pronotum, par la saillie en forme de calus des nervures élytrales sur les bords supérieur et latéraux de la déclivité apicale et par les longues soies dressées qui garnissent la face externe des tibias.

Chez l'individu que nous avons sous les yeux, l'épistome est distinctement échancré en avant, le front est brillant, finement ponctué et la région du vertex ne présente pas d'impression. La ponctuation des élytres est fine en avant, très forte, grossière et confluyente en arrière, au voisinage du bord de la déclivité apicale et notamment entre ses calus marginaux, tandis que sur la déclivité même la ponctuation quoique très forte n'est pas confluyente. La pubescence des élytres est bien apparente, assez dense, assez longue, rousse. La déclivité apicale est munie inférieurement d'un rebord en saillie. Le bourrelet sutural, moins épais que chez les espèces précédentes, se prolonge jusqu'à l'angle apical de l'élytre. Aux tibias postérieurs la longueur des soies de la face externe atteint presque celle des tibias eux-mêmes. Coloration roux brunâtre, plus foncée sur le prothorax et vers l'extrémité des élytres ⁽¹⁾.

Distribution géographique. — Iles Canaries : Palma (Wollaston ; Ch. Alluaud).

Scobicia Chevriéri.

(Voir tabl. des espèces 1, 7, 8. — Pl. I ⁽²⁾, fig. 4; fig. 28 B, 260, 423, 425, 433 et 435 du texte).

Villa, 1835, *Col. Eur. dupl. Suppl.*, p. 49 ⁽³⁾. — Lesne, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 10.

(1) La longueur des tarsez intermédiaires ne fournit pas de caractère distinctif.

(2) *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1896, pl. VIII.

(3) La description de l'« *Apate Chevriéri* » de Comolli (*De Col. prov. No-*

*foveicollis** Allard, 1869, *L'Abeille*, V, p. 468.

pustulata † Kiesenwetter, 1877, *Nat. Ins. Deutschl., Col.*, V, p. 38. — Schilsky, 1899, *Käf. Eur.*, Helt XXXVI, n° 93 (1).

Long. 2 1/4-4 1/3 mill. — Même système de coloration que chez le *S. pustulata*, le corps étant fréquemment d'une teinte générale moins foncée; le prothorax est très souvent roux en entier et ses parties claires, mal délimitées en avant, ne deviennent jamais rouges et ne se réduisent pas non plus à deux taches postéro-latérales. Massue antennaire et pattes rousses, à l'exception des tibias antérieurs (2).

Très voisin des espèces précédentes. Comparé au *pustulata*, il en diffère par sa couronne pileuse frontale plus fournie et plus ample, formée de soies plus longues et s'étendant plus en arrière du côté du vertex où sa ligne d'insertion est accompagnée d'une légère impression, plus sensible chez le ♂; par ses yeux notablement plus gros; par son prothorax moins court, moins fortement arrondi sur les côtés, aussi long que large ou seulement un peu plus large que long; par la déclivité apicale des élytres abruptement coupée et bien délimitée vers le haut. Le calus marginal



432



433

Fig. 432 et 433. — Tête et prothorax, vus de profil, chez les *Scobicia pustulata* (fig. 432) et *Chevrieri* (fig. 433) ♀.

vic., 1837, p. 38) qui paraît être copiée sur celle de Villa, se rapporte très vraisemblablement à la même espèce. Comolli a observé l'insecte « in *Vite la-brusca* »; on sait que cette Vigne est d'origine américaine. L'*Apate capillata* Villa (Dejean, *Cat.*, 3^e éd., p. 334) est le *S. Chevrieri*.

(1) M. Zoufal (*Wien. ent. Zeit*, XIII, 1894, p. 39) paraît avoir considéré les *Scobicia pustulata* et *Chevrieri* comme étant les deux sexes d'une même espèce.

Le *Xylopertha barbifrons* Walker (*List of Col. coll. by Lord*, 1871), dont nous reproduisons ci-dessous la description originale, ne peut être que l'un des deux *Scobicia* européens.

Xylopertha barbifrons Walk. — « Tawny, shining. Head black, with a thick porrect tuft of yellow hairs. Prothorax smooth, roughly punctured in front, where it extends like a hood over the head. Elytra minutely punctured; apical half brownish, dull, more thickly punctured than the basal half. L. 1 3/4 lin. ». — Provenance : « Wady Nash » (Péninsule sinaïtique).

(2) L'étendue des parties claires de la base des élytres varie comme chez le *S. pustulata*.

inférieur de cette déclivité est plus saillant que chez le *pustulata*. De chaque côté de la base du labre, le bord antérieur de l'épistome montre une saillie subanguleuse mieux marquée.

Distribution géographique. — Région méditerranéenne; remonte en outre vers le Nord sur le pourtour du massif alpin dans le Dauphiné, en Savoie et dans le Tyrol ⁽¹⁾. Il semble que l'espèce n'existe ni en Tripolitaine, ni en Égypte, ni dans les contrées situées à l'Est de la Syrie.

Biologie. — Le *Scobicia Chevrieri* a été observé dans le bois du Figuier (V. Mayet, Xamheu, Gredler), du Mûrier (Gredler), du Chêne Vert (*Quercus Ilex*) (V. Mayet), du Laurier (Xamheu), du Lentisque (*Pistacia lentiscus*) ⁽²⁾, etc. ⁽³⁾.

(1) Espagne : Yunquera, près Malaga (Coll. Rosenhauer > Oberthür); Séville et Cordoue (Musée de Madrid). I. Baléares (Coll. Gambey > Oberthür). France méridionale : Ria (Pyrénées-Orient.) (Xamheu); Montpellier (V. Mayet); Marseille (Coll. de Marseul, etc.); Saint-Zacharie (Var) (V. Mayet); Pignans (Var) (E. Abeille de Perrin); Nice (Gougelet); Grenoble et Uriage (Isère) (Coll. Bigot; A. Grouvelle); Savoie (Coll. de Marseul). Italie : Piémont (Musée de Gênes); Gênes (Dodero) et Voltri (Musée de Gênes), Milan (Villa, etc.); env. de Pise (Lavergne de Labarrière). Corse (Damry, etc.). Sicile (E. Al-lard; Coll. Bellier > Oberthür). Tyrol méridional : Bolzen (Gredler in Coll. Steinheil > Oberthür); Istrie : Görz (Ludy sec. Schilsky) et Trieste (Scriba in Coll. Rothschild > Oberthür). Illyrie (Coll. Noualhier). Grèce (K.-J. Lange in Musée de Bruxelles et Muséum de Paris). Crimée (Coll. Schmidt > Oberthür). Caucase (Coll. Pic) : Aresch (Schelkowskoy in Coll. Mesmin); Derbent (Reitter; Coll. A. Grouvelle). Syrie : Akbès (Delagrangé); Beïrout (M. Pic); Jaffa (E. Abeille de Perrin). Tunisie : Bizerte (M. de Vauloger); Tunis, Teboursouk et Souk el Arba (Dr Normand); Tunisie méridionale (Coll. Abeille de Perrin). Algérie : Bône (Leprieur); massif de l'Ouarsenis (M. de Vauloger); Oran (H. Lucas; V. Mayet). Maroc : Tanger (Favier in Muséum de Paris). — De mai en octobre.

C'est très probablement au *S. Chevrieri* que se rapportent les spécimens trouvés à Genève et signalés par Rey (*L'Échange*, 1892, p. 17), ainsi que ceux du bassin moyen de la Garonne dont parlent Delherm et Lucante (*Cat. des Col. du Gers et de Lot-et-Garonne*, 4^e partie, p. 109). Les derniers auteurs citent la localité de Samatan (Gers) et donnent l'espèce comme assez rare dans la région.

Nous avons déjà appelé l'attention (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 11) sur le fait de la coexistence fréquente des *S. pustulata* et *Chevrieri* dans les mêmes localités et nous avons donné une liste de quelques-unes de ces localités communes.

(2) D'après une indication manuscrite placée sous un individu provenant de Cordoue et appartenant au Musée de Madrid.

(3) Autres essences nourricières des *Scobicia* européens (on ne sait si ces

Les larves vivent en grand nombre dans une même branche; leurs galeries s'étendent longitudinalement suivant la direction des fibres du bois. On a remarqué que toutes les larves provenant d'une même ponte, ayant progressé dans des conditions analogues, travaillent presque toujours au même niveau dans l'intérieur de la branche, ce qui explique le fait de déviations parallèles affectant tout un groupe de galeries (Xamheu *in litt.*). A son extrémité, la galerie larvaire s'infléchit vers la surface du rameau. C'est dans cette portion terminale que s'opère, sans apprêt, la métamorphose; la nymphe repose sur la face dorsale (Xamheu).

L'adulte vole à la tombée de la nuit, aux derniers rayons du soleil couchant, au-dessus des haies ou des tas de bois (Ghiliani, M. de Vauloger). On peut aussi le voir explorer la surface des branches habitées par ses congénères et visiter une à une les galeries qu'il trouve ouvertes.

D'après M. Xamheu, la femelle confie ses œufs aux arbres non encore morts et elle creuse à cette intention entre le liber et l'aubier une galerie circulaire « de chaque côté de laquelle est déposée la ponte ». La femelle revient ensuite à reculons vers le trou d'entrée qu'elle obture très exactement de sa déclivité apicale, dont la conformation et la couleur sont évidemment en rapport avec cette fonction particulière de protection de la progéniture ⁽¹⁾.

Il y a probablement deux générations annuelles, car nous avons été témoin d'une période d'éclosion assez importante en septembre.

Scobicia ficicola*.

(Voir tabl. des espèces 1, 7, 9. — Fig. 426 et 436 du texte).

Wollaston, 1865, *Col. Atlant.*, p. 231 et *Append.*, p. 36.

Long. 3 3/4-5 1/2 mill. — Tête, extrémité des élytres, côtés de la poitrine, massue antennaire et tibias antérieurs bruns; prothorax d'un

renseignements ont trait au *S. Chevrieri* ou au *pustulata*: Bambou (à Bône, d'après Olivier de Lamarche), *Quercus robur* et *Q. coccifera* (L. Bedel *in litt.*), Bouleau (dans les Pyrénées-Orientales, d'après Xamheu), Vigne (d'après Perris), *Vitis labrusca* (dans la Province de Côte, d'après Comolli), *Punica granatum* (en Crimée, d'après Köppen).

(1) Nous avons observé cette particularité intéressante en 1898 sur des branches de Figuier provenant des environs de Montpellier et que nous devons à l'obligeance de M. Valéry Mayet. M. Xamheu, de son côté, a constaté le même fait à Ria.

testacé rougeâtre; élytres, sur plus de leur moitié antérieure, milieu de la poitrine, majeure partie de l'abdomen et pattes testacés.

Très voisin du *S. Chevrieri* dont il diffère, en outre de sa coloration et de sa taille, par la massue antennaire plus longue, le prothorax plus




Fig. 434 à 436. — Déclivité apicale des élytres, vue de profil, chez les *Scobicia pustulata* (fig. 434), *Chevrieri* (fig. 435) et *ficicola* (fig. 436).

fortement rétréci en avant, la ponctuation dorsale des élytres moins enfoncée, par la déclivité apicale limitée latéralement par une côte saillante sur les deux tiers environ de sa hauteur, et par l'angle apico-sutural des élytres retroussé et bien plus saillant que celui du *Chevrieri*. La ponctuation du milieu de l'aire postérieure du pronotum est extrêmement fine, peu dense, râpeuse. Les soies dressées des angles antérieurs du prothorax sont plus longues et plus nombreuses que chez le *Chevrieri*.

Distribution géographique. — Iles Canaries : Gomère (*Crotch*) (1).

Biologie. — Cette espèce a été trouvée en nombre par *Crotch* dans le bois mort d'un vieux *Ficus* (Wollaston).

Scobicia suturalis.

(Voir tabl. des espèces 10, 11. — Fig. 437 et 438 du texte).

Horn, 1878, *Proc. Am. Phil. Soc.*, XVII, p. 544.

Long. 4 mill. — Assez allongé, parallèle, brun, avec l'aire postérieure du pronotum, la moitié antérieure des élytres, les antennes, les cuisses et les tarses roux; tibias bruns. Couronne frontale ample, très rapprochée de l'œil sur les côtés, les soies de sa rangée postérieure recourbées vers le bas et beaucoup plus longues que celles des rangées latérales. Front et épistome densément et très finement ponctués. Prothorax plus large que long, assez fortement élargi en arrière, la région de ses angles

(1) L'individu de la collection Fairmaire est étiqueté « Ténériffe », sans doute par erreur.

antérieurs portant de longues soies dressées. Aire postérieure du pronotum râpeusement et assez densément ponctuée au milieu. Ponctuation des élytres assez fine et assez dense dans la partie dorsale et sur les côtés, très forte mais peu dense sur la déclivité apicale dont le tiers inférieur est imponctué. Déclivité déprimée supérieurement près de la suture. Celle-ci fortement épaissie en un bourrelet muni de deux petites dents contiguës, situées au niveau du milieu de la hauteur de la déclivité. De chaque côté, aux bords latéral et inféro-latéral, la déclivité présente deux calus marginaux dont l'inférieur est plus saillant. Bord inféro-apical des élytres épaissi, lisse, obtusément angulé avant la suture. Pubescence des élytres courte, très fine et peu dense. Abdomen très densément et assez finement ponctué, densément et très finement pubescent.

Des trois espèces américaines, celle-ci est la plus proche voisine de ses congénères paléarctiques.

Distribution géographique. — Californie : Saucelito (G.-H. Horn); Los Angeles (G.-H. Horn in *Muséum de Paris*, 1 ♂).

Biologie. — Dans les premiers jours d'octobre, D.-W. Coquillett a observé plusieurs nymphes et un petit nombre d'adultes récemment transformés dans des galeries creusées dans le bois d'une Vigne morte. La plupart des insectes se tenaient au niveau des nœuds, ordinairement deux à chaque nœud ⁽¹⁾.

Scobicia declivis.

(Voir tabl. des espèces 10, 12, 13. — Fig. 424, 439 et 440 du texte).

Leconte, 1857, *Ent. Rep. on route adj. to 47th parall.*, p. 48. — Horn, 1878, *Proc. Am. Phil. Soc.*, XVII, p. 544.

Long. 5-7 mill. — Oblong-allongé, parallèle. Brun foncé, avec les angles postérieurs du prothorax et le calus huméral teintés de rouge; antennes et pattes d'un rouge roux; tibias antérieurs bruns. Front et épistome finement et peu densément ponctués. Couronne frontale évassée et comme étalée, son bord latéral assez écarté de l'œil. Prothorax subcarré, légèrement arrondi sur les côtés, peu fortement rétréci en avant, la dent submarginale des angles antérieurs assez écartée du bord.

(1) Cf. *Ins. Life*, IV, n° 7-8, 1892, p. 261. — L'entomologiste américain ajoute qu'il a trouvé dans une galerie la nymphe nue d'un parasite dont l'éclosion eut lieu à la fin d'octobre.

Ponctuation du milieu de l'aire postérieure du pronotum fine, râpeuse, plus ou moins dense. Élytres fortement et densément ponctués, leurs




Fig. 437 à 440. — Prothorax, vu en dessus, et déclivité apicale des élytres, vue de profil, chez les *Scobicia suturalis* (fig. 437 et 438) et *declivis* (fig. 439 et 440).

deux nervures internes (scutellaire et dorsale interne) saillantes à la base. Strie suturale fortement enfoncée en arrière dans la région dorsale et déterminant ainsi un bourrelet sutural qui se prolonge sur la déclivité postérieure où il est armé près du bord supérieur de cette déclivité, et sur chaque élytre, d'une dent courte insérée immédiatement contre la suture. La déclivité apicale présente en outre, de part et d'autre du bourrelet médian, deux larges espaces longitudinaux très lisses et très brillants, tandis que ses parties latérales, un peu gibbeuses, sont densément et très fortement ponctuées. Bord apical des élytres épaissi en un large bourrelet lisse et très brillant et obtusément angulé avant l'apex. Pubescence des élytres

extrêmement fine, peu apparente. Abdomen finement et densément ponctué et pubescent.

♀ Dernier segment apparent de l'abdomen montrant sur les côtés des pièces pleurales moins larges que chez le ♂ et présentant en outre une légère échancrure médiane. Bourrelet du bord apical des élytres moins large que chez le ♂.

La ponctuation des élytres varie de grosseur et de densité; quelquefois elle est confluyente en arrière, sur les côtés. Dans certains cas, les nervures élytrales apparaissent en arrière sous forme de calus plats, aux bords supérieur et latéraux de la déclivité.

Cette espèce s'écarte beaucoup des *Scobicia* paléarctiques par le nombre des grandes dépressions sensorielles des antennes et par les caractères sexuels du dernier segment abdominal chez la femelle.

Distribution géographique. — Orégon et Californie (1).

(1) Orégon (G.-H. Horn). Sacramento (Leconte). Ile San Nicolas (H.-C. Fall). Cisco (Musée de Vienne). Fort Tejon (Leconte). Sylvania (Coll. Oberthür).

Biologie. — La larve de cette espèce a été observée dans le bois de l'Oranger ⁽¹⁾ et dans celui du « Mountain Laurel » (*Umbellularia californica*, Laurinée) ⁽²⁾. Les galeries creusées par elle sont cylindriques et longitudinales, c'est-à-dire orientées dans la direction des fibres du bois. A leur extrémité elles se recourbent presque à angle droit vers la surface de la branche ou du tronc. D'après Coquillett, la nymphose a lieu dans le bois à une profondeur d'environ 25 millimètres, à l'intérieur d'une loge que la larve façonne dans sa galerie en tassant la sciure de part et d'autre.

L'adulte ronge parfois la moelle des Rosiers mise à nu par la taille; il se plaît à tarauder les bois les plus variés. En Californie, on a essayé d'utiliser les bois de Chêne, de Châtaignier, de Pin, de Tulipier et d'Eucalyptus pour la construction des tonneaux, sans réussir à mettre ceux-ci à l'abri des déprédations du *Scobicia* ⁽³⁾.

Scobicia bidentata.

(Voir tabl. des espèces 10, 12, 14. — Fig. 441 du texte).

Horn, 1878, *Proc. Am. Phil. Soc.*, XVII, p. 544.

Long. 4 mill. — Oblong, parallèle. Brun, avec la région des angles postérieurs du prothorax teintée de roux et les élytres d'un roux brunâtre plus clair à la base; pattes rousses, à part les tibias antérieurs qui sont bruns. Front et épistome couverts d'une ponctuation dense et assez fine, un peu râpeuse. Rangées latérales de la couronne frontale un peu écartées des yeux. Prothorax légèrement arrondi sur les côtés, faiblement rétréci en avant où il présente latéralement une pilosité dressée assez abondante; angles antérieurs marqués d'une dent un peu écartée du bord. Milieu de l'aire postérieure du pronotum finement, râpeusement et assez éparsement ponctué. Ponctuation des élytres dense et



Fig. 441. — Déclivité apicale des élytres, vue de trois quarts et de profil, chez le *Scobicia bidentata*.

(1) Cf. Coquillett, *Ins. Life*, IV, n° 7-8, 1892, p. 260. L'auteur a trouvé la nymphe et l'adulte en juillet; la larve et la nymphe sont, d'après lui, semblables à celles du *Psoa maculata*.

(2) Coquillett, *loc. cit.* Il est spécifié qu'il s'agit ici de bois mort.

(3) J.-H. Comstock, *Rep. of the Ent. for the year 1880*, Washington, 1881, p. 275.

assez fine en avant, devenant graduellement plus forte en arrière, grossière et confluyente sur les bords de la déclivité apicale; nervures dorsales non saillantes à la base. Strie suturale fortement imprimée en arrière où elle circonscrit, dans la partie supérieure de la déclivité, un large bourrelet sutural armé de deux dents fortes et aiguës, insérées à distance de la suture. Déclivité apicale lisse de chaque côté du bourrelet médian, fortement ponctuée sur les côtés et couverte d'une pubescence couchée composée de longs poils blonds. Un tubercule en saillie au bord inféro-latéral de la déclivité. Angles suturaux des élytres fortement redressés, pointus, séparément saillants. Abdomen assez finement et assez densément ponctué, couvert d'une pubescence longue et assez dense.

Distribution géographique. — Nebraska (G.-H. Horn). Texas (Belfrage in Coll. Oberthür), une ♀.

Genre **Enneadesmus**.

(Voir tabl. des genres 1, 31, 32, 34, 36, 37).

Mulsant, 1851, *Mém. de l'Acad. de Lyon*, 2^e série, I, p. 208 (*Opusc. ent.*, Cah. I, 1852, p. 78). — Lacordaire, 1857, *Gen. des Col.*, IV, p. 534 et 539.




Fig. 442 et 443. — Antennes des *Enneadesmus forficula* (fig. 442) et *trispinosus* (fig. 443).

Front avec une couronne semi-circulaire de longues soies dressées, parfois incomplète et réduite à ses rangées suborbitaires. Bord antérieur de l'épistome inerme. Mandibules toutes deux pointues au sommet. Yeux fortement détachés des tempes. Antennes de neuf articles, chacun des articles de la massue présentant sur chaque face deux grandes dépressions parfaitement délimitées. Prothorax dépourvu de suture latérale, muni d'une dent marginale dans la région de l'angle antérieur. Stigmates de la première paire petits, ventraux. Déclivité apicale des élytres armée de chaque côté, vers le milieu des bords latéraux, d'une forte apophyse plus ou moins pointue au sommet; suture non épaissie en bourrelet sur la déclivité; bord inféro-apical des élytres simple. Tibias antérieurs de forme normale.

♂ Pièces pleurales du dernier segment abdominal apparentes en dessous. Couronne frontale moins fournie et formée de soies moins longues que chez la ♀, parfois même incomplète.

♀ Dernier segment abdominal simple.

Les *Enneadesmus*, tous de petite taille, sont répandus dans une grande partie de l'Afrique et dans la région méditerranéenne.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- 1-12 — Déclivité apicale des élytres sans épines suturales. Dents de la râpe prothoracique mêlées de denticules.
- 2-9 — Articles 3-6 des antennes pris ensemble plus courts que la demi-longueur du premier article de la massue (fig. 442); celle-ci très grande, plus de deux fois aussi longue que le reste de l'antenne, son dernier article très long, très mince et comme foliacé.
- 3-6 — Déclivité apicale imponduée au-dessous de l'apophyse latérale. Angle apico-sutural des élytres non saillant. Ponctuation dorsale des élytres non confluyente au voisinage du bord supérieur de la déclivité. Apophyses élytrales courtes.
- 4-5 — Rebord inférieur de la déclivité apicale bien marqué. Œil plus petit que le 1^{er} article de la massue antennaire (fig. 444). Front très souvent orné de deux grains arrondis, situés près du bord postérieur de la couronne frontale et en dedans de celui-ci. — ♀ Couronne frontale régulièrement arquée à son bord postérieur. — ♂ Couronne frontale incomplète, représentée seulement par les rangées de soies suborbitaires (fig. 324). — Long. 3-3 3/4 mill. **E. bigranulum** n. sp.
- 5-4 — Rebord inférieur de la déclivité apicale à peine sensible. Œil plus grand que le 1^{er} article de la massue antennaire (fig. 445). Déclivité apicale moins fortement déprimée le long de la suture. — ♀ Bord postérieur de la couronne frontale décrivant un angle rentrant. — Long. 3 1/2 mill. **E. Decorsei** n. sp.
- 6-3 — Déclivité apicale ponctuée au-dessous de l'apophyse latérale. Angle apico-sutural des élytres saillant. Ponctua-

tion dorsale des élytres grossière et confluyente au voisinage du bord supérieur de la déclivité apicale.

- 7-8 — Région du bord supérieur de la déclivité apicale présentant une pubescence couchée, roux doré, rendant peu distincte la sculpture sous-jacente. Long. 2 1/2-4 1/2 mill. **E. forficula** Fairm.
- 8-7 — Élytres presque glabres dans la région du bord supérieur de leur déclivité apicale, la sculpture de cette région étant par suite bien distincte. Déclivité apicale fortement ponctuée sur toute sa surface, plus nettement tronquée que chez le *forficula*. Apophyses élytrales grandes (fig. 451). Angle apico-sutural très saillant. Moitié basilaire des élytres rousse. — ♀ Sinus postoculaire de la couronne frontale très accentué (fig. 453). — Long. 4-4 1/2 mill. **E. evacanthus** n. sp.
- 9-2 — Articles 3-6 des antennes pris ensemble surpassant en longueur la moitié du premier article de la massue (fig. 443); celle-ci moins de deux fois aussi longue que le reste de l'antenne, son dernier article convexe sur les deux faces et à peine plus long que chacun des deux articles précédents.
- 10-11 — Déclivité postérieure des élytres sans calus marginal au-dessous de l'apophyse latérale; celle-ci très pointue au sommet, moins écartée de la suture que chez l'*obtusidentatus* (fig. 455). Bord apical des élytres plus épais sur sa tranche (fig. 456). Long. 4 1/2 mill. ... **E. auricomus** Reitt.
- 11-10 — Déclivité postérieure des élytres avec un calus (♀) ou un tubercule (♂) marginal au-dessous de l'apophyse latérale (fig. 459 et 458); celle-ci émoussée au sommet. — ♀ Couronne frontale régulièrement arrondie en arrière. — Long. 3 1/2-5 mill. **E. obtusidentatus** Lesn.
- 12-1 — Déclivité apicale munie au centre de deux épines contiguës insérées sur la suture (fig. 461). Râpe prothoracique composée seulement de quelques grosses dents écartées sans denticules interposés. Aire suscéphalique du pronotum large, lisse et brillante. Forme courte. Long. 2-3 1/2 mill. **E. trispinosus** Ol.

***Enneadesmus bigranulum* n. sp.**

(Voir tabl. des espèces 1, 2, 3, 4. — Fig. 444 du texte).

Long. 3-3 3/4 mill. — Cette espèce est assez voisine de l'*E. forficula* étudié plus bas. Nous en donnons seulement une description comparative.

Forme générale plus courte que chez le *forficula*. Corps brun, avec la râpe prothoracique, les calus huméraux, la base des élytres et l'extrémité de l'abdomen teintés de rouge; appendices roux ou brunâtres, à part les tibias antérieurs qui sont bruns. Yeux notablement moins grands que chez le *forficula*. Articles 3-6 des antennes pris ensemble ne surpassant pas en longueur le 2^e article, ni le quart du 7^e; ce dernier aussi long que tous les précédents réunis. Prothorax subcarré, un peu transverse, légèrement arrondi sur les côtés; aire suscéphalique très finement ponctuée. Milieu de l'aire postérieure du pronotum présentant une ponctuation fine, assez dense, râpeuse. Ponctuation des élytres assez fine et peu dense en avant, graduellement plus forte en arrière, sans toutefois devenir confluyente. Déclivité apicale déprimée longitudinalement au milieu, lisse (en ne tenant pas compte des points très fins et épars disséminés à sa surface), couverte d'une pubescence couchée roux doré assez dense, nettement rebordée intérieurement, l'angle sutural non saillant; apophyses marginales plus courtes qu'elles ne le sont en général chez le *forficula*; au-dessous de ces apophyses le tégument est lisse.




Fig. 444. — *Enneadesmus bigranulum* ♂.

♂ Couronne frontale largement interrompue en arrière, réduite aux deux rangées longitudinales longeant le bord interne des yeux.

♀ Couronne frontale non interrompue en arrière, son contour postérieur régulièrement et faiblement arqué et ne formant pas de sinus accentué au voisinage de l'orbite. Les soies frontales sont moins longues et moins fournies que chez le *forficula* ♀; leur ligne d'insertion ne détermine pas d'impression en arrière des yeux.

Le nom de *bigranulum* donné à l'espèce actuelle est destiné à rappeler la présence très fréquente sur le front de deux grains saillants,

arrondis, rapprochés, et situés entre les yeux ⁽¹⁾. Cette particularité n'a encore été observée chez aucun autre *Enneadesmus*.

Distribution géographique. — Madagascar ⁽²⁾.

***Enneadesmus Decorsei* n. sp. (♀).**

(Voir tabl. des espèces 1, 2, 3, 5. — Fig. 445 du texte).

Long. 3 1/2 mill. — Cette espèce est à la fois très voisine des *E. bigranulum* et *forficula*. Elle a le faciès de la première espèce; mais elle s'en distingue par sa forme générale plus allongée, par ses yeux beaucoup plus gros, semblables à ceux du *forficula*, par le rebord inférieur de la déclivité apicale très faible et indiqué seulement près de l'angle sutural. La déclivité est aussi moins fortement déprimée. La couronne frontale de la ♀ est plus fournie que




Fig. 445. — *Enneadesmus Decorsei* ♀.

chez le *bigranulum* et elle décrit un angle rentrant à son bord postérieur.

L'*E. Decorsei* diffère principalement du *forficula* par la ponctuation dorsale des élytres non confluyente en arrière, par la déclivité apicale imponctuée en dedans et au-dessous des apophyses marginales, par l'angle sutural des élytres qui n'est aucunement saillant.

Le front ne présente pas de grains en saillie. Les apophyses élytrales du seul individu étudié sont fort courtes et moins écartées de la suture que chez le *bigranulum*.

Distribution géographique. — Madagascar : Mevatanana (Dr Decorse in Muséum de Paris). — Type unique ♀.

***Enneadesmus forficula**.**

(Voir tabl. des espèces 1, 2, 6, 7. — Pl. I ⁽³⁾, fig. 6; fig. 442 et 446 à 450 du texte).

Fairmaire, 1883, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1883, p. 95.

(1) Des six individus examinés, un seul ♂ de Mevatanana ne présente pas ce caractère.

(2) Diégo-Suarez, en juillet, 1 ♂ (*Ch. Alluaud*); Mevatanana, 2 ♂, 1 ♀ (*Perrier de la Bathie* in *Coll. Fairmaire et Muséum de Paris*); sud-ouest de Madagascar, 1 ♂, 1 ♀ (*Coll. Rothschild* > *Oberthür*).

(3) *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1896, pl. VIII.

Auberti* Chobaut, 1897, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1897, p. 170 (1).

Long. 2 1/2-4 1/2 mill. — Corps généralement roux avec la tête noire, la poitrine, l'abdomen et la région postérieure des élytres rembrunis; souvent le prothorax est aussi rembruni. Dans quelques cas tout le dessus du corps est brun avec les épaules plus claires (2). Ver-




Fig. 446 à 450. — *Enneadesmus forficula*. Corps, vu en dessus, forme type (fig. 446); extrémité des élytres, vue en dessus, chez un exemplaire du Sud-algérien (fig. 447); tête et bord antérieur du prothorax, vus de profil, chez une ♀ à sinus postoculaire bien accentué (fig. 448); déclivité apicale des élytres, vue en dessus et de profil, chez la race *capensis* (fig. 449 et 450).

tex présentant une impression en accolade correspondant au contour postérieur de la couronne frontale; en arrière de cette impression le tégument est couvert des carinules normales du vertex, tandis qu'en avant il est finement ponctué, brillant et très finement pubescent. Articles 3-6 des antennes réunis à peine plus longs que le 2^e et plus courts que la moitié du 7^e; massue très grande, plus de deux fois aussi longue que le reste de l'antenne, son dernier article allongé, de beaucoup plus long que chacun des deux précédents, très mince et comme

(1) C'est très probablement l'*Apate spinipennis** Dejean (*Cat.*, 3^e éd., p. 334). L'exemplaire de la collection Dejean a perdu la moitié postérieure des élytres.

(2) Les exemplaires bruns dont nous parlons proviennent d'Avatchio ou Auatchio et de Bela, dans le Pays des Gallas, du lac Bass Narok et du fleuve Tana.

foliacé. Prothorax arqué sur les côtés, très légèrement élargi en arrière. Élytres finement et assez densément ponctués dans leur moitié basilaire, leur ponctuation devenant très forte et très serrée en arrière, surtout au pourtour supérieur de la déclivité apicale; dans cette région une pubescence fine, couchée, rend la sculpture moins distincte. La suture est élevée et saillante sur la déclivité apicale et, de part et d'autre de cette saillie, la déclivité est presque lisse tandis que les parties supérieures et latérales, situées au-dessus et au-dessous de l'insertion des apophyses, sont fortement ponctuées. Les apophyses, conoïdes et incurvées en dedans, sont insérées sur les bords latéraux de la déclivité, à mi-hauteur de celle-ci, et sont très pointues à l'apex. Angle sutural des élytres assez saillant. Ponctuation de l'abdomen extrêmement fine et peu dense; sa pubescence très fine, éparse.

♂ Couronne frontale peu fournie notamment au voisinage du bord postérieur de l'œil, et formée de soies moins longues que chez la ♀. Impression du vertex moins marquée, effacée auprès des yeux.

♀ Couronne frontale fournie, composée de poils roux doré, serrés, très longs, surtout au bord supérieur de la couronne. Impression du vertex bien enfoncée.

Cette forme est assez difficile à délimiter par suite de sa variabilité et de sa très proche parenté avec l' *E. evacanthus*. Sans parler de la coloration qui, dans le cas actuel, peut être considérée comme ayant quelque importance, la largeur du corps varie d'une façon notable et indépendamment du sexe, de la provenance et de la saison de récolte. Le prothorax est tantôt aussi long que large ⁽¹⁾, tantôt nettement transverse ⁽²⁾, avec toutes les proportions intermédiaires; la ponctuation de l'aire postérieure du pronotum est plus ou moins écartée. La longueur des épines élytrales varie presque du simple au double, sans toutefois qu'il y ait de variation dans leur épaisseur. Le disque de la déclivité postérieure est envahi parfois jusqu'à la suture par la forte ponctuation de ses parties latérales. Chez la ♀, l'impression du vertex décrit, au voisinage de l'œil, une courbe plus ou moins accentuée.

En Abyssinie et dans les Pays somali et galla, la taille est généralement plus petite que chez les exemplaires du Sud-algérien, avec des apophyses élytrales terminées assez brusquement en pointe alors que dans les spécimens du Maghreb ces mêmes apophyses sont régulière-

(1) Par exemple chez des individus du Sud-algérien.

(2) Fleuve Tana, etc.

ment amincies vers le bout ⁽¹⁾; mais ces caractères sont inconstants.

Une forme mieux fixée et qui mérite sans doute d'être considérée comme une race géographique, habite l'Afrique australe. Sa coloration est toujours brune avec le calus huméral roux ou rougeâtre; ses élytres sont plus allongés que chez le type de l'espèce, leur angle apico-sutural est plus saillant. La déclivité postérieure est fortement ponctuée sur le disque, sans espace lisse le long de la suture. Tous ces caractères sont faibles, mais ils paraissent très constants et justifient la création du nom de *capensis* que nous proposons pour cette race locale. Ajoutons qu'ici la longueur des apophyses élytrales varie plus encore que chez le *forficula* et que ces apophyses atteignent chez le *capensis* ♂ une longueur plus grande que dans la forme type. Par leur forme et leurs dimensions habituelles, ces épines élytrales sont intermédiaires entre celles des exemplaires de la presqu'île des Somalis et celles de l'*E. evacanthus*.

Distribution géographique. — Tunisie et Sahara algérien; Sénégal; Erythrée, Abyssinie, baie de Tadjourah, pays des Somalis et pays des Gallas jusqu'au fleuve Tana ⁽²⁾.

La race *capensis* a été trouvée au Transvaal, dans le Natal et dans la Colonie du Cap ⁽³⁾.

(1) On peut réserver à cette dernière forme le nom d'*Auberti*, mais il ne faudrait pas, nous le répétons, la considérer comme une race bien tranchée. Une conformation semblable des apophyses élytrales s'observe quelquefois parmi les exemplaires de provenance somalie.

(2) Aïn Tefel (*Sedillot*), Teboursouk (*D^r Normand*), Zaghouan (*F. Elena* in *Musée de Gènes*), Thala (*Coll. V. Mayet*). Biskra (*Bedel, M. de Vauloger*), Toumourth (*M. de Vauloger*), Gardaïa (*Aubert*).

Sénégal (*Dumoulin* in *Coll. Dejean*) (la détermination de l'individu, qui est très mutilé, n'est pas absolument certaine) : Thiès (*Coll. Aubert*).

Keren (*Ragazzi* in *Musée de Gènes*); Abyssinie (*Raffray* in *Coll. Fairmaire* et *Coll. Oberthür*); Obok (*Laligant, Maindron, D^r Faurot*, etc.); Somalie anglaise : Ouadda (*D^r Jousseau* in *Muséum de Paris*), Berbera (*Coll. Argod-Vallon*); « Ill, Somali Isa » (*Antinori* in *Musée de Gènes*); « Pozzi Maddo » (*Bottego* in *Musée de Gènes*). Pays des Gallas Aroussi et Boran : cours de la Ganana, de la Daoua et de la Ganale Gouda (*E. Ruspoli, V. Bottego* in *Musée de Gènes*).

Afrique orientale anglaise : Banas (*E. Ruspoli* in *Musée de Gènes*); lac Bass Narok (*V. Bottego* in *Musée de Gènes*); Fleuve Tana (*Musée de Vienne*).

(3) Transvaal et Natal (*Péringuey* in litteris). Colonie du Cap (*Drège* in *Musée de Stockholm* et *Coll. de Marseul*; *Coll. Dejean, Muséum de Paris, Musée de Berlin, Coll. Oberthür*) : Bedford et Dunbrody (*O' Neil* in *Coll.*

Biologie. — Cette espèce vit notamment dans le Gommier (*Acacia tortilis*) (1). L'adulte vole le soir au coucher du soleil (2).

***Enneadesmus evacanthus* n. sp.**

(Voir tabl. des espèces 1, 2, 6, 8. — Fig. 451 à 454 du texte).

Long. 4-4 1/2 mill. — Cette forme est très voisine de l'*E. forficula* dont elle a la coloration habituelle rousse avec la tête et la région postérieure des élytres brun foncé. Le corps est un peu plus robuste que chez le *forficula*, le prothorax est plus carré, moins arrondi sur les côtés. Les élytres sont glabres et brillants en arrière; la région du bord supérieur de la déclivité apicale, couverte d'une sculpture grossière, très nettement apparente, montre, de chaque côté, les extrémités costiformes d'une ou de deux nervures dorsales, fait que l'on n'observe pas dans le *forficula* type, mais qui existe parfois à un degré très faible dans la race *capensis*. La déclivité apicale elle-même est plus abrupte et mieux délimitée supérieurement que chez le *forficula* et ses parties discoidales sont fortement ponctuées; les apophyses marginales sont plus développées que dans aucune




Fig. 451 à 454. — *Enneadesmus evacanthus*. ♂, vu en dessus (fig. 451); tête de la ♀, vue de devant et de profil (fig. 452 et 453); déclivité apicale des élytres, vue de profil, chez une ♀ (fig. 454).

autre forme du genre, courbées en faux et terminées par une petite

Bedel; Musée de Cape-Town; Coll. Oberthür; Port-Elizabeth (D' Ch. Martin).

Un exemplaire de la collection Oberthür, provenant de la collection Schmidt, porte l'étiquette « Brésil ».

(1) Au moins dans la forêt de Thala, en Tunisie (Coll. V. Mayet).

(2) D'après L. Bedel. — L'espèce a été trouvée à Ghardaia en mars, à Biskra en juin et dans le nord de la Tunisie en juillet.

pointe excentrique paraissant comme surajoutée. L'angle apico-sutural et très saillant. Chez la ♀ le sinus postoculaire de la couronne frontale est très accentué et les soies frontales sont très longues.

Il est possible que l'*Enneadesmus evacanthus* ne soit qu'une race géographique de l'espèce précédente.

Distribution géographique. — Abyssinie et pays des Somalis ⁽¹⁾.

***Enneadesmus auricomus* *.**

(Voir tabl. des espèces 1, 9, 10. — Fig. 455 et 456 du texte).

Reitter, 1898, *Wien. ent. Zeit.*, XVII, p. 13 (♂).

? *bidentatus* Olivier, 1795, *Ent.*, IV, n° 77, p. 16, pl. III, f. 20 ⁽²⁾.

Long. 4 mill. — Allongé, parallèle, d'un brun un peu rougeâtre, avec les appendices roux, à part les tibias antérieurs qui sont bruns.

Cette espèce est très voisine de la suivante, *E. obtusidentatus*. Elle en diffère surtout par la pubescence dorsale plus apparente, par la forme des apophyses élytrales qui sont ici aiguës et très pointues en même temps qu'elles sont plus rapprochées de la suture; par l'absence de calus inféro-latéral sur les bords de la déclivité postérieure; par l'épaississement bien plus marqué du bord apical des élytres.

En outre, la ponctuation de l'aire suscéphalique du prothorax est beaucoup moins forte que chez l'*obtusidentatus*; celle du milieu de l'aire postérieure du pronotum est à peine râpeuse et d'une finesse extrême. Les côtés du prothorax sont finement et peu densément pubescents en arrière.




Fig. 455 et 456. — *Enneadesmus auricomus*. Corps, vu en dessus, et déclivité apicale des élytres, vue de profil et de trois quarts.

(1) Abyssinie (A. Raffray in *Muséum de Paris et Coll. Oberthür*); Berbera à Milmil, en août (*Coll. Rothschild > Oberthür*); Lugh, en novembre-décembre (V. Bottego in *Musée de Gènes*). — 3 ♂, 1 ♀.

(2) Cette synonymie est très probable. Le dessin original correspondant à la figure de l'*Entomologie* nous a été obligeamment communiqué par M. Ernest Olivier. Il indique une ponctuation éparsée sur la région dorsale des

Les élytres, densément et assez fortement ponctués en dessus et sur les côtés, présentent une pubescence blonde, couchée, assez dense et assez longue. La déclivité apicale est moins déprimée au milieu. Il n'y a pas d'espace lisse et brillant de chaque côté de la suture sur la déclivité; cette région est éparsement et assez finement ponctuée et modérément pubescente comme le reste de la déclivité.

Les autres caractères sont identiques à ceux de *l'obtusidentatus*.

Distribution géographique. — Boukharie (1).

***Enneadesmus obtusidentatus* *.**

(Voir tabl. des espèces 1, 9, 11. — Fig. 457 à 459 du texte).

Lesne, 1899, *Bull. du Mus. d'Hist. Nat.*, 1899, p. 228, fig.

Long. 3 1/2-5 mill. — Oblong-allongé, subparallèle, très légèrement élargi en arrière. Roux ou roux brunâtre, brillant, la partie postérieure




Fig. 457 à 459. — *Enneadesmus obtusidentatus*. Avant-corps du ♂, vu de profil (fig. 457) et déclivité apicale des élytres, vue en dessus, chez le ♂ (fig. 458) et chez la ♀ (fig. 459).

du prothorax et la base des élytres généralement plus claires que le reste du dessus du corps; disque de l'abdomen brun; appendices roux avec les tibias antérieurs presque toujours bruns. Pubescence dorsale fine et peu apparente. Couronne frontale décrivant en arrière un arc de cercle régulier, rappelant beaucoup d'ailleurs celle de *E. forficula* mais formée de soies moins longues. Milieu du front

élytres et la saillie de la suture sur la déclivité, particularités omises par le graveur. Le type du *Bostrychus bidentatus* est perdu; il avait été recueilli en Syrie par Labillardière.

(1) Et probablement aussi Syrie (v. la note précédente). Le type unique et seul spécimen connu de *E. auricomus*, qui est un individu mal conformé, fait actuellement partie de la collection de M. E. Reitter.

densément et très finement pubescent. Vertex non impressionné. Articles 3-6 des antennes pris ensemble plus longs que la moitié du 7^e, le dernier article de la massue ovale, à peine plus long que chacun des précédents, non aminci en lame d'épaisseur uniforme. Prothorax légèrement transverse, légèrement rétréci en avant, peu fortement arqué sur les côtés; aire suscéphalique densément, assez fortement et un peu râpeusement ponctuée. Milieu de l'aire postérieure du pronotum avec des grains râpeux peu denses. Élytres fortement et densément ponctués, leur sillon marginal graduellement atténué en arrière. Déclivité apicale lisse et brillante de chaque côté de la suture, munie de chaque côté, sur ses bords latéraux, au niveau du milieu de sa hauteur, d'une apophyse épaisse, courte et conique, émousée à l'apex et présentant un calus saillant au-dessous de cette apophyse. Suture élevée sur la déclivité. Angle apico-sutural à peine saillant.

♂ Calus inféro-marginal de la déclivité plus saillant, tuberculiforme. Disque de la déclivité entièrement lisse et brillant.

♀ Calus inféro-marginal de la déclivité faible. Disque de la déclivité imponctué seulement suivant deux bandes étroites longeant la suture.

Distribution géographique. — Bassin méridional de la mer Rouge et bassin du golfe d'Aden; Mésopotamie (1).

Enneadesmus trispinosus.

(Voir tabl. des espèces 12. — Fig. 259, 443 et 460 à 463 du texte.)

Olivier, 1795, *Ent.*, IV, n° 77, p. 16, pl. III, f. 19. — Mulsant, 1851, *Mém. de l'Ac. de Lyon*, cl. des Sciences, 1851, p. 205 (*Opusc. ent.*, 1, p. 75). — Zoufal, 1894, *Wien. ent. Zeit.*, XIII, p. 40. — Schilsky, 1899, *Käf. Eur.*, XXXVI Heft, 90.

var. *Lesnei* * Chobaut, 1898, *Rev. d'Ent.*, XVII, p. 81.

Long. 2-3 1/2 mill. — Court, parallèle, très légèrement élargi en arrière. Tête, écusson, parties postérieures des élytres, poitrine et abdomen bruns; prothorax et base des élytres roux, la dernière de

(1) Gueleb (Erythrée) (*Penzig in Musée de Gênes*); Assab (*Ragazzi in Musée de Gênes*); Obok (*M. Maindron in Muséum de Paris*; *Laligant in Coll. Bedel et Coll. Fairmaire*; *Coll. Léveillé*) et Djibouti (*Dr Ch. Martin*); Aden (*A. Raffray in Coll. Bedel*); vallée de Dörfou (Choa) (*Ragazzi in Musée de Gênes*); Bagdad (*Coll. Pic*). — A part le spécimen de Gueleb et celui de Bagdad, tous les individus cités sont des types.

teinte plus pâle que le prothorax; appendices roux clair avec les tibias antérieurs, les cuisses postérieures et souvent les intermédiaires rembrunies. La teinte pâle de la base des élytres est parfois réduite à une étroite bande basilaire élargie près de la suture; dans d'autres cas elle occupe au contraire la moitié antérieure des élytres.

Tête légèrement déprimée dans la région circonscrite par la couronne frontale, cette région râpeusement et assez densément ponctuée, couverte d'une pubescence couchée extrêmement fine. Vertex non impressionné. Couronne frontale peu fournie, régulièrement arquée au bord postérieur. Articles 3-7 des antennes pris ensemble atteignant les trois quarts de la longueur du 8^e article. Dernier article de la massue ovale plus long que chacun des deux précédents. Prothorax transverse, légèrement rétréci en avant, ses côtés assez forte-




Fig. 460 à 463. — Déclivité apicale des élytres, vue de profil et de dessus, chez *Enneadesmus trispinosus* forme type (fig. 460 et 461) et chez sa variété *Lesnei* (fig. 462 et 463).

ment arqués; aire suscéphalique large, brillante, marquée d'une ponctuation extrêmement fine; dents de la râpe grosses et espacées, sans denticules interposés. Ponctuation du milieu de l'aire postérieure du pronotum éparsée et extrêmement fine, à peine râpeuse. Élytres peu densément et assez finement ponctués, leur troncature apicale parfaitement délimitée, régulièrement circulaire, convexe sur le disque, plus fortement et plus régulièrement ponctuée que les parties dorsales des élytres, très finement et très brièvement pubescente ⁽¹⁾ et ciliée sur ses bords supérieur et latéraux de poils blond clair dressés, puis recourbés vers le centre de la déclivité. Une longue apophyse conoïde, incurvée en dedans et très pointue au sommet, est insérée au bord inféro-latéral de la dé-

clivité; sa longueur, qui ne varie guère, dépasse le double de sa largeur de base. La suture est saillante sur la déclivité et présente au niveau du milieu de la hauteur de celle-ci deux fortes épines contiguës à la

(1) Mulsant parle d'un aspect particulier que présente la déclivité apicale de cette espèce et qui fait paraître cette région comme couverte de filaments cryptogamiques ou d'une sorte de toile d'Araignée. Le fait est, en effet, fréquent, mais il provient simplement d'une exsudation graisseuse ayant eu lieu *post mortem*.

base, longues et très pointues. Épisternes métathoraciques larges. Abdomen finement et peu densément ponctué et pubescent.

Dans le Sud-algérien existe une forme très voisine du *trispinosus* (*E. Lesnei* Chob.), mais qui ne paraît pas en être spécifiquement distincte. Elle diffère du *trispinosus* type par ses apophyses élytrales plus courtes, plus larges, moins de deux fois aussi longues que larges à la base et à peine incurvées, par les épines suturales plus petites et insérées un peu plus bas sur la déclivité, par la ponctuation de l'aire postérieure du pronotum et des élytres plus forte. — Long. 3 1/2 mill. ⁽¹⁾.

Distribution géographique. — Provence, Corse, Andalousie, Sahara algérien et tunisien, Basse-Égypte, Mésopotamie ⁽²⁾.

Biologie. — En Provence et en Corse, cette espèce vit dans les branches coupées ou mortes des Tamarix (*E. Abeille de Perrin in litt.*). C'est aussi dans un Tamarix que Schneider l'a observée en Égypte ⁽³⁾. Dans le Sahara algérien et tunisien, elle se développe dans la nervure médiane des feuilles sèches du Dattier ou « djerids » (*R. Oberthür, Dr Normand in litt.*) La galerie larvaire est longitudinale; celle qui livre passage à l'insecte parfait est transverse, perpendiculaire à la première (*Mulsant, Dr Normand*). Les adultes apparaissent surtout en mai ⁽⁴⁾; ils sortent et volent entre 4 heures et 6 heures du soir, mais ils ne viennent pas aux lumières ⁽⁵⁾.

L'Enneadesmus trispinosus a pour ennemis un Histéride, le *Tere-*

(1) Le spécimen type de l'*E. Lesnei* est en entier d'un roux fauve; le front et la déclivité apicale sont glabres; mais les *trispinosus* qui ont été conservés dans de mauvaises conditions et qui se sont décomposés prennent la même teinte et perdent leur pilosité.

(2) Env. de Draguignan (*Doublier*); Sainte-Baume et Marseille (*E. Abeille de Perrin*); Corse (*Damry, etc.*); Porto Vecchio (*E. Abeille de Perrin*). Cordoue (*C. Morel*). Ghardaïa (var. *Lesnei*) (*Bayonne in Coll. Chobaut*); Biskra (*R. Oberthür*); Touggourth (*Pic, M. de Vauloger*); Kebilli (*Dr Normand*). Ramleh (Alexandrie) (*Schneider*). Mésopotamie (*Olivier*).

Mulsant, rappelant qu'*Olivier* était originaire de Fréjus, suppose qu'il avait capturé son *Bostrychus trispinosus* pendant un de ses séjours en Provence et qu'il l'avait ensuite mélangé par mégarde avec les insectes rapportés par lui de son voyage en Orient.

(3) Dans les fourches des branches (*Astgabel*), dit *Schneider* (*Sitzb. Isis, Dresde, 1871, p. 43*).

(4) Observations du *Dr Normand*, faites à Kebilli en 1897.

(5) D'après le *Dr Normand*. Cependant *M. Bayonne* aurait pris aux lumières l'exemplaire de Ghardaïa.

trius brunneus Lewis et un Cléride, le *Macrotelus pallicolor* Fairm. (Dr Normand).

Genre **Xylogenes** n. g.

(Voir tabl. des genres 1, 31, 32, 34, 36, 38.)

Corps court. Tête large, les yeux relativement petits, bien détachés des tempes. Une couronne pileuse frontale incomplète. Bord antérieur de l'épistome denté de chaque côté de la base du labre et échancré en arc de cercle entre les dents. Mandibules dissemblables, celle de gauche assez pointue, celle de droite largement arrondie au sommet. Antennes de neuf articles, les deux premiers articles de la massue un peu allongés et présentant chacun, sur chaque face, deux grandes dépressions bien délimitées ⁽¹⁾. Prothorax dépourvu de suture latérale, son aire suscéphalique grande. Élytres sans tubercules ni épines. Tibias antérieurs fortement comprimés, leur tranche externe graduellement amincie vers l'apex.

♀ Dernier segment apparent de l'abdomen échancré au milieu du bord postérieur.

La seule espèce du genre appartient à la faune méditerranéenne orientale. Elle est particulièrement intéressante en ce qu'elle contribue à rattacher entre eux les genres des types *Xylopertha* et *Sinoxylon*.

Xylogenes dilatatus.

(Fig. 464 et 465 du texte).

Reitter, 1889, *Verhandl. d. Naturf. Vereines in Brünn*, XXVII Band, p. 112 (tirage à part, p. 22). — Zoufal, 1894, *Wien. ent. Zeit.*, XIII, p. 39. — Schilsky, 1899, *Käf. Eur.*, XXXVI Heft, 91 (♀).

Long. 4 1/2-5 1/2 mill. — Corps large, trapu, comme celui des *Sinoxylon*; élytres rappelant beaucoup ceux du *Sinoxylon subretusum* Anc. Tête, moitié postérieure des élytres, poitrine et abdomen, sauf la base du dernier segment, bruns; pièce basilaire de la tête, deux taches transverses sur l'épistome, prothorax, moitié antérieure des élytres, base du dernier segment abdominal et appendices roux, les pattes étant plus pâles; tibias antérieurs bruns. Téguments assez brillants.

(1) Ces dépressions sont ovalaires et longitudinales.


Front et épistome finement et densément ponctués, le premier lisse en arrière. Vertex non impressionné. Couronne frontale représentée de chaque côté par une rangée longitudinale de longues soies dressées située à quelque distance du bord interne de l'œil. Suture fronto-clypéale fine, sulciforme, en accolade. Articles 3-6 des antennes pris ensemble de même longueur que le 7^e. Prothorax transverse, légèrement élargi dans sa moitié antérieure, ses côtés faiblement arqués; aire suscéphalique finement ponctuée et comme chagrinée; dents de la râpe mêlées de denticules, la dent antéro-latérale insérée à distance du bord du prothorax. Ponctuation du milieu de l'aire postérieure du pronotum extrêmement fine, éparse, râpeuse. Élytres très légèrement élargis en arrière, finement ponctués vers la base, un peu plus fortement au voisinage de la déclivité apicale, la longueur de leur région dorsale, prise sur la suture, sensiblement égale à leur largeur aux épaules. Déclivité apicale nettement tronquée et bien délimitée par une côte circulaire effacée seulement près de la suture; surface de la déclivité légèrement bombée sur chaque élytre, déprimée suivant la suture surtout inférieurement, assez fortement ponctuée vers le haut, très finement dans sa moitié inférieure. Suture saillante sur la déclivité. Sillon marginal des élytres presque nul en arrière, le bord latéral présentant une faible encoche près du tournant apical. Parties postérieures des élytres et déclivité couvertes d'une pubescence dense, courte, extrêmement fine. Abdomen finement et densément ponctué et pubescent. Tibias postérieurs avec de longues soies au côté externe.

♀ Dernier segment abdominal apparent plus long que chacun des trois précédents, étroitement et profondément échancré en arrière. De chaque côté, l'angle limitant cette échancrure est dentiforme. Bord inféro-apical des élytres épaissi, légèrement réfléchi, mais simple.

Distribution géographique. — Syrie, Mésopotamie et District transcaspien (1).

(1) Syrie (*Helper in Coll. Laferté > de Marseul*); Mésopotamie (*Schmidt-*

465



464

Fig. 464 et 465. —
Xylogenes dilatatus ♀.

Genre **Octodesmus** n. g.

(Voir tabl. des genres 1, 31, 39).

Front simple, convexe, sans couronne de soies dressées. Yeux bien détachés des tempes. Mandibules toutes deux pointues au sommet. Antennes de huit articles, leur massue triarticulée, notablement plus longue que le reste de l'antenne, chacun de ses articles muni sur chaque face de deux grandes dépressions parfaitement délimitées. 1^{er} article de la massue plus long que les articles 3-5 réunis; 2^e article de la massue légèrement transverse. Prothorax dépourvu de suture latérale; dents de la râpe grosses et peu nombreuses, sans denticules interposés. Déclivité apicale des élytres munie de chaque côté d'une forte épine. Face externe des tibias antérieurs non sillonnée, amincie vers l'apex ⁽¹⁾.




Fig. 466 et 467. — *Octodesmus parvulus*. Antenne et tibia antérieur, vu par la face externe.

♂ Derniers segments abdominaux simples, le 5^e sans pièces pleurales visibles.

♀ 4^e segment abdominal apparent biépiqueux à son bord postérieur, le 5^e profondément échancré au milieu.

Genre indien, remarquable surtout par la réduction du nombre d'articles des antennes. Les deux espèces qu'il renferme diffèrent l'une de l'autre par de nombreuses particularités.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- 1-2 — Épistome légèrement échancré en arc de cercle au milieu de son bord antérieur. Bord interne de l'épistérne métathoracique rectiligne. Prothorax subcarré, un peu transverse (fig. 468), son aire suscéphalique aussi large que haute, lisse et brillante. Épines de la déclivité apicale

Gæbel in *Musée de Vienne*); District transcaspien : Pul-i-chatum en fin avril (Expédition Radde, Walter et Konschtn in *Coll. Reitter*), individu type.

(1) En outre, la suture fronto-clypéale, insensible ou à peine marquée sur les côtés, est fortement enfoncée en fovéole au milieu. La dent antéro-latérale du prothorax est insérée à quelque distance du bord.

insérées en dedans des bords. — ♀ 5^e segment abdominal échancré sur plus du tiers de sa largeur, visible seulement sur les côtés (fig. 469). — Long. 2 1/2 mill.

..... **O. parvulus** Lesn.

2-1 — Bord antérieur de l'épistome avancé au milieu en un lobe court et large. Épisterne métathoracique élargi au milieu, arqué au bord interne (fig. 472). Prothorax moins large (fig. 471), son aire suscéphalique petite et étroite, finement râpeuse. Épines de la déclivité postérieure marginales. — ♀ 5^e segment abdominal échancré sur moins du quart de sa largeur (fig. 470). — Long. 4-5 1/2 mill.

..... **O. episternalis** n. sp.

Octodesmus parvulus * (♀).

(Voir tabl. des espèces 1. — Fig. 466 à 469 du texte).

Lesne, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 19.

Long. 2 1/2 mill. — Allongé, parallèle; testacé, avec la moitié antérieure des élytres pâle, la tête, la région de la râpe prothoracique et la déclivité apicale des élytres rembrunies. Tête régulièrement convexe en dessus. Front assez finement et assez densément ponctué. Bord antérieur de l'épistome légèrement échancré en arc de cercle sur la largeur correspondant à l'insertion du labre et angulé à angle droit de chaque côté de cette échancrure. Yeux assez gros. 2^e et 6^e articles des antennes plus longs, chacun, que les articles 3-5 pris ensemble; 2^e article de la massue transverse, un peu plus court que le précédent. Prothorax subcarré, assez fortement rétréci en avant, ses côtés parallèles en arrière sur plus de la moitié de leur longueur; aire suscéphalique à peu près aussi large que haute, très brillante, lisse, à part une ponctuation extrêmement fine et peu dense. Milieu de l'aire postérieure du pronotum très finement et peu densément ponctué, sans sculpture râpeuse. Angle antéro-latéral du prothorax assez fortement ponctué. Ponctuation des élytres assez forte et assez dense sur les parties dorsale et latérales, moins nette sur la déclivité apicale. Celle-ci ne présente pas de carènes marginales et se raccorde au dos des élytres par une surface courbe ménagée. Elle est munie de chaque côté, sur le disque, d'une forte épine comprimée dans le sens dorso-ventral, légèrement




Fig. 468. — *Octodesmus parvulus*.

falquée et incurvée en dedans, et insérée au-dessus du milieu de la hauteur de la déclivité. Cette épine est très pointue au sommet; son bord interne est angulé vers le milieu et son bord externe forme une carène qui se prolonge sur le plan de la déclivité jusqu'au bord supéro-latéral de celle-ci. Suture saillante sur la déclivité. Angle apico-sutural simple, à part un très petit tubercule inséré tout contre la suture, immédiatement avant l'apex. Bord inféro-apical des élytres coupant. Face externe des tibias postérieurs avec des soies modérément longues.

♀ Bord postérieur du 4^e segment apparent de l'abdomen armé de deux épines assez écartées, notablement moins longues que le segment suivant et dirigées en arrière suivant le plan de l'abdomen. 5^e segment profondément échancré sur plus du tiers de sa largeur, visible seulement sur les côtés et laissant apparaître le sternite suivant.

Distribution géographique. — Inde, Province de Bombay: Belgaum, pris en février, à la lumière (H.-E. Andrewes in Coll. Bedel). — Type unique.

***Octodesmus episternalis* n. sp.**

(Voir tabl. des espèces 2. — Fig. 470 à 472 du texte).

Long. 4-5 1/2 mill. — Allongé, parallèle; roux, avec le prothorax et le dessous de la tête rougeâtres; râpe prothoracique, région postérieure des élytres et tibias antérieurs bruns; dessus de la tête brun foncé. Tête régulièrement convexe en dessus à part une zone légèrement dé-




Fig. 469 et 470. — Extrémité postérieure de l'abdomen, vue en dessous, chez les *Octodesmus parvulus* ♀ (fig. 469) et *episternalis* ♀ (fig. 470).

primée à la limite du vertex et du front; celui-ci densément granuleux. Bord antérieur de l'épistome avancé au milieu en un lobe court, sur une largeur correspondant à celle du labre. Yeux assez petits. Prothorax fortement rétréci en avant, près de deux fois aussi large

en arrière qu'à son bord antérieur, assez fortement arqué sur les côtés; aire suscéphalique petite, finement rugueuse, avec un faible sillon médian. Aire postérieure du pronotum marquée d'une ponctuation extrêmement fine et peu serrée. Ponctuation des élytres dense et assez forte sur le dos et sur les côtés. Déclivité apicale concave, lisse, brillante et presque glabre, imponctuée ⁽¹⁾; dents marginales insérées un peu au-dessus du milieu de sa hauteur, conoïdes, incurvées en dedans et régulièrement amincies en pointe vers l'apex, carénées à la base en dessus. Bord supérieur de la déclivité nettement marqué; bords inféro-latéraux et inférieur assez largement rebordés, le rebord ne s'étendant pas vers le haut jusqu'à l'épine marginale. Suture élevée et saillante sur la déclivité. Bord latéral des élytres présentant en arrière un large sillon; bord inféro-apical épais. Épistérne métathoracique très large, convexe, arqué au bord interne. Tibias antérieurs assez fortement élargis vers l'apex où ils présentent sur la face antérieure une légère concavité longitudinale; face externe des mêmes tibias graduellement rétrécie vers l'extrémité. Tibias postérieurs avec de longues soies blond clair au côté externe.




Fig. 471. — *Octodesmus episternalis*.




Fig. 472. — Arrière-corps de l'*Octodesmus episternalis* ♂, vu de trois quarts en dessous.

♂ Bord inféro-apical des élytres inerme, montrant seulement de chaque côté, un très léger sinus à quelque distance de la suture; angle sutural non ou à peine saillant. Derniers segments abdominaux simples.

♀ Bord inféro-apical des élytres denté de chaque côté en dedans et nettement échancré en dehors de cette dent; angle sutural assez saillant. 4^e segment apparent de l'abdomen muni au milieu de son bord postérieur de deux épines très fines, assez longues et assez rapprochées, dirigées en arrière; 5^e segment échancré sur presque toute sa longueur dans l'intervalle de ces épines.

Cette espèce est le seul Bostrychide connu dont l'épistérne métathoracique soit arqué au bord interne.

(1) Ou ponctuée seulement à son bord supérieur.

Distribution géographique. — Birmanie (Pays des Karen) et Inde septentrionale (1).

Genre. **Xylonthrips** n. g.

(Voir tabl. des genres 40, 41).

Front s'étendant en arrière un peu au delà du bord postérieur des yeux et portant des soies dressées. Suture fronto-clypéale biarquée, en forme d'accolade, fortement imprimée au milieu. Bord antérieur de l'épistome échancré au milieu en arc de cercle sur une largeur égale à



Fig. 473. — Antenne du *Xylonthrips religiosus*, vue par la face postérieure.

celle du labre, les angles limitants de cette échancrure arrondis. Mandibules pointues au sommet. Yeux assez gros, bien détachés des tempes. Antennes de 10 articles, les articles 3 à 7 pris ensemble de longueur sensiblement égale à celle du 8^e article; massue environ deux fois aussi longue que le reste de l'antenne, formée d'articles allongés, assez minces, dépourvus de grandes dépressions. Prothorax transverse, fortement rétréci en avant, assez fortement arqué sur les côtés, offrant en arrière une suture latérale très nette, coudée sur l'angle postérieur et brièvement prolongée le long de la base. Angles antérieurs du prothorax bien accusés et prolongés chacun en une assez longue dent uncinée. Stigmates prothoraciques très grands, latéraux. Sillon marginal des élytres profond en arrière; déclivité apicale bordée supérieurement de tubercules mousses. Pièces pleurales du 5^e segment abdominal visibles dans les deux sexes, très étroites. Tibias antérieurs normaux, sillonnés à la face externe et munis sur la face antérieure d'une rangée de soies courtes, dorées. Tibias postérieurs avec des soies longues, peu nombreuses, au côté externe.

♂ Front légèrement gibbeux, avec des soies dressées courtes ou rares. 5^e segment abdominal nullement échancré, ses pièces pleurales

(1) « Carin Cheba » et « Asciuii Cheba », de 900 à 1.300 mètres d'altitude (L. Fra in Musée de Gênes, Muséum de Paris et Coll. Oberthür), 10 individus ♂♀; Inde boréale (Bacon in Coll. Laferté > de Marseul), un ♂.

glabres, lisses et brillantes, atteignant presque la ligne médiane en arrière.

♀ Pilosité du dessus de la tête disposée sur le front en une couronne de soies rousses, bien fournie, et en deux touffes denses de poils insérés sur l'épistome. 5^e segment abdominal légèrement retroussé au milieu du bord postérieur, ce qui le fait paraître échancré, ses pièces pleurales pubescentes, moins longues que chez le ♂.

Les *Xyllothrips* habitent la région indo-malaise, les archipels de l'océan Pacifique et Madagascar.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- 1-2 — Pli inféro-latéral de la déclivité postérieure relié au bord inférieur (fig. 474) et interrompant brusquement le sillon marginal des élytres. Bord inféro-apical des élytres obtusément tuberculé. Angle antéro-latéral du prothorax sans ponctuation nette. Ponctuation dorsale des élytres généralement très fine, sauf près du bord de la déclivité. — ♂ Front sans soies dressées au milieu ou seulement avec quelques soies disposées en arc de cercle. — Long. 6-8 1/2 mill. **X. flavipes** Ill.
- 2-1 — Pli inféro-latéral de la déclivité non rattaché au rebord inférieur de celle-ci (fig. 475); sillon marginal des élytres prolongé sur la déclivité. Angle antéro-latéral du prothorax densément et nettement ponctué. Ponctuation dorsale des élytres presque toujours forte, sauf près de la base. Teinte générale du corps plus foncée que chez le *flavipes*. — ♂ Une couronne frontale formée de soies courtes mais denses. — Long. 5-8 1/2 mill. **X. religiosus** Boisd.

***Xyllothrips flavipes*.**

(Voir tabl. des espèces 1. — Pl. I, f. 16; fig. 256, 257 et 474 du texte).

Illiger, 1801, *Mag. für Insekt.*, Heft 1-2, p. 171 (♂).

dominicanus Fabricius, 1801, *Syst. Eleuth.*, II, p. 380 (♀)⁽¹⁾. — Lesne, 1895, *Bull. Soc. Ent., Fr.*, 1895, p. CLXXVIII.

(1) La préface des cahiers 1 et 2 du *Magazin* d'Illiger est datée de mars 1801. Le premier volume du *Systema Eleutheratorum* porte la date du 10 avril 1801.

*sinuatus** ‡ Stephens (non Fabricius), 1830, *Illustr. of Brit. Ent.*, III, p. 351, pl. XIX, f. 6. — Spry et Shuckard, 1840, *Brit. Col. del.*, p. 44, pl. 53, f. 4.

religiosæ Fairmaire, 1850, *Rev. et Mag. de Zool.*, 2^e sér., II, p. 50 (in part.).

*mutilatus** Walker, 1858, *Ann. and Mag. of Nat. Hist.*, 3^e sér., II, p. 286. — Ch.-O. Waterhouse, 1888, *Ann. and Mag. of Nat. Hist.*, 6^e sér., I, p. 349.

iracundus Snellen van Vollenhoven, 1869, *Rech. sur la faune de Madagascar*, 5^e part., p. 10, pl. I, f. 7 ⁽¹⁾.

Long. 6-8 1/2 mill. — Généralement d'un brun chocolat, plus foncé sur les parties postérieures des élytres, souvent rougeâtre en entier;



474



475

Fig. 474 et 475. — Déclivité apicale des élytres, vue de trois-quarts, chez les *Xylotrips flavipes* (fig. 474) et *religiosus* (fig. 475).

dessous moins foncé, surtout sur l'abdomen; antennes rousses, avec la massue souvent brune; cuisses testacées, tibias et tarses brunâtres. Dents de la râpe prothoracique mêlées de denticules qui envahissent presque toujours aussi l'aire suscéphalique. Angle antéro-latéral du prothorax souvent ridé ou obsolètement ponctué. Aire

postérieure du pronotum lisse ou très finement ponctué. Ponctuation des élytres fine et peu dense en avant, forte au voisinage de la déclivité, très forte dans la moitié supérieure de celle-ci, assez fine dans la moitié inférieure. Déclivité apicale munie de chaque côté de trois tubercules marginaux émoussés dont le médian est le plus gros et le plus saillant, et d'un pli inféro-latéral lisse et brillant qui fait suite sans interruption au rebord inférieur. Suture élevée sur la déclivité. Le bord de l'élytre est marqué d'un ou de plusieurs tubercules mousses près de l'angle sutural qui est légèrement saillant. Poitrine et abdomen couverts d'une pubescence roux doré très fine et très dense.

♂ Front transversalement convexe, densément et très finement

(1) *Apate dominicana** Eschscholtz et *A. macrocera** Latreille, in Dejean, *Cat.*, 3^e éd., p. 334.

ponctué, très finement pubescent, avec quelques rares poils dressés, notamment auprès des yeux. Épistome avec une bande transverse de poils rebroussés vers le haut; cette bande est interrompue au milieu.

♀ Couronne frontale très fournie, en arc de cercle ou affectant la forme d'un V très ouvert, assez distante de l'œil latéralement. Touffes clypéales formées de poils aussi longs que ceux du front.

Variété de coloration : Tête, prothorax, poitrine, abdomen et une large tache commune basilaire sur les élytres d'un roux testacé, le reste des élytres brun foncé (1). Cette variété qui se rattache au type par des transitions est remarquable par la démarcation nette de la tache élytrale.

Distribution géographique. — Espèce très répandue à la fois à Madagascar et dans les îles voisines et dans les contrées de faune indo-malaise. Le détroit des Moluques, celui de Bourou et le canal qui sépare Cérâm et les Moluques du Sud-Est des péninsules occidentales de la Nouvelle-Guinée paraissent former du côté de l'Est les limites de son aire d'habitat, les îles Arou étant le point extrême atteint vers l'orient. Le *Xylothrips flavipes* n'a pas encore été signalé dans les îles de la Sonde situées à l'est du détroit de Lombok (2).

(1) Philippines (*Ch. Semper* in *Coll. Oberthür*), un individu de 8 1/2 mill.

(2) Madagascar, très répandu dans la partie septentrionale : Nossi-Bé (*Snellen van Vollenhoven*, *Pierron*, etc.); Vohémar (*G. Grandidier*); baie d'Antongil (*A. Mocquerys*); Sainte-Marie (*Perrot* in *Coll. Oberthür*); Pays antisanaka (*id.*). Comores : Mayotte (*Coll. Alluaud*). Séchelles : Mahé (*Ch. Alluaud*; *Coll. Fairmaire*). La Réunion (*Coll. Dejean* > *de Marseille*; *Rousseau* in *Muséum de Paris*). I. Maurice (*Desjardins* [« sur le *Ficus religiosa* », cf. *Fairmaire*, *Rev. et Mag. de Zool.*, 1850, p. 50]; *Leschenault* in *Muséum de Paris*; etc.).

Inde méridionale et nord-orientale : Maïssour (*Coll. Boularel*); Shimoga (*Coll. Oberthür*); Travancore (*Coll. F. Moore* > *Oberthür*; *P. Castets* in *Coll. Oberthür*); Ceylan (*Walker*; *D^r W. Horn*; *Muséum de Paris*; *Musée de Berlin*, etc.). Tetara (Bengale) (*Musée de Bruxelles*); Sylhet (*British Museum*) : Monts Khasia (*Coll. Oberthür*); Sikkim (*Coll. Oberthür*); Bhoutan anglais : Maria Basti (*Coll. Oberthür*).

Toute l'Indo-Chine, très commun. A été rencontré au nord jusqu'à Bhamo, sur le Haut-Irraoudi (*L. Fea* in *Musée de Gènes* et *Coll. Oberthür*) et le long de la frontière septentrionale du Tonkin : env. de Lao-Kay (*Ch. Dupont* in *Muséum de Paris*); Haut-Song-Chai (*Rabier* in *Muséum de Paris*); Bac-Kan (*C^m Roget* in *Muséum de Paris*); N. O. de Bao-Lac (*D^r Battarel* in *Coll. Oberthür*); Pho-Binh-Gia (*L. Florentin* in *Coll. Bedel*).

Ile San-Nan (Nambou-Soto) : Ishigaki Sima (*Coll. Oberthür*).

Xylothrips religiosus.

(Voir tabl. des espèces 2. — Fig. 32, 473 et 475 à 477 du texte).

Boisduval, 1835, *Voyage de l'Astrolabe*, II, p. 460 (1). — Lesne, 1895, *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 1895, p. CLXXVIII.

religiosae Fairmaire, 1850, *Rev. et Mag. de Zool.*, 2^e sér., II, p. 50 (in part.).

destructor Montrousier, 1855, *Ann. de la Soc. d'Agr. de Lyon*, 2^e sér., VII, 4, p. 55. (*Essai sur la faune de Woodlark*, 1857, p. 55.)

lifuanus Montrousier, 1861, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1861, p. 267. — Ch.-O. Waterhouse, 1888, *Ann. and Mag. of Nat. Hist.*, 6^e sér., 4, p. 350.

Les principaux caractères différentiels de cette espèce, qui est très voisine de la précédente, ont été donnés plus haut. Nous y ajouterons les remarques suivantes :

La teinte du corps, plus sombre que chez le *flavipes*, est souvent en entier d'un brun foncé. La taille est en moyenne un peu plus faible. L'uncus prothoracique est plus court et les dents de la râpe un peu plus petites. Il y a sur le milieu de l'aire postérieure du pronotum une ponctuation éparse, d'une finesse extrême. Presque toujours la ponctuation dorsale des élytres est forte et ne s'atténue qu'auprès de la base; mais on observe des individus ne différant pas du *flavipes* sous

Iles Nicobar (*Novara Reise, Musée de Vienne*); Sumatra et Iles voisines; Java; Bornéo; Philippines; Célèbes (*de la Savinière in Muséum de Paris; British Museum; Coll. Lansberge* > *Oberthür*): Menado (*Coll. Lansberge* > *Oberthür*), Makassar (*Doherty in Coll. Oberthür*), Kandari (*O. Beccari in Musée de Gènes*).

Ile Bourou (*Coll. Oberthür*); Amboine (*Muséum de Paris*); I. Arou (*Rosenberg in Musée de Leyde*) (4 individus).

Il y a lieu de signaler aussi quelques indications de provenance qui correspondent peut-être à des captures accidentelles : Natal (*Candèze in Coll. Oberthür*) 1 ind.; un autre individu de même provenance au British Museum; Zanzibar (*Coll. Fairmaire*); Socotora (*Coll. Dejean*); Arabie (*Pervillé in Muséum de Paris*). Si le *X. flavipes* existe réellement en ces régions, il n'y aurait pour ainsi dire pas de solution de continuité dans son aire de dispersion géographique.

L'espèce a été trouvée accidentellement en Angleterre, importée avec des bois attaqués (Cf. Burgess Sopp, *Ent. Monthl. Mag.*, 1899, p. 95). La méprise de Stephens s'explique sans doute par une capture de ce genre.

(1) Boisduval confondait cette espèce avec la précédente.

ce rapport. Le bord inféro-apical des élytres ne présente pas trace de tubercules. L'angle sutural n'est pas saillant. Parfois la ponctuation de la déclivité postérieure est très affaiblie.

Chez le ♂, la couronne frontale existe, aussi fournie que chez la ♀; mais elle est formée de poils beaucoup plus courts. Les pièces pleurales du dernier segment abdominal sont un peu plus étroites que celles du ♂ du *flavipes*.

On trouve aux îles Hawaii une forme dont les tubercules marginaux de la déclivité apicale sont très atténués; le tubercule supérieur est même presque complètement effacé (Musée de Vienne, 2 ind. ♂ ♀); des exemplaires presque semblables se rencontrent en Nouvelle-Calédonie (Coll. Oberthür).

Un spécimen étiqueté Cap York (Coll. Oberthür) se fait remarquer par la ponctuation élytrale plus forte que chez tous les autres individus examinés, par les points enfoncés très fins mais très nets du milieu de l'aire postérieure du pronotum et par la saillie plus faible du tubercule marginal inférieur de la déclivité.

Distribution géographique. — Cette espèce habite les terres de l'océan Pacifique situées entre les tropiques. A l'ouest elle se rencontre encore dans les îles de la Sonde orientales (Soembawa, Soemba); vers l'est elle s'étend jusqu'à l'archipel Hawaii et aux îles Marquises (1).

(1) Îles de la Sonde orientales : Soembawa (Colffs in Coll. Lansberge > Oberthür), 4 indiv.; Soemba (W. Doherty in Coll. Oberthür). Timor Laoet (Forbes in Coll. Rothschild > Oberthür; British Museum). Petite Kei (H. Kühn in Coll. Oberthür). Île Arou (O. Beccari in Musée de Gènes). Moluques (Coll. de Marseul) : Ternate (Beccari in Musée de Gènes; Coll. Lansberge > Oberthür; L. Laglaize in Coll. Oberthür).




Fig. 476 et 477. — *Nylothrips religiosus*. Profil dorsal de la ♀ (fig. 476) et contour du corps, vu en dessus (fig. 477).

Biologie. — Le *Xylothrips religiosus* vivrait à Taïti dans l'Arbre à Pain (*Artocarpus incisa*) et dans le « Bourao » (*Hibiscus tiliaceus*) (1). En Mélanésie cette espèce attaque les bois ouvrés d'essences diverses, même les plus durs; mais sa multiplication est limitée par un Cléride du genre *Cylidrus* (2). L'adulte vole le soir et est attiré par les lumières (Ph. François).

***Xylothrips* (?) *Geoffroyi*.**

Montrousier, 1864, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1864, p. 266.

Cette forme, beaucoup trop brièvement décrite, paraît devoir se ranger au voisinage des deux espèces étudiées ci-dessus. Elle s'en rapproche par la présence de trois côtes dentiformes de chaque côté sur la déclivité apicale, par son pronotum lisse en arrière, par sa coloration noir brun, avec les pattes et le dessous du corps fauves, et surtout par l'allongement des articles de la massue antennaire. Elle présenterait cette particularité d'avoir les tubercules de la déclivité apicale finement rugueux. — Long. 6 mill.

Distribution géographique. — Nouvelle-Calédonie : ile Art (*Montrousier*).

Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Bretagne, îles Trobriand, d'Entrecasteaux et Woodlark, fréquent. Archipel Salomon (*C. Ribbe* in *Coll. Oberthür*; *Webster* in *Coll. Oberthür*).

Australie nord-orientale : Cap York (*Coll. Thorey* > *Oberthür*), 1 ind.; Somersel (*L.-M. d'Albertis* in *Musée de Gènes*), 2 indiv.

Nouvelle-Calédonie et îles Loyauté, fréquent; Nouvelles-Hébrides (*Ph. François*). Îles Viti (*Muséum de Paris*; *Musée de Bruxelles*; *Coll. Bedel*): Viti Levu (*Coll. Oberthür*). Îles Samoa (*British Museum*): Oupolou (*Woodford* in *Coll. Oberthür*). Taïti, fréquent (*Muséum de Paris*, *Musée de Vienne*, *Coll. Fairmaire*, *Coll. Oberthür*, etc.). Îles Marquises : Nouka-Hiva (*Musée de Bruxelles*).

Îles Hawaii (*Musée de Vienne*), 2 indiv. : Honolulu (*D'Albertis* in *Musée de Gènes*), un indiv.

Il est possible que l'aire de dispersion géographique du *X. religiosus* s'étende au nord-ouest jusqu'à Bornéo (d'après un exemplaire de la *Coll. Bedel* et une série d'individus communiqués par M. Heyne) et aux Philippines (*Musée de Berlin*, un individu provenant de Manille). Mais ces indications demanderaient à être confirmées.

(1) Cf. Fairmaire, *Rev. et Mag. de Zool.*, 1850, p. 50.

(2) Montrousier, *Faune de Woodlark*, p. 55.

Genre **Xylopsocus** n. g.

(Voir tabl. des genres 40, 42).

Dessus de la tête régulièrement convexe, sans pilosité dressée. Yeux assez petits, bien détachés des tempes. Bord antérieur de l'épistome tronqué ou faiblement échancré en arc de cercle sur une largeur égale à celle du labre. Mandibules variables, tantôt presque symétriques (*X. rubidus*), tantôt très dissemblables, celle de droite toujours plus épaisse que celle de gauche. Antennes de dix ou de neuf articles, le 1^{er} article long, l'ensemble des petits articles du funicule 3-7 ou 3-6 aussi long ou plus long que le 1^{er} article de la massue; les deux premiers articles de la massue transverses, dépourvus de grandes dépressions et ne présentant que des condensations de pores. Prothorax transverse, fortement rétréci en avant, ses côtés fortement arrondis dans leur moitié postérieure, munis en arrière d'une suture latérale très nette, arquée ou brusquement coudée sur l'angle postérieur. Stigmates prothoraciques très grands, latéraux. Tibias antérieurs normaux ⁽¹⁾.




Fig. 478 et 479. — Antennes des *Xylopsocus capucinus* (fig. 478) et *gibbicollis* (fig. 479).

♂ Dernier segment abdominal simple, très régulièrement arrondi au bord postérieur, sans pièces pleurales apparentes.

♀ Dernier segment abdominal très légèrement échancré au milieu du bord postérieur.

Genre assez varié, dont plusieurs espèces ont des affinités avec les *Sinoxylon*; au point de vue de la conformation des mandibules, la transition est des plus remarquables.

L'aire d'habitat des *Xylopsocus* s'étend sur les contrées baignées par l'océan Indien et par le Pacifique occidental, depuis l'Afrique australe jusqu'aux îles Riou Kiou et aux archipels polynésiens. Une espèce a été introduite dans l'Amérique du Sud et s'y est acclimatée.

(1) En outre les *Xylopsocus* ont une suture fronto-clypéale fortement enfoncée au milieu, les dents de la râpe prothoracique sont mêlées de denticules et les tibias postérieurs ne portent pas de soies dressées au côté externe.

TABLEAU DES ESPÈCES.

- 1-4 — Mandibules peu dissemblables, toutes deux pointues au bout. Bord supérieur de la déclivité apicale présentant de chaque côté deux tubercules ou deux calus. Antennes de 10 articles. Élytres sans faux-épipleures. 1^{er} segment apparent de l'abdomen finement caréné au milieu. Tibias antérieurs assez épais, leur face externe légèrement sillonnée.
- 2-3 — Prothorax sans dents uncinées à son bord antérieur (fig. 480). Aire postérieure du pronotum finement râpeuse au milieu. Déclivité apicale des élytres munie de chaque côté de deux tubercules saillants. Élytres redressés à l'apex (fig. 480). Long. 5 1/2-7 mill. **X. rubidus** *n. sp.*
- 3-2 — Prothorax muni d'une dent uncinée de chaque côté à son bord antérieur. Aire postérieure du pronotum lisse, à part une ponctuation extrêmement fine. Bord supérieur de la déclivité apicale avec deux petits calus sur chaque élytre. Bord apical des élytres non réfléchi. Long. 5 1/2 mill. **X. ebeninocollis** *n. sp.*
- 4-1 — Mandibule droite très largement arrondie au sommet (fig. 488), semblable à celle des *Sinozylon*. Bord supérieur de la déclivité apicale sans tubercules ni calus isolés. Bord antérieur du prothorax muni de chaque côté d'une dent uncinée.
- 5-8 — Antennes de 9 articles, le 3^e aussi long que les deux suivants réunis. Déclivité apicale rebordée sur la presque totalité de son pourtour (fig. 481, 482).
- 6-7 — Crête de la carène élytrale bisinuée au côté supéro-latéral de la déclivité (fig. 481, 482). Déclivité apicale assez fortement ponctuée. Poitrine et abdomen roux. — ♀ Pénultième segment abdominal sinué au bord postérieur. — Long. 3-5 1/2 mill. **X. capucinus** Fabr.
- 7-6 — Crête de la carène élytrale unidentée de chaque côté au bord supéro-latéral de la déclivité. Déclivité apicale très fortement ponctuée. Poitrine et base de l'abdomen brun foncé. — ♀ Pénultième segment de l'abdomen rectiligne au bord postérieur. — Long. 4 mill. **X. radula** *n. sp.*

- 8-5 — Antennes de 10 articles. Pénultième segment abdominal rectiligne au bord postérieur chez la ♀.
- 9-10 — Déclivité apicale rebordée sur son pourtour presque entier par une carène, armée, vers le haut, d'une dent plate, aiguë (fig. 483). Bord inféro-apical de l'élytre conformé en faux-épipleure. Tibias antérieurs assez épais, leur face externe légèrement sillonnée. Poitrine et base de l'abdomen brunes. Long. 4-4 1/2 mill. **X. bicuspis** n. sp.
- 10-9 — Déclivité postérieure sans dent marginale à son bord supérieur. Pas de faux-épipleure au bord terminal des élytres. Tibias antérieurs comprimés, non sillonnés en dehors.
- 11-12 — Ponctuation dorsale des élytres fine, nullement râpeuse. 1^{er} segment abdominal caréné au milieu. Cuisses brunes. Long. 3-4 1/2 mill. **X. castanoptera** Fairm.
- 12-11 — Ponctuation dorsale des élytres assez forte, râpeuse. 1^{er} segment abdominal non caréné au milieu. Cuisses rousses.
- 13-14 — Élytres présentant une large tache basilaire commune à contours nets. Corps plus allongé (fig. 484). Déclivité apicale faiblement convexe. Long. 3-5 mill. **X. sellatus** Fähr.
- 14-13 — Teinte claire de la base des élytres sans limites nettes. Corps plus court (fig. 488). Rebord inférieur de la déclivité apicale moins saillant.
- 15-16 — Déclivité apicale plane (fig. 486). Long. 2 1/2-4 1/2 mill. **X. edentatus** Montr.
- 16-15 — Déclivité apicale notablement convexe (fig. 487), plus fortement granuleuse. Teinte plus foncée. Long. 3-5 mill. **X. gibbicollis** Mac Leay.

***Xylopsocus rubidus* n. sp.**

(Voir tabl. des espèces 1, 2. — Fig. 480 du texte).

Long. 5 1/2-7 mill. — Assez allongé, parallèle; rougeâtre ou d'un roux brunâtre; tête, poitrine et parties postérieures des élytres brunes;

antennes, palpes, hanches et cuisses roux; tibias et tarses brunâtres. Dessus de la tête très légèrement déprimé transversalement en arrière




Fig. 480. — *Xylopsocus rubidus*.

des yeux. Épistome assez densément ponctué. Front densément granuleux. Antennes de 10 articles, les articles 3-7 réunis à peu près aussi longs que le 1^{er}, ceux de la massue présentant sur chaque face deux taches de pubescence. Mandibules médiocrement dis-

semblables, toutes deux pointues au sommet. Prothorax sans uncus marginaux à son bord antérieur, la dent antéro-latérale de la râpe écartée du bord; suture latérale très brièvement prolongée suivant la base; angles postérieurs, vus de dessus, bien marqués, pointus. Milieu de l'aire postérieure du pronotum finement et peu densément râpeux. Élytres assez allongés, deux fois aussi longs que le prothorax, leur ponctuation assez fine et assez écartée à la base, devenant graduellement plus forte et plus serrée en arrière, presque confluyente près du bord supérieur de la déclivité apicale et déterminant, en arrière, sur les côtés, des sortes de rides transverses. Déclivité apicale munie de chaque côté, au bord supérieur, de deux tubercules costiformes subégaux, rebordée inférieurement, fortement ponctuée dans ses régions supérieure et latérales, lisse et brillante sur un espace occupant son tiers ou sa moitié inférieure et remontant le long de la suture; celle-ci saillante sur la déclivité. Élytres réfléchis à l'apex, sans faux-épipleure, leur tranche apicale finement ruguleuse. Abdomen très finement ponctué et pubescent, son premier segment très brièvement caréné en arrière de la saillie intercoxale. Tibias antérieurs normaux, moins de deux fois aussi larges qu'épais sur leur tranche externe, celle-ci faiblement sillonnée, limitée en avant par une arête. Tibias postérieurs avec des soies couchées au côté externe.

Par son faciès, cette espèce rappelle beaucoup les *Xylothrips*.

Distribution géographique. — Australie occidentale (1).

(1) Australie (Coll. Bedel), un ♂ : Albany (Coll. Oberthür; Mus. de Paris), 7 ind. ♂ ♀.

Xylopsocus ebeninocollis n. sp.

(Voir tabl. des espèces 1, 3).

Long. 5 1/2 mill. — Allongé, subparallèle, légèrement élargi en arrière; noir, avec le funicule antennaire, les palpes, la moitié antérieure des élytres et l'abdomen roux; pattes brunes. Dessus de la tête régulièrement convexe, comme chez toutes les espèces suivantes. Épistome densément ponctué. Front finement granuleux. Antennes de 10 articles, le 3^e plus petit que les deux suivants réunis, les articles 3-7 pris ensemble plus courts que le 1^{er}; articles de la massue ornés de taches de pubescence rousse. Mandibules médiocrement dissemblables, celle de droite plus épaisse vers le bout. Prothorax muni de chaque côté d'un uncus au bord antérieur; suture latérale non sinuée près de la base, brièvement prolongée sur celle-ci, l'angle postérieur (vu de dessus) obtus mais bien marqué. Aire postérieure du pronotum entièrement lisse et brillante, à part une ponctuation extrêmement fine et peu dense. Ponctuation de la moitié basilaire des élytres très fine, superficielle, surtout dans la région dorsale, forte et confluyente en arrière, notamment sur les flancs, où elle donne naissance à des sortes de rides transverses. Déclivité apicale couverte d'une ponctuation très forte et très serrée (atténuée dans l'angle apical), limitée sur son pourtour inférieur et latéral par une carène saillante, égale, et montrant de chaque côté, à son bord supérieur, deux petits calus longitudinaux. Suture saillante sur la déclivité. Bord apical des élytres à peine redressé, sans faux-épipleure. Abdomen très finement et très densément pubescent, son 1^{er} segment caréné sur la ligne médiane. Tibias comme dans l'espèce précédente.

Faciès du *X. capucinus*.Distribution géographique. — Nouvelle-Guinée ⁽¹⁾.**Xylopsocus capucinus.**

(Voir tabl. des espèces 4, 5, 6. — Fig. 478, 481 et 482 du texte).

Fabricius, 1781, *Spec. Ins.*, I, p. 62. — Id., 1792, *Ent. Syst.*, I, 2, p. 359.

eremita Olivier, 1790, *Enc. Méth., Ins.*, V, p. 110, pl. II, fig. 11. — Id., 1795, *Ent.*, IV, n° 77, p. 13, pl. II, f. 11.

(1) Hatam, en juin (*Beccari in Musée de Gênes*), type unique ♀.

marginatus Fabricius, 1801, *Syst. El.*, II, p. 382 ⁽¹⁾.

*nicobaricus** Redtenbacher, 1868, *Reise der Novara*, Band II, Abth. 1, p. 114 ⁽²⁾.

Long. 3-5 1/2 mill. — Assez allongé, parallèle, un peu élargi en arrière. Noir, avec la poitrine, l'abdomen, le funicule antennaire, le labre,




Fig. 431. — *Nylopsocus capucinus*.

les palpes et les pattes roux ⁽³⁾; tibias rembrunis, surtout les antérieurs; élytres souvent teintés de roux, sur une longueur plus ou moins grande à partir de la base, leur bord latéral constamment de teinte foncée. Dessus de la tête très finement et peu densément pubescent. Épistome très finement et peu densément ponctué, très faiblement échancré au bord antérieur. Front granuleux. Mandibules très dissemblables, celle de gauche pointue au bout, celle de droite très courte, largement arrondie au sommet. Antennes de 9 articles, l'ensemble des articles 3-6 plus court que le 1^{er} article de l'antenne; pas de taches pileuses apparentes sur les articles de la massue. Bord antérieur du prothorax orné de chaque côté d'une dent uncinée; suture latérale prothoracique sinuée à la base, l'angle postérieur, vu de dessus, aigu, dentiforme. Aire postérieure du pronotum couverte d'une ponctuation râpeuse,

assez dense. Ponctuation élytrale assez fine et assez écartée à la base, devenant rapidement plus forte et granuleuse en arrière et sur les côtés; ceux-ci non ridés. Déclivité apicale très abrupte, nettement tronquée, limitée sur tout son pourtour par une carène saillante dont la crête est légèrement bisinuée au côté supéro-latéral; déclivité fortement et très densément ponctué, sauf dans l'angle apical qui est presque lisse; suture saillante sur la déclivité. Bord inféro-apical de l'élytre conformé en faux-épipleure, l'angle sutural légèrement saillant. Pubescence abdominale extrêmement fine, assez dense, mais ne masquant pas le tégument. 1^{er} segment apparent de l'abdomen finement caréné au milieu. Tibias antérieurs comme chez les espèces précédentes. Pas de soies au côté externe des tibias postérieurs.

(1) Cette synonymie a pu être établie grâce à une comparaison qu'a bien voulu faire M. le professeur Meinert.

(2) *Apate infusata** et *A. fuliginosa** Dejean, *Cat.*, 3^e éd., p. 334.

(3) Les pattes sont quelquefois entièrement brunâtres.

♂ Bord postérieur du pénultième segment abdominal rectiligne, le dernier segment seulement un peu plus long que le précédent.

♀ Dernier segment apparent de l'abdomen deux fois aussi long que le précédent sur la ligne médiane; bord postérieur du 4^e segment largement sinué. Échancrure du dernier segment abdominal très petite, peu distincte.

Distribution géographique. — Cette espèce est largement répandue dans les contrées de faune indo-malaise et à Madagascar. On la trouve aux Comores, aux Séchelles et dans les îles Mascareignes. Le Sikkim, la Birmanie septentrionale, le Tonkin, les îles Philippines, les îles Mariannes, les Nouvelles-Hébrides et la Nouvelle-Calédonie sont aux limites de son aire d'habitat telle qu'elle nous est actuellement connue. Le *Xylopsocus cupucinus* n'a pas été rencontré en Australie; mais il est très abondant en Nouvelle-Guinée et dans toute l'Insulinde ⁽¹⁾.

Il paraît avoir été transporté sur la côte occidentale d'Afrique, dans la colonie de Sierra Leone, et s'y être acclimaté ⁽²⁾. Sa présence dans

(1) Madagascar (Goudot in *Muséum de Paris*) : Diégo-Suarez (*Ch. Alluaud*); Nossi Bé (*H. Pierron* in *Muséum de Paris*, *Coll. Bedel*, *Coll. Oberthür*, etc.); Vohémar (*G. Grandidier* in *Muséum de Paris*); baie d'Antongil (*A. Mocquerys* in *Coll. Oberthür*, etc.); Tamatave (*D^r Jaillet* in *Muséum de Paris*); Sainte-Marie (*Perrol* in *Coll. Oberthür*); Province d'Ankavandra (*Huré* in *Muséum de Paris*).

Comores (*Humboldt* in *Coll. Oberthür*); Séchelles : Mahé (*Ch. Alluaud*); La Réunion (*Muséum de Paris*; *Musée de Bruxelles*); île Maurice (*Coll. Dejean*; *Musée de Bruxelles*; *Coll. Guérin-Méneville* > *Oberthür*) : Curepipe (*Ch. Alluaud*).

Sikkim (*D^r Harmand* in *Muséum de Paris*); Coromandel (*Banks*); Nilghiri; Ceylan (*W. Horn*, etc.).

Birmanie : Bhamo et Chwegoo-Myo (*L. Fea* in *Musée de Gênes* et *Coll. Oberthür*).

Tonkin (*Coll. Aubert*). Laos : Monts de La Khône (*D^r Harmand* in *Muséum de Paris*). Cambodge et Cochinchine.

Les îles ou groupes d'îles de l'Insulinde dans lesquelles l'espèce a été capturée sont les suivantes : Nicobar, Sumatra et îles voisines, Java, Soembawa, Bornéo, Célèbes, Philippines (notamment Paragua), Ternate, Batjan (Batchian), Ceram, Amboine, Kei, Arou, Nouvelle-Guinée, Trobriand, Woodlark, îles d'Entrecasteaux et archipel de la Louisiade (*A.-S. Meek* in *Coll. Oberthür*).

Nouvelles-Hébrides : îles Espiritu-Santo (*Ph. François*). Nouvelle-Calédonie, très répandu (*Coll. Gambey* > *Oberthür*; *Coll. Fauvel*; *Coll. Fairmaire*; etc.).

(2) Sierra Leone, en 1892 (*Clements* in *Coll. Oberthür*). Free Town, en 1889 (*A. Mocquerys* in *Coll. Oberthür*).

Citons en outre les deux indications suivantes, relatives aussi au continent

l'Amérique du Sud, Guyane et Brésil oriental ⁽¹⁾, est vraisemblablement attribuable aux mêmes causes.

Biologie. — Le *X. capucinus* se développe notamment dans le Manguiier ⁽²⁾.

***Xylopsocus radula* n. sp. (♀).**

(Voir tabl. des espèces 4, 5, 7).

Long. 4 mill. — Les caractères de cette forme participent d'une façon remarquable à la fois de ceux du *X. capucinus* et de ceux du *X. bicuspis*. Le *Xylopsocus radula* ressemble beaucoup à ce dernier : il en a le système de coloration, il possède une carène marginale de la déclivité identiquement dentée ⁽³⁾ au côté supéro-latéral et le pénultième segment abdominal est de même rectiligne au bord postérieur chez la ♀. Par contre l'antenne ne compte que 9 articles et est semblable à celle du *capucinus*.

Les particularités qui paraissent lui appartenir en propre relativement aux deux espèces voisines sont la densité plus grande des fins reliefs de l'aire postérieure du pronotum, la grosseur des points enfoncés presque confluent dont est criblée la déclivité apicale et la largeur plus grande du faux-épipleure. Dans sa moitié postérieure le bord latéral de l'élytre est très nettement denté en scie.

Distribution géographique. — Sumatra ⁽⁴⁾.

***Xylopsocus bicuspis* n. sp.**

(Voir tabl. des espèces 4, 8, 9. — Fig. 483 du texte).

Long. 4-4 1/2 mill. — Assez allongé, parallèle, élytres un peu élargis en arrière. Tête, prothorax et poitrine noirs; bord latéral et parties

africain, mais qui ne paraissent pas certaines: Sénégal (*Coll. Mniszech* > *Oberthür*); Zanguebar (*Coll. Bedel*).

(1) Guyane française (*C. Bar* in *Coll. Oberthür*; *Prud'homme*; *F. Geay*).
Brésil (*Coll. Dejean*; *Coll. Mniszech*; *Coll. Bedel*; *Musée de Vienne*; de *Lacerda* in *Musée de Bruxelles*); Pernambuco (*E. Gounelle*); Bahia (*Coll. de Marseul*); Rio Janeiro (*Coll. Dejean*; *Castelnau* in *Muséum de Paris*).

(2) D'après des échantillons provenant de la collection Guérin-Méneville et communiqués par M. R. Oberthür.

(3) Un peu moins fortement toutefois.

(4) Dans les tabacs de provenance de Sumatra (*A. Grouvelle* in *Coll. Bedel*). Type unique ♀.

postérieures des élytres bruns, ainsi que la base de l'abdomen, la massue antennaire et les tibias; base des élytres, extrémité de l'abdomen, funicule antennaire, labre, palpes et cuisses roux; suture et base des élytres quelquefois bordées de brun.

Cette espèce ressemble beaucoup au *X. capucinus*. Elle en diffère, outre la coloration de la poitrine et de l'abdomen, par ses antennes de 10 articles, le 3^e étant plus court que les deux suivants réunis, par la suture latérale du prothorax non sinuée à la base, par l'angle postérieur du prothorax, vu de dessus, non dentiforme, à peine aigu, par la ponctuation du disque des élytres moins forte et à peine granuleuse, par la carène marginale de la déclivité postérieure élevée de chaque côté, au bord supérieur, en une dent plate, triangulaire, courte, pointue; enfin par la déclivité apicale plus granuleuse.

♀ Bord postérieur du pénultième segment abdominal rectiligne; échancrure médiane du bord postérieur du dernier segment faible, mais assez large, ce 5^e segment seulement un peu plus long que chez le ♂.

Les élytres sont quelquefois bruns sur plus de la moitié de leur largeur.

Distribution géographique. — Archipel Riou-Kiou (Liou-Kiou) ⁽¹⁾.

***Xylopsocus castanoptera*.**

(Voir tabl. des espèces 4, 8, 10, 11).

Fairmaire, 1850, *Rev. et Mag. de Zool.*, 2^e sér., II, p. 50.

affinis Brancsik, 1893, *Jahrb. der Naturw. Ver. des Trencsin. Comit.*, XV, p. 235.

Long. 3-4 1/2 mill. — Assez court, parallèle, légèrement élargi en arrière. Noir ou brun, avec les élytres châtain ou teintés de roux ou

(1) Ile d'Oshima (Amami-Oho Sima) en juillet-août (*J.-B. Ferrié in Coll. Oberthür et Muséum de Paris*), 5 ind. ♂ ♀.




Fig. 482 et 483. — Déclivité apicale des élytres, vue de dessus et de trois quarts, chez les *Xylopsocus capucinus* (fig. 482) et *bicuspis* (fig. 483).

de rougeâtre à la base sur une longueur plus ou moins grande; antennes, tarses et bords de l'abdomen généralement roux; cuisses brunes ou brunâtres. Quelquefois le corps est entièrement brun foncé. Épistome assez finement ponctué. Front éparsement granuleux au milieu. Antennes de 10 articles, les articles 3-7 pris ensemble plus longs que le 1^{er} article; articles de la massue ornés de taches de pubescence bien distinctes. Mandibules semblables à celles du *X. capucinus*, mais ne chevauchant pas à la pointe, celle de droite semblable à une mandibule de *Sinoxylon*, celle de gauche assez pointue au bout. Bord antérieur du prothorax muni de chaque côté d'une dent uncinée; suture latérale prothoracique non sinuée à la base, l'angle postérieur (vu de dessus) bien marqué, aigu, dentiforme. Milieu de l'aire postérieure du pronotum râpeusement et assez fortement ponctué en avant, finement en arrière. Ponctuation dorsale et latérale des élytres fine et peu dense, nullement râpeuse; flancs des élytres présentant en arrière des rides transverses plus ou moins fortes qui se prolongent jusqu'au près du bord supérieur de la déclivité. Celle-ci densément granuleuse, sauf dans l'angle sutural, et munie d'un rebord cariniforme seulement dans sa moitié inférieure. Suture élevée sur la déclivité. Bord apical des élytres non conformé en faux-épipleure; angle sutural un peu saillant. Poitrine et abdomen couverts d'une pubescence très dense, argentée. 1^{er} segment abdominal caréné longitudinalement au milieu. Tibias antérieurs comprimés, non sillonnés sur leur face externe qui est de moitié moins large que leur face antérieure. Des soies couchées à la face externe des tibias postérieurs.

Distribution géographique. — L'aire de dispersion géographique de cette espèce est immense et s'étend depuis Madagascar et la côte orientale d'Afrique jusqu'aux archipels polynésiens en comprenant les régions indo-malaises et peut-être aussi une partie de l'Australie ⁽¹⁾.

(1) Ile Maurice (*Coll. Dejean*; *D. d'Emmerez* in *Coll. Alluaud*); Madagascar (*Coll. Abeille de Perrin*); Côte N.-O. (*Coll. Fairmaire*); Nossi-Bé (*Coll. Fairmaire*). Comores (*L. Humblot* in *Coll. Oberthür*). Afrique orientale allemande : Ousambara, Déréma (*L. Conradt* in *Coll. Oberthür*). Assam : Sylhet (*British Museum*). Annam : Hué (*Coll. Fleutiaux*). Bornéo (*Musée de Vienne*); Sarawak (*Doria* in *Musée de Gènes*). Nouvelle-Guinée (*Loria* in *Musée de Gènes*; *Lix* in *Coll. Oberthür*), très répandu. Australie (*Coll. Mnischev* > *Oberthür*; *Coll. Thorey* > *Oberthür*). Taïti (*Vesco* in *Muséum de Paris*).

Xylopsocus sellatus *.

(Voir tabl. des espèces 4, 8, 10, 12, 13. — Fig. 484 et 485 du texte).

Fåhræus, 1872, *Öfv. Vetensk.-Akad. Förh.*, XXVIII, p. 667.

Long. 3-5 mill. — Extrêmement voisin du précédent. En diffère par sa forme un peu plus allongée, par la tache commune de la base des élytres nettement délimitée, d'un roux clair, par la teinte roux clair des hanches et des cuisses, par la sculpture des élytres plus forte, râpeuse en arrière sur les




Fig. 484. — *Xylopsocus sellatus*.



Fig. 485. — Bouche du *Xylopsocus sellatus*, pour montrer la position des mandibules dans le repos.

parties dorsales; par la carène marginale de la déclivité postérieure prolongée jusque vers le quart supérieur de celle-ci; enfin par le premier segment apparent de l'abdomen non caréné au milieu. Déclivité apicale faiblement convexe.

Distribution géographique. — Afrique orientale; Madagascar (1).

Xylopsocus edentatus.

(Voir tabl. des espèces 4, 8, 10, 12, 14, 15. — Fig. 486 du texte).

Montrousier, 1861, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1861, p. 267.

Long. 2 1/2-4 1/2 mill. — Brun ou roux brunâtre en dessus; tête.

(1) Afrique orientale allemande : Kilimandjaro, 1300-1700 m. (*Volkens* in *Musée de Berlin*); Massai (*British Museum*); Ousegouha, Mhonda (*A. Hacquard* in *Coll. Oberthür*); Oukami (*Coll. Bedel*). Lindi, près Zanzibar (*Raffray* in *Coll. Bedel*). Zouloulouland (*D^r Ch. Martin*). Natal (*D^r Ch. Martin*): Durban (*Musée de Cape-Town*). Cafrerie (*J. Wahlberg* in *Musée de Stockholm*). Madagascar : Diégo-Suarez (*Ch. Alluaud*); env. de Mevatanana (*Perrier de la Bathie* in *Coll. Fairmaire*); Morondava (*D^r Petit* in *Muséum de Paris*).

et poitrine brunes; abdomen roux ou roussâtre; antennes et pattes rousses. Ressemble beaucoup aux deux espèces précédentes; mais sa forme est plus courte. Ses caractères les plus remarquables sont les suivants :

Antennes de 10 articles, ceux de la massue marqués de taches de pubescence. Mandibule gauche très large quoique amincie au bout, ne



486



487

Fig. 486 et 487. — Déclivité apicale des élytres, vue de profil, chez les *Xylopsocus edentatus* (fig. 486) et *gibbicollis* (fig. 487).

chevauchant pas sur la mandibule opposée. Prothorax armé d'un uncus de chaque côté à son bord antérieur, sa suture latérale non sinuée à la base. Milieu de l'aire postérieure du pronotum assez finement râpeux en avant. Base des élytres lisse; sculpture des élytres râpeuse dans la région dorsale, graduellement plus forte en arrière, granuleuse sur la déclivité apicale et sur les flancs, où elle montre une

tendance à se disposer en rides postérieurement. Déclivité apicale presque plane, rebordée sur la presque totalité de son pourtour (le milieu du bord supérieur excepté), avec la suture légèrement saillante; bord inféro-apical non conformé en faux-épipleure. 1^{er} segment abdominal sans carène médiane. Tibias antérieurs comprimés comme chez les deux espèces précédentes, sans sillon à la face externe.

Distribution géographique. — Nouvelle-Calédonie et îles Loyauté ⁽¹⁾.

Xylopsocus gibbicollis.

(Voir tabl. des espèces 4, 8, 10, 12, 14, 16. — Fig. 479, 487 et 488 du texte).

Mac Leay, 1872, *Trans. ent. Soc. of New South Wales*, II, p. 276.

viduus Blackburn, 1890, *Proc. of Linn. Soc. of New South Wales*, 2^e sér., IV, p. 1263. — Id., 1892, *Trans. Roy. Soc. of S. Austr.*, XVI, p. 39.

(1) Nouvelle-Calédonie (*Coll. Fairmaire*) : Kanala, Boulari, baie du Prony, île des Pins (*Coll. Gambey* > *Oberthür*; *Coll. Fauvel*) ; env. de Nouméa (*Ph. François*; *Coll. Fauvel*). Ile Lifou (*Montrousier*).

Long. 3-5 mill. — Espèce extrêmement voisine de l'*edentatus*, de forme un peu plus large; généralement noire, avec les antennes, le labre, les palpes et le pourtour de l'abdomen roux et la base des élytres largement teintée de rougeâtre. Elle diffère de l'*edentatus* par son prothorax d'ordinaire moins court, par la ponctuation des flancs des élytres ayant une tendance plus marquée à se disposer en rides en arrière, par la convexité notable de la déclivité apicale et la saillie plus forte de la suture sur cette déclivité. La granulation dont est couverte la déclivité postérieure est un peu plus forte que chez l'*edentatus*.

Distribution géographique — Australie et Nouvelle-Guinée (1).




Fig. 488. — *Aylopsocus gibbicollis*.

(1) Queensland Cooktown (Lichhorn in Coll. Oberthur); Port Denison (Muséum de Paris Coll. Bedel), Dawson district (Barnard in Coll. Oberthur), Gayndah (Mac Leay), baie Moreton et Brisbane (Muséum de Paris). Nouvelle-Galles du Sud : Tamworth, Sydney, Galston, Forest Reefs (A.-M. Lea in litt.), Tweed River, en avril (A.-M. Lea). Victoria (Coll. Bedel). Australie du Sud. Port-Lincoln (Blackburn, sub Viduus). Australie occidentale : Albany (Brewer in Coll. Oberthur). Tasmanie (Coll. de Marseul > Muséum de Paris).

Nouvelle-Guinée méridionale. Kapa Kapa (L. Loria in Musée de Gènes)





TABLE ALPHABÉTIQUE PAR NOMS D'AUTEURS

DES

TRAVAUX CONTENUS DANS CE VOLUME

- BRÖLEMAN (H.-W.). — Myriapodes cavernicoles, descriptions d'espèces nouvelles (fig.), 73.
- BUYSSON (R. DU). — Sur quelques Hyménoptères de Madagascar (fig.), 176.
- CROISSANDEAU (J.). — Monographie des *Strymaenidae* (pl. 4 à 14) [fin], 116.
- KIEFFER (J.-J.). — Monographie des Cécidomyides d'Europe et d'Algérie (pl. 15 à 44), 181.
- LESNE (P.). — Revision des Coléoptères de la famille des Bostrychides, 4^e Mémoire (fig.), 473.
- LÉVEILLÉ (A.). — Catalogus Temnochilidum (seu Trogositidum) inter annos 1758 - 1900 editorum, 1.
- MAINDRON (M.). — A Monsieur le professeur A. Giard, 113.
- MARCHAL (P.). — Notes biologiques sur les Chalcidiens et Proctotrypidés, obtenus par voie d'élevage pendant les années 1896, 1897 et 1898, 102. — Sur un nouvel Hyménoptère aquatique, le *Lymnodytes gerriphagus*, n. gen. n. sp. (fig.), 171.
- OLIVIER (ERN.). — Voyage de M. E. Simon au Venezuela (décembre 1887-août 1888), Lampyrides, 62.
- PÉRINGUEY (L.). — Notes sur certaines Cétoines (Crémastochilides) rencontrées dans les fourmilières ou termitières, avec descriptions d'espèces nouvelles, 66.
- SIMON (Eug.). — Études arachnologiques. Descriptions d'espèces nouvelles de la famille des *Attidae*, 27.
- STANDFUSS (M.). — Études zoologiques expérimentales sur les Lépidoptères, résultats principaux obtenus jusqu'à la fin de 1898 (pl. 1 à 3), 82.

TABLE ALPHABÉTIQUE

GENRES, SOUS-GENRES, ESPÈCES, ETC.
DÉCRITS DANS CE VOLUME

NOTA. — Les noms en caractères égyptiens désignent les genres ou sous-genres nouveaux. — Les noms en caractères italiques désignent les espèces nouvelles.

ARACHNIDES

- Acragas** E. Sim., 37.
castaneipes E. Sim., 39.
erythraeus E. Sim., 41.
humilis E. Sim., 41.
leucospis E. Sim., 38.
longimanus E. Sim., 37.
miniaceus E. Sim., 40.
phasianus E. Sim., 40.
procalvus E. Sim., 39.
- Amphidraus** E. Sim., 60.
auriga E. Sim., 60.
nigritarsis E. Sim., 60.
- Amycus annulatus* E. Sim.,
ectypus H. Sim., 34.
equulus E. Sim., 36.
flavicomis E. Sim., 36.
- Pertyi** E. Sim., 34.
rufifrons E. Sim., 35.
- Brettus adonis** E. Sim., 32.
albolimbatus E. Sim., 31.
rtini E. Sim., 31.
- semifimbriatus* E. Sim., 31.
- Cocalodes papuanus* E. Sim., 32.
- Codeta** E. Sim., 33.
argenteolimbata E. Sim., 33.
- Epicharmus** E. Sim., 28.
Ernsti E. Sim., 28.
- Encolpius** E. Sim., 59.
albobarbus E. Sim., 59.
- Hypaeus** E. Sim., 42.
annulifer E. Sim., 46.
concinus E. Sim., 48.
cucullatus E. Sim., 49.
estebanensis E. Sim., 44.
flavipes E. Sim., 45.
frontosus E. Sim., 47.
furcifer E. Sim., 48.
ignicomis E. Sim., 47.
luridomaculatus E. Sim., 48.
miles E. Sim., 46.
nigricornus E. Sim., 49.
porcutus E. Sim., 45.

- quadrinotatus* E. Sim., 44.
lenuimanus E. Sim., 42.
triplagiatus E. Sim., 43.
venezuelanus E. Sim., 43.
vividus E. Sim., 42.
Letoia E. Sim., 61.
ephippiata E. Sim., 61.
Linus albimanus E. Sim., 33.
Lýssomanes quadrinotatus E. Sim., 27.
Maenola E. Sim., 37.
Starkei S. Sim., 37.
Mago acutidens E. Sim., 56.
longidens E. Sim., 57.
optiparis E. Sim., 58.
perus E. Sim., 57.
procax E. Sim., 59.
saperda E. Sim., 58.
vicanus E. Sim., 57.
Nealces E. Sim., 30.
caligatus E. Sim., 30.
striatipes E. Sim., 30.
Noegus E. Sim., 50.
actinosus E. Sim., 53.
arator E. Sim., 55.
bidens E. Sim., 54.
coccineus E. Sim., 52.
comatulus E. Sim., 52.
fulvocristatus E. Sim., 50.
fuscimanus E. Sim., 52.
niveogularis E. Sim., 54.
niveomarginatus E. Sim., 54.
rufus E. Sim., 51.
transversalis E. Sim., 50.
uncatus E. Sim., 55.
vulpio E. Sim., 53.
Onomastus E. Sim., 29.
nigricauda E. Sim. (err. *nigricanda*), 29.
patellaris E. Sim., 29.
quinquenotatus E. Sim., 29.
Othrus E. Sim., 28.
bicolor E. Sim., 28.
Pandisus E. Sim., 27.
scalaris E. Sim., 27.
Phrealcus E. Sim., 32.
fimbriatus E. Sim., 32.

COLÉOPTÈRES

- Coenochilus hospes* Péring., 71.
intrusus Péring., 71.
Enneadesmus bigranulum Lesne, 603.
Decorsei Lesne, 604.
evacanthus Lesne, 608.
Lucidota Simoni E. Oliv., 62.
Octodesmus Lesne, 616.
episternalis Lesne, 618.
Photinus ineptus E. Oliv., 64.
Placodidus Péring., 68.
compransor Péring., 69.
Tetrapriocera defracta Lesne, 487.
laevifrons Lesne, 488.
ocrenina Lesne, 486.
Trichoplus spectabilis Péring., 70.
vicinus Péring., 70.
Scobicla Lesne, 584.
Xylion Lesne, 542.
falcifer Lesne, 549.
inflaticauda Lesne, 553.
laceratus Lesne, 548.
perarmatus Lesne, 562.
securifer Lesne, 554.
Xylionulus Lesne, 516.
Xylobiops concisus Lesne, 509.
parilis Lesne, 510.
Xyloblaptus Lesne, 514.

Xylobosca Lesne, 564.
gemina Lesne, 569.
Leai Lesne, 570.
Xylocis Lesne, 519.
tortilicornis Lesne, 520.
Xylodectes Lesne, 536.
venustulus Lesne, 540.
Xylodeleis Lesne, 524.
Xylodrypta Lesne, 523.
bostrychoides Lesne, 523.
Xylogenes Lesne, 614.
Xylomeira Lesne, 502.

Xylonites Lesne, 575.
Xylopertha scutula Lesne, 535.
Xyloprista Lesne, 497.
arcellata Lesne, 498.
Xylopsocus Lesne, 627.
bicuspis Lesne, 634.
ebeninocollis Lesne, 634.
radula Lesne, 634.
rubidus Lesne, 629.
Xylothrips Lesne, 620.
Xylotillius Lesne, 540.

HYMÉNOPTÈRES

Limnodytes March., 174.
gerriphagus March., 175.

Thrausmus R. d. Buyss., 177.
Grandidieri R. d. Buyss., 177.

MYRIAPODES

Blaniulus Virei Brölm., 76.
Polydesmus nireus Brölm., 80.

progressus Brölm., 78.

Erratum

Page 29, au lieu de **Onomastus nigricanda**, n. sp., lire : **Onomastus nigricauda**, n. sp.

BULLETIN

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

DE FRANCE

ARTICLE 56 DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT. — Les opinions émises dans le *Bulletin* sont entièrement propres à leurs auteurs ; la Société n'entend aucunement en assumer la responsabilité.

BULLETIN
DE LA
SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE
DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832
RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE
PAR DÉCRET DU 23 AOUT 1878

*Natura maxime miranda
in minimis.*

ANNÉE 1900



PARIS
AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES
28, Rue Serpente, 28
1900

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

MEMBRES DU BUREAU POUR 1900

<i>Président</i>	A. GIARD
<i>Vice-Président</i>	E. SIMON
<i>Secrétaire</i>	PH. FRANÇOIS
<i>1^{er} Secrétaire adjoint</i>	J. DE GAULLE
<i>2^e Secrétaire adjoint</i>	E. DONGÉ
<i>Trésorier</i>	CH. LAHAUSOIS
<i>Archiviste-Bibliothécaire</i>	A. LÉVEILLÉ
<i>Archiviste-Bibliothécaire adjoint</i>	J. MAGNIN

CONSEIL

MM. E.-L. BOUVIER, — l'abbé J. DE JOANNIS, — H. D'ORBIGNY (*Membres restants*); — CH. ALLUAUD, — H. DESBORDES, — P. ESTIOT (*Membres nouveaux*) — et les Membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE PUBLICATION

MM. H.-W. BRÖLEMANN, — R. DU BUYSSON, — A. GROUVELLE, — P. MARCHAL, — L. VIARD — et les Membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE

MM. L. BEDEL, — l'abbé J. DE JOANNIS, — P. MABILLE — et les Membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DU PRIX DOLLFUS

MM. CH. ALLUAUD, — E.-L. BOUVIER, — J. DE GAULLE, — A. GIARD, — l'abbé J. DE JOANNIS, — P. LESNE, — A. LÉVEILLÉ, — P. MARCHAL, — E. SIMON.

Séance du 10 janvier 1900.

Présidence de M. A. GIARD

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance précédente (27 décembre 1899), M. Ch. Alluaud, président de 1899, prononce l'allocution suivante :

Me^s chers Collègues,

Avant de quitter ce fauteuil où j'ai été appelé par votre bienveillante sympathie, et où vous m'avez rendu la tâche si agréable et si facile, permettez-moi de jeter un coup d'œil rapide sur l'année qui vient de s'écouler, la 68^e depuis la fondation de notre chère Société.

Votre vice-président, M. le professeur Giard, qui a eu à me remplacer pendant ma longue absence — votre secrétaire, M. François — votre archiviste, M. Léveillé, secondé par M. Magnin — votre trésorier, M. Fumouze — ont droit une fois de plus à toute notre gratitude, à tous nos éloges. La Société, aux divers points de vue de la cordialité qui règne parmi nous tous, de l'importance scientifique et de la marche régulière de ses publications, de la richesse sans cesse croissante de sa Bibliothèque et de l'état prospère de ses finances, se trouve dans une situation plus forte que jamais.

Notre journal *L'Abeille*, sous l'habile direction de M. Bedel, devient de jour en jour plus important et plus productif. Je ne vous rappellerai pas les importants travaux publiés en 1899; vous me permettrez toutefois une mention spéciale pour le *Synopsis des Onthophagides* de M. H. d'Orbigny auquel vous avez si justement décerné le PRIX DOLLFUS. Au *Bulletin*, vous avez pu voir que des collègues zélés ont réussi à faire encore des découvertes sur notre vieux sol de France, pourtant si exploré depuis plus d'un siècle.

Nos collections de France, grâce à la collaboration dévouée de MM. Philippe Grouvelle, Dongé, de Joannis, Villeneuve, etc., ont vu les boîtes se garnir dans un ordre admirable et bien de nature à enflammer le zèle des débutants. Elles se sont enrichies de la collection de notre regretté collègue Mauppin et d'un don important de M. Clouët des Pesruches.

La Société s'est honorée elle-même en décernant le titre de membres honoraires à des savants tels que S. A. I. le Grand-Duc Michailo vitch Romanoff, le professeur Meinert et M. Eugène Simon.

Enfin, nous avons vu le nombre de nos membres s'accroître dans des

proportions inconnues jusqu'alors. En effet, nous avons admis parmi nous 58 nouveaux collègues, la plupart présentés par M. Giard, dont le zèle mérite toute notre reconnaissance.

J'allais donc vous dire que l'année 1899 pouvait être rangée parmi les années exceptionnellement heureuses pour notre Société. Malheureusement ce tableau est obscurci par des pertes nombreuses et cruelles. Douze de nos collègues nous ont quittés pour toujours : tout d'abord deux membres honoraires, le professeur Balbiani du Collège de France et le professeur Thomson de l'Université de Lund. Le laboratoire d'Entomologie du Muséum a été particulièrement éprouvé en perdant prématurément Charles Brongniart, assistant, et Paul Tertrin, préparateur, et enfin Hippolyte Lucas, assistant honoraire, qui s'était depuis longtemps retiré loin de nous ; c'était le dernier membre datant de la fondation de notre Société. Vous me permettrez d'adresser personnellement un souvenir à la mémoire de Lucas : c'est à lui que je dois ma présentation comme membre de la Société entomologique de France, et vos procédés à mon égard, mes chers Collègues, dès mon arrivée, m'autorisent à dire que mon admission parmi vous fut un des heureux événements de mon existence. Enfin, par ordre chronologique, nous avons vu disparaître A. Sydney Oliff, Alfred Mauppin, Achille Costa, Gorges Rouast, Maurice Dollé, François Decaux, S.-D. Bairstow.

Pour combler ces vides, accueillons avec bienveillance les nouveaux venus et attirons-en d'autres à nous ; travaillons sans cesse à maintenir parmi nous cette cohésion, cette solidarité qui font la principale force d'une association comme la nôtre. L'Entomologie est d'ailleurs d'essence éminemment sociale ; j'éprouve (et je crois pouvoir dire, nous éprouvons tous), aux jours de nos réunions, une joie douce due à la communauté de nos goûts et de nos études. Nous laissons un instant à l'entrée de cette salle — permettez-moi l'expression — comme à un vestiaire de l'oubli, ces préoccupations matérielles et ces soucis de toute nature auxquels nul n'échappe complètement dans la vie ; les plus grandes douleurs elles-mêmes semblent subir un temps d'arrêt. C'est là une impression que vous ressentez certainement comme moi, mes chers Collègues, la preuve en est que vous venez de plus en plus nombreux à nos séances. Au moment où des travaux d'agrandissements se font dans l'hôtel des Sociétés savantes, je ne redoute pas de voir notre salle devenir trop petite — au contraire je le souhaite.

Monsieur Giard, .

C'est un grand honneur, pour le modeste chercheur que je suis, de

vous inviter à venir me succéder à ce fauteuil où notre estime et notre sympathie vous accompagnent.

M. A. Giard prend place au fauteuil de la présidence et s'exprime en ces termes :

Messieurs et chers Collègues,

En parcourant ces jours derniers la liste des membres de notre Société, où sont inscrits les noms de tant d'hommes distingués, ayant bien mérité de l'entomologie, je me suis demandé comment vous avez pu, dédaigneux de l'antique adage, *non bis in idem*, m'appeler une fois encore à l'honneur de présider nos réunions.

Certes j'apprécie comme elles le méritent les marques réitérées de sympathie dont vous me comblez ; j'en suis très fier et je vous en remercie du fond du cœur. Mais j'ai quelque scrupule à tenir une place que d'autres occuperaient, sinon avec plus de dévouement, certainement avec plus d'éclat, et surtout j'éprouve la crainte très vive d'être au-dessous de ce que vous attendez de moi dans les circonstances actuelles et de ne pas répondre dignement à vos légitimes aspirations.

Que cette année 1900 marque, comme certains l'affirment, l'aurore d'une période séculaire nouvelle ou qu'elle représente, comme cela me paraît plus logique, les derniers jours de notre vieux dix-neuvième siècle, il est un fait bien certain, c'est qu'elle doit être pour la France une année d'Exposition universelle et que, dans quelque mois, nous verrons arriver à Paris, attirés par ces assises internationales du travail et de la science, un grand nombre de collègues venus de tous les points du globe.

Accueillir et fêter ces hommes éminents, leur montrer les richesses naturelles de notre pays et celles qui sont accumulées dans nos collections et nos musées, les associer momentanément à nos travaux, discuter avec eux les grandes questions d'intérêt universel qui font que la science, dépassant les limites étroites des diverses patries, tend chaque jour de plus en plus à devenir *mondiale* ; telle est la besogne qui va bientôt s'imposer à nos efforts et réclamer tous nos soins.

Le brillant passé de notre Société nous crée de sérieuses obligations. Rappelez-vous les noms de nos fondateurs et ceux de nos anciens Présidents et membres honoraires. Ils s'appelaient Latreille, E. Geoffroy-Saint-Hilaire, Savigny, Léon Dufour, Lacordaire, Walckenaer, Rambur, Duponchel, Boisduval, Audinet-Serville, H. Milne-Edwards, Robin, P. Gervais, etc. Je cite au hasard parmi nos grands anciens, parmi ceux qui depuis longtemps disparus ont laissé dans nos mémoires une trace impérissable, et si je

ne craignais de blesser la modestie de collègues vénérés, je pourrais poursuivre jusqu'à notre époque la liste de ces noms célèbres dans les fastes de l'Entomologie.

Sans doute, avec de pareils ancêtres, une exposition rétrospective devient chose facile; les soixante-dix volumes de nos *Annales* et *Bulletins* feront bonne figure à côté des publications des nombreuses Académies et Sociétés savantes dont les œuvres vont se trouver réunies dans le nouveau Palais des arts libéraux.

Mais noblesse oblige, et notre compagnie se doit à elle-même de maintenir les glorieuses traditions de ses premières années et de prouver aux Sociétés rivales qu'elle a su défricher et mettre en valeur le terrain conquis par ses vaillants fondateurs.

J'affirme, Messieurs, que nous n'avons point failli, que nous ne faillirons pas à ce devoir.

Si je me sens bien faible et bien humble pour porter le drapeau qu'ont tenu tant de bras illustres, c'est en vous-mêmes que je chercherai ma force. Vos suffrages me donneront l'autorité dont j'étais dépourvu et dont je ne veux user d'ailleurs que pour assurer le développement continu de notre Société.

Nous sommes aujourd'hui près de 500 membres. Tous les grands établissements d'enseignement supérieur, le Muséum d'Histoire naturelle, le Collège de France, la Sorbonne, la Faculté de Médecine, l'École de Pharmacie, l'Institut agronomique, toutes les Universités de province sont largement représentés parmi nous.

Rien, à mon avis, de plus désirable, rien de plus profitable au progrès de l'Entomologie que cette union permanente et cordiale entre les ardens pionniers de la science libre et les professeurs ou directeurs de laboratoires.

Notre situation dans le monde scientifique est grande et belle. Chaque jour nous apporte des preuves nouvelles et palpables de l'estime en laquelle nos travaux sont tenus par les savants les plus autorisés.

L'an dernier l'Institut décernait au Père Pantel le Prix THORE pour ses merveilleuses études sur le développement des Tachinaires parasites des Phasmes et le Prix SAVIGNY à notre jeune collègue Coutière qui, à l'exemple du courageux explorateur de l'Expédition d'Égypte, était allé lui-même recueillir dans la mer Rouge les matériaux de son importante monographie des *Alpheidae*. Cette année nos triomphes sont plus nombreux encore : c'est A. Viré, que l'Académie proclame lauréat du Prix BORDIN pour ses travaux sur les Arthropodes des cavernes; c'est Roule, qui reçoit le Prix SERRES pour ses longues recherches sur l'embryogénie des Crustacés; Vayssières, aussi versé dans l'ana-

tomie des Mollusques que dans celle des Insectes, obtient le PRIX GAY; et Lécaillon voit couronner par le PRIX SAINTOUR sa thèse sur l'évolution embryonnaire des Chrysomélides, début plein de promesses et riche déjà de faits solidement établis.

Enfin, Messieurs, faut-il vous rappeler les distinctions si flatteuses dont ont été l'objet notre savant collègue M. A. Milne-Edwards, promu commandeur de la Légion d'honneur, MM. Marmottan et Bonhoure, nommés chevaliers du même ordre, M. Clément, décoré du mérite agricole pour les services sans nombre qu'il a rendus à l'apiculture et à l'entomologie appliquée.

Si nous pouvions un instant douter de nous-mêmes en comparant notre œuvre à celle de nos devanciers, de pareils succès ne sont-ils pas de nature à rassurer les plus timorés? Ne nous permettent-ils pas de comprendre l'importance que les entomologistes du monde entier attachent au titre de membre d'honneur de notre Société? et n'avais-je pas raison de vous dire tout à l'heure que, fiers du passé, nous avons le droit de nous montrer confiants en l'avenir?

Mais n'oublions pas que cet état prospère nous le devons en grande partie à la bonne harmonie qui règne parmi nous et qui se traduit par l'application la plus large du principe socialiste : *Tous pour chacun et chacun pour tous*. C'est ainsi qu'associés dans une continue et amicale collaboration, nous fécondons réciproquement nos efforts et nous en décuptions les résultats. A la production anarchique des siècles passés succédera forcément, avant qu'il soit longtemps, le travail collectif organisé dont l'effet bienfaisant se fera sentir d'abord dans le domaine si vaste et si complexe de la Biologie, où, plus que partout ailleurs, s'impose la nécessité d'une sage répartition des spécialités. Aux sociétés telles que la nôtre, vivantes et progressistes, il appartient d'entrer résolument dans cette voie nouvelle et d'y entraîner les autres.

N'oublions pas non plus que tout progrès n'est possible qu'avec un bon gouvernement et que notre reconnaissance très profonde est due aux hommes dévoués qui, avec la plus parfaite abnégation, dirigent les rouages de notre compagnie.

C'est pourquoi, Messieurs, je suis convaincu d'être votre interprète à tous en adressant nos meilleurs remerciements à tous les membres du bureau sortants : au président M. Alluaud, qui a su résoudre le problème d'être à la fois un voyageur hors pair et un excellent administrateur, à notre secrétaire M. Ph. François, dont le zèle et la ponctualité ont épuisé déjà toutes les formules d'éloge, à notre bibliothécaire M. Léveillé, *the right man in the right place*, dont la complaisance n'a d'égale que son érudition à toute épreuve, à notre tré-

sorier M. Fumouze, dont vous venez de récompenser les longs et délicats services par un vote unanime qui lui confère l'honorariat; enfin à tous nos collègues membres du Conseil et des diverses Commissions qui n'ont jamais marchandé ni leur temps ni leur peine lorsqu'il s'agissait d'assurer le bon fonctionnement de notre Société.

La Société accueille par d'unanimes applaudissements les discours de MM. Ch. Alluaud et A. Giard.

Correspondance. — MM. Bezagu, Bourgoïn, Chabanaud, Delval et Eusebio remercient la Société de leur admission.

Démission. — M. le Dr Samuel Bonjour, de Nantes, adresse au Président sa démission de membre de la Société.

Admission. — M. Camille Morel, 1, rue Bosio, Paris. *Coléoptères d'Europe et circa.*

Présentations. — M. Joseph Clermont, employé à l'administration des Postes, 48, rue Jean-Jacques Rousseau, Paris [*Entomologie générale pr. Coléoptères*], présenté par M. J. Magnin. — Commissaires-rapporteurs MM. M.-A. Jeanson et Ch. Lahaussais.

— M. Léo Leymarie, 409, rue de la Convention, Paris [*Lépidoptères pr. diurnes*], présenté par M. G.-A. Poujade. — Commissaires-rapporteurs MM. l'abbé J. de Joannis et P. Mabilie.

Changement d'adresse. — M. le Dr H. Coutière, 21 bis, boul. de Port-Royal, Paris.

Captures et observations biologiques. — M. Ch. Pérez mentionne la capture qu'il a faite de *Prestwichia aquatica* Lubbock, dans les mares de Belle Croix (forêt de Fontainebleau), à la fin de juin 1898. Ce rare et intéressant Chalcidien n'avait pas encore été signalé en France.

— M. P. Lesne montre à la Société, de la part de M. le professeur E.-L. Bouvier, une curieuse larve de Malacoderme provenant de Bornéo et assez voisine de celles qui ont été décrites récemment par M. J. Bourgeois ⁽¹⁾. Cette larve fait partie des collections du Muséum de Paris; elle provient d'un échange conclu avec le Musée de Cambridge. M. Lesne fait aussi passer sous les yeux de ses collègues une intéressante photographie communiquée par M. le Dr Sharp et qui représente une larve très voisine de la larve n° 1 de M. Bour-

(1) *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, n° 4, p. 58 et suiv.

geois, où peut-être même identique à celle-ci. La photographie a été prise sur le vivant, à Kuala-Aring (Utu Leheb, Kalantan), dans la presqu'île de Malacca, par M. Annandale.

Communications.

Description de deux nouveaux *Staphylinidae* [COL.] de la Haute Provence

Par P. DE PEYERIMHOFF.

Leptusa (Sipalia) Rey Helitasi ⁽¹⁾, n. sp.

Angustus, ferrugineo-rufus, tenuissime punctulatus. Oculi minutissimi. Coleoptera quam pronoti tertia parte breviora. Segmenta abdominis quatuor priora basi transversim impressa.

♂ *Coleoptera ad suturam longitudinaliter elevata, utrinque in medio impressa, scabrosa. Abdominis ultima duo segmenta simplicia* ⁽²⁾.

♀ *Coleoptera plana, leviter rugulosa.*

Unicolore, assez brillant; pubescence courte. Les trois premiers articles des antennes diminuant progressivement de longueur et de largeur. Pronotum à peu près aussi large que les élytres, transversal, orné de soies latérales, portant au milieu une impression longitudinale un peu géminée. Élytres d'un tiers plus courts, élargis en arrière. Abdomen à peine pointillé à la base des premiers segments, sétuleux. — Long. 1,8 mill.

Montagnes de Siron (1.658^m) et de Blayeul (2.491^m) (arrondissement de Digne), à partir de 1.400^m jusqu'au sommet, sous les grosses pierres enfoncées; le Dr Chobaut a pris 2 ♀ de cette espèce au sommet du Ventoux (1.912^m) (Vaucluse), il a eu la gracieuseté de me donner un de ces exemplaires.

M. Abeille de Perrin a bien voulu me communiquer le type de *Lept. impressa* Rey, que j'ai pu comparer à l'espèce décrite ici; voici les points principaux de cette comparaison :

(1) Dédié à M. M. Héltas, secrétaire général de la Préfecture de la Mayenne.

(2) Un de mes exemplaires porte un vestige de tubercule sur le pénultième segment.

— Yeux assez grands. Abdomen à large fascie préapicale foncée; pronotum (♂ exclus.?) portant une très forte impression géminée. Élytres plus longs, non élargis postérieurement. ♂ 7^e segment abdominal tuberculé, 8^e à bord postérieur aiguë mais peu profondément incisé au milieu. *L. impressa*.

— Yeux très petits. Abdomen unicolore. Pronotum très légèrement impressionné chez les deux sexes. Élytres plus courts, un peu élargis postérieurement. ♂ 7^e segment abdominal mutique, 8^e segment simple et entier *L. Helitasi*.

Cette espèce, à supposer que toutes celles actuellement connues du sous-genre *Sipalia* Rey dussent être versées dans le sous-genre *Geostiba* Thoms., suffirait au maintien de ce sous-genre *Sipalia*. Il est possible que *Sip. impressa* Rey soit également une *Leptusa* et qu'il faille la maintenir à sa place primitive (1).

Atheta (*Geostiba* Thoms.) *incisa*, n. sp.

Praecedenti magnitudine, forma ac colore similis, tarsi autem medii articulis quinque compositi; coleoptera in utroque sexu scabrosa. Segmenta abdominis tria priora basi transversim impressa.

♂ *Coleoptera haud elevata, crebre scabrosa. Abdominis segmentum dorsale septimum apice summo mucronatum, octavum profunde incisum.*

♀ *Coleoptera segmentaque duo ultima simplicia.*

Très semblable au précédent; ponctuation encore plus éparse et moins visible. Premiers articles des antennes plus grêles. Pronotum plus développé, substransversal, un peu plus large que les élytres, longitudinalement impressionné. Élytres à impression médiane sensible, même chez la ♀. — Long. 1,8-2 mill.

Barre des Dourbes! (1.600^m, pas de la Faille, pas de Tartonne, dans les mousses); Archail! (1.400^m, un ex. sous une pierre); Montagne du Cheval Blanc, vers 2.000^m! (col de Talon, sous une pierre, col de la Cine, très abondant dans les souches de certaines Graminées et dans la terre); Forêt de Faillefeu! (1.500^m, 2 ex. dans les Mousses). Toutes ces localités se trouvent dans l'arrondissement de Digne.

L'espèce est remarquable par ses caractères sexuels masculins, et surtout par la très grande échancrure triangulaire du dernier segment dorsal de l'abdomen. La ♀ n'est guère distincte, à part la différence

(1) J'ai vérifié les tarses pour les 2 sexes chez chacune des espèces nouvellement décrites, mais je n'ai pu faire cet examen pour *Lept. impressa* Rey.

générique, de celle de *Lept. Helitasi*, que par le 4^e segment visible de l'abdomen plan, non impressionné à la base, par le pronotum plus robuste et les premiers articles des antennes plus allongés. La sculpture des élytres est aussi bien plus accusée en général, mais je l'ai vue très atténuée chez quelques exemplaires de basse altitude.

Sur les *Xylopertha pustulata* Fabr. et *X. Chevrieri* Villa [COL.]

Par P. LESNE.

Il est utile d'appeler l'attention sur l'existence de deux espèces de *Xylopertha*, habitant l'une et l'autre la plus grande partie de la région méditerranéenne, et qui sont restées confondues jusqu'ici sous les noms de *pustulata* Fabr., *Chevrieri* Villa, *humeralis* Lucas, *foveicollis* Allard, etc., bien que leurs caractères distinctifs soient très apparents et fort peu variables.

De ces deux espèces, l'une a le corps plus court, un peu plus robuste. Son prothorax est transverse et assez fortement arqué sur les côtés. La déclivité apicale des élytres n'est pas brusquement coupée : dans la région de son bord supérieur, elle se relie insensiblement aux parties dorsales des élytres par une surface courbe qui serait régulière si elle n'était interrompue en son milieu par une dépression longitudinale dont le fond est occupé par le prolongement antérieur très atténué du bourrelet sutural. L'œil est de grandeur moyenne : sur l'insecte vu de profil il atteint à peine les dimensions de la hanche antérieure.

La seconde espèce se distingue surtout de la précédente par la forme générale du corps un peu plus allongée, par le prothorax aussi long que large, faiblement arqué sur les côtés, par la déclivité apicale des élytres formant une troncature brusque, nettement délimitée dans sa région supérieure et sans dépression suturale. Les yeux sont très gros et très saillants : sur l'insecte vu de profil chacun de ces organes se montre notablement plus grand que la hanche antérieure.

En recourant à l'examen des *types*, rendu nécessaire par la brièveté et l'insuffisance des descriptions originales ⁽¹⁾, la nomenclature et la synonymie des deux espèces ont pu être fixées. M. le professeur

(1) Les descriptions de Fabricius, de Villa et de Lucas n'ont guère qu'un intérêt historique. Celle de M. Allard mentionne deux bons caractères distinctifs : les proportions du prothorax et la densité des soies de la couronne frontale ; mais ces caractères sont indiqués parmi beaucoup d'autres qui ne sont pas spécifiques.

Meinert a bien voulu comparer les spécimens que nous lui avons fait parvenir au *type* de l'*Apate pustulata* de Fabricius, conservé au Musée de Copenhague. Il ressort de cette comparaison que le nom de *pustulata* doit être attribué à la première des formes caractérisées ci-dessus, celle dont le prothorax est transverse et dont les yeux sont de grandeur moyenne. D'autre part, le Muséum de Paris possédait des exemplaires typiques du *X. Chevrieri* Villa et le *type* du *X. humeralis* Lucas. Ce dernier ne diffère pas du *pustulata*. Le *Chevrieri*, au contraire, se rapporte à l'espèce macrophthalme, à élytres brusquement tronqués en arrière. Il en est de même du *foveicollis* dont les spécimens types nous ont été obligeamment communiqués par M. Ernest Allard ⁽¹⁾.

La synonymie des deux espèces s'établit donc comme il suit :

Xylopertha pustulata Fabr., 1801.

« *humeralis* Lucas, 1843 ⁽²⁾.

Xylopertha Chevrieri Villa, 1835.

« *foveicollis* Allard, 1869.

Un point seulement resterait à fixer, celui relatif à l'identification du *Xylopertha barbifrons* Walker ⁽³⁾, de la presque sinaitique, que sa description très brève ne permet pas de rattacher à l'une ou à l'autre des deux formes précédentes, bien qu'elle semble s'appliquer à l'une d'elles.

Les *Xylopertha pustulata* et *Chevrieri* se rencontrent dans la région méditerranéenne presque toute entière. Cependant, en Afrique, ces espèces paraissent confinées dans le Maghreb et, du côté de l'Est, elles n'ont pas encore été signalées comme se trouvant en Perse. Fréquemment elles habitent les mêmes localités ⁽⁴⁾; mais elles n'ont pas exactement même distribution géographique, le *Xylopertha Chevrieri* remontant vers le Nord, sur le pourtour du massif alpin, au delà des

(1) Ils se trouvent aujourd'hui dans les collections de M. R. Oberthür.

(2) C'est aussi *humeralis* du *Catalogue* de Dejean (3^e édit., p. 334).

(3) *List Col. coll. by Lord*, 1871. — Je n'ai pas obtenu de renseignements sur le *type* qui fait sans doute partie des collections de l'École de Médecine du Caire.

(4) Par exemple à Saint-Zacharie (Var) (V. Mayet), à Marseille (E. Abeille de Perrin, V. Mayet), à Montpellier (V. Mayet), à Ria (Pyrénées-Orientales) (Xambeu), à Tanger (Schousboe, Favier), à Oran (H. Lucas, V. Mayet, etc.), à Bone (Leprieur), à Souk-el-Arba (D^r Normand), à Akbes (H^{le}-Syrie) (Delagrangé), etc.

limites de la région méditerranéenne ⁽¹⁾, limites que ne paraît pas franchir le *pustulata*.

Nous ne pouvons rien dire de général quant aux essences aux dépens desquelles se développent ces deux espèces. Les renseignements précis que nous possédons, et que nous avons puisés presque tous dans les collections de MM. Valéry Mayet et Xamheu, sont encore trop peu nombreux. Il semble que le *pustulata* ait une préférence marquée pour le *Quercus Ilex*, tandis que le *Chevrieri* vit à la fois dans ce même Chêne, dans le Figuier, dans le Laurier, et certainement aussi dans le bois d'autres arbres.

Diagnoses de deux nouveaux *Dromius* de Barbarie [COL.]

Par L. BEDEL.

***Dromius pilifer*, n. sp.** — *Elongatus, rufo-testaceus, elytris paulo dilutioribus, nitidus, superne tenuissime disperse pubescens. Caput cum oculis ovatum, convexum, punctis sparsis. Prothorax capite fere angustior, leviter subcordatus. Elytra elongata, nitida, striis parum regularibus, externis plus minusve deletis, intervallis subseriatim tenuissime punctulatis, 3^e, 5^e et 7^e punctis majoribus pilisque longis et erectis seriatim signatis. Tarsi articulo penultimo angusto, simplici. Mentum haud dentatum.* — Long. 4 mill.

Algérie occidentale : Daya!, à la fin de novembre 1875; trois individus.

Ce *Dromius*, qu'on prendrait à première vue pour un *D. linearis* immature, est remarquable entre tous par la pubescence extrêmement ténue qu'on distingue sur la tête, le pronotum et les élytres et par la

(1) Le *X. Chevieri* existe dans le Dauphiné, en Savoie et dans le Tyrol. Il est très probable que les individus signalés par Rey comme ayant été trouvés à Genève appartiennent bien à cette espèce; mais le fait mériterait d'être vérifié.

Il serait intéressant d'identifier aussi les spécimens capturés dans le bassin moyen de la Garonne et qui ont été mentionnés dans le catalogue de Delherm et Lucante. M. Baudi de Selve cite le « *Xylopertha pustulata* F. » comme existant à Chypre (*Berl. ent. Zeitschr.*, 1873, p. 336), et Th. Köppen donne le même nom à l'espèce que l'on observe sur la côte méridionale de Crimée et qui vit dans le bois du *Punica granatum* (*Die Schäd. Ins. Russl.*, p. 191). Ces indications ne pourront être utilisées qu'après contrôle des déterminations.

présence, sur les 3^e, 5^e et 7^e interstries, de gros points qui donnent naissance à de longs poils dressés. La pubescence dans son ensemble et la sculpture des élytres le rapprochent du *Demetrius atricapillus* L., mais le pénultième article des tarses n'est pas bilobé. C'est évidemment une forme de transition entre les genres *Dromius* et *Demetrius*.

D. dendrobates, n. sp. — *Subelongatus, rufo-testaceus, elytris pallidioribus, nigro-fasciatis, superne glaberrimus, nitidulus. Caput cum oculis ovatum, fronte creberrime punctulata, vertice laeviore. Prothorax latiusculus, haud transversus, postice sinuato-subattenuatus, superne fere laevis, ad angulos posticos impresso-depressus. Elytra elongato-subovata, alutacea, substriata, intervallis 3^o et 7^o seriatim obscure quadripunctatis, post medium fascia lata transversa, communi, piceo-nigra, marginem externum haud occupante, antice per suturam ad scutellum producta, angulo scutellari saepius infuscato.* — Long. 4,6-5 mill.

Algérie orientale : forêt de l'Edough à Bugeaud, près Bone!, en battant les branches de *Quercus suber*; La Calle (Hénou!). — Tunisie : Souk-el-Arba (Dr Sicard!), sous une écorce d'*Eucalyptus*.

Cette espèce est remarquable par la ponctuation serrée qui couvre le front et le dessin très accusé de la fascie élytrale; elle vient se placer à côté du *D. vage-pictus* Fairm. (*communimacula* Fairm.).

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1899, II, 26. — 1900, I, 4. — L. BORDAS : Considérations générales sur les organes reproducteurs mâles des Coléoptères à testicules composés et disposés en grappes.

Académie Impériale des Sciences de St-Petersbourg (Annuaire du Musée zoologique), 1899, III. — B. JAKOWLEW : De speciebus novis generum *Dorcadion* Dalm. et *Neodorcadion* Ganglb. — G. JACOBSON : De genere *Alurno* (Coleoptera, Chrysomelidae). — *Duae Italiae novae* (Hymenoptera, Cynipidae). — B. JAKOWLEFF : Nouvelles espèces du genre *Sphenoptera* (Coleoptera, Buprestidae). — G. JACOBSON : De Specie nova generis *Phasia* (Diptera, Muscidae), fig.

Canadian Entomologist (The), XXXI, 42, 1899. — A. MOFFAT : Butterfly Wing Structure (pl.). — C. ROBERTSON : On the Classification of

- Bees. — W.-H. ASHMEAD : Classification of the Entomophilous Wasps, or the Superfamily Sphegoidea. — R.-P. CURRIE : New Species of North American Myrmeleonidae, V. — T.-D.-A. COCKRELL : A Coccid from the far North. — A. GIBSON : *Lepisesia ulalume* Strecker, in British Columbia.
- Entomologische Nachrichten*, XXV, 24, 1899. — F. KARSCH : Neue Odonaten aus Ost- und Südafrika, mit Einschluss des Seengebietes.
- Entomologist (The)*, XXXIII, 440, 1900. — A.-G. BUTLER : On a new Genus of *Lycaenidae* hitherto confounded with *Catochrysops*. — W.-J. LUCAS : The Orthopterous Fauna of the British Isles, Belgium and Holland (fig.). — A. QUAIL : Entomology in New Zealand. — Notes diverses.
- Entomologist's monthly Magazine (The)*, 428, 1900. — C.-T. CRUTWELL : Great Flight of *Colias edusa* in the West of Ireland. — T.-A. CHAPMAN : *Bacotia sepium* Spr., in the New Forest, with Notes on its Characters. — L. WALSHINGHAM and J.-H. DURRANT : Revision of the Nomenclature of Microlepidoptera. — C.-G. BARRETT : Occurrence of *Zelleria phyllirella* Millière, in Ireland. — R. MAC LACHLAN : Concerning *Teratopsocus maculipennis* Reuter, with Notes on the Brachypterous Condition in females of *Psocidae*. — W. SMITH : Large Colonies of Ants in New Zealand. — J.-J. WALKER : Coleoptera and Lepidoptera at Rannoch. — Notes diverses.
- Feuille des Jeunes Naturalistes (La)*, XXX, 351, 1900. — DECAUX : Notes pour servir à l'étude des mœurs de quelques *Anisotoma* Scht., *Liodes* Latr. — Description des espèces françaises d'après leurs auteurs. — Notes spéciales et locales.
- Illustrierte Zeitschrift für Entomologie*, V, 1, 1900. — Dr C.-H. VOGLER : Beiträge zur Metamorphose der *Teichomyza fusca* (fig.). — DR. FISCHER : Lepidopterologische Experimental-Forschungen. — C. SCHENKLING : Zum Fortpflanzungsgeschäft von *Chrysomela varians* Schall. — Notes diverses.
- Instructor (El)*, XIV, 7-8, 1899.○
- Naturaliste*, XXII, 308, 1900. — CAP. XAMBEU : Mœurs et métamorphoses du *Brachyderes lusitanicus* Fabr., Coléoptère de la famille des Rhynchophores. — L. PLANET : Description d'un Coléoptère nouveau (fig.).
- Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark (Mittheilungen)* für 1898-1899. — PROF. F. THEN : Drei bekannte und eine neue Species der Cicadinen-Gattung *Dellocephalus* (fig.).

Psyche, VIII, 282, 1899. — Manuscript Notes by the late Th. W. Harris on Say's insects and papers. — H.-G. DYAR : Life histories of N. American Geometridae, V. — T.-D.-A. COCKERELL : A new Meloid beetle parasitic on *Anthophora*. — G.-B. KING : A new *Pulvinaria* from Massachusetts (fig.). — Janet's recent Observations on Ants, etc. — T.-D.-A. COCKERELL : The Panurgine bees.

R. Accademia dei Lincei (Atti), 1899, II, 12. ⊙

Revue électorique d'Apiculture, VII, 1, 1900 (2 exempl.). — DOOLITTLE : Durée de la vie chez les Abeilles.

Societas Entomologica, XIV, 19, 1900. — G. KRÜGER : Aus Nah und Fern. — F. STRASSER : *Carabus Wiedemanni* var. *Vaitoiani*. — P. BORN : Meine Exkursion von 1899.

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire (Bulletin), XXV, 11, 1899. ⊙

Stettiner Entomologische Zeitung, LV, 1-3, 1894. — H.-J. KOLBE : Ueber einige neue von Herrn J. Fruhstorfer auf Java entdeckte Coleopteren (fig.). — Beiträge zur Kenntniss der Longicornier (Coleoptera). — Die Coleopteren-Fauna Central-Afrikas. — HERING : Microlepidopterologisches aus West-Indien. — Dr E. BERGROTH : Ueber einige australische Dipteren. — R. PUNGELER : *Acidalia adelpharia*, n. sp. — H. GROSS : Zur Biologie der *Spilothyrus althaeae* Hubner. — Die Raupe von *Cidaria alaudaria* Freyer. — H.-J. KOLBE : Der Pfeilgiftkafer der Kalaharri-Wüste, *Diamphidia simplex* Péring. (*locusta* Fairm.). — E. RADE : Mit dem Tode bestraft. — E. HERING : Zur Lebensgeschichte der *Tinea semifulvella* Hw. und *Blabophanes ferruginella* Hb. — M. WISKOTT : Eine neue europäische Noctuide, *Luperina Standfussi* n. sp.

University of Tennessee, 1° Record, 1899-1900, 2° Agricultural Experiment Station (Bulletin). — R.-L. WATTS : Persimmons, pl. et f. ⊙

Wiener Entomologische Zeitung, XVIII, 10, 1899 (2 exempl.). — F.-W. KONOW : Neue Sudamerikanische *Stromboceros*-Arten (Fam. Tenthredinidae).

Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina, VI, 1899. — Dr C. VERHOEFF : Diplopoden fauna von Bosnien, Hercegovina und Dalmatien. — E. WASMANN : Zur Kenntniss der bosnischen Myrmekophilen und Ameisen (fig.). — V. APFELBECK : Zur Kenntniss der palaarktischen Curculioniden. Synonymische und zoogeographische Beiträge nebst Beschreibungen neuer Arten von der Balkanhalbinsel.

- ALLUAUD (CH.) : Contributions à la faune entomologique de la Région malgache, 6^e note (*Bull. Soc. Ent. Fr.*), 1899, 4 p.*
- BONNIER (J.) : Sur les Pénéides du genre *Cerataspis* (*Misc. biol.*), 1899, 23 p., 4 pl., fig.*
- HOARD (C.) : Étude anatomique de deux galles du Genévrier (*loc. cit.*), 1899, 13 p., 1 pl., fig.*
- JOUSSET DE BELLESME : Des phénomènes physiologiques de la métamorphosé chez la Libellule déprimée; Paris, 1878, 69 p., 2 pl. — Don de M. L. Bedel.
- MÉGNIN (M.) : Mémoire anatomique et zoologique sur un nouvel Acarien de la famille des Sarcoptides, le *Tyroglyphus rostro-serratus* et sur son hypopus (*Journ. Anat. Physiol.*), 1873, 18 p., 3 pl., col. — Don de M. L. Bedel.
- MILNE-EDWARDS (H.) : Mémoire sur quelques Crustacés nouveaux (*Ann. Sc. Nat.*), 15 p., 3 pl. — Don de M. L. Bedel.
- NEEDHAM (J.-G.) : Directions for collecting and rearing Dragon Flies, Stone Flies and May Flies (*Bull. U. S. Nat. Mus.*), 1899, 9 p., fig.*
- PHILIPPI (F.) : Monografia del Jénero *Rhyephenes* Schönh. (*An. Univ.*), 1899, 15 p.*
- RASPAIL (X.) : A propos d'un projet de réforme à la nomenclature des Êtres organisés et des Corps inorganiques (*Mém. Soc. « Ant. Alz. »*), 1899, 6 p.*
- RÉGIMBART (Dr M.) : Revision des *Dytiscidae* de la région indo-sino-malaise (*Ann. Soc. Ent. Fr.*), 1899, 182 p., fig.*
- REY PAILHADE (J. DE) : Projet d'établissement d'un système Mètre-Gramme-Jour pour l'unification des mesures physiologiques; Toulouse, 1899, 8 p.*⊙
- ID. : Décimalisation du Jour et du Cercle. — Table à neuf chiffres pour la transformation des angles et des degrés en fractions décimales du Jour et du Cercle; Toulouse, 1899.⊙
- TÜMPER (Dr R.) : Die Geradflügler Mitteleuropas, livr. 6, 24 p., 3 p., col. et fig. 1899. — Acquis pour la Bibliothèque.

A. L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 21 janvier 1900.

Présidence de M. A. GIARD.

Nécrologie. — Le Président a le profond regret de faire part à la Société de la mort du D^r Richard-Henry Meade, décédé à Bradford (Angleterre) le 23 décembre dernier. — Le D^r Meade, qui faisait partie de la Société entomologique de France depuis 1892, s'occupait de l'étude des Diptères et principalement des Muscides. Beaucoup de nos Collègues ont eu l'occasion d'apprécier la complaisance inépuisable et la courtoisie de ce spécialiste distingué.

— Le Président annonce également la mort du Professeur A.-F. Marion, de la Faculté des Sciences de Marseille. Bien que ce Zoologiste éminent ne fit pas partie de notre Société, il était connu dans le monde de l'Entomologie par ses longues et belles études sur le *Phylloxera*. Les Gouvernements russe et hongrois avaient fait appel à sa compétence pour combattre l'invasion du terrible ravageur des Vignes. Marion avait aussi publié d'intéressantes recherches sur les Crustacés de la Méditerranée.

Admissions. — M. Joseph Clermont, employé à l'administration des Postes, 48, rue Jean-Jacques Rousseau, Paris. *Entomologie générale, pr. Coléoptères.*

— M. Leo Leymarie, 109, rue de la Convention, Paris. *Lépidoptères, pr. Diurnes.*

Présentations. — M. Jules Anglas, préparateur de Zoologie à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris, 62, boulevard de Port-Royal [*Entomologie générale, Lépidoptères*], présenté par M. A. Giard. — Commissaires-rapporteurs MM. L.-F. Henneguy et Ch. Pérez.

— M. Lamy, préparateur de Zoologie à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris, 16, avenue de Montsouris [*Arachnides*], présenté par M. E.-L. Bouvier. — Commissaires-rapporteurs MM. P. Lesne et E. Simon.

Prix Dollfus pour 1899. — Au nom de la Commission du PRIX DOLLFUS, M. P. Lesne donne lecture du rapport suivant.

Messieurs,

La Commission du Prix J. Dollfus s'est réunie, le 22 janvier courant, sous la présidence de M. le professeur A. Giard. Aucun ouvrage n'ayant été présenté au concours ni désigné d'office pour y prendre part, la Commission a conclu à l'unanimité qu'il n'y avait pas lieu de décerner le prix pour l'année 1899.

Changements d'adresse. — M. H. Donckier de Donceel, à partir du 15 avril 1900, 40, avenue d'Orléans, Paris.

— M. Carl Felsche, 27, Dresdener Strasse, Leipsig (Allemagne).

Communications.

Contributions à la faune entomologique de la Région malgache

Par CH. ALLUAUD.

8^e note (1).

Diagnoses d'espèces nouvelles et notes d'habitat.

CICINDELIDAE.

Cicindela (Chaetostyla) andriana, n. sp. — Long. 16 mill. —

Espèce intermédiaire entre *C. regalis* Dej., d'Afrique tropicale et *C. maheva* Fairm., de Madagascar, qui sont également des *Chaetostyla* Ganglb., ayant un pinceau de poils raides près du sommet du 4^e article des antennes chez le ♂. Le tableau suivant et les figures ci-jointes suffiront à distinguer ces trois espèces.



Fig. 1. Fig. 2 (2).

Taches jaunes des élytres larges et peu obliques; ponctuation des élytres

(1) Voir 7^e note in *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 378.

(2) Fig. 1, élytre gauche de *C. maheva* Fairm. — Fig. 2, élytre gauche de *C. andriana*, n. sp.

assez forte; coloration foncière (entre les taches) d'un bleu foncé un peu brillant; tache scutellaire n'atteignant pas le quart de la longueur des élytres ni la 1^{re} bande transversale (humérale); tache suivante peu oblique *REGALIS* Dej.

Taches jaunes des élytres larges et un peu obliques; ponctuation des élytres plus faible; coloration foncière (entre les taches) d'un noir mat; tache scutellaire ⁽¹⁾ atteignant le tiers de la longueur des élytres et dépassant la 1^{re} bande transversale (humérale); tache suivante peu oblique (fig. 2)..
..... *andriana*, n. sp.

Taches jaunes des élytres beaucoup moins larges et plus obliques; ponctuation des élytres assez forte; coloration foncière (entre les taches) d'un noir mat; tache scutellaire atteignant le milieu de la longueur des élytres; tache suivante très oblique (fig. 1)..... *MAHEVA* Fairm.

C. andriana me vient du pays Mahafaly à l'extrême sud-ouest de Madagascar.

C. maheva, décrite de Suberbieville, semble jusqu'à présent localisée chez les Sakalaves du Nord.

M. J. Künckel d'Herculais (*apud* Grandidier, *Hist. Madag.*, Col., pl. 24) semble avoir figuré ces deux espèces sous le même nom de *maheva*; la fig. 3 doit représenter *C. maheva* Fairm., et la fig. 4 représente certainement *C. andriana*.

CARABIDAE.

PENTAGONICA *PERRIERI* Fairm. — J'ai pris cette espèce à Diego-Suarez, près d'Antsirane, à une très faible altitude. Notre collègue M. d'Emmerez l'a également trouvée à l'île Maurice où les exemplaires semblent plus foncés; l'un d'eux est complètement noir.

COLLIURIS ⁽²⁾ (*CASNONIA*) *COERULANS* Alluaud 1900 (*Bull. Mus.*, 1899). = *Stenidea Perrieri* Fairm. 1898. Pour moi cette espèce est bien un *Colliuris*. C'est le *Casnonia coerulans* Künck. (*apud* Grandidier, *Hist. Madag.*, Col., pl. 28, fig. 10).

(1) J'appelle ainsi la tache allongée qui part de l'écusson et longe la suture sur chaque élytre.

(2) Pour le nom de genre, cf. Bedel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 246.

STENIDEA RUDICOLLIS Fairm. est également, à mon avis, un *Colliuris*. Il a un peu l'aspect de *C. madagascariensis* Alluaud 1900 (*Bull. Mus.*, 1899), mais en est très distinct par son thorax régulièrement allongé en avant, nullement globuleux, très fortement ponctué et granuleux.

TRITOMIDAE.

BERGINUS TAMARISCI Woll. — J'ai pris cette espèce communément à Diego-Suarez. Le R. P. Belon, à qui j'ai communiqué quelques exemplaires de cette provenance, m'a dit qu'ils étaient en tout semblables à ceux que l'on prend en Corse et en Algérie.

BYRRHIDAE (ANOBIIDAE¹ AUCT.).

Xyletinus suturatus, n. sp. — Long. 3-3,7 mill. — Antennes, tête, thorax et écusson brun-rouges; élytres profondément striés, noirs avec la suture brun-rouge. Cette dernière teinte affecte toujours au moins la première côte et au plus les trois premières côtes de part et d'autre de la suture. Le thorax et les élytres sont recouverts d'une pubescence claire excessivement courte. Le dessous est brun foncé avec l'abdomen et les pattes plus clairs. Le métasternum présente un sillon longitudinal très net sur la ligne médiane.

Cette espèce ressemble beaucoup, au premier abord, à *X. ruficollis* Gebl. (*rufithorax* Lareyn.); la disposition des stries est à peu près la même, mais elles sont un peu plus profondes chez *X. suturatus* qui est surtout remarquable par sa suture rougeâtre.

Une série d'exemplaires pris par moi à Diego-Suarez, en mai 1893, sur la montagne d'Ambre.

LASIODERMA TESTACEUM Duft. — J'ai eu, à Diego-Suarez, une boîte de cigares attaquée par cet insecte. Les cigares ont été perforés en tous sens de petits trous ronds. Cette espèce, qui est en voie de devenir cosmopolite, a été prise aussi à l'île Maurice.

Theca limnichoides, n. sp. — Long. 2,5-3 mill. — Forme ovale assez allongée; le dessus noir, irrégulièrement garni de poils dorés couchés. Yeux très gros; chaperon excavé ayant en avant un rebord net et continu. Tête et prothorax médiocrement ponctués; élytres présentant des lignes de points superficiels. Métasternum noir, peu ponctué, peu pubescent, déprimé au milieu, avec quelques gros points dans cette dépression. Abdomen brun foncé, densément garni de poils

clairs et courts. Antennes (dont le premier article est énorme et plus foncé) et tarses roux ; cuisses et tibias de la couleur de l'abdomen.

J'ai pris deux exemplaires de cette jolie espèce sur la montagne d'Ambre, au nord de Madagascar.

Coenocara boleti, n. sp. — Long. 2-2,3 mill. — Taille et aspect de *C. bovistae* Hoffm., d'Europe, mais moins densément ponctué et moins pubescent en dessus, par conséquent plus brillant. Le dessous, notamment le métasternum, est bien plus fortement et moins densément ponctué chez *C. boleti* qui a les stries latérales, près de l'épaule, bien plus marqués en même temps que le calus huméral moins saillant.

Une série d'exemplaires provenant de l'élevage de larves trouvées dans des Bolets arboricoles, à Diego-Suarez, en mai 1893.

Je dois à l'obligeance de M. Fairmaire les descriptions suivantes de deux espèces nouvelles de ma collection.

Ocladius Alluaudi Fairm., n. sp. — Long. 3,5 mill. — Ressemble tout à fait à *O. granatus* Fairm., pour la taille, la sculpture et la coloration ; également d'un brun noir mat, biglobuleux, avec des tubercules semblables ; mais les élytres sont plus brusquement déclives en arrière, leurs tubercules au lieu d'être disposés en séries longitudinales sont irréguliers, plus nombreux et placés un peu transversalement ; en outre, chaque élytre porte, au milieu du disque, une petite touffe de poils fauves très courts ; sur le corselet les tubercules laissent au milieu une dépression longitudinale qui n'existe pas chez le *granatus*.

Nossi-Bé : forêt de Loucoubé (Alluaud). Collection Alluaud et Fairmaire.

Agraecus Fairm., n. g. — Ce nouveau genre est très voisin des *Amarsenes* dont il diffère par le corps non gibbeux, le chaperon plus long, largement tronqué en avant, à suture clypéale à peine indiquée, les yeux bien moins angulés en dehors, les antennes moins courtes, dépassant un peu la base du corselet, plus robustes, les 5 derniers articles plus larges, le prosternum est plus large, plan entre les hanches, peu acuminé, la fourche du mésosternum est plus large, moins profonde avec les branches plus divergentes, la saillie intercoxale est plus large, largement arrondie, les pattes sont plus robustes, les tibias antérieurs faiblement arqués

A. chalcoides Fairm., n. sp. — Long. 28 mill. — *Oblongo-ovatus, postice paulo ampliatus, modice convexus, supra fuscus, vage metallescens, modice nitidus, subtus cum pedibus nitidissimus, quasi vernicatus; capite prothoraceque subopaculis, illo laevi, sat magno, antice parum angustato, clypeo magno, sutura subtiliter impressa, labro sat magno, truncato, rufescente; prothorace sat parvo, transverso, antice vix angustiore, lateribus vix arcuatis, cum basi subtiliter marginatis, dorso laevi, angulis anticis parum productis, posticis rectis; scutello triangulari, elytris fortiter striatis, striis laevibus, intervallis convexis, alutaceis, apice obtuso; subtus laevis, prosterno inter coxas bistriato.*

Madagascar : région nord-ouest, sans localité plus précise; un seul exemplaire (coll. Alluaud).

Observations sur la nourriture de quelques chenilles de Bombycites

Par L. DEMAISON.

Dans la séance du 13 juillet 1898, M. Giard a signalé la très grande abondance des chenilles de *Porthesia chrysorrhea* L. sur le littoral du nord de la France, où elles vivent aux dépens de l'*Hippophae rhamnoides* L. (*Bull. Fr.*, 1898, p. 263). J'ai fait la même observation, à Berck-sur-Mer, au mois de juin 1897; ces chenilles pullulaient alors sur les buissons d'*Hippophae* qui croissent dans les sables. La chenille du *Bombyx quercus* doit s'attaquer aussi à cette plante; je n'ai pu le vérifier d'une façon précise, mais j'ai tout lieu de le supposer, car j'ai trouvé cette espèce au même endroit, et la maigre végétation des dunes ne pouvait guère lui offrir d'autres ressources.

Les chenilles des Bombycites s'accommodent, du reste, des nourritures les plus variées. Il y a quelques années, au printemps, dans mon jardin, à Reims, les jeunes pousses d'un Marronnier d'Inde ont été ravagées par des *chrysorrhea*. Le fait est assez exceptionnel, et cet arbre est généralement à l'abri de leurs atteintes. Mais voici un cas plus singulier encore. Pendant deux étés consécutifs, dans un jardin voisin, les feuilles d'un *Chamaerops* ont été entamées par des chenilles. On m'a remis les auteurs présumés des dégâts, et j'ai constaté, non sans surprise, que les parasites qui s'en prenaient ainsi à un végétal exotique étaient de simples chenilles d'*Ocneria dispar* !

D'autres espèces se prêtent de même à des régimes fort différents. L'*Orgyia antiqua* L., qui se nourrit habituellement de feuilles d'Ormes, de Pruniers et autres arbres fruitiers et forestiers, vit aussi sur les

Pins et les Mélèzes (Hofmann, Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas, p. 292). J'ai élevé à partir de l'œuf, avec de la salade (Laitue ou Chicorée), une famille de ces chenilles provenant d'une ponte que j'avais recueillie en Hollande, et j'ai obtenu par ce procédé une croissance rapide et des insectes parfaits très bien développés.

Des chenilles de *Megasoma repandum* Hb. que j'ai reçues de Cadix, en 1886, m'ont donné lieu à une observation assez curieuse. Aux environs de cette ville, elles vivent sur les Genêts; en Algérie, on les trouve aussi sur les Tamarix. J'ai vu celles que je tenais en captivité manger de fort bon appétit des feuilles de Noisetier qui avaient été laissées par hasard à leur portée, et j'ai pu achever leur éducation en leur servant exclusivement cette nourriture assez insolite pour elles.

Les chenilles de *chrysorrhea* que j'ai rapportées des dunes de Berck m'ont donné des Papillons de petite taille, différents du type ordinaire par la teinte plus foncée et plus rembrunie de la touffe de poils de l'extrémité anale. Une autre variété plus intéressante encore m'est venue de chenilles que mon frère m'avait jadis envoyées de Hammam-Rhira (Algérie). Elle offre sur les ailes supérieures des taches noires très accentuées chez les deux sexes : une tache cellulaire, un point près du bord terminal, à peu près à moitié de la hauteur de l'aile, et un point géminé à l'angle interne. On observe parfois des traces de ces taches chez certains individus mâles du nord de la France. Cette variété a été figurée par Engramelle (Papillons de l'Europe, t. IV, pl. CXXXV, fig. 182 d), mais elle est rare, et nos exemplaires sont presque toujours d'une blancheur immaculée. Je pense que le type primitif de *Porthesia chrysorrhea* devait présenter ces points noirs; ils sont restés constants dans la race algérienne, et se sont perdus dans celle de l'Europe moyenne, où ils reparaissent seulement de temps à autre par atavisme.

Sur l'histolyse musculaire des Hyménoptères

Par L. TERRE.

Les notes de MM. Anglas et Pérez ⁽¹⁾, relatives à l'histolyse musculaire chez les Hyménoptères (Apiens, Vespiens, Formiciens, etc.),

(1) J. ANGLAS. Sur l'histolyse et l'histogénèse des muscles des Hyménoptères pendant la métamorphose. *C.R. Soc. Biol.*, 25 novembre 1899. — *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 22 novembre 1899.

CH. PÉREZ. Sur l'histolyse musculaire chez les Insectes. *C. R. Soc. Biol.*, 6 janvier 1900.

contredisent d'une façon formelle la manière de voir de Korotneff, Karawaiew et la nôtre ⁽¹⁾. Cette contradiction est plus apparente que réelle. En effet, quiconque abordera, sans parti pris, l'étude de la métamorphose chez les Hyménoptères, reconnaîtra que les phénomènes de la dégénérescence musculaire sont absolument différents de ceux décrits par Kowalewsky et van Rees chez les Muscides. Aussi MM. Anglas et Pérez sont-ils d'accord avec nous sur plus d'un point.

M. Anglas a constaté, comme nous, que les muscles larvaires possèdent deux sortes de noyaux : les uns plus volumineux, presque sphériques, les autres plus petits, ovoïdes, allongés, aplatis le long de la fibre.

Un autre point sur lequel les résultats de MM. Anglas et Pérez confirment les nôtres, c'est que ni chez les Fourmis, ni chez les Abeilles il n'y a de « körnchenkugeln ». Ces formations occupent une assez large place dans la phagocytose des Muscides pour que leur absence, chez les Hyménoptères, soit digne d'attirer l'attention.

M. Pérez reconnaît que les phagocytes digèrent le muscle sur place ; aux termes près c'est exactement ce que nous disons : « A leur contact — des myoblastes imaginaires jouant le rôle de phagocytes — la substance contractile semble disparaître comme par digestion et absorption. »

« Karawaiew, écrit M. Pérez, semble, il est vrai, n'avoir pratiqué que des coupes transversales qui se prêtent assez mal à l'étude de l'histolyse musculaire. Comme nous l'avons vu, les leucocytes s'allongent dans le sens des fibrilles, aussi sont-ils représentés sur les coupes transversales par un tout petit point chromatique bien inférieur de taille à un noyau de leucocyte, et ce peut être là une cause d'erreur. » C'est entendu ; mais nous avons pratiqué des coupes longitudinales sérieuses qui, en effet, sont beaucoup plus instructives que les transversales, et néanmoins il nous a paru impossible de faire intervenir les leucocytes dans la dégénérescence musculaire. Les éléments auxquels revient ce rôle diffèrent tant par la taille de leucocytes même allongés et sont tellement semblables aux petits noyaux du muscle larvaire, à ce que Karawaiew appelle des myoblastes imaginaires, que nous avons cru devoir les identifier à ces formations.

(1) L. TERRE. Contribution à l'étude de l'histolyse et de l'histogénèse du tissu musculaire chez l'Abeille. *C. R. Soc. Biol.*, 18 novembre 1899. — *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 22 novembre 1899.

M. Pérez insiste sur la difficulté d'apercevoir le protoplasma des leucocytes infiltrés : « Un leucocyte à jeun ne présente autour de son noyau qu'une très fine couche de protoplasma peu colorable. Une fois qu'il s'est étiré à la surface d'une fibrille, le protoplasma échappe presque toujours à l'examen. » Nous n'oublions pas qu'il s'agit de Fourmis, et la description de M. Pérez doit sûrement être exacte, mais, dans nos recherches sur les Abeilles, nous avons toujours vu les leucocytes entourés d'une couche de protoplasma nettement apparente; d'autre part, il nous a été impossible de décider au début si les myoblastes imaginaires, superficiellement placés et allongés parallèlement au faisceau musculaire, sont entourés d'une couche protoplasmique propre; il faut avouer qu'il y a une similitude assez frappante entre les phagocytes de M. Pérez et les éléments qui en joueraient le rôle, selon nous, chez l'Abeille.

Reste donc la question d'origine. La méthode employée jusqu'ici pour l'élucider a été la même, celle des coupes. Malgré l'habileté des opérateurs, cette méthode laissera toujours une large place à l'interprétation. Nos recherches avaient été entreprises pour élucider l'influence des variations des conditions physiologiques et de la durée de la métamorphose sur la nature des phénomènes de dégénérescence. Nous espérons, en particulier, trouver chez l'Abeille une histolyse avec phagocytose leucocytaire rappelant celle des Muscides; c'est assez dire que nos résultats sont dégagés de toute idée *a priori*.

La discussion nécessiterait l'apport d'arguments nouveaux; nous nous proposons, cette saison, d'essayer une méthode expérimentale qui nous permettra peut-être de fournir des résultats plus positifs. Provisoirement, et malgré l'interprétation contraire de MM. Metschnikoff et Mesnil ⁽¹⁾, nous conservons, comme Karawaiew lui-même, notre opinion première.

Sur le revêtement épithélial cilié de l'intestin moyen et des cæcums intestinaux chez les insectes [HYMÉN., ORTH.]

Par le D^r L. BORDAS.

La communication de M. Lécaillon sur les prolongements ciliiformes de certaines cellules du Cousin adulte (*Bull. Fr.*, 22 novembre 1899),

(1) M. CAULLERY et F. MESNIL. Sur le rôle des phagocytes dans la dégénérescence des muscles chez les Crustacés. *C. R. Soc. Biologie*, 6 janvier 1900.

nous fournit l'occasion de signaler que nous avons fait, en 1894 et en 1896, de pareilles observations sur les cellules de l'intestin moyen des Hyménoptères et sur celles de l'épithélium intestino-cæcal des Orthoptères, où nous avons constaté la présence de cils, assez semblables aux cils vibratiles, mais fixes et immobiles.

En 1894 (1), nous avons décrit à la face interne du revêtement épithélial de l'intestin moyen des *Bombidae*, des *Vespidae*, des *Chrysidae*, des *Sphecidae*, etc. « de minces appendices ou filaments protoplasmiques, constituant des sortes de prolongements ciliformes, fixes et immobiles, non identiques aux cils vibratiles des Mollusques, par exemple ». La même observation peut être étendue à la structure de l'intestin moyen de tous les Hyménoptères.

Plus tard, en 1896, nous avons décrit et figuré des prolongements ciliformes sur les cellules de l'intestin moyen et à la surface de l'épithélium interne des cæcums intestinaux des Orthoptères (2). Ce revêtement cilié se rencontre dans toutes les familles : *Forficulidae*, *Blattidae*, *Acriliidae*, *Locustidae*, *Gryllidae*, etc...

Chez les *Forficulidae*, l'épithélium de l'intestin moyen est disposé très régulièrement et comprend une assise de cellules cylindriques « du bord interne desquelles partent de nombreux bâtonnets ou prolongements ciliformes, assez courts, disposés en forme de brosse ».

L'assise épithéliale de l'intestin moyen des *Acriliidae* est constituée « par de longues cellules tronconiques ou tubuleuses, portant à leur sommet un revêtement cilié, très court ».

Nous avons, de même, constaté la présence d'un revêtement cilié à la face interne de l'intestin moyen de tous les autres Orthoptères (*Locustidae*, *Gryllidae*, etc.).

De pareils filaments ciliformes existent également à la face interne des appendices ou cæcums intestinaux, situés à l'origine de l'intestin moyen.

Chez les *Locustidae*, l'épithélium de ces appendices ou cæcums « comprend une couche de longues cellules cylindriques, dont le sommet est recouvert par une assise de cils courts et serrés, affectant, grâce à leur disposition régulière et symétrique, la forme d'un pinceau ou d'une brosse. Ces cils ne sont nullement vibratiles ».

(1) L. BORDAS. Appareil glandulaire des Hyménoptères, pp. 271 et 275. *Ann. Sc. Nat., Zool.*, 7^e sér., t. IX, 1894.

(2) L. BORDAS. Appareil digestif des Orthoptères, pp. 13, 14, 95, 97, 139, 189, pl. II, fig. 5; pl. VII, fig. 6; pl. VIII, fig. 8; pl. IX, fig. 10; pl. X, fig. 9 et 11, in *Ann. Sc. Nat., Zool.*, 8^e sér., t. V, 1897.

Enfin, nous disions, dans nos *conclusions*, que le revêtement interne des appendices ou cæcums intestinaux est, chez tous les Orthoptères, constitué par un *épithélium cilié, non vibratile*. De plus, tous ces cils, en forme de bâtonnets, courts et très serrés, peuvent être observés d'une façon fort nette sur des cellules isolées. Ces dernières présentent alors l'apparence d'une brosse ou d'un pinceau. De ces observations, faites sur deux des principaux ordres d'Hexapodes, on peut certes conclure à l'existence, chez tous les insectes, d'un revêtement cilié, non vibratile, à la surface de l'épithélium de l'intestin moyen.

Cils vibratiles et prolongements ciliformes chez les Arthropodes

Par A. GIARD.

Les notes intéressantes de nos collègues L. Bordas, A. Lécaillon et L. Léger complétant les recherches antérieures de Frenzel, de Van Gehüchten et celles presque simultanées de P. Vignon, nous montrent l'existence, chez un grand nombre d'insectes, particulièrement sur les cellules épithéliales de l'intestin moyen et des tubes de Malpighi, de prolongements très semblables aux cils vibratiles des autres animaux. Chez le Cousin, en particulier, Lécaillon a prouvé que la ressemblance va jusqu'à l'identité de structure et de rapports cytologiques, et qu'il ne manque à ces plastidules que la motilité pour être de vrais cils vibratiles.

Il importe de savoir si de pareils éléments existent chez les Péripates qui, à beaucoup d'égards, ont été rapprochés des Arthropodes ancestraux.

Gaffron ⁽¹⁾ a signalé des cils dans une partie du canal déférent de *Peripatus*. Mais on peut se demander, avec D. Rosa, si ces cils ne sont pas des prolongements immobiles comme ceux que Bordas a décrits et que Rosa a vus également sur des préparations d'Orthoptères faites par notre collègue Giglio-Tos ⁽²⁾. Toutefois une observation absolument positive de A. Sedgwick nous fait connaître la présence de vrais cils vibratiles mobiles dans le *receptaculum seminis* de la femelle de *Peripatus* dont l'épithélium serait tapissé de cellules *with actively waving cilia* ⁽³⁾.

(1) GAFFRON. Beitrage z. Anat. u. Histologie von *Peripatus*. *Zoolog. Beitrage von A. Schneider*, Breslau, 1885, Bd. I, Heft 3, p. 154.

(2) ROSA (D.). La riduzione progressiva della variabilita, etc., Torino, 1899, p. 51, note.

(3) SEDGWICK (Adam). Cambridge Natural History, 1895, *Peripatus*, p. 51.

P. Vignon déclare également avoir vu et montré à plusieurs personnes des cils vibratiles en mouvement dans l'intestin des jeunes larves de Chironomes.

Il semble donc bien démontré qu'il existe chez les Arthropodes une sorte de transition entre les cils vibratiles proprement dits et les prolongements cilliformes immobiles ou bordures en brosses, et que cette transition est réalisée par les cils vibratiles immobiles de Lécaillon.

Par suite nous devons renoncer au dogme de l'absence de cils vibratiles chez les Arthropodes et il n'est plus exact de dire, avec Rosa, en parlant de l'absence de ces éléments, soit à l'extérieur soit à l'intérieur du corps, soit à l'état adulte, soit à l'état embryonnaire : *E questo un fatto perfettamente stabilito* (l. c., p. 54).

Les cils vibratiles existent encore chez les formes ancestrales des Arthropodes et ils réapparaissent chez les états jeunes de certaines formes d'origine plus récente.

La perte de la motilité des cils est sans doute la conséquence de leur chitinisisation progressive; leur disparition, chez la plupart des Arthropodes, résulte du défaut d'usage à la suite de la perte de la motilité.

A l'exemple de G. Jaeger ⁽¹⁾ j'ai souvent insisté sur l'importance de la nature intime des divers protoplasmes pour la caractéristique morphologique et physiologique des êtres vivants. Les Arthropodes sont des animaux dont toute l'organisation est dominée et définie par le protoplasme *chitinigène*, comme les Tuniciers sont définis par leur protoplasme *tunicigène*, etc. On peut même dire que la composition chimique des divers protoplasmes permet de caractériser les groupes secondaires (familles, genres, espèces). Lorsque la chimie organique ou les réactifs histologiques sont impuissants à révéler la différence de composition des protoplasmes de deux groupes voisins, il arrive très souvent que le sens de l'odorat nous permet de saisir ces différences et nous renseigne sur les affinités des animaux ou des végétaux. L'odeur de Coléoptère n'est pas identique à celle de Lépidoptère. On distinguera immédiatement l'odeur d'un Carabique, d'un Coccinellide, etc. Les exemples se présenteront facilement à l'esprit de tous ⁽²⁾.

(1) JAEGER (Gustav). Zoologische Briefe, Wien, 1876, p. 305 et *passim*.

(2) JAEGER (Gustav). Ueber die Bedeutung der Geschmack- und Geruchstoffe, *Zeitsch. f. wissenschaft. Zoologie*, Bd. XXVII, 1876; et : *Lehrbuch der allgemeinen Zoologie*, III, 1880.

Observation relative à une note de S. Jourdain, intitulée :
« Apparition tardive des Lampyres, en 1899 »

Par HENRI GADEAU DE KERVILLE.

Dans la note en question (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 378), notre confrère, M. le Dr S. Jourdain, dit qu'en Normandie les Lampyres se montrent dans la saison chaude, particulièrement au mois d'août, mais qu'en 1899, leur apparition fut beaucoup plus tardive, et qu'ils se montrèrent surtout au mois d'octobre.

Sans mettre en doute la réalité de ce retard, je ne crois pas inutile de faire savoir, que dans la première quinzaine de juillet 1899, j'ai récolté en différents points, sur le bord des chemins, à Omonville-la-Rogue (Manche), des femelles de *Lampyris noctiluca* L. qui émettaient leur poétique lumière. Avant de généraliser, il faudrait, à mon avjs, que l'on ait des renseignements provenant d'un certain nombre de localités normandes.

Description du *Bruchus scapularis* (Reiche), du Brésil [COL.]

Par Maurice PIC.

Dans la collection de *Bruchidae* (*Mylabridae*) de Levoiturier, comprenant la collection de James Thomson (cédée par la maison Deyrolle), j'ai trouvé sous le nom de *Bruchus scapularis* Reiche une jolie espèce brésilienne qui ne me semble pas décrite. Depuis, j'ai acquis chez M. Donckier quelques exemplaires de la même espèce, provenant de la province de Goyas, ce qui me permet de donner la description suivante :

Bruchus scapularis (Reiche), n. sp. — *Ater, nitidus, elytris tenuiter griseo-vestitis, pro parte rubris, nigro-maculatis, antennis pedibusque nigris, thorace conico, antrorsum angustato, femoribus posterioribus crassis, inermibus; pygidio haud prominulo.* — Long. 3,5-4,5 mill.

Hab. : Brasilia.

Oblong, atténué en avant, revêtu d'une très fine pubescence couchée grisâtre, entièrement noir brillant, à l'exception de la majeure partie antérieure des élytres qui est roussâtre. Tête longue; antennes entièrement foncées, épaisses. Prothorax conique, très atténué antérieurement, à ponctuation composée de points petits et assez rapprochés

mélangés de points plus gros et espacés. Écusson noir. Élytres relativement longs, nettement atténués antérieurement, plus larges que le prothorax à leur base, arrondis séparément à l'extrémité, densément et finement ponctués, légèrement striés, ils sont noirs sur la moitié postérieure, roussâtres ou d'un roux pâle sur leur partie antérieure avec une macule noire basale placée sur la suture, tantôt entourant l'écusson, tantôt commençant en arrière de celui-ci. Dessous du corps et pattes noirs, finement pubescents, les cuisses postérieures renflées mais paraissant inermes. Pygidium renfoncé sous les élytres. — Long. 3,5-4,5 mill.

Brésil : Bahia et Jatahy (coll. Pic).

Br. scapularis est une espèce très reconnaissable entre toutes par sa forme, nettement atténuée en avant, et par son dessin élytral.

Quelques mots sur le genre *Tetropiopsis* Chob. [Col.]

Par Maurice Pic.

Le Dr Chobaut a publié récemment (*Bull. Fr.*, 1899, p. 356) la soi-disant description d'un nouveau genre tunisien de *Cerambycidae*, qu'il place, sans raisons données à l'appui, dans le voisinage des genres *Tetropium* Kirby et *Cyamophthalmus* Kr.

Pourquoi les importants caractères de la forme des hanches antérieures ne sont-ils pas mentionnés dans cette diagnose ?

Suivant la classification actuelle ⁽¹⁾, c'est par la forme des hanches antérieures, et non par la longueur des antennes, que nous savons si un genre doit être rangé dans les *Cerambycini* ou dans les *Lepturini*. La description de *Tetropiopsis*, telle qu'elle est présentée, ne nous démontre pas que ce genre rentre dans les *Cerambycini*. D'après les caractères suivants : « Tête assez fortement rétrécie derrière les yeux », puis « antennes comprimées à partir des premiers articles, élytres à ponctuation lâche, chaque point précédé d'une faible saillie », etc., on serait plutôt tenté de se représenter un insecte voisin des *Apatophysis* Chev.

En résumé, la description publiée, quoique longue, est insuffisante comme description générique et par conséquent pour établir le genre nouveau *Tetropiopsis*. Je copie en entier le paragraphe un peu confus de cette description générique tel qu'il a été rédigé par son auteur ; cette

(1) Voir Ganglbauer, *Best. Tab.*, VII et VIII et, à défaut de cet ouvrage, la traduction abrégée de A. Dubois (*Rev. d'Ent.*, 1883).

citation suffira pour prouver que je n'invente rien en parlant de l'omission des caractères précis ou valables.

« Ce nouveau genre se distinguera des genres *Tetropium* Kirby et *Cyamophthalmus* Kraatz par ses antennes plus longues, à 2^e article n'atteignant pas la 5^e partie du 3^e, comprimées dès le 3^e article, non dentées, par son prothorax presque aussi long que large, etc. »

Le descripteur veut-il laisser entendre par là que :

1^o Le nouveau genre se distingue des *Tetropium* Kirby par ses antennes non dentées;

2^o Qu'il se distingue des *Cyamophthalmus* Kraatz par ses antennes plus longues (1)... par son prothorax presque aussi long que large?

Des renseignements à ce sujet ne seront pas de trop (2)! Pour moi, jusqu'à présent, je n'ai étudié que des *Tetropium* à antennes non dentées, j'ai pu voir chez les *Cyamophthalmus* ♂ les antennes ayant presque la longueur des élytres, et le prothorax, un peu variable, ne paraissant pas plus long que large.

Description d'un Opatride nouveau [COL. TENEBRION.]

de la Tunisie méridionale

Par le Dr A. CHOBOUT.

Melanimon sabulorum, n. sp. — Court, large, épais, d'un noir ferrugineux plus clair sur les élytres. Tête beaucoup plus large que longue, revêtue de soies courtes, épaisses, dorées, peu abondantes; épistome convexe, séparé du front par un sillon à convexité regardant en arrière; front garni de six tubercules placés les uns à côté des autres, les deux médians arrondis, les latéraux allongés d'avant en arrière. Antennes courtes, épaisses, cylindriques; les trois derniers articles plus gros que les autres, formant massue. Pronotum deux fois environ plus large que long, beaucoup plus large que la tête, convexe, avec les côtés fortement déclives; à bord antérieur semi-circulairement échancré,

(1) Le Dr Chobaut ne nous dit pas de quel sexe est son *T. numidica*; ces antennes « plus longues » ne caractériseraient-elles pas le ♂ d'une espèce à antennes plus courtes? Je suis surpris que cet habile descripteur, après avoir pu nous parler (*Bull. Fr.*, 99, n° 3, p. 106) d'un sexe qui lui était inconnu, ne nous ait rien dit ici d'un sexe qu'il aurait pu voir.

(2) Si notre collègue ne veut pas se charger d'une étude complémentaire, je m'offrirai volontiers pour l'entreprendre.

à angles antérieurs arrondis au sommet, à bords latéraux crénelés, d'abord arrondis, puis largement échancrés en arrière au niveau des angles postérieurs, à bord postérieur assez longuement avancé sur les élytres, arrondi en arrière; inégal, avec : 1° une impression sur le bord antérieur, de chaque côté, au niveau du tubercule frontal moyen, 2° une autre impression longitudinale de chaque côté du milieu, sur le disque, 3° une troisième impression transversale partant du milieu de la précédente et n'atteignant pas le bord externe, 4° une dernière enfin, sur le bord postérieur, de chaque côté du lobe juxta-scutellaire; rebordé sur les côtés; garni de soies comme la tête, avec, sur les bords, une rangée d'autres soies fines, allongées, renflées au sommet. Écusson invisible. Élytres ayant leur plus grande largeur vers le milieu, convexes, en ogive arrondie en arrière; munis de huit stries profondes, couvertes de points carrés, réguliers, séparées par des côtes saillantes, égales entre elles, garnies à leur sommet d'une rangée de soies analogues à celles de la tête et du pronotum, réunies deux à deux vers le bout, la 1^{re} à la 8^e, la 2^e à la 7^e, etc., les côtés bordés d'une frange de soies comme le prothorax. Dessous recouvert de soies courtes et dorées comme le dessus. Pattes courtes, robustes, tibias antérieurs très fortement dilatés, avec une longue et large dent triangulaire sur la dernière moitié de leur tranche externe. — Long. 3 mill.

Tunisie méridionale : Sfax, fin avril 1899, 2 sujets; Bled-Tahla, près du bordj de l'oued Cherchera, à la mi-mai, 10 sujets. M'a paru vivre des débris des fourmilières de *Myrmecocystus albicans* (Rog.) Em. et For. Déjà trouvé, suivant M. L. Bedel, entre Gabès et Bir-Marabot, par M. Sedillot, et à Zarzis par mon ami le D^r Sicard.

M. sabulorum est très voisin de *M. collare* Motsch. M. Bedel a bien voulu, sur ma demande, comparer l'espèce tunisienne à l'espèce caucasique dont un type, en médiocre état d'ailleurs, figure au Muséum de Paris dans la collection de Marseul. Suivant lui, la première ne diffère de la seconde que par la surface du corps un peu plus égale, les soies latérales du prothorax et dorsales des élytres plus fines, les interstries plus élevés et plus égaux, les impressions thoraciques plus superficielles, etc.

Description de deux Coléoptères nouveaux du Sud-Est algérien

Par A. THÉRY.

Xenonychus Chobauti, n. sp. — Long. 3 mill. — Ovale, court, très fortement convexe, avec l'abdomen excessivement développé,

brun, peu brillant. Front et épistome sans aucune séparation, à peine bombés et très lisses. Prothorax couvert de stries vermiculées transversales, lisse sur les bords latéraux qui sont munis d'une fine strie marginale, partant des angles antérieurs, longeant le bord et remontant un peu le long de la base, garni sur les côtés, en dessous, de longs poils fauves. Écusson invisible. Élytres avec la même strigosité transversale que le prothorax, ce qui les fait paraître couverts de petites écailles, lisses sur les bords latéraux ainsi que sur la partie comprise entre la strie suturale et la suture. Strie suturale très fine et très rapprochée de la suture, entière, réunie par un arc qui longe toute la base à la 1^{re} dorsale qui est entière, 2^e dorsale apicale, raccourcie au milieu, espace compris entre la 1^{re} et une partie de la 2^e lisse, les autres stries dorsales nulles, subhumérale interne rudimentaire, externe entière, atteignant la base. Propygidium et pygidium très rugueusement ponctués sur leur partie dorsale, plus lisses sur les côtés. Pygidium haut et comprimé latéralement, arrondi au sommet. Tibias antérieurs larges, avec leurs tranches externes et internes garnies de longues épines et leur extrémité d'une dent en forme d'épine à pointe mousse; tarses antérieurs nuls ou manquant. Tibias intermédiaires garnis de longues épines sur leur tranche externe et de deux épines plus longues et plus fortes au sommet; postérieurs très élargis, mais peu épais, garnis sur leur tranche externe de deux séries d'épines; tarses avec deux longs poils raides opposés à chaque articulation; crochets des tarses intermédiaires et postérieurs nuls, remplacés par deux petits poils courts. Bord des segments abdominaux, du prosternum, des parties de la bouche avec des poils fauves développés.

Tougourt, un exemplaire capturé par le docteur Chobaut, enfoui dans le sable au milieu de tiges pourries d'Orobanches.

Cette espèce est extrêmement remarquable par le système de ponctuation des élytres. On peut lui appliquer la remarque faite par Lewis au sujet de *Xenonychus altus* Lew., d'Égypte : son profil rappelle d'une façon frappante celui de la Puce commune !

***Agrilus atriplicis*, n. sp.** — Court, épais, entièrement cuivreux obscur, couvert d'une pubescence d'un gris sale un peu plus dense sur les côtés du prothorax, à la base des élytres et le long de la suture, où elle forme une bande très vague. Tête grosse, bombée, finement ponctuée, impressionnée sur le front et sillonnée sur le vertex, front en carré un peu plus haut que large. Antennes très courtes et épaisses. Prothorax plus large que long, élargi en avant, à angles antérieurs aigus; marge antérieure saillante au milieu; carènes laté-

rales fortes, lisses, la supérieure courte, arquée, réunie à la base à la carène intermédiaire; latérale et inférieure réunies en avant et en arrière; angles postérieurs très obtus; marge postérieure trisinuée; disque sans sillon longitudinal au milieu, avec une forte impression transversale derrière la marge antérieure et deux autres larges impressions partant presque des angles antérieurs pour venir se confondre au devant de l'écusson; ponctuation dense, serrée, un peu granuleuse. Écusson large, avec une forte carène aiguë, transverse; acuminé au sommet; lisse. Élytres à peine plus larges que le prothorax à la base, saillants à l'épaule, légèrement rétrécis en dessous des hanches, un peu dilatés aux 2/3, séparément arrondis à l'extrémité et très finement denticulés; suture saillante sur la moitié supérieure; disque légèrement impressionné tout le long de la suture; entièrement granuleux, mais plus fortement à la base. Mentonnière arrondie, séparée du prosternum par un sillon nettement tranché qui la fait paraître indépendante. Prosternum large, en triangle, finement ponctué. Abdomen plus brillant, finement ponctué, visible sur les côtés des élytres par-dessus, à dernier segment impressionné, transversalement arrondi.

Découvert au bordj Saada au commencement de mai 1898, sur l'*Atriplex Halimus*, où il paraît rare, par MM. le Dr Chobaut et L. Vareilles qui ont bien voulu enrichir ma collection de cette espèce. Repris par eux à Biskra, à la fin du même mois, sur la même plante.

A placer près de *A. croceivestis* Mars., dont il se distingue par sa pubescence presque uniforme, l'absence de sillon longitudinal sur le prothorax qui rappelle par sa forme celui de *A. pubiventris* Ksw. Sa taille, en outre, est inférieure à celle de *A. croceivestis*.

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1900, 2 et 3. ○

Académie des Sciences de Cracovie (Bulletin international), octobre et novembre 1899. ○

Agricultural Gazette of N. S. Wales, X, 12, 1899. — W. FROGGATT : Caterpillars. The Bugong Moth (*Agrotis infusa* Boisdu.) (1 carte). — A. GALE : Bee Calendar. — General Notes.

Annals and Magazine of Natural History, sér. VII, vol. V, n° 25, 1900. — T.-R. STREBBING : Arctic Crustacea : Bruce Collection. — P. CA-

MERON : Descriptions of new Genera and Species of Aculeate Hymenoptera from the Oriental Zoological Region. — **A.-G. BUTLER** : On a second Collection of Butterflies obtained by M. E.-M. de Jersey in Nyasaland. — **F.-D. MAURICE** : Descriptions of new or doubtful Species of the Genus *Ammophila* (Kirby) from Algeria. — **H.-S. GORHAM** : Descriptions of new Genera and Species of Coleoptera from South and West Africa, of the Section Serricornia and of the Families Erotylidae, Endomychidae and Languriidae. — **Miss G. RICARDO** : Notes on the Pangoninae of the Family Tabanidae in the British Museum Collection (1 pl.). — **CH. DAWSON et S.-A. WOODHEAD** : The hexagonal Structure naturally formed in cooling Beeswax, and its Influence on the Formation of the Cells of Bees (fig.). — **C. NORMAN** : British Amphipoda of the Tribe Hyperidea and the Families Orchestiidae and some Lysianassidae.

Entomological News, X, 9 et 10, 1899. — **T.-D.-A. COCKERELL** : New Species of *Andrena* from Kansas. — **H. SCHWARZ** : The « Art » of collecting *Catocala*. — **W.-R. HOWARD** : Nature studies. — **N. BANKS** : The Psocids of an old Snake-Fence. — The Digger Wasp. — **J.-L. HANCOCK** : Some Tettigian Studies. — **E.-A. SMITH** : The *Catocala* of Montgomery County, Virginia. — **H. SKINNER** : The fourth of July. Collecting in the Cañon's Mouth. — **M.-V. SLINGERLAND** : Occurrence of *Stagmomantis carolina* in N. York. — **C.-P. LOUNSBURY** : *Ephestia Kuehniella* and *Acanthia lectularia*. — Notes diverses. — Tables.

Entomologische Nachrichten, XXVI, 1, 1900. — **F. KARSCH** : Zwei neue westafrikanische Psychiden. — **J.-D. ALFKEN** : Die Gruppe der *Anthrena nigriceps* Kirby. — **A. DUCKE** : Nachtrag zur Bienenfauna österreichisch Schlesiens. — **T. PIC** : Ueber *Rosalia alpina* L. und deren Varietäten.

Entomologist's Record and Journal of Variation (The), XII, 1, 1900. — **M. BURR** : Brünner von Wattenwyl (portrait). — **BRÜNNER VON WATTENWYL** : Note on the Coloration of Insects. — **G. WHEELER** : Three Seasons among Swiss Butterflies. — **L.-B. PROUT** : Further notes on *Tephrosia bistortata* and *T. crepuscularia*. — **P.-J. LAMBILLION** : Note on Rearing *Lasiocampa populifolia* Esp. — **J.-W. TUTT** : Migration and Dispersal of Insects : Lepidoptera. — **H. DONISTHORPE** : Notes on the *Dinoderus substriatus* of British Collections. — Notes diverses.

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, V, 2, 1900. — **Dr C.-H. Vo-**

GLER : Beiträge zur Metamorphose der *Teichomyza fusca* (fig.). —
 Dr E. FISCHER : Lepidopterologische Experimental-Forschunden.
 — H. FRIESE : Ein auffallender Gynandromorphismus von *Pepsis
 brunneicornis* R. Luc. (Hymenopt.) (fig.). — Notes diverses.

K. K. Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (*Verhandlungen*),
 XLIX, 9, 1900. — C.-W. VERHOEFF : Beiträge zur Kenntniss pa-
 läarktischer Myriopoden, XI. Aufsatz : Neue und wenig bekannte
 Lithobiiden (fig.). — C. THON : Ueber ein interessantes Beispiel des
 Parasitismus bei den Hydrachniden. — P. BORN : *Carabus cancel-
 latus* nov. var. *balcanicus*.

Linnean Society of London. — 1^o Journal, XXVII, 177, 1899. — Con-
 tributions to the Natural History of Lake Urmi N.-W. Persia and
 its Neighbourhood. — Crustacea, par R.-T. GÜNTHER (pl.). — Chi-
 lopoda and Arachnida, par R.-I. Pocock (pl.). — Acari, par A.-D.
 MICHAEL (pl.). — Lepidoptera Rhopalocera, par A.-G. BUTLER. —
 Lepidoptera Phalenaec, par G.-F. HAMPSON. — Neuroptera (Hemero-
 bidae) and Diptera, par R.-T. GÜNTHER. — Orthoptera, par M. BURR.
 — 2^o List, 1899-1900.

Linnean Society of N. S. Wales (Proceedings), XXV, 3, 1899. — REV.
 T. BLACKBURN : Revision of the Genus *Paropsis*, V.

Musée du Congo (Annales). — Zoologie, série I, 1899. ☉

Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique (Annales), X, 1 et 2,
 XII, 1 et 2. — L. BECKER : Les Arachnides de Belgique, part. I-III,
 texte et planches.

Museo civico di Storia naturale di Genova XXXIX, 1898-99. — G. NO-
 BILI : Sopra alcuni Decapodi terrestri e d'acqua dolce dell' America
 meridionale. — R. GESTRO : Res Ligusticae XXIX. Due nuovi Anof-
 talmi. — E. SIMON : Studio sui Chernetes italiani conservati nel
 Museo civico di Genova, con descrizione di una nuova Specie. —
 P. MAGRETTI : Imenotteri della seconda Spedizione di D. Eug. dei
 Principi Ruspoli nei paesi Galla e Somali. — I. BOLIVAR : Contribu-
 tions à l'étude des Acridiens, espèces de la Faune Indo et Austro-
 Malaisienne du Museo civico di Storia naturale di Genova. —
 F. SILVESTRI : Chilopodi e Diplopodi dell'ultima Spedizione Bot-
 tego (fig.). — G.-W. KIRKALDY : Note Sopra alcuni Rincoti acqua-
 tici Africani del Museo civico di Storia naturale di Genova. —
 G. MANTERO : Res Ligusticae, XXX. — Materiali per un Catalogo
 degli Imenotteri Liguri (fig.). — A. DE SCHULTESS SCHINDLER : Or-
 thoptères du pays des Somalis, recueillis par L. Robecchi-Brichetti

en 1891 et par le Prince E. Ruspoli en 1892-93 (pl.). — R. GESTRO : Le Hispidæ dell' isola Nias. — A. SENNA : Viaggio del Dott. E. Modigliani nelle isole Mentawai. — T. THORELL : Viaggio di L. Fea in Birmania e regioni vicine (LXXX) : Secondo Saggio sui Ragni Birmani. — (LXXX), Dr J.-G. DE MAN : Note sur quelques espèces des genres *Paratelpusa* H. M. E. et *Potamon* Sav. recueillies par M. L. Fea pendant son voyage en Birmanie (pl.). — F. SILVESTRI : Alcuni nuovi Diplopodi della N. Guinea (fig.). — R. GESTRO : Sopra alcune Forme di *Acanthocerini* (fig.). — C. EMERY : Formiche dell' ultima Spedizione Bottego (fig.). — W. HORN : Descrizione di una nuova Specie di *Cicindela*. — CH. KERREMANS : Nouvelles espèces de Coléoptères appartenant au Musée civique de Gênes. — M. PIC : Nouvelles espèces de Coléoptères appartenant au Musée civique de Gênes. — R. GESTRO : Contribuzione allo studio dei Sepidiini. — Un Cenno sul genere *Stiptopodius* (fig.). — M. JACOBY : Some new Genera and Species of Phytophagous Coleoptera collected during Captain Bottego's last Expedition. — R. GESTRO : Osservazioni intorno al genere *Bolbotritus* Bates (fig.). — A. DODERO : Osservazioni Sulle Specie europee del Genere *Limnastus* Mots. — S. SCHENKLING : Cleriden aus Somali-Land. — A.-L. MONTANDON : Insectes de la dernière Expédition Bottego. Plataspidae. — M.-K. THOMAS : Descriptions of two new Species of Mylabridinae collected during Capt. Bottego's last Expedition. — Dr K. KERÉSZ : Die *Cleitani*-Arten Neu-Guinea's nebst Beschreibung einer neuer Gattung (pl.). — E. FLEUTIAUX : Eucnémides et Élatérides récoltés à l'île Nias par M. U. Raap en 1897 et 1898. — E.-L. BOUVIER : Sur un nouvel *Apus* de la Somalie, capturé par le Capitaine Bottego. — P. MAGRETTI : Imenotteri dell' ultima Spedizione del Cap. Bottego. — F. SILVESTRI : Prima Nota intorno all' *Anisosphæra* Töm. (fig.). — C. RITSEMA Cz. : Descriptions of two Sumatran Species of the Lucanoid genus *Cyclommatus* in the Genoa civic Museum (fig.). — M. JACOBY : Descriptions of two new Species of Phytophagous Coleoptera from the island of Nias. — P. LESNE : Liste des Bostrychides des Collections du Musée civique de Gênes. (fig.).

Museo nacional de Montevideo (Anales), II, 12, 1899. — R. BLANCHARD : Reglas de la Nomenclatura de los Seres organizados adoptadas por los Congresos internacionales.

Naturaliste (Le), 15 janvier 1900. — L. PLANET : Description d'un Coléoptère nouveau (fig.). — P. FUCUS : Les Papillons et les Che-

nilles en France au mois de janvier. — Les plantes de France, leurs chenilles et leurs Papillons.

Naturgeschichte der Insekten Deutschlands, V, 1. — Nos 1 et 4. — 1877, 1895.

N. York Agricultural Experiment Station, 159-161, 1899. — H. LOWE : The Forest Tent-Caterpillar (carte).

Novitates zoologicae, VI, 4, Tables.

Psyche, IX, 285. — H.-F. WICKHAM : On Coleoptera found with Ants. — J.-L. HANCOCK : Synopsis of Subfamilies and genera of North American Tettigidae. — A.-G. SOULE : The « Cocoons » or « cases » of some burrowing Caterpillars. — H.-G. DYAR : Life histories of N. American Geometridae, VIII et IX. — T.-D.-A. COCKERELL : The name *Leonia*. — H.-G. DYAR : Correction of an error.

R. Accademia dei Lincei (Atti). — *Memorie* I, 1895; II, 1898. ☉

Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, XIII, 145, 1900. ☉

Royal Society (Proceedings), LXV, 422, 1900. — F.-W. KEEBLE et F.-W. GAMBLE : The Colour-Physiology of *Hippolyte varians*.

Royal Society of Canada (Proceedings and Transactions), sér. II, vol. IV, 1899. — CH.-J.-S. BÉTHUNE : The Rise Progress of Entomology in Canada.

Sociedad Científica « Antonio Alzate » (Memorias y Revista), XII, 9-10, 1899. ☉

Sociedad española de Historia natural (Actas), décembre 1899. — R.-P. NAVAS : Ortópteros del Mont-Seny (Barcelona) (fig.).

Società romana per gli Studi zoologici (Bollettino), VIII, 1 et 2, 1899. ☉

Società Veneto-trentina di Scienze naturali (Atti), S, II, vol. III, 2, 1899. — G. CANESTRINI : Nuova Specie italiana di *Phytoptus*. — G. LEONARDI : Alcuni Miriapodi del Portogallo. — G. CANESTRINI : Acari della Nuova Guinea, I, II (pl.). — Nuova Specie di *Celaenopsis* (pl.).

Societas Entomologica, XIV, 20, 1900. — G. KRÜGER : Aus Nah und Fern. — P. BORN : Meine Exkursion von 1899.

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire (Bulletin), XV, 12, 1899. ☉

Société des Sciences naturelles et d'Enseignement populaire de Tarare (Bulletin), IV, 12, 1899.○

Stettiner Entomologische Zeitung, LIX, 10-12, 1898. — LX, 1-6, 1899.

— E. BRENSKE : Melolonthiden aus Afrika. — A. PETRY : Eine neue Coleophore aus Thüringen, *Coleophora Kyffhusana*, n. sp. — W. MARTINI : *Antispila Petryi*, n. sp. — H. FRUHSTORFER : Beitrag zur Kenntniss der Fauna der Liu-Kiu Inseln. — H.-J. KOLBE : Die Oxyopisthinen, eine neue Gruppe der Curculioniden des tropischen Afrika. — Dr HOFMANN : *Lita Petryi*, eine neue *Lita*. — H. FRUHSTORFER : Celebischen Euploeen. — Neue Hestien.

U. S. Department of Agriculture. — Division of Entomology (*Bulletin*), 21, 1899. — A.-D. HOPKINS : Preliminary Report on the Insect Enemies of Forests in the Northwest.

Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters (*Transactions*), XII, 1, 1898.○

Zoological Society of London (*Transactions*), XV, 4, 1899.○

BOLIVAR (I.) : Catálogo sinóptico de los Ortópteros de la Fauna Ibérica (*Annaes Sc. Nat.*), Porto, 1898. 98 p.*

Id. : Orthoptères du Voyage de M. Martinez de la Escalera dans l'Asie Mineure (*Ann. Soc. Ent. Belg.*), 1899, 25 p.*

BOURGEOIS (J.) : Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des Régions limitrophes, II (Hydrophilidae, Micropeplidae), Colmar, 1899, 104 p.*

Id. : Note sur quelques espèces nouvelles ou peu connues de Coléoptères de l'Inde et de la Birmanie (*Bull. Soc. Ent. Fr.*), 1896, 5 p.*

Id. : Description de Malacodermes nouveaux recueillis en Océanie par M. le Dr Ph. François (*loc. cit.*), 1897, 3 p.*

Id. : Notes sur quelques Malacodermes appartenant au genre *Lycus*. Descriptions de deux nouvelles espèces de Lycides (*loc. cit.*), 1898, 4 p.*

Id. : Description de deux *Podistrina* nouvelles de la Faune française (*loc. cit.*), 1899, 4 p.*

Id. : Description de deux larves remarquables appartenant probablement au genre *Lycus* (*loc. cit.*), 1899, 6 p., fig.*

- Id. : Voyage de M. E. Simon au Venezuela, décembre 1897-août 1898, Coléoptères (Malacodermata) (*loc. cit.*), 1899, 11 p.*
- Id. : Sur quelques Malthinides algériens (*Rev. d'Ent.*), s. d., 6 p.*
- Id. : Liste des Coléoptères recueillis à Madagascar par MM. le comm. Dorr de l'Infanterie de marine (1896-97) et le lieut. Jobit, du 13^e d'Artillerie (1895-96), Malacodermes (*Mém. Soc. Zool. Fr.*), 1899, 2 p.*
- CHOBOUT (Dr A.) : Discours prononcé aux obsèques de M. H. Nicolas, suivi d'une Bibliographie de ses travaux (*Mém. Acad. Vaubl.*), 1899, 8 p., 2 exempl.*
- COURCHET (L.) : Notes sur les Aphides du Térébinthe et du Lentisque (*Rev. Sc. Nat.*), 1879, 14 p. — Don de M. L. Bedel.
- MINJARD : L'alcool, l'alcoolisme, ses conséquences et ses dangers (*Soc. Sc. Nat. Tarare*), 1900, 46 p.*⊙
- OLIVIER (E.) : Faune de l'Allier, III, fasc. 2. — Hémiptères hétéroptères (*Rev. Sc. Bourb.*), s. d., 32 p. (2 exempl.)*
- Id. : Contribution à l'étude des Lampyrides, Descriptions et Observations (*Bull. Soc. Ent. Fr.*), 1899, 8 p.*
- Id. : Les Lampyrides des Antilles (*Proc. Int. Congr. Zool.*), 1898, 2 p.*
- Id. : Les Lampyrides typiques du Muséum (*Bull. Mus. Hist. nat.*), 1899, 4 p.*
- Id. : Revision des Coléoptères Lampyrides des Antilles et description des espèces (*Bull. Soc. Zool. Fr.*), 1899, 6 p.*
- PREUDHOMME DE BORRE (A.) : Sur le *Sargus nitidus* Meig. et sur sa capture en Belgique (*Ann. Soc. Ent. Fr.*), 1899, 1 p.*
- Id. : Note sur divers *Bombus* (*Arch. Sc. phys. nat.*), 1899, 2 p.*
- TSCHITSCHÉRINE (T. DE) : Notes sur les *Platysmatini* du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, V (*Hor. Soc. Ent. Ross.*), 1899, 34 p.*

A. L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 14 février 1900

Présidence de M. A. GIARD.

M. H. du Buysson, de Broût-Vernet, assiste à la séance.

— Le Président est heureux d'annoncer à la Société que notre collègue M. F. Henneguy vient d'être nommé professeur d'Embryologie au Collège de France en remplacement de M. Balbiani.

Nécrologie. — Le Président a le profond regret de faire part à la Société de la mort de M. Émile Blanchard, membre de l'Académie des Sciences, ancien Professeur d'Entomologie au Muséum d'histoire naturelle. Retenu par son cours à la Sorbonne, il n'a pu assister aux obsèques de notre regretté collègue. Mais la Société y a été représentée par plusieurs de ses membres et notamment par M. le Professeur Bouvier, successeur de M. E. Blanchard au Muséum, qui a prononcé le discours d'usage.

E. Blanchard faisait partie de notre compagnie depuis plus de soixante ans. Élève et ami de l'illustre H. Milne-Edwards, il avait publié des œuvres très nombreuses sur les diverses branches de la Zoologie et particulièrement sur les Insectes. Sa carrière fut rapide et brillante. Successivement préparateur, puis aide-naturaliste au Muséum, il fut chargé de 1844 à 1857 de plusieurs missions scientifiques en Italie et en Sicile. En 1862, il devint titulaire de la chaire d'Entomologie, et en 1872 il présidait à l'installation du nouveau Palais des Reptiles, la chaire d'Erpétologie étant vacante à cette époque.

Bien qu'il ait très peu participé aux travaux de la Société entomologique, E. Blanchard y était estimé à sa valeur et fut plusieurs fois placé parmi les candidats au titre de membre d'honneur. Beaucoup de nos collègues se fussent empressés, s'il avait accepté leur concours, de l'aider au classement des innombrables richesses accumulées dans son laboratoire du Jardin des Plantes. Depuis dix ans, devenu aveugle et de mauvaise santé, E. Blanchard avait dû renoncer à toute occupation scientifique.

— Le Président annonce également la mort de M. Ernest Allard.

E. Allard comptait parmi les plus anciens membres de notre Société dont il faisait partie depuis 1853. Il avait publié d'importants travaux sur plusieurs familles de Coléoptères européens, notamment sur les Ténébrionides et les Altisides.

Correspondance. — MM. J. Clermont, L. Leymarie et A. Viré remercient la Société de leur admission.

Congrès de 1900. — MM. A. Argod, J. Bourgeois, G. Darboux, A. Degors, A. Délugin, L. Dupont, A. Fauvel, H. Gadeau de Kerville, R. Martin, M. Nibelle, E. Olivier, M. P. Portevin, H. Portevin se sont fait inscrire au nombre des membres qui prendront part au Congrès entomologique de 1900.

Décision. — Sur la proposition du Conseil, la Société décide à l'unanimité qu'il y a lieu de rayer de la liste de ses membres MM. Apostolides, Bonanno, Burns, Léon, Quentin, Savard, Tardieu, Tourchot, Vitrac.

Admissions. — M. Jules Anglas, préparateur de Zoologie à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris, 62, boulevard de Port-Royal. *Entomologie générale, Lépidoptères.*

— M. Ed. Lamy, préparateur de Zoologie à la Faculté des Sciences l'Université de Paris, 16, avenue de Montsouris. *Arachnides.*

Présentations. — M. Louis Loviot, 3, avenue Vélasquez, Paris [*Coléoptères, Lépidoptères*], présenté par M. P. Klincksieck. — Commissaires-rapporteurs MM. Ph. Grouvelle et P. Mabilie.

— M. L. Semichon, licencié ès Sciences naturelles, élève à l'Institut agronomique, 27, rue Cassette, Paris [*Entomologie générale*], présenté par M. A. Giard. — Commissaires-rapporteurs MM. E.-L. Bouvier et P. Marchal.

— M. Raymond Peschet, 1, rue Baulant, Paris [*Coléoptères*], présenté par M. J. de Gaulle. — Commissaires-rapporteurs MM. E. Dongé et J. Magnin.

— M. Alphonse Lavallée, licencié ès Sciences naturelles, 47, rue de Naples, Paris; et château de Segrez, par Boissy-sous-St-Yon (Seine-et-Oise) [*Ent. gén., Lépidoptères*], présenté par M. Ph. François. — Commissaires-rapporteurs MM. Ch. Pérez et G.-A. Poujade.

Budget. — M. le Dr A. Fumouze, Trésorier honoraire, donne lec-

ture du rapport suivant relatif à sa gestion financière pendant l'exercice 1899 :

EXERCICE 1899.

RECETTES.

En caisse le 1 ^{er} janvier 1899.....	57 fr. 76 c.
Cotisations.....	6.980 »
Tirages à part.....	384 75
Ventes d' <i>Annales</i> et de <i>Bulletins</i>	647 75
Abonnements aux <i>Annales</i> et au <i>Bulletin</i>	808 »
<i>Faune</i> Bedel.....	98 »
Tables.....	2 »
Subventions { Ministère de l'Instruction publique....	500 »
{ Ministère de l'Agriculture.....	600 »
Annonces.....	159 »
Remboursement du prix de gravures par un Sociétaire.	220 »
Divers.....	38 60
Bénéfices sur obligations sorties.....	190 59
Revenus.....	3.369 40
Exonérations.....	1.800 »
Total des recettes.....	15.855 fr. 85 c.
	15.118 65

En caisse le 1^{er} janvier 1900..... 737 fr. 20 c.

DÉPENSES

Loyer et assurance.....	1.772 fr. 15 c.
Frais de publication des <i>Annales</i> et du <i>Bulletin</i>	6.484 15
Planches et gravures.....	1.884 35
Frais d'envois.....	801 20
Administration et correspondance.....	451 80
Bibliothèque (achats, abonnements, rellures).....	617 65
Prix Dollfus.....	300 »
Traitement de l'agent.....	799 70
Entretien des collections.....	200 »
Achat de quatre obligations Ouest anciennes.....	1.807 65
Total des dépenses.....	15.118 fr. 65 c.

La Société, aux termes des articles 25 et 28 de ses Statuts et de son Règlement, renvoie l'examen des comptes du Trésorier à son Conseil, qui lui présentera un rapport dans la prochaine séance.

Communications.

Liste des Arachnides recueillis à Uclès (Espagne)

par le P. J. Pantel

Par E. SIMON.

Les Arachnides dont la liste suit ont été recueillis par notre confrère le P. J. Pantel, à Uclès, près Taragon, dans la province de Cuenca, l'une des moins connues au point de vue qui nous occupe; plusieurs des espèces citées sont intéressantes à divers titres, quelques-unes sont spéciales à l'Espagne, d'autres y sont signalées pour la première fois.

Eresus imperialis L. Dufour, spécial à l'Espagne. — *Filistata insidiatrix* Forsk. (*F. testacea* auct.). — *Loxosceles rufescens* L. Dufour. — *Segestria florentina* Rossi. — *Drassodes fugax* E. Sim. — *D. invalidus* Cambr., connu d'Égypte, de Syrie, de Sicile et de Corse, nouveau pour l'Espagne. — *Palpimanus gibbulus* L. Dufour. — *Zodariion fuscum* E. Sim., découvert en Espagne (Escorial et La Granja), retrouvé depuis dans les Basses-Pyrénées. — *Uroctea Durandi* Latr. — *Holocnemus rivulatus* Forsk. — *Latrodectus 13-guttatus* Rossi, variété unicolore. — *Tetragnatha extensa* L. — *Argiope Bruennichi* Scopoli. — *Mangora acalypha* Walck. — *Araneus Armida* Aud. — *Ar. Redii* Scopoli. — *Ar. sericatus* Clerck (*A. scolopetarius* Cl. et auct.). — *Thomisus albus* Gmelin (*T. onustus* Walck.). — *Runcinia lateralis* C. Koch. — *Xysticus sabulosus* Hahn. — *X. nubilus* E. Sim. — *Sparassus Argelasi* Latreille. — *Micrommata ligurinum* C. Koch. — *Chiracanthium striolatum* E. Sim., espèce commune dans le midi de la France, non encore signalée en Espagne; nous l'avons reçue de Lisbonne et nous l'avons trouvée en Algérie. — *Agelena labyrinthica* Cl. — *Tegenaria domestica* Cl. — *T. larva* E. Simon, espèce jusqu'ici exclusivement française. — *Pisaura mirabilis* Cl. — *Lycosa fasciventris* L. Dufour, espèce propre à l'Espagne, très commune à Uclès. — *L. radiata* Latr. — *L. Simoni* Thorell, espèce découverte à l'Escorial, retrouvée depuis dans les Basses-Alpes. — *L. villica* Lucas (*L. tomentosa* E. Sim., *L. Meinerti* Thorell). —

Oxyopes heterophthalmus Latreille. — *Menemerus semilimbatus* Hahn. — *Gluvia dorsalis* Latreille; le P. Pantel a observé que ce Galéode se sert des expansions membraneuses des tarses de ses pattes-mâchoires, comme de ventouses, pour grimper sur les surfaces polies, notamment sur les parois verticales d'un bocal de verre.

**Description d'un nouveau genre de Coléoptères
du groupe des Rhysopaussides**

Par L. FAIRMAIRE.

Barlacus, n. gen. — Très voisin des *Azarelius*, dont il diffère par un corps plus robuste, la tête verticale, non inclinée en dessous, fortement sillonnée entre les antennes qui sont plus distantes, les yeux non contigus, bien que peu distants, le front formant un lobe obtus, assez saillant au-dessus de l'insertion des antennes, les palpes maxillaires plus robustes, surtout le dernier article qui est tronqué. Les antennes sont assez semblables, mais plus allongées, assez épaisses, non moniliformes, 2^e article à peine plus court que le 3^e, les derniers manquent.

B. costulatus, n. sp. — Long. 9 mill. — *Oblongo-elongatus, subparallelus, sat convexus, fusco-niger, subopacus, elytris vix paulo nitidulis; capite sat parvo, brevi, inter antennas concavo et sulcato, his piceis, sat validis; prothorace longitudine haud latiore, elytris angustiore, antice vix paulo dilatato, lateribus carinato, dorso dense subtiliter asperato, haud sulcato, sed leviter pluriimpresso, margine postico recto, angulis fere acute rectis, elytris oblongis, apice rotundatis, fortiter costatis, interstitiis valde punctato-crenatis, pedibus gracilibus, sat elongatis.*

Bornéo; ma collection.

Rappelle, par son faciès et ses élytres, le genre *Ziaelas*, mais la tête et les antennes sont fort différentes.

Description d'une espèce nouvelle du genre *Strongylium* [COL.].

Par L. FAIRMAIRE.

Strongylium forcipicolle, n. sp. — Long. 19 mill. — *Elongatum, convexum, lateribus compressum, supra fusculo-aeneum, nitidum; capite*

subtiliter punctato, inter oculos bifoveolato, his magnis, antice valde approximatis, antennis fuscis, prothoracis basin vix superantibus, basi gracilibus, ab articulo 5° gradatim latioribus et compressiusculis; prothorace singulari, transverso, elytris sat angustiore, antice angustato, dorso fortiter elevato, medio fisso et excavato, lobis summo emarginatis, laevi, basi fortiter bisinuata et marginata, utrinque ad angulos impressa; scutello triangulari, laevi; elytris elongatis, postice levissime attenuatis, seriatim grosse foreolato-punctatis, intervallis basi et lateribus transversim paulo plicatulis, utrinque ad suturam impressionibus 4 signatis, basi utrinque paulo elevata; subtus cum epipleuris coeruleum, pedibus sat elongatis, fusculeo-coeruleis, femoribus, genibus exceptis, et tibiis basi rufis.

Bornéo : Pontaniak ; ma collection.

Cet insecte est fort remarquable par la structure de son corselet qui est très fortement relevée en deux lobes profondément séparés, et se rapprochant au sommet de manière à former une tenaille courte et épaisse.

Notes synonymiques et rectificatives sur quelques Bostrychides [COL.]

Par P. LESNE.

Les remarques suivantes ont trait à divers points de synonymie et de nomenclature mis en question par la publication des récents travaux de MM. Th.-L. Casey (1) et J. Schilsky (2) sur les Bostrychides.

Patea Casey 1898 = *Dinoderus* Steph. 1830 (in part.).

Bostrychulus Lesne 1899 = *Micrapate* Casey 1898.

Gen. *Apatides* Casey 1898. — Nous avons rattaché au genre *Bostrychopsis* (3) le *Bostrychus fortis* de Leconte, en faisant remarquer que cette espèce rompait l'homogénéité du groupe. Pour ne pas multiplier les dénominations nouvelles, nous n'avions pas créé

(1) TH.-L. CASEY. Studies in the Ptinidae, Cioidae and Sphindidae of America (*Journ. of the New York Ent. Soc.*, vol. VI, n° 2, juin 1898, p. 65-76). Ce travail, qui est antérieur de plusieurs mois au 3^e mémoire de notre *Revision des Bostrychides*, ne nous a été connu qu'après la publication de ce mémoire.

(2) J. SCHILSKY. *Die Käfer Europa's*, Heft XXXVI, décembre 1899, n° 75-100 et p. 36 SS-36 BBB).

(3) *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 524 et 552.

de coupe générique spéciale pour cette espèce. Quelques mois auparavant, M. Casey avait établi sous le nom d'*Apatides* un genre ayant pour type le même *Bostrychus fortis*. Désormais celui-ci devra être distrait des *Bostrychopsis*.

Xylopertha Heydeni Schilsky 1899 = *X. picea* Ol. 1790.

Nous devons signaler de graves inexactitudes dans la façon dont notre classification de la tribu des *Bostrychinae* est rapportée dans l'ouvrage de M. Schilsky. Il suffira, pour les rectifier, de répéter ici sous la forme la plus concise le mode de division de la tribu en trois sous-tribus :

♀ pourvues d'un	{	<i>Bostrychinae</i> sens. str.	<i>Bostrychinae oxygnathae</i>
oviscapte		<i>Stnoxyloninae</i>	» <i>pachygnathae</i>
♀ dépourvues	{	<i>Apatinae</i>	» <i>oxygnathae</i>
d'oviscapte.			

Descriptions de deux nouvelles espèces de Lampyrides [COL.]

Par ERNEST OLIVIER.

Diaphanes seminudus, n. sp. — ♂ *Elongatus, parallelus, piceus; antennis brevioribus, flavis; prothorace flavo, marginato, antice rotundato, in medio longitudinaliter vix sulcatulo, angulis posticis acutis et profunde foveolatis; scutello triangulari, flavo; elytris nigris, costulatis, punctulatis, sutura tenuissime picea, intus dehiscentibus, brevibus, tertio abdominis segmento haud longioribus; abdomine piceo, in medio infuscato, ultimis segmentis cereis, ultimo leviter emarginato.* — Long. 10-13 mill.; lat. 3-4 mill.

♀ ignota.

North Konkan (Hindoustan).

Ce *Diaphanes* est très remarquable par ses élytres raccourcis qui ne dépassent pas le troisième segment de l'abdomen et les angles postérieurs de son prothorax, très aigus, bien saillants en dehors et creusés d'un profond sillon. Il est, en outre, étroit, allongé, rappelant par sa forme les *Lampyris* européens.

Diaphanes Wroughtoni, n. sp. — ♂ *Oblongo-elongatus, niger; antennis pilosis, brunneis, ultimo et duobus primis articulis piceis; prothorace flavo, basi recte truncato, margine antica erecta, macula basali quadrata, nigra, et duabus plagis anticis vitreis, in medio longitudinaliter costato, crebre punctato, angulis posticis fere rectis; scutello flavo,*

triangulari; *elytris prothorace latioribus, oblongis, rugosulis, tricostulatis, fuscis, flavo tenuiter limbatis*; *pectore, femoribus, pygidio et tribus ultimis ventris segmentis flavis*. — Long. 15-16 mill.; lat. 5,5-6 mill.

♀ *ignota*.

Cette jolie espèce est voisine de *plagiator* Ern. Oliv. Elle s'en distingue nettement par sa forme plus allongée, par le prothorax taché de noir et dont les angles basilaires sont beaucoup moins obtus, presque droits, par la couleur des élytres, bruns entourés d'une fine bordure flave, par les côtes des élytres et celle du prothorax plus saillantes, etc.

Cette espèce et la précédente m'ont été communiquées par mon ami Rob. du Buysson; elles ont été capturées toutes les deux à North Konkan (Hindoustan) par M. R.-C. Wroughton, du service des forêts de l'Inde.

Description de trois *Ptinus* d'Orient [COL.]

Par Maurice Pic.

***Ptinus* (*Pseudoptinus*) *anatolicus*, n. sp.** — *Nigro-piceus, nitidus, fere glaber, ovatus; antennis fuscis, crassissimis, articulo primo obscuro, 2^o-10^o plus minusve transversis vel subquadratis, ultimo paululum longiore; thorace subcylindrico, ante basin constricto, dein dilatato, subconvexo, rugoso-punctato; scutello subarcuato, griseo-pubescente; elytris elongato-ovatis, fortiter striato-punctatis, interstitiis laevibus, indistincte maculatis; pedibus rubris, sat crassis*. — Long. 2,7 mill.

Anatolia.

Très voisin de *spissicornis* Ab. (type in coll. Abeille de Perrin), mais antennes encore plus robustes, forme élytrale moins étroite, à coloration brunâtre.

P. anatolicus était dans la collection de *Ptinidae* du Rév. Gorham que j'ai acquise récemment.

***Ptinus circassicus*, n. sp.** — ♀ *Rufus vel rubro-fulvus, subnitidus, elongato-ovatus, sat brevis hirsutus; antennis paululum gracilibus, articulis 4^o-10^o elongatis; thorace subelongato, subpubescente; scutello subtriangulare, griseo-pubescente; elytris elongato-ovatis, sat fortiter striato-punctatis, interstitiis parum laevibus, lateraliter antice et pos-*

tice albo-maculatis aut albo-fasciatis; pedibus elongatis. — Long. 2,8-3 mill.

Circassia.

Paraît voisin de *Meisteri* Reitt., mais coloration moins foncée, forme élytrale beaucoup plus allongée, les soies redressées du corps n'étant pas très longues. Cette espèce, recueillie au Caucase par Leder, me vient de la coll. Reitter.

Ptinus Leuthneri, n. sp. — ♀ *Rufo-testaceus, subnitidus, brevis, longe hirsutus; antennis gracilibus, articulis 4^e-10^e elongatis; thorace breve, dentibus pilosis quatuor acutis ornato; scutello subtriangulare, griseo-pubescente; elytris brevibus, fortiter striato-punctatis, interstitiis laevibus; pedibus satis elongatis.* — Long. 1,5-2 mill.

Syria (Dr Leuthner, in coll. Pic).

Voisin de *hirsutus* Pic, mais les soies dressées sur le corps sont moins nombreuses; espèce bien caractérisée par sa forme très courte, large, et ses longues soies claires, dressées et peu nombreuses.

Je ne crois pas me tromper en attribuant comme ♂ à cette espèce un exemplaire d'Akbès, provenant des chasses de Delagrange; cet exemplaire, lui aussi, présente une forme élytrale assez élargie pour son sexe, peu longue, des crêtes pileuses prothoraciques nettes. Cet insecte diffère de *hirsutus* Pic ♂ par la coloration plus claire, le prothorax offrant des traces de callosités brillantes, etc.

Coléoptères aquatiques capturés dans l'île d'Aldabra, près des Comores, par le Dr Voeltzkow, de Strasbourg, et communiqués par le Dr Bergroth

Par le Dr M. RÉGIMBART.

I. — DYTISCIDAE.

HYPHYDRUS IMPRESSUS Klug (*Coquereli* Fairm.). — 3 exemplaires beaucoup plus clairs comme coloration que ceux de Madagascar; les dessins noirs sont plus ou moins réduits et disjoints sur les élytres et le pronotum est faiblement rembruni au milieu.

CANTHYDRUS BIGUTTATUS Rég. — 3 exemplaires présentent la même variabilité, dans l'étendue du jaune à la tête et au pronotum, que les exemplaires d'Afrique continentale.

LACCOPHILUS ADDENDUS var. **GEMINATUS** Rég.

LACOPHILUS POSTICUS Aubé. — Ces deux espèces représentées par plusieurs exemplaires identiques à ceux de Madagascar.

COPELATUS PULCHELLUS Klug. — Plusieurs exemplaires constituant une variété assez distincte, principalement chez la femelle. La taille, variant entre 4 3/4 et 5 1/2 mill., est par conséquent beaucoup plus petite que sur le continent africain, et la forme est relativement assez courte, surtout chez la femelle. La couleur est normale chez le mâle, avec les élytres noirâtres plus ou moins largement ornés de jaune à la base et sur les côtés, les dix stries étant toujours noires sur les parties jaunes; les femelles sont plus foncées et moins jaunes. Chez les mâles, la ponctuation est peu dense et assez grosse; chez la femelle le pronotum est couvert de stries denses et longues, plus courtes en avant, plus effacées au milieu; sur les élytres ces stries sont également denses, très longues, anastomosées et ondulées, profondes, et couvrent toute la surface moins le sommet et les côtés après le milieu. Cette forme est tout à fait intermédiaire aux *C. pulchellus* Klug et *indicus* Sharp (1).

II. — HYDROPHILIDAE.

HELOCHARES NIGRIFRONS Brancsik (5 mill.). — Je rapporte à cette espèce plusieurs exemplaires très pâles, ayant l'épistome et l'occiput noirâtres au milieu, un point noir très net au calus huméral, une ponctuation dense et assez grosse et les séries ponctuées des élytres médiocrement imprimées. Est-ce une espèce valable ou simplement une forme de *H. melanophthalmus* Muls. J'inclinerais volontiers pour cette dernière hypothèse, car je possède un grand nombre de spécimens de diverses régions d'Afrique et de Madagascar, et je trouve une telle variabilité et une telle inconstance dans la taille, la forme, la ponctuation, l'intensité des stries et la coloration, que l'on pourrait, comme l'a fait Kuwert pour le *H. lividus* Forst., y voir autant d'espèces que l'on voudrait. Il me semble donc logique de n'admettre qu'une seule espèce qui varie extrêmement, comme beaucoup d'*Hydrophilides*.

PHILYDRUS PARVULUS Reiche. — Plusieurs exemplaires que je rapporte à cette espèce pour laquelle on peut faire les mêmes remarques que pour la précédente au sujet de la variabilité. Taille entre 2 1/2 et

(1) Aux espèces précédentes, il faut ajouter pour avoir la liste complète des *Dytiscidae* connus de l'île d'Aldabra : *Eretes stictitus* L. (une femelle) et *Cybister tripunctatus* Ol., recueillis par le Dr Abbott (cf. Linell in Proceed. U. S. Nat. Mus., XIX, p. 698).

3 mill., couleur testacée plus ou moins rembrunie sur le disque du pronotum, plus pâle sur les bords, tête noire avec une tache triangulaire en avant des yeux, palpes longs, jaune pâle uniforme, pattes rousses, abdomen et poitrine noirâtres à pubescence grise, ponctuation assez forte, mais peu dense et un peu inégale. Je ne puis trouver de caractères pour séparer ces spécimens d'autres que j'ai d'Égypte, de l'Inde et même d'un autre des îles Séchelles.

Berosus Bergrothi, n. sp. — *Ovalis, sat elongatus, modice convexus; capite aeneo-cupreo, fortiter purpureo et violaceo-micante, fortiter sat crebre punctato; pronoto sordide testaceo, in medio macula magna quadrata, aeneo-cuprea, nec apicem nec basin ludente ornato, fortiter sat crebre punctato, tenuiter pubescente; scutello angusto, aeneo, punctato; elytris ovatis, ad apicem anguste rotundatis, fortiter sat dense punctatis, pubescentibus, sordide testaceis, maculis quatuor fuscis ornatis, profunde crenato-striatis. Subtus nigricans, griseo-pubescent, pedibus flavis, coxis posterioribus et intermediis ex parte majore nigricantibus.* — Long. 3 mill.

Espèce très petite, remarquable par les reflets pourprés et violacés de la tête qui est d'un bronzé cuivreux, par la tache du pronotum quadrangulaire, un peu plus longue que large, entière ou montrant simplement l'indice d'une séparation médiane, et par les quatre taches aux élytres ainsi disposées : une sur le calus huméral, une seconde assez près de la suture vers le premier quart, une troisième plus diffuse également près de la suture et un peu en arrière du milieu, une quatrième latérale, petite, ronde ou transversale, exactement au milieu. Chez le mâle, les 2^e et 3^e articles des tarses antérieurs sont largement dilatés en lobes, surtout au bord interne.

Deux exemplaires mâles.

Volvulus cupreus, n. sp. — *Ovalis, angustus, valde convexus, postice attenuatus, nitidissimus, aeneo-cupreus, fortiter sat crebre punctatus, elytris decemstriatis, his striis profundis, canaliculatis, fortiter crenato-punctatis, ad basin et ad suturam minus impressis, ad latera et praecipue ad apicem sulciformibus. Corpore subtus pedibusque nigro-piceis, palpis rufis.* — Long. 4 mill. 1/2.

Il est possible que cette espèce ait déjà été décrite, mais devant la difficulté de reconnaître les espèces de ce genre sans les types, à cause des descriptions généralement insuffisantes, j'ai jugé utile de lui donner un nom et d'en exposer les caractères. Elle se distingue par une ponctuation assez grosse et modérément dense, un peu moins profonde

sur le pronotum, et par les stries des élytres qui sont très imprimées, sulciformes, pourvues de gros points qui les rendent crénelées, plus superficielles aux environs de la base et de la suture, plus profondes surtout en arrière et sur les côtés. Le mâle a les tarses antérieurs largement dilatés et pourvus en dessous de cupules pétiolées, comme chez la plupart des Dytiscides.

Deux exemplaires. — J'en possède un troisième semblable, de Zanzibar.

Cette espèce ressemble beaucoup, comme taille et aspect, à un autre *Volulus* commun dans toute l'Afrique tropicale et qui se distingue par sa ponctuation un peu plus dense et les stries des élytres beaucoup plus fines et moins profondes.

Anomalies observées chez deux Lépidoptères

Par L. BLEUSE.

Les monstruosités, chez les Lépidoptères, sont assez rares pour qu'il me semble utile de porter à la connaissance de nos collègues deux exemples que j'ai eu la bonne fortune de recevoir, avec d'autres Papillons, des localités d'où elles proviennent.

C'est d'abord un *Parnassius Apollo* L. ♀ qui possède deux tarses à la patte antérieure droite, un peu plus courts que le tarse ordinaire. Le premier, c'est-à-dire celui qui tient la place habituelle sur le tibia, n'a subi qu'une légère modification qui s'est portée principalement sur le premier et le dernier articles qui sont beaucoup plus courts, tandis que le tarse supplémentaire, qui prend naissance au-dessous celui-ci et plus près de l'éperon du tibia, a le premier article grêle et plus long que les quatre derniers réunis, ceux-ci forment une massue allongée, moins foncée; chacun de ces deux tarses n'a qu'un seul ongle très réduit, surtout au tarse supplémentaire où il est presque rudimentaire.

Ce curieux *Parnassius* a été capturé l'an dernier aux environs de Caunterets (H^{tes}-Pyrénées), par mon ami M. Morel.

La seconde anomalie est encore plus curieuse que la précédente, elle s'est produite sur une *Plusia iota* L. ♂, provenant d'Angleterre, et c'est en repréparant cette Noctuelle, qui était étalée à la méthode anglaise, que j'en ai fait la découverte.

Ce Papillon est muni de sept pattes, et il est très heureux qu'aucun accident ne lui soit survenu, car le plus souvent c'est le contraire qui se produit. Cette septième patte prend son attache entre l'antérieure et l'intermédiaire gauches, elle a, comme celles-ci et toutes les autres pattes,

une hanche qui lui est propre, se mouvant quand l'insecte est ramolli; sa forme est celle de la patte antérieure, elle est portée en avant comme elle, avec cette différence toutefois que le tibia est un peu plus long et le tarse plus court.

Anomalie de *Doleschallia amboinensis* Stgr. [LÉPID. RHOPAL.]

Par Charles OBERTHÜR.

Dans un récent envoi reçu d'Amboine se trouve un exemplaire ♀, en excellent état de conservation, de *Doleschallia amboinensis*, ayant 2 antennes du côté droit.

Le côté gauche est tout à fait normal.

Au côté droit, les 2 antennes partent du même point d'insertion; elles paraissent superposées; l'antenne du dessus est un peu plus petite; l'antenne du dessous est aussi longue que l'antenne du côté gauche. La massue des 3 antennes est semblable.

Déjà, j'avais reçu du Thibet un *Lycaena* ayant une patte supplémentaire. Il a été publié quelques cas d'aile supplémentaire; mais je ne crois pas avoir vu chez les Lépidoptères le fait d'une 3^e antenne que je signale aujourd'hui.

Observations à propos des notes de MM. L. Bleuse et Ch. Oberthür

Par Alfred GIARD.

En raison de leur extrême rareté, je désirais vivement examiner les cas tératologiques signalés par M. Bleuse, et grâce à la complaisance de notre collègue j'ai pu constater *de visu* la parfaite exactitude de ses descriptions.

Chez les Coléoptères, on connaît des exemples relativement assez nombreux de membres plus ou moins dédoublés ou même trifurqués ⁽¹⁾. Chez les Lépidoptères ce sont surtout les ailes qui présentent la monstruosité *per accessum*; un seul fait de dédoublement d'un membre a été décrit jusqu'à présent avec quelque détail.

Il s'agit d'un exemplaire mâle de *Smerinthus ocellatus* L., obtenu de chrysalide par Oskar Schultz ⁽²⁾. Ce Papillon avait, du côté

(1) Ces cas de membres triples sont particulièrement intéressants, les deux membres supplémentaires étant le plus souvent placés en symétrie secondaire comme l'a indiqué Bateson (*Materials for study of variations*, 1894, ch. XX, p. 474 et suiv.).

(2) SCHULTZ (Oskar). Einige Worte ueber Monstra per accessum unter

gauche, deux pattes postérieures. Le membre supplémentaire comprenait un fémur, un tibia et un tarse de cinq articles. Schultz ne dit pas si la hanche était également dédoublée. Le fémur était plus fort que celui des membres normaux. Cette patte supplémentaire ne pouvait servir à la locomotion; les diverses parties étaient complètement ankylosées. La cuisse s'étendait en ligne droite le long de l'axe du corps; les poils de la région ventrale de l'abdomen cachaient presque entièrement la jambe dont on ne voyait que l'extrémité obliquement dirigée vers le haut. En voulant faire mouvoir le membre accessoire, Schultz le brisa au point de jonction de la cuisse et du tibia. Le Papillon avait les ailes ratatinées. Le membre supplémentaire déterminait, à la face ventrale de la chrysalide, une saillie causée sans doute par le fémur hypertrophié et d'où partait une sorte d'épaississement linéaire orienté vers la région dorsale du côté droit.

En ce qui concerne les antennes, O. Schulz rappelle qu'on a, à diverses reprises, signalé des Zygènes présentant une troisième antenne de conformation identique aux deux normales. Le Dr Staudinger lui a fait part de la présence dans ses collections d'un *Crambus alpinellus* possédant également trois antennes.

Un cas fort curieux est celui du spécimen d'*Euprepia purpurea* L., décrit par Freyer (1), qui possédait trois palpes. Cet exemplaire était en outre gynandromorphe (antenne et ailes du côté droit ♂, antenne et ailes du côté gauche ♀). La description insuffisante de Freyer avait conduit Bateson à supposer qu'il s'agissait d'une paire de palpes supplémentaires et à le ranger parmi les monstruosité à symétrie secondaire (l. c., p. 524, n° 807). Mais l'exemplaire est actuellement entre les mains du Dr O. Staudinger et n'a, paraît-il, que trois palpes (O. Schultz *vide* Staudinger).

La métamorphose est-elle une crise de maturité génitale?

Par Alfred GIARD.

Dans une récente communication, notre collègue Ch. Pérez a défini la métamorphose *une crise de maturité génitale* [1] (2).

Lepidopteren in allgemeinen und eine derartige Bildung bei *Smerinthus ocellatus* L. im besonderen. *Illustrierte Wochenschrift f. Entomologie*, II, 1897, pp. 631-633.

(1) FREYER (C.-F.). Beitr. zur Schmetterlingskunde, 1845, vol. V, p. 127, Tab. 548, f. 4.

(2) Les chiffres entre crochets renvoient à l'index bibliographique à la note.

Une bonne définition, disent les logiciens, doit *convenire toto et solè definitò*. Soumettons la définition de M. Ch. Pérez à cette double épreuve.

I. — Toute métamorphose est-elle accompagnée d'une crise de maturité génitale?

Sans parler des métamorphoses plus ou moins étendues qui, chez les animaux inférieurs, font du *Pilidium* un Némertien, de l'*Actinotrocha* un *Phoronis*, du *Pluteus* un Oursin, du *Cyphonautes* un *Membranipora*, etc., nous avons chez les larves urodèles des Ascidies et chez les têtards des Batraciens anoures des exemples d'un métabolisme très net sans crise génitale correspondante.

Bornons-nous aux Insectes : Les Papillons de la génération d'automne de certains *Sphinx* sont stériles dans le nord de leur habitat. Le fait a été constaté pour *Acherontia atropos* L. par de nombreux observateurs, en Angleterre, en Norvège, dans le nord de l'Allemagne et, par moi-même, dans le nord de la France; les organes génitaux sont ou complètement atrophiés, ou tout à fait rudimentaires. Et cependant ces Papillons sont le résultat d'une métamorphose complète malgré l'absence de poussée génitale [2].

Dans les cas, certainement très rares, mais dont on connaît cependant plusieurs exemples, où l'on voit une chenille parasitée par une larve de Diptère ou d'Hyménoptère donner à la fois un Papillon et l'imago de l'insecte parasite, la castration parasitaire supprime la poussée génitale de l'hôte sans empêcher la métamorphose.

Un cas bien curieux, mais un peu différent, est celui observé par A.-P. Morres, de Salisbury, qui, en activant par la chaleur le développement d'une chenille d'*A. atropos*, obtint, six semaines après la nymphose, un Papillon dans le ventre duquel il trouva, en l'ouvrant, une larve de 10 mill. de long. L'optimum calorique d'évolution du parasite ne coïncidant pas avec celui de l'hôte, celui-ci avait pu opérer sa métamorphose avant d'être épuisé par son ennemi [3].

Les curieuses expériences de J.-Th. Oudemans sont encore plus démonstratives. En châtrant des chenilles d'*Ocneria dispar*, avant les deux dernières mues qui précèdent la nymphose, cet habile entomologiste put mener à bien l'éducation des chenilles opérées et vit éclore des Papillons tout à fait normaux, présentant même encore des instincts sexuels [4].

La stérilité plus ou moins complète déterminée par les *Conops* chez les *Bombus*, par les Rhipiptères chez les Andrénes et autres insectes modifie parfois, sans le supprimer, le métabolisme de ces animaux.

La castration parasitaire des Termites et la castration alimentaire des larves d'Hyménoptères sociaux n'empêchent pas non plus la métamorphose, bien qu'elles modifient singulièrement les formes de l'adulte.

On pourrait encore invoquer les exemples si intéressants de *gynandromorphie* des Lépidoptères presque toujours accompagnés d'atrophie génitale [5].

II. — Toute crise génitale est-elle forcément accompagnée d'une métamorphose?

Faut-il rappeler les cas de *neoténie* si fréquents chez l'*Axolotl* et constatés aussi, plus rarement, chez *Triton alpestris* Laur. et *Triton punctatus* Daud. Chez l'*Axolotl*, en particulier, une première et parfois même plusieurs poussées génitales successives ont lieu pendant la période larvaire précédant la métamorphose en *Amblystome*, et celle-ci peut être suivie de nouvelles crises de maturité sexuelle. Dans les cas d'*hermaphrodisme protandrique* des *Myzostomes*, des *Épicarides*, etc., dans les cas de *dissogonie* signalés par Chun chez les *Cténophores* une première poussée génitale se produit également avant que l'animal ait réalisé la forme de l'adulte. Non seulement, comme nous l'avons dit, chez les Hyménoptères sociaux la castration alimentaire n'empêche pas la métamorphose, mais la suppression de la castration nutritionnelle, chez les *Vespides*, permet une nouvelle poussée génitale nullement accompagnée de métabolisme [6].

Chez les Insectes, on peut dire que très souvent, loin de déterminer la métamorphose, une crise intense de maturité génitale suffit à l'empêcher de se produire. C'est ce qui a lieu chez les générations parthénogénétiques d'été des *Pucerons*, chez les *Bacillus* et quelques autres *Phasmides*, chez les larves pædogénétiques de *Cécidomyies*, etc. Comme je l'ai fait remarquer ailleurs, la parthénogénèse est dans ces cas le terme ultime d'un processus dont le début est la reproduction anticipée (*progénèse*) accompagnée souvent de viviparité et de la suppression de l'imago devenu inutile.

En somme, l'indépendance relative des divers appareils physiologiques, conséquence du principe de l'épigenèse de C.-F. Wolff, est, comme on pouvait s'y attendre, beaucoup plus grande entre le soma et les gonades qu'entre les divers systèmes d'organes de la vie de l'individu. Le soma et les gonades forment un complexe généralement symbiotique; mais il peut arriver parfois que le soma se développe en vrai parasite aux dépens des gonades et achève ainsi son évolution (cas des générations automnales d'*Atropos*); il peut arriver également que les gonades agissent comme parasites (et même plus énergique-

ment que certains parasites) et arrêtent le développement du soma (diverses formes de *progénèse*).

Il faut se garder de confondre la *métamorphose* avec les *livrées nuptiales* qu'on observe chez beaucoup d'animaux pendant les poussées génitales. La livrée nuptiale est un ensemble de modifications *transitoires* qui apparaissent et disparaissent périodiquement sous l'influence des crises sexuelles. Le métamorphose, au contraire, comme tout phénomène évolutif vrai, est définitive et *irréversible*.

On ne peut objecter comme exemple de réversion la pseudo-chrysalide des Cantharidiens qui semble bien, d'après les recherches de J. Künckel d'Herculais, n'être qu'un phénomène curieux d'enkystement saisonnier [7].

Si chez les insectes la livrée nuptiale semble permanente, si elle accompagne la métamorphose et si celle-ci coïncide avec la maturité génitale, c'est qu'en raison des nécessités de la dissémination, ces animaux ont des ailes, et que toute mue nouvelle devient impossible dès que les ailes sont acquises [8].

1. PÉREZ (Ch.). Sur la métamorphose des Insectes. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 27 déc. 1899, p. 398-402.
4. OUDEMANS (J.-Ch.). Falter aus castrirter Raupen, wie sie aussehen und wie sich benehmen. *Zoolog. Jahrbüch. Abtheil. System.*, XII, 1898, p. 72-88.
2. AIGNER-ABAFI (Ludwig von). Acherontia Atropos L. *Illustrierte Zeitschr. f. Entomol.*, Bd. IV, 1899, p. 211.
3. MORRES in MARSHALL. *Entomologists Magazine*, XXXII, 1896.
6. MARCHAL (P.). La castration nutriciale chez les Hyménoptères sociaux. *C. R. Soc. de Biologie*, 5 juin 1897, p. 556.
5. SCHULTZ (Oskar). Ueber den inneren Bau gynandromorpher Macrolepidopteren. *Illustrierte Zeitschr. f. Entomologie*, Bd. II, 1897, p. 191 et 215.
7. KUNCKEL D'HERCULAI (J.). Observations sur l'hypermétamorphosé ou hypnodie chez les Cantharidiens. — La phase dite de pseudo-chrysalide considérée comme phénomène d'enkystement. *C. R. Acad. Sc.*, 12 févr. 1894; et *Soc. ent. Fr., Congrès annuel*, 1894, p. 136.
8. BOAS (J.-E.-V.). *Lehrbuch der Zoologie*, 1888; et surtout: Einige Bemerkungen ueber die Metamorphose der Insecten. *Zoolog. Jahrb. Abtheil. System.*, XII, 1899, p. 397.

La théorie des métamorphoses de M. Ch. Pérez

Par E. BATAILLON.

M. Pérez ⁽¹⁾, comme M. Anglas ⁽²⁾, trouve dans l'histolyse des Insectes une intervention active des phagocytes, contrairement à l'opinion de Karawaiew, Korotneff et Terre. *En opposition avec la plupart des observateurs, ces Messieurs ne constatent pas une altération des tissus préalable à la phagocytose.*

L'importance du résultat ne s'impose pas immédiatement à l'esprit. Et pourtant, à la lumière de ce fait nouveau, le problème physiologique des métamorphoses changerait de face en se simplifiant singulièrement.

Les altérations préalables à la phagocytose (la karyolyse en particulier) trouvant une explication assez logique dans le déterminisme que j'ai établi, M. Pérez attaque ce déterminisme.

1° *Mes données numériques relatives à la respiration ont été contestées par M. Gal* ⁽³⁾.

2° *Elles seraient exactes qu'elles ne prouveraient pas l'asphyxie.*

3° *L'asphyxie serait démontrée qu'elle n'expliquerait pas la métamorphose.*

Cette argumentation a une allure géométrique imposante, et mérite d'être reprise par ses trois points.

I. — M. Gal a donné des chiffres dont tout physiologiste peut apprécier la valeur. Ils ne sont aucunement comparables aux miens et, à mon sens, n'ont pas de portée au point de vue des métamorphoses.

J'ai fait de ce travail une critique très serrée ⁽⁴⁾ *et regretterais d'avoir à y revenir.* Rapporter les échanges au poids de substance, et non au nombre des individus; M. Gal l'a mal fait. C'est un point que j'ai spécialement examiné; et, puisque M. Pérez cite la note de Terre ⁽⁵⁾,

(1) CH. PÉREZ. Sur la métamorphose des Insectes. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 27 décembre 1899.

(2) J. ANGLAS. Sur l'histolyse et l'histogénèse des muscles des Hyménoptères pendant la métamorphose. *C. R. Soc. Biol.*, 25 nov. 1899; *Bull. Soc. Ent. Fr.*, 22 nov. 1899.

(3) J. GAL. Études sur les Vers à soie. *Bull. Soc. d'Et. des Sc. nat. de Nîmes*, XXVI.

(4) E. BATAILLON. Lettre à M. Gal à propos de ses « Études sur les Vers à soie ». *Ibid.*

(5) L. TERRE. Sur les troubles physiologiques qui accompagnent la métamorphose des Insectes holométaboliens (*C. R. Soc. Biol.*, 22 octobre 1898).

je lui dirai que ces résultats physiologiques continus, parfaitement comparables aux miens, ont été obtenus sur de petites larves, *précisément par la méthode des poids égaux*.

Mais je ne vois pas très bien la portée de ce premier argument!... dans le raisonnement de M. Pérez. Je ne lui ferai pas l'injure de penser qu'il opte à première vue entre deux témoignages. Il se laisse plutôt influencer, comme beaucoup, par le *dernier travail paru*. En ce cas, il est regrettable qu'ayant eu en mains le fascicule de la Société d'Études des Sciences naturelles de Nîmes contenant le travail de M. Gal, il n'ait pas pris la peine de passer de la page 53 à la page 99 où se trouve ma réponse.

II. — *Ces données expérimentales elles-mêmes ne signifieraient rien; car la larve, la chrysalide et l'imago sont des individualités non comparables qui ont chacune leur physiologie.*

Mais, si ces organismes sont dissemblables, c'est qu'ils le deviennent; et, s'ils le deviennent, c'est précisément par suite des phénomènes d'histolyse et d'histogénèse qu'il s'agit d'expliquer. Je ne sais pas très exactement ce que M. Pérez appelle *faute de principe*; mais je vois très nettement, dans son raisonnement, ce que nous appelons dans le langage ordinaire *un cercle vicieux*.

Il y a quelque chose de plus. C'est une conception inacceptable des phénomènes biologiques. Une courbe de l'activité respiratoire continue, une courbe de la fonction glycogénique continue, des variations circulatoires également continues, etc., peuvent-elles logiquement être séparées des phénomènes de destruction et d'édification concomitants? La seule question me paraît étrange. Est-ce que, par hasard, un œuf non segmenté ne serait pas la même individualité physiologique que l'ébauche embryonnaire et la larve qui en sortent? Ce qui trouble ici la continuité, pour M. Pérez, c'est visiblement le fait à expliquer.

Pour nous (je dis nous, car nous sommes nombreux), qui n'admettons la discontinuité ni en morphologie, ni en physiologie, ni entre la morphologie et la physiologie, nous pensons que les grandes fonctions sont le critère constant de la somme des activités élémentaires. Nous pensons que les variations respiratoires, circulatoires, nutritives, traduisent les troubles morphologiques auxquels elles sont liées indissolublement (surtout dans un organisme soumis à l'inanition). Il est vraiment regrettable que P. Bert ⁽¹⁾ n'ait fait que poser les jalons d'une courbe de l'activité respiratoire du *Bombyx* aux différents âges.

(1) P. BERT. *C. R. Soc. Biol.*, 1885.

M. Pérez dissocierait cette courbe suivant *diverses individualités physiologiques*; il reprocherait à P. Bert de réunir des éléments non comparables; de n'avoir pas tenu compte de l'alimentation ou de la non-alimentation, du développement du système trachéen, etc.; mais peut-être aussi se demanderait-il avec anxiété pourquoi le Papillon, si bien doué au point de vue des trachées, montre une baisse aussi brusque de l'activité respiratoire, avec des troubles circulatoires qui font suite à ceux de la chrysalide (1).

Je n'insiste pas. Cette conception des individualités physiologiques successives me semble d'une parfaite obscurité. Elle ne m'aurait pas arrêté si elle n'avait, au moins en apparence, la prétention de séparer la continuité fonctionnelle de la continuité morphologique dont elle est solidaire.

III. — Enfin, l'asphyxie, même démontrée, n'expliquerait pas la métamorphose. C'est que M. Pérez a, lui aussi, sa théorie des métamorphoses. Et s'il est réfractaire aux grandes manifestations qui nous sont accessibles, c'est qu'il veut pénétrer plus avant dans les mécanismes. Je me suis rendu compte depuis longtemps qu'un échafaudage comme celui que j'ai dressé laissait place à des réactions plus intimes et j'attendrai avec impatience de *vrais résultats* dans cette direction.

« L'asphyxie, dit notre critique, n'expliquerait pas la métamorphose; car... si elle expliquait la dégénérescence de tel ou tel tissu, elle expliquerait mal la prolifération de certains autres, qui se produit en même temps. »

J'ai toujours soigneusement mis à part la délicate question des phénomènes d'histogénèse et me demande encore si des éléments embryonnaires ne résisteraient pas mieux à des conditions semi-asphyxiques que les tissus adultes, si même leur évolution ne trouverait pas là un certain stimulus.

M. Pérez n'a pas de ces embarras, et me rassure immédiatement. Nous pouvons avoir des *stimulines* pour tel tissu, des *toxines* pour tel autre. Avec une *coordination supposée* entre la prolifération des gonades et celle des disques imaginaires, nous pourrions nous dégager d'un luxe expérimental parfaitement inutile. Les stimulines et les toxines peuvent intervenir de front; les grandes fonctions n'ont rien à voir là....

(1) E. BATAILLON. Nouvelles recherches sur les mécan. de l'évolution chez le *Bombyx mori*. *Revue Bourg. de l'Ens. sup.*, t. IV..

La prolifération des gonades *détermine* celle des disques imaginaux??... Voilà le point de départ. « Cette multiplication extrême d'éléments *ne va pas sans* rejeter dans le milieu interne une grande quantité de substances, *capables au premier chef* d'intervenir dans les conditions de la lutte entre les divers éléments histologiques, stimulines pour les uns, toxines pour les autres; *capables de modifier* les chimiotactismes, et de permettre aux leucocytes de détruire ce qui constituait un organisme exclusivement nourricier, pendant que s'édifie un organisme surtout reproducteur. » Et voilà la Métamorphose bien définie : « *C'est une crise de maturité génitale* ».

C'est ainsi qu'avec des *hypotheses* on vide les questions les plus délicates *sans aucune espèce d'expérimentation*. Et on conclut par une définition qui ne définit rien.

Cette méthode, qui consiste à discuter dans le vide les résultats d'autrui et à trancher les difficultés à coup d'axiomes sensationnels, paraît surtout dangereuse quand elle appelle à la rescousse les vues d'une grande école.

L'auteur, engagé dans cette voie, aurait pu ajouter à son *rêve* la séduction de promesses expérimentales. Ces gonades, dont l'évolution subite trouble la vie normale d'un Ver à soie, transforme son individualité, en l'enfermant dans un linceul d'où elle ne sortira en apparence régénérée que pour s'épuiser dans l'effort reproducteur; *ces malencontreuses gonades, ne sera-t-il pas possible de les immobiliser?* On peut espérer qu'un sérum approprié substituera à la métamorphose normale une série indéfinie de mues, qu'un ver gigantesque arrivera ainsi sans encombre à la vieillesse extrême et à la mort naturelle, ayant perdu jusqu'à la mémoire des anciennes espérances dont le sacrifice a rétabli l'harmonie périlante de ses fonctions nutritives.

La théorie serait homogène et nous ouvrirait quelque perspective.

Malheureusement, les entomologistes soulèveront immédiatement *une toute petite difficulté*. Sur les stimulines et les toxines *hypothétiques* (dans le cas actuel bien entendu), l'accord peut toujours se faire. Mais il y a le point de départ : *la prolifération des gonades*. Chez les Abeilles et les Fourmis en particulier, ces gonades *avortent en règle assez générale*. Et il faut convenir que l'explication : *Crise de maturité génitale*, rencontre un léger obstacle dans le cas des neutres, ces neutres qui exceptionnellement peuvent donner plus tard des œufs sans crise définie comparable à celle-là.

Même difficulté pour la coordination entre la prolifération des go-

nades et celle des disques; il faut croire que cette coordination manque dans les cas de *pædogénèse*.

Une *hypothèse* dont la base croule dans un nombre incalculable de cas résistera-t-elle à l'expérimentation délicate qu'elle suggère, expérimentation qui, *sans trancher la difficulté physiologique*, donnerait seule à l'ensemble une réelle solidité? Je le souhaite sincèrement à l'auteur, mais suis persuadé qu'il fera mieux de changer de voie, car, dans celle qu'il a adoptée, il risque fort de ne pas sortir de l'*hypothèse*. Je serai le premier à féliciter M. Pérez le jour où il donnera une tournure plus originale et **plus** satisfaisante au problème que j'ai cherché à ébaucher. Mais il faudra des **faits**.

Au reste, quand, sans indiquer une **méthode** nouvelle, il conclut d'une manière *formelle* contre Karawaiew; quand il nous apprend qu'une note d'Anglas établit son fait chez les Guêpes et les Abeilles *contrairement aux observations* de Terre, je ne puis dissimuler une certaine surprise. Certainement, il a voulu opposer *observation à observation*.

Eh bien! je persiste à penser qu'une observation *d'où qu'elle vienne* (surtout consignée sous la forme d'une simple note) n'en renverse pas une autre. Les hommes compétents ne s'y trompent pas. Ils pèsent les éléments de la discussion; ils compulsent soigneusement la Bibliographie et la demandent plus complète que ne l'est jusqu'à présent celle de M. Pérez.

Contribution à l'étude de l'histolyse du corps adipeux chez l'Abeille

Par L. TERRE.

Chez les Muscides, la régression du corps adipeux s'effectue, selon Kowalewsky et van Rees, par phagocytose leucocytaire. Étant donnée la grande autorité de Kowalewsky, M. de Bruyne ⁽¹⁾ aurait bien voulu ne pas contredire les résultats du savant russe, cependant il ne peut adopter l'opinion de Kowalewsky ni celle de van Rees et il pense que, même chez les Muscides, les phagocytes ne jouent aucun rôle direct dans la lipolyse.

(1) C. DE BRUYNE. Sur l'intervention de la phagocytose dans le développement des Invertébrés. *Mémoires couronnés et Mémoires des savants étrangers. Académie royale de Belgique*, 1897, pages 34-41.

Dans sa dernière note, M. Anglas (1) a exposé que chez la Guêpe et l'Abeille les cellules du corps adipeux régressent « sans intervention d'éléments étrangers figurés ». Sur ce point nous sommes pleinement d'accord avec M. Anglas. Cependant sa façon d'envisager les phénomènes présente avec la nôtre de légères divergences qui pourront peut-être justifier la présente note.

Nous avouons ne pas saisir pourquoi M. Anglas s'étend avec tant de complaisance sur l'action des « cellules excréto-sécrétrices du corps adipeux », d'autant plus que cette action, d'après M. Anglas lui-même, est très restreinte dans la destruction du corps adipeux. Nous ne comprenons pas non plus quelles sont les raisons d'ordre majeur qui nécessitent la distinction entre la *cytolysse* et l'*histolysse*. Le corps adipeux constitue chez l'Abeille un agrégat de cellules graisseuses, un véritable tissu, et, sans commettre d'incorrection, il nous semble permis de considérer sa dégénérescence comme un phénomène d'*histolysse*. Enfin, M. Anglas a éprouvé la nécessité d'introduire dans la terminologie biologique l'expression nouvelle de *lyocytose*!

Abordons les faits. Chez des larves très jeunes, le corps adipeux consiste dans une association de cellules plus ou moins arrondies, renfermant de très volumineuses vacuoles claires. Les dimensions de ces vacuoles sont très inégales. Le noyau est bien apparent et limité. Outre ces cellules, le tissu adipeux renferme encore des éléments plus gros dont le protoplasme homogène se teinte énergiquement. Ils contiennent un noyau arrondi pourvu d'un filament chromatique très régulier et très apparent. Ce sont là, sans doute, les cellules glandulaires dont parle Karawaiew chez *Lasius*, les cellules excréto-sécrétrices d'Anglas. Chez l'Abeille, ces éléments ne semblent jouer qu'un rôle très secondaire dans la lipolyse et nous les laisserons de côté.

Sur des larves qui approchent de la période du filage, on constate que le corps adipeux est formé de cellules polyédriques à membrane bien visible, limitant un cytoplasme alvéolaire parsemé de rares vacuoles. Les volumineuses inclusions graisseuses du début ont disparu pour se répartir d'une façon uniforme à l'intérieur de la cellule. Les contours du noyau sont maintenant estompés. Chez une larve ayant filé, le tissu graisseux se dissocie; ses cellules s'isolent, s'individualisent et dans les espaces intercellulaires naissent des leucocytes. Il n'est pas rare d'en trouver accolés aux parois des éléments gras. Jouent-ils

(1) J. ANGLAS. Note préliminaire sur les métamorphoses internes de la Guêpe et de l'Abeille. — La lyocytose (*Comptes rendus de la Soc. de Biologie*, 27 janvier 1900).

un rôle dans la dissociation ? Jamais nous n'avons constaté la pénétration d'un leucocyte dans une cellule adipeuse. M. Anglas ne l'a vu que très exceptionnellement. Cependant M. Pérez ⁽¹⁾ a observé, chez la Fourmi, la pénétration de leucocytes dans les cellules du corps gras. « Ces cellules, ajoute-t-il, doivent donc subir — très partiellement d'ailleurs — une phagocytose leucocytaire. » Que signifie la restriction de M. Pérez ?

La dissociation du tissu s'accompagne d'une résolution du cytoplasme en un liquide au sein duquel nagent de nombreuses gouttelettes grasses. Le noyau présente d'abondantes figures de division directe, puis tous les signes caractéristiques de la chromatolyse. A un stade plus avancé, la membrane cellulaire se résorbe par dissolution, le cytoplasme se désagrège en granulations grasses, le noyau, réduit à un boyau chromatique dense, baigne dans cette bouillie qui va servir d'aliment aux organes en voie d'édification. Chez les nymphes sur le point d'éclore, ni cette bouillie ni les résidus nucléaires ne sont encore complètement résorbés. Les cellules glandulaires ont traversé toute cette période de métamorphose sans paraître subir de modifications importantes ; mais on ne les retrouve pas chez les jeunes Abeilles sur les coupes desquelles on remarque d'abondantes granulations pigmentaires. Existe-t-il un lien entre la chromatolyse et la formation du pigment ? Nous posons seulement la question ?

Il est à noter que la lipolyse débute bien après la myolyse, qu'elle dure pendant toute la nymphose et qu'elle marche très lentement. Enfin il est curieux d'enregistrer que la phase la plus active de ce processus coïncide avec une période de glycémie intense. La transformation de la graisse en glycogène et par suite en sucre est très probable chez les Vertébrés ⁽²⁾. D'autre part M. Couvreur ⁽³⁾ a établi que, chez le *Bombyx*, du glycogène se forme aux dépens de la graisse. Pendant la métamorphose, l'acide carbonique éliminé est constamment inférieur à l'oxygène absorbé ; qu'une certaine quantité d'oxygène reste dans l'organisme sous forme d'acide carbonique accumulé dans

(1) CH. PÉREZ. Sur l'histolyse musculaire chez les Insectes (*Comptes rendus de la Soc. de Biologie*, 6 janvier 1900).

(2) CH. BOUCHARD. Augmentation de poids du corps et transformation de la graisse en glycogène (*C. R. Acad. Sciences*, 3 octobre 1898).

M. BERTHELOT. Observations sur la note précédente (*loc. cit.*, 11 octobre 1898).

(3) E. COUVREUR. Sur la transformation de la graisse en glycogène chez le Ver à soie pendant la métamorphose (*Société linnéenne de Lyon*).

les tissus, cela a été démontré ⁽¹⁾; qu'une autre partie s'élimine sous forme de vapeur d'eau, il est possible; enfin que le reliquat se fixe sur la graisse pour la transformer directement ou indirectement en sucre, cela nous paraît certain. Chez les Insectes, la glycémie et la lipolyse doivent être rattachées par des liens très étroits. Il sera intéressant de préciser par les méthodes microchimiques le détail de ce métabolisme.

En résumé, l'histolyse du corps adipeux, chez l'Abeille, se présente donc comme une sorte de digestion, une dégénérescence chimique, un processus indépendant de la phagocytose leucocytaire comme l'histolyse musculaire elle-même. Et, comme pour le muscle, la régression s'accompagne d'une karyolyse que M. Anglas laisse trop volontiers dans l'ombre.

Puisque ces conclusions nous ramènent à l'histolyse musculaire, rappelons que pour M. Pérez des cellules qui n'englobent rien ne peuvent mériter le nom de phagocytes. M. Anglas abonde dans ce sens. Selon lui, il n'y a phagocytose que si le « phagocyte englobe la particule ingérée ». L'idée de phagocytose implique donc l'englobement de fragments cellulaires ou tissulaires par une cellule. Que MM. Anglas et Pérez nous permettent de leur faire observer qu'ils ne sont pas d'accord avec leurs principes. En effet, ils constatent, comme nous, que dans la myolyse certains éléments, dont la nature importe peu d'ailleurs, digèrent et absorbent le muscle sur place. Or, malgré leurs définitions, MM. Anglas et Pérez voient là un phénomène de phagocytose. Où est l'englobement? C'est pousser l'inconséquence trop loin! M. Anglas s'en est bien aperçu, et pour mieux marquer sa conversion il emploie un néologisme. Lyocytose au lieu de phagocytose, soit. Les termes ne nous apprennent rien, il importe plus de préciser les mécanismes. Or, on ne le fait pas, en déclarant comme M. Pérez ⁽²⁾ que chez des insectes tels que la Fourmi et l'Abeille la métamorphose est une « crise de maturité génitale ». Nous sommes ici sur le terrain des hypothèses et la discussion est sujette à caution. Mais on conçoit difficilement que la prolifération de gonades, puis celle de disques imaginaires cause d'abord la dégénérescence de l'appareil musculaire que l'organisme devra réédifier plutôt que celle d'un tissu de réserves « exclusivement nourricier » comme le corps

(1) E. BATAILLON. La métamorphose du Ver à soie et le déterminisme évolutif (*Bull. scient. de la France et de la Belgique*, 1893).

(2) CH. PÉREZ. Sur la métamorphose des Insectes. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 27 décembre 1899.

gras qui n'est attaqué qu'en dernier. N'est-il pas admis, pour la Grenouille, que le développement des éléments sexuels et la résorption des appendices épiploïques sont en corrélation ? La théorie de M. Pérez n'entraîne pas la conviction. Il sera toujours facile d'ergoter sur la signification, sur la valeur de tel ou tel trouble physiologique ; mais dans un essai d'interprétation des métamorphoses, il nous semble impossible de ne pas tenir compte des troubles fonctionnels, en particulier des troubles circulatoires et respiratoires.

Nouveau Péripate des environs de Rio-de-Janeiro

Par E.-L. BOUVIER.

Parmi les Onychophores qui font partie de la collection du Musée de Hambourg ⁽¹⁾ se trouvent deux exemplaires d'un *Peripatus* que M. le Dr Ohaus a capturé tout récemment, à Petropolis, c'est-à-dire dans le voisinage immédiat de Rio-de-Janeiro. Ne fût-ce qu'en raison du centre géographique qu'il habite, ce Péripate mériterait d'attirer l'attention ; avec le *Peripatoides chilensis* Blanch., il est le plus méridional de tous les Onychophores américains et se trouve séparé par environ 20 degrés de latitude des espèces les moins éloignées de l'Amérique du Sud orientale. Ces dernières ne paraissent pas, en effet, dépasser la région de l'Amazone : l'une est le *Peripatus brasiliensis* Bouv., de Santarem, l'autre le *P. Simoni* Bouv. qui a été trouvé aux environs de Caracas, et capturé depuis à l'embouchure de l'Amazone (coll. du British Museum).

Malgré ces différences de latitude, l'espèce du Musée de Hambourg appartient au même groupe de formes que les Péripates américains situés à l'est de la chaîne des Andes. Il se range, en d'autres termes, parmi les espèces que j'ai désignées sous le nom de *Péripates caraïbes* et il en présente tous les caractères ⁽²⁾. Il est du reste fort voisin des deux espèces de l'Amazone que j'ai citées plus haut ; mais il se distingue du *P. brasiliensis* par les bifurcations segmentaires normales de ses plis dorsaux, de cette dernière espèce et du *P. Simoni* par l'absence à peu près complète de papilles accessoires. A ce point de vue, comme à tout autre égard, il ressemble surtout au *P. Geayi* Bouv., de la Guyane française, et se fait remarquer comme lui par la base

(1) Je profite de cette note pour présenter mes sincères remerciements à M. le professeur Kraepelin, qui a eu l'obligeance de me communiquer cette collection.

(2) E.-L. BOUVIER. Sur les variations et les groupements spécifiques des Péripates américains. *Compt. rend. Acad. Sc.*, t. 128, p. 1344, 1899.

quadrangulaire de ses papilles principales ainsi que par son corps grêle et allongé. Il a du reste des caractères propres qui permettent de ne pas le confondre avec cette dernière espèce : papilles principales primaires subcylindriques et d'ailleurs médiocrement élevées, papilles principales secondaires un peu moins nombreuses que les précédentes et s'intercalant isolément entre elles, sillons de séparation des papilles bien moins distincts que dans l'espèce de Geay. Les papilles secondaires ont des dimensions variables, mais sont toujours assez grandes et parfois même ne se distinguent pas des papilles principales. Le plus souvent, elles sont beaucoup plus longues que larges et se présentent alors sous la forme d'une saillie conique dont la base s'allonge en rectangle; sur cette base s'élèvent, dans quelques cas fort rares, une ou deux papilles accessoires, de sorte que le rectangle intercalaire rappelle un peu les groupements rectangulaires de papilles qu'on observe dans le *P. imthurmi* Scl. Le nombre des pattes est aussi réduit que dans les exemplaires de cette dernière espèce les moins bien doués sous ce rapport : il est de 27 paires dans l'un des exemplaires femelles qui m'ont été soumis et de 28 dans l'autre ⁽¹⁾. Ce nombre peut s'élever à 31 paires dans le *P. imthurmi*; il est de 31 paires dans le *P. brasiliensis*, de 32 paires dans le *P. Geayi* et de 31 ou 32 paires dans le *P. Simoni*.

Je désignerai cette espèce sous le nom de *P. Ohausi*, n. sp., en l'honneur de notre excellent confrère, M. le Dr Ohaus, qui l'a capturée.

La découverte du *P. Ohausi* nous permet de constater combien est homogène le groupe des Péripates caraïbes et combien sont étroites les affinités des espèces, déjà nombreuses, qui le représentent. Ces affinités subissent, du reste, des modifications progressives, qui paraissent être, pour la plupart, sous la dépendance étroite de l'aire géographique; c'est ainsi que le *P. Ohausi* se rapproche surtout des espèces américaines les plus voisines. Le groupe des Péripates andicoles n'est pas moins homogène; pourtant il s'est modifié plus vite quand changeaient les latitudes et, dans les régions septentrionales du Chili, se trouve déjà représenté, d'après M. Silvestri (*Zool. Anz.*, 1899), par des *Peripatoides*, c'est-à-dire par des formes que l'on avait crues jusqu'ici localisées en Nouvelle-Zélande. Pour trouver des modifications analogues dans le groupe des Péripates caraïbes, il faut quitter l'Amérique et atteindre l'Afrique occidentale. Au Congo, en effet, le genre

(1) Ces deux exemplaires ont sensiblement 43 mill. de longueur, 4 de largeur et 3 d'épaisseur; leurs utérus paraissent vides, mais leurs réceptacles séminaux sont blancs et probablement remplis de spermatozoïdes.

Peripatus est représenté par une curieuse espèce, le *P. Tholloni* Bouv., qui se rapproche des *Péripates* caraïbes par la grande majorité de ses caractères, mais qui n'est pas sans présenter aussi quelques affinités avec les *Peripatopsis* de l'Afrique australe.

Pour terminer cette rapide revue du groupe, j'ajouterai que ces derniers, au moins par leur mode de développement, se rapprochent des *Paraperipatus*, de la Nouvelle-Bretagne. Si la plupart d'entre eux (*P. capensis* Grube, *P. Balfouri* Sedgw.) se font remarquer par l'uniformité du développement de leurs embryons et par la nutrition purement ectodermique de ces derniers, j'ai pu me convaincre que les femelles de plusieurs *Peripatopsis* renferment dans leur intérieur des embryons diversement développés et que, dans le *P. Sedgwicki* Purc., ces embryons, à un certain stade, présentent dans la partie antérieure de leur région dorsale une vésicule embryonnaire qui ressemble, abstraction faite des dimensions, à l'énorme vésicule trophique signalée par M. Willey dans le *Paraperipatus Novae-Britanniae* Willey. J'ajouterai que M. Purcell a signalé des embryons à divers stades dans l'*Opisthopatus cinctipes* Purc., du Natal, et que j'ai pu vérifier cette observation sur des femelles appartenant à une variété de cette dernière espèce.

Bulletin bibliographique.

- Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances)*, 1900, I, 4-6. — ☉
Annales des Sciences naturelles, IV, 1825. — L. DUFOUR : Recherches anatomiques sur les Carabiques et sur plusieurs autres Coléoptères (suite). — Recherches anatomiques sur l'Hippobosque des Chevaux. — J. HAYENBACH : Description du *Mormolyce*, nouveau genre d'Insecte dans l'ordre des Coléoptères.
- Annals and Magazine of Natural History (The)*, février 1900. — Miss G. RICARDO : Notes on the *Pangoninae* of the Family *Tabanidae* in the British Museum Collection. — A. GOLDSBOROUGH MAYER : On the Mating Instinct in Moths. — C. NORMAN : British Amphipoda : Fam. *Lysianassidae* (pl.). — G. LEWIS : On new Species of *Histeridae* and Notices of others. — E. BORDAGE : On the Absence of Regeneration in the posterior Limbs of the Orthoptera Saltatoria and its probable Causes. — Regeneration of the Tarsus and of the two anterior Pairs of Limbs in the Orthoptera Saltatoria.

Archives provinciales des Sciences, II, 2, 1899. ☉

Association française pour l'Avancement des Sciences, Bulletin de l'AFAS, janvier, 1900. ☉

Canadian Entomologist (The), XXXII, 1, 1900. — Note on *Danaïa Archippus* Fabr. — A. HEMPEL : Descriptions of three new Species of *Coccidae* from Brazil. — A.-R. GROTE : The Neuration of *Argynnis*. — G.-B. KING : Bibliography of Massachusetts *Coccidae*. Supplementary to Contributions to the Knowledge of Massachusetts *Coccidae*. — G.-D. HULST : A new Genus and Species of *Phycitinae*. — T.-W. FYLES : *Metzneria lappella* L. — A curious Life-History. — H.-G. DYAR : *Bombyx cunea* Dr. — C.-P. LOUNSBURY : Insect Bites and the Effects thereof. — J.-L. HANCOCK : Notes on Species of the Tettigian Group of Orthoptera. — M.-V. SLINGERLAND : A new popular Name for *Clisiocampa disstria*. — A.-G. REHN : *Melanoplus differentialis* in N. Jersey and Pennsylvania.

Entomologisk Tidskrift, 1899, I-IV. — S. LAMPA : Berättelse till K. Landbruksstyrelsen verksamheten vid statens entomologiska anstalt, dess tjänstemans resor m. m. under år 1899 (fig.). — E. REUTER : En ny konkurrent till applevecklaren. — E. HAGLUND : Några af herr ingenior P. Dusen i Chili och Argentina insamlade *Hemiptera*. — C. GRILL : *Tomicus dispar* Fabr. — S. LAMPA : Nunnan (*Lymantria monacha* L.) (pl.). — Utdrag ur assistenten vid Statens Entomologiska Anstalt, d. r. YNGVE SJÖSTEDTS berättelse till Landbruksstyrelsen rörande en resa i Nordamerikas Förenta Stater och Canada 1898 (fig.). — I. TRAGARDH : Ett bidrag till Kännedomen om djurlifvet ute på skären. — G. LAGERHEIM : Beiträge zur Kenntniss der Zooecidien des Wachholders (*Juniperus communis* L.) (pl. et fig.). — En Svanpepidemi på bladlöss sommaren 1896. — A. BERGMAN : Om oestriderna och deras ekonomiska betydelse (pl.). — Y. SJÖSTEDT : Eine neue Termite aus Ostafrika. — J. MEVES : Svensk litteratur om Skogsunnan. — S. LAMPA : Ytterligare rörande den svenska nunnelitteraturen. — A. TULLGREN : Bidrag till kännedomen om Sveriges pseudoscorpioner (pl.). — E. WAHLGREN : Beitrag zur kenntniss der Collēmbola. — Fauna der äusseren Schären. — F. TRYBOM : Blåsfotingar (*Physapoder*) från gallbildningar på blad af asp. — N. HOLMGREN : Zur Kenntniss der Begattungstasche der Elateriden, zugleich ein Beitrag der Systematik dieser Familie. — J. MEVES : Lepidopterologiska Notiser. — Försök med ägg och unga Larver af Nunnan (*Lymantria monacha* L.). — S. LAMPA : Insekt-samlingerna vid statens Entomologiska anstalt. — H.-G. DYAR : A

Note on African Limacodidae. — C. AURIVILLIUS : Diagnosen neuer Lepidopteren aus Afrika (fig.). — Neuer oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia (fig.). — F. TRYBOM : Bläsfotingar (Physapoder) såsom skadedjur på sockerärter. — Y. SJÖSTEDT : Vorläufige Diagnosen einiger afrikanischen Termiten. — C. AURIVILLIUS : Om parasiterna hos *Lymantria Monacha* L. — I.-B. ERICSON : För Skandinavien nya Coleoptera. — A. BERGMAN : Undersökningar afsjuka larver till Löfskogsnuuna (*Ocneria dispar* L.). — E. STRAND : Et lidet bidrag til Norges entomologiske Fauna. — *Notiophilus laticollis* Chd. i Norge. — A.-C. ULLMANN : Norske fund af Coleoptera. — Notes diverses.

Entomologische Nachrichten, XXVI, 2-3, 1900. — G. BREDDIN : Hemiptera nonnulla regionis australicae (fig.).

Entomologist (The), février 1900. — G.-W. KIRKALDY : On the Nomenclature of the Genera of the Rhynchota, Heteroptera and Auchemorrhynchous Homoptera. — W.-F. DE VISMES KANE : A Catalogue of the Lepidoptera of Ireland. — A.-F. ROSA : A List of Butterflies observed in Switzerland in July, 1899. — H.-S.-T. FREMLIN : Collecting in the Isle of Lewis. — E.-G.-J. SPARKE : Notes on some Tuddenham Lepidoptera. — T.-D.-A. COCKERELL : What is the proper Name of *Lophyrus* Latr.? — W.-J. LUCAS : British Dragonflies of the older english Authors. — Notes diverses.

Entomologist's monthly Magazine (The), février 1900. — W. FLEMING : *Colias edusa* in Ireland in 1899. — P.-T. LATHY : On a new Form of *Agrias Sardanapalus* Bates. — J.-H. WOOD : On the Larvae, Habits and Structure of *Lithocolletis concomitella* Banks, and its nearest Allies. — T.-A. CHAPMAN : On *Proutia salicolella* (auct.) = *aricanella* Bruand. — J.-G. NEEDHAM : How to rear Nymphs of Dragonflies, etc. — F.-D. MORICE : *Tenthredopsis Thornleyi* Konow, a new Saw Fly (British). — Notes diverses.

Exploration scientifique de la Tunisie, Paris, 1899. ☉

Feuille des Jeunes Naturalistes (La), 352, 1900. — M. PIC : Contribution à l'étude des *Notoxus* (Coléoptères) d'Europe et des régions avoisinantes. — G. DE ROCQUIGNY-ADANSON : Mœurs et habitudes des Lépidoptères. — Notes spéciales et locales.

Fourth International Congress of Zoology, Cambridge 22-27 august 1898. Londres 1899. — M.-C. PIEPERS : On the Evolution of colour in Lepidoptera. — E. BORDAGE : Expériences sur la relation qui existe entre la couleur du milieu et la couleur des Chrysalides

de certains Lépidoptères. — Dr D. SHARP : Some Points in the Classification of Insecta Hexapoda. — A. DOLLFUSS : Sur la distribution géographique des Isopodes terrestres dans l'Afrique septentrionale, du Sénégal à Obock. — CH. JANET : Contribution morphologique de la tête de l'Insecte. — E. OLIVIER : Les Lampyrides des Antilles. — E.-L. BOUVIER : Sur les caractères externes des Péripates. — DIVERS : Réponses aux questions proposées par M. G. HAMPSON sur la « Nomenclature of Lepidoptera ».

Frelon (Le), VIII, 4, 1900 (2 exempl.). — J. DESBROCHERS DES LOGES : Faunule des Coléoptères de la France et de la Corse : *Anthicidae*. — M. PIC : Notes diverses sur les coléoptères.

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, V, 3, 1900. — Dr C.-H. VÖGLER : Beiträge zur Metamorphose der *Teichomyza fusca* (fig.). — L. v. AIGNER-ABAFI : *Acherontia atropos* L. IV, Schädlichkeit. — H.-J. KOLBE : Die Atmung des *Hydrophilus*. — Notes diverses.

K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (*Verhandlungen*), 1899, X. — A. HANDLIRSCH : Wie viele Stigmen haben die Rhynchoten? (fig.). — Dr F. SPAETH : Uebersicht der paläarktischen Arten des Genus *Notiophilus* Duméril. — Dr H. REBEL : Ueber einige heimische Arten der Gattung *Elachista* Tr. — L. GANGLBAUER : Ueber einige, zum Theil neue mitteleuropäische Coleopteren.

Naturaliste (Le), 304, 1899. — 310, 1900. — M. PIC : Des accidents entomologiques. — THÉRY : Description d'un Coléoptère nouveau.

New Zealand Institute (Transactions and Proceedings), XXXI, 1899. — A.-P. BULLER : On the Appearance of *Anosia bolina* in the Wellington District. — F.-W. HUTTON : Supplement to the *Stenopelmaticidae* of N. Zealand. — Notes on the N. Zealand *Acrididae* (pl.). — Revision of the N. Zealand *Phasmidae*. — A.-T. POTTER : On the Habits of *Dermestes vulpinus*. — C.-O. LILLIE : On the N. Zealand *Ephemeridae* : Two Species. — G.-M. THOMSON : A Revision of the *Crustacea Anomoura* of N. Zealand (pl.). — Synonymy of the N. Zealand *Orchestidae*. — F.-W. HUTTON : The *Neuroptera* of N. Zealand.

Psyche, IX, 286, 1900. — A.-G. MAYERS : On the Mating instinct in Moths. — Entomology for the Young. — H.-G. DYAR : Life histories of North American Geometridae, X. — G.-B. KING : The fifth Species of Kermes from Massachusetts (fig.). — Notes diverses.

R. Accademia dei Lincei (Atti), 1900, I, 1 et 2. ⊙

Revista Chilena de Historia natural, III, 10 et 11 (1899). — F. SILVESTRI : Contribucion al estudio de los Quilópodos Chilenos.

Revue éclectique d'Apiculture, VII, 2, 1900, 2 exempl. — Note entomologique.

Rovartani Lapok, VI, 10, 1899; VII, 1, 1900. — Diverses notes en langue hongroise. — Listes d'Insectes de la Hongrie.

Royal Society (Proceedings), LXV, 423, titre et tables. — LXVI, 424, 1900. ⊙

Royal Society of South Australia. — 1^o *Memoirs*, I, 1, 1899. ⊙. — 2^o *Transactions*, XXIII, 1 et 2, 1899. — J. TEPPER : A List of the Libellulidae (Dragon-Flies) of Australasia. With Annotations on South Australia Species by M.-R. MARTIN. — A.-J. TURNER : Notes on Australian Lepidoptera. — REV. T. BLACKBURN : further Notes on Australian Coleoptera, with Descriptions of New Genera and Species, XXV. — A.-M. LEA : Descriptions of Australian Curculionidae, with Notes on previously described Species. — J.-G. TEPPER : Notes on and Description of the Male of *Coelostoma immane* (Maskell), and of a new Species of a Leaf-mining Moth.

Societas Entomologica, XIV, 21, 1900. — C. FRINGS : Ueber den Saison-Dimorphismus der im Rheinlande vorkommenden *Pieris*-Arten. — P. BORN : Meine Exkursion von 1899. — O. SCHULZ : *Cosmia paleacea* ab. Schultz. — Dr O. SCHMIEDEKNECHT : Zoologisch-botanische Gesellschafts-Reisen für das Jahr 1900.

Società Entomologica Italiana (Bullettino), XXXI, 1899. — P. LIONELLO : I muscoli delle ali nei Ditteri et negli Imonetteri (pl.). — E. FICALBI : Venti specie di Zanzare (*Culicidae*) italiane classate e descritte e indicate secondo la loro distribuzione orologica (fig.). — G. NOÉ : Contribuzione allo studio dei Culicidi (fig.). — C. EMERY : Formiche del Madagascar raccolte dal Sig. A. Mocquerys nei pressi della baia di Antongil 1897-98 (fig.). — S. BERTOLINI : Contribuzione alla Fauna trentina dei Coleotteri. — A. SENNA : Aggiunte alla Fauna brentidologica di Celebes.

Société des Sciences historiques et naturelles de Semur (Bulletin), 1898, 1899.

A. L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

CONGRÈS ANNUEL

Séance du 28 février 1900.

Présidence de M. A. GIARD.

MM. A. Argod, de Crest, — le capitaine F. de Beauchêne, de Vitré, — l'abbé G.-V. Berthoumieu, de Moulins, — J. Bourgeois, de Sainte-Marie-aux-Mines, — H. du Buysson, de Broût-Vernet, — A. Délugin, de Périgueux, — A. Fauvel, de Caen, — H. Gadeau de Kerville, de Rouen, — le capitaine Gruardet, de Montbard, — M. Nibelle, de Rouen, — M. Pic, de Digoïn, assistent à la séance.

— Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance précédente, le Président prononce l'allocution suivante :

Mes chers Collègues,

Je déclare ouverte la séance du dixième Congrès annuel de la Société entomologique de France et je vous remercie d'avoir, comme les années précédentes, répondu en si grand nombre à notre appel.

Je remercie particulièrement les membres de province qui sont venus, quelques-uns de très loin, pour assister à cette réunion solennelle et nous communiquer le résultat de leurs travaux. Qu'ils soient les bien accueillis parmi nous ! Nous sommes heureux de les voir à nos côtés et de leur dire une fois de plus en quelle estime nous les tenons et combien nous sommes fiers des services qu'ils rendent à l'Entomologie.

N'est-ce pas à leurs patients efforts que sont dues tant de recherches intéressantes sur la vie et les mœurs des insectes, recherches presque impossibles dans une grande ville et cependant si indispensables aux progrès de la biologie ? N'est-ce pas aussi grâce à eux, grâce aux notes fauniques accumulées chaque quinzaine dans nos *Bulletins*, que nous arrivons peu à peu à connaître les richesses entomologiques de notre belle France, à en dresser l'inventaire raisonné, à préparer pour nos

successeurs les matériaux d'une *Géographie entomologique française* qui restera longtemps encore parmi les *pia desiderata* de la science?

En attendant, chers Collègues, je ne saurais trop vous engager à consigner, dans des études locales, les résultats de vos observations et à ne pas garder pour vous seuls les découvertes que vous avez faites et qui risqueraient ainsi de disparaître avec vous. Le trésor de l'avare sert toujours à ses héritiers quels qu'ils soient; il n'en est malheureusement pas ainsi des faits qu'un entomologiste exerce, mais trop modeste ou trop négligent, amasse sans les publier. Que de précieux documents demeurent ainsi perdus, pour longtemps peut-être, et ne seront retrouvés qu'au prix de nouveaux efforts dont on eût pu attendre une autre utilisation!

Certes je ne me dissimule pas les inconvénients que peut offrir la publication des catalogues locaux. Il y a vingt-cinq ans, notre collègue A. Fauvel, avec la verve et la compétence que vous lui connaissez, les a magistralement exposés dans une lettre adressée au Secrétaire de la Société entomologique de Belgique, M. Preudhomme de Borre, lettre imprimée dans les *Comptes rendus* de cette société pour 1874 ⁽¹⁾.

Le principal écueil, c'est l'inexactitude de certaines déterminations délicates et rendues plus difficiles encore pour l'entomologiste qui travaille isolément, dans l'éloignement des grandes collections et des bibliothèques.

Les *dubia*, les *corrigenda*, les *delenda*, causent de grands tracas et d'énormes pertes de temps à ceux qui veulent utiliser plus tard ces données imparfaites.

Sans doute; mais dans l'impossibilité où nous sommes en notre courte vie de tout voir par nous-mêmes, force nous est bien de supporter ces ennuis pour en éviter de plus pénibles! Et puis ces difficultés vont en s'aplanissant de jour en jour. Les bons livres de détermination deviennent moins rares. M. Fauvel lui-même et M. Bedel ont largement contribué à rendre plus aisée la connaissance des Coléoptères de la Faune française. Le *Species* d'André et la « Monographie des Ichneumonides » de M. l'abbé Berthoumieu ont singulièrement facilité l'étude des Hyménoptères de France. Les relations entre entomologistes sont aussi plus faciles et plus fréquentes; l'école singulière de ceux qu'on a spirituellement appelés les *naturalistes cacheurs* tend à disparaître peu à peu et les observations plus ou moins consciemment ou involontairement inexactes sont bientôt rectifiées.

(1) FAUVEL (A.). Objections aux catalogues des Faunes locales. *C. R. des séances de la Soc. entomol. de Belgique*, t. XVII, 1874, p. LV et suiv.

Pour les Orthoptères, les excellents travaux de nos collègues Finot et Azam fournissent une base solide aux recherches ultérieures dans les régions encore mal connues. Enfin pour certains ordres d'insectes, tels que les Névroptères, les Diptères, etc., beaucoup trop négligés jusqu'à présent, tout ce qu'on nous apportera relativement à la faune d'une foule de points de la France sera nouveau et, s'il y a des erreurs commises, elles seront bien excusables et sûrement réparées tôt ou tard. Elles le seront d'autant plus aisément que les indications données seront plus nombreuses et plus complètes, et c'est pour cela que je préfère les faunules accompagnées de commentaires aux simples listes préconisées par M. Fauvel.

Je me déclare donc volontiers très partisan des catalogues locaux, à la condition que les auteurs consentent à accepter certaines règles, pas trop rigoureuses d'ailleurs, sans lesquelles les travaux de ce genre perdent une grande partie de leur valeur scientifique.

La première est évidemment de définir avec précision le territoire exploré, et si ce territoire est une division administrative ou politique (arrondissement, département, province, etc.), d'indiquer nettement les régions naturelles en lesquelles il se décompose et la distribution des espèces dans chacune de ces régions. Faut de tenir compte de cette règle, certains catalogues locaux présentent une absence d'homogénéité déplorable. Tels sont les catalogues entomologiques du département du Nord lorsqu'on n'en distrait pas l'arrondissement d'Avesnes qui, au point de vue de la géographie zoologique, appartient presque exclusivement à la *province rhénomane*.

Une tendance mauvaise et malheureusement trop générale des auteurs de faunes locales, est de vouloir enrichir à l'excès la région qu'ils ont étudiée en y signalant des insectes dont la capture ne peut être que tout à fait accidentelle, sans faire ressortir justement ce que de pareilles trouvailles ont d'insolite et souvent même d'artificiel⁽¹⁾. Outre qu'il est bien plus important d'être renseigné sur les formes qui caractérisent essentiellement la faune du territoire considéré, le désir exa-

(1) Ces trouvailles insolites, lorsqu'elles sont bien et dûment constatées, et quand l'insecte se maintient pendant plusieurs années dans son habitat exceptionnel, peuvent avoir un intérêt considérable et mériter une étude attentive. Je citerai, comme exemple, la capture de *Syntomis phegea* L., en Belgique. Cette rare espèce subalpine, signalée dès 1837 par M. de Selys-Longchamps, se trouvait assez communément en 1874 et se prend peut-être encore aujourd'hui sur les remparts de Louvain. S'il y a eu introduction artificielle, la permanence de la race en cette localité est très remarquable, et il serait bien curieux de connaître l'origine de cette colonie dans une station aussi inattendue.

géré d'être complet, et parfois plus que complet, entraîne pour l'avenir de sérieux inconvénients. Car s'il est relativement facile de combler une lacune ou de réparer une omission, c'est une tâche des plus ingrate que de réclamer la radiation d'une espèce insérée à tort dans une faune locale. On peut toujours objecter à celui qui entreprend cette besogne *négative* qu'il n'a pas été aussi heureux ou aussi habile que son prédécesseur. Il faut souvent de nombreuses années pour qu'on accepte sa rectification et encore peut-il parfois rester le doute que l'espèce en question a bien existé là où elle a été signalée, mais qu'elle a disparu depuis.

Au lieu de chercher ainsi de faux enrichissements de la faune d'une province, mieux vaudrait pour le progrès de la science réunir dans ces œuvres régionales de nouveaux renseignements sur les mœurs des animaux observés, sur leurs époques d'apparition, sur les états larvaires et leur développement.

A cet égard, les catalogues locaux sont souvent d'une pénurie regrettable ou, ce qui est plus fâcheux encore, les auteurs se copient les uns les autres sans se contrôler, donnant ainsi une plus grande dissémination et une plus grande autorité à de vieilles erreurs, ou transformant en erreurs des observations exactes quand, par exemple, un entomologiste du Nord de la France emprunte à un entomologiste du Midi les dates d'apparition d'une espèce, l'indication des plantes nourricières, etc.

Je me rappelle avec quel étonnement j'ai lu, bien jeune encore, dans des catalogues de Lépidoptères de notre France septentrionale, que les chenilles des vulgaires *Colias hyale* L. et *Colias Edusa* L., que celle du rare *Hesperia comma* L. vivaient sur la *Coronilla varia* L., plante tout à fait étrangère au Nord de la France et à la Belgique.

Bien des auteurs de catalogues locaux persistent à faire vivre sur *Heliotropium europaeum* L. la chenille de *Dejopeia pulchella* L., alors que depuis longtemps notre collègue P. Mabille et d'autres observateurs ont signalé que dans le Nord de son habitat, là où l'Héliotrope devient rare, cette chenille, d'ailleurs très modifiée, vit surtout sur *Echium vulgare* et sur *Myosotis arvensis*.

Il y aurait quelque cruauté à rappeler aussi l'insuffisance de certains renseignements donnés par les compilateurs, ceux, par exemple, qui attribuent comme nourriture à divers insectes les *plantes basses* ou les *arbres de nos forêts*. Un bon entomologiste doit être quelque peu doublé d'un botaniste et il est curieux de voir combien des hommes qui attachent à juste titre une grande importance à la désignation exacte des espèces, variétés et sous-variétés, quand il s'agit d'un Coléoptère

ou d'un Papillon, se contentent facilement de mots aussi vagues que la Violette, le Plantain, la Scabieuse, etc., lorsqu'ils parlent du végétal dont ces insectes tirent leur nourriture.

Des observations personnelles et précises vaudront toujours mieux que de superficielles compilations. Une seule pierre bien taillée dure plus qu'un vaste édifice en carton-plâtre.

Mais je m'empresse, Messieurs, de terminer cette causerie. Notre ordre du jour est très chargé et j'ai hâte de donner la parole à tous ceux d'entre vous qui ont à nous exposer les fruits de leurs recherches. Si j'ai cru devoir vous présenter ces quelques réflexions, c'est que nous avons trop rarement l'occasion de nous trouver tous réunis et de pouvoir aborder en commun des sujets de discussion générale. Comme le faisait justement remarquer un de mes prédécesseurs dans ce fauteuil, le regretté E. Ragonot, le grand avantage de nos sessions extraordinaires est non seulement de fournir à nos Collègues de province l'occasion d'apporter ici leurs matériaux d'études et de consulter les riches collections de la capitale, mais aussi de leurs permettre de s'entretenir avec leurs collègues de Paris et de s'initier à leurs travaux. C'est par ces échanges d'idées que nous trouvons tous les moyens d'augmenter nos connaissances et que nous acquérons des forces nouvelles pour travailler avec plus d'ardeur au développement de notre belle science entomologique.

Correspondance. — MM. J. Anglas et Ed. Lamy remercient la Société de leur admission.

— M. le Dr A. Fumouze, Trésorier honoraire, et M. le professeur Valéry Mayet, de Montpellier, s'excusent de ne pouvoir assister à la séance du Congrès.

Nécrologie. — Le Président a le regret de faire part à la Société de la mort de M. Louis Favarcq, de Saint-Étienne. — L. Favarcq faisait partie de la Société entomologique de France depuis 1892 seulement, il s'occupait de l'étude des Coléoptères.

Démission. — M. Emile Lucet, de Rouen, adresse au Président sa démission de membre de la Société.

Annales. — Le Secrétaire dépose sur le bureau le 3^e trimestre des *Annales* de 1899.

Admissions. — M. Alphonse Lavallée, licencié ès Sciences naturelles, 47, rue de Naples, Paris; et château de Segrez, par Boissy-sous-Saint-Yon (Seine-et-Oise). *Entomologie générale, Lépidoptères.*

— M. Louis Loviot, 3, avenue Vélasquez, Paris. *Coléoptères, Lépidoptères*.

— M. L. Semichon, licencié ès Sciences naturelles, élève à l'Institut agronomique, 27, rue Cassette, Paris. *Entomologie générale*.

— M. Raymond Peschet, 1, rue Baulant, Paris. *Coléoptères*.

— Le laboratoire de Zoologie de la Faculté des Sciences de Rennes (Prof. L. Joubin, directeur).

Présentations. — M. Léon-C. Cosmovici, professeur de Zoologie et de Physiologie à l'Université, 11, strada Codrescu, Jassy (Roumanie) [*Entomologie générale, Lépidoptères*], présenté par M. A. Giard. — Commissaires-rapporteurs MM. E.-L. Bouvier et G.-A. Poujade.

— M. le Dr M. Jaquet, conservateur au Musée national, 71, strada Coltei, Bucarest (Roumanie) [*Entomologie générale, Tératologie*], présenté par M. A. Giard. — Commissaires-rapporteurs MM. Ph. Grouvelle et J. de Joannis.

Budget. — Au nom du Conseil de la Société qui s'est réuni le 19 février 1900 pour examiner le détail des comptes de l'exercice 1899 présenté par M. le Dr A. Fumouze, Trésorier honoraire, M. H. Desbordes donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

Nous avons l'honneur, au nom du Conseil de la Société, de vous soumettre les quelques observations que nous a suggérées l'examen des comptes produits pour l'exercice 1899 par notre honorable collègue, M. le Dr Fumouze, dont la gestion comme Trésorier a pris fin au 31 décembre dernier.

Au point de vue de la régularité matérielle, nous n'avons pas de critiques à formuler. Le rapporteur des comptes de 1898 avait, vous vous en souvenez, présenté quelques réserves au sujet du emploi des exonérations; nous n'avons pas à en reproduire de semblables cette année, et nous constatons au contraire qu'alors que le chapitre des recettes contient un article de 1.800 francs représentant six exonérations, celui des dépenses accuse l'achat de quatre obligations Ouest anciennes, pour une somme totale de 1.807 fr. 65. Les autres articles, tant de recettes que de dépenses, correspondent soit à des encaissements réellement effectués, soit à des dépenses dûment justifiées.

L'article « Cotisations » ne se monte qu'à 6.980 francs, contre 7.369 francs en 1898. Cet écart de 600 francs environ a pour cause, non pas tant une diminution du nombre des membres de la Société,

qu'une moins grande régularité, de la part de certains, à s'acquitter de leur redevance annuelle. Nous signalons tout spécialement ce relâchement à notre nouveau Trésorier, et nous comptons sur son dévouement pour faire pénétrer dans l'esprit des retardataires ces deux vérités, bien faciles semble-t-il à s'assimiler, d'une part, que la Société ne peut publier sans argent, d'autre part, qu'en entrant dans son sein, on contracte un engagement annuel et qu'il y a convenance à le tenir.

Sous le bénéfice de cette observation, nous vous proposons de donner décharge de ses comptes à notre ancien Trésorier, et de le remercier d'avoir bien voulu remplir, pendant nombre d'années, la charge souvent lourde, et en tout cas fort ingrate, de tenir notre caisse et d'administrer notre avoir.

Après avoir examiné la gestion de notre honorable Collègue, nous profiterons, si vous le voulez bien, de cette circonstance, pour analyser rapidement la situation financière de la Société, telle qu'elle résulte des comptes dont il s'agit.

L'exercice 1899 semble, au premier abord, se solder par un excédent assez important, atteignant le chiffre de 737 fr. 20. Nous devons vous avertir que cet excédent n'est qu'apparent; l'article « frais d'impression » ne comprend en effet que la dépense de trois fascicules d'*Annales* (4^e trimestre de 1898, 1^{er} et 2^e trimestres de 1899), alors que les recettes de chaque exercice doivent réglementairement pourvoir à la publication de quatre fascicules. Il faudrait donc, pour que la situation fût entièrement satisfaisante, que le solde créditeur de l'exercice dépassât ou au moins atteignît les frais de publication du fascicule d'*Annales* qui paraîtra prochainement et complètera le volume à imputer sur l'exercice 1899. Or, le montant de cette dépense ne sera guère inférieur à 1.000 francs, et le reliquat disponible n'étant que de 737 fr. 20, ce n'est plus par un excédent, mais bien par un déficit de près de 300 francs, que semble devoir se liquider l'année 1899.

Nous avons heureusement un moyen de parer à cette situation. Le compte spécial de *L'Abeille*, que tenait également M. le Dr Fumouze, présente, tous frais payés, au 31 décembre 1899, un solde encaisse de 621 fr. 25 qui provient des économies réalisées depuis plusieurs années. La publication, qui semble pouvoir se suffire avec ses propres ressources, n'a pas besoin de cette somme pour continuer à paraître régulièrement, et rien n'empêche, par suite, de l'incorporer aux recettes générales de la Société pour 1899, ce qui suffira, et bien au delà, pour acquitter la note que nous présentera l'imprimeur pour le prochain fascicule d'*Annales*.

Votre Conseil, Messieurs, reconnaît que c'est là un expédient, et

qu'on ne pourrait, les années subséquentes, compter sur une semblable source de revenus. Aussi est-il bien décidé à chercher ailleurs, pour le prochain exercice, soit des recettes nouvelles, soit des économies. Dans cet ordre d'idées, il se propose de tenir plus rigoureusement la main à l'application des articles du règlement qui restreignent à une page l'étendue des communications qui peuvent être insérées au *Bulletin*, et à douze par an le nombre des descriptions d'espèces nouvelles que peut donner chaque Sociétaire. Ces limites ont été fréquemment dépassées, et le résultat a été de donner au *Bulletin* une ampleur à laquelle correspond un très sensible accroissement de dépense. Nous comptons réaliser de ce chef quelques économies dans l'avenir, et si notre Trésorier, plus heureux que son prédécesseur, obtient des retardataires, trop nombreux hélas! qu'ils se mettent en règle vis-à-vis de la caisse, il n'est pas douteux que l'exercice 1900 se soldera régulièrement, c'est-à-dire avec la seule aide de ses ressources normales. Nous vous prions, Messieurs, de vouloir bien, en approuvant le principe des mesures auxquelles, dans ce but, nous nous proposons de recourir, nous donner l'autorité nécessaire pour en poursuivre l'exécution.

Proposition de revision du Règlement. — M. Ch. Alluaud donne lecture de la proposition suivante qu'il dépose sur le bureau :

Monsieur le Président,

Par suite du développement qu'a pris notre Société pendant ces dernières années, grâce à l'accroissement progressif et continu du nombre de nos membres, grâce aussi à la disjonction des Annales et du Bulletin qui a donné à nos publications une extension considérable, un certain nombre des articles de notre Règlement ne sont plus en rapport avec cette situation nouvelle. Les uns sont tombés à juste titre en désuétude et devraient être supprimés, d'autres au contraire demanderaient à être modifiés et appliqués avec plus de rigueur.

Je viens donc vous demander, conformément à l'article 34 des Statuts, de vouloir bien proposer à la Société de prendre en considération la nécessité qu'il y aurait à procéder à une revision de notre Règlement.

Charles Alluaud.

La Société renvoie la proposition de M. Ch. Alluaud à son conseil qui lui présentera un rapport dans une prochaine séance.

Congrès des Sociétés savantes. — Le Président annonce à la Société que le CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES s'ouvrira, à la Sorbonne,

le mardi 5 juin prochain, à 2 heures précises. Ses travaux se poursuivront dans les journées des mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juin.

Le samedi 9 juin, M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts présidera la séance générale de clôture, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne.

Captures et observations biologiques. — M. L. Bleuse signale la capture de *Bruchus* (*Cyphoderes*) *japonicus* Reitt., à Rennes.

Cette espèce, décrite du Japon et trouvée ensuite en Sibérie, avait été rencontrée une fois, accidentellement, à Paris. M. Bleuse l'a prise, le 25 mai, en battant des sarments de Vigne remisés, depuis plusieurs années, dans une maisonnette d'un jardin. Il capturait dans les mêmes conditions, en abondance, *Niptus crenatus* Fabr., *Hedobia imperialis* L., *Pentarthrum Huttoni* Woll., *Caulotrupis aeneopictus* Boh., etc.

— M. A. Lèveillé fait passer sous les yeux de la Société, de la part de M. L. Bleuse, un cadre contenant de remarquables aberrations de Lépidoptères. Ces formes aberrantes, disposées à côté d'exemplaires typiques de chaque espèce, appartiennent aux genres *Polyommatus*, *Lycæna*, *Melitæa*, *Epinephele*, *Macaria*, *Argynnis*, *Euchelia* et *Deiopeia*.

Changement d'adresse. — M. A. Lécaillon, préparateur de la chaire d'Embryogénie comparée du Collège de France, 73 bis, rue

Communications

Description d'une nouvelle espèce d'Hyménoptère

(*Eupelmus Xamboui*)

Par Alfred GIARD.

Eupelmus Xamboui, nov. sp. (fam. Chalcid.). — *Eupelmus violaceo-niger*, fronte, scapo antennarum, pleuris femoribusque nigro-aeneis; tibiis nigris; tarsis basi albescentibus; terebra longitudine dimidium corporis superante, fusca, albo-annulata; alis nullis. — (Femina).

Long. 4,3 mill. (sans la tarière); tarière 2,5 mill. — Couleur noir violacé avec des reflets vert bronzé sur le front, le scape des antennes, les côtés du thorax, la base de l'abdomen et les pattes.

Tête plus large que le thorax, à aspect velouté, d'un beau violacé; les joues à reflets verts. Yeux grands, ovales, devenant noirs après la mort. Antennes insérées sur l'épistome, laissant entre leurs bases un espace égal à la distance qui les sépare des yeux, à articulations peu nettes. Scape plus long que le vertex, légèrement courbe (les convexités des deux scapes se touchant en formant un X). Flagellum égalant le double du scape et comprenant 10 articles. Pédicelle obconique, plus court que l'article suivant, les articles 2-7 cylindriques, allant en décroissant lentement; le 8^e article formant une massue (triarticulée) excavée à sa partie supérieure.

Prothorax cordiforme, rétréci en avant. Mésonotum présentant une déclivité antérieure et une postérieure; la déclivité antérieure creusée d'un sillon qui se continue sur le prothorax, la postérieure rapide, tronquée, plus courte, remplaçant l'écusson. Lames pleurales bien développées, convexes, à reflets cuivreux.

Abdomen de la longueur du thorax, sessile, trigone, lisse. Base du premier segment bronzée. Ventre caréné. Tarière à valves brunes, pâles dans la partie moyenne. Pattes assez robustes, noires; tarses blancs excepté à leur extrémité qui est noire. Ailes nulles.

Cette nouvelle espèce est parasite de la larve de *Gynandrophthalma nigratarsis* Lac. (1).

On la trouve dans les environs de Ria (Pyrénées-Orientales) où elle est peu répandue. Je la dédie à notre collègue M. le capitaine Xamheu qui me l'a communiquée.

L'*Eupelmus annulatus* Nees, parasite de *Cryptocephalus 12-punctatus*, est ailé dans le sexe femelle.

Description d'un Orthoptère nouveau de France

Par J. AZAM.

Arcyptera Khelli, n. sp. (2). — *Corpus crassiusculum, postice angustatum, colore flavo, castaneo-variegato.*

Caput magnum; foveolis verticis contiguis impressis, distincte delineatis. Antennae fuscae, basi testaceae, in ♂ capite pronotoque simul sumptis aequales, in ♀ breviores.

Pronotum supra planum, glabrum, margine postico obtuso-angulato,

(1) Voir XAMHEU. Mœurs et métamorphoses des insectes, 10^e mémoire, Lyon, 1899, p. 36.

(2) J'ai signalé cet insecte, sous le nom de *Arc. brevipennis* Brunner, dans le Bulletin de la Société, 1898, page 370.

antico recto; carinis lateralibus vix expressis, rugoso-punctatis, inter sulcis transversis subextinctis, lineolis (in ♀ latis, pallidis; in ♂ angustis, sulfureis) indicatis, in prozona angulatim incurvis, pone sulcū typicū divergentibus; lobis deflexis rugosis, macula magna pallida signatis.

Elytra in utroque sexu abbreviata (in ♂ oblongo-ovata, in ♀ breviora, acuminata), castanea, maculis fuscis duabusque vittis pallidis ornata.

Area mediastina medio valde ampliata, in ♂ ad medium, in ♀ ultra medium marginis anticae extensa. Area scapularis opaca in ♀, opaca usque ad medium dehinc hyalina in ♂. Area discoïdalis angusta; vena ulnaris anterior flexuosa. Area ulnaris lanceolata.

Alae hyalinae, brevissimae, subabortivae.

Femora tibiaeque posticae in modum « *Arc. fuscum* » coloratae, exceptis tamen lobis genicularibus in utroque sexu et condylo ♀ pallidis.

Abdomen flavum, supra vittis obliquis fuscis signatum in ♀; sulfureum, supra maculis stramineis et griseo-sulfureis marmoratum in ♂.

Lamina supra-analis ♂ sulco basale longitudinali impressa.

	♂	♀
Long. corporis	22 — 25 mill.	30 — 37 mill.
— antenn.	8 »	8 — 9 »
— pron.	5 »	6 — 7 »
— elytr.	10 — 12 »	9 — 10 »
— all.	4 — 5 »	6 »
— fem. post.	14 »	17 — 18 »

De taille moyenne, les mâles bien plus petits que les femelles, la coloration de cette espèce est à peu près la même que celle des autres *Arcyptera*. Sa tête est grande, ornée sur l'occiput de deux lignes noires, courbées, placées derrière les yeux, comme chez l'*Arc. fuscum*. Le vertex possède souvent à son apex une petite carène longitudinale très courte; les fovéoles temporales contiguës, imprimées, ont leurs bords bien tranchés; le front est plus ou moins foncé; la côte frontale, où se trouvent des points imprimés, espacés les uns des autres, comme sur le restant de la face, est convexe ou plane au-dessus de l'ocelle et presque oblitérée en dessous, chez le ♂ seulement elle est sillonnée un peu avant et après l'ocelle. Les antennes, brunes à base claire, sont de la longueur de la tête et du pronotum réunis chez le ♂ et plus longues chez la ♀.

Le pronotum, vert foncé, plan, glabre, a son bord postérieur à angle

obtus (bordé de clair chez la ♀) et son bord antérieur droit et concolore. Sa carène médiane est aiguë, de la couleur du pronotum ou parfois, mais rarement, entourée d'une ligne claire chez la ♀. Les carènes latérales sont rugueuses, peu saillantes, surtout marquées par des lignes larges et d'un blanc sale chez la ♀, étroites et jaune soufre à l'état frais, parfois brunes à l'état sec chez le ♂, presque oblitérées entre les sillons transverses; dans la prozone elles sont anguleusement recourbées et après le sillon typique bien divergentes. Les lobes réfléchis sont rugueux et ornés d'une grande tache claire touchant leurs bords antérieur et inférieur et allant jusqu'au sillon typique.

Les élytres sont abrégées dans les deux sexes, ovales allongées chez le ♂, plus courtes et acuminiées à l'apex chez la ♀, de couleur châtain, ornées de taches brunes à la base et de deux lignes claires : l'une recouvrant le champ scapulaire et semblant prolonger jusqu'à l'extrémité de l'élytre la ligne claire qui recouvre les carènes latérales du pronotum, l'autre située dans le champ anal, touchant la nervure anale. Leurs nervures sont noires de la base au milieu; le reste en est châtain, excepté toutefois la nervure anale qui est très claire. Le champ médiastin, bien renflé en son milieu, atteint chez le ♂ le milieu du bord antérieur de l'élytre et le dépasse chez la ♀; on y remarque une nervure adventive. Le champ scapulaire, plus étroit, est clair chez le ♂, opaque de la base à l'extrémité du champ médiastin, ensuite hyalin et fenêtré par des nervules parallèles; entièrement opaque chez la ♀. Les nervures radiales, très rapprochées à la base, sans pourtant se confondre, sont divergentes après leur milieu, plus chez le ♂ que chez la ♀. Le champ discoidal est étroit et la nervure ulnaire antérieure bien flexueuse. Le champ ulnaire est en forme de fer de lance et les nervures ulnaire postérieure et anale sont parallèles et presque droites. La nervure axillaire n'atteignant jamais l'apex de l'élytre est plus ou moins courte. Le champ anal est assez élargi et possède une nervure adventive.

Les ailes, hyalines, très courtes, presque avortées, ont des nervures apparentes.

Les fémurs et les tibias postérieurs sont colorés comme ceux de l'*Arc. fuscum*, si ce n'est les lobes des genoux des deux sexes et les condyles des femelles qui sont marron clair au lieu d'être noirs.

La poitrine, large, est d'un jaune gris chez la ♀ et d'un jaune soufre chez le ♂.

L'abdomen, de même couleur, est marqué en dessus, de chaque côté, chez la ♀, de lignes obliques plus foncées et chez le ♂ de taches, les unes d'un jaune paille et les autres d'un jaune gris.

La plaque sur-anale ♂ est enfumée et possède un sillon longitudinal à la base.

L'Arc. *Kheili* prend place à côté de l'Arc. *labiatum* Brullé, dont elle se rapproche surtout par les carènes latérales du pronotum et les organes du vol. Elle en diffère pourtant par son pronotum non gibbeux et le sillon longitudinal qui orne la base de la plaque sur-anale des mâles.

On trouve cette espèce sur tout le versant nord de la montagne de Lachens; mais on la rencontre avec plus d'abondance sur un petit plateau de 50 mètres de longueur sur 25 de largeur, appelé *Clot du mûrchal*, situé au-dessus du village de La Bastide, à 1.360^m d'altitude. J'ai dédié cette espèce à mon ami Napoléon Kheil, de Prague, qui vient depuis plusieurs années chasser dans le Var.

Descriptions de Coléoptères

recueillis par M. H. Perrier de la Bâthie à Madagascar

Par L. FAIRMAIRE.

Siagona hovana, n. sp. — Long. 12 mill. — Oblonga, picea, nitida, subtus cum ore, antennis pelibusque rufescentibus, glabra; capite prothorace vix angustiore, convexiusculo, sat grosse punctato, medio laxe, lateribus densius et fere rugose, utrinque acute carinato, mandibulis validis, fortiter arcuatis, antennis sat gracilibus, corporis medium superantibus, articulo 1^o rugosulo-punctato, articulo 2^o tertio parum brevior; prothorace transverso, postice valde angustato, antice fere recte truncato, angulis paulo et obtuse prominulis, dorso sat grosse modice punctato, disco longitudinaliter sat late depresso et medio stria tenui elevata signato, utrinque fortiter sulcato, intervallis elevatis; elytris ovato-oblongis, sat fortiter et sat dense punctatis, intervallis leviter rugosulis, lateribus fortius, sutura sat elevata.

Environs de Suberbieville (H. Perrier).

Le genre *Siagona* n'a pas encore été signalé à Madagascar; cette nouvelle espèce est donc doublement intéressante. Elle n'a aucun rapport avec les *Siagona* de l'Afrique orientale, mais elle ressemble extrêmement à la *S. Gerardi*, d'Algérie, dont elle se distingue par la tête densément ponctuée sur les côtés, le corselet à sillon central plus fin, placé sur une ligne un peu saillante, et par les élytres moins atténuées en avant, à épaules moins effacées, à ponctuation plus serrée avec les intervalles moins rugueux et la suture saillante. Elle ressemble aussi

beaucoup à l'*europaea* qui se retrouve en Égypte, elle en diffère par la tête moins ponctuée au milieu, le 2^e article des antennes à peine plus court que le 3^e, le sillon externe du corselet non effacé au milieu et les élytres plus oblongues, un peu atténuées à la base, à ponctuation plus fine, plus serrée, les intervalles rugueux.

Tetragonoderus Perrieri, n. sp. — Long. 8 mill. — *Late ovatus, parum convexus, dilute fulvus, vix nitidulus, elytris punctis piceis aliquot tessellatis et macula fumata utrinque ad scutellum depressa; capite prothoraceque vix rufescentibus, magis nitidulis, hoc transverso, brevi, elytris angustiore, antice et postice aequaliter angustato, lateribus leviter rotundato, basi utrinque late, antice minute impresso, dorso medio striato, angulis omnibus obtusis; elytris amplis, lateribus arcuatis, apice oblique truncatulis, modice striatis, striis 2 marginalibus tenuibus, tenuiter piceo-punctatis, striis laevibus, basi breviter piceo-lineolatis, intervallis planis, laevibus, genibus paulo rufescentibus.*

Environs de Suberbieville (H. Perrier).

Ressemble beaucoup au *T. Toamasinae* Alluaud, mais plus grand, d'un fauve plus roussâtre, avec la tête et le corselet unicolores, ce dernier n'ayant qu'une strie au milieu et de faibles impressions, les côtés bien moins arrondis avec les angles postérieurs plus obtus, les élytres sont plus amples, plus obliquement tronquées à l'extrémité et les taches dont elles sont parsemées sont très petites; ce sont plutôt des points régulièrement placés et formant 3 lignes transversales très dentelées.

Pygora chamaeleon, n. sp. — Long. 10 1/2 à 12 mill. — *Oblonga, crassa, dorso planiuscula, postice leviter attenuata, nigra, nitida, elytris utrinque post medium maculis 2 oblique dispositis et 2 apicalibus albis, interdum basi plaga magna rufa, medium haud superante, prothoracis margine laterali sat anguste albido-tomentoso, pygidio picescente, interdum albo-bimaculato, abdomine lateribus albo-maculato; capite ruguloso-punctato, margine antico medio vix sensim sinuato; prothorace transverso, elytris valde angustiore, lateribus cum angulis posticis rotundato, antice angustiore, subtiliter laxè punctulato, spatio medio longitudinali laevi, margine postico ad scutellum vix sinuato; scutello fere laevi, subovato; elytris ad humeros valde productis et declivibus, fortiter sinuatis, sutura et utrinque costis 2 elevatis, basi oblitteratis, apice conjunctis, intervallo 1^o depresso, striolato, externo angusto, punctato, angulo suturali rotundato; subtus cum femoribus tibiisque fulvo-villosa, tibiis tarsisque rufopiceis. — ♂ Angustior, abdomine medio fortiter impresso, utrinque maculis albis biserialis, pygidio*

nigro. — ♀ *Magis ampla*, abdomine lateribus uniseriatim maculato, pygidio et abdominis apice piceo-rufescentibus.

Environs de Suberbieville (H. Perrier).

Ressemble à *P. conjuncta* pour la coloration, mais moins longue, surtout pour le corselet qui est court, arrondi sur les côtés et aux angles postérieurs; le chaperon est entier au bord antérieur qui est indistinctement sinué, les pattes sont plus courtes, plus robustes, et les antérieures faiblement tridentées dans les 2 sexes.

Acmaeodera Perrieri, n. sp. — Long. 4 1/2 à 7 mill. — *Oblonga, convexa, antice et postice aequaliter angustata, fusculo-aenea, sat nitida, capite prothoraceque subtiliter puberulis, elytris flavo-fulvis, plaga magna dorsali magis fuscula, basin obtegente, medio strangulata, ante apicem transversim interrupta, apice flavo, varius fusculo-signato; capite antice planiusculo, dense subtiliter punctulato-rugosulo, medio obsolete sulcatulo; prothorace transverso, brevi, antice a medio angustato, postice plus minusve ampliato, dorso subtiliter dense ruguloso-punctato, medio sulcatulo, basi, disco et antice utrinque foveolato, elytris oblongis, apice sat abrupte angustatis, haud serrulatis, sat subtiliter punctulato-striatulis, sutura et intervallis 3^o, 5^o 9^{que} magis elevatis, apice costatis, nono basi et postice magis; subtus aeneolo-cuprescens, subtiliter punctata et pubescens, abdomine lateribus maculis minutis griseis ornato.*

Environs de Suberbieville (H. Perrier).

Cette jolie espèce rappelle, en très petit, certaines *Stigmodera* d'Australie. Le ♂ est plus grand avec les côtés du corselet un peu anguleusement dilatés et les nervures des élytres, surtout l'interne, très sail-lantes.

***Myiodola*, n. gen.**

Les deux insectes ci-après, quoique ressemblant sous beaucoup de rapports aux *Anthrribola* et aux *Sagridola*, en diffèrent notablement par un corps grêle ainsi que les pattes et les antennes, l'armature des fémurs bien faible, celle des tibias nulle, et les élytres déhiscentes dès ou presque dès la base; leur bord externe est longuement sinué, de sorte que leur partie postérieure est très étroite, en forme de languette, presque tronquée ou obtusément arrondie à l'extrémité. La *Sagridola Scalabrii* Fairm. rentre dans ce genre, auquel se rattacheraient aussi les *S. spinicrus* Fairm. et *flavicollis* Waterh.; mais ces dernières sont plus massives, les élytres ne sont pas déhiscentes dès la base, leurs pattes sont un peu plus robustes, plus fortement armées.

M. Perrieri, n. sp. — Long. 11 à 13 mill. — *Elongata*, capite nigro, utrinque sulphureo vittato, antice rufescente, prothorace tomentoso-sulphureo, utrinque disco vitta lata nigra, antice abbreviata, scutello sulphureo, elytris rufo-castaneis, margine laterali postice et sutura infuscatis, subtus cum femoribus flavido-rufa, abdomine dense albido-pubescente, anguste fusco-annulato, pectore nigro, dense tomentoso-sulphureo, utrinque plaga denudata nigra, prothoracis lateribus macula simili minore signatis, antennis, tibiis tarsisque infuscatis; capite antice elongato, rostriformi, oculis oblongo-ovatis; prothorace oblongo, antice a medio attenuato, basi vix ampliato, lateribus medio obtusissime angulatis; scutello oblongo, fere concavo; elytris basi prothorace latioribus, mox angustatis, apice obtuse truncatis, paulo dehiscentibus, abdomine brevioribus; femoribus sat latis, 4 posticis subtus dente minuto acuto armatis. — ♂ Minor, elytris fere a medio dehiscentibus.

Environs de Suberbieville (H. Perrier).

Voisine de la *Scalabrii*, mais plus petite, d'une coloration bien différente, avec le corselet plus court, non rétréci avant la base, la tête plus prolongée en museau, les élytres beaucoup moins rétrécies en arrière et bien moins déhiscentes.

M. muscaria, n. sp. — Long. 7 à 8 1/2 mill. — Forme et coloration de la *M. Scalabrii* Fairm., mais notablement plus petite; d'un brun noir avec une bande blanc de neige sur le milieu du corselet et sur l'écusson, la tête a aussi une ligne blanche en dedans des yeux, une tache de même couleur sur le chaperon; le corselet est plus court, les côtés ne sont pas sinués avant la base, les flancs ont une tache blanche en avant et une autre en arrière, le milieu du prosternum a une tache triangulaire blanche; les élytres sont presque semblables, mais déhiscentes dès la base, tandis que chez l'autre espèce la suture est droite à la base, le bord interne étant sinué ensuite et le reste de l'élytre plus étroit; il y a aussi, chez la *muscaria*, un petit trait brun séparé sur la tranche externe, très court, au lieu d'être prolongé jusqu'à l'épaule; l'écusson est plus court; enfin le dessous de l'abdomen a les 2 premiers segments couverts de pulvérulence blanche, sauf sur le bord apical, au lieu d'une pubescence grise qui couvre tout le dessous, la poitrine a de grandes taches blanches latérales au lieu d'un simple trait et les côtés de l'abdomen ont des taches blanches presque carrées au lieu d'être oblongues; les fémurs sont entièrement fauves, même les postérieurs, glabres en dessous, les dents fémorales sont plus pe-

tites, plus fines, et les tibias ♂ ont, au milieu interne, un petit éperon bien saillant en angle droit.

Environs de Suberbieville (H. Perrier).

Damiria, n. gen.

Genre de Cérambycide voisin des *Listroptera* américains dont il offre le faciès. La tête est assez courte, le front plan, les antennes grêles ne dépassent pas les élytres chez le ♂, et sont un peu plus courtes chez la ♀, le 3^e article n'est pas plus court que le 4^e, le 5^e est plus long que le précédent, les autres diminuent un peu de longueur; le corselet est plus long que large, plus étroit à la base que les élytres, dilaté anguleusement presque au milieu, très inégal en dessus, les élytres sont allongées, parallèles, arrondies à l'extrémité, planes, avec une côte longitudinale en dehors, les épaules saillantes en avant; le prosternum et surtout le mésosternum sont assez larges entre les hanches, l'abdomen est atténué à l'extrémité, le 1^{er} segment plus long que le 2^e; les pattes sont grêles, même les fémurs, et assez longues, les 4 tibias postérieurs sont légèrement ondulés.

D. Perrieri, n. sp. — Long. 12 à 15 mill. — *Sat elongata, elytris plamatis, supra subopaca, fusca, prothorace rubro; capite alutaceo; prothorace basi et antice aequaliter angustato, multiimpresso, utrinque paulo acute angulato; scutello semirotondo; elytris fere parallelis, apice abrupte rotundatis, dorso sat fortiter dense punctatis, extus obtuse costatis, postice leviter dehiscentibus; subtus valde nitida, mesosternum rufo, pedibus gracilibus, elongatis; ♂ minor, nitidior; ♀ major, opacula.*

Environs de Suberbieville (H. Perrier).

Cassidopsis Perrieri, n. sp. — Long. 6 à 8 mill. — Forme de la *basipennis* Fairm., mais plus ovale, moins élargie au milieu, un peu moins convexe et d'une coloration très différente, d'un brun foncé faiblement bleuâtre, brillant, avec des taches élytrales d'un jaune roux, très éclatantes chez l'insecte vivant; le corselet est d'un jaune roux avec une tache antéro-discoïdale et deux taches basilaires triangulaires d'un brun foncé, ces 3 taches se réunissant parfois transversalement; il est plus rétréci en avant et le lobe médian de la base est plus prolongé; l'écusson est jaune roux; les élytres ont chacune 6 taches d'un jaune roux assez grandes, et une étroite bordure marginale de même couleur; elles sont couvertes d'une ponctuation excessivement fine, la strie suturale est marquée en arrière; le dessous du

corps et les pattes sont d'un jaune roux, les antennes sont brunes avec la base roussâtre, la tête est plus ou moins maculée de brun.

Environs de Suberbieville (H. Perrier).

Quelques individus sont entièrement d'un jaune roux avec une étroite ligne suturale et les 3 taches du corselet brunes; ce sont probablement des ♀.

Description d'une nouvelle espèce de Microlépidoptère de France

Par P. CHRÉTIEN.

Presque simultanément, notre collègue M. L. Viard, à Barcelonnette, et moi-même, à la Grave, nous avons pris en juin et juillet derniers plusieurs exemplaires, ♂ et ♀, d'une espèce de Microlépidoptère très intéressante et nouvelle.

Par sa nervulation, cette espèce semble appartenir au genre *Cerostoma*; mais elle s'en différencie par des caractères très importants qu'il convient de mettre en relief par la création d'un sous-genre tout au moins.

Phrealcia, nov. subg.

Antennes ciliées, rapprochées à la base, à article basilaire renflé; ocelles nuls; palpes *très courts et pendants*, 2^e article légèrement poilu, 3^e article épais et conique, palpes maxillaires nuls; tête hérissée de poils. Ailes antérieures un peu lancéolées, non creusées sous l'apex, à cellule supplémentaire, cellule discoïdale divisée; 12 nervures *toutes libres*: 1^a bouclée à la base et 1^b dans l'aire dorsale, 2 à 7 aboutissant au bord externe, 8 à 12 à la côte. Ailes inférieures à cellule discoïdale non divisée; 8 nervures: 1^a, 1^b et 1^c dans l'aire anale, 3 et 4 très rapprochées à leur origine, 6 et 7 longuement tigées.

Se distingue donc du genre *Cerostoma* surtout par ses palpes; tous nos *Cerostoma* ont les palpes érigés et à dernier article long et pointu en forme d'aiguillon.

P. brevipalpella, n. sp.

Enverg. 19-20 mill. — ♂ Ailes antérieures grises, parsemées d'écailles brunes, sans lignes ni dessins, ayant quelquefois un point noirâtre dans le pli avant le milieu de l'aile; frange grise, précédée d'une série de petites taches brun noirâtre et divisée par une ligne brun foncé. Ailes inférieures gris soyeux, à frange concolore, divisée près de la base

par une ligne brunâtre. Antennes grises, annelées de noirâtre; tête, palpes, thorax et abdomen gris.

♀ Ailes antérieures blanches, parsemées d'écaillés brunes avec un point noirâtre comme chez le ♂, une bande médiane brune, vague, interrompue au disque, trois taches ou litures brunes près de l'apex, une série terminale de litures brun foncé avant la frange; cette dernière largement entrecoupée de blanc et de noirâtre. Ailes inférieures semblables à celles du ♂. Antennes blanches annelées de noirâtre; tête, palpes et thorax blancs, abdomen gris.

Hautes et Basses-Alpes; 3 ♂, 2 ♀. — Vole en juin et juillet.

Malgré les affinités qu'elle paraît avoir avec les deux premiers groupes de *Cerostoma*, puisque la forme de ses ailes supérieures est très voisine de celle des *C. vittellum* L. et *sequellum* Cl. et que sa nervulation et celle de *C. lucellum* F. sont identiques, cette nouvelle espèce ne saurait être rangée ni dans l'un ni dans l'autre de ces groupes. Toutes ses nervures libres aux ailes supérieures l'éloignent du premier, et la forme et la frange des ailes supérieures l'excluent du second. En outre, ses antennes ciliées, ses palpes minuscules et tombants, sans parler de l'absence des palpes maxillaires et de la différence de coloration entre le ♂ et la ♀, obligent à la séparer de ces deux groupes comme de tous les autres *Cerostoma*.

Notes sur quelques *Malthinus* paléarctiques (SUITE) ⁽¹⁾ et description d'une espèce nouvelle [COL.]

Par J. BOURGEOIS.

8. *PROGEUTES TRIGIBBER* MARS. et CHABAUTI Bourg. — Ces deux espèces et probablement aussi *conspicuus* Kiesw., que je ne connais pas, mais qui est très proche voisin de *trigibber*, se distinguent des autres *Progeutes* par la forme des antennes (♂) dont les articles, à partir du quatrième inclusivement, sont sensiblement comprimés, assez larges, subcultriformes, tandis qu'ils sont grêles et presque cylindriques chez *longipennis*, *Abdelkader* et *sericellus*.

9. *MALTHINUS SCUTELLARIS* ROSENH. et *FILICORNIS* KIESW. — C'est à tort que Kiesenwetter (*Berl. ent. Zeits.*, 1866, p. 257) a rapporté le *scutellaris* au *flicornis*. Je possède un exemplaire typique de la première de ces deux espèces et j'ai pu m'assurer que de Marseille a parfait

(1) Voir *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 368.

tement fait ressortir, dans sa « Monographie des Malthinides », les différences qui la distinguent du *flicornis*. Malheureusement une erreur de composition a rendu la partie du tableau qui s'y réfère (p. 10) absolument incompréhensible, les mots « 14. *longipennis* Luc. Alg. » ayant été placés sur la 36^e ligne, à la suite du paragraphe E', tandis qu'ils auraient dû l'être sur la 34^e, à la suite du paragraphe F'.

10. — *MALTHINUS AXILLARIS* Kiesw. ♂ ♀. — Les deux sexes de cette espèce présentent d'assez notables différences. Chez le ♂, la coloration noire de la tête ne dépasse que très peu le bord postérieur des yeux et est coupée antérieurement en ligne droite; en même temps, le pronotum présente, de chaque côté, une large bande jaune orangé qui s'étend, en conservant à peu près la même largeur, du bord antérieur à la base. Chez la ♀, la coloration noire postérieure de la tête s'avance jusque vers le milieu du front et est fortement échancrée dans sa partie médiane; quant au pronotum, il n'est généralement que très étroitement bordé de jaune, surtout dans sa moitié antérieure et peut même devenir entièrement noir, à l'exception d'une petite tache flave aux angles postérieurs. En outre, dans ce même sexe, les élytres sont sensiblement plus longs et les tibias intermédiaires rembrunis dans leur première moitié, tandis qu'ils sont d'un flave uniforme chez le ♂. Il est bon de remarquer que la description de Kiesenwetter, reproduite par de Marseul, a été faite sur un exemplaire ♀.

11. *MALTHINUS RUBRICOLLIS* Baudi, *PYRRHODERUS* Fairm. et *SYRIACUS* Mars. — Deux de mes collègues ont répondu à ma demande de renseignements (voir *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 369) et je les en remercie sincèrement. M. L. von Heyden m'a communiqué deux exemplaires ♀, l'un de Caramanie, l'autre des environs d'Alep (Syrie), vus par de Marseul, et dont le premier porte l'étiquette « *syriacus* » de la main de cet auteur. De son côté, M. Pic m'en a adressé trois : le premier de Beyrouth, patrie d'origine du *syriacus*, le deuxième de Digoin (Saône-et-Loire), et le troisième de la Grande-Chartreuse, ces deux derniers étiquetés *rubricollis*.

Aucun de ces exemplaires, comparés soit entre eux soit avec mon *rubricollis* de Soos, soit avec le *pyrrhoderus* de Varna, qu'a bien voulu me confier M. Fairmaire, ne m'a présenté de différence ayant une valeur spécifique quelconque. Le prothorax peut, il est vrai, paraître plus ou moins arrondi à son bord antérieur et, par conséquent, plus ou moins allongé, mais cela dépend de l'angle sous lequel on l'examine. Vu perpendiculairement à sa surface, il apparaît toujours comme l'a

décrit Baudi. Je crois donc être en droit d'établir définitivement pour cette espèce la synonymie suivante :

MALTHINUS RUBRICOLLIS Baudi, *Berl. ent. Zeits.*, 1859, p. 297. — *syriacus* Mars., *Mon. Malth.*, in *L'Abeille*, XVI, 1878, p. 15. — *pyrrhoderus* Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. xxxiv.

Hab. : France mérid. ; Corse ; Tyrol ; Istrie ; Grèce ; Turquie : Varna ; Asie Mineure : Caramanie ; Syrie : Alep, Beyrouth.

Un caractère du *rubricollis* dont il n'a pas encore été fait mention, et que j'ai constaté dans tous les exemplaires qui m'ont passé sous les yeux, réside dans la forme particulière du dernier segment de l'abdomen chez la ♀. Ce segment est parcouru en dessous et dans toute sa longueur par une carène élevée, bifurquée postérieurement et flanquée de chaque côté d'une fossette profonde et arrondie.

12. MALTHINUS RAPHDICEPS Kiesw. — M. L. von Heyden a bien voulu me communiquer deux exemplaires ♀ de cette espèce provenant des chasses de Merkl en Turquie. Leur examen m'a confirmé dans ce que j'en avais dit au n° 5 de ces Notes (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 369) et m'a permis en outre de constater le bien-fondé de la remarque déjà faite par M. Weise sur des individus de même provenance, à savoir que le rebord interne des torulus est un peu plus élevé chez *raphidiceps* que chez les espèces affines, ce qui, joint à la coloration noire de ce rebord qui tranche sur le fond jaune de la partie antérieure de la tête, fait paraître le front, vu d'en haut, comme trisinué entre les yeux (cf. Weise, *Deuts. ent. Zeits.*, 1895, p. 214).

13. MALTHINUS DEVILLEI Ab. — Cette espèce, très bien caractérisée par M. Abeille de Perrin, m'avait déjà été communiquée par M. Villard, qui l'avait récoltée à Saint-Martin-Vésubie. J'avoue l'avoir confondue avec *frontalis*. Les derniers segments abdominaux (♂) sont bien comme les a décrits M. Abeille de Perrin, mais le dernier n'étant pas béant dans mon exemplaire, je n'ai pu apercevoir le style fourchu collé à la face interne de sa valve inférieure, dont parle notre collègue (*L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 92).

14. MALTHINUS IMPRESSICOLLIS Fairm., dont j'ai le type sous les yeux, est très voisin d'*inflavus* Mars., et n'en diffère guère que par une plus grande extension de la coloration noire sur la tête et les pattes. Tandis que chez *inflavus* la partie noire postérieure de la tête est entaillée d'une large tache triangulaire d'un rouge testacé, dont la pointe atteint presque l'occiput, chez *impressicollis*, cette tache se réduit à une échancrure interoculaire subarrondie qui, généralement,

se prolonge peu en arrière; en outre, les tempes ne sont pas tachées de roux comme chez *inflavus*, et les pattes postérieures sont entièrement brunes, à l'exception des genoux. A tous les autres points de vue les deux formes sont identiques; aussi suis-je d'avis de ne considérer *impressicollis* que comme variété d'*inflavus*, d'autant plus que j'ai vu des individus formant passage de l'un à l'autre.

15. Le groupe des petits *Malthinus* d'un flave unicolore, à élytres rehaussés d'une tache soufre à l'extrémité, comprend jusqu'à présent, et par ordre de date, les espèces suivantes : *vitellinus* Kiesw. (1865), d'Espagne; *sordidus* Kiesw. (1871), de Toscane; *lacteifrons* Mars. (1878), d'Algérie et de Sicile; *pallicolor* Fairm. (1883), d'Algérie; *Novaki* Reitt. (1889), des côtes de Dalmatie; *tortiscelis* Pic (1898), d'Algérie.

Les *M. vitellinus* et *pallicolor* se distinguent immédiatement des autres espèces par leurs élytres à ponctuation confuse, sans séries régulières de gros points enfoncés. On les séparera facilement par la forme du prothorax qui, chez *vitellinus*, est assez large, sensiblement transverse et rétréci en avant à partir du milieu, tandis qu'il est étroit, plus long que large et à côtés subparallèles chez *pallicolor*. En outre, chez ce dernier, les élytres sont plus courts et à ponctuation plus fine et plus uniforme.

Parmi les espèces à élytres sérialelement ponctués, les *sordidus* et *tortiscelis* ont les tibias postérieurs (♂) sinués dans leur milieu et un peu élargis vers l'extrémité, alors qu'ils sont simples dans les deux sexes chez *lacteifrons*. Quant à *Novaki*, il semble, par sa description, ne différer que très peu de *sordidus*.

16. *Malthinus varus*, sp. nov. — *Elongatus, parallelus, parum nitidus, pallide flavus, capite postice nigro, nigredine antice inter oculos trisinuata; antennis brunneis, articulis duobus basalibus subtus flavidis, secundo tertio aequali; prothorace sat angusto, longitudine basi aequali, a medio inde apicem versus paulum attenuato, medio nigro, lateraliter late, antice posticeque angustissime flavo-marginato; scutello fusco-nigro; elytris parum profunde punctato-striatis, basi, lateribus interdum maculaque ante-apicali nigro-fuscis, apice sulphureo-guttatis.* — ♂ Tibiis posticis pone medium sinuatis introrsumque curvatis. — Long. 3 1/2 mill.

Allongé, parallèle. Tête assez large, subconvexe, curvilinéairement rétrécie derrière les yeux qui sont assez gros et saillants, très finement alutacée et d'un noir presque mat sur sa partie postérieure, d'un blanc à peine jaunâtre en avant, la coloration noire s'avancant

jusqu'au milieu du front, trisinuée à son bord antérieur, avec l'échancre médiane arrondie, un peu plus profonde que les deux latérales; antennes assez robustes, dépassant à peine la moitié du corps (♀), un peu plus longues (♂), brunâtres, avec les deux premiers articles d'un jaune pâle, souvent un peu obscurcis en dessus, le premier très allongé, un peu épaissi et légèrement courbé vers l'extrémité, 2^e égal au 3^e. Pronotum à peu près aussi long que large à la base, sensiblement plus étroit dans son milieu que la tête y compris les yeux, coupé droit en avant, légèrement arqué en arrière à son bord postérieur, un peu rétréci en avant à partir du milieu, subparallèle postérieurement avec les angles un peu tournés en dehors, visiblement rebordé sur tout son pourtour, creusé dans toute sa longueur d'un sillon assez profond, peu distinctement et éparsément pointillé, paraissant finement alutacé à un fort grossissement, glabre, presque mat, noir ou d'un brun noirâtre dans son milieu, largement bordé de chaque côté de jaune très pâle, avec le bord antérieur et la base lisérés de même. Écusson d'un noir brunâtre. Élytres sensiblement plus larges que le pronotum à la base, parallèles, deux fois et demie environ aussi longs que larges, marqués de lignes de points peu profonds, confuses postérieurement, peu brillants, légèrement pubescents, d'un gris jaunâtre, avec le bord basilaire, les bords latéraux en partie et une grande tache anté-apicale d'un brun plus ou moins foncé, parés à l'extrémité d'une tache d'un jaune soufré vil. Dessous du corps et pattes d'un testacé pâle; partie postérieure de la tête noire jusqu'aux yeux; milieu des segments abdominaux, moitié apicale des cuisses postérieures, majeure partie des tibias et tarses de la même-paire rembrunis. — ♂ Tibias postérieurs assez fortement sinués et coudés intérieurement en arrière du milieu; dernier arceau ventral de l'abdomen subtriangulairement entaillé à l'extrémité.

Algérie: mont Edough, près Bône (Leprieur, Bedel). — Collection Bedel et la mienne.

Voisin du *nigribuccis* Mars., mais de forme plus allongée, et distinct en outre par l'épistome concolore, le prothorax plus étroit, les élytres à lignes ponctuées moins marquées, les pattes de la deuxième paire entièrement flaves, la forme des tibias postérieurs chez le ♂, etc.

Il ressemble aussi beaucoup au *dryocoetes* Rottenb., de Sicile; mais le prothorax est plus étroit et plus allongé, les élytres sont plus longs, bordés de noir à la base et parfois sur les côtés, les tibias sont plus profondément sinués intérieurement chez le ♂, etc.

Obs. — En décrivant le *M. delicatulus* (Bull. Soc. ent. Fr., 1899,

p. 370), j'ai omis de faire mention de la tache jaune pâle qui termine les élytres. Bien que cette tache ne soit pas très apparente, elle n'en existe pas moins et doit être signalée.

Recherches sur la structure et le développement postembryonnaire de l'ovaire des Insectes. — 1^o *Culex pipiens* L.

Par A. LÉCAILLON.

L'étude du développement embryonnaire des Insectes montre que, chez ces animaux, les cellules sexuelles, les *gonades*, se séparent de très bonne heure des cellules somatiques et semblent être toujours de nature ectodermique. Elles se groupent bientôt en deux petites masses pleines s'entourant chacune d'une enveloppe formée de cellules mésodermiques aplaties. Souvent ces deux petites masses ne se modifient plus, au moins dans leur structure intime, et restent telles quelles jusqu'à la fin du développement embryonnaire; ce sont les rudiments ou ébauches des organes génitaux.

Je me suis surtout proposé, dans les recherches dont je commence aujourd'hui à publier les premiers résultats, de suivre l'évolution de l'organe femelle depuis cet état d'ébauche jusqu'au moment où il a atteint sa maturité. J'ai limité mes observations à peu près exclusivement à la partie essentielle de l'ovaire, c'est-à-dire aux cellules sexuelles elles-mêmes, et j'ai laissé de côté les parties accessoires de l'organe femelle ainsi que ses conduits vecteurs.

La question ainsi comprise, bien qu'étant évidemment un des points les plus importants de l'histoire des Insectes, n'a pas encore été traitée, jusqu'ici, d'une manière satisfaisante. Les auteurs décrivent généralement les ovaires des Insectes comme constitués par un nombre variable de gaines ovariques dans chacune desquelles sont placés, les uns à la suite des autres, des œufs à divers états de développement. A ces œufs seraient jointes, dans beaucoup de cas, des cellules vitellogènes intervenant plus ou moins directement dans la formation du vitellus nutritif.

Effectivement, il en est ainsi la plupart du temps. Mais si l'on observe méthodiquement les divers groupes d'Insectes, et dans chacun de ces groupes un nombre suffisant d'espèces, on ne tarde pas à se convaincre que le schéma classique souffre de nombreuses exceptions. Souvent, par exemple, soit chez des types inférieurs de la classe, soit chez des espèces appartenant aux ordres les plus différenciés, chaque ovaire, pris

peu avant le moment de la ponte, est formé non pas de gaines ovariées, mais d'une simple poche contenant les œufs. Cette dernière disposition est manifestement plus simple que l'autre ; mais on ne comprend pas très bien, *a priori*, pourquoi elle existe à la fois dans des types inférieurs et dans des espèces très élevées. A moins qu'il ne s'agisse là que d'un caractère de convergence et que, partis d'un point commun (les ébauches des organes génitaux étant identiques), les ovaires mûrs ne soient arrivés à avoir des structures très analogues qu'après avoir évolué dans des directions très différentes ? Il est de toute évidence que l'étude du développement postembryonnaire de l'ovaire peut seule résoudre cette question.

Sans vouloir entrer maintenant dans d'autres considérations qui seront mieux placées après la description des faits qui se passent chez les divers types, j'ajouterai encore, cependant, que les questions qui se rapportent aux cellules vitellogènes n'ont pas été non plus, jusqu'ici, nettement résolues : L'œuf étant, dans tous les cas normaux, très abondamment pourvu de réserves nutritives, on peut penser que l'existence des cellules vitellogènes doit être probablement universelle. Mais, sur ce point encore, de nouvelles recherches sont nécessaires, et l'étude du développement postembryonnaire de l'ovaire doit permettre de résoudre définitivement le problème.

Je résumerai très brièvement, dans la suite de cette communication, les principaux faits que j'ai observés chez le Cousin ; j'envisagerai successivement :

- 1° L'ovaire à l'état de maturité ;
- 2° L'ovaire à l'état d'ébauche ;
- 3° Les modifications qui surviennent quand l'ovaire passe de l'état d'ébauche à l'état de maturité.

1° Ovaire à l'état de maturité.

Chaque ovaire a la forme d'un sac allongé s'étendant sur la plus grande partie de la longueur de l'abdomen. En avant, le sac se rétrécit un peu et se termine par une extrémité arrondie. En arrière, il se rétrécit de nouveau et se transforme insensiblement en un oviducte qui va s'unir à l'oviducte adjacent pour former avec lui un court conduit commun.

Les deux ovaires sont serrés l'un contre l'autre suivant le plan de symétrie du corps, de sorte que, de ce côté, leur surface est aplatie, tandis qu'elle est arrondie partout ailleurs. La masse formée par les deux ovaires occupe presque toute la cavité du corps qui se trouve

ainsi distendue, tandis que la place occupée par les autres organes est réduite au minimum. La section transversale de cette masse est à peu près de forme circulaire.

La paroi de chaque poche ovarienne est formée par une simple membrane très mince. A l'intérieur sont placés les œufs qui, bien que libres à ce moment, ne sont pas disposés au hasard. Ils ont gardé, par suite de la pression qu'ils exercent réciproquement les uns sur les autres, la position qu'ils avaient pendant les stades plus jeunes. Ils sont disposés en files longitudinales s'étendant sur toute la longueur de l'ovaire. Dans chaque file, chaque œuf a une extrémité appliquée contre la paroi ovarienne et l'autre extrémité dirigée vers l'intérieur de la poche. En outre, chacun d'eux est placé obliquement sur l'axe de l'ovaire, de manière que l'extrémité située contre la paroi de ce dernier soit plus antérieure que l'autre.

Comme l'a décrit et figuré Réaumur, l'œuf a à peu près la forme d'un cigare dont le gros bout serait surmonté d'un col court et évasé. J'ajouterai que cette région correspond à l'extrémité antérieure de l'œuf, tandis que la région pointue représente l'extrémité postérieure de ce dernier. Quand l'œuf est pondu, c'est son extrémité antérieure qui repose sur l'eau et, conformément à la loi de Hallez, c'est par là que sortira la larve.

L'œuf, comme chez les autres Insectes, est formé de protoplasma mélangé d'une quantité considérable de globules deutoplasmiques. Il possède une membrane vitelline bien différenciée, très visible et assez épaisse. Le chorion a une structure assez simple; il est formé de deux lames parallèles, peu épaisses, réunies l'une à l'autre par un nombre considérable de petits piliers cylindriques, dirigés perpendiculairement aux deux plaques, et de grosseur variable. Il y a une différence dans la nature chimique de la substance qui forme les piliers et celle qui forme les deux lames, car la première seule se colore très fortement par certains réactifs. Le col que l'œuf présente à son extrémité antérieure a la même structure que le chorion; c'est une expansion de ce dernier.

2° Ovaire à l'état d'ébauche.

Pendant toute la durée de la vie larvaire, les organes génitaux demeurent à l'état d'ébauche. Celle-ci consiste en deux petits massifs cellulaires situés dans le sixième anneau abdominal. Chaque massif est de forme ovoïde, a son plus grand axe dirigé suivant la longueur du corps et est constitué par un groupe de grosses cellules serrées les unes contre les autres de manière à prendre, par suite de pression

reciproque, des formes polyédriques. Autour de ces cellules, qui sont les cellules sexuelles proprement dites, les gonades, est une enveloppe peu épaisse, formée par des cellules très aplaties qui sont renflées seulement au niveau des noyaux. Cette enveloppe donne naissance à deux filaments grêles, sans cavité visible, qui partent, l'un de l'extrémité antérieure, l'autre de l'extrémité postérieure de chaque massif génital. Même dans les larves très jeunes, le filament postérieur tout au moins est toujours visible.

Sur les coupes transversales du corps, on peut voir que les deux petits massifs sexuels sont placés latéralement, l'un à droite, l'autre à gauche du tube digestif.

3^e Modifications que subit l'ovaire pendant la période de maturation.

L'évolution de l'ovaire, complètement arrêtée durant la vie larvaire, reprend au contraire activement pendant la période nymphale.

L'enveloppe de l'ébauche ovarienne s'agrandit à mesure que la masse de cellules qui y sont contenues augmente de volume; elle conserve toujours la forme d'un sac ovoïde qui croît à la fois en longueur et en largeur. Les cellules sexuelles, de leur côté, augmentent considérablement en nombre et bientôt commencent à se différencier dans des sens divers. Si on examine l'organe femelle à la fin de la nymphose, ou au moment où l'Insecte ailé vient de sortir de la nymphe, on lui trouve la structure suivante :

Chaque ovaire a la forme d'une masse allongée, s'étendant sur toute la longueur de la partie moyenne de l'abdomen. Dans l'axe de la masse, allant jusqu'à une faible distance de chacune de ses extrémités, se trouve une colonne creuse, dont la paroi est faite d'une seule assise de cellules à noyaux arrondis et serrées les unes contre les autres. De la surface entière de cette colonne, se détachent, dans un sens oblique, de nombreux pédoncules formés de cellules identiques à celles des parois de la colonne centrale. Chaque pédoncule porte, à son extrémité opposée à celle par laquelle il tient à la colonne, un renflement ovoïde volumineux, dans lequel on distingue une paroi formée de cellules aplaties, et une masse interne de grosses cellules pressées les unes contre les autres. Entre les pédoncules et les renflements ovoïdes sont de nombreuses trachées. Autour de l'ensemble formé par la colonne centrale, les pédoncules et les renflements ovoïdes, on trouve l'enveloppe agrandie de l'ébauche ovarienne primitive. Tout ce qui est à l'intérieur de cette enveloppe, à l'exception des trachées, provient de la différenciation des gonades ou des cellules qui en sont dérivées.

Pendant la période de la vie adulte qui s'étend jusqu'au moment de la ponte, l'évolution de l'ovaire s'achève. La paroi de l'ovaire mûr provient, en définitive, de la paroi ovarienne décrite précédemment. L'une des grosses cellules de chacun des renflements ovoïdes pédunculés devient un œuf qui accumule dans son intérieur des globules deutolécithiques et sécrète ensuite à sa surface une membrane vitelline. Les autres grosses cellules qui accompagnent la cellule œuf jouent le rôle de cellules vitellogènes; elles disparaissent vers la fin de la maturation de l'œuf. Les cellules aplaties qui forment la paroi de chaque renflement ovoïde constituent un follicule entourant l'œuf et les cellules vitellogènes; plus tard elles sécrètent le chorion de l'œuf. La colonne centrale et les pédoncules qui en partent persistent pendant un certain temps; mais, à mesure que la maturation s'avance, les cellules qui les forment se désagrègent et finissent par disparaître. Finalement, de toutes les cellules contenues dans l'intérieur du sac ovarien, les œufs seuls persistent : l'ovaire a atteint sa maturité.

Comme on vient de le voir, l'ovaire du Cousin a, au début et à la fin de son développement, une structure très simple; mais ce développement n'en est pas moins assez compliqué. Il faut noter surtout que parmi les cellules sexuelles proprement dites il y a une différenciation très accentuée. Certaines de ces cellules, seules, se transforment en œufs, alors que les autres ne jouent que des rôles accessoires. Il y a là une division du travail très accentuée et qui ne doit d'ailleurs pas surprendre, puisqu'il s'agit d'une forme animale très perfectionnée.

Sur les aberrations de l'*Agria Tau* L. [LÉP.]

Par Th. SEEBOLD.

1. — *ab.* FERENIGRA Th. Mg. = LUGENS Stål., Berl. Ent. Zeitschr., Bd. XXXII.

2. — *ab.* MELAINA Gross., *Iris*, 1897.

La *ferenigra* est caractérisée par un obscurcissement des bords (de la périphérie) des ailes; tandis que la *melaina* a les bords des ailes un peu plus clairs que le reste qui est d'un brun noir foncé.

Un mâle de cette dernière aberration a été trouvé *in copula* avec une femelle type dont la ponte donna 56 chrysalides d'où sortirent 11 mâles et 6 femelles de l'*ab. melaina*; le reste de l'éclosion était composé d'exemplaires typiques, sans aucune forme intermédiaire.

Les mâles noirs n'acceptèrent pas les femelles de la même couleur,

mais un mâle jaune (type) s'accoupla de suite avec une femelle noire.

Des 30 œufs obtenus de ce couple naquirent 13 chenilles dont deux chétives. Le reste des œufs n'était sans doute pas fécondé.

Cette aberration a été trouvée dans les forêts de Hêtres des Alpes de la Styrie, à partir du 15 avril jusqu'à la fin de mai, et jamais au-dessus de 800 mètres d'altitude. Elle est toujours d'une très grande rareté.

A propos de l'apparition tardive des Lampyres, en 1899, réponse à M. Gadeau de Kerville

Par S. JOURDAIN.

A la suite de l'observation de M. H. Gadeau de Kerville ⁽¹⁾, je tiens à bien préciser le sens de ma note sur *l'apparition tardive des Lampyres*.

J'en ai bien rencontré quelques-uns, à *Portbail et dans les environs*, au temps normal de leur apparition, mais celle-ci a atteint son maximum plus tard, à une époque où d'ordinaire ils ont disparu.

L'accouplement des Coléoptères

Par H. GADEAU DE KERVILLE.

Depuis quelques années, je me livre à l'étude de l'accouplement dans la série animale, et regrette que mes longs travaux fauniques et dendrologiques ne me laissent point plus de temps pour effectuer des observations et des expériences sur ce captivant sujet.

Dans cette étude, je ne m'occupe nullement de l'anatomie et de la physiologie des organes génitaux, ni de leurs produits, réservant mon attention à l'acte de l'accouplement et à ses préludes, sujet vaste néanmoins, étant donné qu'il comporte aussi la connaissance des conditions ambiantes dans lesquelles s'opère l'accouplement, des époques où il se fait, de sa durée, de la répétition de l'acte copulateur, etc.

Chez les Arthropodes, il existe une grande variété dans la manière dont se fait l'accouplement, et il faudrait de nombreuses pages pour en présenter un simple résumé, que, je l'espère, j'aurai l'honneur et le plaisir de communiquer par fractions à notre Société.

Bien que la question de l'accouplement des animaux constituant les différents groupes de l'embranchement des Arthropodes soit fort inté-

(1) *Bull. Fr.*, 1900, p. 29.

ressante, et que de nombreux renseignements à cet égard aient été insérés dans quantité de publications, cette question n'a pas jusqu'ici — du moins à ma connaissance — été traitée, avec les développements qu'elle comporte, dans des mémoires spéciaux. Peut-être un sentiment de pudeur ou la crainte de la raillerie ne sont-ils pas étrangers à cette lacune? Pourtant, l'impudeur n'existe plus où la science apparaît.

Plus tard, je parlerai en détail de l'accouplement des Coléoptères, et y joindrai une bibliographie aussi complète que possible. En ces lignes, je me borne à donner, sur l'accouplement de ces insectes, une brève généralisation, établie à l'aide des renseignements publiés et de mes observations personnelles.

On sait fort bien que dans la recherche des femelles en vue de l'accouplement, les Coléoptères mâles sont tout particulièrement guidés par leur odorat; mais la vue et l'ouïe ont aussi un rôle dans cette re-




Fig. 1.



Fig. 2.

cherche. Les mâles des espèces photogènes sont attirés par la lumière qu'émettent les femelles, de même que les mâles de certaines espèces le sont par les bruits spéciaux que les femelles produisent.

Chez le plus grand nombre des Coléoptères, l'accouplement a lieu le mâle étant monté sur le dos de la femelle. Le plus souvent, la partie antérieure du thorax du mâle est légèrement en arrière de la partie antérieure du thorax de la femelle, ou à sa hauteur. Les deux thorax sont, ou plus ou moins proches l'un de l'autre, ou plus ou moins distants, selon la forme plus ou moins plate ou plus ou moins convexe de la partie dorsale de la femelle. La figure 1, représentant l'accouplement du *Lytta optabilis* (Fald.) (gros 2 fois linéairement), et la figure 2, montrant l'accouplement de l'*Apion onopordi* (Kirby) (gros 5 fois linéairement) en sont des exemples. Il convient d'ajouter que la position du mâle sur la femelle dépend aussi des conditions de la pénétration du pénis dans l'appareil génital de cette dernière. Pendant la copulation, les pattes du mâle ont un rôle important, servant à le maintenir fixé sur le dos de la femelle. Les pattes antérieures et les

pattes intermédiaires, ou seulement les pattes antérieures, ont l'usage en question, les autres pattes demeurant libres, ou bien les six pattes servent au mâle à se tenir cramponné sur la femelle.

Chez les Coléoptères dont les pattes sont longues, les tarses et les ongles s'appliquent plus ou moins à la partie ventrale de la femelle. Mais chez les Coléoptères qui ont des pattes courtes, tels que, par exemple, les Coccinellidés, les ongles des tarses s'accrochent au bord externe des élytres, concourant ainsi, d'une manière efficace, à la solidité du mâle sur la femelle. Un exemple de ce fait est montré par la figure 3, qui représente l'accouplement de l'*Adonia variegata* (Goeze) grossi 4 fois linéairement.



Fig. 3.

Parmi les Coléoptères qui ont ce mode d'accouplement, de beaucoup le plus fréquent dans cet ordre d'insectes, les mâles d'un grand nombre d'espèces possèdent, soit aux tarses des pattes antérieures et intermédiaires, soit aux uns ou aux autres, des modifications, importantes ou plus ou moins légères, qui contribuent à maintenir l'équilibre du mâle sur la femelle. Ainsi, chez les *Dyticus*, les trois premiers articles des pattes antérieures des mâles sont dilatés et réunis, formant une palette garnie, en dessous, de nombreuses papilles et de deux cupules; en outre, les mêmes articles du tarse des pattes intermédiaires sont plus larges que les deux autres articles et garnis en dessous d'un tissu spongieux. Grâce à cette disposition, le Dytique mâle peut se tenir cramponné sur la femelle, qui, en nageant vigoureusement et avec brusquerie, cherche à se débarrasser de son cavalier. Chez la plupart des espèces de la famille des Carabidés, un ou plusieurs des premiers articles des tarses antérieurs ou des tarses intermédiaires des mâles sont dilatés et plus ou moins garnis, en dessous, de petites saillies servant à augmenter la solidité du mâle sur la femelle. Chez les *Cicindela* mâles, les trois premiers articles des tarses antérieurs sont plus larges que les deux autres et pourvus de broches à leur partie inférieure; etc.

Outre les pattes, il est possible que les antennes jouent aussi un rôle dans l'accouplement. En effet, il paraît que les antennes des Méloés mâles servent, pendant la copulation, à tenir les antennes de la femelle. Si ce fait est exact, il y a tout lieu de croire qu'il n'est pas spécial aux Méloés.

Le plus souvent, après quelques tentatives infructueuses dont le nombre dépend évidemment des conditions physiques et physiologiques dans lesquelles se trouvent les deux animaux accouplés, le mâle introduit son pénis dans l'appareil génital de la femelle, où il déverse le sperme, soit libre, soit agglutiné en spermatophores. Ces derniers, lorsqu'ils sont abondants, peuvent même déborder de l'appareil génital de la femelle et adhérer à la partie inféro-postérieure de son abdomen. Ce dernier fait s'observe chez les Dytiques.

Il est très important d'ajouter que l'appareil copulateur des Coléoptères mâles présente souvent des modifications qui leur permettent de maintenir plus ou moins solidement la femelle pendant la durée de l'accouplement.

Chez de nombreux Coléoptères de la famille des Scarabéidés, entre autres dans la sous-famille des Mélolonthinés, le mâle, grimpé sur le dos de la femelle pendant les premières phases de la copulation, est obligé, en raison de la forme de son pénis, de se renverser progressivement sur le dos, afin de pouvoir introduire en entier cet organe dans l'appareil génital de la femelle.

Ce fait est très facile à constater chez le *Melolontha vulgaris* (F.). Tandis que, pendant des heures, la femelle occupe une position normale, le mâle est derrière elle, en ligne droite, le ventre en l'air et plus ou moins inerte. Tantôt, la femelle reste immobile, tantôt elle traîne, dans cette lamentable posture, son époux qui, dans certains déplacements de la femelle sur le feuillage, se trouve suspendu dans le vide.

Bien que la position d'accouplement dans laquelle le mâle se tient sur le dos de la femelle soit, de beaucoup, la position la plus fréquente chez les Coléoptères, il existe néanmoins, chez un grand nombre d'espèces, un autre mode de copulation, dans lequel le mâle et la femelle sont en ligne droite, bout à bout, le pénis du mâle engagé dans l'appareil génital de la femelle, et les deux sexes reposant normalement sur leurs pattes à l'endroit où ils se trouvent. Cet accouplement linéaire existe dans les familles des Bostrychidés, Cantharidés, Cryptophagidés, Scydmenidés, etc. La figure 4, qui représente deux *Atomaria testacea* (Steph.) en copulation, grossis cinq fois et demie linéairement,



Fig. 4.

montre un exemple de cet accouplement linéaire.

Ce serait une grave erreur de croire que toutes les espèces d'une même famille s'accouplent de la même manière. Ainsi, par exemple, les deux modes de copulation que je viens de décrire existent, non

seulement dans la famille des Cantharidés, mais dans la sous-famille des Cantharinés.

Outre ces deux formes d'accouplement, on a observé, dans l'ordre des Coléoptères, des modes particuliers, chez les *Cebrio*, par exemple. On a dit que les femelles de ces insectes se bornaient à faire saillir, à la surface du sol, leur long vagin dans lequel le mâle introduisait son pénis. Toutefois, il paraît aussi que les femelles de *Cebrio* sortent de terre comme les mâles, au moment de s'accoupler, mais qu'elles se retirent dans leurs galeries souterraines dès que la copulation est terminée.

Les Coléoptères s'accouplent aux différentes saisons; toutefois, c'est pendant la saison chaude que, dans les régions froides et tempérées, les accouplements de ces insectes sont de beaucoup le plus nombreux. Ils ont lieu, soit durant le jour, souvent en plein soleil et par les temps orageux, soit pendant la nuit ou au crépuscule. La durée de la copulation est très variable; malheureusement, les renseignements publiés à ce sujet sont si peu nombreux, qu'il est impossible d'en faire des généralisations. Il en est de même pour la répétition de l'acte copulateur chez les deux sexes. Vraisemblablement, beaucoup de Coléoptères ne s'accouplent qu'une fois; mais, chez les espèces douées d'une certaine ardeur génitale, les mâles doivent, souvent, répéter plusieurs fois l'acte copulateur. Par exemple, chez un Hanneton vulgaire mâle, neuf coïts furent constatés dans un espace de quarante jours. Chez les Coléoptères, il arrive qu'un mâle se réaccouple plusieurs fois avec la même femelle, comme il arrive aussi qu'une femelle se réaccouple avec des mâles différents.

J'ai constaté, chez le *Rhagonycha fulva* (Scop.), que, pendant la copulation, les deux sexes remuaient, par intervalles, leurs antennes avec vivacité, fait qui, probablement, est général chez les Coléoptères. Cette agitation des antennes se manifestant par intervalles exprime, très vraisemblablement, un état physiologique en rapport direct avec le coït.

Un grand nombre de femelles de Coléoptères se déplacent souvent pendant l'accouplement, et, quand elles portent leur cavalier parmi le feuillage, c'est un spectacle intéressant de voir ce dernier, fréquemment renversé par les obstacles qu'il rencontre, et ne tenant guère plus à la femelle que par son armure génitale, remonter sur elle le plus rapidement et le mieux qu'il le peut, au moyen de ses pattes, et, un instant plus tard, être encore plus ou moins désarçonné par quelque nouvel obstacle.

Ajoutons que, souvent, les femelles résistent pendant quelque temps.

aux mâles qui veulent s'accoupler. Ajoutons aussi que chez les espèces douées d'une **grande ardeur génésique**, **les mâles se livrent parfois de véritables combats** pour la possession des femelles.

Après avoir brièvement parlé de l'accouplement normal des Coléoptères, il importe de consacrer quelques lignes aux accouplements anomaux observés chez ces insectes, et qui peuvent être divisés en deux groupes : accouplements entre mâles et femelles d'espèces différentes, et accouplements entre mâles de la même espèce et d'espèces différentes.

Les accouplements entre mâles et femelles d'espèces différentes ne sont pas très rares chez les Coléoptères, surtout, cela se comprend aisément, chez les espèces appartenant à un même genre ou à des genres voisins, qui ont une grande ardeur génésique et possèdent un plus grand nombre de mâles que de femelles. De tels accouplements furent constatés : 1° entre des espèces différentes, mais du même genre, ainsi les *Melasoma populi* (L.) et *M. aenea* (L.), *Cryptocephalus labiatus* (L.) et *C. nitidus* (L.), *Melolontha vulgaris* (F.) et *M. hippocastani* (F.), etc.; 2° entre des espèces appartenant à des genres différents, mais faisant partie de la même famille, tels que les *Strophosomus coryli* (F.) et *Sciaphilus asperatus* (Bonsd.), *Phosphaenus hemipterus* (Goeze) et *Lampyris noctiluca* (L.), *Epicometis hirta* (Poda) et *Anisoplia villosa* (Goeze), etc.; 3° enfin entre des espèces appartenant à des familles différentes, comme les *Donacia simplex* (F.) et *Attelabus coryli* (L.), *Rhagonycha fulva* (Scop.) et *Clytanthus varius* (Müll.), etc.

Pour expliquer ces accouplements hétérosexuels anomaux, il me paraît bien invraisemblable d'invoquer une méprise de l'odorat ou de la vue, et je suis très porté à croire que la cause de ces accouplements réside, au moins le plus souvent, dans l'impérieux besoin de la copulation, éprouvé par des mâles qui ne trouvèrent pas à leur disposition des femelles de leur propre espèce. Très vraisemblablement, ces accouplements hétérosexuels anomaux seraient plus nombreux chez les espèces où les mâles sont ardents et en excès, si, par suite du manque de femelles de leur espèce, ils n'avaient point à vaincre des obstacles souvent insurmontables, provenant, soit de la conformation des femelles d'espèces différentes de la leur, soit de la résistance victorieuse que ces femelles opposent au coït.

Relativement aux accouplements homosexuels, on a constaté la copulation, non seulement entre des mâles de la même espèce, par exemple chez le *Melolontha vulgaris* (F.), le *Platycerus cervus* (L.), etc., mais aussi entre des mâles appartenant à des genres différents d'une même famille, tel que l'accouplement entre mâles du *Luciola*

lusitanica (Charp.) et d'un *Rhagonycha*, très probablement le *fulva* (Scop.). Dans le petit nombre des cas observés de cet accouplement homosexuel, le *Rhagonycha* était l'incube et le *Luciola* le succube.

Si l'on peut fort bien admettre que dans la copulation entre mâles de la même espèce, l'incube, guidé par son odorat, s'est accouplé avec le succube, parce que ce dernier, ayant coïté avec une femelle de son espèce, dégageait encore son odeur, contractée pendant la copulation, par contre cette explication ne saurait guère être donnée quand il s'agit d'accouplements entre mâles appartenant à des genres différents. Dans ce dernier cas, je pense que les accouplements n'ont d'autre cause que le besoin impérieux de la copulation.

Pour connaître, d'une façon minutieuse, l'accouplement des Coléoptères, il est indispensable de l'étudier sur place dans la nature, et, aussi, sur des animaux tenus en captivité. Il est intéressant d'avoir une collection de Coléoptères ayant gardé plus ou moins exactement la position qu'ils avaient pendant le coït. Malheureusement, l'obtention de tels spécimens n'est souvent pas facile, car, d'une façon générale, les Coléoptères se désaccouplent lorsque les conditions ambiantes ne sont plus normales. Évidemment, il faut chercher à tuer le plus rapidement possible les individus accouplés, et, pour ce faire, l'asphyxie dans un flacon renfermant des vapeurs de chloroforme, d'éther, de cyanogène, etc. est de beaucoup préférable à l'immersion dans un liquide toxique. Quoi qu'on fasse, les Coléoptères sont, le plus souvent, désaccouplés avant d'être morts, ou, tout au moins, n'ont plus la position exacte qu'ils avaient pendant la copulation.

Dans le but de formuler des aperçus généraux sur la question de l'accouplement des Coléoptères, que j'effleure seulement en ces lignes, il est indispensable d'avoir un très grand nombre de renseignements précis. A cet égard, je fais un appel chaleureux aux entomologistes, en les priant de noter, d'une manière exacte, la position des insectes accouplés qu'ils rencontreront, et, s'ils le peuvent, d'examiner en détail ces accouplements, et de faire, au besoin, un dessin schématique des animaux accouplés. En publiant de telles observations, ils rendront service à la science. L'accouplement des Arthropodes, connu jusqu'ici de très insuffisante manière, est, en effet, un sujet fort intéressant et qui mérite grandement d'être étudié, car il concerne l'une des phases de la fonction suprême des êtres vivants, la reproduction, qui assure le maintien de la vie sur la terre.

N. B. — Les quatre figures dans le texte ont été dessinées, sur mes indications, par mon excellent collègue et ami, M. A.-L. Clément.

Description d'un *Ocladius* nouveau d'Abyssinie [COL.]

Par Maurice Pic.

Ocladius abyssinicus, n. sp. — *Brevissime oratus, antice non-nihil attenuatus, convexus, niger, parum nitidus, ciliis albidis sub-erectis parce notatus; antennis rufis, tarsis rubro-piceis; rostro arcuato, quinquecarinato; thorace transverso, antice paulo contracto, basi elytris vix angustiore, parte apicali punctata, punctis elongatis saepius confluentibus obsito, interstitiis angustis, irregulariter carinatis vel subconvexis; elytris fere globosis, antice truncatis et paululum contractis, seriatim et profunde impressis, interstitiis subconvexis, punctis brevibus sparse ornatis, singulo macula basali altera submediana luteo-squamosis, his brevibus; pedibus robustis, sat elongatis; femoribus striatis, albo-setosis.* — Long. 5 mill. (*sine rostro*), lat. 3 mill.

Abyssinie (Raffray, in coll. Hénon > Pic).

D'après la classification adoptée dans le « Synopsis » du capitaine de Vauloger (*Bull. Fr.*, 1899, p. 402), cette espèce devra prendre place, par suite de sa sculpture, près de *Sharpi* Tourn., dont elle se distinguera facilement par sa double ponctuation élytrale, ses élytres presque globuleux et sa forme plus robuste. Elle paraît différer de *Sapetoi* Gestro (*An. Mus. civ. Gen.*, XXVII, p. 66; *Bull. Fr.*, 1899, p. 408), d'Erythrée, d'après la description de cette espèce, par sa coloration uniformément noire, sa ponctuation prothoracique; et de *seriatus* Faust (*Ann. Belg.*, 1896, p. 73), de l'Afrique orientale, par la sculpture du rostre, celle du prothorax, le dessin élytral, etc.

Quelques notes coléoptériques

Par Maurice Pic.

I. — Mœurs de *Lucanus cervus* L.

En 1898, j'ai été témoin chez moi, à Digoïn, dans le courant du mois de mai, de certains faits biologiques intéressants concernant *Lucanus cervus* L. J'avais observé, sur un chemin battu touchant à la maison, des trous assez grands, augmentant chaque jour de nombre, et je constatai que la plupart de ces trous étaient vides, mais que plusieurs étaient habités par des *Lucanus cervus* L., à l'état parfait.

Séance du 28 février 1900.

Le 25 mai je compte 18 trous creusés dans la terre dure et un seul dans la terre cultivée d'un massif près du chemin; 3 ♂ montrent l'extrémité de leurs mandibules dans 3 des trous. Le 26 mai au matin rien de nouveau, le soir plus que 2 ♂ dans leurs galeries. Le 27 mai les deux ♂ qui restaient sortent, un le matin, l'autre dans la soirée. Le 28 pris une ♀ sortant d'un nouveau trou à la tombée de la nuit. Le 29 une autre ♀ sort, mais celle-ci dans la terre friable. Le 30, je parviens à extraire une motte de terre située à environ 18 centimètres de profondeur et contenant une coque.

Bellier de la Chavignerie a présenté autrefois à la Société (*Ann. Fr.*, 1846, *Bull.*, p. xxviii) une communication assez analogue qui tend à conclure à l'hivernage de cet insecte dans la terre.

II. — Sur *Mallosia graeca* Sturm.

La ♀ de *Mallosia graeca* est polymorphe et polychrome. Le dessin élytral est composé, soit d'une pubescence brune veloutée foncière, parsemée de lignes longitudinales jaunâtres, soit d'une pubescence générale grise avec une bande longitudinale latérale, quelquefois une autre semblable, suturale, constitué par des poils brun jaunâtre; enfin, plus rarement, la pubescence est entièrement uniforme, plus ou moins grisâtre. Le prothorax, un peu variable, est tantôt subparallèle, tantôt faiblement dilaté sur le milieu de ses côtés et d'une coloration uniformément obscure.

Je sépare comme variété, sous le nom de *cardoriensis* (var. nov.), un très curieux exemplaire ♀ de ma collection (provenant de l'Attique) qui copie tout à fait par sa petite taille et sa forme *Cardoria scutellata* F. ♀, mais qui s'en distingue nettement par la structure du 1^{er} article des antennes non muni d'une carène latérale; de plus, cet insecte est aptère. La var. *cardoriensis* se distinguera des diverses formes ♀ de *Mallosia graeca*, que je viens d'indiquer, en plus de sa forme, par le prothorax en majeure partie testacé et la pubescence générale paraissant moins fournie. — Long. 13 mill.

III. — Quelques mots sur les variétés artificielles ou réelles.

J'ai présenté à la Société en 1892, à la séance du 14 décembre, un certain nombre de *Clytus* fabriqués artificiellement par grattage de leur dessin pubescent ou de leur fascies; aujourd'hui, je montrerai de nouveaux spécimens en attirant l'attention sur la différence de

sculpture qui existe entre les exemplaires fabriqués et ceux présentant des modifications analogues produites par la nature et par conséquent valables.

Après l'épilation, on peut constater que la ponctuation est beaucoup plus fine et plus dense sous les bandes ou taches de pubescence que sur le reste des élytres et, pour cette raison, il sera toujours facile de reconnaître les exemplaires déflorés, même quand ceux-ci se rapporteront à des espèces comme *Clytus lama* Muls., *gazella* F. qui ne présentent pas, sous leur pubescence, une coloration foncière rousse, ainsi que cela a lieu chez *arietis* L. et *arcuatus* L.

M. Théry a décrit, sous le nom de *Cloueti* (An. Fr., 1897, Bull., p. cxxxiii), une très intéressante variété de *Clytus arietis* L., dont je possède le type, variété caractérisée par l'oblitération complète de la fascie médiane, oblitération qui ne peut être copiée artificiellement, car il restera toujours chez cette espèce une bande foncière claire, en dessous de la fascie pubescente enlevée. Je signalerai, sous le nom de **vesubiensis**, var. nov., une variété analogue de *Clytus lama* Muls. (c'est-à-dire ayant la fascie médiane pubescente oblitérée) recueillie par M. A. Buchet, à Saint-Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, et qui m'a été gracieusement offerte par cet entomologiste.

La var. *vesubiensis* affecte aussi, comme la var. *Cloueti*, la structure des élytres, mais à un degré moins sensible et, si l'on compare la var. *vesubiensis* à un exemplaire (analogue de dessin) fabriqué, on constatera que chez le premier la ponctuation élytrale est uniforme partout, tandis que chez le second elle est plus fine et plus serrée à la place où existait la fascie jaune enlevée que sur les parties voisines.

Par l'étude de ces divers spécimens on peut se rendre compte que, à côté des modifications accidentelles et élastiques, il en existe d'autres qui méritent d'être signalées, car elles affectent (contrairement à l'impression qu'elles pourraient produire à un examen superficiel) la structure même de l'insecte.

Je terminerai cette communication en attirant l'attention sur les *Plagionotus Bobelayei* Brullé et *scalaris* Brullé. Je crois que l'on n'a pas fait remarquer pour ces insectes que le dessin fascié du premier est analogue à celui de *C. arietis* L. (c'est-à-dire que les fascies ou macules pubescentes reposent sur des fascies claires), tandis que chez le *scalaris* le dessin est analogue à celui de *C. lama* Muls. (c'est-à-dire que les fascies ou macules reposent sur la coloration générale foncière noire), c'est une nouvelle preuve de la distinction spécifique des deux formes.

Études de quelques Diptères de l'ambre tertiaire

Par Fernand MEUNIER.

4^e Note (1).

En passant en revue une belle série de *Mycetophilidae* de l'oligocène inférieur de la Baltique, j'ai observé un Diptère de cette famille présentant une certaine ressemblance avec le genre *Synapha* Meigen (2), quoique bien distinct de celui-ci par plusieurs caractères alaires.

Le *S. fasciata* de cet auteur paraît être rare et peu connu des diptéristes. A ma connaissance, il a seulement été décrit et figuré à nouveau par Macquart (3) et signalé par Schiner (4) qui tend à le con-



Fig. 1. Aile de *Synapha*
(d'après Meigen).




Fig. 2. Aile de *Palaeosynapha*
Meun.

sidérer comme une espèce tératologique. Cette même manière de voir a été émise par Winnertz (Beitrag zu einer Monographie der Pilzmücken. *Verhandl. der. k. k. zool. bot. Gesellsch. Wien.*, Bb. XIII, p. 637, 1863). A la suite de Meigen la diagnose de *S. fasciata* a été aussi recopiée dans l'Encyclopédie méthodique de Latreille, Saint-Fargeau, Serville et Guérin (t. X, p. 540, Paris, 1825).

La curieuse cellule lancéolée et longuement pétiolée se trouve vers le milieu du champ alaire chez le *S. fasciata*. Le fossile l'a plus rapprochée du bord postérieur de cet organe, et son pétiole est court et légèrement courbé. De plus, la fourche formée par la quatrième nervure longitudinale est longue et atteint presque la base de l'aile chez l'espèce du succin, tandis qu'elle est visiblement plus courte et située près de l'extrémité chez le *Synapha*. Les autres caractères morphologiques de ce rarissime Diptère sont voisins du genre cité.

(1) Voir pour les notes précédentes *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, pp. 334, 358 et 392.

(2) *Syst. Besch. d. bekannt. Europ. zweiflügeligen Insekten*, Bd. I, ss. 178-179, Taf. 8, fig. 7-9. Halle, 1851.

(3) *Histoire naturelle des Insectes, Diptères*, t. I, p. 145, pl. 3, fig. 13. Paris, 1834.

(4) *Fauna austriaca. Die Fliegen*, Bd. I, p. 494 (note). Wien, 1864.

Je propose de désigner provisoirement ce *Mycetophilidae* sous le nom de **Palacosynapha** nov. gén.

Au point de vue de la paléontologie stratigraphique, cette découverte est intéressante, car elle permet de signaler, pour la première fois, la présence d'une forme singulière de Mycétophilien dans l'oligocène inférieur de Samland.

Pour ce qui concerne la phylogénie de ces *Orthorapha*, elle laisse entrevoir que les *Synapha* et les *Palacosynapha* semblent être les derniers survivants, actuellement connus, d'une sous-famille de ces Diptères s'étant vraisemblablement épanouis dans le paléocène ou l'éocène et dont les espèces, à l'exception du *Synapha* actuel, se sont lentement éteintes pendant la durée des temps oligocènes.

Sur une larve de Lycide [COL.]

Par Ern. OLIVIER.

Dans le *Bulletin* de la séance du 22 février 1899, M. J. Bourgeois a décrit et figuré deux larves d'aspect insolite qu'il attribue à des espèces de Lycides et probablement à des *Lycus*. Ces deux larves appartiennent au Muséum de Paris. J'en possède dans ma collection un exemplaire identique à celui auquel M. Bourgeois donne le n° 2 et qui provient de la côte ouest de Sumatra.

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1900, I, 7 et 8. —

A. MALAQUIN : Nouvelles recherches sur l'évolution de Monstrilides. — CH. PÉREZ : Sur un Epicaride nouveau, le *Crinoniscus equitans* (fig.). — P. WUILLEMIN : Développement des Azygospores d'*Entomophthora*.

Académie des Sciences de Cracovie (Bulletin international), décembre 1899. ☉

Academy of Natural Sciences of Philadelphia (Proceedings), 1899, II.

— P.-P. CALVERT : Neuropterous Insects collected by Dr A.-D. Smith in Northeastern Africa (pl.). — Parallelisms in Structure between certain Genera of Odonata from the old and the new Worlds. — T.-D.-A. COCKERELL : Some Notes on Coccidae. — W.-

J. Fox : Contributions to a Knowledge of the Hymenoptera of Brazil, VII : Eumenidae (Genera *Zethus*, *Labus*, *Zethoides*, *Eumenes*, *Montezumia* and *Nortonia*).

Agricultural Gazette of N. S. Wales (The), XI, 1, 1900. — A.-J. NORTH : A List of Insectivorous Birds of N.-S. Wales. — A. GALE : The Queen Bee. — Kerosene for San Jose Scale. — Bee Calendar. — Notes diverses.

Archives provinciales des Sciences, II, 3, 1900. ☉

American Entomological Society (Transactions), XXVI, 2, 1899. — H.-C. FALL : Revision of the Lathridiidae of Boreal America (3 pl. n.).

American Museum of Natural History (Bulletin), XI, 2, 1899. ☉ Demande d'échange.

Canadian Entomologist, XXXII, 2, 1900. — T. PERGANDE : A new Species of Plant Louse injurious to Violets. — N. BANKS : On two Genera of Mites. — D.-W. COQUILLET : New Genera and Species of Ephyridae. — H.-G. DYAR : Notes on some N. American Yponomeutidae. — W. BARNES : New Species and Varieties of N. American Lepidoptera. — C.-F. BAKER : Four new Species of *Platymetopus*. — F.-M. WEBSTER et C.-W. MALLY : The Purslane Saw-Fly : *Schizocerus Zabriskei* (fig.). — L.-O. HOWARD : A popular Name for *Clisiocampa disstria*. — W.-G. JOHNSON : The destructive Green-Pea Louse (fig.).

Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1899, II. — Dr W. HORN : Entomologische Reisebriefe aus Ceylon, II, III. — Dr G. KRAATZ : Zwei neue Cetoniden von der Molukkeninsel Dammer. — *Genyodonta plagiata* Kr., *G. Jansoni* Gestro (Expl. del Giuba 1895) ♀ var. ? — Dr VON HEYDEN : Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Halbinsel Sinai. — J. WEISE : Coccinelliden aus Süd-Amerika. — E. REITTER : Neue Coleopteren aus Europa, den angrenzenden Ländern, russisch Asien und der Mongolei. — Weitere Beiträge zur Kenntniss der Coleopteren-Gattung *Laena* Latr. — *Dryocoetes baikalicus*, n. sp. — Einige neue Coleopteren von der dalmatinischen Insel Meleda. — A. SCHULTZE : Beschreibung neuer paläarktischer Ceutorrhynchinen. — Dr G. KRAATZ : Ueber die Languriiden-Arten von Kamerun nebst einigen verwandten Formen. — *Cymophorus floccosus*. — Neue Ostafrikanische *Leucocelis*-Arten. — J. FAUST : Neue Curculioniden aus Deutsch-Ost-Afrika. — Dr G. KRAATZ : Einige Bemerkungen zu von Gorham's Aufsatz 1896 : Languridae in Birmania ex regione vicina a L. Fea collecta. — Cetoniden vom Nyassa-See. — K.-M. HELLER :

Neue und wenig gekannte *Thaumastopaeus*-Arten. — Dr G. KRAATZ : *Phocasoma*, nov. gen. *Aleocharinum*. — A. MULLER : *Pterostichus baldensis* Schm. var. *Pakae*. — Dr G. KRAATZ : Zwei neue ostafrikanische *Polystalactica*-Arten. — *Dinonota* Krtz., nov. gen. *Diplognathidarum*. — Dr W. HORN : *Euryoda inornata* Horn. — J. WEISE : Bemerkungen zu den neuesten Bearbeitungen der Coccinelliden. — Dr W. HORN : Neue africanische Cicindeliden. — A. SCHULTZE : Eine neue Südspanische *Baris*-Art. — Dr G. KRAATZ : Eine neue *Carolina* Thoms.-Art von Borneo. — Dr G. KRAATZ : *Glyciphana binotata*. — *Mausoleopsis 4-maculata*. — E. WASMANN : Ein neuer *Termitodiscus* aus Natal. — Zur Beschreibung von *Termes obesus* Ramb. — Zwei neue *Lobopelta*-Gäste aus Südafrika (fig.). — Zwei neue myrmekophile *Philusina*-Arten. — Ueber *Atemeles pubicollis* und die Pseudogynen von *Formica rufa* L. — Ein neuer Gast von *Eciton carolinense*. — Ein neuer *Melipona*-Gast (*Scotocryptus Goeldii*) aus Pará.

Entomological News, XI, 1 et 2, 1900. — V.-L. KELLOGG : Notes on the Life-History and Structure of *Blepharocera capitata* Loew (fig.). — A.-T. SLOSSON : Additional List of Insects taken in Alpine Region of Mount Washington. — C.-W. JOHNSON : Some Notes and Descriptions of seven new Species and one new Genus of Diptera (fig.). — W. BARNES : Notes on N. American Diurnals with some Additions and Corrections to Dr Skinner's Catalogue. — W.-J. HOLLAND : A Description of a Variety of *Argynnis Nitocris* from Chihuahua, Mexico. — H.-G. DYAR : A new Cochiliid of the Palaeartic Group. — C.-P. LOUNSBURY : Life History of a Thik. — W.-G. DIETZ : Some New Genera and Species of N. Amer. Tineina (pl.). — T. KINCAID : Notes on the Species of *Crabro* found in the State of Washington. — PR. C.-H. FERNALD : Zoology as Taught at the Massachusetts Agricultural College, with Reference to Entomology. — A.-J. SNYDER : Silver Lake, Utah. — Notes diverses.

Entomologische Nachrichten, XXVI, 4, 1900. — H. REBEL : Zur Auffassung der Lemoniiden als selbständige Lepidopterenfamilie. — H.-J. KOLBE : Eine neue *Chalcosoma*-Art aus der Familie der Dynastiden. — W. HORN : De duabus novis generis Tetrachae Speciebus ex Ecuadoria. — K.-M. HELLER : Ueber die corsicanischen Varietäten der *Cetonia aurata*. — H. ROESCHKE : Carabologische Notizen, V. — K.-M. HELLER : Zur Synonymie der Zygopiden.

Entomologist's monthly Magazine (The), mars 1900. — R.-C.-L. PERKINS : *Prosopis palustris*, sp. n., an addition to the British Hyme-

noptera (fig.). — E. SAUNDERS : Three little known British Aculeate Hymenoptera (*Pompilus approximatus* Sm., *Osmia parietina* Curt. and *O. inermis* Zett.). — J.-W. YERBURY : Notes on certain Diptera observed in Scotland during the years 1898-99. — W.-A. LUFF : List of the Coleoptera of Alderney. — L. WALSINGHAM : A gall-making *Coleophora* (*Stefanii*) de Joannis. — J.-H. DURRANT : A new Species of *Tortrix* reported from Shetland. — J.-H. WOOD : On the larvae, habits, and structure of *Lithocolletis concomitella* Banks, and its nearest allies (fig.). — Notes diverses.

Entomologist's Record and Journal of Variation (The), XII, 2, 1900. — M. DE LA B. NICHOLL : Bulgarian Butterflies. — J.-W. TUTT : *Phibalapteryx aquata* a British Species. — N.-C. ROTHSCHILD : Some new Exotic Fleas (pl.). — J.-W. TUTT : *Plebeius argus* and *Plebeius aegon*. F.-W. SLADEN : The Hymenoptera of Suffolk. — E. WASMANN : The Guests of Ants and Termites. — J.-W. TUTT : Notes on *Masonia Edwardsella*, a Psychid new to Science. — TH. WOOD : Notes on the genus *Meloe*. — M. BURR : On the Geographical distribution of European Orthoptera. — Notes diverses.

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, V, 4, 1900. — J. TARNANI : *Letkrus apterus* Laxm. — M. GILLMER : *Lycaena bellargus* Rott. ab. *Krodeli* und *L. corydon* Poda ab. *cinnus* Hb. (pl.). — Dr BAS-TELBERGER : Ueber das Entolen. — Notes diverses.

K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (*Verhandlungen*), L, 1, 1900. — BAR. C. v. HORMUZAKI : Beitrag zur Macrolepidopteren Fauna der österreichischen Alpenländer. — Dr M. BERNHAUER : Siebente Folge neuer Staphyliniden aus Europa nebst Bemerkungen. — Dr FR. SPAETH : Ueber *Notiophilus orientalis* Chd.

Naturaliste (Le), 15 février 1900. — Les plantes de France, leurs chenilles et leurs papillons. — CAP. XAMBEU : Ponte de *Trichosoma hemigenum* de Graslin, Lépidoptère du Groupe des Chélonides. — L. PLANET : Essai monographique sur les Coléoptères des Genres *Pseudolucane* et *Lucane* (fig.). — AUSTAUT : Lépidoptères nouveaux d'Asie.

R. *Accademia dei Lincei (Atti)*, 1900, I, 3. ○

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, XIII, 146, 1900. ○

Sociedad española de Historia natural (Anales), XXVIII, 2, 1899. — M. BURR : Essai sur les Eumastacides Tribu des Acridiidea (pl.).

Societas Entomologica, XIV, 22-23, 1900. — W. CASPARI II : *Plusia aurifera*. Ein deutscher Schmetterling? — C. FRINGS : Ueber den Saison-Dimorphismus der im Rheinlande vorkommenden *Pieris*-Arten. — P. BORN : Meine Exkursion von 1899 (2 art.). — F. ZAHRADKA : Einige lepidopterologische Mittheilungen aus dem Grauer Komitate. Ungarn. — B. SLEVOGT : Reiche Novemberabende 1899.

Société d'étude des Sciences naturelles d'Elbeuf (Bulletin), XVII, 1898-99. — L. COULON : Les noms scientifiques en histoire naturelle.

Société d'Histoire naturelle des Ardennes (Bulletin), V, 1898. — B. PRIEOT : Le parasitisme chez les Insectes.

Société d'études scientifiques de l'Aude (Bulletin), X, 1899. — Liste de Coléoptères.

Société Entomologique de Belgique (Annales), 1899, XIII. 1900, I. — A. LAMEERE : Discours sur la raison d'être des métamorphoses chez les Insectes. — Quelques Orthoptères de Belgique. — V. VILLEM : Un type nouveau de Sminthuride : *Megalothorax*. — L. CLOUËT DES PESRUCHES : Notes sur diverses espèces d'Aphodiides, genres *Psammobius* et *Sicardia*, et description d'une espèce nouvelle. — M. PIC : Contribution à l'étude des *Cerambycidae* de Chine et du Japon. — Dr F. SPAETH : Contribution à la faune entomologique de Sumatra (Cassides). — Dr A. FOREL : Un nouveau genre et une nouvelle espèce de Myrmicide.

Société Linnéenne du Nord de la France (Bulletin), 321-322, 1899. ○

Stettiner Entomologische Zeitung, LX, 7-9, 1899. — SCHÜTZE : Biologische Mittheilungen über einige Kleinschmetterlinge. — A. FUCHS : Zwei neue Kleinschmetterlinge. — H.-J. KOLBE : Die Arten der Hispinen-Gattung *Cryptonychus*. — FR. OHAUS : Bericht über eine entomologische Reise nach Centralbrasilien. — H. DOHRN : Beitrag zur Kenntniss der Lepidopteren-Fauna von Sumatra.

A. L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 14 mars 1900.

Présidence de M. A. GIARD.

Correspondance. — MM. A. Lavallée, R. Peschet et L. Semichon remercient la Société de leur admission.

Démission. — M. Cl.-M. Weed, de Hanover (États-Unis d'Amérique), a envoyé sa démission de membre de la Société.

Admissions. — M. Léon-C. Cosmovici, professeur de Zoologie et de Physiologie à l'Université, 44, strada Codrescu, Jassy (Roumanie). *Entomologie générale, Lépidoptères.*

— M. le Dr Maurice Jaquet, conservateur au Musée national, 74, strada Coltei, Bucarest (Roumanie). *Entomologie générale, Tératologie.*

Présentations. — M. Charles Mottaz, conservateur à la collection locale du Palais Eynard, Genève (Suisse) [*Entomologie générale, Coléoptères*], présenté par M. P. Marchal. — Commissaires-rapporteurs MM. E.-L. Bouvier et Ph. Grouvelle.

Renseignements fauniques. — M. L. Bedel fait observer que, sous le nom de *thoracica*, on confond généralement en France deux espèces de *Cassida* qui se trouvent l'une et l'autre dans les limites du bassin parisien.

1. *C. thoracica* Panz. — Fémurs entièrement pâles. Insecte large, subarrondi. Élytres assez finement ponctués, à disque peu convexe en arrière et côtés largement explanés.

Oise : Coye près Chantilly (Dr Marmottan!), Calvados : Villers-sur-Mer!, Loire-Inférieure (Ch. Brisout!), etc. Vivrait, d'après le Dr Scholz cité par Suffrian, sur le *Scorzonera humilis* L.

2. *C. ferruginea* Gæze (*thoracica* Geoffr. ap. Fourc., *tincta* Weise). — Fémurs noirs vers la base. Insecte subovalaire. Élytres assez grossièrement ponctués, à disque bombé en arrière et côtés médiocrement explanés.

Seine-et-Oise : Mennecy !, Orne : Brotz près L'Hôme !, Eure : Évreux (Dr Régimbart), Calvados : Villers-sur-Mer !, etc. Vit sur le *Pulicaria dysenterica* L. !; ce fait était déjà connu de Geoffroy qui l'a signalé dès 1762 dans son *Histoire abrégée des Insectes*, I, p. 314 (*Cassida* n° 4).

Communications.

Description de deux Malacodermes nouveaux [COL.] de l'Amérique méridionale

Par J. BOURGEOIS.

1. *Chauliognathus scabripennis*, sp. nov. — *Submitidus, niger, elytris scabrosis, a medio inde flavis; corpore subtus luteo, femorum apice tarsisque rufo-testaceis.* — Long. 48 mill.; lat. 6 mill.

Tête large, plane, un peu déprimée transversalement derrière les yeux, d'un noir un peu luisant, imponctuée; moitié basilaire des mandibules, palpes et antennes d'un flave roussâtre, celles-ci avec le 2^e article très court. Pronotum transverse, rectangulaire, très légèrement élargi d'arrière en avant, d'un noir lisse et luisant, rebordé au bord antérieur et à la base, étroitement marginé et relevé sur les côtés, avec les angles antérieurs et postérieurs arrondis; disque inégal, transversalement déprimé en avant et en arrière, longitudinalement marqué, dans son milieu, d'un faible sillon. Écusson noir, subcarré. Élytres cinq fois au moins aussi longs que le pronotum, recouverts de fortes rugosités vermiculées, entremêlées de gros points enfoncés; ils sont noirs, glabres et assez brillants sur un peu plus de la moitié antérieure, flaves, pubescents et presque mats postérieurement; épipleures lisses, d'un flave pâle. Dessous du corps d'un testacé pâle; pattes noires, avec l'extrémité des cuisses, les tibias et les tarses d'un testacé rougeâtre (♀).

Colombie : Ibagué (Fr. Claver).

Cette remarquable espèce, à laquelle la forte rugosité des élytres donne un aspect tout particulier, et qui constituera peut-être un jour le type d'un genre nouveau, m'a été communiquée par le Frère Marie-Sébastien, du pensionnat de Saint-Genis-Laval (Rhône).

2. *Chalcas Fairmairei*, sp. nov. — ♂ *Niger, subopacus, dense flavo-cinereo-pubescent, coleopteris inflatis, rotundatis, subplanatis,*

glabris, rubris, maculis quatuor nigris juxta basin notatis. — Long. 13-16 mill.; lat. max. 9-13 mill.

Cette espèce, dont je n'ai vu jusqu'à présent que le ♂, est voisine du *Ch. obesus* Fairm. Elle s'en distingue à première vue par la taille plus petite, les élytres moins bombés, subaplanis, présentant de chaque côté une petite côte très fine qui part de l'épaule et se prolonge jusque vers le 4^e ♂ postérieur; en outre, ces organes qui, chez *obesus*, sont en entier d'un jaune d'ocre, sont ici d'un rouge brique assez vif et sont marqués chacun, tout contre la base, de deux petites taches noires allongées, dont l'une est placée à côté de l'écusson et l'autre sur l'épaule. Le prothorax a sensiblement la même forme que chez *obesus*; il est recouvert ainsi que la tête, l'écusson, les pattes et la majeure partie de l'abdomen d'une pubescence très dense d'un blanc jaunâtre qui, dans les exemplaires très frais, dessine autour du pronotum un étroit liséré blanchâtre.

Haut-Orénoque (Gaillard, 1887). — Coll. du Muséum de Paris et la mienne.

M. Théry m'en a aussi communiqué un exemplaire étiqueté de Caracas (Venezuela).

Je ne crois pouvoir mieux faire que de dédier cette espèce à notre cher et vénéré Président honoraire, M. L. Fairmaire, qui, il y a plus de cinquante ans déjà, publiait une remarquable monographie du genre *Chalcus*, accompagnée d'une superbe planche (*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1849, p. 5 et pl. I).

Observations sur le *Peripatopsis Moseleyi* [ONYCH.]

Par E.-L. BOUVIER.

Les observations que j'ai l'honneur de présenter à la Société entomologique sont de deux sortes bien différentes; les unes ont trait au nombre des appendices du *Peripatopsis Moseleyi* W. M., les autres se rapportent à la nourriture de cet animal.

Le *P. Moseleyi* diffère des autres Onychophores de l'Afrique australe par des variations assez considérables dans le nombre de ses pattes. Jusqu'ici on croyait qu'il en avait 22 ou 23 paires, et que celles de la dernière étaient réduites à une faible saillie dépourvue de pied et de griffe; en réalité les variations de l'espèce sont bien plus grandes, comme j'ai pu m'en convaincre en étudiant les collections d'Onychophores des Musées de Londres et de Hambourg. Sur 9 exemplaires con-

tenus dans ces collections, 1 seul a 22 paires de pattes (♂), 2 en ont 23 (1 ♂, 1 ♀), 5 en ont 24 (2 ♂, 3 ♀), enfin un exemplaire ♂ a jusqu'à 25 paires de pattes. Ces variations sont indépendantes du sexe.

Les pattes de la dernière paire sont toujours réduites, mais il s'en faut qu'elles soient toujours dépourvues de pieds ou de griffes (1). Sur les neuf individus étudiés, cinq avaient des pattes postérieures inermes et fort réduites, mais les quatre autres présentaient, à ce point de vue, les variations les plus grandes : une femelle ayant 23 paires de pattes montrait une griffe sur le moignon appendiculaire droit et une femelle à 24 paires sur le moignon gauche ; les moignons opposés, dans ces deux exemplaires, étaient absolument inermes. Deux exemplaires mâles, munis chacun de 24 paires de pattes, m'ont offert un degré de réduction moins avancé en ce sens que les pattes postérieures étaient toutes deux armées de deux griffes ; dans l'un de ces exemplaires, les pattes étaient fort rudimentaires et réduites à un pied incomplet, dans l'autre le pied bien formé s'élevait sur un cône appendiculaire très saillant où se trouvaient encore, à l'état d'ébauche, des rudiments de soles pédieuses.

Ainsi se présente, à tous les degrés, l'atrophie des pattes postérieures dans le *Peripatopsis Moseleyi*. J'ai déjà eu l'occasion de montrer que c'est à des phénomènes de cette nature qu'il faut rapporter les caractères morphologiques essentiels des Onychophores : dans les *Peripatus* l'orifice génital se trouve entre les pattes de l'avant-dernière paire et celles de la dernière paire sont encore bien développées ; dans les *Peripatoides* les pattes de cette paire disparaissent et l'orifice se trouve entre les pattes de la paire précédente, dans les *Peripatopsis* ces dernières s'atrophient plus ou moins, enfin dans les *Paraperipatus* elles disparaissent totalement, de sorte que l'orifice se trouve loin en arrière des pattes postérieures.

La seconde partie de cette note sera consacrée au genre d'aliment que choisissent les Onychophores. Pour Moseley ces animaux seraient exclusivement végétivores ou plutôt humivores, pour Balfour ils ne prendraient pas exclusivement des matières végétales, mais mangeraient aussi des Insectes, enfin Kennel suppose qu'ils sont carnassiers et qu'ils doivent rechercher surtout les petits Termites. Du reste, dans les mémoires de ces différents auteurs, les observations précises font défaut.

J'ai été plus heureux en étudiant deux exemplaires mâles recueillis à Port-Élisabeth et appartenant au Musée de Hambourg. Dans l'un de

(1) M. Purcell me dit, dans une lettre, qu'il a reconnu que le *P. Moseleyi* peut, dans certains cas, avoir des griffes aux pattes postérieures.

ces mâles je trouve les restes très évidents d'une chenille velue qui devait avoir une assez grande taille, car la couronne de crochets de ses fausses pattes avait de 12 à 14 centièmes de millimètres. Dans l'autre j'ai pu recueillir en abondance des articles de pattes, des morceaux d'antennes, une mandibule et des fragments de thorax ou d'abdomen. Ces restes appartiennent tous à un Thysanoure plus voisin des Japyx que des Campodes, probablement de même taille que notre Japyx lucifuge; ils proviennent, pour le moins, de deux individus différents.

Ces restes, très bien conservés, se trouvaient englobés dans la bouillie plus ou moins solide qui remplit à divers degrés l'estomac des Onychophores.

Description d'un Dytiscide nouveau de Perse [COL.]

Par le Dr M. RÉGIMBART.

Platambus Escaleraï, n. sp. — Long. 7 $\frac{3}{4}$ –8 $\frac{1}{2}$ mill. — *Elliptico-ovatus, elongatus, parum convexus, subtiliter reticulatus et tenuissime punctulatus, nitidissimus; capite et pronoto ferrugineis, hoc antice et postice late et vage infuscato, ad latera rufescente, leviter aeneo, utrinque sat crasse marginato, basi sinuata, angulis posterioribus prominulis et subacutis; elytris nigro-aeneis, vitta laterali lata, intus trimaculata vel triemarginata, maculaque triangulari basali extus producta et cum margine late conjuncta flavis ornatis, punctis triseriatis et valde remotis instructis; corpore subtus, antennis pedibusque rufoferrugineis, coxis posterioribus dense coriaceo-reticulatis.*

Espèce de forme très elliptique et allongée, fort brillante, avec une teinte bronzée bien nette au pronotum et aux élytres dont les dessins sont ainsi disposés : d'abord une large bordure jaune, rousse extérieurement à partir du milieu et plus ou moins distinctement divisée par une ligne longitudinale brune, marquée près du bord interne sinueux de trois taches plus ou moins distinctes, ensuite une grosse tache basale irrégulièrement triangulaire, prolongée en dehors où elle se réunit largement à la bordure ; les trois séries ponctuées sont formées de points très espacés l'un de l'autre. La réticulation est formée d'aréoles polyédriques à contours extrêmement fins et enfermant chacun un ou deux points d'une extrême ténuité.

Cette espèce, bien distincte, a été découverte par M. Manuel M. de la Escalera en juin-juillet 1899, à Chindaar, sur le Haut-Kharoum (Perse occidentale).

**Description d'un nouveau genre et d'une espèce nouvelle d'Aphodiide
et note sur le genre *Epilissus* [Col.]**

Par L. CLOUËT DES PESRUCHES.

***Rhyssemorphus*, nov. gen.**

Ce nouveau type d'Aphodiide, découvert par M. A. Mocquerys à Madagascar, offre l'aspect d'un *Rhyssemus*, mais les deux derniers arceaux de l'abdomen sont simplement distincts l'un de l'autre, et non séparés par le large sillon concave à fond creusé d'une rangée de petites stries parallèles et rapprochées que l'on remarque chez tous les *Rhyssemus*. Ce caractère étant d'une importance considérable, il me semble nécessaire d'en consacrer l'absence par la création d'un nouveau genre, que j'appellerai « *Rhyssemorphus* », étant donné que cette absence jette une singulière confusion dans la classification des Aphodiides. Il est facile en effet de s'en rendre compte en récapitulant les divers caractères de chacun des genres intéressés, dans l'ordre de leur classement rationnel. La sculpture du prothorax place les *Rhyssemus* immédiatement après les *Psammobius*; les *Rhyssemodes* servent de trait d'union par la conformation de leurs tarses postérieurs. Après ceux-ci viennent les *Rhyssemus* vrais; ils précèdent les *Ataenius* avec le sillon profond qui sépare les deux derniers arceaux de l'abdomen, et qui est propre aux deux groupes. Les *Saprosites* se placent ensuite, et sont eux-mêmes suivis par toute une série d'insectes à sculpture extraordinaire, les *Rhypparus*, *Notaucolus*, *Odochilus*, *Sybus*, *Syba-coides*, etc..., mais qui tous ont avec les *Ataenius* un lien commun, la conformation des membres intermédiaires et postérieurs. Reste le genre *Rhyssemorphus* que l'on est forcé d'ajouter à la suite puisqu'il est impossible de le rapprocher des *Rhyssemus*.

R. Mocquerysi, nov. sp. — Long. 3-3,8 mill. — *Elongatus*, *parallelus*, *convexus*; *niger*, *parum nitidus*, *carinis pronoti nitidioribus*. *Caput antice emarginatum*, *utrinque emarginationis sat breviter non late rotundatum*, *lateribus obtuse arcuatis*, *ante genas vix perspicue sinuatis*; *genae angulatae*, *sed non mucronatae*, *postice ante oculos oblique fractae*; *clypeus grosse verrucosus*, *regio verrucosa postice bicurvatum interrupta et medio ad verticem angulatim producta*; *vertex subtiliter crebre granulatus*, *costulis obliquis ornatus*. *Prothorax basi late arcuatus*, *antice pone oculos profunde sinuatus*, *regione angulorum producta*, *angulis non acutis*. *Discum rugis 5 ornatum*; *prima secundum*

marginem lata, depressa et variolosa; alteris angustis, ut in genere « Rhyssemo » ordinatis; intervalla opacula, deplanata, rugis latiora, crebre et subtiliter granulosa. Scutellum elongato-triangulare, opacum. Elytra profunde punctato-striata; intervallis biserialim tuberculatis, seriei internae tuberculis minimis, separatis, externa elevatior, tuberculis imbricatis; intervallis omnibus tectiformibus, apice sensim strangulatis et carinatis, carina rugosa. Rhombus metasternalis profunde canaliculatus, medio et postice laevis, antice punctatus, inter coxas medius in carinam productus. Abdominis segmenta simpliciter conjuncta, duobus ultimis connexis, sulco nullo separatis. Femora non incrassata, sparsim setigera. Tarsi ut in genere « Rhyssemo ».

Antanambé (N.-E. de Madagascar).

Je dédie cette espèce à M. Albert Mocquerys qui l'a découverte au cours de son dernier et fructueux voyage.

L'insecte rappelle beaucoup par sa forme la variété *parallelus* Reitt. du *Rhyssemus germanus*. Les arceaux de l'abdomen sont ornés d'un sillon en zigzag comme chez un grand nombre de *Rhyssemus*, et d'un sillon crénelé le long de leur bord postérieur. Les épisternums du prothorax sont étroits et allongés, bien limités par une carène, lisses ou peu distinctement chagrinés vers le bord interne.

M. A. Mocquerys a rapporté de Madagascar douze espèces du genre *Epilissus*. La plupart de ces insectes se trouvent, paraît-il, sur les feuilles des arbres, rangés en rond autour des excréments que les oiseaux y font tomber; leur capture est assez malaisée, car ils se laissent brusquement choir dans le vide à la moindre alarme.

Descriptions et habitats nouveaux de divers Coléoptères d'Algérie et d'Orient

Par Maurice Pic.

Apotomus rufithorax Pecc. — Jéricho (Pic). Non encore signalé en Palestine, du moins à ma connaissance.

Sphenoptera paradoxa Ab. — Jéricho (Pic). Décrit récemment d'Algérie et nouveau par conséquent pour la faune asiatique.

Perrinellus ⁽¹⁾ *argentatus* Ab. — Palestine : Jaffa (Pic et Dr Lys-holm); décrit de Caïffa (Syrie). Cette espèce se rencontre dans les dunes, soit sur les Graminées, soit au pied des plantes.

Cardiophorus Chobauti Buyss. (*Bull. Fr.*, 1899, p. 214). — C'est par suite d'un oubli que M. H. du Buysson a seulement cité pour cette espèce le Dr Chobaut. Cette espèce a été recueillie à Bou Saada dès l'année 1875, par Leprieur, donc bien antérieurement aux chasses récentes du Dr Chobaut.

***Malthinus Mathieui*, n. sp.** — Peu brillant, entièrement foncé à l'exception des côtés du prothorax et de la partie antérieure de la tête (moins l'épistome taché de noir ou rembruni) qui sont pâles ou rous-sâtres. Moins allongé que *obscuripes* Ksw., avec le prothorax plus ou moins largement orné de jaune sur les côtés.

Sera décrit plus longuement dans une étude synoptique sur le genre *Malthinus* Latr.

Oran (Paul Mathieu; coll. Mathieu et Pic).

Arynotarsus insularis Ab. — Algérie : Mecheria (Pic). Espèce décrite de Corse (se retrouvant, je crois, en Sicile) et nouvelle pour l'Algérie.

Anthocomus Doriae Baudi. — Damas (Pic). Décrit de Perse et nouveau pour la faune syrienne.

***Mordellistena oranensis*, n. sp.** — *Rubro-testaceus, angustatus, sericeus; oculis, antennarum apice, tibiurarum et articularum tarsalium margine summo apicali strigisque nigricantibus; elytris concoloribus; pygidio parum elongato.* — Long. (pygid. excl.) 3 mill.

Hab. Algeria.

Testacé roussâtre, très allongé, revêtu d'une pubescence soyeuse jaunâtre; yeux noirs ainsi que les extrémités des tibias, des tarses et les hachures des tibias. Antennes légèrement obscurcies sur leurs derniers articles, le 3^e ayant à peu près la longueur du 4^e. Prothorax presque plus large que long. Élytres longs et étroits, faiblement atténués à l'extrémité. Tibias postérieurs ayant trois hachures, les deux antérieures très obliques, l'autre presque droite. Dessous du corps de

(1) Nouveau genre établi par M. H. du Buysson (*Bull. Fr.*, 1899, p. 292) pour cette espèce et quelques autres du Nord de l'Afrique.

la coloration du dessus. Pygidium peu long, assez épais, parfois rembruni. — Long. 3 mill.

Oran (Paul Mathieu; coll. Mathieu et Pic).

Cette espèce, bien reconnaissable à sa coloration uniforme et par la structure de ses tibias, pourrait se rapprocher de *M. abdominalis* F. et *Milleri* Ém., mais ces espèces ont les élytres foncés et une forme moins élancée. D'après les caractères donnés par Émery (*L'Abeille*, 1876, p. 81, Mordellides) pour désigner *M. brunnea* F. ⁽¹⁾, *oranensis* s'en distinguerait par la forme plus allongée, la structure du pygidium peu long, la hachure apicale des tibias presque droite; il est aussi distinct de *brunnea*, d'après la description primitive de cette espèce (*Syst. El.*, II, p. 125, n° 18), au moins par la coloration générale concolore.

Rhamphus Kiesenwetteri Tourn. var. — Haute-Égypte : Assouan (Pic). Décrit de Sicile et nouveau, à ma connaissance, pour la faune égyptienne.

Tropideres Munieri Bedel var. — Damas (Pic). Espèce nouvelle pour la Turquie d'Asie.

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1900, I, 9-10. ☉

Annals and Magazine of Natural History (The), mars 1900. — CH.

CHILTON : A New-Zealand Species of the Amphipodan Genus *Cyproidia* (pl.). — G. LEWIS : On new Species of *Histeridae* and Notices of others (fig.). — W.-F. KIRBY : Notes on a Collection of African *Blattidae*, chiefly from the Transvaal, formed by M. W.-L. Distant. — R.-I. POCKOCK : Some new or little-known *Thelyphonidae* and *Solifugae* (fig.). — C.-J. GAHAN : Description of a new Genus and Species of Longicorn Coleoptera from Central Formosa. — C.-O. WATERHOUSE : Descriptions of New Coleoptera from Hainan Island, China. — E. BORDAGE : On the Spiral Growth of Appendages in Course of Regeneration in Arthropoda.

Archives provinciales des Sciences, II, 4, 1900. ☉

(1) Il est à remarquer que cette espèce a été passée sous silence par Schilsky (*Kafer Europa's*, XXXV, 1899) dans son étude synoptique des *Mordel-*

Association française pour l'avancement des Sciences, 28^e sess., 1899. —

A. VIRÉ : Le monde souterrain : cavernes et animaux aveugles de France (fig.). — Notes diverses.

Boston Society of Natural History (Proceedings), XXIX, 1-8, 1899. —

G. DE N. HOUGH : Studies in Diptera Cyclorhapha. 1, The Pipunculidae of the United States. — M.-T. SUDLER : The Development of *Penilia Schmackeri* Richard (pl.).

Entomologische Nachrichten, XXVI, 5, 1900. — H. FRIESE : Neue exo-

lischen Schmarotzerbienen. — T. PIC : Diagnosen verschiedener *Phytoecia* aus dem Orient. — H. ROESCHKE : Carabologische Notizen VI. — H.-J. KOLBE : Ein vergessener *Nyctobates*. — J.-D. ALFKEN : Zwei neue *Colletes*-Arten des palaearktischen Gebietes. — *Xylocopa cantabrita* Lep. mas. — W. MEIER : *Timarcha* v. *Fracassi*. — *Chrysomela sirentensis*. — *Hippodamia* v. *equiseti*. — Dr F. KARSCH : Eine westafrikanische Embiide.

Entomologist (The), mars 1900. — *Oporabia autumnata* from Rannoch,

with reference to several other related Forms (pl.). — T.-D.-A. COCKERELL : New Insects from Arizona, and a new Bee from Mexico. — Variation of *Emydia cribrum* (Fig.). — T.-A. CHAPMAN : Note on *Anthocharis*. — G.-W. KIRKALDY : Notes on Jamaican Rhynchota, 2. — W.-J. LUCAS : British Dragonflies of the older English Authors. — C.-W. DALE : Notes on the great Earwig and other british Forficulidae. — G.-W. KIRKALDY : On *Aegaleus bechuana*, a new Species of Cimicidae, reported to injure Coffee-Berries in British Central Africa. — W. DE VISMES KANE : A Catalogue of the Lepidoptera of Ireland. — T.-A. CHAPMAN : On the Mould to Pupa in *Pterophorus*. — T.-D.-A. COCKERELL : Note on the Coccid Genus *Oudablis* Signoret. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes (La), n^o 353, 1900. — C. HOULBERT : Les

Orthoptères des environs de Sens. — G. DE ROCQUIGNY-ADANSON : Mœurs et habitudes des Lépidoptères. — M. PIC : Contribution à l'étude des *Notoxus* (Col.) d'Europe et des contrées avoisinantes.

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, V, 5, 1900. — E. WASSMANN :

Zur Kenntnis der termitophilen und myrmecophilen Cetoniden Süd-Afrikas (pl.). — F. MEUNIER : Ueber die Mycetophilen (*Sciophilinae*) des Bernsteins (fig.). — P.-N. CHOLODKOWSKY : Ueber den Geschlechtsapparat von *Parnassius Mnemosyne* L. (fig.). — O. SCHULTZ : Asymmetrie der Flügelzeichnung bei Lepidopteren (Tagfaltern, Schwärmern und Spinnern). — Notes diverses.

Instructor (El.), XVII, 9, 10, 1900. ☉

Naturaliste (Le), 312, 1900. — Nouvelles expériences relatives à la désinfection phylloxérique des plants de Vignes. — Apparition tardive des Lampyres en 1899. — M. PIC : Diagnoses de Coléoptères américains et asiatiques.

N. York Agricultural Experiment Station, nos 162-166, 1899. — L.-L. VAN SLYKE : Report of Analyses of Paris Green and other Insecticides.

Psyche, IX, 287, 1900 — J. MC NEILL : The Orthopteran genus *Trime-notropis*.

R. Arcademia dei Lincei (Atti), 1900, I, 4.

Revista Chilena de Historia natural, III, 12, 1899. — C.-E. PORTER : Datos para la fauna i flora de la Provincia de Atacama.

Revue électorique d'Apiculture, mars 1900 (2 exempl.).

Royal Society (The), LXVI, 425, 1900. ☉

Sociedad científica « Antonio Alzate » (Memorias y Revista), XII, 11 et 12, 1899. — X. RASPAIL : A propos d'un projet de réforme à la nomenclature des êtres organisés et des corps inorganiques. — A. L. HERRERA : Sur la réforme de la nomenclature.

Sociedad española de Historia natural (Actas), février 1900. — R.-P. NAVAS : Notas entomológicas. ☉

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire (Bulletin), janvier 1900. ☉

Société d'Histoire naturelle de Mâcon (Bulletin), 15-16, 1899-1900. — M. PIC : Les Coléoptères Anthicides du Centre de la France (pl.). — A. FLAMARY : Contribution au Catalogue des Diptères du Mâconnais. — M. PIC : Notes sur les Ichneumoniens de Digoin et ses environs (1^{er} supplément). — E. ANDRÉ : Une éducation de *Caligula japonica*.

South African Museum (Annals), 1, 3, 1899. — W. F. PURCHELL : New and little known South African Solifugae in the Collection of the South African Museum (fig.). — New South African Scorpions in the Collection of the South African Museum. — L. PÉRINGUEY : Description of twelve New Species of the Genus *Mutilla*. (Order Hymenoptera) in the South African Museum.

Tijdschrift voor Entomologie, 1899, III. — D. TER-HAAR : *Craniophora* (*Acronycta*) *ligustri* Fabr. var. *olivacea* Tutt (pl.). — P.-C.-T. SNELLEN : Eenige Aanteekeningen over exotische Lepidoptera (pl.). — H.-A.

DE VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL : Over de Stekels aan de voorschennen bij het genus *Agrotis* (pl.). — J.-C.-H. DE MEIJERE : Sur un cas de dimorphisme chez les deux sexes d'une Cécidomyide nouvelle (*Monardia* Van der Wulp) (pl.). — *Cyclopodia Horsfeldi* n. sp. eine neue Nycteribiide aus Java (fig.). — E. WASMANN : Weitere Nachträge zum Verzeichniss der Ameisengäste von Holländisch Limburg.

Union apicole, VI, 1 et 2, 1900. — ROUCH DE LADOUÉ : De l'importance du traitement d'hiver contre les parasites de la vigne et des arbres fruitiers. — Notes diverses.

Université de Toulouse. — 1^o Annuaire. — 2^o Bulletin, 1899-1900. ☉

U. S. National Museum (*Proceedings*), XXI, 1899. — J.-B. SMITH et H.-G. DYAR : Contributions toward a Monograph of the Lepidopterous Family *Noctuidae* of Boreal America : A Revision of the Species of *Acronycta* (Ochsenh.) and of certain allied Genera (pl.). — L.-O. HOWARD : On some new parasitic Insects of the Subfamily Encyrtinae. — M.-L. LINELL : On the Coleopterous Insects of Galapagos Islands. — D.-W. COQUILLETT : Report on a Collection of Japanese Diptera, presented to the U. S. National Museum by the Imperial University of Tokyo. — O.-F. COOK : American Oniscoid Diplopoda of the Order Meropoda (pl.). — C.-L. MARLATT : Japanese Hymenoptera of the Family *Tenthredinidae*. — MARY J. RATHBUN : A Contribution to a Knowledge of the Fresh-Water Crabs of America : The *Pseudotelphusinae* (fig.). — The Brachyura collected by the U. S. Fish Commission Steamer Albatross on the Voyage from Norfolk, Virginia, to San Francisco, California, 1887-1888 (pl.). — O.-F. COOK : African Diplopoda of the Genus *Pachybolus* (pl.). — The Diplopod Family *Striariidae* (pl.). — African Diplopoda of the Family *Gomphodesmidae* (pl.). — H. RICHARDSON : Key to the Isopods of the Pacific Coast of N. America, with Descriptions of twenty-two New Species (fig.). — W.-P. HAY : Description of a new Species subterranean Isopod (pl.).

Wiener Entomologische Zeitung, XIX, 1, 1900 (2 exempl.). — G. STROBL : Spanische Dipteren, VIII. — E. REITTER : Coleopterologische Notizen, LXXIII. — G. SEIDLITZ : Ueber *Leptura aquatica* L. und *Donacia dentipes* Fabr. — J. MIK : Dipterologische Miscellen (32, XIII). — J. MÜLLER : Coleopterologische Notizen.

A. L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 28 mars 1900.

Présidence de M. A. GIARD.

Correspondance. — M. le Dr M. Jaquet, de Bucarest, remercie la Société de son admission.

Distinctions honorifiques. — Le Président a le plaisir d'annoncer à la Société que nos collègues MM. E. André, L. Bedel, R. Blanchard, E. Chevreux et A. Montandon ont été récemment nommés Membres correspondants étrangers de la *Sociedad Española de Historia natural*, de Madrid.

Nécrologie. — Le Président a le profond regret d'annoncer à la Société la mort de M. le Dr Henri Beauregard, assistant d'Anatomie comparée au Muséum d'Histoire naturelle et professeur de Botanique cryptogamique à l'École de Pharmacie de Paris, décédé à Grasse après une longue maladie. — Le Dr Beauregard avait publié des travaux estimés sur l'anatomie des animaux supérieurs, notamment des Cétacés, des Oiseaux et des Poissons. Mais il était plus particulièrement connu dans le monde des entomologistes par les belles recherches qu'il poursuivit pendant dix ans sur l'organisation et le développement des Cantharidiens. Guidé par les brillantes découvertes de J.-H. Fabre et de Lichtenstein, Beauregard élucida bien des points obscurs de l'évolution des Vésicants, et l'important volume qu'il publia sur ces Insectes, en 1879, restera comme un de ses titres les plus sérieux à la reconnaissance des zoologistes.

Beauregard faisait partie de notre Société depuis 1834, et nous avons tous pu apprécier les rares qualités de cœur et d'esprit de ce regretté collègue.

Admission. — M. Ch. Mottaz, conservateur à la collection locale du Palais Eynard, Genève (Suisse). *Entomologie générale, Coléoptères.*

Présentation. — M. le Dr Paul Amans, 37, avenue de Lodève, Montpellier (Hérault) [*Mécanique des Arthropodes, vol des Insectes*], présenté par M. A. Giard. — Commissaires-rapporteurs MM. J. Anglas et G.-A. Poujade.

Changement d'adresse. — M. le Dr A. Joanin, 272, boulevard Raspail, Paris.

Captures et renseignements fauniques. — M. A. Giard signale la capture des Lépidoptères suivants, non rencontrés jusqu'à présent dans le Nord de la France :

1. *Epundu lichenea* Hb. — Pas rare à Wimereux (Pas-de-Calais) en septembre, sur les vieux murs; se dissimule parmi les Lichens à la façon des *Bryophila*. Cette espèce de l'Europe méridionale et occidentale, trouvée également dans le sud de l'Angleterre (Plymouth, Portland), remonte jusqu'au Pas-de-Calais grâce au climat marin. Elle n'est pas indiquée en Belgique.

2. *Hyponomeuta rorellus* Hb. — Commun en septembre sur les Saules (*S. cinerea* L., *S. caprea* L.) dans les dunes de Slack, à la pointe à Zoie entre Wimereux et Ambleteuse. N'attaque pas le *S. repens* L. si abondant dans cette localité.

3. *Platyptilia ochrodactyla* Hb. — Commun, dans la première quinzaine d'octobre 1899, sur les corymbes de *Tanacetum vulgare* L., le long des berges du nouveau bras de décharge de l'Escaut, à Valenciennes (Nord).

Ces trois espèces ne sont pas inscrites aux Catalogues de G. Le Roi et de A. Foucart. Le Catalogue des Lépidoptères de Belgique par Ch. Donckier de Donceel (S. E. B., 1882) signale *H. rorellus* (Liège) et *P. ochrodactyla* (Brabant, Liège, Val Benoît).

— M. L. Bedel indique une nouvelle localité française du *Platysma* (*Bothriopterus*) *angustatum* Duft. Cette Féronie, déjà signalée des départements du Nord et de l'Aube, a été trouvée par notre collègue M. L. Bleuse dans la forêt de Rennes (Ile-et-Vilaine). — Il est à noter que les *P. angustatum* Duft. et *P. oblongo-punctatum* F. coexistent aux environs de Rennes.

Communications.**Myriapodes recueillis en Espagne par le P. J. Pantel**

Par H.-W. BRÖLEMANN.

Les Myriapodes recueillis aux environs d'Uclès (prov. de Cuenca, Espagne) par notre collègue, le P. Pantel, et dont il a bien voulu nous confier l'examen, sont les suivants :

Lithobius insignis Meinert.

Lithobius gracilis Meinert (l'unique individu examiné, un ♂, est quelque peu différent de celui décrit par Meinert, mais ne peut pas constituer une espèce nouvelle).

Scolopendra mediterranea lusitanica Verhoeff.

Scolopendra cingulata hispanica Newport.

Geophilus ferrugineus C. Koch.

Geophilus hirsutus Porat.

Geophilus longicornis Leach.

Geophilus longicornis pseudotruncorum Verhoeff.

Himantarium superbum Meinert.

Une femelle de *Brachydesmus* (?).

Polydesmus Panteli, n. sp.

Une femelle de *Chordeumide* (?).

Description du :

***Polydesmus Panteli*, n. sp.**

♂ Longueur environ 13 mill. ; largeur au 10^e segment 1.50 mill.

Coloration brun-rosé (?), pattes concolores. Corps élancé, à bords parallèles, à téguments brillants. — 20 segments. — 30-31 paires de pattes.

Tête rugueuse et même densément ponctuée en arrière des antennes ; la face est presque glabre, mais les côtés de la tête sont plantés de soies courtes ; le sillon occipital est court. Antennes longues ; proportions des articles : 1^{er} art. 0.20 mill. ; 2^e art. 0.30 mill. ; 3^e art. 0.50 mill. ; 4^e art. 0.35 mill. ; 5^e art. 0.42 mill. ; 6^e art. 0.43 mill. ;

7^e et 8^e art. ensemble 0.40 mill.; total 2.30 mill. Diamètre du 6^e art. 0.20 mill.

Premier écusson (fig. 1) aussi large que la tête, à bord antérieur faiblement convexe, à bord postérieur sensiblement sinueux sur la ligne dorsale; les côtés sont formés de trois tubercules. La surface de tous les écussons, au lieu d'être mamelonnée comme chez les autres *Polydesmus*, est semée de tubercules coniques lisses, contigus, munis d'une soie à l'extrémité, rappelant la sculpture des *Trachelodesmus* ou des *Scytonotus*; les carènes aussi portent des tubercules semblables, mais un peu plus gros, faisant




Fig. 1. — Écussons 1 et 2.




Fig. 2. — Écussons 11 et 12.

suite aux rangées du dos. Sur le premier écusson quatre rangées; la rangée antérieure et la rangée postérieure sont assez régulières, mais les rangées médianes sont parfois disloquées.

Sur les autres écussons (fig. 2), trois rangées, dont la médiane comprend les plus gros tubercules. Le bord externe des carènes est formé de trois ou quatre tubercules, toujours précédés à l'angle antérieur d'une petite dent épineuse. Sur les segments qui sont privés de pores, on en compte trois; le tubercule postérieur (angle postérieur de la carène) n'est guère plus gros que son voisin de la même rangée. Sur les autres segments (5, 7, 9, 10, 12, 13, 15-19) le tubercule postérieur de la carène est beaucoup plus gros que tous les autres et il est divisé en deux lobes; c'est à la base du lobe antérieur que s'ouvre, sur la face dorsale, le pore répugnatoire. C'est seulement dans les derniers segments que le tubercule postérieur de la carène s'allonge et dépasse le niveau du bord postérieur de l'écusson. Le dernier écusson est conique et sa surface présente de petites saillies épineuses, réduction des tubercules des autres écussons. Les valves sont faiblement globuleuses, à bord libre en bourrelet. L'écaille sous-anale est

taillée en demi-hexagone, avec un tubercule sétigère à chaque angle.

Les pattes sont longues. Le troisième tarse est beaucoup plus long que le tibia.

Mâle. — Les hanches de la 7^e paire de pattes ambulatoires présentent près de la pointe une robuste verrue arrondie; celles de la 6^e paire sont un peu globuleuses. Entre les pattes de la 12^e paire (la paire postérieure du 9^e somite) la lame ventrale porte une lamelle perpendiculaire bilobée; chez un autre mâle, cette lamelle était divisée en deux pièces dans toute sa hauteur. Les hanches des pattes copulatrices sont constituées suivant le type connu, c'est-à-dire qu'elles




Fig. 3. — Patte copulatrice, profil interne.

sont plus larges que longues et que les brides trachéennes, en forme de cadre subrectangulaire, sont en contact sur la ligne médiane sans être soudées. La patte copulatrice (fig. 3) est arquée en faucille, à extrémité recourbée, avec deux dents spiniformes latérales au troisième quart environ de sa longueur. Du milieu de la courbure se détachent côte à côte deux rameaux courts, divergents (fig. 4); l'un, inférieur, est biacuminé; l'autre, supérieur, est arrondi à la pointe, celle-ci étant complètement couverte de papilles très courtes remplaçant le bouquet de soies usuelles; ces papilles dissimulent l'orifice des canaux (ou rainures) qui se voient par transparence de la chitine; l'un d'eux se prolonge jusqu'à la base de la patte, l'autre aboutit à une ampoule située dans le membre à la hauteur de la naissance des rameaux.




Fig. 4. — Patte copulatrice, détail plus grossi.

Descriptions de quelques Coléoptères malgaches

Par L. FAIRMAIRE.

Cicindela Horni, n. sp. — Long. 8 mill. — *Parum oblonga, parum convexa, supra capite prothoraceque viridi-aeneis, cupreo tinctis, modice nitidis, elytris olivaceis, extus virescentibus, utrinque trilunulatis, lunulis pallidis, angustis, humerali arcuata, interdum apice interrupta, mediana ad marginem haud dilatata, intus recte retro-angulata, apicali saepe postice oblitterata; capite inter oculos depresso et subtiliter striolato, oculis magnis, exsertis, clypeo brevi, obscure rufescente, labro flavo, luto, antice obtuso, leviter angulato et setoso, mandibulis piceis, basi fulvis, palpis fulvis, articulo ultimo piceo; prothorace subquadrato, transversim biimpresso, lateribus nitidiore et punctis grossis sparsuto, stria media parum impressa; elytris parum dense punctatis, punctis obscure coerulis, sutura apice coerulea, nitida et brevissime spinosula; subtus cyanea, nitida, abdomine laevi, pectore albo-piloso, femoribus coeruleis, paulo virescentibus, tibiis piceo-coerulescentibus, genubus et trochanteribus rufis.*

Environs de Suberbieville, sous des pierres humides, dans une forêt (H. Perrier); très rare.

Cette petite Cicindèle est fort intéressante par sa grande ressemblance avec la *C. decempunctata* Dej., de l'Inde; elle en diffère par les élytres plus courtes, le corselet à côtés moins droits, la coloration moins terne, plus verdâtre sur les côtés des élytres, par la lunule humérale entière, parfois un peu interrompue avant l'extrémité, mais ne formant pas une tache discoïdale, la médiane plus étroite, bien angulée; la ponctation est distincte, plus forte à l'extrémité et les trochanters rougeâtres comme les genoux.

Je dédie cet insecte à notre collègue M. le Dr Horn en souvenir de son obligeance et de sa libéralité.

Pogonostoma vestitum, n. sp. — Long. 16 à 17 mill. — *Atro-coerulescens, vix nitidulum, capite prothoraceque antice sat longe, elytris brevius et parcius rufo-villosulis, capite subtiliter rugosulo, inter oculos levissime impresso, labro magno, medio convexo; prothorace oblongo-ovato, antice et postice fere similiter constricto et transversim sulcato, subtiliter dense rugosulo, postice magis transversim sed leviter strigosulo, stria dorsali subtiliter impressa; elytris cylindraceis, fortiter ac dense ruguloso-punctatis, apice paulo oblique sinuato-truncatis et*

extus spinosis, subtus cum pedibus laeve, his levissime violaceo tinctis.

Environs de Suberbieville (H. Perrier).

Ressemble à *P. brevicorne* Horn, mais moins grand, plus mat, avec la tête à peine impressionnée, le corselet moins ridulé en avant, les élytres plus fortement ponctuées, à impression antérieure moins forte, la suture non déhiscente à l'extrémité, et enfin la villosité rousse qui couvre le dessus du corps, assez longue et assez dense sur le devant de la tête et du corselet, plus courte et plus fine sur les élytres. Sous le rapport de la vestiture ressemble au *meridionale* Fleut., mais plus grand, avec la pubescence couvrant la tête et le devant du corselet où elle est plus longue et plus serrée que sur les élytres, la coloration est d'un noir bleu, pas tout à fait mate, plus bleue en dessous, les mandibules sont entièrement d'un brun de poix, le corselet est finement rugueux et la troncature des élytres est biépineuse chez le ♂, fortement angulée en dehors chez la ♀.

Pogonostoma Perrieri, n. sp. — Long. 11 à 13 mill. — *Gracile, nigrum, vage coerulescens, opacum, subtiliter fulvo-pubescens, capite paulo evidentius; capite prothoraceque dense subtiliter coriaceis, hoc subtilissime transversim strigosulo, profunde transversim bisulcato, strin dorsali vix perspicua, capite inter oculos obsolete biimpresso; elytris dense sat subtiliter rugosulo-punctatis, basi fortius; subtus magis coeruleum et nitidum, subtiliter coriaceum; ♂ abdomine segmento 5° apice rufescente, medio oblonge impresso et bicostulato, ultimo rufo, asperato, elytris apice oblique truncatulis, extus angulatis, angulo suturali obtuso; ♀ abdomine segmento 5° profunde foveato, elytris apice truncatis, extus rotundatis.*

Environ de Suberbieville (H. Perrier).

A la différence des autres *Pogonostoma*, celui-ci s'envole quand on veut le saisir.

Très voisin du *Kraatzi* Horn, en diffère, pour le ♂, par le chapeçon plus velu, le corselet plus large et plus arrondi sur les côtés, finement ridé en travers à la base; les antennes sont presque aussi longues que le corps. La base de la lèvre est velue.

Gaurambe minor, n. sp. — Long. 3 mill. — Ressemble extrêmement au *colobicoides* Fairm., même forme et coloration presque semblable, mais taille notablement plus faible, tête bituberculée entre les yeux, antennes semblables, mais 1^{er} article moins gros, roux comme le funicule, corselet très inégal, impressionné de chaque côté à la

base, moins rétréci en avant, plus arrondi aux angles postérieurs, le disque non rembruni, les angles antérieurs bien plus arrondis, les élytres plus courtes, non striées, ayant de fines côtes longitudinales dont les interstries ont une double rangée de points serrés, le tout parsemé de soies roussâtres soyeuses; la teinte foncière est plus pâle.

Suberbieville (H. Perrier); un seul individu.

Aspurgus, n. g.

Ce nouveau genre est extrêmement voisin des *Nicarete* dont il diffère par un corps plus robuste, la tête plus large, le chaperon largement tronqué, les yeux plus étroits, les saillies antennaires bien moins saillantes, les antennes n'ayant en dessous que quelques soies distantes, le 3^e article aussi long que les 2 premiers réunis, le corselet à côtés non parallèles, la saillie intercoxale large, très obtuse, les pattes également courtes et robustes, mais avec les fémurs plus larges, un peu comprimés, ayant en dehors une sorte de plaque ou large impression occupant presque la totalité et bordée d'un fin liséré lisse; les tibias sont assez fortement élargis à l'extrémité et les tarses sont larges, concaves en-dessous.

A. cinerarius, n. sp. — Long. 28 mill. — Plus grand et plus épais que les *Nicarete*, brun, couvert d'un enduit cendré, mais fuligineux à la base des élytres, sur la tête et le corselet, avec une tache vague cendrée à la base de chaque élytre et une bande longitudinale de même couleur, peu distincte sur le milieu du corselet. La tête est courte, un peu élargie en avant, fortement sillonnée entre les antennes, ce sillon se terminant en une ligne courte, saillante, au milieu du chaperon qui est tronqué; les antennes sont robustes, plus longues que le corps, à peine ciliées en dessous, le 1^{er} article atteint presque la base du corselet. Ce dernier plus étroit que les élytres est presque carré, faiblement atténué vers la base, très rugueux, avec 2 sillons transversaux bien marqués. L'écusson est presque arrondi, un peu déprimé au milieu. Les élytres sont longues, angulées aux épaules, atténuées de la base à l'extrémité qui est à peine tronquée, très arrondie en dehors, ruguleuses à la base qui est un peu aplanie sur les épaules, la ponctuation est mélangée d'assez gros points écartés et de petites taches d'un rubigineux clair. Les tibias sont épais, plus fortement à l'extrémité et marqués avant d'une tache brune, les tarses sont épais, le pénultième article est bilobé, les crochets sont robustes; l'abdomen est couvert d'une pubescence grisâtre assez brillante.

Farafangana (Blucheu), un seul individu; ma collection.

Les fémurs de cet insecte sont remarquables.

Descriptions de deux Elmides nouveaux de France [COL.]

Par E. ABEILLE DE PERRIN et A. GROUVELLE.

Esolus galloprovincialis Ab., n. sp. — Long. 1 1/2 mill. — Allongé, convexe, d'un brun noir mi-brillant en-dessus, avec pubescence dorée; antennes et pattes rousses. Corselet déclive en avant, à côtés presque droits, orné d'une ligne longitudinale de chaque côté, naissant de la 4^e strie et parallèle aux côtés du thorax. Élytres très allongés, presque parallèles, à apex très prolongé, marqués de rangées striales de points assez gros et assez réguliers affaiblis postérieurement, portant, le long du 7^e intervalle, une carène saillante n'atteignant pas tout à fait le sommet de l'élytre; intervalles plans, chagrinés.

Cette espèce, qui diffère de l'*angustatus* par le parallélisme et l'allongement de l'ensemble de son corps, n'est pas rare dans les ruisseaux des environs montagneux de Marseille, tels que la chaîne de l'Étoile, les vallons au-dessus de Saint-Pons jusqu'à la Sainte-Baume; elle se retrouve à St-Martin de Vésubie, col de Raus, Borréon, etc. (Buchet, Sainte-Claire-Deville).

Riolus meridionalis A. Group., n. sp. — Long. 2 mill. — En ovale court, déprimé, peu luisant, garni de poils jaunes très appa-
rents, disposés en séries étroites sur les interstries, surtout sur les 3^e et 5^e, qui sont un peu saillants, une forte carène sur le 7^e interstrie, allant presque jusqu'au bout de l'élytre. Corselet large, sans dépression oblique, à côtés sinueux, à angles postérieurs divariqués et précédés d'une légère échancrure. Élytres courts, subparallèles, à stries fortement ponctuées, interstries fortement chagrinés en travers. Antennes rouges, pattes assombries.

Montpellier (Hérault), où il a été pris par M. Valéry Mayet; Cabasse, près de Brignoles (Var), un seul exemplaire pris dans l'Issolle par M. Henri Caillol.

Très distinct de tous les autres par son corps large, déprimé et à interstries impairs fortement villeux.

Note sur la nymphe de *Coelostoma hispanicum* Küst. [COL.]

Par L. BEGUIN BILLECOCQ.

Cette nymphe est longue d'environ 4 mill. $1/2$; elle est blanche avec les yeux noirs. Elle porte sur le bord antérieur du prothorax une rangée de poils dressés, longs et mous. Chacun des segments abdominaux est muni d'un poil dressé au bord latéral. L'abdomen est terminé par deux appendices allongés, légèrement courbés intérieurement à l'extrémité.

La nymphe de *C. hispanicum* remue l'abdomen lorsqu'elle est inquiétée et se déplace assez facilement au moyen des crochets anaux. Je l'ai trouvée en septembre, au bord de la Creuse, à Jartraux (Indre). Elle habitait une petite loge creusée dans le sable humide sous une pierre enfoncée.

Description d'une nouvelle espèce de Microlépidoptère de France

Par P. CHRÉTIEN.

♂ - **Lita mucronatella**, n. sp. — Envergure 10-12 mill. — Ailes supérieures étroites, brunes, tachées de jaunâtre par places, avec les bandes ou taches ordinaires blanches, salies d'écailles brunes, présentant en outre un empâtement noir près de la base et du bord interne, un trait noir dans le pli après la bande oblique blanche, un point noir assez gros, placé obliquement au-dessus, près de la tache blanche médiane, une tache jaunâtre au bout du disque entre deux traits noirs, dont le dernier sépare les taches blanches opposées; espace terminal noir; franges brunes, indistinctement divisées en plus foncé, extrémité grise. Ailes inférieures grises, luisantes; franges brunes, un peu jaunâtres à la base. Antennes brunes, annelées de gris; palpes, tête, thorax; bruns; abdomen gris plombé, zoné de brun.

Chenille allongée, blanc verdâtre, à premier segment entièrement brun rougeâtre, verruqueux très petits et bruns, poils blancs, tête et écusson noirs, les deux premières paires de pattes écailleuses noires extérieurement, la 3^e paire et le clapet bruns. Cette chenille vit dans une galerie soyeuse le long des tiges d'*Alsine mucronata* L. dont elle mange surtout les feuilles. Elle est à taille en juillet et se transforme dans un petit cocon de soie blanchâtre parmi les détritux végétaux à la surface du sol.

La chrysalide est brun jaunâtre, plus foncé et noirâtre à l'extrémité

anale, qui est obtuse, avec trois petits mamelons et ceinturée de quelques poils raides brun jaunâtre dont les supérieurs sont les plus longs.

Le Papillon, qui est voisin de *L. gypsophilae* St., vole en août, à une altitude de 2.000 mètres et au-dessus, dans les Hautes-Alpes.

Note sur des *Phytoecia* du sous-genre *Helladia* [COL.]

Par Maurice Pic.

I. — Sur *Helladia edessensis* Reitter et *adelpha* Ganglb.

Une récente communication de M. E. Reitter m'a permis de constater que *Helladia damascena* Pic (*Bull. Fr.*, 1899, p. 240) n'est qu'une variété de *H. edessensis* Reitt. (*Deuts. Ent. Zeits.*, 1898, p. 358), espèce connue de Syrie et d'Asie Mineure.

Le tableau suivant facilitera la distinction de la forme type de cette espèce et des deux variétés actuellement connues :

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Coloration des 4 pattes postérieures entièrement foncée. Pubescence élytrale soit distinctement jaunâtre et dense, soit d'un gris jaunâtre et peu serrée..... | 2. |
| 1' Coloration des 4 pattes postérieures au moins en partie claire. Pubescence élytrale un peu jaunâtre, ordinairement peu serrée. — Urfa (Edessa), Akbès [coll. Reitter et Pic]...
..... <i>edessensis</i> Reitt. | |
| 2. Pubescence élytrale distinctement jaunâtre et dense. Prothorax orné sur le disque d'une macule testacée bien marquée. — Damas [coll. Pic]..... | var. <i>damascena</i> Pic. |
| 2' Pubescence élytrale d'un gris jaunâtre et peu serrée. Prothorax à macule discale testacée presque nulle. — Urfa (Edessa) [coll. Reitter]..... | var. <i>urfanensis</i> Reitt. |

Quant à la var. *scapopicta*, attribuée à cette espèce par M. Reitter, je crois devoir la rapporter à *adelpha* Ganglb., comme variété, à cause de la pubescence grisâtre du dessus du corps, de celle plus claire de l'écusson et de la bande médiane prothoracique. La var. *scapopicta* Reitt. se reconnaîtra facilement à la coloration des membres bien plus claire que chez *H. adelpha* Ganglb. forme type, et aussi à la pubescence moins fournie sur les élytres.

Ph. adelpha, d'après un type obligeamment communiqué par M. L. Ganglbauer, a les 1^{ers} articles des antennes et les 4 pattes posté-

rieures foncés, de plus, la pubescence élytrale est très fournie, voyant presque complètement la ponctuation.

Je possède *adelpha* Ganglb., ou variété, d'Akbès (Ch. Delagrangé) et Mersina (Pic).

II. — Sur *Helladia scapulata* Muls. et var. *mersinensis*.

Mulsant (*Op.*, 1, p. 54) a décrit *H. scapulata*, provenant de Syrie, en lui donnant comme caractères : les 2 premiers articles des antennes noirs et les cuisses intermédiaires foncées ou presque foncées, etc. J'ai capturé à Mersina, en Caramanie, une variété de cette espèce offrant les 4 pattes postérieures plus ou moins largement claires et les antennes à 1^{ers} articles testacés (long. 9-10 mill.); je la désignerai sous le nom de var. *mersinensis*, var. nov.

Cette variété correspond à peu près à la var. *scarpicta* Reitt. de *adelpha* Ganglb.

III. — Habitats de *Helladia ferrugata* Ganglb.

M. Ganglbauer a décrit *H. ferrugata* sur des exemplaires récoltés à Haïfa, en Syrie. Je possède cette espèce de la région d'Akbès et je l'ai recueillie en Palestine à Jérusalem et entre Bethléem et Mar-Saba.

NOTA. — Préparant une étude synoptique sur les *Phytoecia*, ou au moins le groupe des *Helladia*, je serai reconnaissant à ceux de nos collègues qui voudraient bien me communiquer des matériaux pour rendre mon étude plus complète et meilleure.

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1900, I, 11 et 12. —

E.-L. BOUVIER : Sur l'origine et les enchaînements des Arthropodes de la classe des Onychophores (*Peripatus* et formes voisines). —

L. BORDAS : Étude anatomique des organes générateurs mâles des Coléoptères à testicules composés et fasciculés.

Académie des Sciences de Cracovie (*Bulletin international*), janvier 1900. ☉

Agricultural Gazette of N. S. Wales, XI, 2, 1900. — W. FROGGATT :

Notes on Australian Coccidae, (pl.). — A. GALE : The Queen Bee.
— Bee Calendar.

Biologia Centrali-Americana, 1899, 1900. — VAN DER WULP : Diptera, II, pp. 409-428 (fig.), pl. 12. — C. CHAMPION : Rhynchota-Heteroptera, II, pp. 265-304, pl. 16-18. — W. FOWLER : Rhynchota-Homoptera, II, pp. 249-264, pl. 16. — T.-D.-A. COCKERELL : Fam. Aleurodidæ, pp. 1-33, fig.

Buffalo Society of Natural Sciences (Bulletin), VI, 2-4, 1899. ☉

Canadian Entomologist (The), mars 1900. — J.-A. MOFFAT : *Hydroecium stramentosa* Guen. (pl.). — J.-D. TINSLEY : Contributions to Coccidology, II. — A.-N. CAUDELL : A new Species of *Sinea*. — A.-R. GROTE : A new popular name for *Clisiocampa disstria*. — J. G. NEEDHAM : Nymphs of northern Odonata still unknown. — J.-O. MARTIN : A Study of *Hydrometra lineata* (fig.). — J. McNEIL : *Orchelimum* Serv. — H.-G. DYAR : Notes on Some North American *Hyponomeutidae*. — T.-W. FYLES : Further Observations upon *Bombyx cuneu* Drury, etc. — A.-G. BUTLER Note on *Cyaniris pseudargiolus* of Boisduval and Le Conte. — T.-D.-A. COCKERELL : A new Oak-gall from New Mexico. — G.-M. DODGE : *Pyrameis huntera*, n. var. *fulva*.

Comptes rendus du Congrès des Sociétés savantes de Paris et des Départements, 1900. — A. VIRÉ : Cavités souterraines des Causses et des Pyrénées.

Entomologist's Record and Journal of Variation, mars 1900. — H.-R. BROWN : Digne Revisited. — T.-A. CHAPMAN : Notes on the Fumeids, with descriptions of new Species and varieties. — M. BURR : British Dragonflies. — M. DE LA B. NICHOLL : Bulgarian Butterflies. — J.-W. TUTT : Migration and Dispersal of Insects : Lepidoptera. — E. WASMANN : The Guests of Ants and Termites (pl.). — N. ALLANDALE : Notes on Orthoptera in the Siamese Malay States. — Notes diverses.

Eckönyce. — *Jahresheft des naturwissenschaftlichen Vereines des Trencsiner Comitatus*, 1900. — Dr C. BRANCSIK : Additamenta ad faunam Coleopterorum Comitatus Trencsiniensis. — Aliquot Coleoptera nova Russiae asiaticae. — Additamenta ad faunam provinciae russiae asiaticae Transcaspiæ. — Traité sur la faune des Orthoptères de l'Afrique centrale (titre et texte hongrois).

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, V, 6, 1900. — E. WASMANN : Zur Kenntniss der termitophilen und myrmekophilen Cetoniden Südafrikas. — Dr HOFMANN : Zur Naturgeschichte der Micropterygi-

den (fig.). — PR. P. BACHMETJEW : Der kritische Punkt der Insekten und das Entstehen von Schmetterlings-Aberrationen (fig.). — Petites Communications originales.

Naturaliste (Le), 15 mars 1900. — M. PIC : Description de Coléoptères nouveaux. — P. CHRÉTIEN : Les *Coleophora* du *Dorycnium*. — F. PLATEAU : Un cas probable de mimétisme défensif chez la Ranatre.

New-York Academy of Sciences. — Statuts et Liste des Membres, 1899.

Novitates zoologicae, VII, 1, 1900. — W. ROTHSCHILD : Descriptions of the hitherto unknown female of *Ænetus mirabilis* Rotsch. — W.-J. HOLLAND : The Lepidoptera of Buru, I, *Rhopalocera*. — H. GROSE-SMITH : Descriptions of new Species of Butterflies captured by Mr. A. S. Meek at Milne Bay, British N. Guinea, in the Museum of the Hon. W. Rothschild at Tring. — W. WARREN : New Genera and Species of *Thyrididae* and *Geometridae* from Africa. — New Genera and Species of *Drepanulidae*, *Thyrididae*, *Epiplemidæ* and *Geometridæ* from the Indo-Australian and palaearctic Regions.

Revista Chilena de Historia natural, IV, 1, 1900. — F.-W. NEGER : Sobre algunas Acallas nuevas Chilenas. — Dr F.-T. DELFIN : Datos para el conocimiento de los Coleópteros e Himenópteros del departamento de Talcahuano. — C.-E. PORTER : Especies nuevas de Coleópteros.

Revue des Revues d'Histoire naturelle, I, 6, 1900. — J.-H. FABRE : Le chant du Grillon. — Dr J. PELLEGRIN : La Puce chique à Madagascar. — Notes diverses.

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, mars 1900. — E. OLIVIER : Em. Blanchard (not. nécrologique).

Royal Society (Proceedings), n° 426, mars 1900. ☉

Smithsonian Institution (Annual Report of the Board of Regents). — Report of the U. S. National Museum, 1899. ☉

Societas Entomologica, XIV, 24, 1900. — L. BAYER : Uebergangsformen bei Caraben. — C. FRINGS : Beobachtungen an zwei Raupenarten. — P. BORN : Meine Exkursion von 1899.

Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France (Bulletin), IX, 4, 1899. — ABBÉ J. DOMINIQUE : Note sur *Ibalia leucospoides* Hoch. (pl.).

Société des Sciences naturelles et d'Enseignement populaire de Tarare (Bulletin), 15 février 1900. ☉

Société Entomologique de Belgique (Annales), IV, 2, 1900. — WILLEM :

Deux formes nouvelles d'Isotomiens : *Isotoma Stagnalis* et *I. tenebricola*. — E. BRAY : Lépidoptères capturés aux environs de Virton. — J.-C.-H. DE MEYERE : Matériaux pour l'étude des Diptères de la Belgique. — M. BURR : Forficules exotiques du Musée royal d'Histoire naturelle de Bruxelles. — A. FOREL : *Ponerinae* et *Dorylinae* d'Australie. — E. CANDÈZE : Élatérides nouveaux.

Société Linnéenne du Nord de la France (Bulletin), janvier 1900. ☉

Tijdschrift voor Entomologie, XLII, 4, 1899. — A.-W. VAN HASSELT : Een buitengewoon Spinnen-Verblijf (pl.). — K.-J. KEMPERS : Het Adersysteem der Kevervleugels (pl.). — P.-C. SNELLEN : Eenige Opmerkingen over *Incurvaria capitella* L. — Beschrijving van *Lycaena Bathinia* Snell. — D^r TH. OUDEMANS : *Trichiosoma lucorum* L., eene biologische Studie.

Union apicole (L'), mars 1900. — A. DELAIGUES : Les Abeilles et les Fleurs. — Entomologie agricole : Le *Phylloxera*.

U. S. Department of Agriculture. — Division of Entomology, New Series, Bulletin 22, 1900. — L.-O. HOWARD : The Two most abundant Pulvinarias on Maple (*Pulvinaria innumerabilis* Rathw. and *P. acericola* W. et R.), fig. — The Insects to which the name « Kissing Bug » became applied during the Summer of 1899 (fig.). — W.-D. HUNTER : An Investigation to determine whether *Melanophus spretus* breeds permanently in the Turtle Mountains in North Dakota. — F.-H. CHITTENDEN : The Bronze Apple-Tree Weevil (*Magdalis aenescens* Lec.), fig. — D.-W. COQUILLETT : The new Cecidomyians destructive to buds of Roses (fig.). — A new Violet Pest (*Diplosis violicola* n. sp. (fig.)). — F.-H. CHITTENDEN : Food Plants and Injury of North American Species of *Agrius*. — Insects and the Weather : Observations during the Season of 1899. — H.-D. HEMENWAY : Experiments with Hydrocyanic Acid-Gas as a means of exterminating Mealy Bugs and other Insects in Greenhouses. — D^r L. REH : Scale Insects on American Fruit imported into Germany. — F.-G. HAVENS : Insect Control in Riverside, California. — A. BUSCK : Notes on a Brief Trip to Puerto Rico in January and February 1899. — Notes diverses.

Wiener Entomologische Zeitung, XIX, 2-3, 1900 (2 exempl.). — L. MELICHAR : Beitrag zur Kenntniss der Homopteren-Fauna von Sibirien und Transbaikal. — M. BERNHAUER : Neue Staphyliniden (Col.) aus dem Kaukasus und den angrenzenden Ländern. — M. BEZZI : Zur Synonymie und Verbreitung des *Psammoreyter vermiles* Deg. Ein

dipterologischer Beitrag. — L. MELICHAR : Eine neue Art der Homopteren-Gattung *Aphrophora*. — G. STROBL : Spanische Dipteren, IX. — J. MIK : Dipterologische Miscellen (2 Serie, XIV, Sammt Inhaltsübersicht der Dipt. Miscellen 2 Serie, Nr. 1-100). — LOKAI : Eine neue *Leptusa* (Col.) vom Altvater-Gebirge. — R. FORMANCK : Coleopterologische Notizen. — J. MIK : Ein neuer *Thinophilus* (Dipt.) von Sardinien.

ALLUAUD (CH.) : Contributions à la faune entomologique de la région malgache, VII. (*Bull. Soc. Ent. Fr.*), 1899, 5 p.*

Id. : Deux Coléoptères nouveaux du Sud-Est de Madagascar. (*Bull. Mus. Hist. nat.*), 1899, 2 p.*

BEDEL (L.) : Diagnoses de deux nouveaux *Dromius* de Barbarie. (*Bull. Soc. Ent. Fr.*), 1900, 2 p.*

Id. : Diagnose d'un nouveau Mylabre Saharien. — L. BLEUSE : Description d'un Mylabre du Sud-Oranais. (*loc. cit.*), 1899, 2 p.*

BERG (C.) : Los Mantispidos de la República Argentina. (*Com. Mus. nac. B.-Ayres*), 1899, 7 p.*

Id. : El género *Rhyephenes* Sch. en la República Argentina. (*loc. cit.*), 1899, 4 p.*

Id. : Notas hemipterológicas. (*loc. cit.*), 1899, 3 p.*

Id. : Sobre algunos Anisomórfidos chileno-argentinos. (*loc. cit.*), 1899, 6 p.*

BRÖLEMANN (H.-W.) : Forêt de Lyons (Myriapodes), V. (*Feuilles J. Nat.*), 1899, 4 p.*

Id. : Myriapodes du Bourg-d'Oisans et de la Meije. (*Ann. Univ. Gren.*), 1899, 10 p., grav.*

CARPENTIER (L.) : Nervations anormales de Tenthredinides. (*Rev. quest. Scient.*), 1899, 4 p.*

DOLLFUS (AD.) : Note sur les Isopodes terrestres et fluviatiles de Syrie, recueillis principalement par M. le Dr Th. Barrois. (*Rev. biol. Nord Fr.*), 15 p., 2 pl. — Don de M. L. Bedel.

A. L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 11 avril 1900.

Présidence de M. A. GIARD.

Correspondance. — M. Ch. Mottaz, de Genève, remercie la Société de son admission.

Distinction honorifique. — Le Président a le plaisir d'annoncer à la Société que notre collègue M. L. Bedel a été tout récemment élu membre honoraire de la Société entomologique de Berlin.

Admission. — M. le Dr Paul Amans, 37, avenue de Lodève, Montpellier (Hérault). *Mécanique des Arthropodes, vol des Insectes.*

Présentation. — M. Edmond Lamoureux, architecte, 44, villa Chaptal, Levallois-Perret (Seine) [*Lépidoptères*], présenté par M. P. Mabille. — Commissaires-rapporteurs MM. l'abbé J. de Joannis et L. Viard.

Revision du Règlement. — Au nom du Conseil, M. Ph. François donne lecture du rapport suivant :

Messieurs,

Dans la séance du 28 février dernier, notre collègue M. Ch. Alluaud a déposé entre les mains du Président une demande de révision du Règlement de notre Société.

Conformément à l'article 34 de nos Statuts et Règlement, votre Conseil s'est réuni et a entendu l'auteur de la proposition; ses réunions ont eu lieu les lundis 12, 19, 26 mars dernier et 2 avril courant.

Le Conseil a examiné successivement tous les articles du Règlement et a décidé de vous proposer pour quelques-uns d'entre eux des modifications ou des suppressions, et pour quelques autres des adjonctions qui lui semblent en rapport avec les besoins actuels de notre Société.

Notre situation financière, vous le savez, est suffisamment prospère;

mais une plus grande prospérité serait désirable. Le changement de format de nos publications, que vous avez décidé récemment, n'aura sans doute pas lieu sans une légère augmentation de dépense; l'accroissement normal et continu de notre bibliothèque et de nos collections, l'accumulation de nos publications, font prévoir à brève échéance le moment où nous serons réduits à la nécessité de donner à notre local une plus grande extension.

Il a semblé à votre Conseil qu'il serait possible d'attirer à nous de nouveaux souscripteurs en créant des catégories de membres, *bienfaiteurs* ou *donateurs*, création qui encouragerait la libéralité de personnes susceptibles de faire à notre Société des donations d'une certaine importance.

La plupart des autres articles proposés sont nécessités par des situations nouvelles résultant des progrès incessants de notre Société et qui ne pouvaient pas être prévues par le Règlement actuellement en vigueur.

Dans cet ordre d'idées, il faut citer notamment la publication du *Bulletin*; l'importance prise par ce périodique depuis sa séparation d'avec les *Annales* exige une réglementation spéciale. Il en est de même pour les collections conservées ou en formation au siège de la Société.

Enfin le Conseil a pensé qu'il y aurait lieu de simplifier le mode de scrutin pour les élections des membres effectifs et de ne plus laisser indéfiniment vacantes les places de membres honoraires. Les élections pour ces dernières auraient lieu chaque année, à une époque fixe, dans les formes prescrites par le Règlement.

Dans l'énumération suivante des propositions du Conseil, il n'est pas fait mention des modifications déjà consacrées par des votes postérieurs à la rédaction du Règlement actuel et dont il sera tenu compte dans la rédaction du nouveau Règlement.

Articles proposés.

ART. 4. — Pour faire partie de la Société à titre de *Membre effectif*, il faut être présenté par un de ses membres et par écrit; en cas de minorité une autorisation écrite du père ou du tuteur du candidat est exigée.

Le Président désigne deux commissaires pour examiner la candidature.

Dans la séance suivante la Société vote sur les conclusions des rapporteurs.

Le scrutin secret peut être demandé par écrit; il a lieu à la majorité absolue des suffrages.

ART. 5. — Des entomologistes âgés de moins de 21 ans, présentés ⁽¹⁾ par un *Membre effectif*, peuvent être admis à titre de *Membres assistants*, avec l'autorisation écrite de leur père ou tuteur, et après avis conforme de la Société.

Ils n'ont ni le droit de vote ni le droit de faire des communications; il leur est interdit d'emprunter des ouvrages de la bibliothèque, ils peuvent seulement les consulter sur place.

A leur majorité, les *membres assistants* sont tenus de se faire recevoir *membres effectifs*. Sur leur demande écrite, portée par le Président à la connaissance de la Société, ils sont admis sans autre formalité; sinon ils sont exclus de plein droit.

ART. 6. — (*Après le premier paragraphe.*)

Les membres français paient en outre un franc et les membres étrangers deux francs pour recevoir franco les publications de la Société.

ART. 8. — (*Supprimé.*)

ART. 10. — (*Après le troisième paragraphe.*)

Ce versement pourra s'effectuer par fractions annuelles et consécutives d'au moins cent francs; mais la libération ne sera acquise qu'après le versement de la dernière fraction.

Toute somme versée reste dans tous les cas acquise à la Société.

ART. 11 bis. — Sont *Membres bienfaiteurs* les personnes qui ont versé, à une époque quelconque, une ou plusieurs souscriptions de 500 francs; ces membres reçoivent gratuitement, pendant toute leur vie, autant d'exemplaires des publications de la Société qu'ils ont versé de fois la souscription de 500 francs. — La Société pourra également reconnaître comme *bienfaiteurs* les personnes qui lui auront donné ou légué des collections, des ouvrages scientifiques, etc., ou qui lui auront rendu tel service important qu'elle jugera mériter ce titre.

ART. 11 ter. — Sont *Membres donateurs* les personnes ayant versé, à une époque quelconque, une somme d'au moins 200 francs.

Les *donateurs*, s'ils ne sont pas membres effectifs, ne reçoivent pas les publications de la Société.

(1) Cette présentation doit être écrite et faire mention de l'âge du candidat.

Les noms des *Membres bienfaiteurs* et *donateurs* figurent perpétuellement en tête de la liste des membres de la Société.

ART. 12. — (3^e paragraphe.)

Elle peut aussi nommer un Président d'honneur.

ART. 13. — (A la place des 2 premiers paragraphes).

Chaque année, dans la première séance d'octobre, la Société, s'il y a lieu, nomme une Commission de cinq membres, chargée de présenter, à la séance suivante, une liste de candidats au titre de *Membre honoraire*; cette liste est insérée dans le *Bulletin* et le vote renvoyé à la seconde séance suivante.

ART. 24. — Les secrétaires adjoints sont spécialement chargés de la rédaction et de la publication du *Bulletin*.

ART. 30 bis. — Une commission dite *commission des collections* est chargée de veiller à la conservation et à l'entretien des collections de la Société.

Cette commission, nommée pour trois ans, est composée de sept membres élus au scrutin de liste et à la majorité relative des suffrages; ces sept membres sont rééligibles.

La commission des collections dispose des sommes affectées aux collections; elle doit présenter tous les ans, à la séance du Congrès, un rapport sur l'état des collections et sa gestion pendant l'année écoulée.

ART. 32. — (9^e paragraphe, note.)

Les membres désirant faire des communications ou déposer des travaux écrits sont priés d'en donner les titres au secrétaire au commencement de la séance.

(10^e paragraphe, note.)

Les manuscrits doivent être écrits très lisiblement et seulement au recto des pages. Ils doivent être disposés dans la forme en usage dans les publications de la Société et ne porter d'autres indications typographiques que les signes conventionnels adoptés par l'imprimerie de la Société.

Les manuscrits ne remplissant pas ces conditions seraient retournés à leurs auteurs pour être recopiés.

Ces dispositions s'appliquent également aux travaux écrits déposés pour les *Annales*.

ART. 40. — Les publications de la Société comprennent :

1^o Les publications régulières.

I. Le *Bulletin de la Société entomologique de France*, paraissant deux fois par mois (août et septembre exceptés).

II. Les *Annales de la Société entomologique de France*, paraissant par fascicules trimestriels.

2° Les publications exceptionnelles.

I. *L'Abeille*, journal d'Entomologie.

II. Les Tables générales des *Annales* et du *Bulletin*.

III. Les monographies, faunes, catalogues ou autres publications que la Société pourrait entreprendre en dehors de ses publications régulières.

ART. 42. — (1^{er} paragraphe.)

Chaque membre n'a droit par séance qu'à deux pages d'impression au maximum dans le *Bulletin*.

(Et après le 2^e paragraphe.)

Toute communication excédant les limites précédentes sera renvoyée d'office à la Commission de publication et réservée aux *Annales*, à moins que l'auteur ne déclare par écrit, en remettant son manuscrit, qu'il s'engage à payer les frais supplémentaires ⁽¹⁾. Toutefois, dans ces conditions, l'ensemble d'une communication ne pourra excéder quatre pages d'impression au total ⁽²⁾.

ART. 42 bis. — Lorsque les communications comportent des figures dans le texte, les auteurs sont tenus de faire parvenir leurs dessins ⁽³⁾, au secrétaire, quatre jours au moins avant la séance où la communication doit être faite; faute de quoi la publication pourra être renvoyée au *Bulletin* de la séance suivante.

Les clichés sont exécutés par la Société aux frais des auteurs.

ART. 42 ter. — Le Secrétaire fait parvenir aux auteurs une épreuve qui doit lui être retournée dans les trois jours; passé ce délai il ne peut être tenu compte des corrections.

Les corrections ne doivent entraîner aucune surcharge ni aucun remaniement du texte.

(1) Le prix de chaque page ou fraction de page est de 6 francs.

(2) Par exception, dans le numéro du *Bulletin* du Congrès, chaque membre a droit gratuitement à 4 pages d'impression, et peut obtenir quatre pages supplémentaires en les payant au prix convenu, ce qui porte à 8 le nombre total des pages accordées. Les communications devant être imprimées dans le *Bulletin* du Congrès sont soumises à l'examen de la Commission de Publication.

(3) Les dessins doivent être exécutés de façon à pouvoir être reproduits directement par les procédés phototypographiques.

ART. 42 *quater*. — Les auteurs qui désirent des tirés à part de leurs communications insérées au *Bulletin* doivent en mentionner le nombre à l'avance sur le manuscrit. Ce nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires; le prix de chaque exemplaire (titre et couverture compris) est de 0 fr. 10.

Les tirés à part sont retirés au siège social, sinon ils sont expédiés contre remboursement.

ART. 51. — Les auteurs des mémoires publiés dans les *Annales* ont droit, à titre gratuit, à un tirage à part de *vingt-cinq* exemplaires (texte et planches noires). Un tirage plus considérable peut être accordé mais aux frais des auteurs ⁽¹⁾.

ART. 64 *bis*. — Les collections de la Société, conservées au Siège social dans le local qui leur est affecté, sont à la disposition des sociétaires qui désirent les consulter, après entente avec un des membres de la commission des collections et seulement en sa présence.

ART. 68 *bis*. — Les membres rayés pour cause d'arriéré dans le paiement de leurs cotisations pourront être réadmis, sur leur demande, à condition de payer le total des sommes dont-ils étaient débiteurs envers la Société au moment de leur radiation; à moins qu'ils ne préfèrent s'exonérer.

ART. 68 *ter*. — La réintégration d'un membre démissionnaire a lieu, sans nouveau rapport, sur un vote immédiat provoqué par le Président.

Tout membre ayant démissionné deux fois ne peut plus être réadmis que comme *membre à vie*.

— Le Président annonce que le vote sur les propositions ci-dessus énumérées aura lieu dans la séance du 23 mai prochain.

Changement d'adresse. — M. le Dr D.-A. Sicard, médecin-major au 2^e bataillon de marche de la Légion étrangère, Diego-Suarez (Madagascar).

Radiation. — Sa Société décide par un vote unanime qu'il y a lieu de rayer du nombre de ses membres M. Léo Leymarie qui avait été admis le 24 janvier dernier.

(1) Le prix des tirés à part est de *dix centimes* par feuille ou fraction de feuille d'impression (*sans aucun changement*), de *dix centimes* par planche noire et de *cinquante centimes* par planche coloriée.

Communications.

Note sur le *Conothele birmanica* Thorell [ARACHN.]

Par E. SIMON.

L'Arachnide qui fait l'objet de cette note, et dont je dois la communication à notre obligeant confrère le P. Pantel, a été capturé à Korseong, par un missionnaire de l'Inde orientale, le P. Décoly, à qui l'on doit de nombreuses découvertes entomologiques, relatives surtout aux Orthoptères.

Il appartient au genre *Conothele* et répond assez bien à la description du *C. birmanica* Thorell (découvert à Shwegoo-Myo par L. Fea) sauf cependant en ce qui concerne la grosseur relative des yeux, les latéraux du premier rang n'étant pas sensiblement plus gros que les médians, caractère au reste variable dans la sous-famille des *Ctenizinae*; le *C. birmanica* Th. se distingue surtout de ses congénères malais (*C. malayana* Dol., d'Amboine, *C. Doleschalli* Thorell, de Nouvelle-Guinée, *C. Cambrigei* Thorell, de Sumatra) par l'absence d'un groupe spinuleux triangulaire à l'angle supéro-interne des tibias de la première paire des pattes.

Ce qui fait surtout l'intérêt de cette capture est l'observation que le P. Décoly a faite de la manière de vivre, jusqu'ici inconnue, des *Conothele*.

Ces Araignées ne sont pas terricoles comme les *Pachylomerus*, dont elles sont si voisines par leur organisation, mais arboricoles comme les *Moggridgea*, *Myrtale* et *Pseudidiops*; la coque operculée qu'elles construisent sur les écorces rugueuses des gros arbres ressemble surtout à celle des *Pseudidiops* de l'Amérique du Sud.

La coque habitée par le *Conothele* adulte, en compagnie de ses jeunes, est longue de 45 mill. et large de 20 mill., ovale, arrondie par le bas, ouverte par le haut où elle est fermée par un opercule arrondi, fixé au bord supérieur de l'orifice par une charnière assez large et très élastique.

Le tissu de cette coque et de son opercule est très épais, papyracé et rigide, analogue à celui d'un cocon de *Saturnia piri*; la face appliquée à l'écorce est brunâtre et filamenteuse, les petits éclats de bois, encore mêlés aux fils, indiquent qu'elle devait y adhérer fortement, tandis que la face externe, de même que le dessus de l'opercule, sont tout couverts de lichens et de mousse en pleine fructification, qui les dissimulent entièrement.

**Recherches sur la structure et le développement postembryonnaire
de l'ovaire des Insectes ⁽¹⁾. II *Campodea staphylinus* Westw.**

Par A. LÉCAILLON.

L'Insecte nommé actuellement *Campodea* fut d'abord pris pour un Myriapode non encore arrivé à l'état adulte. C'est Westwood [42] qui, en 1842, le rangea parmi les Thysanoures et en donna la description. Ses caractères de type inférieur donnent un intérêt tout particulier à l'étude de son organisation et de son développement.

Les organes génitaux de *Campodea staphylinus*, comme l'ont montré les travaux de Grassi [84 et 87] et d'Anton Schneider [85], sont constitués par une paire de simples tubes placés l'un à droite, l'autre à gauche de l'intestin, dans la cavité abdominale, et plus près de la face dorsale du corps que de sa face ventrale. Le premier de ces auteurs décrit l'ovaire surtout au point de vue de la forme générale, et le second surtout au point de vue histologique. Mais, si l'on en juge d'après leurs descriptions et leurs dessins, Grassi et Anton Schneider ont envisagé l'ovaire au moment où il contient des œufs peu éloignés de la maturité. Les résultats auxquels ils sont arrivés sont notablement différents de ceux auxquels m'a conduit l'étude de stades plus jeunes. Ainsi Grassi admet l'existence de cellules vitellogènes, mais il les représente de la même grandeur que celle des cellules de la chambre germinative, et il émet l'hypothèse qu'elles ne sont pas homologues de celles que l'on rencontre chez les Insectes supérieurs. Cet auteur dit aussi qu'il n'y a pas de follicules épithéliaux autour des œufs. Anton Schneider figure une chambre germinative très réduite et dit que les cellules vitellogènes disparaissent sans avoir atteint une taille digne de remarque.

En 1898, de Bruyne [98], dans son essai de classification des Insectes d'après les cellules vitellogènes et leurs rapports avec l'œuf, croit pouvoir admettre que ces cellules font défaut chez les Thysanoures.

Comme on peut le voir d'après la figure qui accompagne cette note, et qui a été dessinée d'après une coupe faite à peu près suivant le plan de symétrie du corps de l'Insecte à un moment où les œufs sont encore peu développés, et comme je vais le résumer dans les lignes suivantes, l'étude d'un stade suffisamment jeune permet de se prononcer avec certitude sur toutes ces questions.

(1) Voir *Bull. de la Soc. entom. de France*, n° 4, 1900, p. 96.

Si donc on examine un ovaire répondant à la condition que je viens d'indiquer, on peut y distinguer trois régions principales :

- 1° Une région antérieure ou chambre germinative, *A*.
- 2° Une région intermédiaire, *B*.
- 3° Une région postérieure *CCC* contenant les cellules vitellogènes, *C*, et les œufs *o*.

1° Chambre germinative.

La chambre germinative présente un développement considérable plus allongée dans le sens longitudinal que dans le sens transversal, elle a une forme générale ovoïde. Elle est constituée essentiellement par une masse cellulaire pleine qu'entoure une enveloppe *m* extrêmement mince et montrant çà et là un noyau très aplati. Cette enveloppe se continue sur le reste du tube ovarique dont elle forme la paroi; en avant, elle se continue par le filament terminal *f* de l'ovaire.

Les cellules qui remplissent la chambre germinative sont pressées les unes contre les autres et de forme plus ou moins polyédrique. Ce sont les cellules sexuelles; elles sont destinées à donner naissance aux œufs et aux cellules vitellogènes. Dans les préparations que j'ai examinées on ne peut distinguer, à ce moment, les futurs œufs des futures cellules vitellogènes, mais on peut reconnaître deux zones cellulaires dans la chambre germinative : une zone antérieure *a* et une zone postérieure *b* occupant chacune à peu près la moitié de la chambre. Les cellules de la première zone ont un noyau volumineux par rapport au corps protoplasmique; dans ce noyau les granulations chromatiques ne sont pas dis-



Coupe longitudinale de la partie antérieure d'un ovaire de *Campodea staphylinus* (1).

(1) *A*, chambre germinative subdivisée en deux zones *a* et *b*; — *B*, région intermédiaire; — *C*, cellules vitellogènes; — *m*, paroi de l'ovaire; — *f*, filament terminal; — *o*, œufs.

posées sur un peloton ni sur un réseau, mais sont libres et placées surtout à la périphérie de la cellule. Les cellules de la deuxième zone se distinguent de celles de la première en ce que les granulations chromatiques ont augmenté notablement de volume et semblent se colorer plus énergiquement.

2° Région intermédiaire.

La région intermédiaire, *B*, est formée par un amas de petites cellules très aplaties et allongées transversalement. Ces petites cellules ont un noyau petit et très effilé; elles n'ont pas été signalées par Grassi, mais Anton Schneider semble les avoir vaguement aperçues, car il en figure quelques-unes dans le dessin qu'il a donné et il dit que les cellules de la chambre germinative s'aplatissent dans la partie postérieure de cette dernière.

La masse des petites cellules de la région intermédiaire forme une sorte de disque placé entre la région antérieure et la région postérieure de l'ovaire. Ce disque est toutefois plus épais sur son bord qui touche à la paroi de l'ovaire que dans sa région centrale. Sur son bord, en effet, on voit souvent de 4 à 5 cellules superposées, tandis qu'il n'y en a que deux ou trois ou même moins vers le centre. Il ne constitue en réalité qu'un diaphragme incomplet entre la chambre germinative et la région postérieure de l'ovaire. Contrairement à l'opinion d'Anton Schneider, on ne peut considérer les petites cellules dont il vient d'être question comme des cellules de la chambre germinative; les premières ne peuvent sans doute pas dériver des secondes. Je reviendrai plus loin sur la signification que je crois pouvoir leur attribuer.

3° Région postérieure de l'ovaire.

C'est de beaucoup la partie la plus étendue de l'ovaire; on n'en a représenté que la moitié environ dans la figure ci-jointe. Cette région contient des cellules vitellogènes et des œufs.

Les cellules vitellogènes ne sont pas isolées, mais sont disposées par groupes pouvant comprendre chacun jusqu'à une dizaine d'unités. Chaque groupe est placé entre deux œufs, sauf le premier groupe qui est situé entre les cellules de la région intermédiaire et le premier œuf. Je ne puis m'étendre ici ni sur la structure ni sur l'évolution des cellules vitellogènes; je me contenterai de dire qu'elles grossissent beaucoup tout d'abord pour diminuer ensuite, et que leur noyau subit de bonne heure une sorte de *pulvérisation chromatique*, c'est-à-dire que les chromosomes se fragmentent en un nombre considérable de petits

granules qui prennent très fortement les matières colorantes. Ces cellules vitellogènes sont aussi différenciées que chez les Insectes élevés, et il n'y a aucune raison pour ne pas les considérer comme homologues de celles des autres Insectes.

Les œufs contenus dans chaque ovaire sont en nombre très restreint; je n'en ai trouvé le plus souvent que 4. Grassi et Anton Schneider n'en ont représenté que 3, mais le dernier de ces auteurs dit que leur nombre peut s'élever jusqu'à 5. Au début, les œufs (*o*) sont allongés transversalement dans l'ovaire; à mesure qu'ils grandissent, ils s'arrondissent, puis s'allongent longitudinalement. Quand ils sont pondus, d'après les observations d'Uzel [98], ils reprennent une forme arrondie. Je n'entrerai pas ici dans le détail des modifications cytologiques qui surviennent dans l'œuf pendant sa maturation; j'indiquerai simplement que la vésicule germinative a une petite taille et que, au début tout au moins, elle est bien moins grosse que le noyau des cellules vitellogènes voisines. En outre, chaque œuf finit par s'entourer d'un épithélium folliculaire dont les cellules restent toujours de petite taille. Quand l'œuf est encore jeune, l'épithélium ne l'enveloppe pas complètement comme on peut le voir sur la figure. Mais plus tard le follicule s'étend tout autour de l'œuf. Les éléments qui le forment paraissent être identiques aux petites cellules de la région intermédiaire et proviennent vraisemblablement de cette région. Celle-ci serait donc formée simplement par un amas de cellules folliculaires. J'ajouterai encore que l'on observe d'abord un retard dans la maturation des œufs les plus antérieurs par rapport à celle des œufs les plus postérieurs, mais que ce retard n'est pas cependant très grand. D'après l'aspect de l'ovaire, tous les œufs arrivent vraisemblablement à peu près en même temps à maturité et il y a probablement des pontes successives composées chacune d'un petit nombre d'œufs.

En résumé, on peut admettre que l'organe femelle de *Campodea* présente les caractères suivants :

1° L'ovaire a une structure simple, moins compliquée que chez les Insectes supérieurs. Cependant, les éléments cellulaires du tube ovarique sont disposés dans ce dernier suivant le même ordre et avec la même régularité que chez les Insectes supérieurs.

2° Les œufs sont séparés par des groupes de cellules vitellogènes évoluant comme celles des Insectes supérieurs.

3° Il existe des follicules ovariens constitués par de petites cellules spéciales dont il paraît y avoir une réserve dans la partie de l'ovaire que j'ai décrite sous le nom de région intermédiaire.

4° L'ovaire contient un très petit nombre d'œufs évoluant simultanément, mais il doit y avoir, pour chaque femelle, un certain nombre de pontes successives.

Index bibliographique.

BRUYNE C. DE [98]. — Recherches au sujet de l'intervention de la phagocytose dans le développement des Invertébrés. *Arch. de Biologie*, t. XV, fasc. 2, 1898.

GRASSI B. [84]. — Notice préliminaire sur l'anatomie des Thysanoures *Arch. ital. de Biologie*, t. 5, 1884.

— [88]. — Les ancêtres des Myriapodes et des Insectes. *Arch. ital. de Biologie*, 1889.

ANTON SCHNEIDER [85]. — Die Entwicklung der Geschlechtsorgane der Insecten. *Zoologische Beiträge*, 1^{er} vol.

UZEL H. [98]. — Studien über die Entwicklung der Apterygoten Insecten. Berlin, 1898.

WESTWOOD J.-O. [42]. — *The Annals and Magaz. of Nat. History*, v. 10, 1842.

Description d'une espèce et d'une variété nouvelles du genre *Acanthia* Latr. [HÉM. HÉTER.]

Par O.-M. REUTER.

1. *ACANTHIA VARIABILIS* H. Sch. var. nov. **mendica**. — Hemelytris nigris, solum limbo laterali vittula mox infra quartam basalem partem aliaque ante apicem, ectocorio guttula mox ante apicem, mesocorio guttulis duabus, posteriore paullo infra medium, endocorio guttulis duabus apicalibus, clavo guttula ante apicem flaventibus.

France méridionale : Toulouse, coll. du Dr Signoret.

Ab *A. scotica* Curt., cui signaturis simillima, corpore superne glabro membranaeque vena externa cum limbo coriaceo nigro tota confluenta divergens.

2. *Acanthia niveo-limbata*, n. sp. — Oblongo-ovalis, nigra, opacula, omnium subtilissime cinerascens-sericans; antennis breviusculis,

articulis duobus primis sordide albidis, secundo versus apicem infuscato, hoc primo circiter $\frac{2}{3}$ longiore, ultimis longitudine subaequalibus; capite striis duabus transversalibus inter apices oculorum, vitta apicali punctisque duobus cum illa crucem formantibus albis, callosis; pronoto capiti a supero viso aequae longo, lateribus rectis, versus apicem fortiter angustatis, apice quam basi fere duplo angustiore; scutello nitidulo; hemielytris sericeo-nigris, limbo laterali, ectocorio toto, guttis duabus mesocorii, altera mox infra tertiam basalem partem, altera mox supra tertiam apicalem partem, gutta supra suturam membranae inter ramos venae principalis membranaeque albis, hac venis fuscis, area interiore apicem areae proclinae attingente, limbo exteriori coriaceo albo; acetabulis totis nigris; pedibus albidis, femoribus apicem versus fuscescenti-conspurcatis, tibiis et tarsis solum extremo apice fusco. — Long. 2-4 mill.

Sénégal : Rufisque (F. Ancey), communiquée par M. A.-L. Montandon.

A. ornatulae Reut. ex Aegypto et Nubia magnitudine similis, hemielytris sericeo-nigris, altiter pictis, clavo gutta apicali destituto, ectocorio toto albo mox distinguenda.

Observations sur quelques types de Meigen [Dipt.]

Par le Dr J. VILLENEUVE.

Je dois à l'obligeance de M. le Professeur Bouvier, qui a bien voulu me confier quelques Tachinaires de Meigen avec un empressement dont je lui exprime ici ma vive reconnaissance, de pouvoir apporter quelque lumière dans la connaissance de certaines espèces restées jusqu'à présent plus ou moins méconnues.

Quelques Exoristines surtout, telles que *gnava*, *lucorum*, etc., sur lesquelles on discute encore; quelques *Phorocera* aussi, m'avaient fortement préoccupé. Mais j'ai rencontré, dans cet examen, les mêmes déceptions que lorsque je vis les Anthomyiaires de Meigen, non pas que la majeure partie des types ne fussent bien conservés, mais parce que les étiquettes ne correspondent pas toujours aux insectes décrits. Ici, une *Masicera* (♂) est placée à côté d'une *Exorista* (♀); plus loin tel exemplaire mâle porte l'étiquette ♀; d'autres individus, enfin, ne répondent pas du tout à la description. Il s'ensuit qu'il ne faut avancer que lentement, avec infiniment de circonspection et se défier des apparences qui ont fait confondre les espèces, peut-être par Meigen lui-même,

soit qu'il ait complété sa collection plus tard, après avoir perdu le souvenir précis de ses diagnoses, ou bien que sa vision soit devenue défectueuse par le fait des années.

Dans ce travail de revision, je pourrai affirmer certaines synonymies par comparaison avec quelques exemplaires de ma collection qui ont été déterminés par M. le Professeur Brauer, de Vienne.

I. EXORISTA.

1. ALACRIS (♀). — Est identique à un exemplaire de ma collection que M. Brauer a nommé *crinita* Rond.

2. HORTULANA (♂ ♀). — Le mâle répond parfaitement à la description de Meigen, mais l'écusson a son bord postérieur finement rougeâtre alors qu'il est dit entièrement noir. Il est identique à *blepharipoda* Br. Berg. (dét. Brauer!). Il est dépourvu de macrochètes discales; la femelle, au contraire, en possède et n'est autre que *glauca* ♀ (type n° 20).

3. MITIS (♂). — Identique à *mitis*, de M. Brauer, qui l'a déterminé dans ma collection.

4. LEUCOPHOEA (♂). — Cet exemplaire, qui n'a plus d'antennes, n'est pas du tout la *leucophoea* décrite par Meigen.

5. PABULINA (♀). — N'est que *maculosa* Meig. ♀ ou peut-être *notabilis* Meig. si l'on s'en tient strictement à la longueur des antennes. Je crois d'ailleurs que ces deux dernières espèces ne doivent en faire qu'une seule.

6. ANGUSTIPENNIS (♂). — C'est le mâle de *pabulina*, qui précède.

7. HERACLEI. — Je n'ai pu trouver de différence avec *E. vulgaris* Fall. dont elle ne serait qu'une variété plus foncée et plus brillante.

8. LUCORUM (♂ ♀). — Cette espèce possède 4 fortes macrochètes au milieu du bord postérieur du 2^e segment abdominal et une herse de soies raides et fortes sur les 3^e et 4^e segments. Elle répondrait dès lors à *cheloniae* Rond., Schiner.

9. GNAVA (♂ ♀). — Le mâle présente l'aspect brillant « wie lakirt », qui paraît encore augmenté par l'usure du rasé blanchâtre. Les types de Meigen sont en assez bon état, mais les macrochètes sont tombées partout; cependant les pores d'insertion de ces dernières sont bien visibles, et j'ai pu me convaincre que le mâle et la femelle appartenaient à deux espèces voisines.

Quoi qu'en ait dit Robineau-Desvoidy (*Dipt. env. Paris*, 1863, I, p. 242) qui a pris la femelle pour la vraie *gnava* de Meigen, j'ai la certitude que le mâle seul doit fixer l'espèce.

Le mâle n'a pas de macrochètes discales; l'abdomen, à transparence rougeâtre sur les côtés des 3 premiers segments, est comme poli et saupoudré finement de cendré clair. Deux macrochètes marginales médianes au 2^e segment; une rangée complète d'apicales au 3^e segment. C'est bien *Carcelia bombylans* de Rob.-Desvoidy (1863, I, p. 238).

La femelle, comme le dit Robineau, a des macrochètes discales; le front est aussi large que chez la femelle de *lucorum*, et presque le double de celui du mâle. Or, Meigen écrit : Stirne schmal, an beiden Geschlechtem gleich.

J'ai vu également, dans la collection du Muséum, un exemplaire mâle étiqueté « *gnava* » par Macquart; c'est encore *Carcelia bombylans* R.-Dsv. ♂. Je possède un grand nombre d'exemplaires de cette espèce dans ma collection; la coloration varie et quelques femelles ont un aspect jaunâtre uniforme, auquel cas elles répondent au type *fulva*, de Meigen, que j'ai sous les yeux. Un mâle de ma collection, obtenu par éclosion de la chenille d'*Orgyia pudibunda*, a la taille plus grande, les côtés de l'abdomen franchement rouges, mais les soies frontales descendent sur la face, nombreuses et sans ordre. Ce doit être une variété de *gnava*, comme *E. polychaeta* Macq. est une variété d'*affinis* Fall.

10. *ANCILLA* (♂). — Identique à un exemplaire de ma collection que M. le Professeur Brauer a étiqueté : *Tritochaeta polleniella* Rond., mais je dois faire remarquer que le bord postérieur des segments abdominaux n'est pas noir, comme l'indique Rondani pour *polleniella*.

11-12. *FAUNA, LIBATRIX* (♂ ♀). — La seule différence qui existe entre ces deux espèces est tout entière dans la coloration. On observe, chez les deux, 2 fortes macrochètes au bord postérieur du 1^{er} segment abdominal, et des macrochètes discales, à répartition identique, sur les 2^e et 3^e segments abdominaux.

13. *AEMULA* (2 ♂). — C'est *fractiseta*, de Rondani.

14. *AFFINIS* (♂ ♀). — La tête manque dans les deux exemplaires.

15. *PROXIMA* (♀). — L'exemplaire du Muséum de Paris n'est pas la vraie *proxima*, de Meigen; c'est une femelle de *grossa* Br. Berg. (ma collect., dét. Brauer!). Il me semble bien que *proxima* doit être la véritable femelle de *gnava* (voy. n° 9). Robineau-Desvoidy émet presque la même opinion.

16. ANGELICAE (2 ♂). — Espèce aux yeux nus qui n'est autre que *Dexodes machairopsis* Br. Berg.

17. NEMESTRINA (♂ ♀). — Le mâle est identique à *arvensis* (type Meigen).

M. Brauer qui a vu le mâle d'*arvensis* dans la collection von Winthem, le fait synonyme de *fimbriata* Meig.; ce que je n'ai pu vérifier sur l'exemplaire *fimbriata* de Paris qui est presque entièrement détruit. Néanmoins les deux mâles que j'ai sous les yeux, à savoir *nemestrina* et *arvensis*, vérifient exactement la description de *fimbriata* que donne M. Brauer.

La femelle appartient à une autre espèce. L'écusson est rouge et les macrochètes frontales descendent jusqu'au milieu de la face. C'est une femelle de *confinis* Fall.

18. ARVENSIS (♂). — C'est *nemestrina* ♂, qui précède.

19. FIMBRIATA (♀). — Il ne reste de ce type que le thorax et les pattes.

20. GLAUCA (♂ ♀). — Le mâle est *Masicera sylvatica* Fall. ♂.

La femelle possède des soies discales et marginales et se rapporte à *grossa* Br. Bgst. de ma collection (déterm. Brauer!).

J'ai capturé plusieurs mâles de *glauca* (= *grossa* Br. Bgst.), l'été dernier, à Rambouillet, et j'ai constaté que chez eux, les palpes se rembrunissaient plus ou moins jusqu'à devenir parfois entièrement noirâtres.

21. DUBIA (♂ ♀). — La femelle a les palpes roux.

22. BERBERIDIS (♀). — Pattes rougeâtres ainsi que la face et les antennes. C'est une variété, probablement immature, de *dubia*.

23. LOTA (♂ ♀). — Le mâle possède des tibias postérieurs régulièrement ciliés; les cils ou plutôt les fortes soies qui les constituent sont plus longs vers la portion moyenne. Ce caractère sépare nettement cette espèce des voisines comme *grossa*; *blepharipoda* Br. Bgst., etc., mais il manque chez le sujet qui porte l'étiquette « *lota* ♀ ».

24. JUCUNDA (♀). — La description de Rondani pourrait s'appliquer aussi à l'espèce de Meigen; mais les palpes testacés sont plutôt cylindriques et non pas « *subclavati* » comme le dit Rondani. Il y a une paire de macrochètes discales distinctes sur les 2^e et 3^e segments abdominaux.

En terminant ce groupe des Exoristines, je signalerai encore un

exemplaire nommé *agilis*, par Macquart; c'est *Phryno vetula* Meig. ♂.

II. PHOROCERA.

1. PAVIDA (♂). — C'est *cilipeda* Rond.

2. PUMICATA (♂). — A les tibias complètement noirs et sans la fine ciliation de l'espèce précédente.

3. FRONTOSA (♂ ♀). — C'est *Bothria pascuorum* Rond.

4. MUNDA (♂ ♀), TAENIATA. — Ne diffèrent en rien de *Machaira serri-ventris* Rond.

5. LEUCOMELAS. — C'est bien l'*Arrhinomyia leucomelas* Meig. de M. le Professeur Brauer.

6. AESTUANS (♀). — Il manque l'abdomen et les tibias moyens. Les tibias qui restent sont rougeâtres et l'aspect des tibias postérieurs témoigne que cet exemplaire n'est qu'une grosse femelle de *pavida* (= *cilipeda* Rond.).

7. DELECTA (♀) [avec la mention « Förster »]. — Cette espèce, décrite au t. VII, p. 262, est absolument distincte de celle du même nom décrite au t. IV, p. 349. Elle n'est autre que *Doria nigripalpis* Rond. ♀.

8. INEPTA (♀). — Espèce qui m'est inconnue. J'ajouterai qu'il existe une paire de macrochètes discals sur les 2^e et 3^e segments abdominaux, trois soies à l'origine de la 3^e nervure longitudinale de l'aile; enfin la nervure transversale postérieure est située avant le milieu de l'espace qui sépare la petite nervure transverse du coude de la 4^e longitudinale. La soie antennaire est très renflée en fuscau dans son tiers basal.

III. MASICERA.

1. FATUA (♂). — Conforme à la description de Meigen, mais n'est que le mâle de l'espèce que Rondani a nommée *properans* ♂.

2. FESTINANS (♀). — C'est la femelle de l'exemplaire *fatua* qui précède. Elle est donc identique à *properans* Rond. ♀.

J'ai pu vérifier cette identité sur un couple de *properans* que je possède dans ma collection, et sur deux couples de Styrie que M. le Professeur Strobl m'a envoyés récemment.

3. FERRUGINEA (2 ♀). — Répondent à l'espèce *rutila*, de Schiner.

4. RUTILA (2 ♀). — Ne diffèrent de *ferruginea* que par la taille qui

est plus grande et la coloration des premiers articles de l'antenne qui sont d'un jaune vif. Les deux espèces ont des macrochètes discales.

5. *APRICA* (♂). — L'œil est petit, le front proéminent, les gènes larges, les arêtes nasales très saillantes et les antennes raccourcies avec les premiers articles rougeâtres. Cette conformation de la tête sépare nettement cette espèce du groupe des précédentes.

Elle est figurée dans l'ouvrage du Prof. Brauer (fig. 16 ♂) et répond exactement à *Pexopsis tibialis*, de Schiner, qui avait d'ailleurs soupçonné justement l'identité de ces deux espèces.

6. *INNOXIA* (♂ ♀). — Cette espèce s'éloigne entièrement du genre *Masicera* et doit être rangée dans le groupe des *Thryptocera* de M. le Prof. Brauer. — Robineau-Desvoidy l'a placée dans le genre *Gravenhorstia*.

J'ai constaté, comme Robineau, que les tarsi antérieurs de la femelle, piquée au-dessous d'un mâle, sur la même épingle, sont dilatés, contrairement à ce qu'en dit Meigen. Le mâle porte de chaque côté du front une macrochète orbitale externe unique, les gènes sont nues, les soies scutellaires nettement divergentes, le 3^e segment abdominal avec des macrochètes discales; la 3^e nervure longitudinale de l'aile avec 1-2 soies seulement à sa base; enfin, arêtes nasales à vibrisses dressées atteignant presque le milieu, et second article de la soie antennaire allongé et très distinct. Il pourrait être placé, ce semble, très près du genre *Arrhinomyia* Br. Bgst.

Description d'une nouvelle espèce de Microlépidoptère de France

Par P. CHRÉTIEN.

En même temps que la *Lita mucronatella*, espèce nouvelle décrite dans le précédent *Bulletin*, et souvent sur le même pied, l'*Alsine mucronata* L. nourrit une autre espèce de Microlépidoptère très intéressante, appartenant au genre si difficile et si embrouillé des *Butalis*.

Plusieurs sujets soumis à l'examen du Dr Ot. Hofmann, de Ratisbonne, qui avait entrepris une Monographie des *Butalis*, ont été étudiés par lui et reconnus comme formant une espèce nouvelle qu'il se proposait de décrire dans sa Monographie.

Mais ce savant, dont nous déplorons la mort toute récente, n'a pu mettre son projet à exécution.

En sa mémoire, je conserve le nom qu'il avait donné à cette espèce, et je vais essayer de remplir une tâche dont il se serait bien mieux acquitté que moi, j'en suis certain.

***Butalis penicillata*, n. sp.** — Envergure 5,5 mill. — Ailes antérieures un peu étroites, d'un brun foncé bronzé, violacé et à reflet changeant, paraissant blanchâtre par places, surtout dans le sinus médian longitudinal, qui est profond, faisant croire à une bande longitudinale blanche qui en réalité n'existe pas; franges brun foncé. Ailes inférieures brunes, légèrement teintées de pourpre, à écailles espacées; franges brunes. Tête et thorax bronzés, antennes et palpes brun foncé, pattes à reflet blanchâtre. Abdomen brun foncé ou noirâtre, bronzé, terminé chez le ♂ par deux pinceaux de poils épais, écartés à la base, parallèles ou légèrement divergents, chez la ♀ par un petit prolongement cylindrique, à peu près comme chez *Butalis senescens* ♀.

Sa chenille, qui mesure 3 à 4 mill. de longueur, est très effilée antérieurement, rayée longitudinalement de brun et de blanc et teintée de verdâtre; ligne dorsale fine, irrégulière, élargie au milieu des segments où elle forme tache; sous-dorsale interrompue, maculaire; stigmatale plus nette et bande latéro-ventrale large, blanches; ventre gris clair; verruqueux petits, noirs, poils blonds; tête noirâtre au sommet, brun marron vers la bouche; écusson et pattes écailleuses noirâtres, clapet brun; stigmatale grands, blancs, avec un point noir au centre et un cercle noir à la circonférence.

Cette chenille vit en petite société et au milieu d'assez nombreuses toiles qu'il est très facile de remarquer sur les petites touffes gazonnantes de l'*Alsine mucronata*, dans le courant du mois de juillet. En outre, elle a le bon esprit de se transformer sur la plante elle-même, de sorte qu'il suffit d'attendre l'époque de cette transformation pour faire une récolte facile et sûre des cocons, au lieu d'élever les chenilles.

Le cocon est court, ovoïde, formé de soie blanche, garnie extérieurement des excréments de la chenille, de grains de terre ou de menus débris empruntés aux tiges de la plante nourricière. Il ressemble assez, sous certains rapports, aux calices desséchés et vieux d'*Alsine mucronata* qui persistent sur les tiges des précédentes années.

La chrysalide, peu allongée, est très atténuée postérieurement, brune. La pointe des ptérothèques atteint le pénultième segment abdominal, les incisions des segments forment un peu bourrelet, les segments portent à la place des verruqueux un poil excessivement court, mais raide; dernier segment corné, hérissé de ces sortes de poils qui permettent difficilement de dégager la chrysalide de la soie du cocon; mucron mutique, arrondi.

Le Papillon vole au mois d'août dans les mêmes localités que la *Lita mucronatella*.

Sur le *Pimpla flavipes* Grav. [HYMÉN.]

Par R. DU BUYSSON.

Parmi les Lépidoptères dont les chenilles sont attaquées par le *Pimpla flavipes* Grav., je puis citer une Tortricide, la *Tortrix xylosteana* L. Le Pimple pique la chenille quand celle-ci est dans son tube de feuille. Il ne dépose qu'un œuf par chenille. Cette dernière ne se transforme pas en chrysalide, c'est la larve du Pimple qui se file une coque de soie blanche, serrée, assez résistante et occupant un grand espace du tube de feuille. La chenille est déjà grosse en mai. Le Pimple pond à cette époque et l'éclosion de sa progéniture s'effectue en juin.

Les chenilles de *Tortrix xylosteana* L. que j'ai élevées l'année dernière provenaient du bois de Vincennes, et je les ai nourries avec des feuilles de chêne pédonculé.

Contribution à l'étude des Coléoptères de la Tripolitaine
et de la Tunisie

Par Maurice Pic.

La faune de la Tripolitaine est encore peu connue; les chasses récentes de M. Ch. Alluaud, dans cette région, apportent donc un contingent de renseignements nouveaux très intéressants pour la répartition géographique de plusieurs espèces. Je dois à M. Alluaud la communication des matériaux qui m'ont servi à rédiger le présent article et je suis heureux de remercier au nom de la science un de nos plus infatigables chasseurs et un de nos plus sympathiques collègues.

1^o Ptinides et Malacodermes.

M. Alluaud m'a communiqué deux espèces seulement de *Ptinus* dont une, *Ptinus Theryi* Pic, décrite d'Algérie, est intéressante et nouvelle pour la faune de la Tripolitaine.

Ptinus (*Gynopteris*) *variegatus* Rossi, Djebel Ghariâne.

Ptinus (*Eutaphrus*) *Theryi* Pic, Aïn Zara.

Comme Malacodermes, j'ai étudié seulement les espèces suivantes :

Dasytes confinis Schils. ou espèce voisine, Azizihe, Djebel Ghariâne.

Mesodasytes croceipes Kiesw. var., Djebel Ghariâne.

Dasytiscus (Haplothryx) syrticus Bourg., Djebel Ghariâne.

Melyris ruficrus Fairm. (*Amaliae* Heyd.), Djebel Ghariâne et R'dir Djila.

2° Anthicides.

Parmi les *Anthicidae* recueillis par M. Alluaud je signalerai particulièrement un *Mecynotarsus* unique, paraissant correspondre à la description de *M. bison* Oliv.; *Anthicus cinctutus* Mars., espèce algérienne; *Anthicus Bonnairei* Fairm., rare espèce connue jusqu'à présent des environs de Biskra seulement; enfin un *Anthicus* nouveau (*tripolitanus*) que je signale provisoirement comme variété de *insignis* Luc., en attendant que des captures ultérieures, et surtout la découverte du ♂, me permettent de me prononcer plus sûrement à son sujet.

Mecynotarsus bison Oliv.?, Aïn Zara. — *Anthicus phoxus* Mars., R'dir Djila. — *A. coniceps* Mars. var., Mellâha. — *A. opaculus* Woll., Aïn Zara. — *A. Goebeli* Laf. var. *meridionalis* Pic, environs de Tripoli. — *A. Bonnairei* Fairm., Djebel Ghariâne. — *A. cinctutus* Mars., Zanzour. — *A. insignis* var. *tripolitanus* (nov.), Djebel Ghariâne.

Anthicus (Liparoderus) insignis Luc. var. *tripolitanus*, nov. ♀. — Robuste, oblong, convexe, foncé à reflets légèrement métalliques, avec la base du prothorax testacée, les pattes plus ou moins roussâtres; élytres non fasciés. Tête forte, tronquée en arrière, brillante, à ponctuation éparse. Antennes courtes et grêles, obscures. Prothorax densément ponctué, presque mat, large, à peine dilaté en avant, foncé avec la base étroitement testacée sur les côtés. Élytres ovalaires, modérément longs, subarrondis à l'extrémité, foncés, dépourvus de fascies pileuses argentées mais ornés d'une pubescence couchée longue et claire; pourtour un peu roussâtre; épaules effacées. Pattes robustes, roussâtres, avec les cuisses un peu rembrunies. — Long. 4 mill. environ.

Se distinguera très facilement de tous les *Liparoderus* décrits par l'absence de fascies argentées sur les élytres.

**

Haplocnemus Alluaudi, n. sp. — *Subdepressus*, *nitidus*, *aeneus*, *griseo-pubescentis*; *capite biimpresso*; *antennis nigris vel brunneis, gracilibus, in mare pectinatis*; *thorace fortiter punctato, breve et valde lato*; *elytris fortiter punctatis, angulis suturalibus rotundatis*; *pedibus pro parte pallidis*. — Long 3,6-4,2 mill.

Hab. Tunisia.

Large, subdéprimé, brillant, bronzé, orné d'une pubescence grisâtre longue avec quelques soies rembrunies sur l'avant-corps. Tête biimpressionnée entre les yeux, densément et irrégulièrement ponctuée. Antennes grêles, foncées ou brunâtres, subdentées (♀), ou pectinées (♂), les dents minces et assez longues, écartées les unes des autres. Prothorax court, très large, un peu convexe au milieu, arrondi sur les côtés, à ponctuation forte et plus ou moins rapprochée. Élytres larges, plus larges que le prothorax à la base, modérément atténués à l'extrémité, arrondis sur la suture, à épipleures courts et ponctuation très forte parsemée de rides transversales peu marquées. Dessous du corps foncé. Pattes courtes, testacées avec les cuisses foncées. — Long. 3,6-4,2 mill.

Tunisie méridionale : Gabès (Ch. Alluaud, 1899).

D'après la description, *H. biscrensis* Schilsky (Käfer Europa's, XXXIII, n° 96) paraît voisin de *H. Alluaudi*; il est décrit comme oblong avec les palpes et les antennes testacées, l'angle sutural des élytres marqué, caractères qui ne se retrouvent pas chez *H. Alluaudi* qui se distinguera facilement par la gracilité de ses antennes en même temps que par sa forme large et son aspect bronzé.

C'est avec grand plaisir que je dédie cette espèce nouvelle à M. Charles Alluaud qui l'a recueillie lors de son récent voyage en Tunisie.

Sur des élytres de Coléoptères de la tourbe préglaciaire de Lauenburg (Elbe)

Par Fernand MEUNIER.

Dans une récente note stratigraphique, M. Keilhack ⁽¹⁾ signale que M. Müller a trouvé des restes de Coléoptères dans la tourbe du diluvium de Lauenburg.

Les fossiles de cette formation qui m'ont été communiqués par M. le Dr Berendt semblent être proches parents des espèces rencontrées en Europe et aux États-Unis. Cependant il est probable que plusieurs d'entre elles sont éteintes actuellement.

(1) Excursion in d. norddeutsch. Flachland v. 29 Sept. bis 5 Okt. 1898. *Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellschaft*. Berlin, 1899, Bd. L., Heft III, pp. 144, 148.

J'ai observé des élytres de *Carabidae* du genre *Bembidium* ⁽¹⁾ Gyll. Ces Coléoptères se distinguent du *B. exoletum* Scudd. par leur facies morphologique. Chez *B. Berendti* ⁽²⁾, nov. sp. ces organes sont ornés de 7 fines lignes longitudinales entre lesquelles il existe une ponctuation assez rugueuse, tandis que *B. exoletum* a des stries formées d'une série de points bien distincts. De plus, la première de ces espèces a 4 mill. de longueur et 1 mill. de large, et la seconde n'a seulement que 2,8 mill. de longueur.

Des fragments incomplets de quelques petits *Carabidae* nous permettent d'entrevoir la découverte prochaine de divers genres de cette famille dans ce même gisement préglaciaire.

Un autre reste de *Carabidae* indéterminable, ayant aussi 4 mill. de long et 1 mill. de large, paraît avoir conservé sa couleur normale (noire) et ses élytres sont pourvus de stries longitudinales (on ne peut en compter exactement le nombre) irrégulières et à aspect chagriné.

La faunule de Lauenburg se caractérise principalement par la présence d'un grand nombre d'élytres de *Chrysomelidae* du genre *Donacia*. Comme l'ont fait Kolbe ⁽³⁾ et Heer ⁽⁴⁾, pour des insectes en bon état de conservation, il est impossible d'identifier ces débris de fossiles avec le *Donacia* (*Plateumaris*) *discolor* Panzer.

M. Kolbe a raison de dire que les élytres des *Donacia* perdent leur couleur bronzée et deviennent bleues après que la tourbe a été extraite du sol. — Long. d'une élytre 5 mill., larg. 1 1/4 mill.

De simples trouvailles d'articulés tertiaires et quaternaires peuvent rendre de grands services pour l'étude de la paléontologie géographique. Mais pour arriver à grouper quelques faits positifs, il est indispensable de reviser les fossiles décrits ou signalés par Heer, Flach, Kolbe, Hinde, Scudder ⁽⁵⁾, etc.; de les examiner avec ceux de Lauenburg et de les comparer aux espèces des régions holartiques actuelles.

(1) On a aussi signalé des Coléoptères de ce genre dans l'oligocène, le pliocène et le plistocène.

(2) Pour prendre date, je désigne provisoirement ces *Bembidium* sous ce nom.

(3) Ueber fossile Reste von Coleopteren aus einem alt. Torflager (Schmierkohle.) bei Gr. Raeschen i. d. Nieder-Sausitz. Sitz. Ber. d. Gesellsch. naturforsch. Freunde. Berlin 1894, p. 238.

(4) Urwelt der Schweiz, p. 481.

(5) A classed and annotated Bibliography of fossil insects. Bull. of the U. S. Geol. Survey, Nr. 69, Washington 1890.

Index to the known fossil insects of the world including Myriapods and Arachnids. *ibid.*, Nr. 71, Washington 1891.

**Sur des bruits produits par deux espèces américaines
de Fourmis et de Termites**

Par E. GOUNELLE.

**1^o Observation faite en 1889 dans le Sertão méridional
de l'État de Bahia.**

Étant une après-midi à la chasse et traversant un de ces fourrés de Broméliacées à feuilles rigides et épineuses si communs dans ces régions arides, mon oreille fut frappée par une sorte de grésillement analogue au bruit qu'aurait produit une pincée de sable projetée sur une feuille de papier et que chacun de mes pas semblait provoquer. Ayant tiré un coup de fusil, ce même bruit qui paraissait provenir du sol prit tout autour de moi une intensité extraordinaire. Je constatai alors la présence sur les plantes environnantes de myriades de Termites de très petite taille et de deux formes différentes, les uns à tête couleur d'ambre jaune et les autres à tête noire semblable à un marteau terminé en pointe. Chaque fois que j'agitais le fourré, les insectes qui s'y trouvaient, baissant et relevant leur tête d'une façon précipitée et saccadée, en frappaient les feuilles rigides, ce qui produisait le bruit insolite qui m'avait intrigué.

Sans doute quelque Tamanoir avait, peu de temps avant mon passage, éventré le nid de ces Termites pour les dévorer, et les survivants privés de leur demeure, désorientés, s'étaient répandus dans les environs. Ainsi s'expliquerait la présence au grand jour, tout à fait anormale, de ces insectes lucifuges.

Quant au bruit produit, il est difficile, au premier abord, d'en deviner le but. Mais ayant ultérieurement, à titre d'expérience, détruit partiellement une des galeries couvertes qui relient au sol le nid que cette même espèce construit dans les arbres, j'ai constaté que dès qu'un Terme à tête noire s'apercevait du dégât, il battait aussitôt le rappel de la manière que j'ai décrite, pour appeler les ouvriers au travail. Cette manœuvre était répétée, à leur passage devant la partie détruite et tant que celle-ci n'était pas réparée, par tous les individus de même forme qui semblaient remplir les fonctions de sous-officiers ou de contre-maîtres. Les ouvriers (les Termites à tête jaune) arrivaient alors en foule et, apportant chacun une petite boulette de terre, s'empressaient de réparer le dégât.

C'est donc là évidemment un signal d'alarme qui, grâce aux qualités de résonance du bois, se transmet rapidement jusqu'au nid aérien et

qui est très utile aux Termites en temps ordinaire lorsqu'ils se trouvent chez eux.

Quant à ceux qui, chassés de leur demeure, avaient été effrayés par l'ébranlement de l'air causé par mon coup de fusil, ils avaient sans doute instinctivement exécuté leur manœuvre habituelle alors que dans la circonstance elle ne pouvait leur rendre aucun service. Je dois dire toutefois qu'à la différence de ce qui s'est passé dans le nid, les Termites des deux formes se livraient à cette manœuvre indistinctement.

2° Observation faite en 1895 dans l'État de Ceara.

Chassant au parapluie à la lisière d'un bois, un bruit de crécelle analogue à celui que produit le serpent à sonnettes quand il est en colère, s'échappa d'un fourré dont je battais les branches et éveilla mon attention. Après quelques recherches, je finis par découvrir que le bruit partait d'une tige de bambou sèche dont quelques feuilles étaient enroulées en forme de cornet. Ayant ouvert un de ceux-ci, j'y trouvai une douzaine d'individus d'une petite espèce de Fourmi que notre collègue M. E. André a bien voulu déterminer depuis, et qui est le *Camponotus mus*. Chacun des cornets était également habité. Quand j'agitais le Bambou, les Fourmis se livrant au même exercice que j'ai décrit plus haut en parlant des Termites, frappaient à coups de tête précipités la paroi interne des feuilles enroulées. Ces sortes de grelots animés dont le bruit était augmenté par la résonance de la tige rigide et comme métallique du Bambou, produisaient un bruit d'une force étonnante vu la petitesse et le petit nombre des exécutants.

Mœurs des Anthrènes [COL.]

Par G.-A. POUJADE.

Plusieurs entomologistes ont déjà remarqué que les larves d'Anthrènes percent les boîtes en carton léger pour s'échapper. Je me souviens avoir vu des traces de dégâts évidemment commis par une seule larve dans un tableau d'insectes dont la vitre était hermétiquement collée avec des bandes de papier depuis plusieurs années. Examinant le cadre de tous les côtés pour voir s'il n'y avait pas une fente quelconque, je ne pus découvrir qu'un petit trou rond fait dans le papier par une larve, supposai-je, pour s'introduire dans l'intérieur.

Aujourd'hui je puis montrer deux petites boîtes rondes en carton ayant contenu des larves d'Anthrènes avec des débris d'insectes, ces

boîtes ont chacune un petit trou pratiqué, chose remarquable, dans la jointure de la bande de carton qui forme la gorge et au niveau de la fermeture du couvercle. J'ai surpris une larve encore engagée dans l'ouverture qu'elle venait de pratiquer. Il paraît évident que, se trouvant à court de nourriture, ces insectes ont senti le point le plus facile à entamer pour sortir de leur prison.

**Description d'un *Platyderus* nouveau [COL.]
de la Tunisie méridionale.**

Par L. BEDEL.

***Platyderus elegans*, n. sp.** — Totus dilute testaceus, supra perparum nitidus, vix depressus, capite pronotoque tenuissime, elytris multo distinctius alutaceis. Caput breviusculum, oculis subconvexis, antennis tenuibus, basin elytrorum haud longe superantibus. Pronotum paulo longius quam latius, convexusculum, postice transversim depressum, nec punctatum, nec impressum, antice leviter emarginatum, angulis anticis brevissimis, lateribus subsinuatim, angulis posticis obtusis, apice ipso rotundato, puncto setigero anteposito, basi truncatum et medio immarginatum. Elytra ovata, vix depressa, striis punctatis, haud profundis, intervallo tertio tripunctato, punctis duobus posticis inter striam secundam et tertiam impressis. Subtus nitidior, adhuc tenuius alutaceus, plane impunctatus. Episterna metathoracis postice angustata, vix longiora quam latiora. Femora intermedia margine inferiori punctis quatuor setigeris notata. Tarsi postici graciles, articulo 1° longo, extus subsulcato, articulis 2-5 magis opacis, 2-4 extus subimpressis. Apterus? — Long. circ. 7 mill. (♀).

Sud de la Tunisie (coll. Bedel).

Cette espèce est remarquable par sa surface très peu déprimée, entièrement alutacée et presque mate, son pronotum peu échancré en avant et sans impressions distinctes en arrière, ses tarses postérieurs dépolis, sa couleur jaunâtre, etc.

Par sa forme svelte et bien moins aplatie que celle des autres *Platyderus*, elle rappelle, en petit, le facies de certains *Laemostenus* cavernicoles.

Captures de Coléoptères myrmécophiles, en Orient

Par Maurice PIC.

Je dois avant tout adresser de vifs remerciements à nos collègues MM. E. Wasmann et E. André qui ont bien voulu m'aider dans l'é-

tude des insectes faisant l'objet de cette note. Je regrette que la rapidité de mon voyage m'ait empêché de chasser avec plus de soin les insectes myrmécophiles. Ma liste de captures est courte, elle mentionne cependant, pour plusieurs espèces, des habitats nouveaux.

Dinusa sp. (peut-être *hierosolymitana* Saulcy?). — Jérusalem, avec *Myrmecocystus viaticus* F. var. *niger* André.

Oxysoma Bedeli Fauv. [ex Wasmann]. — Jérusalem, avec *Pheidole pallidula* Nyl.

Paussus turcicus Friv. — Jérusalem, avec *Pheidole pallidula* Nyl.

Scydmaenus camelus Reitt. — Mont Liban, avec *Camponotus maculatus* race *dichrous* Forel.

Thorictus loricatus Peyron. — Smyrne, avec *Aphaenogaster barbara* race *capitata* Latr.

Th. dimidiatus Peyron. — Jérusalem, avec *Myrmecocystus* var. *niger* André.

Th. pilosus Peyron. — Jérusalem, avec *Myrmecocystus* var. *niger* André.

Spathochus Coyei Mars. — Jérusalem, avec *Myrmecocystus* var. *niger* André.

La capture de *Spathochus* avec *Myrmecocystus* est intéressante, car cette espèce n'était pas encore considérée comme sûrement myrmécophile.

Quelques autres myrmécophiles non encore déterminés ne sont pas cités dans cette note; enfin plusieurs *Merophysa* et *Thorictus Baudii* Reitt. ont été capturés isolément.

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1900, I, 13 et 14. ☉

Académie des Sciences de Cracovie (*Bulletin international*), février 1900.

☉

American Academy of Arts and Sciences (*Proceedings*), mars 1900. —

S.-H. SCUDDER : The Species of the Orthopteran Genus *Derotimema*.

Annals and Magazine of Natural History, avril 1900. — C. NORMAN :

British Amphipoda : Familles *Pontoporeidæ* to *Ampeliscaidæ* (fig.).

C.-J. GAHAN : On some Longicorn Coleoptera from the Island of

Hainan. — L. WALSINGHAM : Asiatic *Tortricidae*. — W.-L. DISTANT : Rhynchotal Notes ; IV, Heteroptera : Pentatominae (part). — E.-A. HEATH : Description of a new Cetoniid Beetle from East Africa (fig.).

Chicago Entomological Society (Occasional Memoirs), I, 4, 1900. — J.-L. HANCOCK : Some Tettigidae from Madagascar (pl.). — J. TOUCH : A new Species of *Gomphus* (fig.). — J.-G. NEEDHAM : Insect Drift on the Shore of Lake Michigan. — A.-J. SNYDER : The Argynnis of North America.

Cincinnati Society of Natural History (Journal), XIX, 5, 1900. — C. DURY : Random Notes on Natural History. Odonata, Lepidoptera, Coleoptera. — Index du vol. XVIII.

Entomological Society of Ontario (40th Annual Report), 1899. — Conference on the San Jose Scale. — J. FLETCHER : Some Interesting Insects (fig.). — F.-M. WEBSTER : On Hundred Years of American Entomology. — W. LOCHHEAD : Some common Insects of the Orchard, Garden and Farm. — F.-M. WEBSTER : The native Home of the San Jose Scale. — Some Notes on the Larval Habits of the Gray Hair-Streak Butterfly. — San Jose Scale. — W. LOCHHEAD : Notes on some Insects on Coniferous Shade-trees (fig.). — A. GIBSON : The Electric Light as an Attraction to Moths. — W. LOCHHEAD : Injurious Insects of the Orchard, Garden and Farm in 1899 (fig.). — W.-N. HUTT : Asparagus Beetles (fig.). — C.-S. BETHUNE : Fatal Bite of an Insect (fig.). — J.-A. MOFFAT : Remarks upon some Cuban Insects. — The Wing-structure of a Butterfly (pl.). — W. LOCHHEAD : Nature-study Lessons on the Cabbage Butterfly (fig.). — T.-W. FYLES : Spiders (fig.). — DIVERS : Notes on Insects of the year. — Notes of the Season of 1899 (fig.). — J. FLETCHER : Injurious Insects in Ontario during 1899. — C.-J.-S. BETHUNE : Some Observations of a Humble-Bees' Nest.

Entomologische Nachrichten, XXVI, 6, 1900. — G. LÜSTNER : Ueber eine neue Gallmücke des Weinstockes *Clinodiplosis vitis* nov. sp. (pl.). — FRIESE : Neue palaearktische Bienenarten. — E. REITTER : Uebersicht der mir bekannten Arten der Coleopteren (Elatерiden). Gattung *Pleonomus* Mén. aus Central-Asien. — W. MEIR : Beitrag zur Coleopteren-Fauna Unter-Frankens. — A. SINKA : Zu *Chalcosoma Möllenkampi* Kolbe.

Entomologist (The), avril 1900. — F. W. FROHAWK : Aberrations of British Lepidoptera (pl.). — R. SOUTH : *Lycaena Corydon* var.

Fowleri, nov. — H.-C. LANG : Butterflies collected in the South of France and in Corsica. — H.-G. KNAGGS : Notes on certain Scopariæ (fig.). — Dr H.-J. HANSEN : On the Morphology and Classification of the Auchenorrhynchous Homoptera. — A.-R. GROTE : Dephyletism in the Lepidoptera. — A.-G. BUTLER : The Genera *Cupido* and *Lyraena*. — W.-F. DE VISMES KANE : A Catalogue of the Lepidoptera of Ireland. — Notes diverses.

Entomologist's monthly Magazine (The), avril 1900. — T.-A. CHAPMAN : A Contribution to the Life-History of *Catharia pyrenealis* Dup. — A.-H. JONES : Lepidoptera of the Italian Lakes in October. — L. WALSINGHAM : A new Species of *Aristotelia* bred from *Hypericum*. — W.-L. DISTANT : Undescribed African Rhynchota. — E. SAUNDERS : Mimetic Resemblance between *Paragus bicolor* Fabr., a Dipteron and *Prosopis variegata* Fabr., an aculeate Hymenopteron. — J.-W. YERBURY : Notes on certain Diptera observed in Scotland during the years 1898-1899. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes (La), 1^{er} avril 1900. — C. HOULBERT : Faune analytique illustrée des Orthoptères de France (pl.). — Notes spéciales et locales.

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, V, 7, 1900. — Dr HOFFMANN : Zur Naturgeschichte der Micropterygiden. — L. v. AIGNER ABADI : Missbildungen bei Schmetterlinge (fig.). — PROF. P. BACHMETJEW : Der kritische Punkt der Insecten und das Entstehen von Schmetterlings-Aberrationen. — E. WASMANN : Zur Kenntniss der termitophilen und myrmekophilen Cetoniden Südafrikas. — Petites communications originales.

Naturaliste (Le), 1^{er} avril 1900. ☉

R. Accademia dei Lincei (Atti), 1900, I, 7. — SUPINO : Osservazioni sopra fenomeni che avvengono durante lo sviluppo postembrionale della *Calliphora erythrocephala*.

Revue éclectique d'Apiculture, avril 1900. — Insectologie. — Le *Phylloxera*.

Royal Society (Proceedings), LXVI, 427, 1900. ☉

Societas Entomologica, XV, I, 1900. — P. BACHMETJEW : Die variation der kritischen Punktes bei verschiedenen Exemplaren einer und derselben Insekten-Art. — C. FRINGS : Einige merkwürdige Aberrationen. — P. BORN : Meine Exkursion von 1899.

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire (Bulletin), février 1900. ☉

Société Entomologique de Belgique (Annales), XLIV, 3, 1900. — Diagnoses d'insectes recueillis par l'expédition antarctique belge : Dr TOSQUINET : Hyménoptères. — E. ANDRÉ : Thynnidae. — Dr JACOBS : Diptères. — Dr E. ROUSSEAU : Carabidae. — E. BRENSKE : Scarabaeidae. — J. BOURGEOIS : Dascillidae. — L. FAIRMAIRE : Hétéromères. — A. LAMEERE : Cerambycidae. — BRUNNER VON WATTENWYL : Orthoptères. — H. SCHONTEDEEN : Catalogue raisonné des Pucerons de Belgique. — J. BOURGEOIS : Étude sur les Lycides du Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique (espèces du Congo et pays voisins). — Dr M. RÉGIMBART : Contribution à l'étude de la faune entomologique de Sumatra (Dytiscides) (9^e article). — P. LESNE : Contribution à l'étude de la faune entomologique de Sumatra (Bostrychides) (10^e article).

ALLUAUD (CH.) : Contributions à la faune entomologique de la Région malgache, 8^e note. (*Bull. Soc. Ent. Fr.*), 1900, 5 fr., fig.*

DONCKIER DE DONCEEL (H) : Catalogue systématique des Hispidés. (*Ann. Soc. Ent. Fr.*), 1899, 76 p.*

DUBOIS (E.-R.) : Notes sur l'habitat des Pseudo-Névroptères et Névroptères de la Gironde, I, II. (*Feuil. J. Nat.*), 1899, 9 p.*

FAIRMAIRE (L.) : Matériaux pour la faune coléoptérique de la Région malgache, 9^e note (*Ann. Soc. Ent. Fr.*), 1899, 42 p., 2 exempl.*

FERTON (CH.) : Observations sur l'instinct du *Bembex* Fabr. (*Act. Soc. Linn. Bordeaux*), 1899, 15 p.

FLEUTIAUX (E.) : Notes rectificatives sur deux *Cicindelidae* et description d'une espèce nouvelle. (*Bull. Soc. Ent. Fr.*), 1899, 1 p.*

Id. : *Elatéridae* nouveaux de Madagascar. (*Bull. Mus. Hist. nat.*), 1899, 14 p.*

HÉER (O.) : Geographische Verbreitung der Käfer in den Schweizeralpen, besonders nach ihren Höhenverhältnissen. (*Mitth. Geb. Theor. Erdk.*), 1834, 63 p. — Don de M. H. Desbordes.

JAQUET (Dr M.) : Faune de la Roumanie (Insectes déterminés par divers auteurs) ; Coléoptères par M. E. PONEY, 2 fasc., et 3 art., 1899. — Curculionides par M. le Dr G. STIERLIN, 2 fasc., 1899. — Lépidoptères par

- MM. BLACHIER et E. FLECK, 2 fasc. 1899-1900. — Orthoptères par MM. FREY-GESSNER et H. DE SAUSSURE, 1900. — Myriapodes par M. le Dr C. VERHOEFF. — Arachnides par M. P. PAVESI. — Isopodes par M. A. DOLLFUS. — Insectes divers par M. FREY-GESSNER. — Hémiptères-hétéroptères par M. H.-L. MONTANDON.
- LAPOUGE (G. DE) : Philogénie des *Carabus*, VIII. (*Bull. Soc. Sc. méd. Ouest*), 1899, 13 p.*
- LÉCAILLON (A.) : Recherches sur l'œuf et le développement embryonnaire de quelques Chrysomélides. Paris, 1898, 230 p., 4 pl.
- LE MESLE (G.) : Mission géologique en novembre-février 1890-91. (*Expl. Sc. Tun.*), 1899, 35 p.*⊙
- MARCOTTE (F.) : Tableau méthodique et synonymique des Coléoptères des environs d'Abbeville. (*Ann. Soc. Emul. Abbeville*), 1853, 423 p. — Don de M. H. Desbordes.
- MEUNIER (F.) : Un insecte névroptère dans une résine du landénien de Léau (Brabant). (*Ann. Soc. géol. Belg.*), s. d., 4 p., fig.*
- Id. : Note sur les Collemboles de l'ambre tertiaire. (*Ann. Soc. Scient. Brux.*), 1899, 2 p.*
- OBERTHÜR (CH.) : Études d'Entomologie, livr. XII, 1888; nouveaux Lépidoptères d'Afrique et d'Amérique. — Premiers états de Lépidoptères de la Réunion. — Lépidoptères européens et algériens, 44 p., 7 pl. col. — Livr. XIII, 1890; Lépidoptères des îles Comores, d'Algérie et du Thibet, 50 p., 10 pl. col. — Don de M. le Dr R. Blanchard.
- OTTO (B. C.) : Conspectus animalium quorundam maritimarum. Breslau, 1821, 20 p. — Don de M. L. Bedel.
- PIC (M.) : Descriptions d'*Anthicidae* exotiques. (*Rev. Ent.*), 1899, 2 p.*
- Id. : Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes; 3^e cahier. Lyon, 1900, 27 p.*
- Id. : Diagnoses préliminaires d'*Helopidae* d'Asie Mineure. — Notes sur trois *Anthicus* de la région méditerranéenne. (*Bull. Soc. Ent. Fr.*), 1899, 2 p.*
- Id. : Description d'un Coléoptère malacoderme d'Asie Mineure. (*loc. cit.*), 1899, 2 p.*
- Id. : Renseignements sur les types des *Polyarthron* d'Algérie. — Description d'une variété de *Phytoecia Astarte* Ganglb. (*loc. cit.*), 1899, 2 p.*

- Id. : Contribution à l'étude des *Cerambycidae* de Chine et du Japon. (*Ann. Soc. Ent. Belg.*), 1900, 4 p.*
- Id. : Nouvelles espèces de Coléoptères appartenant au Musée civique de Gênes. (*Ann. Mus. civ. St. Nat. Gen.*), 1899, 6 p.*
- Id. : Descriptions d'Élatérides et Curculionides d'Europe et circa. (*Misc. Ent.*), 1899, 4 p.*
- Id. : Contribution à l'étude du genre *Chrysanthia* Schm. (*Feuille J. Nat.*), 1899, 3 p.*
- Id. : Quelques mots sur les droits de priorité. (*Bull. Soc. Zool. Fr.*), 1899, 2 p.*
- Id. : De l'Entomologie philosophique. Lyon, 1899, 4 p.*
- Id. : A propos de la Synonymie. (*Soc. Hist. nat. Autun*), 1898, 5 p.*
- PIC (M. ET TH.) : Bestimmungs-Tabelle der Europäischen Coleopteren, XL : *Hylophilidae* (*Euglenini*, *Xylophilini*), Paskau 1900, 21 p. — Acquis pour la Bibliothèque.
- SCHULTESS-SCHINDLER (A. DE) : Faune Entomologique du Delagoa. — Hyménoptères, 29 p. — II. Orthoptères, 25 p., 2 pl. (*Bull. Soc. Vaud.*), s. d.*
- STEFANI (T. DE) : Due Galle inedite ed i loro Autori.
- SLINGERLAND (M.-V.) : The Peach-Tree Borer. (*Corn. Univ. Agr. Exp. St.*), 1899, 2 fasc., pl. et fig.*
- TRABUT (Dr) : Une nouvelle Cochenille menaçant les Orangers (*Aspidiotus ficus*). (*Bull. Agr. Alg. Tun.*), 1900, 6 p., 1 pl., 2 exempl.*
- XAMBEU (CAP.) : Mœurs et métamorphoses des Insectes, X. (*Ann. Soc. Linn. Lyon*), 1899, 72 p. (2 exempl.).*

A.-L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 25 avril 1900.

Présidence de M. A. GIARD.

Nécrologie. — Après la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance précédente, le Président s'exprime ainsi :

Messieurs,

Notre Société déjà si cruellement éprouvée par tant de deuils récents vient encore de faire une perte irréparable en la personne de M. Alphonse Milne-Edwards, Membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine, Directeur et Professeur au Muséum d'Histoire naturelle, Professeur à l'École de Pharmacie, Commandeur de la Légion d'honneur.

Fils de l'illustre Henri Milne-Edwards, élevé au milieu des splendides collections accumulées au Jardin des plantes par les glorieux fondateurs de cet établissement, A. Milne-Edwards, à peine reçu docteur en médecine, débuta dans la science par d'importants mémoires de carcinologie. *L'Histoire des Crustacés podophtalmaires fossiles* et la *Monographie des Macrours de la famille des Thalassiniens*, publiées de 1860 à 1864, continuent et complètent en l'étendant aux âges anciens la magistrale *Histoire naturelle des Crustacés* actuels à laquelle Henri Milne-Edwards avait consacré trois volumes des *Suites à Buffon*.

C'est à cette époque (1862) que A. Milne-Edwards entra dans notre Compagnie.

Bientôt d'importantes recherches sur les Mammifères de la famille des Chevrotains et sur les Oiseaux fossiles occupèrent l'activité du jeune savant et lui valurent le titre de Lauréat de l'Institut où il ne tardait pas à être nommé (1879).

Ces travaux et ceux qu'il publia plus tard sur la faune des îles Mascareignes et sur celle de Madagascar, dont M. A. Grandidier venait de révéler les richesses, désignèrent A. Milne-Edwards pour succéder à son père dans la chaire de Mammalogie et d'Ornithologie du Muséum.

Mais notre collègue ne restait étranger à aucune branche de la Zoologie; l'examen des animaux fixés sur un câble télégraphique sous-

marin relevé du fond de la Méditerranée lui avait inspiré, dès 1870, le désir d'entreprendre dans les abîmes de l'Océan des recherches parallèles à celles que les Naturalistes anglais et américains poursuivaient avec un succès croissant sur la faune des eaux profondes.

Avec le concours du regretté A.-F. Marion et du Professeur E. Perrier il organisa les fructueuses campagnes du *Travailleur* et du *Talisman* dont il fit connaître sommairement les résultats principaux, en attendant la publication plus complète des collections.

Mais il semble que parmi tous les trésors recueillis dans ces mémorables expéditions, les Crustacés aient particulièrement attiré son attention. Revenant ainsi à ce groupe des Arthropodes qui avait été naguère l'objet de ses études de prédilection, il publia soit seul, soit en collaboration avec notre collègue Bouvier, des mémoires d'un puissant intérêt sur la morphologie comparée, la taxonomie et la distribution géographique de plusieurs grandes familles de Crustacés Brachyours et Anomours.

A d'autres plus autorisés il appartiendra de dire ce que fut A. Milne-Edwards comme Directeur-administrateur du Muséum d'Histoire naturelle et comme Président de la Société de Géographie. Mais dans cette Société d'Entomologie nous ne pouvons oublier les services qu'il a rendus à notre Science bien-aimée en guidant et en encourageant de toutes façons tant de naturalistes voyageurs.

Plusieurs de nos collègues, et en particulier mon éminent prédécesseur M. C. Alluaud, pourraient témoigner ici de la constante bienveillance et de la sollicitude avec laquelle le regretté Président du comité des Missions s'efforçait de leur atténuer autant que possible les difficultés inséparables d'expéditions lointaines en des régions peu explorées.

Si nous avons vu rarement parmi nous A. Milne-Edwards, bien qu'il fit partie de notre Société depuis près de 40 ans, nous pouvons donc affirmer qu'il ne nous oubliait pas et qu'il n'a jamais cessé de travailler avec nous et de la façon la plus effective aux progrès de l'Entomologie.

Admission. — M. Edmond Lamoureux, architecte, 44, villa Chaptal, Levallois-Perret (Seine). *Lépidoptères*.

Présentation. — M. Gaston Buchet, rue de l'Écu, Romorantin (Loir-et-Cher) [*Entomologie générale, Arthropodes du plankton*], présenté par M. A. Giard. — Commissaires-rapporteurs MM. E.-L. Bouvier et J. de Guerne.

Renseignements biologiques. — M. l'abbé J. de Joannis fait passer sous les yeux de la Société :

1^o) Une « pelote », rejetée par un rapace nocturne, et recueillie par M. L. Dupont, aux Damps (Eure). De cette pelote sont éclos, pendant le mois de février dernier, quatre *Trichophaga tapetzella* L. et, il y a peu de jours, deux *Tinea pellionella* L.;

2^o) Un sabot de cheval encore garni de son fer, ramassé en Algérie par M. A. Théry, et perforé par des tubes de *Tin. infuscatella* J. de Joann.

Communications

Description de deux nouveaux *Eriophyes* de Chine [ACAR.]

Par le Dr A. TROTTER.

Eriophyes Giraldii, n. sp. — Corps cylindrique, médiocrement allongé, s'amincissant vers l'extrémité postérieure. Bouclier thoracique ou écusson de forme losangique, parcouru par des sillons longitudinaux, dont trois sur le milieu se montrent avec plus de netteté, convergents en avant. — Soies dorsales longues comme l'écusson, dirigées en arrière, insérées à la marge postérieure. — Rostre grêle, long de 25 μ , large à sa base de 13 μ . — Pattes distinctement articulées; dernier segment plus court que l'avant-dernier, celui-ci un peu échancré vers le milieu; soie plumeuse à trois rayons (ou quatre?); l'ongle tarsal dépasse quelque peu cette dernière; soies du dernier article des tarsi bien développées. Le sternum ne semble pas être fourchu. — Abdomen finement annelé et ponctué, de 70 anneaux environ; soies latérales dépassant l'insertion ventr. de la I^e p.; celles-ci arrivant jusqu'à l'insertion des soies ventr. de la II^e p. qui sont les plus courtes; les soies ventr. de la III^e p. atteignent l'extrémité du corps. Les soies caudales sont longues comme la moitié du corps environ; il y a aussi de petites soies caudo-latérales. — Epigynium bien développé, large de 20 μ environ; plaque supérieure parcourue par de courts sillons longitudinaux; plaque inférieure carénée avec une petite soie de chaque côté de sa base (soie génitale).

Long. moyenne de la ♀ 200 μ environ; larg. 40 μ .

Long. moyenne du ♂ 115 μ environ; larg. 45 μ .

Galle. — Cette espèce vit en grande quantité dans des galles de *Rhus* sp. qui consistent en excroissances velues, irrégulières, se développant sur les feuilles, particulièrement sur les nervures et sur le rachis, ressemblant à la forme foliole des galles de l'*Eriophyes fraxini* (Karp.).

Il y avait aussi avec l'E. *Giraldii* d'autres Acariens de famille autre que celle des *Eriophyidae*, peut-être parasites ou commensaux du premier.

Monts du Lao-y-San, prov. du Shensi sept. (Chine intér.). — Été 1897.

J'ai dédié cette espèce au Rév. Père Jos. Giraldi, missionnaire, qui a envoyé de Chine ces galles avec plusieurs autres, dont la figure paraîtra dans un des prochains numéros du *Giornale botanico italiano* de la Soc. bot. d'Italie.

Eriophyes chinensis, n. sp. — Corps cylindrique, un peu aminci vers l'extrémité postérieure. Écusson petit, semi-circulaire, parcouru par des sillons longitudinaux serpentants, parfois interrompus, dont trois sur le milieu sont presque parallèles ou quelque peu convergents à la partie antérieure. — Soies dorsales médiocres, dirigées en arrière, placées au-dessus de la marge postérieure de l'écusson vers la moitié de ce dernier. — Rostre grêle. — Pattes distinctement articulées; 4^e et 5^e articles presque égaux, le 4^e un peu rétréci sur la moitié; 2^e et 3^e articles beaucoup plus gros que les 4^e et 5^e; soie plumeuse à 5 rayons, le dernier, c'est-à-dire celui du sommet, plus petit que les autres; ongle tarsal robuste, égal en longueur à la soie plumeuse; toutes les soies des articles des pattes sont bien développées, particulièrement celles du 3^e et 5^e articles et aussi les soies thoraciques de la III^e p. Il existe un sternum (simple?).

Abdomen distinctement annelé et ponctué de 60 anneaux environ; les soies latérales dépassent l'insertion des soies ventrales de la I^e p., celles-ci arrivant jusqu'à l'insertion des soies ventr. de la II^e p. qui sont très petites, aussi longues que 3-4 anneaux ventraux; soies ventr. de la III^e p. médiocres, elles arrivent à l'extrémité de l'Acarien; les soies caudales ne semblent pas atteindre en longueur la moitié du corps; il ne semble pas y avoir de soies caudales latérales. — Epigynium avec de petites soies génitales, placées en avant, quelque peu au-dessous de deux épimères inf., il est large de 20 μ environ, avec une plaque inf. carénée, la supér. sillonnée longitudinalement.

Long. moyenne de la ♀ 250 μ env.; larg. 60 μ .

Cet *Eriophyes* se distingue de *E. padi* N. par la soie plumeuse à 5 rayons, par les sculptures de l'écusson toujours présentes, par la ponctuation de l'abdomen et par la longueur des soies aussi bien que par la forme de sa galle.

Galle. — Cette espèce vit dans des galles en massue, rougeâtres, lisses, longues de 4-7 mill., se développant, parfois en grande quantité, sur la face supérieure des feuilles de l'Abricotier (*Prunus armeniaca*), s'ouvrant à la face opposée par un très petit orifice circulaire, velu.

Dans ces galles j'ai trouvé aussi quelques petites larves blanchâtres, fusiformes, appartenant peut-être à quelque Cécidomyide parasite.

Même localité. — Été 1897 (J. Giraldi).

Description d'une variété nouvelle du *Cantharis discoidea* et notes sur l'habitat de quelques autres Malacodermes [COL.]

Par J. BOURGEOIS.

CANTHARIS (subg. METACANTHARIS) DISCOIDEA Abr., var. **Carreti**, var. nov. — *Ab exemplaribus normaliter coloratis nigredine capitis magis extensa, prothoracis macula discoidali magna, triangulari, postice bilobata, elytris (humeris et angusto limbo ul marginem ochraceis exceptis), femoribus apice supra tibiisque posticis nigris discedit.*

Alpes piémontaises : Val de Cogne (abbé Carret).

Dans cette intéressante variété, qui peut être considérée comme une exagération de la var. *liturata* Redtb., la coloration noire postérieure de la tête s'étend sur toute la largeur en contournant les tempes, la tache discoidale du corselet est grande, triangulaire, élargie, plus ou moins bilobée postérieurement, les élytres sont entièrement noirs, à l'exception d'une petite tache humérale et d'un fin liséré le long de la moitié basilaire du bord marginal, les cuisses intermédiaires et postérieures sont tachées de noir en dessus à leur extrémité, les tibias postérieurs ainsi que tous les tarses sont rembrunis. Elle ressemble par la coloration à la var. *scapularis* Redtb. du *Cantharis livida* L., mais la forme du corselet et les ongles externes (♂) bifides à l'extrémité l'en distingueront immédiatement.

Je me fais un plaisir de la dédier à l'habile chasseur qui l'a découverte.

Parmi d'autres captures que M. l'abbé Carret a bien voulu me communiquer, je citerai encore

Des Alpes piémontaises :

CANTHARIS FIBULATA Märk. — Lac della Vecchia (1).

CANTHARIS ALBOMARGINATA Märk. — Val de Cogne.

RHAGONYCHA TRANSLUCIDA Kryn. (var. à poitrine rembrunie). — Pié di Cavallo. 1 ex. ♂.

RHAGONYCHA NIGRICEPS Walt, var. ATRICAPILLA Kiesenw. — Pié di Cavallo, Val Sassera. 4 ex. (1 ♂, 3 ♀).

Ces exemplaires se réfèrent en tous points à la description de Kiesenwetter, avec cette seule différence que les cuisses elles-mêmes sont fortement rembrunies. La var. *styriaca* Baudi (*Berl. ent. Zeits.*, 1871, p. 111) ne me semble pas en différer.

MALACHIUS FALCIFER Ab. — Mosso-Santa-Maria. 1 ex. ♀.

Des Pyrénées orientales :

MALACHIUS BARNEVILLEI Puton. — Cerdagne. 1 ex. ♀.

HYPERBAEUS BRISOUTI Rey. — Ria. 1 ex. ♀.

Un nouvel ennemi des Abeilles (*Phyllotocus Macleayi* Fischer) [COL.]

Par A. GIARD.

On sait que l'Abeille ordinaire (*Apis mellifera* L.), introduite en Australie depuis 1862, y prospère admirablement grâce à l'abondance des fleurs à nectar et aussi sans doute parce que bon nombre de ses ennemis du vieux continent n'ont pas été transportés dans les terres australes.

Cependant M. Walter W. Froggatt, entomologiste du gouvernement à Sydney N. S. W., vient de faire connaître un fait curieux qui pourrait en se généralisant causer de sérieux dommages à l'apiculture.

Un petit Lamellicorne très commun en Australie, le *Phyllotocus Macleayi* Fischer, long. de 8 mill. environ, qui jusqu'à présent vivait exclusivement dans les fleurs de divers arbustes, notamment des *Angophora* et des *Leptospermum*, s'est mis depuis deux ans à pénétrer dans les ruches, trouvant plus commode de dévorer le miel tout recueilli par les Abeilles.

(1) Le lac della Vecchia, le Val Sassera, Mosso-Santa-Maria, Pié di Cavallo sont situés dans les montagnes Biellaises, au nord et au nord-est de la petite ville piémontaise de Biella.

C'est au crépuscule que les *Phyllotocus* commettent leur pillage, et en trois nuits M. W. Reed, apiculteur à Pumphong Cooma, a pu détruire neuf litres de ces larrons en plaçant parmi les ruches des vases remplis d'eau miellée où ils allaient se noyer.

On sait que dans certaines régions de la France *Cetonia* (*Potosia*) *cardui* Sch h. a aussi une tendance à pénétrer dans les ruches, mais sa grande taille le rend moins dangereux que le *Phyllotocus*.

Nous avons déjà insisté sur les curieux changements de régime que peuvent présenter certains Lamellicornes (*S. E. F. Bulletin*, 1893, p. cccv). L'exemple nouveau cité par W. Froggatt méritait d'être signalé; publié dans un travail d'entomologie appliquée, il aurait pu passer inaperçu des biologistes.

Dégâts du *Forficula auricularia* Linn. dans les ruches d'Abeilles

Par H. DU BUYSSON.

Cette année, le 29 mars, j'eus l'idée d'examiner une ruche que j'avais établie l'an dernier, et en la soulevant je vis le plateau de dessous jonché de cadavres d'Abeilles parmi lesquels ceux de 18 *Forficula auricularia* L. — Une lutte devait avoir eu lieu, et en examinant les rayons je fis tomber encore sept ou huit Forficules vivants qui étaient assurément occupés à manger le miel et la cire. — Cet essaim maladif, par suite du froid de l'hiver, d'un calfeutrage insuffisant et par suite surtout de l'épuisement des provisions, avait eu à souffrir de ces intrus. Je crois intéressant de signaler le fait, attendu que cette observation ne se trouve relatée dans aucun ouvrage d'apiculture et que pareille chose s'est produite aussi, cet hiver, dans une ruche, chez M. J. Martin, préparateur d'Entomologie au Muséum de Paris.

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (*C. R. hebdomadaires des séances*), 1900, I, 45 et 46 ☉

Académie d'Hippone. — 1^o Bulletin, 1896-1898. ☉ — *Comptes rendus des réunions*, 1899. ☉

(1) W.-W. FROGGATT, Entomological notes for 1898. *Miscellaneous Publication* n° 327. *Depart. of Agriculture*, Sydney, N. S. W. 1899, p. 1, pl. 1, fig. 2.

Agricultural Gazette of N.S. Wales, XI, 3, 1900. — W. FROGGATT : Plague Locusts (pl.). — D. MAC-ALPINE : The systematic position of the Locusts-fungus imported from the Cape (pl.). — A. GALE : The Queen-Bee. — Poultry Pests. — Notes diverses.

Canadian Entomologist (The), avril 1900. — E.-F. HEATH : Notes on Captures of Lepidoptera. — N. BANKS : Some new North American Spiders. — G.-D. HULST : Some new Species of Geometridae. — A.-R. GROTE : Note on *Gortyna erepta*. — W.-G. WRIGHT : *Anthocharis flora*. — W. KNAUS : The Cicindelidae of Kansas. — H.-J. ELWES : *Cyaniris pseudargiolus* Boisd. et Lec. — H.-G. DYAR : Life History of *Margarodes flegia* Cr. — H. LYMAN : Notes on a few Butterflies from the Yukon. — Notes diverses.

Entomologist's Record and Journal of variation (The), avril 1900. — L.-B. PROUT : *Phibalapteryx aquata* as a British species. — J.-W. TUTT : Note on *Psychidea graecella* Millière. — E. WASMANN : The Guests of Ants and Termites (traduction). — T.-A. CHAPMAN : Notes on the Fumeids, with descriptions of new species and varieties (pl.). — R. BROWN : Digne revisited. — N. ANNANDALE : Notes on Orthoptera in the Siamese Malay States. — M. BURR : On the British Orthoptera in the Hope Museum, Oxford. — Notes diverses.

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, V, 8, 1900. — L. SORHAGEN : Restitutio in integrum, I : *Coleophora albidella* H. S. (fig.). — G. PAGANETTI-HUMMLER : Beitrag zur Fauna Süd-Dalmatien, IV. — FR.-W. KONOW : Abnorme Kopfbildung bei *Tenthredopsis elegans* KDW. — FR.-P. BACHMETJEW : Der kritische Punkt der Insekten und das Entstehen von Schmetterlings-Aberrationen. — Petites notes originales.

Instructor (El), mars et avril 1900. ☉

K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (Verhandlungen), 4, 2 et 3, 1900. — Dr P. KEMPNY : Ueber die Perlieden-Fauna Norwegens (fig.). — Die Verwerthung überschüssiger Spermatozoen im Organismus weiblicher Insekten (fig.). — J. MÜLLER : Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae et Gyrinidae Dalmatiae. — Pr J. SAHLBERG : Eine neue Art der Bembidiinengattung *Anillus* von Korfu. — M. PIC : Neue Pedilidae und Anthicidae. — L. GANGLBAUER : Eine neue sibirische *Agapanthia*. — Dr R. COBELLI : Contribuzioni alla biologia del *Lophyrus pini* L.

A. L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 9 mai 1900.

Présidence de M. A. GIARD.

Correspondance. — M. E. Lamoureux remercie la Société de son admission.

Distinction honorifique. — Le Président a le plaisir d'annoncer à la Société que notre collègue M. H. Miot, de Beaune, a été récemment promu officier du Mérite agricole.

M. Miot avait été, depuis de longues années, de la part de diverses sociétés savantes et de jurys d'expositions, l'objet de nombreuses récompenses décernées pour ses recherches et collections d'Entomologie appliquée dont il s'occupe depuis plus de quarante ans. Ces récompenses avaient été consacrées par les palmes d'Officier d'Académie, puis par celles de l'Instruction publique, plus tard il avait été nommé chevalier du Mérite agricole.

Admissions. — M. Gaston Buchet, rue de l'Écu, Romorantin (Loir-et-Cher). *Entomologie générale, Arthropodes du plankton.*

— Le Musée zoologique de l'Université de Naples (Italie).

Présentations. — M. Stephen-A. Forbes, state entomologist, Urbana, Illinois (États-Unis d'Amérique) [*Entomologie générale et appliquée*], présenté par M. A. Giard. — Commissaires-rapporteurs MM. E.-L. Bouvier et P. Marchal.

— M. Nicolas Victor Nassonow, professeur et directeur du Musée de Zoologie à l'Université impériale de Varsovie (Russie) [*Entomologie générale, anatomie des Articulés*], présenté par M. Ph. François. — Commissaires-rapporteurs MM. E.-L. Bouvier et Ch. Janet

Démission. — M. l'abbé Deharle, ex-vicaire à la cathédrale de Laon, a envoyé sa démission de membre de la Société.

Changements d'adresse. — M. J. Clermont, 5, rue des Ciseaux, Paris.

— M. H. Coss, 39, the Avenue, Subitan Hill, Surrey (Angleterre).

Captures. — M. l'abbé J. de Joannis signale la capture de *Paranarsia Joannisiella* Rag., à Anagni (Italie centrale). Ce Microlépidoptère avait été découvert à Lourdes (Hautes-Pyrénées), par M. L. de Joannis, il y a une dizaine d'années.

— M. P. Pigeot, de Rethel, signale la capture d'*Andrena nyctemera* Im., à Charleville (Ardennes). Cette espèce était connue seulement jusqu'à présent des rives de l'Aar et du Rhin, en Suisse, et considérée comme très rare.

Il ne s'agit pas là d'une capture accidentelle, M. Pigeot a pris cette Andrène en mars et avril 1899, il l'a reprise en assez grand nombre cette année (une douzaine de ♀), dans le même endroit; c'est donc une espèce nouvelle pour la faune française. Cet Hyménoptère creuse ses galeries dans les talus sableux, exposés au midi, que l'on rencontre au bois de Lecuyer en face du hameau de Vivier Guyon.

— M. A. Giard présente à la Société de curieuses larves, recueillies en avril, au cap Nègre dans les Maures, par notre collègue M. L. Léger, qui les lui a communiquées pour la détermination. Ces larves sont des *Embia Solieri* Rambur, à divers états de développement. Elles vivaient sous les pierres dans des terrains schisteux très chauds. L'*Embia Solieri* est une espèce fort rare en France. Maurice Girard a même supposé naguère qu'elle était d'importation dans notre pays. M. A. Giard se range plutôt à l'opinion d'I. Bolivar qui considère les Embides comme appartenant réellement à la faune circumméditerranéenne (voir *Petites Nouvelles entomologiques*, t. II, 1877, p. 182 et p. 185).

Les larves d'*Embia Solieri* sont aussi communes aux environs de Banyuls (Pyrénées-Orientales) et M. Giard a pu examiner un exemplaire de cette localité récolté par M. Dubosq, chef des travaux zoologiques à la Faculté des Sciences de Grenoble.

Communications.

Quelques Hémiptères du Maroc

Par O.-M. REUTER.

M. le Dr A. Chobaut a bien voulu me communiquer une récolte d'Hémiptères du Maroc. La faune hémiptérologique de ce pays étant très peu connue, je donne ici les noms des espèces susdites.

1. *Psacasta (Cryptodentus) tuberculata* F., Tanger, mai 1897. — 2. *Cydnius pilodulus* Klug, Larache, février 1899. — 3. *Macroscytus brunneus* F., Tanger. — 4. *Geotomus elongatus* H. S., Larache. — 5. *Crocistethus aeneus* Brullé, Larache, février 1899. — 6. *Croc. basalis* Fieb., ibid. — 7. *Holcostethus analis* Costa. — 8. *Eurydema festivum* L. var. *picta* H. S., Tanger, juin 1896. — 8a. Id. var. *decorata* H. S., Tanger, février 1896. — 9. *Zicrona coerulea* L. var. *viridiaenea*. — 10. *Verlusia rhombea* L., Tanger, mars 1896. — 11. *V. (Haploprocta) sulcicornis* F., Tanger. — 12. *Bothrostethus subinermis* Put., Larache, février 1899. — 13. *Micrellytra fossularum* Rossi, Tanger, févr. 1896. — 14. *Cymus melanocephalus* Fieb. — 15. *Pamera calcarata* Gut., Tanger. — 16. *Rhyparochromus pruetextatus* H. S., Tanger, mai 1894. — 17. *Plinthisus Putoni* Horr., Tanger. — 18. *Lasiocoris apicimacula* Costa, Larache, mai 1899. — 19. *Aphanus (Microtomideus) carbonarius* Ramb., Tanger, juin 1896. — 20. *A. alboacuminatus* Goeze var. *funerea* Put., Tanger. — 21. *Beosus maritimus* Scop., déc. 1894. — 22. *Dieuches albostrigatus* F., Tanger. — 23. *Scantius aegyptius* F., Larache, févr. 1899. — 24. *Tropidochila geniculata* Fieb. (var. articulo secundo antennarum paullo graciliore limboque marginali corii angustissimo), Larache. — 25. *Aneuris luevis* F., Tanger. — 26. *Phymata monstrosa* F., Tanger, janvier 1897. — 27. *Ploiariodes* (B. White 1881 = *Ploiariolu* Reut. 1888) *brevispina* Put. var. **CHOBAUTI** n. var. (an species propria?), Tanger. — 28. *Pirates hybridus* Scop. var. *stridulus* F., Tanger, mai 1896. — 29. *Prostemma albimacula* Stein, Tanger. — 30. *Nabis (Aptus) lativentris* Boh., Tanger, janv. 1898. — 31. *Pilophorus pusillus* Reut., Tanger. — 32. **ACANTHIA (CHILOXANTHUS) PYGMAEA** n. sp., Larache, deux ex. — 33. *Acanthia (Chartoscirta) Cocksi* Curt., Tanger.

Voici la description des formes nouvelles.

1. **PLOIARIODES BREVISPIA** var. nova **Chobauti** (an species propria?). — Nigro-fusca, capitis lateribus lineis duabus longitudinalibus, pronoto carinis lateralibus basin versus margineque postico, apice spinæ scutelli, dimidio basali segmentorum connexivi, rostro, antennis pedibusque cum coxis albidis; antennis pedibusque glabris, rostro articulo primo annulo fusco, antennis articulo primo apice annulisque 7 8 fuscis his albidis aequae latis vel latioribus, articulis ultimis fuscis, secundo ultra medium albido-annulato, annulis circiter sex, secundo primo parum brevior, tertio parti secundi annulis destitutæ aequae longo, quarto tertio vix duplo brevior; coxis anticis externo ante apicem punctis duobus fuscis, femoribus anticis annulis quatuor magis mi-

fusce distinctis, intermediis apice annulisque circiter septem valde angustis, posticis annulis circiter octo angustis nigro-fuscis, tibiis anticis annulis duobus ante medium apiceque, posterioribus annulis plurimis angustis apiceque sat late nec non tarsis omnibus fuscis; hemielytris basi, limbo externo venisque discoidalibus albis; membrana nigro-fusca, albo-irrorata et reticulata, apicem abdominis subaequante; pronoto capiti aequae longo, a superno viso lateribus apicem versus rotundato-ampliato, disco antice utrinque sat elevato et foveolato, medio carinis obtusis duabus basin versus evanescentibus, basi medio tuberculo nigro obtuse elevato instructo, utrinque ante angulum basalem tuberculo testaceo extrorsum angulato-producto; spina scutelli sat longa, obliqua, leviter curvata. — Longit. 3 2/3 mill.

A *Pl. brevispina* Put., mihi ignota, pronoto basi solum tuberculo medio nec spina armato, femoribus posterioribus angulis nigro-fuscis his albidis multo angustioribus, femorum posticorum solum octo nec duodecim, coxis anticis externe ante apicem solum punctis duobus parvis fuscis nec macula magna nigra notatis demumque verisimiliter etiam statura minore divergens. A *Pl. Baerensprungi* Döhrn differt magnitudine sat multo minore, pronoto basi medio tuberculo nec spina armato, spina scutelli apice pallida, brevior et magis obliqua nec suberecta, connexivi segmentis dimidio basali albidis, antennarum articulo primo annulis fuscis angustioribus et pluribus, secundo ultra medium albo-annulato, femoribus annulis fuscis his albidis multo angustioribus. Magnitudine *Pl. melanacanthae* Horv. et *Xambeui* Mont. similis, ab illo pronoto basi medio nigro-tuberculato, margine basali ejus apiceque spinæ scutellaris albidis, ab hac structura antennarum notisque aliis superne commemoratis mox distincta.

2. *Acanthia (Chiloxanthus) pygmaea*, n. sp. — Obovata, retrorsum sensim sat fortiter ampliata, nigra, superne brevissime nigropilosella, capite, pronoto et scutello nitidulis, fronte utrinque ad oculum vittula flavo-testacea, pronoto scutelloque breviter dense aureosericeis, pronoto fortiter transverso lateribus antice anguste postice late flavo-testaceis; hemielytris opacis, clavo sericeo-nigro, vitta angustiore juxta marginem scutellarem aliaque latiore juxta suturam clavi, endocorio macula basali, mesocorio maculis tribus aequedistantibus, quarum basali et apicali minoribus, ectocorio, macula parva anteapicali excepta, limboque marginali, apice excepto, nec non areis tribus exterioribus membranae flavo-testaceis, corio macula ante medium aliaque majore ante apicem sericeo-nigris; membrana (formae brachypterae) apicem abdominis attingente, margine inferiore recta

areolis quatuor instructa; limbo antico prosterni, acetabulis anticis et intermediis limbo antico sat lato nec non marginibus segmentorum ventralium anguste albicantibus; pedibus flavo-testaceis, femoribus superne et inferne seriatim nigro-punctatis, tibiis fusco-spinulosis, apice nigro-fusco, tarsis articulo ultimo apice nigro-fusco; capite apici pronoti aequae lato et basi hujus circiter $1/4$ angustiore, verticali, fronte setis quatuor nigris exsertis; ocellis inter se ac ab oculis fere aequae distantibus; antennis totis nigris, articulo secundo latitudini verticis oculique unici aequae longo, tertio secundo circiter $3/7$ brevior, quarto tertio aequae longo; pronoto basi margine laterali magis quam duplo latiore, lateribus rectis mox ante apicem subito arcuatis, callo magno, disco postico brevi; tarsis posticis articulo tertio secundo paullo longiore. — Long. ♀ 2 $1/2$ mill.

Var. B. : Pronoto lateribus loboque postico solum medio excepto, apice scutelli hemielytrisque sordide flaventibus, clavo medio, corio maculis duabus discoidalibus, macula marginali ante apicem apiceque, membrana venis limboque exteriore nigricantibus; acetabulis anticis etiam margine externo anguste segmentoque genitali feminae apice late albicantibus.

Species eximia, ab omnibus subgeneris *Chiloxanthus* statura minuta obovata hemielytrisque locis sericeo-nigris variegatis distinctissima, a subgenere *Acanthia* in sp. pronoto versus apicem minus angustato, apice capiti latitudine aequali, limbo laterali inferne flavo-testaceo, nec non ocellis multo latius distantibus divergens.

Obs. — Membrana in subgen. *Chiloxanthus* areolis nunc quatuor nunc quinque instructa, character in eadem specie (ex. gr. in *Ch. piloso*) variabilis.

Note sur *Enconista miniosaria* Dup. [LÉP.]

Par l'abbé J. DE JOANNIS.

Mon frère et moi avons reçu, à l'automne dernier, une série de soixante-trois *Enconista miniosaria* Dup. recueillis aux environs de Soalheira, province de Beira Baixa (Portugal), non loin de la frontière d'Espagne. Cette série présente des variétés intéressantes.

E. miniosaria a été décrit par Duponchel (tome VII, pl. 160, fig. 4), d'une localité inconnue. Les ailes supérieures ont le fond blanc saupoudré de noir et de rose, et sont traversées par les quatre lignes ordinaires, généralement très bien marquées en noir. Duponchel a, de

plus, décrit sous le nom de *perspersaria* (ibid., pl. 169, fig. 1 et 2) deux formes de la même espèce, presque unicolores, l'une gris jaunâtre, l'autre gris rougeâtre, les lignes n'y sont indiquées que par quelques taches isolées. Guenée fit connaître la vraie région de cette espèce; dans son *Species* (*Ur. et Phal.*, t. II, p. 543), il dit en effet qu'il a reçu, des *Pyrénées orientales*, deux exemplaires de la forme *miniosaria*, ils sont actuellement dans la collection de M. Ch. Oberthür. L'aire de dispersion des deux formes est sensiblement la même : Piémont, France méridionale, Espagne (notamment un ♂ de la forme *miniosaria*, de Chiclana, coll. de Graslin actuellement dans la coll. Oberthür), et Portugal. Toutefois elles semblent y être inégalement réparties. La forme *perspersaria*, seule indiquée de Piémont dans le catalogue Staudinger, prédomine de beaucoup dans le midi de la France. A cet égard, je noterai que la forme typique, *miniosaria*, à lignes foncées, a été trouvée dans le département de la Haute-Garonne, au plateau de Montreich (environ 1.000 mètres), mais en très faible proportion (A. de Caradja, *Iris*, 1893, p. 235). Au contraire c'est la forme typique qui dans la série de Portugal est prédominante (environ les deux tiers).

Il y a lieu de mentionner spécialement une forme intermédiaire entre les deux qui ont reçu des noms. Chez elle, le fond est brunâtre uniforme plus foncé même parfois que chez *perspersaria*, mais les quatre lignes y sont très marquées, comme chez *miniosaria*.

On constate aussi de grandes variations dans l'épaississement des lignes, dans le développement des écailles roses ou des écailles noires modifiant considérablement la couleur du fond.

Je signalerai spécialement une série de variations, très nettes ici, dans la position des lignes. L'ombre médiane et la subterminale sont



Variations d'*Enconista miniosaria* Dup.

sensiblement invariables, tandis que les deux autres lignes se déplacent. Les quatre figures ci-jointes donnent une idée de ce qui se passe. Dans 1, l'extrabasilaire et la coudée sont très inégalement distantes de l'ombre médiane; elles en sont au contraire à égale distance dans 2.

Dans 3, elles se rejoignent par leurs angles sur le pli dorsal, formant une sorte de boucle le long du bord interne; enfin dans 4, elles se rapprochent encore et se confondent près du bord interne en une large tache noire. Bien entendu, on trouve tous les intermédiaires, notamment la coudée soudée à l'ombre médiane, comme dans 4, tandis que l'extrabasilaire en est très distante.

Description d'une nouvelle espèce de Microlépidoptère de France

Par P. CHRÉTIEN.

Brachmia medjella n. sp. — Enverg. 14 mill. — Ailes supérieures étroites, allongées, acuminées, brun foncé, soyeux et luisant avec une très légère teinte vineuse, présentant trois points noirs très distincts : deux petits superposés un peu obliquement et placés avant le milieu, le troisième plus gros, placé après le milieu de l'aile; pas de taches claires opposées; franges brunes, divisées par une ligne plus foncée. Ailes inférieures gris clair, soyeux, luisant; franges brunâtres, d'un jaunâtre clair à la base, indistinctement divisées par une ligne plus sombre. Tête et thorax gris plus ou moins foncé, palpes gris plus clair, à dernier article zoné de brun noir au milieu, antennes brun noirâtre.

Chenille fusiforme, à segments bien prononcés, d'un brun rougeâtre très foncé, sans autre ligne ou bande que la stigmatale, dont la ligne inférieure qui est blanchâtre et très fine est seule assez distincte; le premier segment est zoné de blanc antérieurement, les deuxième, troisième et quatrième présentent de chaque côté des taches blanches, allongées et obliques; verruqueux indistincts, poils courts et blonds; tête, écusson, pattes écailleuses et stigmates noirs.

Cette chenille est très vive et agite fébrilement la partie antérieure de son corps quand elle se déplace. Elle vit en juin sur le *Cotoneaster vulgaris* Lindl. dans les feuilles réunies par les bords et qu'elle mange en respectant toutefois la surface extérieure. Quand les feuilles sont trop petites pour la renfermer, elle en relie plusieurs bout à bout les unes aux autres et en forme comme une galerie couverte. Pour se transformer, elle fait un petit cocon de soie blanche entourée de grains de terre.

Sa chrysalide est d'un brun jaunâtre luisant, élargie antérieurement, aplatie sur le dos et très atténuée postérieurement; mucron obtus, garni de poils raides à crochets : les plus longs de ces poils sont à la base, les plus courts au centre.

Le Papillon vole en juillet, dans le vallon du Puy-Vacher, en face de la Meije (Hautes-Alpes), à une altitude de 2.000 mètres et au-dessus.

Sur quelques *Mymaridae* du copal fossile [HYMÉN.]

Par Fernand MEUNIER.

Parmi les Hyménoptères *Oxyura*, ce sont les *Mymaridae* qui par l'aspect bizarre de leur corps et leur extrême petitesse doivent principalement intéresser les biologistes et les systématistes.

La plupart des espèces de cette tribu paraissent avoir vraisemblablement des habitudes terrestres. Cependant les *Cosmocoma* (*Polynema* auct.) *natans* et *Prestwichia aquatica* Lubb. ont des ailes et des tibias leur permettant de se diriger à la surface des eaux.

Quelques *Mymar* [1] Hal. et d'autres petits *Proctotrypidæ* [2] ont été rencontrés dans l'ambre de l'oligocène inférieur de la Baltique et le copal fossile, mais aucun paléontologiste n'a étudié les *Mymaridae* inclus dans la dernière de ces résines.

Ces pygmées, nommés plus exactement atomes ailés, ne peuvent être confondus avec les Névroptères physopodes ou Thripsiens, leur facies morphologique étant entièrement différent.

Les deux *Mymaridae* décrits ci-dessous se trouvaient dans une petite collection d'insectes du Copal qui m'a été remise par M. Künow, le savant conservateur honoraire du Musée zoologique de Königsberg.

Pour ne pas compliquer l'étude déjà difficile de ces Hyménoptères, je me bornerai à esquisser les caractères typiques rapprochant ces *Oxyura* des genres vivants avec lesquels ils ont le plus d'analogie.

1.) Tête aussi large que le thorax. Vertex paraissant aplati. Palpes invisibles.

Antennes de 9 articles : les deux basilaires saillants, les 3^e, 4^e et 5^e presque cylindriques, les 6^e, 7^e, 8^e deviennent graduellement plus oviformes. Le fouet (Knopf) ovoïde et aussi long que les trois précédents réunis. Le 8^e article s'anastomose si intimement au 9^e qu'on peut, à première vue, le confondre avec celui-ci (fig. I). — Thorax aussi large que l'abdomen. Prothorax invisible. Mésothorax grand. Métathorax indistinct. Scutellum très appréciable. — Abdomen



Fig. I.

sessile, ovoïde. A un fort grossissement, on ne peut déterminer rigoureusement le nombre de ses segments. Oviscape (Bohrer) à peine indiqué. La tête et le corps ont une couleur rouge métallique. — Ailes antérieures légèrement spatuliformes (löffelförmig) (fig. II), les postérieures

plus linéaires (fig. III). Nervus ulnerus des ailes antérieures fort et peu éloigné de la base. Poils alaires très longs, se croisant vers le milieu du champ de l'organe et laissant une aire transparente non ciliée à la partie spatuliforme. Ce dernier caractère, déjà entrevu par Duisburg,




Fig. II.




Fig. III.

rapproche cet articulé du genre *Anagrus* Hal. [3]. Par le nervus ulnerus ce fossile semble voisin des *Rachistus* Hal. (*Gonatocerus* Nees.), mais il s'en distingue par le nombre d'articles aux antennes. Les nervures médianes des ailes antérieures et postérieures aboutissent respectivement au delà du milieu et vers l'apex de ces organes. Les fémurs et les tibias dilatés (keulenförmig) et les articles tarsaux pentamères indiquent que ce *Mymaridae* a de l'affinité avec le *Litus cynipseus* Hal. Par les antennes de 9 articles cette bestiole se sépare des *Rachistus* et *Limacis* Förster, qui ont l'un 11 et l'autre 8 articles.

Taille d'environ 0,1 mill. Ce fossile est invisible à l'œil nu.

2.) Ce Proctotrypien est plus altéré que le précédent. Les antennes paraissent avoir 11 articles : le basilaire saillant, bombé, presque aussi long et de forme analogue à celle du fouet; le deuxième gros et godiforme, les 3^e à 6^e articles ⁽¹⁾ petits, fortement unis entre eux; les 7^e à 10^e articles godiformes et de diamètre plus grand que les 4 précédents. Le fouet ovoïde aussi long que les articles 5 à 10 pris ensemble (fig. IV).




Fig. IV.

Les ailes antérieures (fig. V) moins linéaires que les postérieures (fig. VI).

(1) A un grossissement de 358 diamètres les articles 3 à 5 semblent enchevêtrés, ce qui m'oblige à les figurer un peu schématisés.

Le nervus ulnerus de la première paire se termine à peu de distance de la base. Il existe une nervure médiane aux quatre ailes. Les cils de




Fig. V.




Fig. VI.

ces organes ne se croisent pas vers le centre, mais émergent, d'un côté, très près du contour périphérique.

Vu à 358 diamètres, les tarses semblent être composés de 5 articles, avec le métatarse plus court que les 4 suivants. Ce caractère rapproche cet Hyménoptère des *Ooctonus* Hal. qui, de l'avis même du Dr Förster, ont plusieurs traits de ressemblance avec les *Cosmocoma* [4] Först. (*Polynema* auct.). Par le nervus ulnerus ce minuscule *Oxyura* est voisin de ce dernier genre. L'état de conservation du fossile ne permet pas de constater si l'abdomen est sessile ou pétiolé. Les caractères de la tête, du thorax et de son scutellum sont trop imparfaitement indiqués pour les décrire rigoureusement.

En attendant de nouveaux matériaux d'étude, on ne peut préciser davantage les liens de parenté de ce pygmée avec les autres *Mymaridae*; et il est prudent de s'abstenir de donner de nouveaux noms génériques à ces *Proctotrypidae*.

Ces quelques faits, glanés dans un groupe aussi curieux que les *Mymaridae*, laissent entrevoir que les recherches de micro-paléontologie feront mieux saisir plusieurs points de l'histoire phylogénique des *Proctotrypii*, *Chalcidii* et des autres articulés microscopiques du succin et du copal fossile.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.

[1] DUISBURG. — Zur Bernstein-Fauna. *Schrift. d. phys. ökonom. Gesellsch. Königsberg* 1868, t. IX, pp. 23-28, avec figure.

Löw, H. — Zur Verwandlungsgeschichte der Mymariden. *Stett. Ent. Zeit.* Stettin 1847, t. VII, pp. 339.

[2] DALMAN, J. W. — Om insekter inneslutne i Copal, etc. *Kongl.*

Vetensk. Acad. Handlingar. Stockholm 1825,
p. 385.

HOPE, F. W. — Observations on Succinic Insects. Part the second. Gums and Resins. *Trans. of the Ent. Soc. London*, 1837-1840, t. II, pp. 53-56.

[3] FÖRSTER, Arn. — Ueber die Familie der Mymariden. *Linn. Ent.* Berlin, Posen u. Bromberg. 1847, t. II, pp. 195-233.

WALKER FR. — Descriptions of the Mymaridae. *Ann. and Mag. o. Nat. Hist.* London 1846, t. XVIII, pp. 49-54f.

[4] MARSHALL, T. A. — A catalogue of Brit. Hymenoptera Oxyura. London 1873, pp. 22-25.

Sur la parthénogénèse des Phasmes [ORTHOPT.]

Par R. DE SINÉTY.

L'aptitude des Phasmes à la reproduction parthénogénétique a été constatée dans ces dernières années par divers observateurs et chez diverses espèces. Dans l'impossibilité de faire ici l'historique complet de cette question, qui possède déjà toute une bibliographie, rappelons seulement que la première publication qui s'y rapporte est due à M. l'abbé Dominique et que ce même naturaliste a donné récemment une notice revisionnelle que l'on peut considérer comme la mise au point très exacte des résultats acquis (1).

1° Des pontes parthénogénétiques ont été constatées chez tous les Phasmes dont l'élevage a pu être mené à bonne fin :

Bacillus gallicus Charp. (Dominique, Nantes).

« « var. *occidentalis* (Chaves, Açores).

« *Rossii* Fabr. (Krauss, Tübingue).

Leptynia hispanica Bol. (Pantel, Ucles).

Eurycnema herculeana Charp. (Wolf. von Wülfling, Batavia).

2° Dans tous les cas où l'on a pu suivre le sort ultérieur des œufs, la ponte parthénogénétique s'est montrée accompagnée de thélytokie (*Bacillus gallicus*, *B. Rossii* (2), *Eurycnema herculeana*).

(1) *Bull. Soc. Sc. nat. Ouest*, t. 9, 1899, p. 127.

(2) D'après Dominique, *Bacillus Rossii* aurait fourni à Heymons une moyenne de 1 mâle pour 20 femelles, ce qui irait à l'encontre de la thélytokie;

Or on doit se demander jusqu'à quel point la thélytokie ici observée est liée à l'absence de fécondation.

Nous ferons remarquer à ce sujet que les espèces ci-dessus énumérées se prêtent mal à l'étude de la question. Chez ces espèces, en effet, les mâles sont introuvables (*Bacillus gallicus*, *Eurycnema herculeana*) ou extrêmement rares (*Bacillus Rossii*). De ce que les femelles se montrent thélytoques, dans les cas de séquestration, on ne peut pas conclure en rigueur qu'elles se comportent autrement qu'à l'état libre. La question demeure donc ouverte.

Nous nous sommes adressé à une espèce plus favorable, le *Leptynia attenuata* Pant., d'Espagne et Portugal, chez laquelle les mâles sont très nombreux.

Nos observations sur cette espèce se poursuivent depuis deux ans. En 1898 et 1899 nous avons obtenu et isolé avec soin, ponte par ponte, un assez grand nombre d'œufs parthénogénétiques.

Aucune éclosion n'a été observée en 1899; mais cette année (1900) nous avons eu simultanément des éclosions parmi les œufs d'un an comme parmi ceux de deux ans, et toutes les larves jusqu'ici observées se trouvent être des femelles.

Les circonstances secondaires de l'éclosion, dans les œufs parthénogénétiques, ne nous paraissent pas différer beaucoup de ce que l'on observe dans les œufs fécondés.

Une de ces circonstances la plus digne d'attention est sans aucun doute le retard d'une et peut-être de plusieurs années. Nous l'avons observé non seulement chez *Leptynia attenuata*, mais aussi chez *Leptynia hispanica* Bol. (1), espèce très voisine, et nous le trouvons signalé dans deux notes récentes, relatives aux mêmes élevages, l'une de M. François (2), l'autre de MM. Piel de Churchville (3). Mais nous devons faire remarquer qu'il n'est pas nécessairement connexe à l'absence de fécondation.

Nous venons de mentionner des pontes parthénogénétiques qui ne l'ont point présenté et d'autre part, nous observons tous les ans, depuis

mais nous ferons remarquer que Heymons ne dit pas s'il a établi sa moyenne sur des pontes de femelles libres ou de femelles séquestrées.

(1) Sur les œufs parthénogénétiques obtenus en Espagne et mis à notre disposition, pour notre étude, par le P. Pantel, observons que de cette espèce nous n'avons obtenu que des femelles, mais la signification de ce fait n'est pas autre que dans le cas du *Bacillus gallicus*, car le mâle de *Lept. hispanica* est aussi excessivement rare.

(2) *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 398.

(3) *Miscellanea entomologica*, vol. VIII, n° 1, 1900.

que nous avons été amené à nous occuper de l'élevage des Phasmes, des œufs de femelles libres qui n'éclosent qu'après deux ans et donnent des mâles et des femelles de *Leptynia attenuata*.

Une autre circonstance assez singulière, mais commune aussi aux deux catégories d'œufs, c'est que dans la ponte d'une même femelle, ce ne sont pas les œufs les plus âgés qui éclosent toujours les premiers. Dans plusieurs lots observés avec soin, les éclosions ont commencé par le milieu de la série, pour continuer ensuite avec assez de régularité par ordre d'âge.

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1900, I, 17-18. ⊙

Annales du Musée du Congo. — Zoologie, I, 1899. ⊙

Annals and Magazine of Natural History, mai 1900. — T.-D.-A. COKERELL : Observations on Bees collected at Las Vegas, New Mexico, and in the adjacent Mountains. — W.-L. DISTANT : Rhynchotal Notes. — IV. *Heteroptera* : *Pentatominae* (part.). — A.-G. BUTLER : A List of the Species of *Cyaniris*, a well-known Group of the Family *Lycaenidae*. — L. WALSINGHAM : Asiatic *Tortricidae*. — R.-J. POCKOCK : Some new or little-known Neotropical Scorpions in the British Museum.

Archives provinciales des Sciences, 1^{er} avril 1900. ⊙

Association française pour l'avancement des Sciences. Bulletin de l'AFAS — Avril 1900. ⊙

Entomological News, XI, 3-4, 1900. — W.-J. HOLLAND : Alaska Insects, (2 art.). — J.-J. RIVERS : A New *Metrius* from California. — R.-W. DOANE : Notes on a New Sugar-Beet Pest, with a Description of the Species. — J.-S. HINE : *Pangonia chrysocoma* Ost. Sack. — F.-C. BOWDITCH : Collecting Notes. — H. OSBORN : A New Species of *Eutettix* (Jassidae, Homoptera). — H. NEWCOMB : Smiths' List. — E.-B. WILLIAMSON : On the Habits of *Tachopteryx Thoreyi* (Odonata). — W.-J. FOX : Arrangement of the extra-American Species of *Mutilla*. — H. SINNER : North American *Hesperidae* (pl.). — W.-M. WHEELER : On the Genus *Hypocharassus* Mik. — C.-L. MARLATT : *Aspidiotus diffnis* another Scale Insect of probable European Origin recently found in N. America. — O.-W. BARRETT : Description of *Papillio*

Electryon. — D.-W. COQUILLET : Two New Genera of Diptera (fig.). — N. BANKS : A new Genus of Atropidae (fig.). — G.-M. DODGE : List of Catocalae taken at Louisiana, Missouri. — B.-F. WEBSTER : Some Insect Notes. — Notes diverses.

Entomologische Nachrichten, XXVI, 7 et 8, 1900. — T. BECKER : Die Leptiden-Formen im Gebiete der Europäischasiatischen und Mittelmeer-Fauna (fig.). — W. HORN : Ueber einige U. S. A.-Cicindelen. — FR.-W. KONOW : Neue Sibirische Tenthrediniden. — F. KARSCH : Ein neuer *Papilio* (*P. Thurani*) aus Ostafrika.

Entomologist (The), mai 1900. — W.-J. LUCAS : Dragonfly Season of 1899 (pl.). — R.-J.-F. DONOVAN : Lepidoptera occurring in County Cork. — G.-W. KIRKALDY : A Guide to the Study of British Waterbugs (Aquatic Rhynchota). — W.-F. DE VISMES-KANE : A Catalogue of the Lepidoptera of Ireland. — Notes diverses.

Entomologist's monthly Magazine (The), mai 1900. — J.-H. WOOD : On the Larvae, Habits and Structure of *Lithocolletis concomitella* Banks and its nearest Allies. — L. WALSINGHAM : A new *Eriocrania* from England. — F.-D. MORICE : *Ellampus truncatus* Dahlb., an Addition to the List of British Chrysid. — K.-J. MORTON : Some old Records of the Occurrence of certain Dragonflies in Scotland. — R. MAC LACHLAN : An extraordinary melanic Variety or Aberration of *Enallagma cyathigerum* Chp., ♂ (fig.). — T.-A. MARSHALL : List of some Corsican Diptera. — Notes diverses. — C. MORLEY : On *Sphegophaga vesparum*, Curt.

Entomological Society of London (Transactions), 1899, I-V. — T.-A. MARSHALL : A Monograph of British *Braconidae*, VIII (pl.). — F.-M. VAN DER WULP : *Asilidae* from Aden and its neighbourhood (pl.). — J.-H. LEECH : Lepidoptera heterocera from Northern China, Japan, and Corea, II. — P.-I. LATHY : A Monograph of the Genus *Calisto* Hübn. (pl.). — F.-D. MORICE : Illustrations of specific characters in the armature and ultimate ventral segments of *Andrena* ♂ (pl.). — Notes on *Andrena taraxaci* Giraud, and the species most resembling it, with synoptic tables, and descriptions of two new species. — T.-A. CHAPMAN : A Contribution to the Life-History of *Micropteryx* (*Eriocephala*) *ammanella*. — G.-J. ARROW : On sexual Dimorphism in Beetles of the family *Rutelidae*. — Notes on the Rutelid genera *Anomala*, *Mimela*, *Popilia* and *Strogoderma*. — C.-H. DOLBY-TYLER : The development of *Ceroptastes roseatus* Towns. and Ckll. (pl.). — R. MAC LACHLAN : A second Asiatic species of *Corydalis* (pl.). — A.-E. EATON : An annotated

- List of the *Ephemeridae* of N. Zealand (pl.). — H.-J. ELWES : On the *Lepidoptera* of the Altai Mountains (pl.). — F. MERRIFIELD et E.-B. POULTON : The Colour-relation between the pupae of *Papilio Machaon*, *Pieris napi* and other species, and the surroundings of the larvae preparing to pupate, etc. — C. FULLER : Notes and Descriptions of some Species of Western Australian *Coccidae* (pl.). — W.-L. DISTANT : Descriptions of four new species of *Cicadidae* (pl.). — G.-J. ARROW : On sexual Dimorphism in the Rutelid genus *Parustasia* (pl.). — *Proceedings*.
- Feuille des Jeunes Naturalistes* (La), 4^{er} mai 1900. — C. HOULBERT : Faune analytique illustrée des Orthoptères de France (pl.). — Notes spéciales et locales.
- Frelon* (Le), VIII, 5, 1900 (2 exempl.). — J. DESBROCHERS DES LOGES : Espèces inédites de Curculionides de l'Ancien Monde.
- Illustrierte Zeitschrift für Entomologie*, 4^{er} mai 1900. — Dr J.-M. BASTELBERGER : Ueber *Eupithecia ericeata* Rbr. und *E. millierata* Stgr. (= *pauzellaria* Rbr. = *expressaria* Mill., non = *expressaria* H. S.). — J.-J. KIEFFER : Beiträge zur Biologie und Morphologie der Dipteren (fig.). — G. PAGANETTI-HUMMLER : Beitrag zur Fauna von Süd-Dalmatien. — Petites Communications originales.
- K. *Vetenskaps Akademiens Forhandlingar* (Öfversigt), 1899-1900. — HAGLUND : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kamerun. — WAHLGREN : Ueber die von der schwedischen Polar expedition 1898 gesammelten Collembolen (fig.). — On some Apterygogenea collected in the Volga-delta and in Transcaspia by Dr. E. Lönnberg. — LÖNNBERG : Some biological Observations on *Galeodes* and *Buthus*.
- Linnean Society* (Journal), 1^o 178, 1900. — G.-M. THOMSON : On some N. Zealand Schizopoda (pl.).
- Naturaliste* (Le), 4^{er} mai 1900. — L. PLANET : Essai monographique sur les Coléoptères des genres *Pseudolucane* et *Lucane* (fig.).
- N. *York Entomological Society* (Journal), mars 1900. — W.-F. MERCER : The Development of the Wings in the *Lepidoptera* (pl.). — D.-W. COQUILLETT : Notes and Descriptions of *Ortalidae*. — H.-G. DYAR : On the Larvae of *Atomacera* and some other Saw-Flies. — A new Zygaenid from Arizona. — E.-M. SWAINSON : Notes on Larvae of *Lepidoptera*. — H.-G. DYAR : Preliminary Notes on the Genus *Arctia*. — R.-W. DOANE : Additional Notes on *Trypetidae*.
- Préparateur* (Le), I, 1, 4, 1899-1900. — P. BORN : Mon excursion de 1898. — S... : L'albinisme total.

Psyche, avril 1900. — V.-L. KELLOGG : A new Blepharocerid (fig.). — Proceedings of the Cambridge Entomological Club, Double Cocoon of *Samia cynthia*. — J.-L. HANCOCK : A new Tettigian genus and Species from South America (fig.). — T.-D.-A. COCKERELL : Table of North American *Kermes*, based on external characters. — S.-H. SCUDDER : The Species of the Oedipodine genus *Heliastus*, occurring in the United States. — Insect Neuration.

R. Accademia dei Lincei (Atti), 1900, I, 6 et 7. ☉

Revista Chilena de Historia natural, février 1900. — W.-B. CALVERT : Descripciones de los Scydmaenidae Chilenos tomadas de la Monografía de la Familia publicada por el Dr L.-W. Schaufuss (fig.). — Dr F.-T. DELFIN : Datos para el conocimiento de los Coleópteros e Himenópteros del Departamento de Talcahuano.

Revue agricole, horticole et de culture maraîchère de l'Algérie, I, 1, 1900. ☉

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, avril 1900. — BERTHOUMIEU : Essai bibliographique sur l'Histoire naturelle du Bourbonnais.

Royal Society (Proceedings), LXVI, 428, 1900. ☉

Schweizerischen entomologischen Gesellschaft (Mittheilungen), X, 6, 1900. — FREY-GESSNER : Beschreibung von zwei neuen *Prosopis*-Arten. — Dr STIERLIN : Beschreibung einiger neuen europäischer Rüsselkäfer. — G. AGASSIZ : Catalogue des Variétés et Aberrations de ma collection. Macrolépidoptères de la zone paléarctique. — E. FREY-GESSNER : Hymenoptera Helvetiae, pp. 85-116.

Societas Entomologica, XV, 2 et 3, 1900. — Dr K. MANGER : Coleoptera in Paraffin. — W. CASPARI II : Ueber Acronycten. — P. BORN : Meine Exkursion von 1899 (2 art.). — O. SCHULTZ : Beschreibung einiger aberrativer Lepidopteren.

A. L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 23 mai 1900.

Présidence de M. A. GIARD.

M. Ernest Olivier, de Moulins, assiste à la séance.

Correspondance. — M. Gaston Buchet, de Romorantin, remercie la Société de son admission.

Nécrologie. — Le Président a le très vif regret de faire part à la Société du décès de M. Ch. Marquet, de Toulouse. Ch. Marquet, qui faisait partie de notre Société depuis l'année 1892, s'était occupé de l'étude de plusieurs ordres d'insectes; il avait, en particulier, publié tout récemment un Catalogue des Coléoptères du Languedoc.

Distinction honorifique. — Le Président a le plaisir d'annoncer à la Société que notre collègue M. J. Chatin, professeur à la Sorbonne, vient d'être élu membre de l'Académie des Sciences en remplacement d'Émile Blanchard.

Admissions. — M. Stephen-A. Forbes, state entomologist, Urbana, Illinois (États-Unis d'Amérique). *Entomologie générale et appliquée.*

— M. Nicolas Victor Nasonow, professeur et directeur du Musée de Zoologie à l'Université impériale de Varsovie (Russie). *Entomologie générale, anatomie des Articulés.*

Présentation. — M. Paul Vignon, licencié ès Sciences physiques et naturelles, préparateur de Zoologie à la Sorbonne, 9, boulevard de Latour-Maubourg, Paris [*Anatomie et histologie des Articulés*], présenté par M. Ph. François. — Commissaires-rapporteurs MM. J. Anglas et A. Lécaillon.

Changement d'adresse. — M. E. Abeille de Perrin, jusqu'au 1^{er} octobre 1900 : château de la Mine, à la Sainte-Baume, par St-Zacharie (Var); à partir du 1^{er} octobre prochain : 10, rue Emeric-David, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

Revision du Règlement. — La Société procède à la discussion et au vote sur les articles nouveaux du Règlement qui ont été proposés au nom du Conseil dans la Séance du 11 avril dernier (*Bull.*, p. 147).

Tous ces articles, sauf un (42 bis), sont successivement adoptés soit avec la rédaction proposée, soit avec de légères modifications de détail.

Le vote sur l'article 42 bis et sur l'ensemble des articles nouveaux est renvoyé à la prochaine séance (13 juin).

Communications.

Description d'un nouvel Histéride fouisseur, de Biskra [COL.]

Par P. DE PEYERIMHOFF.

Xenonychus bidens, n. sp. — *Curtus, globosus, turgidus, vir nitidus, piceo-niger; supra glaber, infra confertim et longe flavo-pilosus. Caput laevissimum, nitidum; epistoma a fronte non discretum; pronotum ferme duplo latius quam longius, regulariter, confertim, versus apicem et lateres parcius et subtilius punctatum; basis et lateres acute marginati; margo lateralis pilis longis ciliata. Coleoptera maxima e latitudinis basalis, punctis scabrosis crebre insculpta, ad suturam, basin et lateres laevigata. Calus humeralis prominens. Stria suturalis subtilis, antice in lineam basalem producta, postice ad suturam appropinquans; secunda dorsalis nisi quam in posteriore dimidia parte distincta; externa subhumeralis integerrima, basin et apicem attingens; interna autem ut brevis sulcus basalis tantum visibilis; caeterae evanidae. Propygidium et pygidium turgida, dense punctata, pygidii punctis transversim confluentibus, undulatas lineas simulantibus. Femora primi paris ante apicem arcuatim incisa; tibiae explanatae, supra dentibus perrobustis duobus armatae, infra pilis longis ciliatae, tarsis destitutae (fig. 1). Tibiae secundi paris supra duabus vicinis spinularum seriebus pectinatae, quae singulae statura designatae sunt, spinulisque circiter septem constant (a latere exhibitae, lineam alternatarum in magnitudine spinularum unicam efformare videntur). Tibiae tertii paris explanatissimae, ejusdem paene longitudinis et altitudinis, supra sicut in secundo pare duabus spinularum seriebus pectinatae; extrinsecus praeterea, linea circiter novem spinularum in medio ut confricae (fig. 2). Tarsorum articuli infra longa seta singuli provisi. Primus postremi tarsorum paris articulus robustus, caeteris valde minoribus, magnitu-*

dine gradatim decreascentibus. Unguli evanidi, quorum setae robustae locum tenent. — Long. 3 mill.

Habitat in arena volatili.

J'ai pris un exemplaire de ce nouveau *Xenonychus* dans la dune désertique de Biskra, à 30 centimètres de profondeur environ, au pied d'un *Limoniastrum Guyonianum*. L'insecte est des plus bizarres : il paraît comme soufflé. Il se meut par saccades et, quand on l'inquiète, il étend et raidit les pattes à la manière des *Geotrypes*. C'est un des types fouisseurs les plus profondément adaptés qu'on puisse voir.



Fig. 1. — Face antérieure du tibia antérieur droit, a chez *X. bidens*, b chez *X. Chobauti*.




Fig. 2. — Face externe du tibia postérieur droit, vu de profil, a chez *X. bidens*, b chez *X. Chobauti*.

J'ai eu occasion de le comparer à l'exemplaire jusqu'à présent unique du *Xenonychus Chobauti*. Théry (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 32), gracieusement communiqué par le Dr Chobaut. Il en est très différent, tant par le système de ponctuation, que par l'échancrure des fémurs antérieurs, la structure des tibias, la disposition de leurs spinules, la

proportion des articles des tarses postérieurs, etc. Il est aussi plus ventru que l'espèce de Touggourt.

Description de deux Staphylinides nouveaux circuméditerranéens [Col.]

Par E. ABEILLE DE PERRIN.

Ocypus integer, n. sp. — Long. 25 mill. — Noir, un peu luisant, ailé, large, antennes brunes au sommet, pubescence foncée; ponctuation fine et serrée, égale; tête un peu plus large que le corselet; celui-ci subcylindrique, arrondi à la base, côtés subsinueux; angles antérieurs

obtus, postérieurs arrondis; élytres un peu plus courts que lui; abdomen subdilaté. 7^e segment arrondi et nullement échancré en dessous chez le mâle.

Patrie : Smyrne! — Je n'en ai rapporté qu'un exemplaire ♂, ayant confondu l'espèce avec *O. olens* auquel elle ressemble beaucoup. Elle en diffère par ses antennes plus courtes, notamment à leurs derniers articles, par la ponctuation générale du corps plus fine et moins serrée, par le 6^e segment dorsal de l'abdomen privé de bordure blanche lisse et par le 7^e segment ventral (♂) sans échancrure à son bord inférieur.

Lathrobium (Glyptomerus) Doderoi, n. sp. — Long. 9 mill. — Faciès des *caricola* Müll. et *apenninus* Baudi. Testacé-rougeâtre brillant. Tête et corselet à ponctuation forte, peu serrée, celle des élytres moins profonde, subrugueuse en travers, celle de l'abdomen fine, serrée, nette. Tête courte, subtriangulairement arrondie; front et disque très peu ponctués; pas d'impressions discoïdales; yeux réduits à un petit ocelle oblique. Corselet cylindrique, très long, plus étroit que la tête, à côtés sinueux et rentrés au milieu, angles très arrondis, ligne lisse médiane large. Élytres peu convexes, plus courts que le corselet, à peine élargis au sommet. ♂ 7^e segment ventral profondément et largement incisé au milieu du sommet jusqu'à la base du segment; 6^e incisé triangulairement jusqu'au milieu, les angles latéraux et le fond de l'échancrure obtus, déprimé et caréné tout le long de son milieu, pectiné de chaque côté de cette carène d'un double peigne de cils noirs; 5^e sinué au milieu de son sommet, largement canaliculé au milieu, avec une touffe de poils noirs de chaque côté; 4^e et 3^e de moins en moins fortement canaliculés au milieu; en dessus, le 7^e segment est profondément incisé jusqu'à la base, les côtés de cette incision aigus et prolongés. ♀ Sommet ventral simple, acuminé et terminé par une troncature arrondie; en dessus 7^e segment dorsal fendu comme chez le ♂, mais le milieu du 6^e s'avance en pointe arrondie au sommet de manière à cacher le tiers de cette fente.

Cette belle et intéressante espèce a été découverte à Gênes par M. Dodero à qui je suis heureux de la dédier.

Je ne puis la comparer qu'aux ♀ des deux espèces précitées, ne connaissant pas leur ♂ *de visu*. Leurs deux ♀ ne présentent aucunement l'avancement médian du 6^e segment dorsal de *Doderoi*, caractère tout à fait singulier; en outre, le 6^e segment ventral du même sexe est tronqué-échancré au lieu d'être subarrondi. Enfin leur ponctuation abdominale est bien moins serrée; leur corselet a ses côtés non rentrés

au milieu; leur tête, sensiblement plus longue, présente des côtés subparallèles, bien moins arrondis, ce qui donne à l'ensemble de la tête un aspect bien moins fortement triangulaire. D'après les descriptions, le ♂ du *Doderoi* différerait nettement de celui de *cavicola* par les cils du 6^e segment ventral de l'abdomen à deux et non à 6 étages; et de celui de l'*apenninus* par le 5^e segment ventral (le 6^e de Baudi) fortement et triangulairement incisé; mais pour plus de certitude, il faudrait confronter entre eux les trois mâles; du reste, les autres signes très précis de la nouvelle espèce suffisent pour la caractériser nettement. Il est peut-être utile d'ajouter que je possède un type de l'*etruscus* Piccioli, donné par son auteur, et que, dans le temps, j'avais pu le comparer, à Turin, à un type de l'*apenninus* de Baudi et constater leur identité.

**Recherches sur la structure et le développement postembryonnaire
de l'ovaire des Insectes ⁽¹⁾. III *Machilis maritima* Latr.**

Par A. LÉCAILLON.

La forme générale de l'ovaire de *Machilis maritima* a été décrite par Grassi en 1886 et en 1888. Cet auteur a montré que la partie essentielle de chacun des deux organes femelles consiste en sept gaines ovariennes placées dans les sept premiers segments abdominaux. Comme détails histologiques sur la structure de ces gaines, Grassi ajoute que les cellules vitellogènes font défaut et que les œufs sont entourés d'un épithélium folliculaire.

Mes observations ⁽²⁾ ont porté sur des individus capturés et fixés au printemps, par conséquent à un moment assez rapproché de celui de la maturité sexuelle. Chaque gaine ovarienne a une forme extérieure qui rappelle assez celle d'un ovaire entier de *Campodea*; mais si l'on compare les structures histologiques, on constate de grandes différences.

La vaste *chambre germinative* que l'on trouve chez *Campodea* est ici considérablement réduite. Elle est représentée par un petit groupe de cellules génitales encore peu différenciées qui occupent l'extrémité antérieure de la gaine. Cette réduction du volume occupé par les cellules sexuelles est, si l'on veut, en rapport avec ce fait que chez *Machilis* chaque ébauche ovarienne primitive s'est subdivisée en sept parties,

(1) Voir *Bull. de la Soc. entom. de France*, n^o 4 et 7, 1900.

(2) Les exemplaires qui m'ont servi de sujets d'étude proviennent de Wimeux; je les dois à l'obligeance de MM. A. Giard et Ph. François.

tandis qu'elle reste unique chez *Campodea*. Il est probable en outre que le nombre des cellules sexuelles placées au sommet de chaque gaine est d'autant moindre que le moment de la ponte est plus proche, puisque beaucoup de ces cellules se sont alors déjà transformées en œufs. La grande réduction de la chambre germinative que j'ai constatée chez *Machilis* peut donc tenir, au moins en partie, à l'état de maturité sexuelle assez avancé dans lequel étaient les individus observés. A ce stade, d'ailleurs, les cellules de la chambre germinative peuvent encore se multiplier et j'ai observé des mitoses parmi elles.

• Les petites cellules *aplaties* qui forment la *région intermédiaire* de l'ovaire de *Campodea* n'existent plus chez *Machilis*, mais elles ont pour homologues des cellules à noyaux *arrondis* qui sont amassées non plus derrière les cellules de la chambre germinative, mais en avant d'elles, c'est-à-dire tout à fait à l'extrémité antérieure de la gaine ovarique, sous la paroi même de celle-ci. Ces cellules sont plus petites que les cellules sexuelles et ne peuvent être confondues avec elles; elles entourent peu à peu les jeunes œufs auxquels elles finissent par former une enveloppe complète (follicule ovarien).

Dans le reste de la gaine ovarique, c'est-à-dire dans presque toute la longueur de celle-ci, se trouvent des œufs à des degrés très divers de développement. Tandis que chez *Campodea* un très petit nombre d'œufs se différencient en même temps de façon à arriver à maturité presque au même moment, il y a ici une très grande quantité d'œufs à des stades distincts, de sorte que l'on peut suivre facilement, dans une même gaine, les diverses étapes de la maturation ovulaire. Conformément aux observations de Grassi il n'y a aucune cellule vitellogène; toutes les cellules sexuelles de la chambre germinative deviennent donc des œufs, tandis que chez *Campodea* il n'y en avait qu'environ 1/10. les autres se transformant en cellules vitellogènes.

Il est intéressant de noter qu'au début l'évolution des cellules vitellogènes des Insectes ressemble étonnamment à celle des œufs. J'ai indiqué que, dans les cellules vitellogènes de *Campodea*, le noyau et le corps protoplasmique deviennent très volumineux, et que les éléments chromatiques du noyau se multiplient considérablement de manière à donner un grand nombre de granulations très colorables (phénomène de pulvérisation chromatique). Dans les jeunes œufs de *Machilis*, à mesure que le corps protoplasmique grossit, la vésicule germinative elle-même devient très volumineuse; les chromosomes se portent à la périphérie et s'y divisent abondamment, tandis que le nucléole, d'abord peu ou pas visible, prend un développement énorme et acquiert une très grande affinité pour les matières colorantes. Ces marques d'activité

dont la vésicule germinative est le siège sont plus accentuées chez *Machilis* que chez *Campodea*. Dans ce dernier type les modifications se font surtout sentir dans le noyau des cellules vitellogènes, tandis qu'elles sont beaucoup moins intenses dans la vésicule germinative. On est ainsi conduit à penser qu'il y a une sorte de balancement entre l'importance des modifications qui surviennent dans les cellules vitellogènes et celles qui se produisent dans les œufs. Chez *Campodea*, où les cellules vitellogènes interviennent activement dans les phénomènes de maturation de l'œuf, ces cellules subissent des changements considérables, alors que le noyau de l'œuf grossit peu et n'est le siège que de modifications chromatiques relativement peu intenses. Chez *Machilis*, au contraire, les cellules vitellogènes n'existant pas, l'œuf est doué d'une activité plus grande, car c'est surtout par lui-même qu'il doit accumuler les réserves nutritives, d'où grand développement du noyau, du nucléole, etc.

Les cellules des follicules épithéliaux qui entourent les œufs deviennent plus volumineuses chez *Machilis* que chez *Campodea*; cependant elles n'atteignent jamais les dimensions qu'elles présentent à un moment donné chez beaucoup d'Insectes supérieurs. Chez *Machilis* comme chez *Campodea*, ces cellules folliculaires interviennent peu activement dans les phénomènes qui accompagnent la maturation de l'œuf.

Les œufs les plus jeunes, qui sont naturellement placés les plus près de l'extrémité antérieure des gaines ovariennes, ne sont tout d'abord pas disposés régulièrement les uns derrière les autres, et quand ils sont encore très petits, il peut y en avoir plusieurs au même niveau; mais quand ils ont une certaine grosseur, ils sont situés les uns à la suite des autres comme les grains d'un chapelet. Ils sont d'abord, comme chez *Campodea*, allongés transversalement, puis ensuite longitudinalement par rapport à la gaine ovarienne.

En résumé, l'ovaire de *Machilis*, comparé à celui de *Campodea*, présente des particularités assez importantes. On doit noter en premier lieu que, dès le groupe des Thysanoures, les cellules vitellogènes peuvent exister ou faire défaut, fait que l'on retrouve dans des groupes d'Insectes supérieurs, par exemple chez les Coléoptères. Cette remarque implique cette conclusion que l'on doit s'abstenir de prendre la présence ou l'absence de cellules vitellogènes comme base de classification.

Bulletin bibliographique.

Abeille (L'), XXIX, 13, 1900. — H. D'ORBIGNY : Supplément au Synopsis des Onthophagides paléarctiques. — Tables. — L. BEDEL : Catalogue raisonné de Coléoptères du Nord de l'Afrique, pp. 201-208.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1900, I, 19-20. — H. COUTIÈRE : Sur quelques Macroures des eaux douces de Madagascar.

Académie des Sciences de Cracovie (Bulletin international), mars 1900.



Académie Imp. des Sciences de St-Petersbourg (Annuaire du Musée zoologique), 1899, IV, 1900. — A. BIRULA : Recherches sur la biologie et la zoogéographie principalement des mers russes, VII : Notes sur les Crustacés recueillis par M. le Dr A. S. Botkin en 1896 et 1897 dans la mer Kara et dans la région sud-est de la mer Mouromane (texte russe, fig.). — A. OSTROUMOW : Note sur la larve de la *Hypania invalida* (Grube) (texte russe). — GR. GRUM-GRSHIMAÏLO : Lepidoptera nova vel parum cognita regionis palaearticae, I. — A. SKORIKOW : Eine neue *Tomocerus*-Art (*Collembola*) aus Ost-Russland (pl.). — Dr R. PIERSIG : Hydrachniden aus den Salzseen bei Slaviansk (pl.).

Agricultural Gazette of N. S. Wales, X, Tables. — XI 4, 1900. — W. FROGGATT : The Hessian-Fly and allied Grain Pest (spl.).

Akademia umiejtnosci w Krakowie. — 1^o *Rozprawy*, XV-XVII, 1899-1900. — V. KULCZYNSKI : Symbola ad faunam Araneorum Austriae inferioris cognoscendam (pl.). — Arachnoidea opera Rev. E. Schmitz collecta in insulis Maderianis et in insulis Selvages dictis (pl.). — 2^o *Sprawozdanie Komysyi Fizyograficznej*, XXXIV, 1899. — E.-L. NIEZABITOWSKI : Materyaly do fauny rosliniarek (*Phytophaga*) Galicyi. — J. SNIJEK : O krajowych gatunkach Trzmielców (*Psithyrus*). — F. SCHILLE : Fauna lepidopterologiczna doliny Pohradu i jego dopływów, III. — Dr S. KLEMENSIEWICZ : O nowych i mało znanych gatunkach motyli Fauny Galicyjskiej. — Tous ces travaux sont en langue polonaise.

Archives provinciales des Sciences, mai 1900. — J. ROGER : Étude sur les Coléoptères Longicornes.

Canadian Entomologist (The), may 1900. — H. LYMAN : An entomological Muddle : A Review. — T.-D.-A. COCKERELL : Four new Cocc-

- dae from Arizona. — A. MOFFAT : *Hydroecia stramentosa*. — A.-L. MELANDER : A Decade of Dolichopodidae (fig.). — W.-H. ASHMEAD : Classification of the Fossorial predaceous and parasitic Wasps, or the Superfamily Vespoidea, I. — H.-G. DYAR : The Larva of *Eustizia pupula* Hubn. — Larvae from Hawai. — A Correction.
- Entomologische Nachrichten*, XXVI, 9 et 10, 1900. — P. STEIN : Die Tachininen und Anthomyinen der Meigen'schen Sammlung in Paris. — J.-D. ALFKEN : Ueber Leben und Entwicklung von *Eucera difficilis* (Duf.) Pér. — H. SCHULZ : Varietäten palaearktischer Cicindelen und Caraben.
- Entomologist's Record and Journal of Variation (The)*, mai 1900. — C.-N. BURROWS : *Phorodesma smaragdaria* Fabr. — T.-A. CHAPMAN : Lepidoptera at Locarno. — E. WASMANN : The Guests of Ants and Termites (pl.) (tradⁿ). — W.-J. KAYE : Conversazione of the City of London Entomological Society. — T.-A. CHAPMAN : Notes on the Fumeids, with descriptions of new Species and varieties (pl.). — J.-W. TUTT : Migration and Dispersal of Insects : Lepidoptera. — Notes diverses.
- Geological Survey of Canada*, 1900. -- Deux notes. ☉
- Linnean Society of N. S. Wales (Proceedings)*, XXIV, 4, 1899. — A.-M. LEA : Revision of the Australian Curculionidae belonging to the Subfamily *Cryptorhynchides*, IV. — T.-G. SLOANE : Studies in Australian Entomology, IX. New Species of Carabidae (with Notes on some previously described Species and Synoptic Lists of Species. — R. GREIG SMITH : The Tick Fever Parasite. — D.-G. STEAD : Contributions to a knowledge of the Australian Crustacean Fauna.
- Museu Paraense de Historia natural e Ethnographia (Boletim)*, III, 1, 1900. — H. BRÜLEMANN : Dous Myriapodos notaveis do Brazil, Notas Myriapodologicas (fig.).
- Naturaliste (Le)*, 15 mai 1900. — COUPIN : Alph. Milne-Edwards. Notice nécrologique (portrait). — P. CHRÉTIEN : Histoire naturelle de l'*Exapate duratella* v. Heyd. Microlépidoptère. — M. PIC : Quelques mots sur le variétisme.
- New York Agricultural Experiment Station (Bulletin)*, 167-173, 1899. — S.-A. REACH, V.-H. LOWE et F.-C. STEWART : Common Diseases and Insects injurious to fruits.
- Psyche*, mai 1900. — W.-S. BLATCHLEY : On the Species of *Nemobius* known to occur in Indiana. — C.-F. BAKER : On some American

Species of *Macropsis* (Jassidae). — H.-G. DYAR : Life Histories of N. American Geometridae, XI.

R. *Accademia dei Lincei* (Atti), 1900, I, 8. ⊙

Revista Chilena de Historia natural, mars 1900. ⊙

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, mai 1900.

— BERTHOUMIEU : Essai bibliographique sur l'Histoire naturelle du Bourbonnais.

Royal Society (Proceedings), LXVI, 429, 1900. ⊙

Sociedad española de Historia natural. — 1^o Actas, mars-avril 1900. —

DUSMET : Notas para el estudio de los Himenopteros de España. —

R.-P. NAVAS : Notas entomologicas. — 2^o *Annales*, XXVIII, 1900.

M. BURR : Essai sur les Eumastacides (pl.). — M. MARTINEZ DE LA

ESCALERA : Examen del Grupo *Bathysciæ* de España.

Societas entomologica, 15 mai 1900. — C. FRINGS : Experimente mit erniedrigter Temperatur im Jahre 1899. — Dr K. MANGER : Beiträge zur Coleopteren. — Fauna der Rheinpfalz.

Societas pro Fauna et Flora Fennica (Acta), XV, XVII, 1898-99. —

E. NORDENSKIÖLD : Notizen über Hydrachniden aus Süd-Finnland.

— K.-E. STENROOS : Zur Kenntniss der Crustaceenfauna von Russisch-Karelien. *Cladocera, Calanidae* (pl., carte). — E. REUTER : Bi-

drag till kännedom om Microlepidopter-faunan i Ålands och Åbo

skärgårdar. I. *Pyralidina, Tortricina*. — J.-A. SANDMAN : Några

iakttagelser om *Leptodora hyalina* : Finland (pl.). — K.-E. STEN-

roos : Das Thierleben im Nurmijärve See. Eine faunistisch-biolo-

gische Studie (pl., carte). — O.-M. REUTER : Thysanoptera Fennica

(fig.). — Anteckningar om Finska Psocider.

Société d'Agriculture Sciences et Industrie de Lyon, 1898-1899 ⊙

Société des Sciences naturelles et d'enseignement populaire de Tarare,

15 mars 1900. ⊙

Société Linnéenne de Lyon (Annales), 1899-1900. — CAP. XAMBEU :

Mœurs et Métamorphoses des Insectes, X. — J. BAUVERIE et

C. VANEY : Sur *Isaria arbuscula* (Hariot) d'une nymphe de cigale du

Mexique (fig.). — R. DUBOIS : Sur la soie de la Chenille procession-

naire du Pin maritime et sur la manière de la faire filer au fur et à

mesure de sa production. — Sur la solidification du fil de soie à la

sortie de la glande séricigène du *Bombyx mori*. — R. P. BELON :

Récapitulation des *Lathridiidae* de l'Amérique méridionale.

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire (Bulletin), mars-avril 1900. ☉

Société d'étude des Sciences naturelles de Reims (Bulletin), 1899, 4; 1900, 1. — A. TUNIOT : Note sur l'*Ephestia Kuehniella* Zell.

Société d'Histoire naturelle de Toulouse (Bulletin), XXIX-XXXII, 1895-1899. — MARQUET : Aperçu des espèces du genre *Oxybelus* (Latr.) qui se trouvent dans le Midi et le centre de la France. — Catalogue des Coléoptères du Languedoc.

Société entomologique de Belgique (Annales), XLIV, 4, 1900. — Dr J. TOSQUINET : Notes sur quelques Ichneumonides inédits de l'Europe méridionale. — F. PLATEAU : Expériences sur l'attraction des Insectes par les étoffes colorées et les objets brillants. — F.-J.-M. HEYLAERTS : Remarques psychidologiques et descriptions de nouvelles espèces et variétés.

South African Museum (Annals), I, 1 et 2, 1898-99. — W.-F. PURCELL : Descriptions of new South African Scorpions, in the Collection of the S. African Museum (pl.). — L. PÉRINGUEY : Descriptions of some New or Little Known South African *Mutillidae* in the Collection of the S. African Museum. — Catalogue of the South African *Hispinae* (Col.), with Descriptions of new Species. — W.-F. PURCELL : On the Species of *Opisthophthalmus* in the Collection of the S. African Museum, with Description of some New Forms. — L. PÉRINGUEY : Fifth Contribution to the South African Coleopterous Fauna. — Description of New Species of Coleoptera, chiefly in the Collection of the S. African Museum (pl.). — W.-F. PURCELL : On the South African Species of Peripatidae in the Collection of the S. African Museum. — L. PÉRINGUEY : A Contribution to the Knowledge of S. African *Mutillidae* (Hym.) (pl.).

Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie, fasc. 69, 1900. — J.-J. KIEFFER : Monographie des Cynipides, pp. 433-512; pl. XIX et XX.

Stettiner Entomologische Zeitung, LX, 10-12, 1899. — M. JACOBY : Descriptions of the New Species of Phytophagous Coleoptera obtained by Dr Dohrn in Sumatra (pl.). — H. DOHRN : Verzeichniss der Phytophagen von Deli. — L. KRÜGER : Die Odonaten von Sumatra, III. — H. FRUHSTORFER : Neue *Elymnias* aus dem australischen Gebiet. — Neue *Cupha*-Unter-Arten und Aufzählung der bekannten Species. — Neue Rhopaloceren aus Nias. — Eine neue

Neptis aus Celebes. — Zwei neue Euploen. — Eine neue *Parnassius*-Aberration.

Union apicole (L'), avril-mai 1900. — VALLÈS : L'Abeille et la pluie. — Le *Phylloxera*, son origine, son apparition en France. — Notes diverses. — A. DELAIGUES : Les Abeilles et les Fleurs. — Le *Phylloxera*.

United States Geological Survey, XIXth Annual Report, II, III, V, 1897-98. — XXth Annual Report, I, V, VI, 1 et 2, 1898-99. ☉

U. S. Department of Agriculture (*Bulletin*), 10, N. sér., 1898. — L.-O. HOWARD : Some miscellaneous Results of the Work of the Division of entomology. — Don de M. H. du Buysson.

Wiener Entomologische Zeitung, 1^{er} mai 1900 (2 exempl.). — F. HENDEL : Ueber eine neue *Sciomyza* aus dem Oesterreichischen Litorale. — G. STROBL : Spanische Dipteren, X. — FR. W. KONOW : Neuer Beitrag zur Synonymie der Tenthredinidae. — J.-J. KIEFFER : Ueber Allotrinen. — A. FLEISCHER : Neue Coccinelliden aus der Sammlung der Kais. Rathes Herrn E. Reitter. — F. HARTMANN : Eine neue Gattung der Oxyopisthinen und eine neue Art der Gattung *Oxyopisthen*. — F. WEISE : Antwort auf den Artikel von Seidlitz « Ueber *Leptura aquatica* L. und *Donacia dentipes* F. ». — R. FORMANEK : Eine neue *Lochmaea* Ws. — J. MIK : Eine neue *Helomyza* aus Oesterreich. — E. REITTER : Coleopterologische Notizen, LXIX.

Zoological Society of London (Proceedings), 1899, IV. — R.-I. POCKOCK : On the Scorpions, Pedipalps and Spiders from Tropical West Africa represented in the Collection of the British Museum (pl.). — L.-A. BORRADAILLE : A Note on the Hatching-Stage of the Pagurine Land-crabs. — A.-G. BUTLER : On a Collection of Butterflies made by Mr. R. Crawshay in British East Africa (pl.). — On a small Collection of Butterflies from the Nandi District, Uganda Protectorate, Eastern Side of Lake Victoria; made by Cap. Hobart of the Grenadier Guards.

BECKER (TH.) : Die Leptiden Formen im Gebiete der Europäisch Asiatischen und Mittelmeer-Fauna. (*Ent. Nachr.*), 1900, 20 p., fig.*

A. L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 13 juin 1900.

Présidence de M. A. GIARD.

M. A. Fauvel, de Caen, assiste à la séance.

Correspondance. — Le professeur Monticelli remercie la Société de l'admission de l'Institut zoologique de l'Université royale de Naples.

Annales. — Le secrétaire dépose sur le bureau le 4^e trimestre des *Annales* de l'année 1899.

Admission. — M. Paul Vignon, licencié ès Sciences physiques et naturelles, préparateur de Zoologie à la Sorbonne, 9, boulevard de Latour-Maubourg, Paris. *Anatomie et histologie des Articulés.*

Présentation. — M. l'abbé Robert de Sinéty, 35, rue de Sèvres, Paris [*Anatomie, embryologie et biologie des insectes*], présenté par le P. J. Pantel. — Commissaires-rapporteurs MM. A. Giard et l'abbé J. de Joannis.

Voyage. — Notre collègue M. Ch. Alluaud s'est embarqué le 10 juin courant à Marseille. Chargé d'une mission scientifique, il se rend à Madagascar où il doit séjourner une année entière, il compte s'installer à Fort-Dauphin et explorer au point de vue zoologique le sud de l'île, région peu connue et intéressante à tous égards.

Collections. — Le secrétaire annonce que la collection de Coléoptères d'Algérie donnée à la Société par notre collègue L. Clouët des Pesruches est arrivée récemment et a été placée dans la salle des collections.

Changements d'adresse. — M. P. de Froberville, château des Brosses, Chailles (Loir-et-Cher).

— M. Al. Olivier, 51, boulevard Chave, Marseille (Bouches-du-Rhône).

Rectification. — M. l'abbé J. de Joannis communique une rectification relative à une note publiée par lui dans le *Bulletin* n° 9 (séance du 9 mai 1900) : Le Microlépidoptère signalé d'Anagni (Italie centrale) sous le nom de *Paranarsia Joannisiella* Rag. a été rapporté à cette espèce par suite d'une confusion; il appartient en réalité au genre *Protasis*.

Captures. — M. A. Giard signale la capture, par M. Galien Mingaud, de *Thais Cassandra* Hub. aux environs de Nîmes [bois de Siguan (1889) et de Caissargues (1899)]. Le même Lépidoptère a été pris également, vers Pâques 1899, par M. Pierre Crouzet, près du mas de la Cassagne, entre Générac et Saint-Gilles. Dans la plaine de Nîmes, *Thais Cassandra* vole en mars-avril au bord des petits cours d'eau et fossés où croît la plante nourricière de la chenille, *Aristolochia rotunda* L. Dans la même région, *Thais medesicaste* Illig. est plus commune et fréquente, en mai-juin, les terrains arides où pousse *Aristolochia pistolochia* L. (*Bull. Soc. d'études des Sc. nat. de Nîmes*, 21 avril 1899).

— M. P. Crouzet a pris, également aux portes de Nîmes, au quartier de Montaury, cinq exemplaires de *Charaxes Jasius* L. (2 ♂ et 3 ♀) dans la première quinzaine de septembre 1899 (*Bull. Soc. d'études Sc. nat. Nîmes*, 6 octobre 1899). *Ch. Jasius* a été trouvé quelquefois à Montpellier. Son extension accidentelle vers le nord est possible, mais parait limitée cependant par la grande sensibilité de la chenille aux gelées (voir les observations d'Emmanuel Martin, *Bull. Soc. entom. Fr.*, 1864, p. vi).

Revision du Règlement. — La Société procède à la discussion et au vote sur l'article 42 bis du nouveau Règlement; elle vote ensuite sur l'ensemble des articles nouveaux qui lui ont été proposés.

En conséquence ces articles sont adoptés avec la rédaction définitive indiquée ci-après.

Le nouveau Règlement sera imprimé et distribué aux membres de la Société le plus rapidement possible.

Articles adoptés.

ART. 4. — Pour faire partie de la Société à titre de *Membre effectif*, il faut être présenté par un de ses membres et par écrit; si le candidat est mineur, une autorisation écrite de son père ou tuteur est exigée.

Le Président désigne deux commissaires pour examiner la candidature.

Dans la séance suivante la Société vote sur les conclusions des rapporteurs.

Le scrutin secret peut être demandé par écrit; il a lieu à la majorité absolue des suffrages.

ART. 5. — Des entomologistes âgés de moins de 21 ans, présentés ⁽¹⁾ par un *Membre effectif*, peuvent être admis à titre de *Membres assistants*, avec l'autorisation écrite de leur père ou tuteur, et après avis conforme de la Société.

Ils n'ont ni le droit de vote ni le droit de faire des communications; il leur est interdit d'emprunter des ouvrages de la bibliothèque, ils peuvent seulement les consulter sur place.

A leur majorité, les *membres assistants* sont tenus de se faire recevoir *membres effectifs*. Sur leur demande écrite, portée par le Président à la connaissance de la Société, ils sont admis sans autre formalité; sinon ils sont exclus de plein droit.

ART. 6. — (*Après le premier paragraphe.*)

Les membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colonies françaises, paient en outre *un franc* et les membres résidant à l'étranger *deux francs* pour recevoir franco les publications de la Société.

ART. 8. — (*Supprimé.*)

ART. 10. — (*Après le troisième paragraphe.*)

Ce versement pourra s'effectuer par fractions annuelles et consécutives d'au moins *cent francs*, mais la libération ne sera acquise qu'après le versement de la dernière fraction.

Toute somme versée reste dans tous les cas acquise à la Société.

ART. 11 bis. — Sont *Membres bienfaiteurs* les personnes qui ont versé, à une époque quelconque, une ou plusieurs souscriptions de *500 francs*; ces membres reçoivent gratuitement, pendant toute leur vie, autant d'exemplaires des publications de la Société qu'ils ont versé de fois la souscription de 500 francs. — La Société pourra également reconnaître comme *bienfaiteurs* les personnes qui lui auront donné ou légué des collections, des ouvrages scientifiques, etc., ou qui lui auront rendu tel service important qu'elle jugera mériter ce titre.

ART. 11 ter. — Sont *Membres donateurs* les personnes ayant versé, à une époque quelconque, une somme d'au moins *200 francs*.

(1) Cette présentation doit être écrite et faire mention de l'âge du candidat.

Les donateurs, s'ils ne sont pas membres effectifs, ne reçoivent pas les publications de la Société.

Les Membres bienfaiteurs et donateurs reçoivent un diplôme spécial et leurs noms figurent perpétuellement en tête de la liste des membres de la Société.

ART. 12. — (3^e paragraphe.)

Elle peut aussi nommer un Président d'honneur.

ART. 13. — (A la place des 2 premiers paragraphes.)

Chaque année, dans la première séance d'octobre, la Société, s'il y a lieu, nomme une Commission de cinq membres, chargée de présenter, à la séance suivante, une liste de candidats au titre de *Membre honoraire*; cette liste est insérée dans le *Bulletin* et le vote renvoyé à la troisième séance suivante.

ART. 23. — Les secrétaires adjoints sont spécialement chargés de la rédaction et de la publication du *Bulletin*.

ART. 30 bis. — Une commission dite *Commission des collections* est chargée de veiller à la conservation et à l'entretien des collections de la Société.

Cette commission, nommée pour trois ans, est composée de sept membres élus au scrutin de liste et à la majorité relative des suffrages; ces sept membres sont rééligibles.

La commission des collections dispose des sommes affectées aux collections; elle doit présenter tous les ans, à la séance du Congrès, un rapport sur l'état des collections et sa gestion pendant l'année écoulée.

ART. 32. — (9^e paragraphe, note.)

Les membres désirant faire des communications ou déposer des travaux écrits sont priés d'en donner les titres au Secrétaire au commencement de la séance.

(10^e paragraphe, note.)

Les manuscrits doivent être écrits très lisiblement et seulement au recto des pages. Ils doivent être disposés dans la forme en usage dans les publications de la Société et ne porter d'autres indications typographiques que les signes conventionnels adoptés par l'imprimerie de la Société.

Les manuscrits ne remplissant pas ces conditions seraient retournés à leurs auteurs pour être modifiés.

Ces dispositions s'appliquent également aux travaux écrits déposés pour les *Annales*.

ART. 40. — Les publications de la Société comprennent :

1^o Les publications régulières.

I. Le *Bulletin de la Société entomologique de France*, paraissant deux fois par mois (août et septembre exceptés).

II. Les *Annales de la Société entomologique de France*, paraissant par fascicules trimestriels.

2^o Les publications exceptionnelles.

I. *L'Abeille, journal d'Entomologie*.

II. Les Tables générales des *Annales* et du *Bulletin*.

III. Les monographies, faunes, catalogues ou autres publications que la Société pourrait entreprendre en dehors de ses publications régulières.

ART. 42. — (1^{er} paragraphe.)

Chaque membre n'a droit par séance qu'à deux pages d'impression au maximum dans le *Bulletin*.

(Et après le 2^e paragraphe.)

Toute communication excédant les limites précédentes sera renvoyée d'office à la Commission de publication et réservée aux *Annales*, à moins que l'auteur ne déclare par écrit, en remettant son manuscrit, qu'il s'engage à payer les frais supplémentaires (1). Toutefois, dans ces conditions, l'ensemble d'une communication ne pourra excéder quatre pages d'impression au total (2).

ART. 42 bis. — Lorsque les communications comportent des figures dans le texte, les auteurs sont tenus de faire parvenir leurs dessins (3), au secrétaire, quatre jours au moins avant la séance où la communication doit être faite; faute de quoi la publication pourra être renvoyée au *Bulletin* de la séance suivante.

(1) Le prix de chaque page ou fraction de page est de 6 francs.

(2) Par exception, dans le numéro du *Bulletin* du Congrès, chaque membre a droit gratuitement à 4 pages d'impression, et peut obtenir quatre pages supplémentaires en les payant au prix indiqué ci-dessus, ce qui porte à 8 le nombre total des pages accordées. Les communications destinées à être imprimées dans le *Bulletin* du Congrès sont soumises à l'examen de la Commission de Publication.

(3) Les dessins doivent être exécutés de façon à pouvoir être reproduits directement par les procédés phototypographiques.

Les clichés sont exécutés par la Société *aux frais des auteurs*.

ART. 42 *ter*. — Le Secrétaire fait parvenir aux auteurs une épreuve qui doit lui être retournée dans les trois jours de la réception; passé ce délai il ne peut être tenu compte des corrections.

Les corrections ne doivent entraîner aucune *surcharge* ni aucun *remaniement* du texte.

ART. 42 *quater*. — Les auteurs qui désirent des tirés à part de leurs communications insérées au *Bulletin* doivent en mentionner le nombre à l'avance sur le manuscrit. Ce nombre ne peut être inférieur à 25 exemplaires; le prix de chaque exemplaire (titre et couverture compris) est de 0 fr. 10.

Les tirés à part sont retirés au siège social, sinon ils sont expédiés contre remboursement.

ART. 51. — Les auteurs des mémoires publiés dans les *Annales* ont droit, à titre gratuit, à un tirage à part de *vingt-cinq* exemplaires (texte et planches noires). Un tirage plus considérable peut être accordé, mais aux frais des auteurs ⁽¹⁾.

ART. 64 *bis*. — Les collections de la Société, conservées au Siège social dans le local qui leur est affecté, sont à la disposition des sociétaires qui désirent les consulter, après entente avec un des membres de la commission des collections et seulement en sa présence.

ART. 68 *bis*. — Les membres rayés pour cause de retard dans le paiement de leurs cotisations pourront être réadmis, sur leur demande, à condition de payer le total des sommes dont ils étaient débiteurs envers la Société au moment de leur radiation, à moins qu'ils ne préférèrent s'exonérer.

ART. 68 *ter*. — La réintégration d'un membre démissionnaire a lieu, sans nouveau rapport, sur un vote immédiat provoqué par le Président.

Tout membre ayant démissionné deux fois ne peut plus être réadmis que comme *membre à vie*.

(1) Le prix des tirés à part est de *dix centimes* par feuille ou fraction de feuille d'impression (*sans aucun changement*), de *dix centimes* par planche noire et de *cinquante centimes* par planche coloriée.

Communications.

Note complémentaire sur le *Conothele birmanica* Thorell [ARACHN.]

Par E. SIMON.

Dans une note sur le *Conothele birmanica* Thorell (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, n° 7, p. 151), j'ai omis de citer un récent ouvrage de M. R.-I. Pocock « *Scorpions, Pedipalpi and Spiders collected by Dr Willey in New Britania, the Solomon islands, etc.* », 1899, dans lequel cet auteur décrit et figure la coque operculée du *Conothele arboricola* Pocock, espèce nouvelle de Nouvelle-Bretagne.

Cette coque, construite à la surface d'une écorce et en partie recouverte de Lichens, ressemble à celle du *C. birmanica* Th., à cela près qu'elle est plus déprimée, et que le plan de son orifice et de son opercule est plus oblique.

L'observation du P. Décoly n'est donc pas entièrement nouvelle, comme je le pensais; elle est néanmoins intéressante, car elle indique que cette manière de vivre est générale dans le genre *Conothele*, qui par son organisation touche de si près aux *Pachylomerus* qui sont terricoles.

Sur l'application de la loi phylogénique de Brauer

Par P. DE PRYERIMHOFF.

Une des lois les plus suggestives de la phylogénie des Insectes, est celle d'après laquelle les larves qui se rapprochent le plus, à la fois de l'imago et de la forme ancestrale, appartiennent aux types primitifs. Cette loi a été posée en premier lieu et très clairement par Brauer (*Betrachtungen über die Verwandlung der Insekten, etc. Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Ges.*, 1869, 313), et il est juste qu'elle porte désormais le nom de ce savant.

Depuis, les quelques auteurs qui se sont occupés de la phylogénie des Insectes ont eu à faire usage de cette règle, mais on ne voit pas sans surprise combien en général, et dans l'ordre des Coléoptères en particulier, elle a été mal appliquée.

Il est vrai que Brauer tout le premier, a mésusé de l'excellent principe qu'il venait de découvrir, et l'exemple de cette erreur me paraît trop instructif, pour ne pas valoir d'être exposé tout d'abord en détails :

Je näher, dit Brauer, Larve und Imago einander und der Form der Stammkerfe stehen oder weniger die Imago—die Larve an vollkommener Organisation übertrifft, desto älter ist die Form. So wird uns der *Staphylinus* als eine der ältesten Käferformen gelten, etc. » Il y a dans cette citation l'exposé de la loi, et son application immédiate à la phylogénie particulière des Coléoptères. C'est cette seconde proposition que je crois utile de discuter ⁽¹⁾.

Pour apprécier en quoi diffèrent deux types d'Insectes, il paraît évident que le faciès, l'allure et l'éthologie ne peuvent suffire, et qu'il est indispensable de consulter les organes que l'expérience a désignés comme étant les plus représentatifs de la variation. L'histoire des progrès de la systématique n'est que la paraphrase, en quelque manière, de cette proposition, regardée maintenant comme un truisme. La même précaution s'impose dans l'étude comparative des larves; « ce n'est pas, dit Perris, aux formes extérieures qu'il faut exclusivement s'en rapporter, il importe surtout de vérifier les organes essentiellement caractéristiques ». Quand enfin il s'agit de comparer deux organismes aussi dissemblables, aussi indépendants dans leur évolution propre qu'une larve et un imago de Coléoptère, l'appréciation délicate des

(1) Elle est citée par la majorité des auteurs (Packard, Houlbert, Ganglbauer), qui ont écrit postérieurement à Brauer, et qui paraissent lui avoir attribué plus d'importance qu'au principe même dont elle est l'application. La fortune de cette idée doit avoir son origine dans l'opinion séduisante qui se forma à la suite des découvertes paléontologiques de Heer. Ce savant, comme on sait, trouva (Zwei geologische Vorträge. *Zürich* 1852. — *Urwelt der Schweiz. Zürich* 1865) dans le lias de Schambelen un type de Forficule (*Baseopsis forficulina* Hr.) où l'on crut voir un terme de passage entre les Coléoptères et les Orthoptères. Les Staphylinides, dont le faciès est analogue à celui des Forficules, devaient compléter la transition. Mais depuis que Leach a fait connaître le système si particulier de la nervation alaire des Forficules, cette opinion a singulièrement perdu de sa vraisemblance.

Néanmoins Packard (On the genealogy of the Insects. — *Amer. Natur.*, 1863, p. 932, 944) l'admet encore et, dans son diagramme généalogique des Insectes, les Coléoptères se trouvent provenir à la fois des *Hemerobiidae* et des *Dermaptera*.

Cette théorie que les *Staphylinidae* ont pu provenir des Forficules hante aussi Brauer dans sa critique de la thèse de Paul Meyer (*Betrachtungen, etc.*, II. *Verhandl. d. k. k. Zool. bot. Ges.*, 1878, 157). On y lit cette phrase, où l'idée violente évidemment les faits « Ein *Staphylinus* unterscheidet sich nun von einer *Forficula* oder *Perliden* hauptsächlich dadurch, dass seine Larve nur wenige (vier) Häutungsstadien durchmacht... » Il y a bien d'autres choses qui séparent un *Staphylinus* d'un *Forficula*.

différences et des ressemblances doit être faite avec un soin extrême, et le faciès, l'allure, l'éthologie ne sont plus que des caractères de dernier ordre, presque fortuits.

Chez les *Staphylinidae*, en particulier, il n'est pas douteux qu'il y ait des analogies frappantes entre la forme générale et l'allure des larves et des imago; mais par contre les différences analytiques sont considérables, plus grandes, par exemple, que celles qui séparent un Caraboïde et sa larve. Ainsi la larve des *Caraboïdea* possède un tarse articulé, musclé, muni le plus souvent de deux ongles, caractère qui la rapproche à la fois de son imago et des larves appartenant aux types anciens (Névroptères); le tarse de la larve des *Staphylinidae*, comme celui des tarses de tous les Coléoptères autres que les *Caraboïdea*, est réduit à un ongle simple, corné, non organisé, inséré directement sur le tibia. La larve caraboïde (1) a une mâchoire bilobée, comme presque tous les imago des *Masticantia* (les Coléoptères compris); la larve staphylinide a une mâchoire unilobée (excepté chez le genre *Oxyporus*). Les ocelles sont presque toujours chez les larves des *Caraboïdea* au nombre (primitif) de six, chiffre qui ne se rencontre que très rarement (*Oxyporus*) chez celles des *Staphylinidae*. Ce dernier caractère, il est vrai, ne conduit pas à une comparaison entre la larve et l'imago, mais il démontre l'ancienneté relative du type larvaire des *Caraboïdea* par rapport à celui des *Staphylinidae*. Les considérations tirées de la nervation des ailes inférieures mèneraient à la même conclusion chez les imago.

Le choix du genre *Staphylinus* pour la démonstration de la loi de Brauer est, en outre, particulièrement malheureux, car des caractères tout spéciaux viennent montrer que ce genre est en réalité un des plus récents de l'ordre tout entier. On sait que chez les Coléoptères, la nymphe, à de très rares exceptions près, est du type libre ou incomplet, c'est-à-dire qu'elle est membraneuse, très peu chitinisée et mobile. Or une de ces exceptions est précisément réalisée dans le genre *Staphylinus* dont la nymphe (cf. Schioedte. De Metamorphosi Eleutheratorum observationes. Pars II, *Copenhagen*, 1864, p. 115 : « Nymphae Staphylinorum corneae, semiolectae, etc. ») est immobile, complètement chitinisée, et du type récent des *nymphae oblectae* ou chrysalides.

Comme on voit, si l'on veut faire application de la loi de Brauer, ni les *Staphylinidae*, ni surtout le genre *Staphylinus*, tant au point de vue morphologique qu'au point de vue capital des métamorphoses, ne peuvent représenter le Coléoptère ancestral.

(1) Au moins dans la majorité des espèces terrestres.

La distinction des larves des Insectes *Metabola* en deux types, le type *campodéiforme* et le type *éruciforme*, et la valeur phylogénique attribuée au premier, constituent l'application la plus fréquente de la loi de Brauer. Elle ne laisse pas, également, de prêter à la critique, chez les Coléoptères en particulier; on observe en effet, dans cet ordre, des larves éruciformes à caractères anciens, et des larves campodéiformes à caractères récents.

Je prendrai comme exemple du premier cas les larves des *Scarabaeidae*. Elles ont, comme chacun sait, un faciès éruciforme très prononcé, complété par un certain nombre de caractères incontestablement récents (première paire de stigmates prothoracique, absence de cerques, absence d'yeux chez la majorité des espèces, etc.). Mais les organes de la bouche, qui sont parmi les plus considérables ⁽¹⁾ placent d'emblée ces larves à un rang très primitif : ainsi leur mâchoire est complète, pourvue de deux lobes le plus souvent indépendants, et d'un palpe ordinairement quadriarticulé; c'est le type qui se trouve réalisé *sans aucune modification de composition* chez les imago de l'immense majorité des Coléoptères, et chez les *Ametabola* primitifs tels que les Orthoptères. Ce mélange, dans un même organisme, de caractères primitifs et de caractères récents, se retrouve chez les insectes parfaits; il est la marque d'un type anciennement détaché, qui a subi son évolution et ses adaptations propres; et c'est enfin ce que démontre l'allure taxinomique des *Scarabaeidae*, famille très homogène, et complètement isolée dans l'ordre des Coléoptères.

Les jeunes larves des *Meloidae*, ou *triongulins*, réalisent d'autre part le cas d'une larve campodéiforme à caractères récents. On les confronte volontiers (Lubbock, Houlbert, etc.) avec les types larvaires anciens de même faciès, et en particulier avec le *Campodeu*. Mais elles en sont encore plus loin, analytiquement, que les larves des *Staphylinidae*, qui ont des cerques, des antennes quadriarticulées, etc. On ne saurait, en effet, assimiler les longues soies qui terminent le 9^e segment abdominal des triongulins à des cerques, c'est-à-dire à des

(1) « The relative form of the maxillae appears to be a good index as to the general development of the body in the different groups of Coleoptera, » dit Packard (Origin of the Coleoptera. *Amer. Natural.*, 1883, p. 939) qui passe ensuite une revue sommaire de la maxille chez les principales larves des Coléoptères, en s'efforçant de montrer qu'elle est dans chaque cas l'expression, l'indice (index) de leur forme et de leur éthologie. Cette généralisation me paraît dépasser excessivement les faits, qui d'ailleurs, en ce qui concerne les *Scarabaeidae*, ne sont pas reproduits bien exactement dans ce mémoire.

appendices organisés, souvent segmentés. Les organes de la bouche sont plus simples aussi que chez les larves des *Staphylinidae*, et plus éloignés par conséquent du type buccal primitif ⁽¹⁾. Je ne crois pas, pour les mêmes raisons, qu'il soit possible de rapprocher, comme fait Packard (*Origin of the Coleoptera. Amer. Natur.*, 1883, p. 942), ces triongulins des larves des *Carabidae*; les deux types n'ont entre eux qu'une vague analogie de forme. Au demeurant, le triongulin n'offre pas plus de caractères primitifs, à part son faciès, que telle autre larve d'Hétéromère appartenant à une famille voisine des *Meloidae*.

En résumé, la loi de Brauer est susceptible de donner des résultats très sûrs, mais à la condition expresse que les comparaisons qu'elle conseille soient analytiques, et non pas seulement superficielles. Sans doute, le faciès campodéiforme d'une larve, par exemple, est une présomption déjà forte qu'elle appartient à un type ancien. Mais ce caractère synoptique peut varier indépendamment d'organes ayant une valeur phylogénique supérieure, et il n'est pas douteux, dans ce cas, qu'il doive perdre à leur profit une part de sa signification et de son poids.

Description d'une nouvelle espèce de Microlépidoptère de France

Par P. CHRÉTIEN.

c *Lita capsophilella*, n. sp. — Envergure 10-11 mill. — Ailes supérieures très étroites, d'un gris teinté de bleuâtre, avec un point noir près de la base, deux autres superposés obliquement, l'inférieur dans le pli, le supérieur dans le disque, un trait noir à l'extrémité supérieure du disque et un empâtement noir un peu avant l'apex; franges brunes, divisées par une ligne plus foncée peu distincte. Ailes inférieures grises, luisantes, à franges brunes faiblement lavées de jaunâtre. Antennes brunes, palpes gris, pointe du 3^e article noire, tête et thorax brun noirâtre avec des écailles grises, abdomen brun noirâtre.

(1) Non seulement il ne paraît pas avantageux, mais il est à peu près impossible de comparer les divers types buccaux, si bien homologués, des Insectes, avec celui des Thysanoures Entognathes (*Campodeidae*, *Japygidae*, etc.); ce type est d'une complication telle, que l'homologie de ses parties avec celles des autres ordres n'a pu être faite d'une manière satisfaisante. Il est bien préférable de choisir à ce point de vue des termes de comparaison chez les Orthoptères, où les organes de la bouche sont à la fois très différenciés (c'est-à-dire très primitifs) et les plus clairs possible.

Chenille courte, un peu atténuée aux extrémités, d'un blanc verdâtre, à verruqueux indistincts et poils blonds; tête brun jaunâtre clair, bordée au sommet de noirâtre, avec des taches cunéiformes noirâtres, écusson clair avec deux points noirs très rapprochés situés au milieu sur le bord inférieur et un autre point noir à l'extrémité latérale; pattes écailleuses et clapet concolores.

Cette chenille, à l'encontre de presque toutes les chenilles de *Lita*, vit à découvert sur sa plante nourricière. On la trouve au moment de la pleine floraison du *Gypsophila repens* L., dont elle mange les boutons floraux et les jeunes ovaires. Sans tisser aucune toile, elle se maintient sur les tiges de la plante en contournant un peu l'extrémité anale de son corps comme font des larves de Tenthredes et de certains Coléoptères. Ses mœurs ressemblent à celles de la *Lita semidecandrella* Thr. que j'ai trouvée aux environs de Paris sur le *Cerastium semidecandrum* L.; mais les Papillons de ces deux espèces ne sauraient être comparés, tant ils sont différents.

On se procure aisément la chenille de *Lita capsophilella* en battant les fleurs de *Gypsophila repens* dans le creux de la main. Elle est à taille dans la première quinzaine de juillet et elle descend à terre pour se métamorphoser dans un petit cocon de soie blanchâtre chargé extérieurement de grains de terre.

Sa chrysalide est brun clair, presque lisse ou très finement rayée en travers; derniers segments brun noirâtre, à extrémité large, présentant trois petits mamelons coniques, celui du dessus plus faible et moins proéminent que les latéraux; poils qu'elles entourent raides, sans crochets et bruns, les plus longs sont alignés et redressés devant le plus petit mamelon.

Voisine de *Lita alsinella* Z., cette espèce en diffère notamment par la présence d'un point noir près de la base des ailes supérieures et par la chenille qui n'a pas la tête et l'écusson noirs comme celle de *L. alsinella*.

La *Lita capsophilella* vole aux environs de la Grave (Hautes-Alpes) fin juillet et août.


Description d'une espèce nouvelle d'*Eriophyes* [ACAR.]

de l'Amérique du Sud

Par A. TROTTER.

***Eriophyes bicornis*, n. sp.** (fig. 1, côté ventral : à l'extrémité du rostre on voit apparaître les petites cornes; fig. 2 et 3, écusson vu de des-

sus et de côté). — *Corps* cylindrique, allongé, aminci vers l'extrémité postérieure. — *Écusson* petit, semicirculaire, parcouru par des sillons longitudinaux parfois interrompus, peu caractéristiques; partie antérieure de l'écusson pourvue de deux cornes fortement aiguës au sommet, dirigées en avant, très rapprochées sur la ligne médiane, longues de 12 à 15 μ ; *soies dorsales* médiocres, dirigées en arrière, insérées à la marge postérieure. — *Rostre* un peu trapu, long de 15 μ , large 13 μ environ. — *Pattes* grêles, distinctement articulées; dernier article un peu plus long que l'avant-dernier; *soie plumeuse* à 4 rayons, *ongle tarsal* long presque du double de cette dernière; *soies* des pattes médiocrement développées. — *Les soies thoraciques*, de la III p. atteignent à peu près le 4^e art. des pattes; *soies thor.* de la II et I p. petites, rapprochées du *sternum* qui est simple. — *Abdomen* distinctement annelé et ponctué, de 65 anneaux environ. — *Les soies latérales* dépassent quelque peu l'insertion des *soies ventrales* de la I p., celles-ci, qui sont les plus longues, dépassent les soies ventrales de la II p. qui sont les plus petites; les soies ventrales de la III p. arrivent à l'extrémité de l'Acarien; *soies caudales* médiocres, elles n'atteignent pas en longueur la moitié de l'abdomen; il y a aussi deux petites *soies caudo-latérales*. — *Epigynium* avec des *soies génitales* très développées, large de 20 μ environ; plaque supérieure sillonnée longitudinalement, plaque inférieure carénée et sillonnée.



Eriophyes bicornis, n. sp.

Long. moyenne de la ♀, 200 μ environ; larg. 40 μ .

Long. moyenne du ♂, 140 μ environ; larg. 45 μ .

GALLE. — Cette espèce vit en très grande quantité sur *Solanum eleagnifolium* Cav., particulièrement sur les feuilles où il produit des boursofflures plus ou moins grandes, revêtues en dedans de très petites proéminences d'origine mésophyllique, poilues; ces proéminences peu-

vent se trouver aussi à la face opposée, et souvent aussi sur les pétioles des feuilles et des fruits, ou sur les tiges, sans que dans ces derniers organes il se produise d'autres déformations plus apparentes.

Jusqu'à présent on ne connaissait sur les Solanacées que deux espèces d'Eriophydes, savoir *Eriophyes eucricotes* (N.), sur *Lycium europaeum* et *mediterraneum*, et *E. cladophytus* (N.), sur *Solanum Dulcamara*.

M. le Prof. C. Spegazzini a découvert les galles de cette espèce aux environs de La Plata (Rép. Argentine).

**Note sur le *Caenoptera* (*Molorchus*) *Marmottani* Ch. Brisout [COL.]
et description du mâle de cette espèce**

Par Valéry MAYET.

Ch. Brisout (Cat. Grenier, p. 114) décrivait il y a quarante ans, sous le nom de *Marmottani*, un *Molorchus* ♀ unique, trouvé par notre collègue le Dr Marmottan au Canigou. Mulsant de son côté (Longicornes, 2^e éd., 1863, addenda p. 583) reproduisait une courte diagnose de cet insecte.

Grâce à deux nouveaux exemplaires (♂ et ♀) nous sommes à même de modifier sur certains points la description de Brisout, faite sur une seule femelle de petite taille, et de donner celle du mâle.

Notre femelle, que M. Bedel a bien voulu comparer au type, a été obtenue par M. La vagne, de Montpellier, en avril dernier, de branches de Pin laricio ⁽¹⁾ rapportées en décembre de la forêt de Saint-Guilhem du désert (Cévennes de l'Hérault).

Une excursion entreprise les 24 et 25 mai derniers, en compagnie de

(1) Le *Pinus laricio* ou Pin de Corse, à peu près disparu aujourd'hui de la France continentale, se trouvait un peu partout sur le versant sud des Cévennes à l'époque quaternaire; les dépôts de travertins en font foi (G. Planchon, Les tufs de Montpellier, 1864). Actuellement, sans parler du département du Gard où se trouvent quelques stations de ce Conifère, en ce qui concerne l'Hérault, les parties boisées de cette essence sont réduites à des îlots, dont le principal est la forêt de Saint-Guilhem (700 hectares environ). En dehors, on ne rencontre que quelques bouquets, entre Bédarieux et Carlencas, et quelques pieds dans les bois de Montarnaud près Montpellier. L'espèce est représentée chez nous par une variété de taille moindre que le type, ne dépassant guère 10 mètres, *Pinus cebennensis* Gren. et God. (Flore de Montpellier par Loret et Barrandon, 2^e éd., 1888, p. 456).

notre collègue M. G. Darboux, préparateur de Zoologie à la Faculté des Sciences de Montpellier, mettait en notre possession un mâle tombé dans le parapluie de notre ami et de là dans notre flacon.

Nous sommes de ceux qui ne croient guère aux espèces rares. Informations prises par M. Bedel auprès du Dr Marmottan, possesseur du type, cet insecte a été pris par lui en battant des Pins non pas comme le dit Brisout, sur le Canigou, montagne de près de 3.000 mètres, mais au pied de ce puissant massif, dans la chaude vallée de Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales).

Bien que située entre 400 et 700 mètres d'altitude, la forêt de Saint-Guilhem est, elle aussi, une localité chaude, comprise ailleurs ⁽¹⁾ par nous dans la *Région de l'Olivier*, où, mêlés au Pin laricio, se trouvent, le Genévrier de Phénicie, l'Arbousier, l'Érable de Montpellier, etc., où nous capturons des frileux tels que *Scorpio occitanus*, *Scarabaeus pius*, *Temnochila coerulea*, *Heliopates luctuosus* *Oxypleurus Nodieri*, *Pogonocherus Caroli*, etc.

On peut penser que la rareté de notre *Molorchus* provient de ce qu'il n'est pas, chez nous, dans sa région naturelle, et la station des Pyrénées-Orientales peut faire supposer que nous avons affaire à une forme espagnole qui, comme bien d'autres, vient jusque chez nous.

Description.

♀ En ce qui concerne la femelle, Brisout, avons-nous dit, a eu sous les yeux un exemplaire de petite taille. Long. de 5 1/3 mill., dit-il; notre ♀ atteint 9 mill. Il n'est pas parlé dans la description des poils gris blanc couvrant le corps, plus rares sur la partie dorsale que sur les flancs et le ventre et atteignant leur plus grande longueur sur les pattes. La couleur des *antennes* et des *pattes* est bien le brun ferrugineux, mais on peut dire les tarses beaucoup plus clairs. Les *antennes* dépassent à peine 5 mill. Le *prothorax*, un peu plus long que large, semble au premier abord plus large que long par suite du développement de son disque. Les *élytres*, d'une épauule à l'autre, atteignent 2 mill. sur une longueur de 1,50 mill. La fossette humérale, signalée comme longue par Brisout, va jusqu'au bord interne de l'élytre. C'est un large sillon évasé, oblique, un peu arqué, laissant en saillie une ligne élevée qui atteint aussi la suture, bordée, d'autre part, vers la base interne de l'élytre, par une dépression avoisinant l'écusson. Cette région renflée constitue la majeure partie de la grande tache testacée qui occupe le bord interne des élytres, recouvrant près de la

(1) *Essai de géographie zoologique de l'Hérault*, Montpellier, 1898.

moitié de leur surface. Le fond brun réapparaît autour de l'écusson et se prolonge le long de la suture en une bordure brune allant presque jusqu'à la déhiscence des élytres. Les ailes fortement enfumées et irisées dépassent un peu l'extrémité abdominale.

♂ Le mâle est long de 5,75 mill. sur 1,25 mill. de large mesuré à la hauteur des élytres. La couleur foncière est le brun de poix.

Tête plus étroite que le prothorax, portant sur toute sa surface des points enfoncés plus gros et plus distants entre les antennes; yeux noirs, saillants, plus fortement échancrés que chez la ♀; antennes longues de 9 mill., dépassant la longueur du corps d'environ 3 mill. 50, d'un brun ferrugineux.

Prothorax beaucoup plus long que large, 1 mill. 50 sur 1, couvert de gros points enfoncés, portant sur son disque une ligne saillante, brillante, étroite en avant, dilatée en arrière et s'étendant vers le tiers antérieur en deux larges tubercules brillants. La base est, comme chez la femelle, brusquement rétrécie, mais creusée d'un sillon transversal moins accusé, le disque est moins renflé, à côtés presque parallèles. Les pattes, aux cuisses brusquement renflées à l'extrémité, sont de même couleur que les antennes.

Élytres longues de 1 mill. seulement, larges de 1,25 mill. mesurées ensemble d'une épaule à l'autre, à tache testacée beaucoup moins étendue que chez la ♀, n'occupant guère que la partie saillante oblique, allant de l'épaule à la suture, décrite par nous chez celle-ci. La couleur foncière est plus claire que sur le reste du corps. Les ailes de même couleur que chez la ♀ n'atteignent pas, comme chez celle-ci, l'extrémité abdominale.

En somme, ce *Molorchus* se distingue nettement des 3 autres espèces d'Europe par l'ensemble de sa couleur foncée et surtout par son corps relativement trapu.

La mue chez les Phasmes du genre *Leptynia* [ORTHOPT.]

Par R. DE SINÉTY.

Le nombre des mues pour les *Leptynia hispanica* Bol. et *attenuata* Pant. est de quatre. Elles sont séparées par des intervalles (âges) que nous trouvons sensiblement constants, dans les conditions normales. La première survient un mois environ après l'éclosion et les autres se succèdent avec assez de régularité, chacune quinze ou vingt jours après la précédente.

La durée globale du développement larvaire est, comme il fallait s'y attendre, dans une étroite dépendance vis-à-vis de la température. Les individus élevés dans une étuve à 30° achèvent leur évolution plus vite que les témoins maintenus à la température du laboratoire. Mais il est à remarquer que l'accélération n'affecte pas également chacun des quatre âges : tandis que le premier est peu abrégé, le deuxième et le troisième le sont beaucoup et le quatrième est allongé.

C'est ce qui ressort de la comparaison suivante :

Leptynia attenuata ♀ maintenu à l'étuve à 30°.

Sortie de l'œuf.	2 mai (1899) . .	} Durée du 1 ^{er} stade	27 jours.
1 ^{re} mue	29 mai — . .		
2 ^e mue	3 juin — . .		— du 2 ^e — 5 jours.
3 ^e mue	7 juin — . .		— du 3 ^e — 5 jours.
4 ^e mue	3 juillet — . .	— du 4 ^e — 26 jours.	

Leptynia attenuata ♀ témoin.

Sortie de l'œuf.	3 mai (1899) . .	} Durée du 1 ^{er} stade	32 jours.
1 ^{re} mue	4 juin — . .		
2 ^e mue	20 juin — . .		— du 2 ^e — 16 jours.
3 ^e mue	5 juillet — . .		— du 3 ^e — 15 jours.
4 ^e mue	21 juillet — . .	— du 4 ^e — 16 jours.	

Note sur l'*Aurigena unicolor* Ol. [COL.]

Par VALÉRY MAYET.

Les stations françaises de ce beau Bupreste, si commun dans le nord de l'Afrique, ne sont pas nombreuses. On le prend çà et là dans le Var et les Alpes-Maritimes, et pour nos collègues niçois, la chasse au filet fixe immergé dans le canal de la Vesubie, imaginée par feu l'abbé Clair, est un des moyens de capture. Il y a deux ans, à Collioure, nous en prîmes en juin un exemplaire mort *sous un Olivier*.

A l'instant nous recevons d'un naturaliste nîmois, M. Mingaud, secrétaire de la Société des sciences naturelles de Nîmes, un exemplaire tout frais, capturé avec plusieurs autres le lundi de Pentecôte dernier, à Saint-Gilles (Gard), sur des Bruyères. Ces plantes n'avaient pas à coup sûr nourri la larve. L'insecte parfait vit d'habitude aux dépens de végétaux à feuilles épaisses. Nous l'avons vu en Algérie et en Tunisie brouter les feuilles des Lentisques, des Grenadiers et surtout de la

Passerina hirsuta aux feuilles si **charmées**. C'est sans doute pour la même raison que notre *Bupreste* ~~vit~~ sur les Bruyères.

Pour nous la larve **pouvrait** bien vivre aux dépens de l'Olivier, sur lequel, dans le **Var**, aux environs de Saint-Raphaël et dans les Alpes-Maritimes, aux environs de Grasse, nous avons observé des branches mortes, à la façon de celles qui, sur les Chênes, sont attaquées par le *Coroebus bifasciatus*. C'est la même incision circulaire amenant la dessiccation de la branche.

Description d'une Hespéride nouvelle [LÉP.]

Par P. MABILLE.

Eudamus Biolleyi, n. sp. — Ailes noir foncé avec un reflet bleu sombre sur la base; les supérieures, violâtres aux bords, offrent sur le milieu une bande de taches blanches et transparentes, composée de trois taches peu distantes et de deux traits. Les traits sont sur la côte; il y a dans la cellule une tache carrée échancrée en avant; dans l'intervalle 3 une tache semblable, plus longue, échancrée en avant, et dans le deuxième une petite tache triangulaire. A l'apex on voit trois points apicaux, puis cinq petites taches qui vont rejoindre celle du 3^e intervalle et figurent une bandelette subterminale flexueuse. Les ailes inférieures sont d'un noir bleu aux bords avec la base terne et sombre; elles sont prolongées en queues divergentes, courtes et larges, blanches ainsi que la frange jusqu'à la nervure 5.

Le dessous des ailes supérieures est d'un noir-roux avec les mêmes taches; les inférieures sont d'un bleu-noir avec une bande antémarginal d'un blanc bleuâtre, plus intense supérieurement et divisée, sur les 4 taches intermédiaires des six qu'elle compte, par une ligne noire sinuée. Le corps est noir en dessus.

Cette espèce rappelle l'*E. ridens* He v v. et imite parfaitement l'*E. Crisson* God. et Salv. dont elle diffère à première vue par ses queues blanches.

Pecara (Costa Rica) 1.300 m. d'altitude. Collection J. de Joannis.

Notes synonymiques

Par Maurice Pic.

Dans le n° IV-V du *Wiener Entomologische Zeitung*, 1900, page 135, est analysé un mémoire de M. Brancsik publié dans le *Jahresbericht*

des naturwissenschaftlichen Vereines des Trencsin Komitates, XXI, 1898-1899 (paru à Trencsen en 1900) où sont décrits plusieurs Coléoptères. Parmi les espèces nouvelles mentionnées je relève *Anthicus Reitteri* var. *reductus*, nom préoccupé par celui de *reductus* Woll. (*Col. Hesp.*, 1867, p. 221) et qui pour ce motif doit être changé. Doutant de la valeur de cette variété, je laisse le soin à l'auteur de publier un nouveau nom, s'il y a lieu, ou celui d'enregistrer une synonymie nouvelle.

Hylophilus (*Xylophilus* olim) *nigricollis* Champ. (*Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1896, p. 43), des Antilles, nom préoccupé par celui de *nigricollis* Marsh. (*Ent. Brit.*, I, p. 487) à remplacer par celui de *atriceps*.

Rosalia alpina (v.) *prolongata* Reitt. et (v.) *parvonotata* Reitt. (*Wien. Ent. Zeit.*, 1900, p. 131 et 132) = *Rosalia alpina* L. forme type. Ces modifications, récemment décrites, sont insignifiantes et doivent être regardées comme de simples variations.

Descriptions d'une espèce et d'une variété nouvelles d'Élatérides du Caucase [COL.]

Par H. DU BUYSSON.

Athous Mesmini, n. sp. — *Brevis, testaceo-castaneus, longius rufopilosus; fronte valde impressa, antice in medio leviter arcuata, dense et fortiter punctata. Antennis crassis, brevibus; articulo 2° parvo, 3° hunc longitudine parum superante. Prothorace latitudine longiore, antice in medio producto et arcuato, crebre fortiterque punctato; angulis posticis fortibus, angustatis, summo productis et obtusis, humis carinatis. Elytris thorace 2 1/2 longioribus, fortiter punctato-striatis; tarsis simplicibus. Scutello convexo, fortiter punctato. Prosterno antice valde arcuato.* — Long. 6-7 mill.; lat. 2-2,3 mill.

♂ Forme générale courte, médiocrement convexe, subparallèle. D'un châtain clair, terne ou peu brillant, avec la tête, le prothorax et le dessous du corps de teinte légèrement plus foncée; base des antennes, præsternum et milieu de l'abdomen généralement plus clairs que les parties avoisinantes. Pubescence rousse, longue, couchée. Tête couverte d'une ponctuation forte, assez serrée; front très largement et profondément impressionné, presque tronqué, légèrement arqué en son milieu. Antennes robustes, dépassant les angles postérieurs du pronotum de la longueur d'un article; articles 2 et 3 petits, le 3° un peu plus long que le 2°, formant ensemble une longueur peu supérieure à celle du 4°; celui-ci et les suivants larges, arrondis au sommet sur les

angles externes et internes. Pronotum un peu plus long que large, avancé en avant sur le milieu de son bord antérieur en forme arquée, modérément convexe, fortement et densément ponctué, ses côtés légèrement sinués en avant et en arrière, légèrement arqués au milieu; angles antérieurs faisant légèrement saillie en avant et en dehors, fortement arrondis au sommet; angles postérieurs assez courts, rétrécis à la base, faiblement divergents, obtusément arrondis au sommet. Écusson convexe, fortement ponctué. Élytres plus larges que le pronotum et tout au plus deux fois $1/2$ plus longs, parallèles jusqu'au milieu, ensuite curvillinairement atténués en arrière; stries profondes, marquées de gros points; intervalles légèrement convexes, éparsement pointillés. Tarses simples.

♀ De forme épaisse, subcylindrique, fortement convexe sur le pronotum et les élytres; antennes très courtes, n'atteignant pas le sommet des angles postérieurs du pronotum.

Cette espèce vient se placer, à cause de ses antennes épaisses, dans le voisinage de l'*Athous brevicornis* Desbr. et du *villosulus* Desbr., mais elle s'en distingue nettement par les angles postérieurs du pronotum obtusément arrondis au sommet, par le pronotum moins allongé et par une pubescence beaucoup moins longue et moins rude, par une forme générale toute différente, moins robuste, et par les articles de ses tarses nettement simples. On lui trouve aussi quelque peu l'aspect de l'*Athous corsicus* Reiche, mais la forme des antennes et les proportions des élytres la distinguent aussi nettement de cette dernière espèce que des précédentes. L'*A. cavatus* Cand., qui est d'une coloration plus pâle et plus vive, d'une taille presque aussi petite, s'en éloigne beaucoup par le 3^e article de ses tarses lamellé et le 3^e article de ses antennes de la taille du 4^e; le 2^e seul très petit.

Caucase (M. Leder); Caucase occidental, région subalpine, en juillet : Utschdere, Abago (M. Starck).

Nous nous faisons un plaisir de dédier cette espèce à M. L. Mesmin qui s'est toujours empressé de nous communiquer tous les Élatérides intéressants qu'il recevait.

ATHOUS VILLOSUS Fourcr. (RHOMBEUS Ol.) var. **caucasicus**, var. nov. — Comme le type, mais en entier d'un noir foncé, sans fascie distincte au delà du milieu des élytres; stries un peu plus fortement creusées et marquées de points un peu plus gros. Bord antérieur du front plus fortement excavé et plus nettement anguleux vu de face.

Caucase occidentale (M. Starck).

Rectification d'un nom de genre préoccupé [HYMÉN.]

Par J. VACHAL.

A la page 534 de nos *Annales* 1899, j'ai décrit un Hyménoptère nouveau d'Afrique, voisin des *Stizus* Latr., pour lequel j'ai créé un nouveau genre sous le nom d'*Omphalius*

Notre savant collègue M. Carlos Berg, directeur du Musée de Buenos-Aires, a eu l'amabilité de me faire connaître que le nom générique *Omphalius* a déjà été employé en Zoologie par Philippi, en 1847.

J'exprime mes remerciements à notre éminent collègue, et je substitue au nom déjà employé celui de **Scotomphales**.

L'espèce décrite (*l. c.*) portera donc le nom de *Scotomphales niger* m.

Description d'une Cécidomyie nouvelle de Chine [DIPT.]

Par J.-J. KIEFFER et A. TROTTER.

Rhopalomyia Giralddi, n. sp. — *Imago*. D'un rouge orangé; trois bandes plus ou moins confluentes, sur le thorax, et de larges bandes transversales sur le dessus de l'abdomen noires; pattes et antennes sombres. Palpes composés d'un article unique de forme obovale, muni, vers son extrémité, d'une forte soie. Antennes composées de plus de quatorze articles; funicule du mâle à articles munis d'un col allongé qui, au premier article, atteint à peine le tiers, au second, presque les deux tiers, et aux suivants la longueur de l'article; filets arqués conformés comme chez les *Lecidomyia*; articles de la femelle à col presque nul. Pattes grêles et longues, couvertes d'écailles larges et obtuses; crochets des tarses simples, égalant la longueur de la grande pelote. Ailes à bord antérieur non interrompu après sa jonction avec la seconde nervure; celle-ci est droite et aboutit à la pointe alaire; bifurcation de la troisième nervure située un peu au delà de l'extrémité de la première, son rameau postérieur se détachant presque à angle droit. L'ongle de la pince anale du mâle n'offre pas la conformation ordinaire des espèces de ce genre, car il n'est pas en forme de massue, mais épaissi dans toute sa longueur, avec un léger rétrécissement en son milieu; son extrémité, qui est arrondie, paraît armée d'un minime crochet noirâtre. Lamelle inférieure beaucoup plus longue que la supérieure et bilobée comme elle. Oviducte de la femelle terminé en une

pochette obtuse, à **peine** deux fois aussi longue que large. — Taille ♂ ♀, 2 à 2,50 mill.

Nymphé. — Comme chez les autres espèces de ce genre, la nymphe est dépourvue de spinules dorsales. Stigmates **thoraciques** non proéminents. Base de la gaine antennaire armée d'une **dent aiguë**, brune, trois à quatre fois aussi longue que large. Soies du vertex peu **longues**, mesurant environ quatre fois la longueur de la grosse papille sur laquelle elles s'insèrent; papilles de la face dépourvues de soie; celle du côté interne de chacun des yeux est remplacée par une dent triangulaire brune, presque aussi large que longue et insérée presque perpendiculairement à la surface de l'œil. Corps couvert de minimes ver-rues pointues et appliquées.

Galle et provenance. — L'insecte qui vient d'être décrit produit des galles sur une espèce d'*Artemisia*. Ces galles (fig. 1) se développent sur la tige qu'elles embrassent quelquefois et sont formées aux dépens d'un bourgeon ou d'une pousse, à l'aisselle d'une feuille dont il ne reste parfois plus de trace; il s'en forme aussi à l'aisselle des lobes d'une feuille, par conséquent aux dépens du limbe d'une feuille. Leur forme est irrégulièrement arrondie, leur diamètre varie de 2 à 14 millimètres; leur surface paraît couverte d'un feutrage gris et très court, et leur consistance est un peu spongieuse à la maturité; le nombre des cellules larvaires ou galles internes varie selon les dimensions de la production gallaire. La métamorphose a lieu dans la galle même, comme c'est ordinairement le cas pour les *Rhopalomyia*.

Galle de *Rhopalomyia*
Giraldii, n. sp.

Le R. P. Giraldi, missionnaire, à qui l'insecte est dédié, a recueilli ces galles le 11 juin 1897, à Huo-Tria-Zaey, province du Shen-Si septentrional (Chine).

Sur les différentes colorations des chrysalides de *Papilio Demoleus* et de *Danaïs Chrysippus* [LÉP.]

Par Edmond BORDAGE.

Au mois d'août 1898, j'ai fait présenter au Congrès international de Zoologie tenu à Cambridge un travail sur l'homochromie chez les

chrysalides de certains Lépidoptères des îles Mascareignes (1).

Deux savants qui — plus ~~favorisés~~ que moi — assistaient à ce Congrès, après m'avoir ~~fait l'honneur~~ de déclarer mes recherches très intéressantes, ~~ont cru~~ cependant devoir poser deux objections dont je n'ai pu avoir connaissance que tout récemment, en recevant le volume spécial publié à l'occasion du Congrès de Cambridge (2).

Bien que je fusse absolument certain de tous les résultats auxquels j'étais précédemment arrivé, je n'ai pas hésité un seul instant à reprendre ces expériences de nouveau. Je me hâte d'ajouter que les conclusions auxquelles j'ai été conduit sont identiquement les mêmes.

Je serais alors désireux de soumettre les deux points en litige à nos collègues de la Société entomologique de France avec preuves à l'appui.

I. — La première des objections en question concerne les chrysalides de *Papilio Demoleus*. Elle a été posée par notre savant collègue M. Roland Trimen, président de la Société entomologique de Londres. Cet entomologiste déclare que les chrysalides du *P. Demoleus* prennent les couleurs des surfaces sur lesquelles elles sont fixées, à condition toutefois que ces couleurs correspondent aux variétés de coloration offertes par les chrysalides dans la nature (gris foncé, gris relativement clair, jaune verdâtre, brun rougeâtre tirant sur le rouge brique). De mon côté, je nie ces phénomènes d'homochromie, et, à l'appui de mon assertion, je fais mettre sous les yeux des membres de la Société entomologique des chrysalides de *P. Demoleus*, conservées dans le formol qui n'altère pas leur coloration. Ces chrysalides adhèrent encore aux supports sur lesquels les chenilles s'étaient fixées avant leur transformation, c'est-à-dire sur de petits rameaux gris ou bruns de la plante nourricière (*Triphasia trifoliata*, fam. des Aurantiacées).

Or, il est aisé de constater que la couleur de la chrysalide ne correspond pas toujours à celle du support. Les cas où la couleur de la chrysalide ne correspond pas à celle du support sont, en effet, tout aussi nombreux que ceux où il peut se produire une remarquable similitude de coloration, ainsi que l'on peut en juger à l'examen des spécimens que j'ai l'honneur de soumettre à nos collègues de la Société entomologique. Je signalerai surtout le cas où la chrysalide, d'une

(1) Expériences sur la relation qui existe entre la couleur du milieu et la couleur des chrysalides de certains Lépidoptères (*Proceed. of the Intern. Congress*, pp. 235-246).

(2) *Proceedings of the International Congress of Cambridge, London, 1899.*

belle coloration jaune verdâtre, est fixée sur une brindille de couleur brune ⁽¹⁾.

Comment alors expliquer cette contradiction complète entre les conclusions de M. R. Trimen et les miennes? Cela est bien simple. Cet auteur dit, en effet, n'avoir fait qu'une seule expérience.

Or, de mon côté, quand je fis ma première expérience, je n'avais à ma disposition que cinq chenilles dont trois furent placées sur fond gris et deux sur fond jaune verdâtre. Les chrysalides que j'obtins offraient parfaitement les colorations respectives des surfaces sur lesquelles elles étaient fixées. Si je m'en étais tenu à cette seule observation, j'aurais pu être également tenté de conclure au pouvoir d'accommodation des couleurs. Mais des expériences très nombreuses me permirent ensuite de constater qu'il n'y avait eu là qu'une simple coïncidence.

La nature semble se plaire à cacher ses mystères, à décevoir, à induire en erreur l'observateur qui, pour une cause quelconque, est amené à formuler des conclusions basées sur une seule expérience.

II. — L'objection de M. Caracciolo concerne *Danaïd Chrysippus*. Cet entomologiste déclare tout d'abord avoir été absent pendant une partie de la séance durant laquelle il fut donné lecture de ma communication. C'est ce qui explique probablement que M. Caracciolo n'a pas dû avoir connaissance du passage de cette communication dans lequel je dis avoir fait de nombreuses expériences et porté mes recherches sur plusieurs centaines de larves. Il pense, à tort, que mes conclusions sont appuyées sur un trop petit nombre d'expériences. Je viens d'ailleurs de reprendre ces recherches, ce qui m'a été très facile, car *D. Chrysippus* est très abondante à la Réunion. Je suis arrivé encore à des résultats absolument identiques à ceux que j'avais obtenus en 1898.

M. Caracciolo dit, qu'à la Trinidad (Antilles anglaises), il a pu constater que toutes les chrysalides de *D. Chrysippus*, provenant de chenilles ayant vécu en liberté, présentaient la coloration verte, et que, s'il avait quelquefois obtenu des chrysalides de coloration rougeâtre,

(1) Les chenilles qui ont donné ces chrysalides avaient été mises séparément dans des bocaux de verre de très grandes dimensions et recouverts par une toile métallique laissant pénétrer l'air en abondance; la nourriture leur était donnée fréquemment, mais en petite quantité, de façon à ce que la coloration verte des feuilles ne pût avoir aucune influence. Dans les bocaux étaient placées les brindilles grisâtres ou brunes (dépourvues de feuilles) sur lesquelles les chenilles se fixaient.

c'était en élevant des chenilles en captivité. Ces chrysalides étaient alors atrophiées et n'arrivaient pas, la plupart du temps, à leur complet développement, ou bien, si elles y arrivaient, il en résultait des Papillons mal venus et aux ailes froissées. Cette coloration était donc, en quelque sorte, pathologique. Elle se présentait encore, ajoute M. Caracciolo, pour les chrysalides infestées par des parasites.

De mon côté, je puis assurer que, aux îles Mascareignes comme à Madagascar, les chenilles de *D. Chrysippus* vivant en liberté donnent naissance à des chrysalides présentant, les unes une coloration verte, d'autres une coloration rose tendre ou rose carné, tout en atteignant également des dimensions normales et en étant à peu près aussi nombreuses les unes que les autres ⁽¹⁾. Il ne saurait donc ici être question de spécimens mal venus ou tous parasités. Les quelques chrysalides parasitées ou mal venues que j'obtenais étaient petites, et présentaient non pas une jolie coloration rose clair, mais une teinte tirant sur le rouge brique et qui doit certainement correspondre à celle que M. Caracciolo indique pour les chrysalides mal venues qu'il a obtenues.

Je ferai maintenant remarquer que je ne suis pas le premier à citer la coloration rose clair chez des chrysalides de *D. Chrysippus* trouvées en liberté. Je citerai à ce sujet Boisduval ⁽²⁾. Cet auteur s'exprime ainsi : « La chrysalide de *D. Chrysippus* ressemble à un pendant d'oreille. Elle est d'un vert tendre ou d'un rose pâle, avec des points d'or et une bande noire en fer à cheval près de l'extrémité. » Or, Boisduval tenait ce renseignement de deux entomologistes de grande valeur, ayant habité longtemps Madagascar et les Mascareignes : Goudot et Sganzin. Le Dr A. Vinson a également cité la coloration rose de *D. Chrysippus* dans ses nombreuses et intéressantes brochures sur les Lépidoptères de la Réunion. Il en est de même de l'entomologiste Godart ⁽³⁾.

(1) Les Papillons qui en provenaient étaient bien conformés et de dimensions normales.

(2) BOISDUVAL. Faune entomologique de Madagascar, Bourbon et Maurice, Lépidoptères, Paris, 1838, p. 35.

(3) GODART in Encyclopédie méthodique, Entomologie, t. IX, Paris, 1839. Article *Papillon*, p. 187. Cet auteur dit nettement qu'il y a des chrysalides roses. Il ajoute que les chrysalides vertes proviennent du changement de coloration des chrysalides roses quand approche le moment de l'éclosion. J'ignore de qui Godart tenait cette idée aussi bizarre qu'inexacte. Les chrysalides gardent leur coloration primitive jusque vers le moment de l'éclosion, puis les unes et les autres brunissent peu à peu, puis deviennent complètement

En résumé, je suis à peu près persuadé que la différence qui existe entre les résultats que j'ai obtenus et ceux auxquels est arrivé M. Caracciolo provient : 1° de ce que les larves en captivité sur lesquelles cet entomologiste a fait ses observations devaient être enfermées trop à l'étroit et être privées d'air, tandis que celles sur lesquelles j'expérimentais étaient bien maintenues dans l'obscurité la plus complète, mais ne manquaient ni d'air, ni d'espace, ni de nourriture. Dans de telles conditions elles me donnaient des chrysalides le plus souvent colorées en rose tendre, de très belles dimensions, et d'où sortaient des Papillons très vigoureux et normalement colorés. 2° J'ignore quel est le nom scientifique de la plante préférée des chenilles du *D. Chrysippus*, à la Trinidad. Ce détail peut avoir une certaine importance, la différence de nourriture pouvant, jusqu'à un certain point, produire des différences dans la coloration des chrysalides, ce qui pourrait peut-être expliquer les divergences d'opinion.

A la Réunion, on trouve la chenille de *D. Chrysippus* sur trois plantes de la famille des Asclépiadacées : *Gomphocarpus cornutus*, *Asclepias curassavica* et *Tylophora athamatica*. La première de ces trois plantes est, de beaucoup, la plus fréquentée. Les chenilles sur lesquelles j'ai opéré étaient indifféremment nourries avec l'une ou l'autre de ces plantes.

Tels sont les points contestés que je désirais soumettre à l'appréciation de la Société entomologique de France.

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des séances), 1899, II, Tables. — 1900, I, 21-23. — A. DOLLFUS et A. VIRÉ : Sur une nouvelle espèce d'Isopode souterrain, le *Caecosphaeroma Faucheri*.

Annales de la Société entomologique de France, 1899, IV. — H. DONCKIER DE DONCKEL : Catalogue des Hispides (fin). — L. FAIRMAIRE : Description de Coléoptères nouveaux recueillis en Chine par M. de Latouche. — A. LÉVEILLÉ : Études sur la famille des Temnochilides. — J. BOURGEOIS : Diagnoses de Lycides nouveaux ou peu connus (7^e partie). — R. DU BUYSSON : Sur quelques Osmies de Tunisie (pl. 10). — M. DE VAULOGER : Contribution au Catalogue des Coléoptères du Nord de l'Afrique. *Helopini*. — P. MABILLE : Lepidoptera nova Malgassica et africana. — M. PIC : Étude sur les *Hylophilidae*,

Anthicidae et *Pedilidae* de l'île de Sumatra. — I. BOLIVAR : Les Orthoptères de Saint Joseph's Collège à Trichinopoly (Sud de l'Inde), 2^e partie (pl. 11 et 12). — J.-J. KIEFFER : Étude sur les Évanthides (fig.). — Observations sur le groupe *Chironomus* avec description de quelques espèces nouvelles (fig.). — Tables. — L. BEDEL : Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, t. V, *Phytophaga*, pp. 277-308 (encartage).

Annals and Magazine of Natural History (The), juin 1900. — L. WALSHINGHAM : Asiatic *Tortricidae*. — E. BORDAGE : On the special Protection of Appendages in process of Regeneration after artificial Mutilation among Insects. — C.-O. WATERHOUSE : New Species of the Coleopterous Genus *Prionocalus* from Ecuador and Peru (fig.). — H. DRUCE : Descriptions of some new Genera and Species of Heterocera from Tropical South America. — W.-F. KIRBY : On a small Collection of Odonata (Dragonflies) from Hainan, collected by the late J. Whitehead (pl.). — On the Species which have been included in *Zygonyx* Hagen and de Sélys. — Tables.

Canadian Entomologist (The), juin 1900. — M.-E. MURTFELDT : New Tineidae with Life-Histories. — H. FIELD : Condemnable Practices in Generic Revisions. — L.-O. HOWARD : A new Genus of Aphaelininae from Chile. — G.-D. HULST : Some new Genera and Species of Phycitinae. — A.-D. MACGILLIVRAY : *Tenthredo* New Species. — W.-H. ASHMEAD : Classification of the Fossorial, Predaceous and Parasitic Wasps, or the Superfamily Vespoidea, II. — G.-H. FRENCH : The Genus *Catocala*. — A.-R. GROTE : A new *Catocala* from Texas.

Entomologische Nachrichten, XXVI, 11, 1900. — W. MEIER : *Timarcha Schencklingi* n. sp. — ROESCHKE : Carabologische Notizen, VII. — H. KOLBE : Ueber einige Arten der Dynastidengattung *Heteronychus*. — KRIECHBAUMER : Neue Schlupfwespen. — TH. BECKER : Anmerkung zu meinem Aufsatz : Ueber die Leptiden Formen im Gebiete der Europäisch-Asiatischen und Mittelmeer-Fauna.

Entomologist (The), juin 1900. — Dr M. STANDFUSS : Synopsis of Experiments in Hybridization and Temperature made with Lepidoptera up to the end of 1898 (pl.). — A.-G. BUTLER : The Type of *Thecla*, Fabr. — Dr H.-J. HANSEN : On the Morphology and Classification of the Auchenorrhynchous Homoptera. — T.-D.-A. COCKERELL : A new Genus of *Coccidae* injuring the Roots of the Grape-Vine in South Africa. — W.-J. LUCAS : British Dragonflies of the older

English Authors. — G.-W. KIRKALDY : Recent notes on *Hydrometra Martini* Kirkaldy = *lineata* Say. — Notes diverses.

Entomologist's monthly Magazine (The), juin 1900. — E.-R. BANKES : Supplementary Notes on *Lithocolletis pyrivorella* Bnks. — L. WAL-SINGHAM : Description of the Larva of *Metzneria littorella* Dgl. — R. MAC LACHLAN : A remarkable new Mimetic Species of *Mantispa* from Borneo (fig.). — REV. F.-D. MORICE : A revised Synoptic Table of British Chrysidids. — W.-E. SHARP : *Elasmostethus ferrugatus* Fabr., in Wales. — F. BARRETT : Further Notes on South African Lepidoptera. — Notes diverses.

Entomologist's Record and Journal of Variation (The), juin 1900. — T.-A. CHAPMAN : The Relationship between the Larval and Imaginal Legs of Lepidoptera (pl.). — L.-B. PROUT : Psychides in 1900. — E. WASMANN : The Guests of Ants and Termites (pl.); traduction. — W.-H. HARWOOD : Notes on *Malacosoma castrensis*. — C.-N. BURROWS : *Phodoresma smaragdaria* Fabr. — J.-W. TUTT : Migration and Dispersal of Insects : Lepidoptera. — *Anthonomus rufus* Sch., and Addition to the British List. — M. BURR : Notes on the Geographical Distribution of the Eumastaciidae. — J.-K. DONISTHORPE : Myrmecophilous Orthoptera — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes (La), 1^{er} juin 1900. — C. HOULBERT : Faune analytique illustrée des Orthoptères de France (pl.). — G. DE ROCQUIGNY-ADANSON : Géonémie de *Saturnia pyri* Schiff. — Notes spéciales et locales.

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 15 mai et 1^{er} juin 1900. — P^r H.-J. KOLBE : Ueber altersschwache Käfer. — D^r J.-M. BASTELBERGER : Ueber *Eupithecia ericeata* Rbr. und *E. millierata* Stdgr. (= *pauzellaria* Rbr. = *expressaria* Mill., non = *expressaria* H.S.) — O. SCHULTZ : Filarien in paläarktischen Lepidopteren (2 art.). — D^r L. REH : Periodicität bei Schildläusen. — J.-N. ERTL : Zur Verbreitung von *Cosmopteryx Scribaella* v. Heyd. — Petites communications originales.

K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (*Mittheil. d.*), L, 4, 1900. — L. GANGLBAUER : Revision der europäisch-mediterranen Arten der blinden Bembidiinen-Genera. — P. BORN : *Carabus italicus* nov. var. *Ronchetti*. — D^r M. BERNHAUER : Achte Folge neuer Staphyliniden aus Europa nebst Bemerkungen.

Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, XXXII, 1899-1900. — C.-W.-S. AURIVILLIUS : Animalischer Plankton aus dem

Meere zwischen Jan Mayen, Spitzbergen, K. Karls Land und den Nordküste Norwegens (fig.). — P.-T. CLEVE : The Plankton of the North Sea, The English Channel and the Skagerak in 1898. — Plankton-researches in 1897.

Museo nacional de Montevideo (Anales), III, 13, 1900. ☉

Naturaliste (Le), 1^{er} juin 1900. — A. GRANGER : Les plantes de France, leurs Chenilles et leurs Papillons. — Les Sauterelles en Espagne. — E. SANTINI DE RIOLS : Les soies du *Bombyx mori*, du Jambonneau (Pinne marine) et de l'Araignée.

Psyche, juin 1900. — S.-J. HUNTER et W.-S. SUTTON : The Melanopli of Kansas, I. — A.-D. HOPKINS : American fossil Coleoptera referred to the Scolytidae (fig.). — S.-H. SCUDDER : The species of *Hadrotettix*, a genus of Oedipodinae. — H.-G. DYAR : Life histories of North American Geometridae, XII. — T.-D.-A. COCKERELL : Some Coccidae quarantined at San Francisco. — C.-N. SOULE : Some mating Notes.

R. Accademia dei Lincei (Atti), 1900, I, 9 et 10. ☉

Royal Society (Proceedings), LXVI, 430, 1900. ☉

Sociedad científica « Antonio Alzate » (Memorias y Revista), XIV, 1-2, 1899. ☉

Sociedad española de Historia natural (Actas), mai 1900. — V. FIGUEROA : Catálogo de Los Lepidopteros recogidos en los alrededores de Valladolid. — BARRAS : Excursions por Palencia. — R.-P. NAVAS : Notas entomológicas, V ; Neuropteros del Moncayo y Zaragoza.

Società Entomologica Italiana (Bullettino), XXXII, 1, 1900. — G. LEONARDI : Storia naturale degli acari insetticoli. — M. BEZZI : Contribuzioni alla fauna ditterologica italiana, II ; Ditteri delle Marche e degli Abruzzi. — C. EMERY : Intorno al torace delle formiche e particolarmente dei neutri (fig.).

Societas Entomologica, 1^{er} juin 1900. — C. FRINGS : Experimente mit erniedrigter Temperatur im Jahre 1899. — B. SLEVOGT : Einige Bemerkungen zu den Tafeln von Dr Hofmann's « Die Grossschmetterlinge Europa's ».

Société des Sciences naturelles et d'Enseignement populaire de Tarare (Bulletin), 15 avril 1900. ☉

Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne (Bulletin), LIII, 1899-1900. ☉

Société Entomologique de Belgique (Annales), 1900, V. — Dr J.-CH.

JACOBS : Diptères de Belgique. — P. DOGNIN : Hétérocères nouveaux de l'Amérique du Sud. — F. OLIVIER ; Contribution à l'étude de la faune entomologique de Sumatra, XI (Lampyrides).

Société Linnéenne du Nord de la France (Bulletin), février et mars 1900.



South African Museum (Annals), II, 1900. ⊙

South London Entomological and Natural History Society (Proceedings),

1899. — T.-A. CHAPMAN : Some Points in the Evolution of the Lepidopterous Antenna (pl.). — J.-W. TUTT : The Nature of Metamorphosis. — D.-J. SCOURFIELD : Fresh-water Entomostraca. — M. BURR : Orthoptera, with Special Reference to British Species. — R. ADKIN : More Lazy Days by the Sea (being Stray notes on a short holiday at Eastbourne).

BEDEL (L.) : Catalogue raisonné des Coléoptères du nord de l'Afrique, pp. 201-208. (*L'Abeille*), 1900.*

ID : Description d'un *Platyderus* nouveau de la Tunisie méridionale. (*Bull. Soc. ent. Fr.*), 1900, 1 p.*

BELON (R.-P.-M.) : Descriptive Catalogue of the Coleoptera of South Africa. Fam. *Lathrididae*. (*Trans. Ph. Soc. S. Afr.*), 1900, 18 p.*

BORDAS (Dr L.) : Recherches sur les organes génitaux mâles de quelques *Cerambycidae*. (*Ann. Soc. Ent. Fr.*), 1899, 8 p., 1 pl.*

ID. : Sur le revêtement épithélial cilié de l'intestin moyen et des caecums intestinaux chez les Insectes. (*Bull. Soc. Ent. Fr.*), 1900, 3 p.*

ID. : Étude anatomique des organes générateurs mâles des Coléoptères à testicules composés et fasciculés. (*C. R. Acad. Sc.*), 1900, 3 p.*

BOURGEOIS (J.) : Étude sur les Lycides du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique (Espèces du Congo et pays voisins.) (*Ann. Soc. Ent. Belg.*), 1900, 8 p.*

ID. : Notes sur quelques *Malthinus* paléarctiques et description d'une espèce nouvelle. (*Bull. Soc. Ent. Fr.*), 1899, 4 p.*

ID. : Lycides nouveaux ou peu connus du Musée civique de Gênes, II, 2. (*Ann. Mus. civ. St. nat. Gen.*), 1900, 13 p.*

BUCHET (G.) : Considérations sur les conditions favorables, au dosage

du Plankton de surface en haute mer. (*Ass. fr. Av. Sc.*), 1899, 2 p.*

BUYSSON (H. DU) : Fumigation with Bisulphide of Carbon for the complete and rapid Destruction of the Insects which attack herbarium specimens, furs, woolens, etc. (*Ins. Life*), 1893, 3 p.*

COQUILLETT (D.-W.) : Report on a Collection of Dipterous Insects from Puerto Rico. (*Proc. U. S. Nat. Mus.*), 1900, 24 p.

FELT (E.-P.) : Insects injurious to Forest Trees. (4th Ann. Rep. Com. Fish., etc.), 1898, 31 p., 3 pl. col., fig.*

GAL (J.) : Études sur le Ver à soie, IV. Nîmes, 1900, 11 p.*

GERVAIS (P.) : Note sur quelques espèces de l'ordre des Acariens. (*Ann. Sc. nat.*), 1840, 6 p., 1 pl.

HOLMGREN (A.-E.) : Dispositio methodica Exochorum Scandinaviae. (*Ofr. K. Vet. Ak. Forh.*), 1873, 24 p., 1 pl.

MAINDRON (M.) : Description d'une nouvelle espèce d'Insecte coléoptère (*Calosoma Grandidieri*) découverte dans le Sud de Madagascar par M. Alfred Grandidier. (*Bull. Mus. Hist. nat.*), 1900, 2 p., fig.*

MALAPERT (P.) : Bombyx anastomose (*B. anastomosis*), des mœurs de ce Lépidoptères, etc. Poitiers, 1851, 16 p.

MINGAUD (G.) : Notes zoologiques (*Thais Cassandra*, *Phyllotoma aceris*, *Platysyllus castoris*, *Charaxes Jasius*, *Bruchus irresectus*) (*Bull. Soc. ét. Sc. nat. Nîmes*), 1900, 25 p.*

NAÇONOW (N.) : Contributions à l'étude de l'intestin des Insectes. — Notes entomologiques, 66 p.*

Id. : Recherches entomologiques. Varsovie, 1893, 106 p., 5 pl. n.*

Id. : Description des Collections du Cabinet zoologique de l'Université de Varsovie. Liste et description de la Collection de Biologie des Insectes. Varsovie, 1894, 64 p. 1 pl. n.*

Id. : Développement des Crustacés : *Balanus* et *Artemia*. — Morphologie des Insectes inférieurs : *Lepisma*, *Lipura* et *Campodea*. (*Bull. Soc. I. Am. Sc. nat. etc.*). Moscou, 1887, 86 p., fig.*

Id. : Matériaux pour l'histoire naturelle des Fourmis (*loc. cit.*). Moscou, 1889, 126 p., 9 pl.*

(Tous les travaux de M. le Prof. Naçonow sont en langue russe.)

ORBIIGNY (H. D') : Supplément au Synopsis des Onthophagides paléarctiques (*Abeille*), 1900, 12 p.*

- PIC (M.) : Diagnoses de Coléoptères d'Orient récoltés en 1899. (*Soc. Hist. nat. Autun*), 1900, 8 p.*
- PLATEAU (F.) : Nouvelles recherches sur les rapports entre les Insectes et les Fleurs. — II. Le choix des couleurs par les Insectes. (*Mém. Soc. zool. Fr.*), 1899, 35 p.*
- Id. : Rapport sur la question : *On demande des recherches anatomiques et systématiques sur les Insectes du groupe des Apterygota* (Thysanura et Collembola). (*Ac. R. Belg.*), 1899, 9 p.*
- Id. : La vision chez l'*Anthidium manicatum* L. (*Ann. Soc. ent. Belg.*), 1899, 5 p.*
- RÖBER (J.) : Prophylaxis? (*Ill. Zeits. Ent.*), 1900, 1 p., 2 exempl.*
- SAUSSURE (H. DE) : Hymenoptera. Vespidae (*Abh. Senck. naturf. Ges.*), 1900, 40 p.*
- STEFANI (T. DE) : Zoocecidii e Cecidiozoi dell' *Atriplex halimus* L. in Sicilia. (*Atti Acc. Gion. Sc. nat. Catun.*), 1900, 27 p., 1 pl.*
- TSCHITSCHÉRINE (T. DE) : Notes sur les *Platysmatini* du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, IV, VI. (*Hor. Soc. Ent. Ross.*), 1899.*
- Id : Mémoire sur la Tribu des *Harpalini*. (*loc. cit.*), 1900, 36 p.*
- TUTT (J.-W.) : Catalogue of the Palaearctic Psychides from British Lepidoptera. 1900, 4 p.*

A. L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 27 juin 1900.

Présidence de M. A. GIARD.

Correspondance. — M. Stephen.-A. Forbes, d'Urbana (U. S. A.), et M. P. Vignon remercient la Société de leur admission.

Distinctions honorifiques. — M. le prof. A. Giard, président de la Société, a été élu le 25 courant membre de l'Académie des Sciences en remplacement d'A. Milne-Edwards. — M. Maurice Maindron adresse à cette occasion, à M. Giard, une allocution qui sera imprimée dans le prochain fascicule des Annales (1^{er} trimestre 1900).

— M. A. Giard remercie chaleureusement la Société des témoignages de sincère sympathie qu'elle lui a toujours donnés et a le plaisir de lui annoncer que l'Académie française vient de décerner le PRIX SOBRIER-ARNOULD, à M. Maurice Maindron, pour son ouvrage *Récits du Temps passé*.

Admissions. — M. l'abbé Robert de Sinéty, 35, rue de Sèvres, Paris. *Anatomie, embryologie et histologie des insectes*.

— M. le Dr Carlo-E. Della Torre, assistant à la chaire de Matière médicale de l'Université de Florence (Italie) [*Entomologie appliquée à l'apiculture, Anatomie comparée*], qui avait fait partie, autrefois de la Société entomologique de France, est, sur sa demande, réadmis au nombre de ses membres.

Présentations. — M. le Dr Manuel J. Rivera, professeur de Sciences naturelles à l'École normale de Chillan (Chili) [*Entomologie du Chili*], présenté par M. E. Gounelle. — Commissaires-rapporteurs MM. E.-L. Bouvier et Ch. Lahaussais.

— M. Louis Thouvenin, capitaine au 2^e zouaves, Oran (Algérie) [*Coléoptères*], présenté par M. L. Bedel. — Commissaires-rapporteurs MM. P. Lesne et M. de Vauloger.

— M. Moser, Hauptmann 60, Bülow-Str., Berlin W. (Allemagne)

[*Coléoptères*, pr. *Célonides*], présenté par M. Ph. François. — Commissaires-rapporteurs MM. L. Bedel et H. Donckier.

Changement d'adresse. — M. Hyacinthe Grison, sous-inspecteur de l'Enregistrement, Saïgon (Cochinchine).

Renseignement bibliographique. — M. l'abbé J. de Joannis annonce, de la part de M^{me} Ragonot, que le second volume de la « Monographie des *Phycitinae* et *Galleriinae* » vient d'être envoyé à l'impression.

L'œuvre importante de notre éminent et regretté collègue E.-L. Ragonot sera donc ainsi terminée très prochainement.

Communications.

Sur l'habitat de trois Coléoptères algériens

Par J. BOURGEOIS

Au cours de sa campagne géodésique de l'année dernière dans les environs de Tamerna, entre Biskra et Tougourt, M. le capitaine Prévoist, du Service géographique de l'armée, a bien voulu recueillir à mon intention un certain nombre de Coléoptères, parmi lesquels je crois devoir dès à présent mentionner les trois espèces suivantes, en attendant la liste des autres captures :

COPTOGNATHUS LEFRANCI Muls. et God. (2 ♂, 1 ♀). — Le ♂ a l'abdomen lisse ou presque lisse, avec le dernier arceau ventral légèrement sinué en arc à son extrémité; chez la ♀, l'abdomen est assez fortement ponctué et le dernier arceau ventral, qui est densément rugueux sur la plus grande partie de sa surface, se termine en courbe régulière, sans trace de sinuosité à son sommet. En outre, si j'en juge par mes exemplaires, la ♀ est de forme plus massive que le ♂ et ses élytres sont un peu plus sensiblement élargis en arrière.

CRATOR (VERTUMNUS) CUNICULUS Burm. (1 ex.) — Décrite d'abord de Sénégambie, cette espèce a été trouvée ensuite à Ouargla (cf. Fairm., Bull. Soc. ent. Fr., 1885, p. viii) et dans le Mزاب (Letourneux). Tamerna paraît être la localité algérienne la plus septentrionale d'où elle ait été signalée jusqu'à présent.

EXOCHUS GIGAS MARS. (1 ♂, 1 ♀). — C'est bien le géant de nos Curculionides paléarctiques; la ♀ surtout est énorme. Voici, du reste, les dimensions de mes exemplaires : ♂ Long. (*sine rostr.*) 21 mill.; larg. 9 1/2 mill.; ♀ Long. (*sine rostr.*) 27 1/2 mill.; larg. 13 mill.

Diagnose d'un Harpalide nouveau, de Tunisie [COL.]

Par L. BEDEL.

Acupalpus (Egadroma) Vaulogeri, n. sp. — *Oblongus, sat latus, perparum convexus, totus flavo-rufescens, nitidissimus, glaber-rimus. Capite brevi, polito, fronte colloque latis, oculis magnis, prominulis. Antennis longiusculis, articulis 3-11 elongatis. Prothorace brevissimo, longitudine duplo latiore, in medio litudinem elytrorum attingente, supra polito ac laevigato, antice emarginato, lateribus angustissime marginatis, angulis posticis valde rotundatis. Elytris latis, breviusculis, translucidis, leviter alutaceis, striis tenuissimis, stria secunda ante apicem unipunctata.* — Long. vix 6 mill.

Tunisie désertique : Djebel Cherichira à l'Ouest de Kairouan, le soir au vol, juin 1900 (capitaine de Vauloger); un individu femelle.

Malgré cet aspect tout spécial qu'ont la plupart des Carabiques nocturnes des contrées désertiques, cette espèce me paraît appartenir au groupe des *Egadroma* Motsch., tel qu'il vient d'être caractérisé dans la remarquable étude de Tschitschérine sur les *Harpalini* (Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 364); elle diffère d'ailleurs essentiellement du *marginatus* Dej. qui jusqu'ici représentait seul les *Egadroma* dans la région méditerranéenne.

C'est une des plus intéressantes découvertes du capitaine de Vauloger dans son dernier voyage en Tunisie et il n'est que juste d'y attacher son nom.

Notes synonymiques

d'après les types de la collection R. Oberthür [COL.]

Par L. BEDEL.

Agonum oblongum *Dej. 1831, Spec. V, p. 736 (*patruele* Gemm. Cat. Monac.). — Cette espèce, décrite par Dejean sur un individu en très mauvais état et envoyé par Schœnherr comme

provenant de « Barbarie », est positivement l'A. (*Europhilus*) *gracile* Gyll. 1827. La provenance indiquée est manifestement inexacte.

Anchomenus melanocephalus *Dej. 1828, Spec. III, p. 118. — Le type unique, que Dejean dit avoir rapporté d'Espagne, est une femelle de l'*Agonum* (*Europhilus*) *Thoreyi* Dej. et ne diffère du type ordinaire que par son pronotum non rembruni.

Bien entendu, cet insecte n'a aucun rapport avec l'*Anchomenidius astur* Sharp, qui est si remarquable par sa tête très grosse et ses ongles finement en scie.

Singilis maroccana *Fairm. 1896 in Bull. Soc. ent. Fr. 1896, p. 344. — Espèce établie sur un exemplaire qui a certainement noirci par suite de fermentation et qui ne diffère pas autrement des variétés foncées du *S. soror* Ramb. A première vue les élytres du type paraissent entièrement noirs, mais on retrouve encore à leur base les traces de la couleur rousse qu'ils devaient avoir.

Trachyscelis anisotomoïdes *Fairm. 1876 in Petites Nouv. ent. II, p. 38 et in Ann. Soc. ent. Fr. 1880, p. 49. — Appartient en réalité au groupe des Clavicornes et au genre *Liodes* Latr. (*Anisotoma* Schmidt); c'est même une espèce voisine du *L. ciliaris* Schmidt, avec une ciliation des élytres bien plus forte et des tibias antérieurs encore mieux adaptés à la vie sabulicole.

Description d'une espèce nouvelle d'*Amphicoma* Latr. [COL.]

Par A. CHAMPENOIS.

Amphicoma (subgen. **Eulasia**) **speciosa**, n. sp. — *Breviter oblonga, supra tota violaceo-purpurea. Mandibulae apice interno bidentatae, earum latus externum rotundatum. Palpi nigri. Antennae basi nigrae, apice testaceae, articulis primo et secundo dense nigro-villosis. Caput, pronotum et scutellum coriacea, subtiliter crebre punctata, nigro-villosa; clypei margine sat fortiter elevato, angulis anticis rotundatis; pronotum transversum, lateribus angulisque posticis rotundatis, medio ante basim particulatim laevigatum; scutellum breve rotundatum. Coleoptera convexa, parallela, apice externo et interno rotundata, dehiscentia, subtiliter sat crebre punctata, nigro-pubescentia. Pectus cum pedibus nigro-violaceum, nigro-villosum. Abdomen nigrum, lateribus nigro-, in medio rufo-villosum; penultimo segmento rubro-maculato in ♂.*
— Long. 12-14 mill.

Types : 1 ♂ et 1 ♀ de Syrie (*ex* Staudinger, coll. Champenois), 1 ♀ de Perse (coll. Abeille de Perrin!), 1 ♀ (coll. Argod!).

Cette espèce est voisine de l'*A. papaveris* Sturm. Elle en diffère, notamment, ainsi que des *A. pulchra* Reitt. et *hybrida* Reitt., par la conformation de ses mandibules régulièrement arquées au bord externe au lieu d'être dilatées en forme de lobe. La ponctuation de son pronotum et la longue villosité noire dont elle est revêtue suffisent pour la distinguer facilement de toutes les autres espèces du même groupe.

Chez la ♀, le chaperon est moins fortement arrondi aux angles antérieurs et plus nettement caréné au milieu sur toute sa longueur.

5^e supplément aux Ichneumonides d'Europe [HYMÉN.]

Par l'abbé V. BERTHOUMIEU.

61. *Amblyteles Gaullei*, n. sp. (groupe *equitatorius*).

♀ *Capite, antennis, thorace et pedibus nigris; segmentis abdominis 2-3 castaneis, gastrocelis parvis.* — Long. 11 mill.

Diffère de *A. Pici* par les articles des antennes plus longs, l'aréole supéro-médiane semi-circulaire, la ponctuation des hanches postérieures plus serrée et le postpétiole bicaréné.

Hab. Tunisie (J. de Gaulle).

62. *Amblyteles solymus*, n. sp. (groupe *occisorius*).

♀ *Antennis totis nigris; scutello albo; pedibus rufis, coxis et trochanteribus nigris; alis infuscatis; stigmatibus nigro; gastrocelis mediocribus; segmentis abdominis 2-3 castaneis, 5-7 albo-maculatis.* — Long. 15 mill.

Un point blanc aux orbites du front, un point roux sous les ailes, aréole supéro-médiane subhexagonale; l'aréole des ailes étroite au sommet.

♂ ? Diffère par l'abdomen entièrement noir, segments 6-7 maculés de blanc; par l'absence de points colorés aux orbites du front et à la base des ailes. Les articles inférieurs des antennes sont carénés et le 4^e segment ventral plissé.

Hab. Jérusalem (M. Pic).

63. *Platylabus judaicus*, n. sp.

♂ ♀ *Niger; fronte canaliculata; antennis setaceis, nigris, albo-annu-*

latis. Pedibus rufis, coxis et trochanteribus nigris; gastrocelis medio-cribus. — Long. 10 mill.

Diffère de *P. pedatorius* par ses formes plus épaisses, l'aréole supéro-médiane subcarrée, les spiracules ovales, le thorax entièrement noir et un trait jaune aux orbites externes des yeux.

Hab. Jérusalem (M. Pic.).

64. *Platylabus maurus*, n. sp.

♂ *Oris partibus, genis prope mandibulas, duobus punctis clypei, orbitis oculorum internis, scapo, lineis infra alas, squammulis, scutello et macula coararum anteriorum albis. Antennis et coxis nigris. Pedibus et abdomine rufo, segmentis 5-7 nigris.* — Long. 6 mill.

Corps grêle, aréole supéro-médiane carrée, spiracules ovales-arrondis. Postpétiole rugueux, gastrocèles en sillon transversal.

Hab. Maroc : Tanger (coll. Pic).

65. *Dicaelotus alboscutatus*, n. sp.

♀ *Palpis, mandibulis, clypeo, facie, genis, scapo cum antennis, pedibus totis, postpetiolo et segmentis 2-7 rufis. Orbitis frontis, colli margine, lineis ante et infra alas, squammulis et scutello albo-flavis; stigmate testaceo.*

Métathorax bimaculé de roux, brièvement ou indistinctement bidenté; aréole supéro-médiane en mitre. Postpétiole ponctué. — Long. 5 mill.

Hab. le Liban (M. Pic).

66. *Dicaelotus rufatorius*, n. sp.

♀ *Mandibulis, clypeo, facie, genis prope mandibulas, antennis, orbitis frontis, squammulis, lineis ante et infra alas, parte pleurarum, dentibus metathoracis, postpetiolo et segmentis 2-7 rufis.* — Long. 4 mill.

Antennes courtes. Aréole supéro-médiane en mitre. Stigma et cuisses postérieurs bruns. Postpétiole ponctué.

Varie avec les pieds entièrement roux et par l'absence de lignes rousses sur les pleures; lignes devant les ailes et écailles blanches.

Hab. Tunisie : Ain Draham (M. Pic).

67. *Herpestomus bilineatus*, n. sp.

♀ *Basi mandibularum, annulo antennarum, lineis ante et infra alas, scutelli margine laterali, squammulis, coxis et trochanteribus anterioribus albis. Antennis, duobus punctis orbitarum frontis, lateribus metq-*

thoracis, pedibus partim, segmentis abdominis 1-5 rufis, 6-7 nigris. — Long. 8 mill.

Tête de la largeur du thorax. Clypeus brillant, convexe, arrondi au bord; mandibules à dent inférieure à peine distincte. Antennes assez robustes, atténuées. Aréole supéro-médiane en mitre. Postpétiole aciculé, base du 2^e segment entièrement déprimée.

Hab. Tunisie : Ain-Draham (M. Pic).

68. **Herpestomus annulipes**, n. sp.

♀ *Niger, antennis brunneis. Basi tibiaram, coxis et trochanteribus anterioribus albis.* — Long. 4 mill.

Antennes grêles, 8^e article carré; aréole supéro-médiane en mitre. Postpétiole mat, chagriné; dépression basale du 2^e segment peu distincte.

Hab. Tunisie : Ain Draham (M. Pic).

69. **Diadromus palliditarsis**, n. sp.

♀ *Niger, antennis tricoloribus; pedibus rufis, basi tibiaram et articulis tarsorum albis.* — Long. 5 mill.

Mandibules grêles, à dent inférieure presque nulle. Antennes subfiliformes, plus étroites à la base, 10^e article carré. Hanches postérieures avec une crête très distincte. Aréole supéro-médiane subovale. Postpétiole lisse.

Hab. Suisse : Dissentis (M. Pic).

70. **Diadromus Theresae**, n. sp.

♀ *Antennis rufo-brunneis. Stigmate testaceo, pedibus nigris et rufis. Abdomine nigro, segmentis 2-3 rufis, his saepe nigro-maculatis.* — Long. 5 mill.

Corps grêle, thorax subcylindrique, aréole supéro-médiane semi-circulaire, 5^e article des antennes carré. Postpétiole très convexe, lisse. Pieds assez grêles.

Hab. Alsace (M^{me} Th. Pic).

71. **Phaeogenes acicularius**, n. sp.

♀ *Antennis robustis, nigris, basi rufa. Pedibus nigris, tibiis et tarsis rufis. Abdomine nigro, segmentis 2-3 rufis.* — Long. 5 mill.

Aréole supéro-médiane pentagonale. Hanches postérieures avec une

petite dent verticale, très fine. Postpétiole lisse. Diffère de *Ph. planifrons* par la tête aussi large que le thorax, la dent des hanches, la couleur des pieds et de l'abdomen.

Hab. Suisse : Dissentis (M. Pic).

72. *Stenodon Pici*, n. sp.

♂ *Mandibulis*, *genis*, *clypeo*, *facie*, *orbitis frontis*, *scapo antennarum*, *lineis anté et infra alas et propleurarum*, *squammulis*, *scutelli margine laterali*, *coxis et trochanteribus et basi tibiaryum albis*. *Antennis brunneis*. *Pedibus rufis*; *stigmate nigro*. *Abdominis segmentis 2-7 rufis*, *2-5 nigro-maculatis*. — Long. 5 mill.

Tête plus large que le thorax, face protubérante. Postpétiole ponctué, lisse à l'extrémité; 2^e segment sans dépression basale.

Hab. Tunisie : Ain Drahm (M. Pic).

73. *Ischnus Gaullei*, n. sp.

♀ *Mandibulis*, *facie*, *scapo*, *thorace*, *mesonoto excepto*, *cruribus et tarsis rufis*. *Annulo antennarum*, *macula genarum*, *orbitis frontis*, *duobus punctis verticis*, *squammulis*, *coxis anterioribus*, *trochanteribus et tibiis albis*. *Abdomine nigro*, *segmentis 2-3 margine postica pallida*. — Long. 8 mill.

Tête cubique. Abdomen lisse ainsi que le postpétiole, filiforme, 3^e segment carré.

Hab. La Bourboule (J. de Gaulle).

OBSERVATION. — Dans le « 4^e supplément aux Ichneumonides d'Europe », l'espèce décrite au n^o 56, sous le nom de *Diadromus erubescens*, n'est qu'une variété de *Herpestomus xanthops* Grav. Cette erreur me fournit l'occasion de déclarer que les différences signalées entre les deux genres précités n'ont aucune valeur.

Sur un phénomène tératologique observé chez *Enoplops scapha* Fabr. [HÉMIPT.]

Par Paul CHABANAUD et Maurice ROYER.

Nous signalons à la Société deux exemplaires d'*Enoplops scapha* Fabr. présentant le même cas tératologique, une antenne anormale. Chez l'un d'eux, capturé à Saint-Épain (Indre-et-Loire) [Chaba-

naud], c'est l'antenne gauche qui est anormale. Les premiers articles sont identiques dans les deux antennes. Le second article de l'antenne gauche (anormale) est plus fort et a peine sensiblement plus long que son homologue de droite et présente la même coloration. Le 3^e manque totalement. Le 4^e diffère en ce qu'au lieu d'être cylindrique, rétréci aux deux extrémités, il se trouve allongé, comme étiré, présentant alors un renflement dans sa partie moyenne. La coloration entièrement brunâtre du 4^e art. normal n'existe ici qu'aux 3 derniers quarts. Le quart basal présente la même coloration que le 3^e article de l'antenne normale.

Le second exemplaire, qui fait partie de la collection Royer, provient du bois de Boulogne. Chez cet individu c'est l'antenne gauche qui est monstrueuse. Les anomalies qu'elle présente sont analogues à celles de l'exemplaire précédent, mais plus prononcées.

M. le Dr Puton a bien voulu nous citer pareil cas tératologique chez un exemplaire de sa collection provenant de San-Remo et appartenant à la variété qu'il a décrite sous le nom de *curvidens*. D'après lui ce fait s'est déjà rencontré plusieurs fois chez certains Coreïdes et Lygèides, et, à notre connaissance, n'a point encore été signalé.

M. le Dr Puton nous prévient aussi que Costa a décrit, en 1844 (*Ann. Soc. Ent. Fr.*), sous le nom de *Tritomacera aphanoides*, un genre de Lygeïde basé sur un seul exemplaire femelle, capturé par lui à Palerme, chez lequel les 2 antennes, absolument identiques, ne présentent que 3 articles. N'est-on pas, là encore, en présence d'un cas tératologique?

Bulletin bibliographique.

Abeille (L'), XXX, 1, 1900. — A. CHAMPENOIS : Synopsis des espèces paléarctiques du genre *Clerus* Muller (*Trichodes*) Herbst.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1900, I, 24-25. — H. COUTIÈRE : Note préliminaire sur les Crustacés décapodes provenant de l'expédition antarctique belge.

Academy of Natural Sciences of Philadelphia (Proceedings), 1899, III. — W. J. Fox : Contributions to a Knowledge of the Hymenoptera of Brazil, 7 (suite).

Agricultural Gazette of N. S. Wales (The), mai 1900. — Ants in the Orchard. — A. GALE : Something more about queen Bees. — Fumigating Trees for Pests. — A. GALE : Bee Calendar.

Archives provinciales des Sciences, 1^{er} juin 1900. — Notice nécrologique sur le Prof. A. Milne-Edwards (portrait).

Association française pour l'Avancement des Sciences, Bulletin de l'AFAS, 94, 1900. ☉

Entomological News, XI, 5-6, 1900. — E.-B. WILLIAMSON : Notes on a few Wyoming Dragonflies (Order Odonata), (fig. et pl.). — H.-C. FALL : List of a Small Collection of Coleoptera from Arctic Alaska. — F.-H. FOSTER : Some Hints for rearing Larvae (fig.). — C.-F. BAKER : Notes on *Clastoptera* (*Cercopidae*). — E.-A. SMYTH : *Anthocharis genutia* Fabr. — A.-B. WOLCOTT : Coleoptera of Central Illinois, III. — W.-G. JOHNSON : The new Peach Mite. — G.-M. DODGE : *Catocala Tilania* n. sp. — E.-A. SMYTH : Larval Stage of *Protoparce rustica* Fabr. (pl.). — W.-A. SNOW and H. MILLS : The Destructive *Diplosis* of the Monterey Pine (pl.). — E.-J. OSLAR : Some Notes on the Habits and Capture of *Aegiale Streckeri* Skin. — G.-A. EHRLMAN : The Capture of *Platynus caudatus* Lec. and *P. larvalis* in Western Pennsylvania. — D.-W. COQUILLETT : New *Scenopinidae* from the U. States. — H. OSBORN : A neglected *Platymetopus*. — H. SKINNER and A. SATTERTHWAIT : How a little Tineid Larva lives on what is left of a big *Cecropia* Caterpillar. — Notes diverses.

Entomologische Nachrichten, XXVI, 12, 1900. — J.-D. ALFKEN : Drei neue *Anthrena*-Arten aus Japan. — H. FRIESE : Neue Bienenarten Süd-America's. — J.-D. ALFKEN : *Bombus Sorbensis* F., Form *proteus* Gerst. und seine Farben-Varietäten. — F. THURAU : Ein Fall von Copula inter mares zwischen *Bombyx mori* L. und *Ocneria dispar* L. — J.-D. ALFKEN : *Stilbula* Kunthill, eine neue javanische Eucharide (Chalcidoide).

Entomologist (The), juillet 1900. — Collective Enquiry as to progressive Melanism in Moths. — G.-V. HUDSON : Entomology in N. Zealand. — A.-G. BUTLER : On a small Collection of Insects, chiefly Lepidoptera, from Nicaragua. — H.-F. DE VISMES KANE : A Catalogue of the Lepidoptera of Ireland. — Mr. DONOVAN's Captures in Co. Cork. — W. HARCOURT-BATH : *Lycaena pheretes* and its Allies in the Sikhim Himalayas. — Notes diverses.

Entomologist's monthly Magazine, juillet 1900. — E.-A. ELLIOTT : Notes on *Pezomachus*. — R. MAC-LACHLAN : *Plectrocnemia brevis* M. Lachl., an Addition to the British *Trichoptera*. — E.-M. BLOOMFIELD : *Odonata* of East Sussex. — L. WALSINGHAM : New Corsican

and French *Micro-Lepidoptera*. — T.-D.-A. COCKERELL : Note on *Chrysomphalus dictyospermi*, a Scale-Insect from Cannes. — Notes diverses. — F.-D. MORICE : An Excursion to Egypt, Palestine, Asia Minor, etc., in search of *Aculeate Hymenoptera*.

Entomologist's Record and Journal of variation (The), juillet 1900. — C.-N. BURROWS : *Phorodesma smaragdaria* Fabr. (pl.). — The food-plants of *Phorodesma smaragdaria* Fabr. — J.-K. DONISTHORPE : A few Notes on Myrmecophilous Coleoptera. — T.-A. CHAPMAN : The Relationship between the Larval and Imaginal Legs of Lepidoptera (pl.). — L.-B. PROUT : The synonymy of some of the Emerald Moths. — J.-W. TUTT : Migration and Dispersal of Insects : Lepidoptera. — C. MORLEY : On the Emergence of *Listrodromus quinqueguttatus* Grav., with a description of its pupa (fig.).

Feuille des Jeunes Naturalistes (La), 1^{er} juillet 1900. — C. HOULBERT : Faune analytique illustrée des Orthoptères de France (pl.).

Frelon (Le), VIII, 6, 1900 (2 exempl.). — J. DESBROCHERS DES LOGES : Faunule des Coléoptères de la France et de la Corse.

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 15 juin 1900. — E.-H. RÜBSAAMEN : Ueber Zoocecidien von der Balkan-Halbinsel. — PR.-F. LUDWIG : Pflanzen mit Fensterblumen. — O. SCHULTZ : Filarien in paläarktischen Lepidopteren. — Petites communications originales.

Naturaliste (Le), 15 juin 1900. — H. COUPIN : Les comédiens de la nature. — AUSTAUT : Notice sur deux variétés inédites de *Parnassius Apollo*. — CAP. XAMBEU : Mœurs et métamorphoses du *Dermestes undulatus* Brahm.

New York Academy of Sciences (Memoirs), II, 1, 1899. ⊙

Nova Scotian Institute of science (Proceedings and Transactions), X, 1, 1898-99. ⊙

R. Accademia dei Lincei (Atti), 1900, I, 11. ⊙

Rivista Chilena de Historia natural, avril 1900. — F. CAMPOS : Observaciones entomológicas. — E. SIMON : Liste des Arachnides recueillis par M. C. Porter en 1898-1899 et descriptions d'espèces nouvelles.

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, juin 1900. ⊙

Societas Entomologica, 15 juin 1900. — P. BACHMETJEW : Das vitale Temperaturminimum bei Insekten abhängig von der Zeit. —

B. SLEVOGT : Einige Bemerkungen zu den Tafel von Dr. Hoffmann's : Die Gross-Schmetterlinge Europa's.

Société Impériale des Naturalistes de Moscou (Bulletin), 1898, II-IV ; 1899, I. — Travaux en langue russe sur les Microlépidoptères Tortricina, sur les Acridiens, les Coléoptères et les Hydrachnides (pl.).

Union apicole (L'), juin 1900. — A. DELAIGUES : Les Abeilles et les Fleurs. — Le *Phylloxera*.

Zoological Society of London (Proceedings), 1900, I. — DIVERS : On a Collection of Insects and Arachnids made in 1895 and 1897, by Mr. C. V. A. Peel, in Somaliland, with Descriptions of new species (pl.). — L.-A. BORRADAILE : On a small Collection of Decapod Crustaceans from Freshwaters in North Borneo. — A. G. BUTLER : A Revision of the Butterflies of the Genus *Zizera* represented in the Collection of the British Museum (pl.).

DUPONT (L.) : Les Zygènes de la Normandie (*Bull. Soc. Et. Sc. nat. Elbeuf*), 1900, 30 p.*

PACKARD (A.-S.) : View of the Carboniferous Fauna of the Narragansett Basin (*Proc. Am. Ac. Arts Sc.*), 1900, 8 p., fig.*

PHIPPS (C.-J.) : Voyage au Pôle boréal fait en 1773 par ordre du Roi d'Angleterre (traduction). Paris, 1775, 259 p., pl. et cartes. — Don de M. L. Bedel.

VAYSSIÈRE (A.) : Étude sur le *Chionaspis evonymi*, espèce de Cochenille qui ravage les Fusains dans le midi de la France. (*S. l. n. d.*), 18 p., 1 pl. — Don de M. L. Bedel.

VIURA Y CARRERAS (J.) : Experiencias acerca las propiedades vesicantes de las *Cerocomas*, *Myiabrís* y *Aenas*. (*Rev. Cienc. méd.*) ; Barcelone, 1884, 8 p. — Don de M. L. Bedel.

A. L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 11 juillet 1900.

Présidence de M. A. GIARD.

MM. Ern. Olivier, de Moulins, et Maurice Pic, de Digoin, assistent à la séance.

Correspondance. — MM. le Dr C. Della Torre et l'abbé R. de Sinéty remercient la Société de leur admission.

Démission. — M. Bouant, membre assistant, a adressé au Président sa démission.

Admissions. — M. le Dr Manuel J. Rivera, professeur de Sciences naturelles à l'École normale de Chillan (Chili). *Entomologie du Chili.*

— M. Louis Thouvenin, capitaine au 2^e zouaves, Oran (Algérie). *Coléoptères.*

— M. Moser, Hauptmann, 60, Bülow-Str., Berlin W. (Allemagne). *Coléoptères, pr. Cétonides.*

Présentation. — M. Walter Wilson Froggatt, Government Entomologist, Department of Agriculture, Sydney, N. S. W. [*Entomologie appliquée, Hémiptères*], présenté par M. A. Giard. — Commissaires-rapporteurs MM. E.-L. Bouvier et P. Marchal.

Congrès scientifique. — La Société désigne M. Ern. Olivier, de Moulins, directeur de la *Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France*, pour la représenter au 29^e Congrès de l'« Association française pour l'Avancement des Sciences » qui aura lieu à Paris du 2 au 9 août 1900.

Changements d'adresse. — M. de Lumeau, chef de bataillon au 78^e régiment d'infanterie, Limoges (H^{te}-Vienne).

— M. le Dr L. Huet, 9, rue Grusse, Caen (Calvados).

Captures et observations biologiques. — M. L. Bedel signale une nouvelle station du *Cryptocephalus bidens* Thoms. (? *sericeus* L.), en Seine-et-Oise; cette localité est située sur la rive droite de la Seine à quelques centaines de mètres en aval du pont de Poissy; le *Cryptocephalus* s'y trouve, sur le *Centaurea jacea*, dès la fin de juin et en juillet.

— M. Maurice Pic présente à la Société quelques espèces rares de Coléoptères qu'il a recueillies en Saône-et-Loire pendant le mois de juin dernier :

Ancyrophorus flexuosus Muls. Rey et *Thinobius delicatulus* Kr., Digoin; *Laemophloeus castaneus* Er., Beaubery; *Elater ruficeps* Muls. Guillb. et *Lymexilon navale* L., les Guerreaux; *Hylophilus nigrinus* Germ. et var. *alpestris* Pic, Digoin; *Dircaea rufipes* Gylh. et *Clytus lama* Muls., Beaubery.

— M. R. de la Perraudière signale un cas de cannibalisme qu'il a observé chez un Malacoderme, le 5 juillet dernier; en battant de vieux Lierres pour récolter des *Hypebaeus albifrons* Ol., il vit un *Malachius bipustulatus* L. ♀, tombé dans son parapluie, se précipiter sur un *Hypebaeus* ♂ et lui dévorer en moins de deux minutes l'abdomen et la majeure partie des élytres.

M. de la Perraudière fait passer sous les yeux de la Société, comme pièces à conviction, le bourreau et ce qui reste de la victime.

Communications

Sur le vaisseau dorsal des larves des Tachinaires [DIPT.]

Par J. PANTEL.

Les caractères anatomiques attribués récemment par Wandolleck ⁽¹⁾ au vaisseau dorsal d'une larve de Muscide acalyptrée diffèrent assez de ceux que nous avons décrits chez celle de *Thruxion*. Sans nous arrêter ici, les limites de cette note ne le permettent pas, à l'interprétation nouvelle du sinus situé en avant de la gouttière sus-oesophagienne et circonscrit par la charpente du pharynx, que ce savant

(1) Zur Anatomie der cycloraphen Dipterenlarven : Anatomie der Larve von *Platycephala planifrons* (F.) [Abhandl. u. Ber. des Königl. Zool. Museums zu Dresden, Festschrift 1899, n° 7].

considère comme une partie constitutive de l'organe propulseur, rappelons quelques autres points de sa description :

1° L'*anneau* comprend un ensemble assez hétérogène, savoir : une partie supérieure constituée par un épaississement de la *media*, deux épais septums latéraux en rapport avec des trachées, une partie inférieure bulbeuse, qui se prolonge en se bifurquant et envoie ses branches dans les hémisphères.

2° Dans la région des petites péricardiales il n'y a ni ostioles ni valvules. Il n'y a pas non plus de muscles annexes striés.

3° Dans la partie postérieure élargie (ventricule des auteurs) il existe une paire unique de valvules, ce qui implique une seule paire d'ostioles.

Pour notre part nous n'avons pu étudier jusqu'ici que des larves de Muscides calyptérées, appartenant toutes au groupe des *Tachininae* et parasites de diverses chenilles des genres *Vanessa*, *Bombyx*, *Porthesia*, *Acronycta*, etc. Aussi devons-nous nous abstenir de trop généraliser nos résultats. Nous ferons seulement remarquer que ces résultats sont confirmatifs, sauf les points signalés ci-après, de ceux que nous avait fournis l'étude du *Thrixion*. L'appareil circulatoire est peut-être de tous les appareils de la vie organique celui qui nous a montré le moins de variations.

L'*anneau aortique* est une formation extérieure à la paroi cardiaque, bien que soudée sur elle; il entoure complètement cette paroi en se fermant sur lui-même et l'assujettit d'une part au système trachéen, grâce à une branche communicante qui le traverse au bord antérieur, d'autre part au cerveau, au moyen de brides musculaires striées. En même temps qu'il soutient le vaisseau, il sert comme d'intermédiaire pour son innervation, et à ce titre il reçoit à sa partie postérieure, riche en éléments nerveux, les deux nerfs courts mais robustes du *système sympathique pair* (nous faisons ici abstraction des rapports avec le *système impair*, celui-ci étant principalement affecté à l'appareil digestif). Ces nerfs portent sur leur trajet, entre le cerveau et l'anneau, un noyau volumineux. Nous les avons vus chez le *Thrixion*, mais seulement sur des coupes où ils se superposaient partiellement à des fibres musculaires et nous avons été induit par leur aspect à les considérer comme des ligaments musculaires du type viscéral ⁽¹⁾. De nouvelles observations et surtout des dissections de larves de plus forte taille nous permettent de rectifier cette interprétation.

(1) *La Cellule*, t. XV, pl. IV, fig. 68, *lm.*

Le tronçon du vaisseau dorsal qui correspond aux petites péricardiales porte des systèmes de valvules rudimentaires impliquant la présence d'ostioles au moins virtuels, très régulièrement espacés et comprenant entre eux le même nombre de noyaux pariétaux que les ostioles et les valvules actifs du ventricule. Nous devons mentionner en outre, à titre d'annexe, les *petites ailes*, muscles striés, remarquables cytologiquement en ce qu'ils se présentent chez les espèces étudiées par nous comme des cellules pluripolaires à bras très divergents, striées perpendiculairement à leurs axes respectifs.

Le ventricule nous a toujours présenté 3 paires d'ostioles et de valvules.

À l'égard de la structure histologique, nous ne pouvons que confirmer ce que nous en avons dit d'après la larve du *Thrixion*, sauf cependant pour la situation des noyaux dans l'aorte, lesquels sont normalement latéraux, comme dans les deux tronçons postérieurs. La rotation autour de l'axe longitudinal, invoquée par nous pour rendre compte des images contraires que nous avons décrites, existait assurément dans l'exemplaire que nous avons étudié, mais elle était anormale et vicieuse, comme nous nous en sommes assuré depuis sur d'autres pièces et sur le vivant.

Nous ne parvenons pas à distinguer dans la paroi cardiaque les 4 couches classiques : *intima*, *muscularis*, *media*, *adventitia*. Elle est essentiellement formée d'un seul élément anatomique, une cellule musculaire aplatie en lame, à protoplasme incomplètement différencié en fibrilles contractiles dissociées.

Sur l'existence probable de *Rhopalomyia Giralдии* Kieff. et Trott. dans le Sud oranais [DIPT.]

Par Alfred GIARD.

Il y a quelques mois mon ami très regretté, F. Debray, professeur de Botanique à l'École supérieure des Sciences d'Alger, m'envoya des tiges d'*Artemisia herba alba* Wild couvertes de jolies galles tout à fait identiques à celles que nos collègues J.-J. Kieffer et A. Trotter ont décrites et figurées dans le n° 11 du *Bulletin* (p. 233 et 234) comme appartenant à une espèce nouvelle de Cécidomyie (*Rhopalomyia Giralдии* Kieff. et Trott.), parasite d'une *Artemisia* sp. de la Chine.

La seule différence que je puisse trouver est que le feutrage épais de 2 mill. environ qui recouvre les galles africaines est d'un *blanc de neige* et non *gris* comme dans les galles chinoises.

Les galls que m'a transmises F. Debray avaient été recueillies à Hassi Souina, vallée de Meguiden, région N. E. du Gourara dans le Sahara oranais.

Tous les échantillons que je possède ne renferment que des débris de nymphes écloses, je ne puis donc affirmer d'une façon absolue l'identité de l'insecte parfait avec *Rhopalomyia Giralddii*. Il s'agit en tout cas d'une forme bien voisine et, en raison de l'éloignement des lieux d'origine, le fait m'a paru avoir quelque intérêt pour la géographie zoologique encore si peu connue des Cécidomyides.

Sur un mode particulier de progression souterraine chez quelques larves d'insectes

Par J. BOURGEOIS.

Un des chapitres les plus captivants du nouveau livre de M. J.-H. Fabre (1) est sans contredit celui que notre éminent collègue a consacré à l'éclosion du Dectique à front blanc (*Decticus albifrons* F.), orthoptère assez répandu dans le Languedoc et en Provence. La femelle de ce Locustien introduit à l'automne ses œufs dans la terre, au moyen de son robuste oviscapte en forme de sabre, comme ferait un semeur de graines avec son plantoir. Au mois de juin de l'année suivante, les jeunes Dectiques commencent à se montrer. A travers les parois de quelques tubes de verre dans chacun desquels il avait introduit une pincée d'œufs et tassé, par-dessus, une couche de sable très fin et humecté, M. Fabre a pu se rendre compte des conditions dans lesquelles s'opère l'éclosion et des procédés mis en œuvre par les larves de Dectiques pour gagner la surface du sol. Il a vu le nouveau-né, engainé dans un fourreau, faire saillir de sa nuque une sorte d'ampoule membraneuse, se gonflant et se dégonflant tour à tour. C'est à l'aide de cette *hernie occipitale* que le jeune insecte chemine pour arriver au jour. « Dégonflé, l'avant refoule un peu le sable humide, s'y insinue en creusant une fossette; puis, ballonné, il devient bouton, qui se moule et prend appui dans la dépression obtenue. Alors l'arrière se contracte, et c'est un pas de fait. Pour chaque coup de la vessie locomotrice, la voie s'allonge de près d'un millimètre » (p. 174).

Ce mode de locomotion, si extraordinaire qu'il paraisse, n'est pas unique dans la série entomologique, comme semble le croire M. Fabre. Nous le retrouvons, en effet, chez les larves d'un Coléoptère, le *Cebrio*

(1) J.-H. FABRE, *Souvenirs entomologiques* (sixième série). Études sur l'Instinct et les Mœurs des Insectes. Paris, Delagrave, 1900.

gigas, avec cette différence, toutefois, qu'ici ce n'est pas une hernie occipitale, mais une saillie de la gorge, une espèce de *goître* rétractile, qui intervient pour aider la larve dans sa marche souterraine. Le goître du Cébriion, d'ailleurs, fonctionne absolument comme l'ampoule du Dectique; il se dilate et se contracte alternativement comme elle, et ces gonflements et dégonflements successifs sont accompagnés de l'émission d'un liquide destiné à ramollir le milieu ambiant.

C'est à Lefébure de Cérisy que l'on doit la première constatation de ce fait intéressant; Guérin-Ménéville l'a reproduit en le développant dans la *Revue et Magasin de Zoologie*, 1853, p. 214, pl. 7, et il a été relaté ensuite par Chapuis et Candèze (*Mémoires de la Soc. des Sc. de Liège*, VIII, 1853, p. 488) et par Mulsant et Rey (*Fossipèdes*, 1865, p. 3).

N'est-il pas remarquable de voir la nature se servir du même procédé pour venir en aide à l'insuffisance des moyens ordinaires de locomotion chez les larves de deux insectes aussi éloignés l'un de l'autre que le Dectique et le Cébriion? La larve du *Cebrio*, destinée à cheminer dans la terre à la recherche des menues racines dont elle se nourrit, n'a que des pattes très courtes, inaptés, par conséquent, à une progression souterraine, et le jeune Dectique, avec ses antennes minces et déliées, ses pattes postérieures organisées pour le saut et nullement pour le travail du mineur, emmaillotté d'ailleurs dans une gaine protectrice, ne saurait, lui non plus, à l'aide de ses seuls organes ambulatoires, se frayer un passage dans le sol. A ces deux larves, si différentes de forme et de structure, il a été départi un organe de progression identique dans son principe et dans son mode d'action, et ne différant de l'une à l'autre que par la position qu'il occupe sur le corps.

Que de reconnaissance la science ne doit-elle pas aux observateurs sagaces qui savent si magistralement mettre de tels faits en lumière et combien la lecture de livres comme ceux de M. Fabre n'est-elle pas faite pour élever l'esprit et le reposer de l'aride nomenclature!

**Description d'un Microlépidoptère nouveau,
nuisible au Vanillier et provenant de l'île de la Réunion**

Par l'abbé J. de JOANNIS.

M. E. Bordage, directeur du Muséum d'Histoire naturelle de l'île de la Réunion, m'a communiqué quelques exemplaires d'un Micro-

lépidoptère dont la chenille nuit assez gravement au Vanillier. Cet insecte appartient à la famille des *Tortricidae* et au genre *Conchylis*; en voici la description :

Conchylis vanillana, n. sp. — 10 mill. — Ailes étroites; supérieures triangulaires, côte à peine arquée vers l'apex, bord interne un peu oblique, très légèrement convexe; fond d'une teinte jaune ocracé mêlé de brun ocracé. Après deux petites taches costales près de la base, on voit, au premier tiers de la côte, une petite tache brune triangulaire délimitant, intérieurement, l'espace basal qui, sur le bord interne est limité, extérieurement, par une tache plus grande, bleuâtre. Le disque est traversé par une bande, droite, allant en diminuant de largeur de la côte au bord interne; cette bande est formée comme il suit : du milieu de la côte part une ligne noire courbe, arquée vers l'extérieur, ne descendant pas plus bas que le milieu de l'aile et au-dessous de laquelle la bande discale est brun ocracé; un peu au delà du milieu, sur la côte, une tache triangulaire noire; l'espace compris entre cette tache et la ligne arquée est mêlé d'écailles bleuâtres. La bande transversale ainsi formée est liserée de chaque côté par une ligne claire. Au delà du liséré extérieur, au bord interne, une petite tache noirâtre suivie d'une tache brune plus grande. Sur la côte, avant l'apex, deux traits costaux; l'apex lui-même est brun. Dans l'espace terminal, appuyée contre le milieu du bord interne, une tache brune quadrangulaire, remontant un peu obliquement, entourée d'une bordure claire un peu rosée et brillante, qui comprend tout l'angle interne et est limitée extérieurement elle-même par une fine ligne noire.

Ailes inférieures à apex assez aigu; gris noirâtre, plus foncé à l'apex, chez le ♂, noirâtre plus foncé uniforme chez la ♀.

Tête, thorax et antennes jaune ocracé foncé; abdomen noirâtre. Pattes ocracées, tarses annelés de noir. Aux ailes supérieures toutes les nervures partent de la cellule; aux inférieures 3 et 4 longuement tigées. — 5 ♂, 1 ♀.

La chenille est noire, très vive et s'attaque à la fleur du Vanillier.

**De la place à assigner, parmi les Longicornes,
au genre *Tetropiopsis* Chob. [COL.]**

Par le D^r A. CHABAUT.

Une note de M. Pic, beaucoup plus malveillante que juste, parue au commencement de l'année dans le bulletin de notre Société (*Bull. Soc.*

ent. Fr., 1900, p. 30-31) me reproche de n'avoir pas assigné au genre *Tetropiopsis* une place suffisamment précise parmi les Longicornes.

Cette critique a été évidemment dictée par le refus que j'ai opposé à cet entomologiste (?) de lui communiquer mon insecte, ayant pour habitude de réserver les matériaux de mes chasses à ceux de mes collègues capables de produire des travaux sérieux et intelligibles.

Je me garderai bien de répondre aux attaques personnelles contenues dans la note de M. Pic. Nul ne connaît mieux que moi mes imperfections de descripteur. Mais il est au moins étrange de me les voir reprocher par cet auteur (?) dont chaque phrase et chaque mot pourraient être critiqués, sans parler de ses idées... originales (1).

Je préfère rester sur le terrain scientifique.

En plaçant le genre *Tetropiopsis* à côté des genres *Tetropium* Kirby et *Cyamophthalmus* Kraatz, il me semblait avoir suffisamment indiqué que je le considérais comme appartenant au groupe des *Cerambycini* de la sous-famille des *Cerambycidae*. Faudrait-il dire aussi à quels caractères on reconnaîtra que c'est bien un Longicorne?

Chez ce genre nouveau, les hanches antérieures sont faiblement coniques, la tête est assez fortement rétrécie derrière les yeux, ceux-ci sont profondément échancrés au niveau de l'insertion antennaire, enfin les mandibules n'ont point de membrane interne. Ces caractères peuvent faire hésiter le classificateur entre les *Lepturini* et les *Cerambycini*. Cependant le premier et les deux derniers de ces caractères obligent à opter pour les *Cerambycini*. D'ailleurs la forme, l'aspect sont ceux d'un *Tetropium* ou d'un *Cyamophthalmus*. Comme eux, il a la tête rétrécie derrière les yeux, comme eux les yeux fortement échancrés, comme eux encore les hanches antérieures et intermédiaires rapprochées.

Cette contiguïté des deux premières paires de hanches, la subconicité des hanches de devant, le rétrécissement de la tête derrière les yeux, la structure lamellaire de la majeure partie des articles antennaires, la ponctuation des élytres peuvent évidemment faire penser à assigner au genre *Tetropiopsis* une place dans les *Lepturini*.

En réalité, il s'agit d'un genre aberrant dont la position systéma-

(1) Ses « Quelques mots sur le genre *Tetropiopsis* Chob. » fourmillent, par exemple, d'erreurs, d'inexactitudes, de phrases inintelligibles, comme d'ailleurs la grande majorité de ses trop nombreuses publications. Page 30, note (1), ligne 2 : (*Rev. d'Ent.*, 1883), c'est 1884 qu'il faut lire. Page 31, ligne 3, *se distinguera*, quand j'ai écrit *se distingue*. Même page, note (1), que dire de cette phrase : ces antennes « plus longues » ne caractériseraient-elles pas le ♂ d'une espèce à antennes plus courtes ?

tique est certainement difficile à déterminer. Je pense cependant avoir été dans le vrai en le rangeant dans les *Cerambycini* près des *Tetropium* et des *Cyamophthalmus*.


D'ailleurs, soumis à M. L. Bedel, un maître dont la compétence est autre, certes, que celle de M. Pic, l'insecte m'était revenu avec l'étiquette : « *Cyamophthalmus* sp. ? ». C'est dire combien le genre *Tetropiopsis* s'en rapproche.

Description d'un Longicorne nouveau, du Nord de l'Algérie [COL.]

Par le Dr A. CHABAUT.

Leptura (*Leptura* s. str.) **suberis** n. sp.

♂ Entièrement noir, sauf les élytres qui sont testacés mais tachés de noir autour de l'écusson et à l'apex, cette couleur remontant un peu le long du bord externe; allongé, avec les élytres un peu raccourcis; recouvert partout d'une pubescence grise, cette pubescence dressée sur le corps, mi-dressée sur les élytres où elle devient jaunâtre. Tête, vue de face, à peine plus longue que large, rugueusement ponctuée, avec un sillon longitudinal, faible, entre les yeux, transversal, profond, au-devant de l'insertion antennaire. Antennes grêles, allongées, 3^e article plus long que le 4^e, articles 5 à 11 plus longs que le 3^e, à peu près égaux entre eux. Pronotum plus long que large, étroit, les côtés ayant une saillie développée un peu avant le milieu, sa plus grande largeur à ce niveau; finement et densément ponctué; irrégulier, avec une ligne lisse, longitudinale, sur sa seconde moitié. Écusson allongé, arrondi au bout. Élytres larges aux épaules, puis régulièrement rétrécis jusqu'au dernier tiers, ensuite déhiscentes, atténués, finalement arrondis à l'apex; rebordés sur tout le bord externe, à l'extrémité et sur le bord interne à partir seulement du milieu; à ponctuation forte, lâche à la base, fine, serrée et rugueuse au bout. Dessous moins pubescent que le dessus. Abdomen n'ayant de visible en dessus que le dernier et la moitié de l'avant-dernier segments. Pattes normalement développées. Premier article des tarses postérieurs aussi long que le reste du tarse. — Long. 10 mill.



Leptura suberis, n. sp.

J'ai pris un seul exemplaire de cette espèce dans la forêt de l'Edough près Bône, en battant un Chêne-Liège (*Quercus suber* L.), vers le milieu de juin 1900.

L. suberis est évidemment bien voisin des *L. sicula* Ganglb. et *kabyliana* Pic. Elle s'en distingue cependant bien, différant particulièrement de cette dernière espèce par ses élytres noirs seulement à l'apex et autour de l'écusson, par sa tête plus longue que large, et surtout par son pronotum à côtés tuberculés, sans dépression médiane profonde, ayant sa plus grande largeur non à la base, mais au niveau de la saillie latérale.

Description d'un nouveau genre d'Elmides, de Tunisie [COL.]

Par Maurice Pic.

Le Dr Normand, dans la Medjerda, à Souk-el-Arba, et le capitaine de Vauloger, au Djebel Mehila, ont recueilli récemment en Tunisie une très jolie espèce d'*Elmini*, distincte entre toutes par ses côtes dorsales densément revêtues de pubescence jaunâtre, et qui correspond à la description du *Limnius villosocostatus* ⁽¹⁾ Reiche (*Ann. Fr.*, 1879, p. 238), décrit d'Oran. Cette espèce n'ayant pas de carène latérale au prothorax ne peut pas rentrer dans le genre *Limnius* Müll. qui en possède une; par suite de l'absence de cette carène prothoracique on pourrait la classer dans le genre *Riolus* Muls., mais la forme du prothorax est tout autre; il est plus long, nettement moins large que les élytres et, pour ce motif, je crois plus juste de la classer dans une division spéciale et nouvelle que j'ai le plaisir de dédier au Dr Normand. Le tableau suivant facilitera la séparation du nouveau genre en le caractérisant mieux que ne pourrait le faire une simple diagnose.

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Prothorax (ordinairement plus large que long) non canaliculé au milieu. Méta sternum bordé d'une ligne en relief. Élytres trapus ou peu allongés..... | 2. |
| 1' Prothorax (généralement aussi long que large) canaliculé au milieu. Méta sternum sans ligne relevée sur les côtés. Élytres allongés..... | <i>Stenelmis</i> Duf. |

(1) Sous le nom de var. *robustior*, je sépare les exemplaires qui offrent une forme plus robuste et présentent une coloration générale plus ou moins rousâtre sur les pattes. — Long. 2 mill.

2. Disque du prothorax non marqué de longs sillons longitudinaux et sans carènes latérales (en dedans du rebord)..... 3.
- 2' Disque du prothorax marqué de longs sillons longitudinaux accompagnés en dehors d'une ligne plus ou moins saillante.
Lareynia Duv., *Elmis* Muls. Rey (*Latelmis* Reitt.),
Esolus Muls. Rey, *Dupophilus* Muls. Rey, *Limnius* Müll.
3. Écusson très sensiblement plus long que large. Prothorax sans sillon court ni tubercules apparents près de la base. 4.
- 3' Écusson large. Prothorax long, peu nettement et brièvement sillonné vers la base, quelquefois avec une sorte de tubercule apparent..... *Microdes* Motsch.
4. Prothorax relativement court et plus ou moins large, très peu ou non sensiblement plus étroit à sa base que les élytres; pas de ligne pileuse longitudinale sur le milieu de son disque..... *Riolus* Muls. Rey.
- 4' Prothorax (à côtés presque droits) relativement long et peu large, sensiblement plus étroit à sa base que les élytres; une ligne pileuse longitudinale nette (parfois élevée) sur le milieu de son disque..... **Normandia**, n. g.

Le genre *Lydyella* Reitt. (*Wien. Ent. Zeit.*, 1899, p. 283 et Taf. IV, fig. 5), d'Espagne, m'est inconnu en nature, il offre un prothorax très long, sensiblement plus étroit que les élytres, mais impressionné sur le milieu de son disque.

Note sur l'appareil respiratoire trachéen des Aranéides

Par Ed. LAMY.

Bertkau, le seul auteur qui ait étudié d'une manière générale l'anatomie de l'appareil trachéen chez les Aranéides ⁽¹⁾, lui a trouvé une grande diversité de formes. Il a décrit : deux troncs principaux avec bouquets de tubules chez *Dysdera*, *Segestria*, *Oonops*, *Argyroneta*, *Dictyna*, *Hahnia*, et chez les Attides; deux troncs avec ramifications arborescentes chez *Anyphaena* et *Uloborus*; quatre tubes ramifiés chez

(1) BERTKAU : Ueber die Respirationsorgane der Araneen. *Arch. f. Naturgesch.*, 1872, p. 208.

Id. — Versuch einer natürlichen Anordnung der Spinnen, id., 1878, p. 351.

les Thomisides ; quatre tubes simples sans ramification chez la plupart des Araignées, Erésides, Drassides, Théridiides, Argiopides, Clubionides Agélénides, Lycosides, etc.

J'ai trouvé ⁽¹⁾ aussi des trachées arborescentes chez *Miagrammopsis*, *Prodidomus*, *Zodarion* et quatre tubes simples chez *Dinopsis*, *Psechrus*, *Zoropsis*, *Stegodyphus*, *Leptoneta*, *Storena*, *Hersilia*, *Uroctea*.

Comme chez les Dysdérides, chacun des deux stigmates trachéens, placés très haut sur l'abdomen, émet, outre le grand tronc principal céphalothoracique, un petit tronc abdominal, Bertkau admet que chez la plupart des Araignées, où le stigmate trachéen impair résulte de la fusion de deux stigmates primitifs avec déplacement vers les filières, les quatre tubes trachéens correspondent, les deux externes aux troncs abdominaux des Dysdérides, et les deux internes aux troncs céphalothoraciques. Donc, pour Bertkau, tout l'appareil trachéen étant d'ailleurs homologue d'une deuxième paire de poumons, les quatre tubes trachéens de la majorité des Aranéides sont homologues entre eux.

Cependant, comme il le remarque avec raison, habituellement les deux tubes internes sont plus larges et plus courts, les deux externes étant plus étroits et deux ou trois fois plus longs. De plus, chez les *Epeira* et surtout les *Zilla*, les courts tubes médians s'élargissent en forme de feuilles dont le bord antérieur laisse voir trois ou quatre petites saillies, indices d'une ramification. J'ai d'ailleurs retrouvé cette disposition bien plus accentuée chez *Oecobius* où les tubes internes sont nettement ramifiés à leur extrémité. Même chez les Thomisides où les quatre tubes sont ramifiés, Bertkau note que les deux latéraux sont plus faibles que les médians. Enfin il fait une famille spéciale, les Micryphantides, pour les genres *Erigone*, *Gonatium*, etc., où la chambre poststigmatique se divise en deux tubes externes grêles non ramifiés et deux troncs internes, larges et courts, émettant des tubules.

Il existe d'autre part une série de formes où l'appareil trachéen est en partie rudimentaire. Chez *Scytodes*, Bertkau a observé que, les deux troncs externes étant bien développés, les deux médians sont avortés et fusionnés en une courte apophyse de la chambre poststigmatique. Dans un genre voisin, *Loxosceles*, j'ai retrouvé cette même

(1) Les Araignées qui m'étaient nécessaires pour ces observations ont été mises à ma disposition avec une extrême obligeance par M. Eug. Simon ; je le prie d'agréer tous mes remerciements.

apophyse, mais plus développée, et les troncs externes sont ramifiés ⁽¹⁾.

Chez *Filistata* l'appareil trachéen a été figuré par Geo. Marx ⁽²⁾, mais inexactement. Au lieu des deux stigmates indiqués par cet auteur, j'ai observé, au milieu du corps, une grande fente conduisant dans un atrium d'où partent deux tubes latéraux simples (sans fil spiral), difficiles à suivre, et deux apophyses médianes, identiques d'aspect à celle de *Loxosceles*.

Chez *Palpimanus* et *Otiothops*, de même, j'ai trouvé deux apophyses médianes et deux tubes externes, simples chez *Palpimanus*, ramifiés chez *Otiothops*.

Enfin, à côté du genre *Pholcus*, où il n'y a ni trachées ni stigmate trachéen, j'ai vu, chez *Holocnemus*, à un pli transverse du tégument abdominal ⁽³⁾ correspondre seulement deux apophyses médianes.

Quand on observe ces appareils trachéens rudimentaires, surtout celui des *Palpimanides*, il est impossible de ne pas se rappeler une opinion de Purcell ⁽⁴⁾. D'après cet auteur, chez les *Dysdérides* les trachées à bouquets de tubules seraient l'homologue d'une deuxième paire de poumons ⁽⁵⁾; chez les *Drassides*, *Epeirides*, *Agélénides*, *Lycosides*, etc., sur les quatre tubes trachéens simples, les deux latéraux seraient également l'homologue d'une deuxième paire de poumons, tandis que les deux médians seraient l'homologue des entapophyses (ou tendons musculaires ectodermiques) de la deuxième paire d'appendices abdominaux; et enfin chez les *Attides* ces entapophyses se seraient étirées en longs tubes formant les deux gros troncs ramifiés et constitueraient ainsi tout l'appareil trachéen, pendant que les trachées homologues des poumons ne seraient plus représentées que par des rudiments latéraux.

Un élément nouveau de discussion, en faveur de cette opinion d'une distinction à faire entre les quatre tubes constituant l'appareil trachéen de la majorité des *Aranéides*, est apporté par les faits dont je viens de

(1) Dans un genre également voisin, *Diguetia*, je n'ai pu trouver trace de trachées.

(2) E. SIMON : *Hist. Nat. des Araignées*, 2^e éd., t. I, p. 257.

(3) E. SIMON : *loc. cit.*, p. 459.

(4) PURCELL : Note on the Development of the Lungs, Entapophyses, Tracheae and Genital Ducts in Spiders. *Zool. Anz.*, 1895, p. 396.

(5) Chez *Nops* et *Caponia*, d'après Bertkau, la première paire de poumons est elle-même remplacée par des trachées à bouquets de tubules (E. Simon, *loc. cit.*, p. 326).

parler dans cette note, surtout par ceux concernant les appareils trachéens rudimentaires.

Note sur *Phraelcia brevipalpella* Chr. [MICROLÉP.]

Par L. VIARD.

Dans un voyage que je viens de faire à Barcelonnette, j'ai rencontré et recueilli plusieurs espèces intéressantes; celle qui m'a fait le plus de plaisir et qui mérite d'être signalée est la *Phraelcia brevipalpella* Chr., que j'ai découverte l'an dernier et que M. Chrétien a décrite (*Bull. Fr.*, 1900, p. 90). Elle vit sur le Chèvrefeuille. L'insecte parfait se trouve sur cet arbuste, du 8 au 15 juin, et même un peu plus tard isolément. Il se pose sur les rameaux; quand on le dérange, son vol est brusque, peu soutenu, au bout de 3 ou 4 mètres le Papillon se laisse tomber et se blottit dans l'herbe. Sa couleur grise, chez le mâle, blanchâtre chez la femelle, le protège contre le chasseur qui le perd facilement de vue. Sans être rare, il est assez localisé autour de Barcelonnette.

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1900, I, 26; II, 1.

— L. BORDAS : Étude sur l'appareil digestif du *Brachytrupes achatinus*.

American Museum of Natural History (Bulletin), XII, 1890. — W. BEUTENMÜLLER : Synopsis of the Species of *Melittia* of America, North of Mexico, with Description of a new Species. — On Some Species of North American Lepidoptera. — R.-P. WHITFIELD : Notice of two very large Lobsters in the Collection of the American Museum of Natural History (pl.).

Annals and Magazine of Natural History, juillet 1900. — T.-D.-A. COCKERELL : The New Mexico Bees of the Genus *Megachile* and a new *Andrena*. — C. NORMANN : British Amphipoda; IV, Families *Stegocephalidae* to *OEdiceridae* (part.) (pl.). — W.-L. DISTANT : Rhynchotal Notes; V, *Heteroptera* : *Asopinae* and *Tessaratomidae*. — H. DRUCE : Descriptions of some new Species of Heterocera from Tropical South America. — W.-F. KIRBY : Report on the Neuroptera Odonata collected by M. E. Austen at Sierra Leone during

August and September 1898 (fig. et pl.). — M. BURR : Notes on the *Forficularia*; V, Descriptions of new Species and a new Genus, (pl.). — L. WALSINGHAM : Asiatic *Tortricidae*.

Entomologische Nachrichten, XXVI, 13 et 14, 1900. — MATSUMURA SHONEN : Neue Japanische Microlepidopteren. — J. RÖBER : Neue Schmetterlinge. — MATSUMURA SHONEN : Uebersicht der Fulgoriden Japans, I. — W. HORN : Zum Studium der Cicindelen. — W. MEIER : Coleopterologische Notizen.

Essex Institute (Annual Report), mai 1900. ☉

Frelon (Le), 30 juin 1900 (2 exempl.). — J. DESBROCHERS DES LOGES : Faunule des Coléoptères de la France et de la Corse.

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1^{er} juillet 1900. — L. v. AIGNER-ABAFI : Schmetterlingsfang vor 50 Jahren. — E.-H. RÜBSAAMEN : Ueber Zoocecidien von der Balkan-Halbinsel (fig.). — H. FRUHSTORFER : Ueber die Variabilität des *Ornithoptera Croesus* Wall. — O. SCHULTZ : Filarien in paläarktischen Lepidopteren. — Petites communications originales.

Instructor (El) mai et juin 1900. ☉

Naturaliste (Le), 1^{er} juillet 1900. — Les Plantes de France, leurs papillons et leurs chenilles. — C. HOULBERT : Genera analytique illustré des Coléoptères de France (fig.).

Rochester Academy of Science (Proceedings), III, 2, 1900. ☉

Royal Society. — *Reports to the Malaria Committee, 1899-1900*. — C.-W. DANIELS : On Transmission of *Proteosoma* to Birds by the Mosquito. — J.-W. STEPHENS et S.-R. CHRISTOPHERS : Distribution of *Anopheles* in Sierra Leone, I-II (cartes). — F.-V. THEOBALD : A new *Anopheles* (*A. paludis*) from Sierra Leone.

Societas Entomologica, 1^{er} juillet 1900. — PR. P. BACHMETJEW : Das vitale Temperaturminimum bei Insekten abhängig von den Zeit. — C. FRINGS : Ein gynandromorphes *Sm. populi*-Exemplar.

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire (Bulletin), mai 1900. — Notes d'excursions.

Société des Sciences naturelles et d'Enseignement populaire de Tarare (Bulletin), 15 mai 1900. — C. REVAUD : Les Insectes mangeurs de livres.

Société Entomologique de Belgique (Annales), juin 1900. — L. FAIRMAIRE : Descriptions de Coléoptères malgaches. — L. CLOUËT DES

PESRUCHES : Description d'un genre nouveau et de deux nouvelles espèces de la tribu des Aphodiides. — **M. PIC** : Contribution à l'étude des *Ptinidae*. de l'Amérique centrale et méridionale:

BARGAGLI (P.) : Cenni biografici di Ferdinando Piccioli (*Bull. Soc. Ent. It.*); 1900, 12 p.*

BERG (C.) : Tres Reduviidae novae argentinæ (*Com. Mus. nac. B. Ayres*); 1900, 4 p.*

ID. : Sobre algunas larvas de Lepidópteros argentinos (*loc. cit.*), 1900, 3 p.*

ID. : Termitariophilie (*loc. cit.*); 1900, 4 p.*

DENNY (H.) : Monographia Pselaphidarum et Scydmaenidarum Britanniae. Norwich, 1825, 74 p., 14 pl. col. — Acquis pour la Bibliothèque.

LÉCAILLON (A.) : Sur les rapports de la larve et de la nymphe du Cousin (*Culex pipiens* L.) avec le milieu ambiant (*Bull. Soc. Philom. Paris*), 1899, 14 p., fig.*

LÉVEILLÉ (A.) : Études sur la Famille des Temnochilides (*Ann. Soc. Ent. Fr.*), 1899, 14 p.*

A. L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 25 juillet 1900.

Présidence de M. A. GIARD.

M. le professeur Valéry Mayet, de Montpellier, et M. J. Künckel d'Herculais, qui vient de faire un séjour de deux années en mission dans la République Argentine, assistent à la séance.

Correspondance. — M. le capitaine Moser, de Berlin, et M. le capitaine Thouvenin, d'Oran, remercient la Société de leur admission.

Nécrologie. — Le Président a le regret de faire part à la Société de la mort d'un de ses anciens membres, Don Victor López Seoane, décédé à la Corogne le 14 juillet.

Démission. — M. E. Foray, de Roanne, a envoyé au Président sa démission de membre de la Société.

Annales. — Le Secrétaire dépose sur le bureau le 4^{er} fascicule des *Annales* de 1900.

Admission. — M. Walter-Wilson Froggatt, Government Entomologist, department of Agriculture, Sydney, N. S. W. *Entomologie appliquée, Hémiptères.*

Présentation. — M. Henri Rouzaud, receveur des Finances, Narbonne (Aude) [*Entomologie générale et appliquée*], présenté par M. A. Giard. — Commissaires-rapporteurs MM. E.-L. Bouvier et G.-A. Poujade.

Changements d'adresse. — M. R. Delsuc, 47, rue Talleyrand, Reims (Marne).

M. L. Gratiollet, 8, rue Guy-de-la-Brosse, Paris.

Communications.

Sur le *Biston Hünii* Ch. Oberth.,
Lépidoptère hybride appartenant à la tribu des Phalénites
 (avec la planche 1)

Par Charles OBERTHÜR.

Dans le *Bulletin de la Société entomologique de France* (année 1897, n° 15) j'ai fait connaître, sous le nom de *Biston Hünii*, le produit hybride de *Biston* (*Nyssia*) *pomonarius* ♂ et de *Biston hirtarius* ♀.

Mais en 1897, on ne connaissait encore que *Biston Hünii* ♂ ; ce sexe étant seul sorti des chrysalides, à cette époque. Cependant une partie des chrysalides était restée vivante ; on pouvait donc espérer posséder la ♀, un peu plus tard.

Il s'agissait de savoir si *Hünii* ♀, fille de *pomonarius* ♂ et *hirtarius* ♀, qui est ailée, aurait les ailes plus développées que *Pilzii* ♀, fille de *hirtarius* ♂ et de *pomonarius* ♀, qui est aptère.

Peut-être *Hünii* ♀ serait plus favorisée pour la grandeur de ses ailes que *Pilzii* n'avait pu l'être par sa mère *pomonarius*, absolument dépourvue d'ailes ?

Ou bien *pomonarius* ♂, transmettant à sa descendance, en outre de son caractère de ♂ ailé, l'ensemble de ses caractères spécifiques, produirait-il une ♀ *Hünii*, analogue à la ♀ *Pilzii*, compensant ainsi *hirtarius* ♀.

Dans ce cas l'influence à exercer par chaque Papillon reproducteur, sur la descendance devant résulter du double accouplement hybride, serait rigoureusement égale, en ce sens qu'aucun sexe ne serait prédominant par rapport à l'autre, quant à la conformation des êtres qui constitueraient la descendance des deux accouplements.

Grâce aux travaux remarquablement patients et habiles de M. Hüni, de Zürich, et au succès qui les a couronnés, nous avons obtenu la solution du problème.

La ♀ *Hünii*, issue de *pomonarius* ♂ et de *hirtarius* ♀, est sensiblement similaire à la ♀ *Pilzii*, issue de *hirtarius* ♂ et *pomonarius* ♀. Chacun des reproducteurs, ♂ et ♀, transmet donc à sa descendance hybride l'ensemble de ses caractères spécifiques se mélangeant et se compensant également et non un caractère personnel, qui résulterait de l'un des reproducteurs, considéré au point de vue du sexe dont il est le représentant ; étant donné que la ♀ d'une des espèces appelée à re-

produire est, pour le caractère des ailes, favorisée à l'opposé de la ♀ de l'autre espèce.

Les six ♀ *Hünii*, obtenues après 3 et 4 années de chrysalide, sont représentées par procédé phototypique sur la planche I du présent Bulletin.

Ces six ♀ sont photographiées exactement conformes à leur grandeur naturelle, comme il avait été fait pour les Papillons *Pilzii* et *Hünii* des planches I et II du Bulletin n° 15, de 1897.

De même que le ♂ *Hünii* diffère du ♂ *Pilzii* par le ton plus jaunâtre et plus clair du fond de ses ailes, ainsi la ♀ *Hünii* est moins obscure, et est colorée d'une manière générale par une nuance d'un gris légèrement jaune. De plus, les dessins noirâtres, notamment la ligne marginale commune, sont plus accentués.

Mais la dimension des ailes n'est pas bien différente entre *Pilzii* ♀ et *Hünii* ♀. Il est très difficile d'établir, sous ce rapport, une description comparative rigoureusement exacte, puisque non seulement aucun individu n'est semblable à l'autre, mais que les 2 côtés des ailes, dans le même individu ♀, ne sont pas symétriques.

Jugeant donc sur l'ensemble des exemplaires, on peut dire que, par la dimension des ailes, *Pilzii* ♀ et *Hünii* ♀ sont analogues, ainsi que cela a lieu pour les ♂♂.

L'aspect général des *Hünii* ♀ est plus robuste et moins grêle que chez *Pilzii* ♀. Cela tient à la distension de l'abdomen des *Hünii* ♀ qui ne paraissent pas avoir pondu.

Pour compléter ce que nous savons de la vie évolutive des *Biston Hünii*, j'ajouterai, d'après les renseignements de M. Hüni, qu'il y a encore des chrysalides vivantes dont l'éclosion ne pourra désormais avoir lieu qu'au mois de mars prochain. Les Papillons qui en sortiront auront donc passé cinq années en chrysalide.

Maintenant serait-il possible que *Pilzii* et *Hünii*, une fois obtenus par l'intervention d'un naturaliste, se perpétuassent, et qu'une nouvelle forme, tout à fait nouvelle et jusqu'ici inconnue, subsistât désormais, se reproduisant librement dans la nature?

Je ne puis le croire.

Des accouplements que nous avons déjà signalés (1897, n° 15, p. 259), il n'est sorti que des œufs inféconds.

Jusqu'ici du moins, la volonté de l'homme, servie par une remarquable habileté, est indispensable pour produire à côté des espèces naturelles, une forme nouvelle. Si cette intervention ne se renouvelle pas sans cesse en vue de l'accouplement hybride, cet accouplement n'a pas

lieu. Eût-il lieu par extraordinaire, ce serait un accident dont le résultat serait limité à la durée de la vie des individus qui en seraient issus.

Aberrations de *Melitaea didyma* Ochs.

et *Melitaea Parthenie* Bks. [LÉP.]

(avec la planche 1)

Par Charles OBERTHÜR.

Les 13 *Melitaea* qui sont représentées sur la planche 1 du présent *Bulletin*, ont toutes été prises aux environs de Rennes. L'intérêt qu'elles me paraissent surtout offrir, c'est de démontrer que les aberrations se produisent toujours analogues, suivant des lois concernant chaque espèce ou même chaque genre. Les aberrations ne sont donc pas des incidents isolés, paraissant une fois pour ne plus reparaitre semblablement; ce sont plutôt des variations régulières, se produisant dans certains lieux, où se trouvent réunies les conditions nécessaires pour leur développement. Ces conditions paraissent encore être peu connues. La chaleur ou le froid, la lumière et l'électricité semblent cependant être les causes principales des aberrations, chez les Lépidoptères.

C'était par une chaleur d'orage accablante que, le 15 août 1847, feu Bellier de la Chavignerie captura successivement cinq *Lycaena Adonis* du plus beau lilas (*Ann. Fr.*, 1848, p. 301).

Sans doute c'était l'électricité dont l'air était chargé qui avait fait passer du bleu au lilas les *Lycaena Adonis* fraîchement éclos.

Il est vrai que la même cause ne peut vraisemblablement produire l'aberration *Cinnus* Hbn. (830-1) de la même *Lycaena Adonis*. Pourtant elle se reproduit assez fréquemment, puisque ma seule collection en contient une douzaine d'exemplaires.

Au milieu d'un groupe de *Lycaena Adonis* normaux, on trouve parfois un *Cinnus*, ainsi que cela m'est arrivé au mois de mai de la présente année, à Vernet-les-Bains. Tous les *Adonis* d'un même lieu ont vraisemblablement subi les mêmes influences. Pourquoi une aberration isolée? Mais il convient d'ajouter que 3 *Cinnus* ont, à plusieurs années de distance, été rencontrés dans la même localité. Il y a donc une cause inconnue à la production dans le petit bois de Pinats, à Vernet, de cette aberration.

Il en est de même pour les *Melitaea*, dont la représentation a été faite par les procédés photographiques. La *didyma* vole, au Sud de Rennes, dans un site très agreste appelé Bourg-des-Comptes. C'est sans doute la dernière station actuelle de cette *Melitaea*, vers l'Ouest.

Dans les landes, les prés arides et sur les berges du chemin de fer, *didyma* vole deux fois par an, en mai et en août.

L'hermaphrodite, côté gauche ♀, côté droit ♂, figuré en tête de la colonne, a été pris en mai 1891. C'est un cas pathologique plutôt qu'une aberration. Il paraît qu'on en a recensé près d'un millier, dans toutes les collections, jusqu'à ce jour.

Les 3 ♂ qui suivent, varient tous de la même façon, par l'oblitération des taches et dessins noirs des ailes inférieures en dessous. Le second exemplaire de la colonne fait la transition de l'aberration suivante à la forme type. Il a été capturé comme le 4^e exemplaire, en 1893; le 3^e a été rencontré en 1892.

Les 2 *Melitaea didyma*, 3^e et 4^e, sont parfaitement conformes entre elles et elles ont été prises à un an de distance, en août, au même lieu.

L'honneur de la capture de ces 4 *Melitaea didyma* revient à M. P. Boulé, naturaliste à Rennes. Il a bien voulu me les offrir pour ma collection.

Les deux autres colonnes représentent des *Melitaea Parthenie*. Les 4 spécimens de la colonne du milieu aberrant par albinisme de l'aile inférieure en dessous. En dessus, les taches noires normales ont presque entièrement disparu.

Les 3 premiers individus ♂ ont été pris à Bourg-des-Comptes par le même M. Boulé; la ♀ a été prise par nous le 2 juin 1889.

Le 5^e exemplaire de la colonne de droite appartient à cette même aberration. Il est dépourvu de la plupart des taches noires normales en dessus, tandis que le 4^e exemplaire de la même colonne est tout noir en dessus, sauf une bande marginale de lunules fauves. Malheureusement la photographie donne la même valeur aux couleurs fauve et noire et les 2 figures représentant les *Melitaea Parthenie* en dessus, sont trop confuses pour être bien intelligibles. Je le regrette vivement.

Il n'en est pas de même des 3 *Melitaea* mélanisantes photographiées ci-dessous. A l'inverse des Papillons de la colonne du milieu, le noir envahit aux ailes supérieures comme aux ailes inférieures.

Ma collection contient une trentaine d'exemplaires aberrants de *Melitaea Parthenie*, la plupart pris aux environs de Rennes.

Environ la moitié de ce nombre appartient à la variation mélanisante; l'autre moitié se rapporte à la variation albinisante, qui existe semblable pour *Melitaea athalia*.

Hübner a figuré sous le nom des *Pyronia* (585-8) des *Athalia*, aberrantes, mélanisantes aux ailes supérieures, plutôt un peu albinisantes aux ailes inférieures. Le premier exemplaire de *Parthenie* de la colonne de droite cadre bien avec le n^o 588 de Hübner.

**Notes sur les *Paussus* du Nord de l'Afrique
et sur les espèces du groupe de *P. cornutus* Chevr. [COL.]**

Par L. BEDEL.

I. — Sur les trois *Paussus* du Nord de l'Afrique.

1. *Paussus saharæ*, nom. nov. (*cornutus* \pm Fairm. nec Chevr.). — *Castaneo-rufus, tibiis tarsisque nigris, nitidus. Capite inter oculos spina erecta setigera armato. Antennarum clava lenticulari, bi-convexa, haud hirsuta, utrinque limbata, basi rotundato-subtruncata et extus in dentem acutum producta, in mare oblongiore, tenuissime granulosa et opaca, in femina brevior, magis inflata, fere punctulata, vix opaca. Prothorace capite haud latiore, parte antica convexa, a postica sulco transverso, medio profunde foveolato, separata. Elytris oblongis, nitidis, haud vel indistincte punctatis, pilis dispersis brevissimis, punctuliformibus, vix apparentibus. Pedibus breviusculis; tibiis compressis, pariter latiusculis.* — Long. 6-8 mill.

Régions désertiques. — Algérie : Aïn-Sefra (Hénon! in coll. Bedel), Ghardaïa (coll. R. Oberthür!), région du Hodna et Chegga (Vauloger!), Tougourt (Thiébaud! in coll. R. Oberthür!), etc. — Tunisie : Sfax, Sbeitla, Gamouda (Vauloger!), El-Hafay, Gabès (Dr Sicard), Kebilli (Dr Normand!), etc. — Trouvé généralement le soir, au vol, attiré par les lumières.

Le *P. saharæ* m. a été longtemps confondu avec le *P. cornutus* Chevr. et redécrit sous ce nom par Fairmaire (Rev. et Mag. de Zool. 1879, p. 179); il a été récemment signalé de Tunisie par J. Bourgeois et du Mزاب par le Dr Chobaut sous le nom de *P. aethiops* (1). Il diffère tellement du véritable *cornutus* Chevr. (*dentifrons* Westw.) qu'il serait difficile de le comparer à cette espèce. Par contre, il est très voisin du *P. aethiops* Westw. (*Thomsoni* Reiche) dont il se distingue surtout par les poils disséminés sur ses élytres et qui sont tellement courts qu'on les prendrait pour des grains de poussière; en outre, ses pattes sont un peu moins longues et ses tibias plus largement aplatis.

2. *P. Olceseï* Fairm. 1836 (*Klugi* \pm Fairm.). — Maroc : Tanger

(1) C'est sans doute encore le *P. saharæ* que Leprieur (L'Abeille, XXI, Paussides, p. 3, note) a signalé d'Alexandrie sous le nom erroné de *P. armatus* Westw.

(Olcese, Dieck). — Algérie : région du mont Ouarsenis (Vauloger!); Grande-Kabylie à Azazga (Pic).

Obs. — Cette espèce est voisine du *P. Klugi* Westw., espèce sud-africaine qui paraît vivre avec des *Pheidole*.

3. *P. Favieri* Fairm. 1851. — Surtout en hiver et au premier printemps, dans les fourmilières de *Pheidole pallidula* Nyl., sous les pierres!. — Maroc : Tanger (Favier!). — Algérie : régions montueuses, de Daya à Bône! mais plus rare vers l'Est que vers l'Ouest. — Tunisie : Aïn-Draham (Léveillé!), Porto-Farina (Vauloger!). — Aussi en Andalousie et dans les Pyrénées-Orientales.

II. — Sur les *Paussus* du groupe de *cornutus* Chevr.

Dans le Catalogue général des Paussides publié en 1887 par A. Raffray (Nouv. Arch. du Muséum, IX), diverses erreurs matérielles rendent inutilisable la liste des espèces voisines du *P. cornutus* Chevr. (pp. 40-41). — Grâce aux renseignements que j'ai reçus de M. René Oberthür et aux constatations que j'ai faites à ce sujet, je puis rétablir ici leur synonymie d'une manière plus exacte, en prévenant que le *P. verticalis* Reiche, dont la tête est dépourvue de corne entre les yeux, devrait être mis à part et même exclu de ce groupe :

<i>cornutus</i> Chevr. 1832.	<i>armatus</i> Westw. 1833.
<i>dentifrons</i> Westw. 1833.	<i>curvicornis</i> Chevr. 1838.
*	<i>cornutus</i> (mas) † Chevr.
<i>aethiops</i> Westw. 1845 (!).	<i>cilipes</i> Westw. 1845.
<i>Thomsoni</i> Reiche, 1860.	<i>hirsutus</i> Raffr. 1887.
? <i>verticalis</i> † Westw., Raffr.	—————
<i>Antinorii</i> Gestro, 1881.	<i>verticalis</i> Reiche, 1848.
(= ? <i>aethiops</i> Westw.).	? <i>Reichei</i> Thoms. 1859.
<i>arabicus</i> Raffr. 1887.	—————

Il y aurait lieu d'ajouter à cette liste le *P. saharæ* m., décrit plus haut, ainsi que plusieurs espèces sud-africaines, notamment le *P. setosus* Westw., le *P. propinquus* Pér. (qui m'a paru voisin de l'*armatus* Westw.) et peut-être quelques autres *Paussus* décrits par Péringuey en 1897.

(1) Cette espèce doit être attribuée à Westwood et non pas à Blanchard qui l'a figurée mais ne l'a pas décrite.

Description de trois Lépidoptères de Cao-Bang (Tonkin)

Par l'abbé J. DE JOANNIS.

M. le Dr A. Billet a recueilli à Cao-Bang (Tonkin Nord-Est) un certain nombre de Lépidoptères dont l'étude complète sera publiée ultérieurement; je signalerai seulement ici ceux qui m'ont paru constituer des nouveautés.

1.) *EUSEMIA VULCANIA* BUTL. var. **Melania**, nov. var.

Pilis pedum abdominisque extremi nigris, non aurantiacis ut in typo; collari flavo-pallescenti, non aurantiaco; maculis subapicalibus flavo-pallescentibus, non albis, nec in linea recta, sicut in typo, dispositis.

2.) **Oxyodes Billeti**, n. sp.

Supra ochraceo-aurantiaca; in anticis maculis duabus loco umbræ mediæ item et reniformi, subrotunda et lata, violaceis; in utrisque alis, margine externo et, in posticis, linea, a costa prius huic margini parallela, postea cum ipso convergenti versus marginem internum, violaceis; in anticis, margine interno squamis violaceis irrorato.

Infra pallide violacea, conspersa squamis albis quæ, in posticis, in duplici serie maculari, inter venas, una secus marginem externum, altera parallela, confluant; margine interno tantum, in utrisque alis, latius in anticis, pallide flavo.

Capite albo et violaceo mixto; thorace flavo; pectore albo; abdomine ad basim flavo, ulterius squamis violaceis consperso. Palpis albo et brunneo mixtis, 2^o et 3^o articulis in linea perpendiculari cum primo, 3^o ad summitatem incrassato. Alis posticis subquadratis.

Exp. alarum : 49 mill.

Une ♀.

Il existe à Londres, au Musée britannique, un mâle de la même espèce, venant de Darjeeling, presque entièrement identique à la ♀ décrite ci-dessus. J'ai rapporté cette espèce au genre *Oxyodes* principalement à cause de la coupe des ailes rappelant celle d'*O. scrobiculata*. Toutefois la forme des palpes, celle des ailes inférieures, un peu anguleuses, ainsi que la présence de petites touffes triangulaires de poils aux pattes, paraissent demander au moins un sous-genre pour lequel je propose le nom de **Rectipalpula**, subg. nov.

3.) Une troisième espèce, appartenant aux *Notodontidae*, constitue

un genre nouveau. Chez le ♂, venant de Cao-Bang, les antennes sont malheureusement défectueuses; mais je possédais déjà une ♀ de cette espèce, venant du Laos ou du Tonkin, je ne puis préciser davantage. Au Musée britannique, Sir George F. Hampson m'a montré deux exemplaires ♂, venant de Bornéo, d'une espèce inédite différente, mais appartenant au même genre. Je dédierai ce genre à M. le Dr Billet.

Billetia, nov. gen.

Palpes redressés, le troisième article oblique. Abdomen dépassant peu le bord abdominal. Antennes assez courtes, bipectinées jusqu'à leur extrémité dans les deux sexes, plus brièvement chez la ♀. Ailes allongées; aux supérieures, 3 et 4 de l'angle inférieur; discocellulaire formant un angle rentrant vers la base; 6 de l'angle supérieur; 7, 8, 9, 10 tigées; pas d'aréole. Aux inférieures, 3 et 4 de l'angle, 6 et 7 longuement tigées, 8 se rapprochant de la cellule puis s'écartant lentement de celle-ci et de 7.

Ce genre se place près de *Stauropus*, il s'en distingue spécialement par la discocellulaire, droite chez *Stauropus*, anguleuse chez *Billetia*. Les ailes sont aussi très différentes, épaisses chez *Stauropus*, beaucoup plus minces chez *Billetia*.

B. rubripuncta, n. sp.

Pallide flavo-grisea, discocellulari in utrisque alis et in utraque alarum pagina puncto rubro notata. In anticis, strigis duabus macularibus, una a costa ante apicem, altera a margine externo ultra apicem, obliquis, parallelis, fasciisque discoidali, ad costam latiore, tenuiter fuscis; duobus punctis marginalibus, respective in intervallis 4 et 6; duobusque aliis basalibus, nigris. Infra, in anticis, striga, a costa paulo ante apicem, obliqua, maculis duabus fuscis constanti, et ultra evanescenti; in posticis, linea discoidali fusca, externo margini parallela, etc, praeter ad costam et ad marginem internum, notata, et, ultra eam, ad marginem internum, maculis rubris duabus.

Palpis nigris, 1^o et 2^o articulis pilis flavis hirsutis. Capite et thorace quatuor punctis nigris anterieus notato, pallide flavo-griseis; abdomine flavo, in articulis singulis, praeter duos primos et ultimum, punctis quinque nigris notato, duobus dorsalibus, duobus lateralibus, unoque ventrali. Alis anticis versus apicem rotundatis, margine externo sub apice leviter sinuato, posticis rotundatis.

Exp. alarum : ♂, 53 mill.; ♀ 55 mill.

**A propos de deux Staphylinides [COL.]
décrits par M. E. Abeille de Perrin.**

Par A. FAUVEL.

Je crois utile d'appeler l'attention sur un caractère signalé par mon excellent ami, M. Abeille de Perrin, chez son *Ocypus integer*, de Smyrne (*Bulletin*, 1900, p. 203); le ♂ a, dit-il, le 7^e segment de l'abdomen arrondi et nullement échancré en dessous. C'est la seule exception qu'on ait indiquée dans l'immense tribu des Staphyliniens, où les espèces de tous les genres ont toujours ce segment plus ou moins incisé ou échancré, et il est impossible de ne pas insister sur son importance.

Seulement je me le demande — et je suis assez indiscret pour le demander à l'auteur — comment, en pareil cas, distinguerons-nous les sexes, puisque ce caractère des échancrures ventrales était le seul admis comme l'apanage des ♂? La dilatation des tarses antérieurs, couramment invoquée dans beaucoup d'autres groupes ou familles, ne peut servir pour les *Ocypus*, ces insectes ayant, tout le monde le sait, les tarses également dilatés dans les deux sexes.

Je profite de l'occasion pour dire quelques mots au sujet du *Lathrobium* (*Glyptomerus*) *Doderoi* Abeille (même *Bulletin*, p. 204).

Dès 1873, dans le tome III de ma *Faune gallo-rhénane* (p. 355), j'ai noté, d'après les types, l'*etruscum* Piccioli comme synonyme de l'*apenninum* Baudi. Depuis cette époque, le Dr Joseph (*Berl. Ent. Zeits.*, 1882, 35) et Czwalina (*Deuts. Ent. Zeits.*, 1888, 355) se sont occupés de cette espèce hypogée et ont décrit les caractères du ♂, que, faute d'avoir ce sexe sous les yeux, j'avais donnés (*l. c.*) d'après Piccioli.

En étudiant à nouveau mes deux ♀ d'*apenninum* (tout ce que je possède), de Vallombrosa et Lucca (Toscane), je constate que l'exemplaire de Vallombrosa a le 7^e segment dorsal (6^e pour Abeille) faiblement, mais nettement anguleux à sa marge apicale, tandis que, chez celui de Lucca, cette saillie forme un triangle très net, comme l'indique notre collègue pour le *Doderoi* ♀. Par contre, le 7^e segment ventral est identique chez mes deux exemplaires, c'est-à-dire saillant-obconique avec un faible sinus à son extrémité. Je ne puis trouver d'ailleurs le plus léger caractère pour séparer mes deux spécimens, et j'en conclus volontiers que ces modifications du 7^e segment dorsal sont individuelles, puisque ce segment affecte une troisième forme chez les ♀ de M. Abeille de Perrin, n'ayant plus trace de saillie anguleuse.

Pas plus que notre collègue je n'ai vu le ♂ d'*apenninum*; mais les auteurs cités plus haut lui donnent pour caractères : 7^e segment ventral légèrement incisé à l'extrémité, pectiné de chaque côté avant le milieu de deux touffes transverses de petits cils noirs juxtaposés semblant prendre naissance au bord d'une fossette elliptique; 6^e segment avec une impression triangulaire munie intérieurement de cils noirs courts et rigides et prolongée en sillon à sa base; segments 5, 4 et 3 légèrement impressionnés au milieu.

D'après M. Abeille de Perrin (*Bulletin*, p. 205), le *Doderoi* ♂ différerait d'*apenninum* ♂ par le 5^e segment ventral *fortement et triangulairement incisé*; mais cette indication est contredite par les termes de sa description (*ibid.*, p. 204), où il donne ce segment comme *simplement sinué*; d'ailleurs je ne connais pas d'exemple d'un 5^e segment à incision fortement triangulaire. Il est à croire qu'il s'agit du 8^e ou segment de l'armure génitale.

Un poco piu di luce ne serait pas inutile pour éclairer ces obscurités, presque aussi profondes que celles des cavernes où vivent les *Glyptomerus*.

Notes sur quelques *Podistrina* et description d'une espèce nouvelle d'Algérie [Col.]

Par J. BOURGEOIS.

1. *PODISTRINA CONTINUA* Bourg., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 340. — Cette espèce, décrite du mont Ventoux, où elle avait été prise par notre collègue M. le Dr Chobaut, vient d'être retrouvée par M. P. de Peyerimhoff, sur un Pin sylvestre, au hameau de Blégiers (montagne du Cheval-Blanc), dans les environs de Digne. L'exemplaire que M. de Peyerimhoff a bien voulu me communiquer, et qui est également une ♀, a le pronotum un peu plus transversal et un peu plus élargi d'arrière en avant, mais tous les autres caractères étant identiques à ceux de mon exemplaire typique, il ne me paraît pas possible de l'en séparer, surtout en l'absence du ♂.

Les deux *Podistrina* du mont Ventoux (*P. Chobauti* Bourg. et *P. continua* Bourg.) ont donc été retrouvées, presque immédiatement après, par M. de Peyerimhoff, dans les environs de Digne; la première au lac d'Allos (cf. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 338) et la seconde au Cheval-Blanc. C'est un fait à noter au point de vue géographique.

2. *Podistrina Abeillei* Bourg., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1893, p. CCLXXXIX.
— M. le Dr Chobaut, qui vient de reprendre cette espèce au mont Edough (Algérie), a bien voulu m'en envoyer plusieurs exemplaires, parmi lesquels un ♂ et une ♀ accouplés. Leur examen m'a permis de constater que le premier article des antennes, que j'avais décrit comme étant entièrement d'un roux clair, est susceptible de passer au brunâtre plus ou moins foncé, notamment chez la ♀. Il en est de même des tibias antérieurs.

3. *Podistrina algerica*, sp. nov. — ♂ *Lalet*. — ♀ *Aptera, fusca, tenuissima pubescens; capite antice rufo-flavo, palpis pallide flavis, articulo ultimo nigro, antennis brunneis, crassis, ultra medium corporis paulum prolongatis; pronoto quadrato, latitudine haud brevior, punctulato, transversaliter immarginato, rufo, medio plus minusve infusato, antice lateraliter depresso; elytris abbreviatis, fusco-brunneis, apice flavo-maculatis*. — Long. 4 mill.

♂ Inconnu.

♀ Aptère. Tête subconvexe, peu rétrécie postérieurement, finement et assez densément pointillée, d'un brun de poix à peine luisant, avec la partie antérieure, à partir de l'insertion des antennes, d'un roux testacé; yeux noirs, peu saillants, à facettes grosses et convexes; mandibules rousses, un peu obscurcies au bout; palpes d'un flave pâle, avec le dernier article noir; antennes épaisses, dépassant un peu la moitié du corps, d'un brun assez clair avec l'extrémité obscurcie; 1^{er} article allongé, égalant les deux suivants réunis, assez fortement épaissi de la base vers l'extrémité, 2^e de la moitié de la longueur du premier et atteignant presque les trois quarts du 3^e, les suivants subégaux. Pronotum à peu près aussi long que large, finement pointillé, légèrement convexe, avec une dépression transversale en avant du milieu, visiblement rebordé au bord antérieur et à la base, nullement sur les côtés, d'un roux assez vif avec le disque plus ou moins rembruni, parfois concolore; côtés parallèles, presque droits, angles antérieurs tronqués et relevés en bourrelet, les postérieurs droits, très légèrement dirigés en dehors. Écusson transversal, d'un brun noirâtre. Élytres raccourcis, ne dépassant pas le double de la longueur du pronotum, ruguleux, pubescents, bruns avec une tache jaunâtre, assez vaguement limitée, à l'extrémité. Abdomen épais, plus large que les élytres, ruguleux, brun noirâtre avec les arceaux ventraux bordés de jaune sur les côtés et postérieurement; le dernier concolore, échancré en demi-cercle à son extrémité. Pattes brunes, tibias et tarses flavescents.

Algérie : mont Edough (Dr Chobaut, mai 1894); Philippeville (M. Pic).

Très voisin de *P. continua* Bourg., mais distinct par la tête d'un roux testacé antérieurement, par les antennes d'un brun clair, plus robustes et un peu plus longues, par le pronotum plus allongé, presque aussi long que large, par les élytres marqués d'une tache jaunâtre à l'extrémité, etc. Chez certains exemplaires, le pronotum est maculé de noir sur une assez grande étendue de sa partie discale et quelquefois aussi sur le bourrelet des angles antérieurs; chez d'autres, il est entièrement roux.

Description d'un Lampyride nouveau, de Bornéo [COL.]

Par Ernest OLIVIER.

Dans les *Annales de la Société Entomologique de Belgique* (t. XLIV, 1900, p. 237), j'ai créé le genre *Ototreta* pour deux Coléoptères inédits de la famille des Luciolides (*Ototetra Weyersi* et *fornicata*), provenant de Sumatra, se distinguant nettement des *Luciola* par leur forme courte, trapue, la brièveté de leur prothorax, leurs antennes à articles médians comprimés, les angles postérieurs du prothorax creusés à leur sommet d'une profonde impression, etc. Je viens faire connaître aujourd'hui une troisième espèce de ce genre; elle fait partie de ma collection et provient de Sarawak (Bornéo).

Ototreta gravida, nov. sp. — *Nigra, lucida; antennis dimidium corporis attingentibus, nigris, pubescentibus, articulis 3-8 compressis; prothorace laevi, breri, antice rotundato, basi recte truncato, in medio longitudinaliter canaliculato, angulis posticis piceis, retroproductis et valde impressionatis; scutello obconico, punctato; elytris oblongis, rugosis, pubescentibus; pedibus nigris.* — Long. 6 mill.

Cette espèce se reconnaît facilement à sa coloration différente de celle des deux autres du même genre.

Description d'une nouvelle *Rhopalomyia*, d'Italie [DIPT.]

Par le Dr A. TROTTER.

Rhopalomyia Kiefferi, n. sp. (♀ ♂).

Imago. — Corps rouge; antennes, vertex et occiput, pronotum, larges bandes du mésonotum, écusson, poitrine et larges bandes sur

le dessus de l'abdomen bruns; pattes brunâtres. Palpes bi-articulés; article premier globuleux, le second ovalaire, tous deux longuement ciliés. Bouche à peine proéminente. Antennes composées de 2 et 14 articles, avec les deux premiers articles du funicule soudés entre eux et deux fois et demie aussi longs que gros; chez le ♂, tous les articles, à l'exception du dernier, sont munis d'un col atteignant environ la moitié de leur longueur; chez la ♀, le col est presque nul, et les deux derniers articles sont étroitement connés, de sorte qu'ils ne paraissent former qu'un article unique, rétréci en son milieu et deux fois aussi long que le précédent.

Pattes entièrement couvertes d'écailles noires; crochets des tarsi noirs et bifides, caractère par lequel cette espèce se distingue de toutes les autres du même genre; pelote médiane à peine plus longue que les crochets, les deux latérales beaucoup plus petites, mais très distinctes. Ailes à bord antérieur cilié, conformées comme chez *Rh. foliorum* (H. Löw). Pince anale avec l'article basal et l'ongle conformés de même que chez cette dernière espèce; lamelle supérieure profondément bilobée; l'intermédiaire avec une échancrure arquée; l'inférieure, la plus courte, conformée comme d'ordinaire. Pochette de l'oviducte très courte, à peine plus longue que large. — Taille ♂ ♀ 2,5 mill.

Nymphe. — Gaine antennaire munie à sa base d'une dent brune, en cône comprimé et un peu plus longue que large. Soies faciales à peine plus longues que leur minime papille; soies du vertex très longues, six fois aussi longues que le grand mamelon sur lequel elles sont insérées et cinq fois aussi longues que les stigmates thoraciques; ceux-ci en cône tronqué, à peine chitineux, deux fois aussi longs que larges. Point de spinules dorsales. La dépouille nymphale n'est pas entièrement hyaline, mais la tête, le thorax et la gaine des hanches antérieures sont brunâtres.

Larve. — Elle est de couleur jaune vitellin, seulement, plus tard, elle devient rougeâtre. Le nombre et la disposition des papilles et des soies est en tout comme dans les autres *Rhopalomyia*; elle est en outre dépourvue de spatule sternale, caractère distinctif des larves de ce genre. (Voir à ce propos la publication de Kieffer, *Beobachtung. üb. die Larven der Cecidomyinen*, p. 8-9, in « Wien. Entomol. Zeitg. » 1895, I Heft, p. 1).

Oeuf. — Les œufs sont nombreux, de la couleur de l'abdomen, cinq fois aussi longs que gros, de forme cylindrique, avec les deux bouts arrondis et un peu amincis.

Galle et mœurs. — Cet insecte produit des galles aux dépens des

pousses ou des feuilles d'*Artemisia camphorata*. Ces galles sont ovoïdes, hautes de 5 à 6 mill. et larges de 2 mill., glabres, un peu charnues, coriaces ou subligneuses à maturité, rouges ou brunes, terminées supérieurement par une pointe, avec une cavité intérieure. J'ai déjà donné une description et une figure de cette galle dans ma publication « *Contributo alla conoscenza degli Entomoecidi italiani, etc.* » ⁽¹⁾.

La larve se métamorphose dans la galle, dans un petit cocon blanc, et l'insecte en sort au printemps de la seconde année, au mois de mai ou juin.

Patrie. — Vallurbana (Modène) et Vittorio (Treviso). — J'ai obtenu l'insecte de galles récoltées par le Professeur P.-A. Saccardo dans cette dernière localité.

L'espèce est dédiée au savant cécidiologue de Bitsch, l'abbé J.-J. Kieffer, qui a bien voulu m'aider à la reconnaître.

Notes sur le genre *Malthinus* Latr. [COL.]

Par Maurice Pic.

En attendant une étude générale synoptique sur le genre *Malthinus* Latr., je crois utile de publier dès maintenant quelques observations ou rectifications inspirées, pour la plupart, par l'étude de plusieurs accouplements recueillis dans mes dernières chasses.

Tout d'abord je dois dire que les divisions synoptiques établies par de Marseul (*Malthinides*, in *L'Abeille*, XVI, 1877) et basées seulement sur la coloration de l'épistome, celui-ci étant soit clair, soit foncé ou taché de noir (divisions G et G', de la page 12), ont pour résultat de séparer les deux sexes de *nigribuccis* Mars.; il en est de même pour *fasciatus* Thoms. (= *balteatus* Suffr. [ex auctor.]). La coloration de la tête, presque invariable dans le même sexe, est différente chez les deux sexes de chacune des deux espèces que je viens de nommer, la coloration étant, dans le pourtour du labre, toujours claire et parfois très pâle chez le ♂, et plus ou moins noire ou rembrunie chez la ♀.

J'ai capturé en Tunisie plusieurs accouplements qui m'ont permis de constater que la forme *varus* Bourg., récemment décrite (*Bull.*

(1) « Riv. di Patol. vegetale » 1899, v. VII, p. 197, n° 5, tav. XVII, fig. 1 et 1a.

Fr., 1900, p. 94), s'accouplait avec la forme *nigribuccis* Mars., ou du moins avec une ♀ non spécifiquement distincte du type de de Marsoul, d'où on peut conclure que ces deux noms désignent une seule espèce ⁽¹⁾. A la rigueur on peut attribuer, à titre de variété, le nom de *varus* aux exemplaires qui offrent une coloration plus pâle sur l'avant-corps ou moins foncée sur les pattes, car *M. nigribuccis* Mars. est variable dans la coloration de ses membres ou celle de son avant-corps.

Tout récemment, j'ai recueilli en Saône-et-Loire un autre accouplement dont les deux sexes correspondent bien à la description du *fasciatus* de Thomson (Skand. Col., VI, 1864, p. 194) et qui, par conséquent, doivent se rapporter à *balteatus* Suffr., en admettant que la note synonymique de M. Bourgeois (supplément aux Malacodermes, p. 27, in *Revue d'Ent.*, 1893) soit juste. La ♀ de cet accouplement est, de plus, identique aux exemplaires typiques reçus de l'auteur et nommés *Merkli* var. *praetextus* Bourgeois ⁽²⁾. Je ne connais pas les types de *Merkli* Weise ni ceux de *balteatus* Suffr. et ne puis qu'indiquer, d'après ce qui vient d'être rapporté, la synonymie probable de ces deux noms; mais au sujet de la variété *praetextus* Bourg., je serai plus précis; cette variété est insignifiante, car le « fin liséré noir bordant les côtés du prothorax », qui la caractérise, est variable, parfois raccourci ou invisible vu de côté.

Le caractère des tibias postérieurs du ♂ dilaté et aplatis près de l'extrémité qui, d'après les derniers monographes, caractérisait principalement *M. balteatus* Suffr., ne suffit plus maintenant à la distinction de cette espèce, car plusieurs autres récemment décrites, comme *brevior* Pic, *maritimus* Pic, *delicatus* Bourg., possèdent une structure de tibias analogue dans le même sexe. Puisque j'ai occasion de parler de *delicatus* Bourg. (*Bull. Fr.*, 1899, p. 370), je ferai remarquer que cette espèce, d'après sa description, me paraît difficilement séparable de *maritimus* Pic (*L'Échange*, n° 174, p. 19); c'est pourquoi *delicatus* Bourg., a besoin d'être réétudié avant d'être accepté comme valable.

(1) J'ai déjà présenté cette réunion comme probable avant mon voyage (*L'Échange*, n° 185, 1900, p. 37).

(2) Cette variété a été récemment décrite (*Bull. Fr.*, 1899, p. 370) comme provenant seulement d'Asie Mineure et de la France méridionale: Soos; mais en réalité elle possède un habitat bien plus étendu ainsi que je l'ai indiqué (*L'Échange*, n° 185).

Notes synonymiques

Par Maurice PIC.

Ptinus lepidus Péringuey (Ann. South African Museum, I, part. 2, 1899, p. 242), de l'Afrique australe, étant préoccupé par *Pt. lepidus* Villa (Cat. Col. eur., suppl., 1838, p. 62). d'Italie, devra prendre le nom de **Kruger**i [nom. nov.].

Anthicus quadraticeps Fairmaire (Ann. Fr., LXVIII, 1899, p. 490), de Madagascar, étant préoccupé par *A. quadraticeps* Desbrochers (Opusc. Entom., I, 1875, p. 47), de Syrie, devra prendre le nom de **betsibokensis** [nom. nov.].

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1900, II, 2 et 3. ⊙

Agricultural Gazette of N. S. Wales, juin 1900. — W. FROGGATT : Insects and Birds. — Insects living in Figs (pl.). — A. GALE : Why do Bees Swarm ? — Notes diverses.

Archives provinciales des Sciences, 1^{er} juillet 1900. ⊙

Association française pour l'Avancement des Sciences. — 1^o Bulletin de l'AFAS juillet 1900. — 2^o Session de Boulogne-sur-Mer, 1899-1900. — M. CAUSARD : Sur la respiration branchiale chez les Diplopodes. — L. BORDAS : Étude comparée des organes reproducteurs mâles des Coléoptères.

Canadian Entomologist (The). XXXII, 7, 1900. — REV. THOMAS W. FYLES : The « Entomological Muddle » — A rejoinder (1 pl.). — E.-D. BALL : Some new Jassidae from the southwest. — E.-E. BOGUE : A new species of *Kermes*. — C.-F. BAKER : Notes on *Idiocerus* (Jassidae). — WILLIAM BEUTENMULLER : A new *Sesia* from Alaska. — A. RADCLIFFE GROTE : Types of Noctuid genera. — F.-M. WEBSTER : Some species of Diptera inhabiting or frequenting the wheat fields of the middle west. — GEO.-B. KING : The Coccidae of the ivy. — HERBERT OSBORN : Description of a new species of *Haematopinus*.

Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1900, I. — A. SCHULTZE : Beschreibung neuer paläarktischer Ceuthorrhynchinen. — *Ceuthorrhynchus dalmatinus* Stierl. = *obsoletus* Germ. — E. REITTER : Beitrag zur

Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. — Uebersicht der Arten der Curculioniden-Gattung *Myloccerus* Schönh. und *Corigetetus* Desbr. der centralasiatischen Fauna. — J. GERHARDT: Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1899. — *Leptacinus linearis* Kraatz sp. pr. — Dr G. KRAATZ: *Dilochrosis nigra*. — Einige neue Cetoniden-Arten. — Ueber die Gattung *Phonotaenia* Kraatz. — *Brachypteryx* Krtz. = *Syntomopteryx* Krtz. — *Rhadinotaenia* n. gen. auf *Grametis* ? *clytus* Westw. — *Trymodera Dwivieri* Schoch vom Nyassa-See. — E. REITTER: Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. — O. SCHWARZ: Verzeichniss der von Hrn. Dr Schultheiss in N.-O. — Sumatra gesammelten Elateriden nebst Beschreibung einiger neuer Arten. — Neue paläarktische Elateriden. — Dr G. HAUSER: *Sambus Prinae* n. sp. — J. WEISE: Kurze Mittheilungen über ostafrikanische Coccinelliden und Beschreibungen neuer Arten. — Neue Coleopteren aus Kleinasien. — Dr G. HAUSER: *Alaomorphus Candezei* novum genus et nova species Elateridarum. — Dr G. KRAATZ: *Protaetia regalis* var. nov. *Horni* Krtz. — O. SCHWARZ: Neue Elateriden aus Africa. — G. BREDDIN: Nova Studia Hemipterologica. — Dr G. KRAATZ: Varietäten einiger *Glycyphana*-Arten von Neu-Guinea. — Cleriden aus Ceylon gesammelt von Hrn. Dr Horn. — Dr WALTHER HORN: De novis Cicindelidarum speciebus. — Dr G. KRAATZ: *Amblyopinus Brandesi* Krtz. n. sp. — J. WEISE: Einige neue Hispinen und Cassidinen von Paul Weise in Usambara gesammelt. — Eine neue *Alurnus*-Form. — Dr G. KRAATZ: *Formasinus Darcisi* Krtz. (neuer Goliathide). — Ueber die Varietäten der *Protaetia soloriensis* Wall.

« Fauna » Société des Naturalistes Luxembourgeois, VIII, 1898 et IX, 1899. — Dr ER. FELTGEN: Geschwulstbildung durch Raupenhaare. — Janet's Werke über Ameisenkunde. — Miscellen: L'alcoolisme chez les Papillons. — Jets de sang (Orthoptères). — Dr E. KLEIN: Die Rosenblattbiene (*Megachile centuncularis*).

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, V, 14, 1900. — Dr ANDREA GIARDINA: Ein Beitrag zur Kenntnis des Genus *Machilis* Latr. (fig.). — L. SORHAGEN: Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Lithocolletis* (pl.). — EW. H. RÜBSAAMEN: Über Zoocecidien von der Balkan-Halbinsel (fig.). — Dr L. ZEHNTNER: Formalin als Konservierungsmittel. — Notes diverses.

K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (Verhandlungen der), L, 5, 1900. — Dr PETER KEMPNY: Beitrag zur Perliden- und Tri-

chopteren-Fauna Südtirols. — L. GANGLBAUER : Drei neue mitteleuropäische Coleopteren.

Naturaliste (Le), 15 juillet 1900. — Dr LÉON C. COSMOVICI : Contributions à l'étude de la faune de la Roumanie. — LOUIS PLANET : Essai monographique sur les Coléoptères des genres *Pseudolucane* et *Lucane*. — X : Les plantes de France, leurs papillons et leurs chenilles. — C. HOULBERT : Genera illustré des Coléoptères de France (suite).

Psyche, IX, 291, 1900. — S.-H. SCUDDER : Notes on the Orthopteran genus *Leprus* Saussure. — S.-J. HUNTER and W.-S. SUTTON : The Melanopli of Kansas, II. — G.-B. KING : The genus *Kermes* in north America (fig.).

Royal Society (Proceedings), LXVI, 431, 1900. ☉

Sociedad científica « Antonio Alzate » (Memorias y Revista), XIV, 3-4, 1900. ☉

Societas entomologica, XV, 8, 1900. — O. SCHULTZ : Lepidopterologisches (betreffend *Papilio podalirius* L. und *Papilio machaon* L.). — FR. W. KONOW : Neuer Beitrag zur Synonymie der Chalastogastrea (Hym.).

Union apicole (L'), VI, 7, 1900. — Entomologie agricole : Dégâts du *Forficula auricularia* L., dans les ruches.

Wiener Entomologische Zeitung, XIX, 6-7, 1900 (2 exempl.). — Jos. MÜLLER : Ueber neue und bekannte Histeriden. — Jos. MIK : Dipterologische Miscellen, III. — EDM. REITTER : Coleoptera, gesammelt im Jahre 1898 in Chin. Central-Asien von Dr Holderer in Lahr. (1 pl.). — ROMUALD FORMANEK : Synoptische Uebersicht der *Phaenops*-Arten aus der palaearctischen Fauna. — GABRIEL STROBL : Spanische Dipteren (XI). — F. HARTMANN : Zwei neue *Episomus* aus Sumatra. — EDM. REITTER : Eine neue Art der Coleopteren-Gattung *Acanthocinus* aus Bosnien. — Dr A. FLEISCHER : Zur Variabilität des *Porcinolus murinus* Muls. — LEANDER CZERNY : Neue österreichische Dipteren.

BRÖLEMANN (H.-W.) : Sur le travail du Dr Verhoeff intitulé : « Über Doppelmännchen bei Diplopoden (*Bull. Soc. zool. Fr.*), 1900, 6 p.*

Id. : Dous Myriapodos notaveis do Brazil, 7 p., fig.*

Id. : Notes Myriapodologiques, traduction française de la note ci-dessus (*Zool. Anz. XXIII*, 612), 1900, 4 p. fig.*

- OLIVIER (ERNEST) : Contribution à l'étude de la Faune entomologique de Sumatra (Voyage de M. J.-L. Weyers), XI, Lampyrides (*Ann. Soc. ent. Belg.*), 1900, 5 p. (2 exempl.)*
- PIC (T.) : Über *Dorcadion divisum* Germ. und dessen Varietäten (*Ent. Nachr.*), 1899, 4 p.*
- Id. : Ueber *Rosalia alpina* L. und deren Varietäten (*loc. cit.*), 1900, 2 p.*
- PIC (M. und T.) : Diagnosen verschiedener *Phytaecia* aus dem Orient (*loc. cit.*), 1900, 2 p.*
- PIC (M.) : Sur le genre *Polyarthron* Serv. (*Miscell. entom.*), 1900, 2 p.*
- Id. : Neue Pedilidae und Anthicidae (*K. K. zool. bot. Gesells.*), 1900, 2 p.*
- Id. : Description d'un *Ocladius* nouveau d'Abyssinie. Quelques notes coléoptériques (*Bull. Soc. ent. Fr.*), 1900, 3 p.*
- Id. : Descriptions et habitats nouveaux de divers Coléoptères d'Algérie et d'Orient (*loc. cit.*), 1900, 3 p.*
- Id. : Contribution à l'étude des *Ptinidae* de l'Amérique centrale et méridionale (*Ann. Soc. ent. Belg.*), 1900, 8 p.*

A. L. et J. M.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 10 octobre 1900.

Présidence de M. P. MABILLE, ancien Président.

MM. de Beauchêne, de Vitré, Darboux, de Montpellier, et Pic, de Digoin, assistent à la séance.

Correspondance. — M. le capitaine Thouvenin, d'Oran, remercie la Société de son admission.

Démission. — M. E. Foray, de Roanne, a envoyé au Président sa démission de membre de la Société.

Nécrologie. — Le Président a le profond regret de faire part à la Société de la mort de M. H.-J. Lhotte, décédé le 30 juillet dernier. H.-J. Lhotte était un Lépidoptériste zélé et habile; il se livrait particulièrement à la recherche et à l'éducation des chenilles, et avait fait dans cet ordre d'études nombre de découvertes intéressantes dans les environs de Paris.

Nominations et distinctions honorifiques. — Le Président a le plaisir d'annoncer à la Société les nominations et promotions suivantes qui ont eu lieu depuis la dernière séance :

M. le Dr A. Foumouze, Trésorier honoraire, a été promu officier de la Légion d'Honneur.

— MM. de Claybrooke, M. Maindron, P. Nadar et A. Vollon ont été nommés chevaliers de la Légion d'Honneur.

— M. A. Bonhoure a été nommé Gouverneur de la Côte française des Somalis, à Djibouti.

— M. E. Oustalet a été nommé Professeur au Muséum d'Histoire naturelle de Paris (Mammalogie, Ornithologie).

— M. le Dr P. Marchal, après un brillant concours, a été nommé Professeur de Zoologie appliquée à l'Agriculture, à l'Institut agronomique de Paris.

— M. G. Darboux a été nommé Maître de Conférences de Zoologie à la Faculté des Sciences de Lyon.

— La Société entomologique de France a obtenu à l'Exposition universelle une médaille d'or pour l'ensemble de ses publications.

— Une médaille d'or a été également décernée à M. le Professeur A. Giard pour son exposition de Champignons entomophytes.

Admission. — M. Henri Rouzaud, receveur des Finances, Narbonne (Aude). *Entomologie générale et appliquée.*

Présentation. — M. Potier de la Varde, Granville (Manche) [*Coléoptères*], présenté par MM. de Larminat et E. Dongé. — Commissaires-rapporteurs MM. J. Magnin et Ph. Grouvelle.

Congrès des Sociétés savantes. — Le Président donne lecture d'une circulaire de M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts annonçant que le 39^e Congrès des Sociétés savantes s'ouvrira, à Nancy, le 9 avril 1901.

La circulaire de M. le Ministre insiste tout particulièrement sur les prescriptions suivantes :

Toute lecture sera, comme les années précédentes, subordonnée à l'approbation du Comité des Travaux historiques et scientifiques.

Les manuscrits devront être entièrement terminés, lisiblement écrits *sur le recto* et accompagnés des dessins, cartes, croquis, etc. nécessaires, de manière à ne pas retarder l'impression si elle est décidée.

Les mémoires devront parvenir, *avant le 20 janvier prochain*, au 5^e bureau de la Direction de l'Enseignement supérieur; il ne sera tenu aucun compte des envois adressés postérieurement à cette date.

Nomination de Membres honoraires. — Conformément à l'article 14 du Règlement, la Société procède à l'élection d'une Commission de cinq membres chargée de lui présenter, à la prochaine séance, une liste de candidats au titre de *Membre honoraire*. — Sont nommés membres de cette Commission MM. E.-L. Bouvier, A. Giard, A. Grouvelle, P. Mabille et E. Simon.

Changements d'adresse. — M. l'abbé V. de Bange, 4, montée de Fourvière, Lyon (Rhône).

— M. L. Clouët des Pesruches, villa Antoinette, au Bardo près Tunis (Tunisie).

— M. G. Darboux, 24, quai Claude-Bernard, Lyon (Rhône).

— M. J.-W. Holland, 5th and Bellefield avenues, Pittsburg, Pa., U. S. A.

— M. le Dr Normand, médecin major au 4^e Tirailleur, La Goulette (Tunisie).

— M. R. Peschet, commis-stagiaire à la Préfecture de la Seine, 11, rue Delouvain (19^e arrondissement), Paris.

Captures. — M. L. Bedel signale la capture, dans le domaine de Chantilly (Oise), des *Stenus Kiesenwetteri* Rosh., *lustrator* Er. et *Phytobius muricatus* Ch. Bris. qu'il a trouvés, cet automne, parmi les mousses d'un terrain marécageux situé presque au pied du viaduc de Coye, sur la ligne du Nord.

— M. Robert Brown annonce, dans une lettre adressée au Secrétaire, la capture d'un Lépidoptère nouveau, semble-t-il, pour la faune française :

« J'ai fait aux environs de Bordeaux la capture d'une Tinéite probablement nouvelle pour la faune de notre pays, du moins n'est-elle signalée, à ma connaissance, que de la Bavière rhénane; c'est *Nannodia Eppelsheimi* Stdgr., dont un Papillon m'est éclos, le 6 août dernier, de l'une de deux chenilles trouvées, le 19 juillet précédent, minant la feuille d'un *Silene* indéterminé, probablement *Silene nutans*.

« L'espèce ne semble pas très rare dans notre région, car j'avais trouvé, en même temps que les deux chenilles, huit ou neuf mines vides; de plus, elle est certainement bivoltine, car j'avais déjà capturé, dans le courant du printemps, deux de ces chenilles qui n'ont malheureusement donné naissance qu'à des Chalcidiens parasites. »

A propos du genre *Tetropiopsis* Chob. — M. Maurice Pic, faisant allusion à la note publié récemment par M. le Dr Chobaut (*Bull. Fr.* 1900, p. 264), déclare qu'il n'usera pas de son droit de réponse pour relever les personnalités contenues dans cet article.

Communications.

Sur la valeur phylogénique et le nombre primitif des tubes de Malpighi chez les Coléoptères

Par P. DE PEYERIMHOFF.

Les Coléoptères sont des insectes *Oligonephria* qui peuvent, sans difficulté jusqu'à présent, se diviser en deux groupes, *Tetranephria* et *Hexanephria*, selon qu'ils possèdent quatre ou six tubes de Malpighi. On n'a signalé encore aucune transition entre ces deux formes d'appareil urinaire.

Wheeler ⁽¹⁾ s'est préoccupé récemment de savoir lequel de ces deux nombres est le primitif, et s'appuyant en particulier sur le cas du *Melolontha*, où l'embryon est du type hexanéphrique, tandis que la larve et l'imago sont du type tétranéphrique, il a conclu de l'ontogénèse à la phylogénèse, et formulé la règle qui se trouve énoncée comme il suit dans un des plus récents traités d'entomologie : It is probable that the insects which never develop more than four Malpighian vessels have lost a pair during their phylogeny ⁽²⁾.

Si ce principe est exact, les Coléoptères *Hexanephria* sont phylogéniquement antérieurs aux *Tetranephria*, qui comprennent d'après les anatomistes : les *Caraboidea*, les *Necrophaga*, les *Hygrophili* (part.), les *Lamellicornia*, les *Buprestidae*, les *Elateridae*, les *Cantharidae* et les *Meloidae*.

Il est curieux tout d'abord de voir figurer dans ce groupe où doivent entrer, d'après la théorie de Wheeler, les formes les plus récentes, précisément les quatre familles qui ont été considérées, par les divers phylogénistes, comme les plus primitives de l'ordre :

1° Les *Carabidae* (*Caraboidea*) qui, selon Roger ⁽³⁾ « dem ursprünglichen Typus am nächsten stehen », et dont Packard ⁽⁴⁾ signale les relations avec les Névroptères.

2° Les *Staphylinidae* (*Necrophaga*) considérés par Brauer ⁽⁵⁾ et après lui par beaucoup d'autres auteurs comme « eine der ältesten Käferformen ».

3° Les *Cantharidae* (*Malucodermata*) que l'on doit, d'après Mayer ⁽⁶⁾, à cause du nombre des segments abdominaux libres et des ganglions nerveux, « als eine der ältesten Käferfamilien dem Protentomon nahe stehen », et que Roger ⁽⁷⁾ tient également, à cause de

(1) WHEELER (W.-M.). — The primitive number of Malpighian vessels in insects. *Psyche*, 1893, 539.

(2) A text-book of Entomology, by A.-S. Packard. *The Macmillan Co.*, 1898, p. 356.

(3) ROGER (Dr OTTO). — Das Flügelgeäder der Käfer. *Erlangen*, 1875 (*b. Ed. Besold*), p. 15.

(4) PACKARD (A.-S.). — On the Genealogy of the Insects. *Amer. Natur.*, 1883, 944.

(5) BRAUER (FR.). — Betrachtungen über die Verwandlung der Insekten, etc. *Verhandl. d. k. k. zool. bot. Ges. Wien*, 1869, 313.

(6) MAYER (Dr. P. in Jena). — Ueber Ontogenie und Phylogenie der Insekten, eine akademische Preisschrift. *Jenaische Zeitschrift*, 1876, 187.

(7) ROGER, *op. cit.*, p. 68.

leur nervation alaire, pour « den augestorbenen Stammformen der Käfer am nächsten verwandt ».

4^e Les *Meloidae*. « Le groupe des Vésicants apparaît donc comme le noyau primordial auquel seraient alliées, directement ou indirectement, toutes les autres familles des Coléoptères ⁽¹⁾ » (Houlbert).

Mais on ne peut, en vérité, donner raison à ces quatre théories à la fois. J'ai montré déjà ⁽²⁾ que celle qui concerne les *Staphylinidae* repose sur une interprétation erronée de la loi de Brauer. Il y a également, à mon avis, quelque invraisemblance à faire dériver tout un ordre d'une famille essentiellement parasite, telle que les *Meloidae*, que bien d'autres caractères semblent devoir ranger, au point de vue phylogénique, à une place assez secondaire. Néanmoins l'objection à la théorie de Wheeler persiste en ce qui concerne les *Caraboidea* et les *Malacodermata*, dont l'ancienneté relative est incontestable. Au surplus, elle n'a peut-être pas la force qu'on serait tenté de lui donner au premier abord : les variations des organes, en effet, sont souvent indépendantes, et il s'agit de savoir quel est celui d'entre eux qui représente le mieux l'évolution phylogénique. Il n'est pas absurde, a priori, de penser que l'appareil urinaire possède, à ce point de vue, une valeur supérieure à celle du système nerveux ou de la nervation des ailes inférieures.

Dans cette hypothèse, il resterait à établir solidement que le type hexanéphrique est antérieur au type tétranéphrique. Or, au fait même sur lequel Wheeler s'est appuyé pour formuler son principe, peut s'opposer un autre fait qui mène à la conclusion inverse. Au cours de recherches ayant pour but de préciser le nombre des tubes de Malpighi chez certaines familles, j'ai constaté que ce nombre est de six chez les *Cyphon* (*Dascillidae*) alors que leur larve (ainsi que celle du genre très voisin *Helodes*) est du type tétranéphrique, comme l'a décrit Rolph ⁽³⁾. Ainsi le cas des *Dascillidae* aquatiques est l'inverse du cas du *Melolontha*, à cela près que chez celui-ci le type embryonnaire se modifie dès la larve, tandis que chez le *Cyphon* il est conservé par la larve, et ne change que chez l'imago. On ne peut objecter, en effet,

(1) HOULBERT (C.) — Rapports naturels et phylogénie des principales familles de Coléoptères. *Miscellanea entomologica*, II, 1894, 61.

(2) P. DE PEYERIMHOFF. — Sur l'application de la loi phylogénique de Brauer. *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, 220.

(3) ROLPH (W.-H.) — Beitrag zur Kenntniss einiger Insektenlarven. Inaugural dissertation. Bonn, b. Carl Georgi, 1873, p. 34.

la possibilité que l'embryon du *Cyphon* soit du type hexanéphrique, car il faudrait alors qu'il perdît une paire de tubes à l'état larvaire, pour la récupérer à l'état d'imago, ce qui serait contraire à la règle bien connue de la non-réversibilité de l'évolution.

En résumé, le principe de Wheeler, qui est peut-être exact, ne repose encore que sur des données insuffisantes et critiquables, et l'étude de l'appareil urinaire chez les Coléoptères est elle-même trop peu avancée pour qu'on puisse faire état, dès maintenant, des quelques résultats connus. Mais cette étude me paraît extrêmement propre, une fois complétée, à éclairer la systématique et la phylogénie de cet ordre, et si j'ai appelé l'attention sur les faits qui précèdent, ce n'est pas pour le seul plaisir de mettre en opposition des théories et des auteurs d'ailleurs pleins de mérite; c'est tout au contraire afin de montrer l'intérêt qu'il y aurait à résoudre les contradictions, apparentes assurément, qui encombrant pour le moment cette question.

Note sur quelques Lépidoptères

observés par H. Lhotte aux environs de Paris

Par l'abbé J. DE JOANNIS.

Au mois de juillet dernier, notre collègue, Henri Lhotte, était enlevé subitement par une mort prématurée. Dans ses chasses nombreuses aux environs de Paris, depuis quelques années, il avait recueilli diverses observations qu'il eût été bien désirable de voir publier. M. E. Moreau, son gendre et son compagnon de chasse, a bien voulu me communiquer les quelques détails qui suivent et qui ont paru particulièrement intéressants.

a) *TORTRIX FORMOSANA* Hb.

Cette belle espèce, décrite de Russie méridionale, a été signalée de Taulanne (Alpes-Maritimes), par Millière (*Cat. rais. Alp.-Mar.*, III, 1876, p. 271), de Corse, par Ragonot, où elle avait été prise par M. P. Mabille (*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, p. 181), et, plus récemment, M. Dumont en avait signalé la capture à Lardy, le 11 juillet, à la lumière (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 27 oct. 1897, p. 254). J'ajouterai que M. L. Viard en a capturé six exemplaires, également à la lumière, au Vésinet, du 21 juillet au 2 septembre.

Toutefois, bien qu'assez répandue, ainsi qu'il semble, cette espèce était peu connue, la chenille spécialement n'avait pas été observée.

Millière, ayant pris le Papillon dans une forêt de Pins sylvestres, supposait que la chenille vivait sur cet arbre, et probablement sur ses fruits. M. Dumont avait annoncé effectivement qu'elle vivait sur le Pin, mais les détails étaient jusqu'à présent restés inédits.

La chenille de *T. formosana* loge sa toile à l'extrémité des branches du *Pinus sylvestris*. Cette toile se compose d'un tube assez court (deux ou trois centimètres), ouvert par les deux bouts et qui longe plus ou moins la tige, près des bourgeons terminaux. De plus, les aiguilles sont reliées entre elles, dans les environs de ce tube, par une toile très lâche et, en général, très peu abondante. L'un des traits les plus caractéristiques de cette toile est qu'elle ne dévie pas les aiguilles de leur position normale pour les réunir en paquet serré, comme font beaucoup de chenilles de Microlépidoptères, et ce trait rend fort difficile de voir, à distance, les branches attaquées, on aperçoit tout au plus quelques brins de soie qui ressemblent plutôt à une toile d'araignée. Très vive, cette chenille s'échappe d'ailleurs facilement par l'une ou l'autre extrémité de son tube suivant qu'on l'inquiète ici ou là. Elle mange les aiguilles du Pin sylvestre; elle a été observée aux mois de juin et juillet aux trois localités voisines, Bouray, Janville et Lardy (Seine-et-Oise).

En voici la description faite sur quatre exemplaires soufflés par H. Lhotte et que M. Moreau m'a communiqués.

Tête brun rouge, le triangle frontal plus foncé ainsi que quelques taches sur les calottes latérales. Écusson bien développé, brun rougeâtre, plus foncé à l'arrière et un peu plus clair à l'avant, accompagné, de chaque côté, d'une petite plaque brun jaunâtre. Corps gris lavé de rougeâtre, une teinte un peu plus rougeâtre indique vaguement une dorsale et une ventrale, celle-ci un peu moins indistincte. Stigmates très petits, sauf le dernier et surtout le premier. Points verruqueux blanchâtres, portant au centre un petit point noir d'où part un poil brun. Pattes cornées brun jaunâtre extérieurement, claires à l'intérieur, la base cerclée de brun noir intérieurement. Pattes membraneuses à crochets brun rougeâtre clair, trois petits points noirs pilifères à l'extérieur en avant du mamelon. Clapet anal brun rouge, parfois très peu marqué.

Chez l'une des quatre chenilles examinées, le corps est nettement plus rougeâtre que chez les autres.

La dépouille de la chrysalide est brun rouge, elle porte sur la moitié dorsale de chacun des sept derniers anneaux deux rangées transversales de pointes courtes à peine recourbées, le mucron est brun noir, un peu aplati, élargi et garni à l'extrémité de cinq ou six soies brun rouge, recourbées en crochet.

Le Papillon paraît ne pas voler pendant le jour, il se laisse tomber dans le parapluie quand on bat les branches et reste immobile.

b.) J'ajouterai ici une courte liste de quelques Lépidoptères pris aux environs de Paris par H. Lhotte et qu'il m'a paru intéressant de signaler; la plupart ont été pris à la lumière :

Cidaria polygrammata Bkh., Janville. — *Pyrausta perlucidalis* Hb., Janville, août. — *Chilo phragmitellus* Hb., Janville, fin juin. — *Euzophera fuliginosella* Hein., Janville, juillet. — *Nemotois albiciliellus* Stgr., Bouray (sablonnière), sur les fleurs d'*Omonis*, juillet. — *Hypercallia citrinalis* Scop., Bouray, Janville, Lardy, juin. — *Oecophora lambdella* Don., Janville, juin. — *Gracilaria simploniella* Fisch. R., Bouray, Lardy (juillet-août?). — *Coleophora wockeella* Zell., Janville, juillet. — *Agdistis satanas* Mill., Bouray (sablonnière), juillet.

Note complémentaire

sur *Caenoptera* (*Molorchus*) *Marmottani* Ch. Bris. [COL.]

Par Maurice Pic.

Je crois devoir ajouter les quelques renseignements suivants comme complément à la note publiée récemment, sur *Caenoptera Marmottani* Ch. Bris., par M. Valéry Mayet (*Bull. Fr.* 1900, p. 226).

Notre savant collègue omet de signaler le nom de *discicollis* Heyd. qui est synonyme de *C. Marmottani* Ch. Bris.

M. discicollis Heyd. a été décrit en 1876 (*Deuts. ent. Zeit.*, p. 383); il est mentionné dans plusieurs catalogues (catalogue de Marseul, catalogue de v. Heyden, Reitter et Weise). Le nom de *discicollis* méritait d'être cité, d'abord à titre de renseignement bibliographique, ensuite parce qu'il rappelle un habitat particulier.

Le ♂ de la collection V. Mayet n'est pas le premier exemplaire connu de ce sexe. En effet, M. L. von Heyden (*Die Käfer von Nassau und Frankfurt*, separ. p. 332) ⁽¹⁾ cite la capture d'un ♂ de *discicollis* à Mombach. Voici d'ailleurs la traduction de la note publiée par l'érudite entomologiste de Francfort : « La ♀ type (maintenant in coll. v. Heyden) a été trouvée sur *Spiraea* par M. le Dr Richter, à Rheingen, près de la maison d'aliénés d'Eichberg. Diffère de toutes les espèces par le prothorax large, presque arrondi et les élytres courts et larges. Le

(1) Extrait de : *Jahrbüchern des Nassauischen Vereins für Naturkunde*, XXIX et XXX, 1876-1877.

D^r Kirschbaum en a récolté un ♂ à Mombach ». — Dans la *Revue d'Entomologie* (1884, p. 336) la provenance de Nassau est du reste indiquée pour *C. Marmottani*.

M. G. Faust (*Hor. Soc. ent. Rossicae*, XIV) dans un article sur les *Cerambycidae* cite *Molorchus Marmottani* Ch. Bris.; il décrit (sépar. p. 13) les antennes du mâle et signale pour cette espèce l'habitat suivant : « Un ♂ de Samara; j'ai vu plusieurs exemplaires de la Russie méridionale dans la collection de M. Ballion. »

Je puis ajouter encore qu'il existe dans la collection Cl. Rey un *Molorchus* provenant du Beaujolais et nommé *Marmottani*, sans être à même toutefois d'affirmer que cet insecte se rapporte bien à l'espèce décrite par Ch. Brisout. J'ai dû reste déjà mentionné ce dernier habitat (*Matériaux Longicornes*, 1894, p. 55).

Comme on le voit par les renseignements qui précèdent, la répartition géographique de *C. Marmottani* est assez étendue et ne tend guère à confirmer que cette espèce soit une forme espagnole comme le suppose M. V. Mayet (cf. p. 227), bien qu'elle n'ait pas encore été signalée en Espagne

Notes sur quelques *Malthinus* paléarctiques (Col.)

(suite) ⁽¹⁾

Par J. BOURGEOIS.

17. *MALTHINUS SULCICOLLIS* Mars. — Je dois à l'obligeance de M. L. Bedel la communication d'un bel exemplaire ♂ de cette intéressante espèce; il provient de Nemours (Algérie). M. L. von Heyden m'en avait communiqué antérieurement un autre, étiqueté « Tunis ». *M. sulcicollis* présente une facies très analogue à celui de *longipennis* Luc.; mais, comme l'a fait remarquer de Marseul, il est de taille moindre, sa tête est oblongue et non transversale, ses antennes sont plus longues (elles atteignent presque l'extrémité du corps chez le ♂) et leurs articles, au lieu d'être coniques, sont légèrement comprimés à partir du quatrième. En outre, la forme des derniers segments abdominaux (♂) est toute différente dans les deux espèces. Chez *longipennis*, l'avant-dernier arceau ventral est divisé en deux moitiés latérales par une large incision longitudinale, à bords parallèles, qui s'étend sur toute la longueur, et le dernier arceau est peu renflé en dessous, tandis que, chez *sulcicollis*, l'avant-dernier arceau ventral est échancré en demi-cercle à son bord postérieur et le dernier est cupuliforme, comme

(1) Voir *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 368 et 1900, p. 91.

hez *biguttulus*, par exemple. De plus, chez *sulcicollis*, les palpes ne présentent pas l'article supplémentaire caractéristique des *Progeutes* ⁽¹⁾, ce qui, joint à la forme des derniers segments abdominaux dont je viens de parler, indique que cette espèce, malgré son analogie de facies avec *longipennis*, doit être rangée parmi les *Malthinus* sens. str., dans le voisinage du *M. rubricollis*.

48. *MALTHINUS SCRIPTUS* KIESW. ET SES VARIÉTÉS. — L'espèce type (*M. scriptus* Kiesw.) est rare. Elle a été décrite sur des individus trouvés au Montserrat (Catalogne). En France, je ne l'ai vue jusqu'à présent que de la région des Albères : Collioure, où M. Valéry Mayet l'a prise sur des Genêts, Banyuls, La Massane. On la reconnaît facilement à sa coloration générale d'un brun clair et à son prothorax entièrement d'un flave roussâtre à l'exception de deux larges bandes longitudinales noires qui ornent sa partie discale, sans atteindre ni la base, ni l'extrémité « *marginè omni et lineà medià longitudinali flavo-testaceis* » (Kiesenw., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1851, p. 611). A partir du front la tête est noire et parcourue dans son milieu par une ligne rousse. Le *M. flicornis* Kiesw. est une variété par excès du *M. scriptus*. Sa coloration générale est habituellement d'un noir brunâtre foncé, son prothorax est noir, à l'exception de la moitié ou du tiers postérieur des bords latéraux et d'un fin liséré basilaire qui sont jaunes « *lateribus basin versus et basi ipsa tenuiter flavo-limbatis* » (Kiesenw., *loc. cit.*, p. 612). La partie postérieure de la tête ne présente pas de ligne médiane rousse. Cette variété est surtout commune en Algérie et en Tunisie. Enfin, entre ces deux systèmes de coloration, on en rencontre d'intermédiaires — et ce sont les plus fréquents — où la tête est parcourue dans sa moitié postérieure par une ligne rousse souvent interrompue et où le prothorax, de même coloration que dans la variété *flicornis*, présente, en outre, un étroit liséré jaune à son bord antérieur. Dans quelques exemplaires même, on aperçoit, sur le disque du pronotum, la trace d'une fine ligne roussâtre qui, partant du liséré basilaire, tend à rejoindre le liséré antérieur.

J'ajouterai enfin, pour en finir avec cette espèce, que c'est à tort que

(1) La constatation de ce caractère est souvent difficile et demande quelque attention. Il faut bien se garder, en effet, de prendre pour un article adventif le pinceau terminal que forme souvent la pubescence à l'extrémité des palpes. Chez certaines espèces ce pinceau, de couleur plus claire que le reste, a l'apparence d'un petit article supplémentaire implanté sur le dernier. L'article adventif des *Progeutes* affecte une forme plutôt cylindrique et est en général plus ou moins tronqué au bout.

je l'avais considérée primitivement comme un *Progeutes* (*Revue d'Entom.*, XVI, 1897, p. 40). Par ses palpes non appendiculés et la forme des derniers segments de l'abdomen chez le ♂, elle doit rentrer dans les *Malthinus* sens. str.

49. *MALTHINUS VARUS* Bourg. = *NIGRIBUCCIS* Mars. ♂. — *M. BALTEATUS* Suffr. et *M. MERKLI* Weise. — *M. DELICATULUS* Bourg.

Au cours de son dernier voyage en Tunisie, M. Pic a eu la bonne fortune d'observer que, chez les *Malthinus* « la forme *varus* s'accouplait avec la forme *nigribuccis* » (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 287). Dès lors, il est de toute évidence que les *M. varus* et *nigribuccis* doivent être considérés, le premier comme le ♂ et le second comme la ♀ d'une seule et même espèce, qui prendra le nom le plus ancien, c'est-à-dire celui de *nigribuccis*.

Je ne suis pas éloigné de croire non plus, avec le même auteur, que *M. Merkli* Weise ne soit identique à *M. balteatus* Suffr., espèce dont C.-G. Thomson a, le premier, fait connaître les deux sexes, mais en les attribuant par erreur au *fuscatus* (*Skandin. Coleopt.*, VI, p. 194). Enfin, c'est encore bien volontiers que je sacrifie à M. Pic la variété *pratextus* que j'avais établie pour une coloration particulière du *M. Merkli*. J'avoue cependant m'être un peu égayé en me voyant relevé par cet entomologiste du péché de *variétisme*.

Mais là où je proteste, c'est quand notre collègue s'en prend à mon *M. delicatulus* qu'il prétend être « difficilement séparable de son *maritimus* » et devoir être « réétudié à nouveau avant d'être accepté comme valable ». Si, comme je l'ai toujours cru, une espèce *vaut* avant tout par sa description ⁽¹⁾, c'est, au contraire, le *maritimus* dont la validité est contestable. Rien, en effet, dans les quelques lignes que l'auteur consacre à cette espèce, n'est susceptible de la faire reconnaître (*L'Echange*, 1899, p. 49). Il n'y est pas dit un mot, par exemple, de la forme des tibias postérieurs chez le ♂. M. Pic, il est vrai, nous a révélé *depuis* que son *maritimus* présentait une structure de tibias analogue à celle du *delicatulus* (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 288). Mais pourquoi n'avoir pas signalé, dès le début, ce caractère si important? Pourquoi avoir même laissé supposer, en avançant que le *maritimus* pourrait bien n'être qu'une variété du *seriepunctatus*, que ses tibias sont *simples* comme chez ce dernier? De pareilles descriptions, à mon

(1) Voir ce que dit à ce sujet, avec infiniment de raison, M. J. Weise dans la Préface du VI^e volume de *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands* (p. v).

avis, ne sauraient prévaloir et un jour viendra, sans doute, où il en sera fait justice.

**Description d'une espèce nouvelle de *Nanophyes* [COL.],
parasite du *Sedum telephium* L.**

Par L. BEDEL.

Nanophyes (s. str.) **telephii**, nov. sp. — *Subglobosus, nitidulus, lutescens vel testaceus, elytris basi plaga nigra vel infuscata fere semicirculari, retro subcaudata, et apice limbo tenui nigricante ornatis, pectore abdomineque nigro-piceis; supra perparum pubescens, pilis in elytrorum superficie passim condensatis; subtus lateribus pectoris fere lanosus. Rostrum incurvatum, haud striatum. Antennarum clava triarticulata, haud infuscata. Prothorax laevior, fere calvus. Elytra subrotundata, interrallis striarum subconvexis. Femora omnia ante apicem spinulis duabus nigris, secundu praecedente breviora, distinctissime armata.* — Long. (rostr. excl.) 1,9-2,3 mill.

France centrale : Le Vernet (Allier); découvert par M. H. du Buysson dans les tiges florifères du *Sedum telephium* L. (1).

Ce joli *Nanophyes*, dont la coloration paraît très constante, ressemble au *N. hemisphaericus* Ol. et surtout à la var. *ulmi* Gerin. qui a, comme lui, le prothorax entièrement roux; il en diffère d'ailleurs très nettement par son rostre recourbé et dépourvu de stries longitudinales, par la surface du corps bien plus dégarnie de pubescence, les élytres plus arrondis en arrière, les fémurs tous également armés de deux épines noires, d'inégale longueur mais toutes deux bien visibles, par les antennes entièrement testacées, le rostre non ou faiblement rembruni, la grande tache foncée de la base des élytres presque semicirculaire, etc.

Au mois d'août dernier, M. H. du Buysson a retrouvé, près du Vernet, au carrefour connu sous le nom de « rond de la Dame » des *Sedum telephium* attaqués par ce *Nanophyes* dont il avait observé les mœurs quelques années auparavant. Il a bien voulu m'envoyer aussitôt

(1) La note sur les mœurs du « *N. hemisphaericus* var. *ulmi* » communiquée par R. du Buysson (*Bull. Soc. ent. Fr.* 1898, p. 254) s'applique exclusivement au *N. telephii* m.

Quant au *N. hemisphaericus* Ol., ses mœurs ont été observées très exactement par Léon Dufour (*Ann. Soc. ent. Fr.* 1854, p. 651); il vit, comme j'en ai constaté plus d'une fois, dans les tiges du *Lythrum hyssopifolium* L.

quelques tiges de la plante contenant le parasite déjà éclos et tout prêt à sortir. — Comme notre collègue, j'ai pu constater que le *N. telephii* provoque, le long des tiges florifères du *Sedum*, un renflement charnu, noueux, bien apparent, et qu'il accomplit sa dernière métamorphose dans une cavité spacieuse creusée par sa larve dans l'épaisseur de la partie tuméfiée. Chaque galle renferme un *Nanophyes*, très rarement deux, mais plusieurs galles sont ordinairement réparties sur une seule tige qui, malgré tout, fleurit comme d'habitude (1).

Description de deux Psélaphides nouveaux [COL.]

PAR A. RAFFRAY.

Le R. P. Wasmann a eu l'amabilité de m'abandonner deux Psélaphides myrmécophiles dont voici les descriptions :

***Pselaphus formicarius*, n. sp.**

Ovalis, totus nitidus, laevis, rufo-ferrugineus. Caput fronte triangulatum impressum et inter oculos bifoveatum. Antennae elongatae, articulis 1-2 majoribus, 3-6 triplo, 8 vix duplo latitudine sua longioribus, 9 subobconico, 7 longitudine aequali, 10 quadrato, 11 magno, ovali, acuminato. Prothorax latitudine sua paulo longior, subcordatus, basi ipsa transversim leviter impressa. Elytra magna, ovata, humeris leviter notatis.

♂ Metasternum magnum, totum concavum, circiter minute carinatum, fundo minute granulosum, tertia parte anteriori transversim carinatum. Abdomen infra totum excavatum, lateribus carinatum, segmento ultimo dorsali magno, apice truncato, bisinuato et minute trinodoso. Tibiis posticis elongatis, pone medium sinuatis, ante apicem intus inflatis et ciliatis. — Long. 1,25 mill.

Cette espèce diffère de *batrisoides* Sharp par la forme plus allongée, les articles des antennes plus longs.

Colombie : Dibulla. Avec *Prenolepis fulva*.

***Centrophthalmus monilicornis*, n. sp.**

Sat crassus, totus rufo-testaceus, parce granulosus et fulvo-setosus.

(1) Le *N. telephii* n'est pas le seul *Nanophyes* qui s'attaque aux *Crassulacées*; Durieu de Maisonneuve a découvert, il y a fort longtemps, les mœurs du *N. Durieui* Luc., espèce méditerranéenne qui vit, comme je l'ai vérifié moi-même en Algérie, dans les tiges des *Umbilicus*, plantes voisines des *Sedum*.

Caput triangulare, foveis tribus aequalibus, tuberculo frontali transverso, spina infra-oculari brevi, acutissima. Antennae crassae, articulis 1 cylindrico, 2-10 globosis, 2 sequenti paulo majori, 8-10 majoribus et leviter crescentibus, 11 ovato-elongato, basi truncato et apice obtuso. Prothorax subtransversus, antice plus et postice minus attenuatus, basi media foveata, utrinque (procul ab angulo) sulco brevissimo longitudinali, angulis posticis fasciculatis. Elytra latitudine sua vix longiora, basi valde attenuata, sulco dorsali lato, diffuso, ante medium evanescenti. Abdomen elytris fere longius, segmentis dorsalibus 2 primo fere duplo longioribus, leviter convexis, carinis lateralibus ad medium segmenti secundi abbreviatis. Pedes robusti, minus elongati. — Long. 2 mill.

Cette espèce diffère de toutes les autres par les antennes épaisses, à articles moniliformes, le prothorax court, ayant à la base, de chaque côté, en dedans de l'angle postérieur, une courte impression longitudinale.

Indes : Coonoor, Mts. Nelghiries. Avec *Prenolepis indica*.

Sur les antennes anormales des Hémiptères

Par Robert Brown.

Le phénomène ou cas tératologique signalé par MM. Chabanaud et Royer, dans le *Bulletin* n° 12 (séance du 27 juin 1900), d'une antenne anormale chez un Hémiptère, a été, à ma connaissance, déjà publié.

Dans le volume 32 des « Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux » (année 1878, pages 101-102 et 117-118 des procès-verbaux), feu Samie a signalé deux cas d'antennes anormales chez *Gonocerus juniperi*. Dans les deux cas, c'était l'antenne gauche de l'insecte qui ne présentait que trois articles, le troisième faisant complètement défaut. Samie entre, à ce sujet, dans quelques développements auxquels je ne peux que renvoyer ceux qu'intéresse la question.

Je possède moi-même un sujet du vulgaire *Syromastes marginatus* chez lequel l'antenné gauche offre exactement la même déformation; le troisième article fait totalement défaut, et le quatrième, au lieu d'être entièrement noir, a sa moitié antérieure de la même couleur que le second.

Bulletin bibliographique.

- Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances)*, 1900, II, 4-14. — H. COUTIÈRE : Sur quelques *Alpheidae* des côtes américaines. — A. GIARD : Sur l'existence de *Ceratitis capitata* Wied. var. *hispanica* de Brème, aux environs de Paris.
- Académie des Sciences de Cracovie (Bulletin international)*, 1900, juin et juillet. ☉
- Academy of Natural Sciences of Philadelphia (Proceedings)*, 1900, I. — V.-L. KELLOGG et SHINKAI J. KUWANA : Mallophaga from Alaskan Birds.
- Agricultural Gazette of N. S. Wales*, 1900, 7 et 8. — A. GALE : Bee wintering (2 art.). — W. FROGGATT : Notes on a Collection of Ticks determined by Prof. Neumann. — A. GALE : Bee Calendar (2 art.). — W. FROGGATT : Entomological Notes on Specimens received during 1899. — R.-W. PEACOCK : The Caterpillar Plague.
- American Association for the Advancement of Science (Proceedings)*. — 48^e Meeting, 1899 ☉.
- American Entomological Society (Transactions)*, XXVI, 3 et 4, 1900. — R. HAYWARD : A Study of the Species of *Tachys* of Boreal America. — N. BANKS : New Genera and Species of Nearctic Neuropteroid Insects. — W.-D. HUNTER : A Catalogue of the Diptera of South America, I. — H. SKINNER : Revision of the American Species of the Genus *Coenonympha* (1 pl.). — H.-F. BASSETT : New Species of North American Cynipidae.
- American Museum of Natural History (The)*, 1899.
- Annals and Magazine of Natural History (The)*, ser. VII, vol. 6, nos 32-34, 1900. — Miss G. RICARDO : Notes on Diptera from South Africa (*Tabanidae* and *Asilidae*). — G.-H. CARPENTER : Two Spiders new to the British Fauna (fig.). — H. GROSE SMITH : Description of a new Species of *Papilio* from B'wool, North Celebes. — W.-F. KIRBY : Notes on the Collection of African *Phasgonuridae* formed by Mr. W.-L. Distant in the Transvaal etc., with Descriptions of two new Species. — C.-O. WATERHOUSE : Description of a new Species of Buprestidae. — W.-L. DISTANT : Rhynchotal Notes, VI-VII. Heteroptera : *Dinidorinae*, *Phyllocephalinae*, *Urolabidinae*, *Acanthosominae*, *Coreidae* (2 art.). — L. WALSINGHAM : Asiatic *Tortricidae* (3 art.). — F. LANCHESTER : On some Malacostracous Crustaceans from Malaysia in the Collection of the Sarawak Museum (pl.). —

G. LEWIS : On new Species of *Histeridae* and Notices of others (pl.). — Miss G. RICARDO : Descriptions of five new Species of *Pangoninae* from South America. — COL. C. SWINHOE : New Species of Eastern and Australian Moths. — R.-I. POCKOCK : Some new Arachnida from Cape Colony. — The Scorpions of the Genus *Heterometrus*. — W.-M. KIRBY : Notes on some Insects from the Yang-Tse-Kiang. — H. GROSE SMITH : Description of a new Species of *Ornithoptera*. — A. HEMPEL : Descriptions of Brasilian *Coccidae*. — P. CAMERON : Description of new Genera and Species of Hymenoptera.

Archives provinciales des Sciences, 1^{er} août 1900. — J. ROGER : Étude sur les Coléoptères longicornes. — Nouvelles.

Berliner Entomologische Zeitschrift, 1900, I-II. — H. FRUHSTORFER : Rhopalocera Bazilana. Verzeichniss der von W. Doherty auf der Insel Bazilan gesammelten Tagfalter. — E. BRENSKE : Die *Serica*-Arten der Erde. — Dr KRIECHBAUMER : Von Ihrer K. Hoheit der Prinzessin Therese von Bayern auf einer Reise in Südamerika gesammelte Insecten. — Hymenopteren (pl.). — Dr GÜNTHER ENDERLEIN : *Epipsocus ciliatus* Hagen, eine Psocide des Bernsteins und die recente peruanische *Epipsocus nepos* nov. sp. (fig.). — J.-J. KIEFFER : Beitrag zur Kenntniss der um Bitsch vorkommenden Collembolen. — E. SUFFERT : Eine neue Aberration des *Danaus dorippus* Kl. aus Deutsch-Ostafrika. — H. STICHEL : Bemerkenswerthe Schmetterlings-Varietäten und Aberrationen (pl.). — Variation und Gynandromorphismus bei *Chlorippe vacuna* God. (pl.).

Canadian Entomologist (The), août et septembre 1900. — J.-B. SMITH : New Noctuids from British North America, with Notes on some others (pl.). — H. BIRD : New histories in *Hydroecia*. — O.-W. BARRETT : Some Notes on « The Cambridge Natural History, vol. VI. » — C.-W. FERNALD : On the North American Species of *Choreutis* and its allies. — C.-W. JOHNSON : New North American *Ortalidae*. — J.-S. HINE : Description of two new Species of *Tabanidae*. — E.-D. SANDERSON : The Larvae of *Donacia piscatrix* Lac. and *crassipes* Fabr. (pl.). — G.-H. FRENCH : A Parasite the supposed cause of some cases of Epilepsy (fig.). — F.-M. WEBSTER : *Harpalus caliginosus* as a Strawberry Pest, with Notes on other phytophagous Carabidae (pl.). — H.-G. DYAR : Partial Life-History of *Dichogama Redtenbacheri* Led. — J. FLETCHER : Description of the Full-grown Larva of *Grapta J-album*. — H. BIRD : New Histories in *Hydroecia*.

— H. OSBORN : The new Species of *Jassidae*. — H.-G. DYAR : Note on the genus *Dyaria* Neum.

Cincinnati Society of Natural History (Journal), XIX, 6, 1900. — E.-O. ULRICH : New American Paleozoic Ostracoda (pl.). — H. OSBORN : The Genus *Scaphoideus* (pl.).

Entomologische Nachrichten, XXVI, 15-18, 1900. — E. STRÄND : Einige arktische Aberrationen von Lepidopteren. — H.-J. KOLBE : Ueber einen neuen Rübenschädling vom Mittelrhein, *Ceutorhynchus Rubsaameni* n. sp., nebst Bemerkungen über einige verwandte Arten. — J.-D. ALFKEN : Die nordwestdeutschen *Proposis*-Arten. — F. KARSCH : Westafrikanische Pyraliden, I. — S. MATSUMURA : Uebersicht der Fulgoriden Japans. — R. JORDAN : Einige Bemerkungen zur Herrn Prof. Grote's Systema Lepidopterorum Hildesiae. — F. KARSCH : Vorarbeiten zu einer Orthopterologie Ostafrikas, II. Einige Gattungen Feldheuschrecken Acridodea (fig.).

Entomologist (The), XXXIII, 447-449, 1900. — W.-L. DISTANT : Description of a new Species of Cicadidae from China (fig.). — W.-J. LUCAS : Migrations of Dragonflies. — A. EAST : Notes on the Respiration of the Dragonfly Nymph. — P.-I. LATHY : Three new Species of Nymphalinae from Siam. — W.-J. LUCAS : British Dragonflies of the older English Authors (2 art.). — T.-D.-A. COCKERELL : On a small Collection of Bees from Juarez, Mexico. — G.-A.-K. MARSHALL : Mosquitos and Malaria. — A. QUAIL : Diphyletism in the Lepidoptera. — E.-G. ALDERSON : A Butterfly Hunter's Holiday. — F.-A. WALKER : Notes on *Triecphora sanguinolenta* Marsh. — G.-W. KIRKALDY : Bibliographical and nomenclatorial Notes on the Rhynchota, N° 1. — T.-D.-A. COCKERELL : Some Bees visiting the Flowers of Mesquite. — V. ST. CLARE MACKENZIE : The Ant-Hills at the Paris Exhibition. — A. EAST : Some additional Notes on *Aeschna cyanea*. — W.-L. DISTANT : On a small Collection of Lepidoptera from Pemba Island. — G.-W. KIRKALDY : On the Nomenclature of the Genera of the Rhynchota, Heteroptera and Anchenorrhynchous Homoptera. — Notes diverses.

Entomologist's monthly Magazine (The), 1900, N°s 435-437. — R.-C.-L. PERKINS : *Odynerus tomentosus* Thoms. a Species new to Britain, and some Remarks on the Walcott Collection of Aculeate Hymenoptera. — C. MORLEY : *Helcon annulicornis* Nees confirmed as British. — L. WALSHINGHAM : On *Tinea (Meessia) vinculella* H. S. and its European Allies, with Descriptions of new Species. — L. WALSHINGHAM et J.-H. DURRANT : *Blastobasis segnella* Z. a European

Species wrongly included in the American Lists, and *Opogona dimidiatella* Z., a Javan Species, inserted without justification in Staudinger's Catalog. — A.-E. EATON : *Berea articularis* Pict. an Addition to the British *Trichoptera* with further Notes on *Plectrocnemia brevis* Mc. Lachl. — J.-F. KING : *Neuroptera* collected in the upper portion of Strathglass in 1899. — E. GREEN : Note on the attractive Properties of certain larval Hemiptera (fig.). — F. MERRIFIELD : Experiments on the Colour-Susceptibility of the pupating Larva of *Aporia crataegi*, and on the edibility of its Pupa by Birds. — L. WALSINGHAM : Note on the *Phthoroblastis juliana* Crt., of Staudinger's Catalog. — W.-C. BOYD : Notes on *Psyche villosella*. — P.-I. LATHY : On the Species of *Amnosia* Westw. — G.-F. HAMPSON : On some teratological Specimens of Lepidoptera. — J.-W. YERBURY : Some Notes on the British Species of the Genus *Norellia*. — G.-C. CHAMPION : *Anchomenus 4-punctatus* De Geer confirmed as British. — F.-D. MORICE : Re-Occurrence of *Heriades truncorum* L. in England. — E. SAUNDERS : *Nomada atrata* Smith = *brevicornis* Schmied. re-admitted into the British List. — *Pompilus* (*Westmaelinus*) *sanguinolentus* F. and Addition to the British List. — L. WALSINGHAM : New Corsican and French Micro-Lepidoptera. — R. MAC LACHLAN : *Berthania prisca* Kolbe a Genus and Species of *Psocidae* new to Britain. — Abstract of an Article of M.-A. Lancaster on Migrations of *Libellula 4-maculata* in Belgium in June 1900. — *Agrium hastulatum* Charp. a new British Dragonfly. — E. SAUNDERS : *Crabro carbonarius* Dahlb. an Addition to the British List. — *Nabis brevis* Scholtz. an Addition to the British Hemiptera. — T.-A. CHAPMAN : A special Structure in the larva of *Eriocampa limacina*. — D. SHARP : Some undescribed Species of *Trogophloeus*, with a new Genus. — G.-C. CHAMPION : *Pachyta 6-maculata* L., at Nethy Bridge, Inverness-Shire. — R. NEWSTEAD : Observations on Coccidae (N° 48) fig. — Notes diverses.

Entomologist's Record and Journal of Variation XII, 8 et 9, 1900. — J.-W. TUTT : The connection between Primary and Secondary Sexual Characters in Lepidoptera. — T.-A. CHAPMAN : Further notes on the Fumeas. — J.-W. TUTT : Is the separation of the Papilionides from other butterflies warranted? — E. WASMANN : The Guests of Ants and Termites (Traduction). — J.-W. TUTT : Migration and Dispersal of Insects : Lepidoptera (2 art.). — M. BURR : The Distribution of Orthoptera found in Great Britain. — J.-H. et J.-W. TUTT : Lepidoptera in the Hautes-Alpes : Abries. — T.-A. CHAP-

MAN : The relationship of *Philea (irreorella)*, *Cybosia (mesomella)* and *Endrosa (aurita)*. — R.-H. HAMLYN-HARRIS : The Sagacity of Larva *Galleria mellonella (cereana)* L. — W. BATESON : British Lepidoptera. — W.-J. KAYE : Some diary Notes on the Season's Collecting. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes (La), XXX, 358-360, 1900. — H.-W. BRÜLEMANN : Matériaux pour servir à une faune des Myriapodes de France (2 art.) pl. — C. HOULBERT : Faune analytique illustrée des Orthoptères de France (pl.) (2 art.). — Notes diverses.

Frelon (Le), VIII, 8-12, 1900 (2 exempl.). — J. DESBROCHERS DES LOGES : Faunule des Coléoptères de la France et de la Corse (4 art.). — Premier supplément à la monographie des *Barididae*. — Tableau synoptique des *Cathormiocerus* de France et description d'une espèce nouvelle.

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, V, 15-18, 1900. — L. v. AIGNER-ABAFI : *Lycuena jolas* O. — Dr A. GIARDINA : Ein Beitrag zur Kenntniss des Genus *Machilis* Latr. (3 art.). — E.-H. RUBSAAMEN : Ueber Zoocecidien von der Balkan-Halbinsel (2 art.). — L. SORHAGEN : Beitrag zur Kenntniss der Gattung *Lithocolletis* (2 art.). — J.-J. KIEFFER : Beiträge zur Biologie und Morphologie der Dipteren. — W. POSPJELOW : Die Parasiten der Hessefliege in Russland (fig.). — O. SCHULTZ : Filarien in paläarktischen Lepidopteren (2 art.). — Dr C.-H. VÖGLER : Weitere Beiträge zur Kenntniss von Dipteren-Larven. — P. SPEISER : Ergänzungen zu Czwalinas « Neuem Verzeichniss der Fliegen Ost- und Westpreussens. — Petites communications originales.

Instructor (El), XVII, 3-4, 1900. ☉

K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (*Verhandlungen*), 4, 6, 1900. — Dr H. KRAUSS : Neue mediterrane Staphylinidea (Coleopt.) nebst Bemerkungen zu bekannten. — J. MÜLLER : Ueber *Acritus nigricornis* Hoffm. und *A. seminulum* Küst. — Dr H. REBEL : *Cledeobia Hampsoni*, eine neue paläarktische Pyralidine. — Dr A. STEUER : Mittheilungen ueber einige Diptomiden Oesterreichs.

Linnean Society of London. — 1^o Journal, XXVIII, 179, 1900. ☉ — 2^o Transactions, VII, 9-12, 1899-1900. ☉

Linnean Society of N. S. Wales (Proceedings), XXV, 1, 1900. — O.-B. LOWER : Descriptions of new Australian Lepidoptera. —

G.-A. WATERHOUSE : Descriptions of new species of Australian Rhopalocera (pl.).

Museo nacional de Montevideo (Anales), III, 14, 1900. ☉

Naturaliste (Le), XXII, 322, 324-325, 1900. — L.-C. COSMOVICI : Contributions à la faune de Roumanie (fig.). — C. HOULBERT : Genera analytique illustré des Coléoptères de France (fig.), 2 art. — M. PIC : Description de Coléoptères. — Dr L. LALOY : Les plantes de France, leurs Papillons et leurs chenilles (2 art.).

New York Entomological Society (Journal), VIII, 2, 1900. — TH.-L. CASEY : Review of the American Corylophidae, Cryptophagidae, Tritomidae and Dermestidae, with other Studies (fig.).

New York State Museum, VI, 31, 1900. — E.-P. FELT : 15 th Report of the State Entomologist on Injurious and other Insects of the State of New York.

Novitates zoologicae, VII, 2, 1900. — W. WARREN : New Genera and Species of American *Drepanulidae*, *Thyrididae*, *Epiplemidae* and *Geometridae*. — W. ROTHSCHILD : Some new or recently described Lepidoptera (pl.).

A.-L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 21 octobre 1900.

Présidence de M. A. GIARD

M. le Dr G. von Seidlitz, de Munich, assiste à la séance.

Nécrologie. — Le Président a le profond regret d'annoncer la mort du Dr Otto Staudinger, l'éminent Lépidoptériste de Dresde, qui depuis 42 ans faisait partie de notre société. Très laborieux malgré son grand âge et malgré les souffrances d'une maladie de cœur qui le minait depuis longtemps, le Dr Staudinger préparait une troisième édition du « Catalogue des Lépidoptères de l'Europe ». Tous les entomologistes feront des vœux pour que le Dr H. Rebel, collaborateur de Staudinger, assure l'achèvement de cette œuvre impatientement attendue.

— Un autre deuil non moins cruel a frappé récemment le monde de l'Entomologie. Le Professeur Joseph Mik, de Vienne, est mort le 15 octobre après une courte maladie, à l'âge de 62 ans. Bien qu'il ne fût pas membre effectif de notre société, Mik recevait nos publications en échange de l'important journal *Wiener entomologische Zeitung* dont il était le fondateur et un des principaux rédacteurs. Tous ceux de nos collègues qui s'occupent de Diptères savent avec quelle complaisance le savant viennois mettait à leur service sa vaste érudition. L'œuvre de Mik se compose en grande partie de fragments détachés dont l'utilisation serait difficile si lui-même n'avait pris soin d'établir à plusieurs reprises la bibliographie méthodique de ses miscellanées.

J. Mik s'intéressait vivement à nos travaux. — Dans le dernier numéro de *Wien. ent. Zeitung* (15 septembre 1900, p. 224) il rendait compte à ses lecteurs de l'œuvre utile que nous avons entreprise en revisant les *Statuts et Règlement de la Société entomologique de France*. « Ce code rajeuni que j'ai pris plaisir à lire nous est, disait-il, une garantie de l'action efficace qu'on peut attendre encore de cette puissante Société dont la vieille renommée remonte à 1832. On y sent l'ardeur au travail et la fraîcheur de la jeunesse. Et à cette occasion je tiens à signaler

avec insistance l'important progrès et l'excellente rédaction du *Bulletin* bimensuel qui reflète si bien la vie de la Société. »

Une pareille approbation venant d'une source si autorisée et une si bienveillante sympathie doivent à la fois encourager nos efforts et augmenter les regrets que nous cause la mort de l'illustre Diptérologiste.

Nomination. — Le Président est heureux d'annoncer à la Société que notre collègue M. le professeur A. Vayssière vient d'être nommé conservateur du Musée d'Histoire naturelle de Marseille (section de Zoologie).

Admission. — M. Potier de la Varde, Granville (Manche). *Coléoptères*.

Changement d'adresse — M. Mollandin de Boissy, au Beausset (Var).

Nomination de Membres honoraires. — Au nom de la commission de cinq membres chargée de présenter une liste de candidats au titre de *Membre honoraire*, M. le professeur E.-L. Bouvier, empêché d'assister à la Séance, a envoyé le rapport suivant :

Messieurs,

La Commission à laquelle vous avez confié le soin de dresser une liste pour la prochaine élection de *Membres honoraires*, s'est réunie, dans la journée d'hier, au siège de la Société, sous la présidence de M. le professeur A. Giard.

Elle n'a pas cru qu'il y avait de lieu de modifier la proportion des membres français et étrangers, telle que l'ont établie les élections de l'année dernière. Et comme il s'agit de remplacer notre éminent compatriote G. Balbiani et le savant zoologiste suédois G.-G. Thomson, elle vous propose la nomination d'un *membre français* et d'un *membre étranger*.

Passant ensuite au choix des candidats, votre Commission a pensé qu'elle répondrait au sentiment général et remplirait équitablement son rôle en prenant pour guide les indications qui se sont dégagées du scrutin, aux élections dernières. En conséquence, elle a cru devoir proposer à votre choix, pour chaque candidature, les deux savants qui, au dernier scrutin, ont obtenu le plus de voix après les membres élus. Tel est l'esprit dans lequel a été dressée, par *ordre alphabétique*, la liste suivante :

1^o POUR LE MEMBRE FRANÇAIS A ÉLIRE : MM. A. Fauvel, — P. Mabilie.

2° POUR LE MEMBRE ÉTRANGER : MM. le baron C.-R. d'Osten-Sacken, — S.-H. Scudder.

— Par application de l'article 14 des Statuts et Règlement de la Société, le Président rappelle que, conformément aux conclusions du rapport ci-dessus, la Société procédera à l'élection de *deux Membres honoraires* dans sa séance du 12 décembre prochain.

Tous les membres français, résidants ou non, peuvent voter soit directement, soit par correspondance. Pour les votes par correspondance, l'enveloppe signée et fermée contenant le bulletin de vote (qui aura lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés) devra parvenir entre les mains du Président de la Société, au siège social (Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente), au plus tard le mercredi 12 décembre 1900, à huit heures du soir, avant l'ouverture du scrutin.

Subventions. — M. Ch. Lahaussais, Trésorier de la Société, annonce qu'il a reçu les subventions du Ministère de l'Agriculture (600 fr.) et du Ministère de l'Instruction publique (500 fr.).

Captures et observations biologiques. — M. Ph. Grouvelle présente à la Société une larve peu connue, celle de *Luciola lusitanica* Charp., capturée en même temps que l'insecte parfait (♂ et ♀), à St-Martin-Vésubie (Alp.-Mar.), au mois de juillet dernier. — L'extrémité de l'abdomen est lumineuse chez cette larve, comme le supposait M. J. Bourgeois (*Fn. gall.-rhén.* IV, 1894, p. 87).

La femelle de *L. lusitanica* se distingue aisément du mâle par le mode d'émission des rayons lumineux, beaucoup plus faibles et surtout jaillissant sur les côtés seulement au niveau du 5^e segment abdominal, tandis que ceux émis par le mâle déterminent une auréole large et d'un éclat intense tout autour de l'arrière-corps.

Vu en dessous, *L. lusitanica* ♀ présente les segments 5 et 6 de l'abdomen (lumineux) comme divisés en quatre compartiments nettement séparés et dont les deux supérieurs affectent une forme exactement circulaire.

M. Grouvelle a trouvé en outre une femelle pondant au pied d'un vieux mur, au milieu d'herbes très humides. L'insecte était dressé, l'abdomen engagé dans une excavation circulaire peu profonde, son oviducte entièrement distendu, et, à ce moment, son appareil lumineux émettait une lueur continue presque équivalente en intensité à celle des mâles.

Communications.

Sur la biologie de *Chyliza vittata* Mg. [DIPT.]

Par Alfred GIARD.

On connaît très peu de choses sur le développement des *Psilinae*. C'est ce qui me détermine à publier l'observation suivante tout incomplète qu'elle soit.

Il y a quelques mois, notre collègue Ch. Pérez me communiquait un Diptère qu'il avait obtenu d'éclosion et dont il désirait savoir le nom. Bien que l'exemplaire fût en assez mauvais état, je reconnus cependant la femelle du rare *Chyliza vittata* Mg.

Les larves d'où provenait ce Diptère vivaient aux dépens des racines de *Neottia nidus avis* L. dans lesquelles elles creusent des galeries. Il est assez facile d'en recueillir aux environs de Paris dans les localités où croît l'Orchis nid d'oiseau, mais leur éducation présente certaine difficulté pour être menée à bien.

La larve de *Chyliza atriseta* Mg. a été observée par Perris et par Kaltenbach; elle vit dans la tige souterraine renflée d'*Orobanchë rapum* Thuil. Scholtz a trouvé les larves de *Chyliza leptogaster* Panz. dans une galle ligneuse grosse comme une noix sur la tige de *Spiraea opulifolia*, mais il n'a pu constater si cette galle était produite par le Diptère.

Les descriptions de Scholtz, Perris et Kaltenbach sont malheureusement insuffisantes pour permettre une utile comparaison des larves de *Chyliza* qu'ils ont étudiées avec celle de *Ch. vittata*.

PERRIS. Mém. d. l. Soc. des Sc. d'Agric. et des Arts de Lille, 1853.

KALTENBACH. Verh. d. n. Wesphal. Vereins d. preuss. Rheinlande, XXI, 228.

SCHOLTZ. Ent. Zeit. Breslau, Bd. 1-3, p. 13.

Description d'un *Otiorrhynchus* nouveau [COL.]

du nord de l'Afrique

Par Maurice PIC.

Otiorrhynchus (Arammichnus) Vaulogeri, n. sp. — *Oblongogastus*, *piceus*, *densissime griseo-squamosus*, *brevissime setulosus*, *antennis pedibusque dilutioribus*. — Long. 4,2-4,8 mill.

Hab. Mauritania.

Relativement étroit et plus ou moins allongé, noir de poix, revêtu de squamules grisâtres denses et fines, parfois mélangées d'autres rembrunies dessinant de vagues macules; des rangées de soies claires, courtes et espacées sur les élytres. Rostre épais et court, très élargi antérieurement; yeux à peine saillants. Antennes testacées, assez grêles; scape un peu plus long que la tête, presque droit, les 2 premiers articles du funicule, le 1^{er} surtout, longs, les derniers un peu élargis, massue oblongue. Prothorax parsemé de gros points plus ou moins apparents, plus long que large, nettement arrondi sur les côtés, plus étroit au bord antérieur qu'au postérieur, parfois orné d'une dépression longitudinale sulciforme sur le milieu du disque. Élytres, ornés de lignes de soies claires plus ou moins distinctes, en ovale allongé, atténués aux deux extrémités mais davantage en arrière, déclives postérieurement, subconvexes en dessus avec des stries peu marquées; épaules effacées. Pattes roussâtres ou testacé roussâtre, squamuleuses à l'état frais, assez longues, cuisses antérieures inermes, tibias antérieurs dilatés en saillies interne et externe à leur extrémité. — Long. 4,2-4,6 mill.

Tunisie : Sbeitla et Fériana (M. de Vauloger, in coll. de Vauloger et Pic); Sud-Est algérien : environs de Negrin (Dr Munier, in coll. Bedel).

Cette espèce est très remarquable par son revêtement écailleux très dense et déprimé, analogue à celui de certains *Bagous*, et par là très facile à distinguer des autres espèces de ce genre; elle est, en outre, de forme plus étroite et à ponctuation prothoracique bien moins marquée que *planithorax* Boh., dans le voisinage duquel on peut la placer.

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1900, II, 15-16. —

L.-G. SEURAT : Sur la morphologie de l'appareil respiratoire de la larve et de la nymphe du *Bruchus ornatus* Bohm.

Agricultural Gazette of N. S. Wales, XI, 9, 1900. — A. GALE : Bees and how to manage them. — Bee Calendar.

Annaes de Sciencias naturaes, VI, 1900. — I. BOLIVAR : Catálogo sinóptico de los Ortópteros de la fauna ibérica.

Archives provinciales des Sciences, II, 11, 1900. — E. CANNAVIELLO : Note sur les Phalènes de la région vésuvienne.

Biologia Centrali Americana. — G.-C. CHAMPION : Rhynchota-Heteroptera, II, pp. 305-336. pl. 19. — DISTANT : Rhynchota-Homoptera, pp. 41-56, pl. 6 et 7. — FOWLER : Rhynchota-Homoptera, II, pp. 265-280, pl. 17 et 18. — Acquis pour la Bibliothèque.

Canadian Entomologist, octobre 1900. — A.-R. GROTE : The Principle which underlies the Changes in the Neuration. — Types of Noctuid Genera. — C. ROBERTSON : *Nomada Sayi* and two related new Species. — W.-H. ASHMEAD : Classification of the Fossorial predaceous and parasitic Wasps, or the Superfamily *Vespoidea*. — T.-D.-A. COCKERELL : The N. Mexico Bees of the Genus *Coelioxys*. — W. BEUTENMÜLLER : Synopsis of Food-Habits of the Larvae of the Sesiidae. — E.-S. TITUS : Notes on Colorado Bees. — H.-G. DYAR : Notes on some N. American Species of Tineidae. — E.-M. EHRRORN : New Coccidae from California (pl.). — J.-M. ALDRICH : A question of Nomenclature. — F.-M. WEBSTER : Sudden Disappearance of the Purplane Sawfly *Schizocerus Zabriskei*.

Chicago Academy of Sciences (The), 1898. — Bulletin n° III, part. 1 of the Natural History Survey. ☉

Entomologische Nachrichten, XXVI, 19, 1900. — P. SPEISER : Uebersicht der Dipteren-Gattung *Cyclopodia* Kol. — KRIECHBAUMER : *Alomyia moerens* Pty. — E. REITTER : Uebersicht der mir bekannten Arten der Coleopteren-Gattung *Dila* Fisch. — Uebersicht der mit *Erodium* verwandten paläarktischen Coleopteren-Genera. — Uebersicht der bekannten zwei Arten der neuen Coleopteren Gattung *Diaphanidus* Reitt. — H. TETENS : *Papilio Sticheli* nov. sp. aut subsp. — G. VORBRINGER : Ueber *Dromius cordicollis* Vorbrg. — F. KARSCH : Ein *Sminthurus* aus dem Kaukasus.

Entomologist's Record and Journal of Variation (The), XII, 10, 1900. — J.-W. TUTT : Migration and Dispersal of Insects : Lepidoptera. — L. ROTHSCHILD : The Giant Flea : *Hystrihopsylla talpae* (pl.). — J.-H. and J.-W. TUTT : Lepidoptera in the Hautes-Alpes : Abries. — Notes diverses.

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1^{er} octobre 1900. — Dr C.-H. VOGLER : Weitere Beitrag zur Kenntniss von Dipteren-Larven (fig.). — O. SCHULTZ : Filarien in paläarktischen Lepidopteren. — Petites communications originales.

Museo nacional de Costa Rica (Informe), 1898-1900. — P. BOLLLEY : Ortópteros recogidos en Costa Rica desde 1890 a 1900 (pl.).

Naturforschenden Gesellschaft in Bern (Mittheilungen), N° 603-618,

684-711, 812-827, 937-961, 1018-1029. — 5 volumes 1867-1882. — Don de M. L. Bedel.

New York Entomological Society (Journal), septembre 1900. — J.-B. SMITH : New Species of Floridan Noctuidae. — H.-G. DYAR : Notes on the Larval-Cases of Lacosomidae (Pterophoridae) and Life-History of *Lacosoma chiridota* Grt. (pl.). — A.-C. WEEKS : Ovipositing of *Vanessa Antiopa*. — R.-W. DOANE : New North American Tipulidae (pl.). — N. BANKS : New Genera and Species of American Phalangida. — Dr R.-E. KUNZE : Notes on ova and Larva of *Hyperchiria pamina*.

Psyche, IX, 292-294, 1900. — N. DURAND : Notes on two Canadian Butterflies. — S. I. HUNTER, W.-S. SUTTON : The Melanopli of Kansas, III. — S.-H. SCUDDER : The clearwinged species of the Oedipodine genus *Mestobregma*. — H.-G. DYAR : Life histories of North American Geometridae, XIII-XV. — M. NEWBERRY, T.-D.-A. COCKERELL : Notes on the nesting of *Anthidium paroselae*. — S.-H. SCUDDER : Localities for western Tryxalinae. — A.-S. PACKARD : Occurrence of *Myrmeleon immaculatum* de Géer in Maine. — S.-H. SCUDDER : A list of the Orthoptera of New England. — A.-S. PACKARD : Occurrence of *Machilis variabilis* in Maine. — W.-M. WHEELER : The habits of *Myrmecophila nebrascensis* Bruner (fig.). — S.-H. SCUDDER : The Distribution of *Leptygma marginicollis* (Serv.). — G.-B. KING : Miscellaneous notes on Coccidae from Western Massachusetts. — S. HENSHAW : New England Orthoptera. — S.-H. SCUDDER : *Mantis religiosa* in America.

R. Accademia dei Lincei (Atti), 1900, I, 12; II, 4-6. — GRASSI et NOE : Propagazione delle filarie del sangue esclusivamente per mezzo della puntura di peculiari Zanzare. — Rendiconto dell' adunanza solenne del 10 giugno 1900.

Revista Chilena de Historia natural, IV, 5-7, 1900. — A. BORELLI : Di alcuni Scorpioni di Chile. — E.-C. REED : Cuatro especies de Himenopteros nuevas a la fauna de Chile. — Sinopsis de los Hemipteros de Chile.

Revue horticole, juillet 1900. ☉

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, juillet, 1900. — BERTHOUMIEU : Essai bibliographique sur l'Histoire naturelle du Bourbonnais.

Rovertani Lapok, VII, 4-6, 1900. — Nombreuses notes entomologiques en langue hongroise.

Royal Dublin Society, — 1° *Economic Proceedings*, I, 1, 1899; ☉. — 2° *Scientific Proceedings*, IX, 1, 1899; ☉. — 3° *Scientific Transactions*, VII (sér. II), 2. 4-7, 1899-1900; ☉. — 4° *Index to the scientific Proceedings and Transactions of the R. Dublin-Society from 1877 to 1898 inclusive*.

Royal Society of London. — 1° *Further Reports to the Malarian Committee*, 1900 by S.-R. CHRISTOPHERS and J.-W. STEPHENS (pl. et carte). — 2° *Proceedings*, LXVI, 432-434; LXVII, 435, ☉. — 3° *Philosophical Transactions*, sér. B., vol. 192. ☉

Royal Society of N. S. Wales (Journal and Proceedings), XXXIII, 1899. — TH.-L. BANCROFT : On the Metamorphosis of the young Form of *Filaria Bancrofti* Cobb (*Filaria sanguinis hominis* Lew., *F. nocturna* Manson) in the Body of *Culex ciliaris* L., the « House Mosquito » of Australia (fig.).

Royal Society of South Australia. — 1° *Memoirs* I, 2, 1900; ☉. — 2° *Transactions*, XXIV, 1, 1900. — J. TURNER : New Micro-Lepidoptera mostly from Queensland. — T. BLACKBURN : Further Notes on Australian Coleoptera, with Descriptions of new Genera and Species, XXVI.

Sociedad científica « Antonio Alzate » (Memorias y Revista), XIV, 5-6, 1900. ☉

Sociedad española de Historia natural (Actas), juin et septembre 1900. — DUSMET : Notas para el estudio de los Himenópteros de España, IV. — DE LA FUENTE : Datos para la fauna de la provincia de Ciudad-Real, XIII. — P. NAVAS : Notas entomológicas, VI; Algunas costumbres de las Hormigas y Hormigaleones. — R. ESCALERA : Descripciones de algunas nuevas especies de *Dorcadion*.

Societas Entomologica, XV, 9-14, 1900. — P. BACHMETJEW : Eine Bemerkung zur Fortpflanzung von Schmetterlings-Aberrationen. — FR.-W. KONOW : Neuer Beitrag zur Synonymie der *Chalastogastra* (Hym.). — H. SEEMAN-JASSY : Ueber die Tarantel (2 art.). — J. BREIT : Ueber die allmähliche Verdunkelung einiger Lepidopterenarten aus der Umgegend von Düsseldorf. — K. FRINGS : Verfolgung der Schmetterlinge durch Vögel. — H.-F. WICKHAM : Notes on Cicindelidae from the Southwestern United States. — F. HIMSL : Ein weiterer Beitrag zur Schmetterlingsfauna von Ober-Oesterreich (Linz und Umgebung). — C. v. HORMUZAKI : Eine merkwürdige Beobachtung ueber die Zeitvarietäten von *Lycaena argiades* Pall. in der Bukowina. — P. BACHMETJEW : Lähmung bei Lepido-

pteren infolge erhöhter Temperatur ihres Körpers (3 art.). —
Dr K. MANGER : Beiträge zur Coleopteren-Fauna der Rheinpfalz.

Societas Entomologica Rossica (Horae), XXXIV, 1-2, 1900. — Séances de
de la Société : Diverses notes entomologiques en langue russe. —
N. ZUBOWSKY : Beitrag zur Kenntniss der Sibirischen Acridiodeen.
— N. KOKUJEW : Symbolae ad cognitionem Braconidarum Imperii
Rossici et Asiae centralis, II (texte russe). — B.-E. JAKOWLEW : Des-
cription de deux nouvelles espèces de la famille des Lucanides
(fig.). — SEMENOW : *Pseudobrosca* Sem. (Coleoptera, Carabidae)
(texte russe et latin). — T. DE TSCHITSCHÉRINE : Note supplémentaire
sur le genre *Trichocellus* Ganglb. — B.-E. JAKOWLEFF : Nouvelles
espèces du genre *Dorcadion* Daln. — Note supplémentaire sur le
Neodorcadion Przewalskii. — SEMENOW : *Brosca* Putz. (Coleop-
tera, Carabidae) (texte russe et latin). — Coleoptera nova Rossiae
Europeae Caucasiae, VII. — B.-E. JAKOWLEFF : Nouvelles espèces
du genre *Sphenoptera*. — T. DE TSCHITSCHÉRINE : Notes sur les Platys-
matini du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, I-V. — N. KOKU-
JEW : Revisio specierum rossicarum ad Ichneumonidarum genus
Paniscus Grav. pertinentium. — B.-E. JAKOWLEFF : Étude sur les
espèces du genre *Sphenoptera* Sol. appartenant au groupe du *Sph.*
antiqua Ill. — A. SEMENOW : *Polyarthron Bedeli*, Coleoptera, Ceram-
bycidae (texte russe et latin). — S. MOKRZECKI : Zur Biologie der
Oberea oculata L. var. *borysthénica* (pl.). — A. SEMENOW : *Cal-
lipogon (Eoxenus) relictus* Sem. (Coleoptera, Cerambycidae).

Società zoologica Italiana (Bollettino), IX, 1-2, 1900. ☉

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire (Bulletin), VI, 6 et 7,
1900. ☉

Société des Sciences naturelles et d'enseignement populaire de Turare,
V, 6-8, 1900. ☉

Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France (Bulletin), X, 1
et 2, 1900. — J. DOMINIQUE : Additions et Annotations au catalogue
des Orthoptères de la Loire-Inférieure.

Société d'étude des Sciences naturelles de Nîmes (Bulletin), XXVII, 1900.
— G. MINGAUD : Nouvelles captures de *Platypsyllus castoris* Rits. et
de larves de ce Coléoptère (fig.). — Dr A. CHABAUT : La Chasse aux
Coléoptères, en hiver, sous les écorces du Platane dans le départe-
ment du Gard, en face d'Avignon. — J. GAL : Études sur les vers
à soie. — G. MINGAUD : La *Phyllotoma aceris* Kalt., dans le Gard et
dans l'Hérault. — Dr A. CHABAUT : Mœurs et métamorphoses du

Platypsyllus castoris Rits., insecte Coléoptère, hôte du Castor (fig.).

— G. MINGAUD : Pupes et Diptères trouvés dans une momie. —

Le *Bruchus irseectus* Fähr. parasite des haricots cultivés.

Société d'étude des Sciences naturelles de Reims (Bulletin), X, 2-3, 1900.



Société Linnéenne du Nord de la France (Bulletin), n^{os} 326-328, 1900.

— M. DUBOIS : Contributions à la faune entomologique de la Somme.

— G. BREDDIN : Le Mimétisme chez les Hémiptères (trad.) (2 art.).

Société Entomologique de Belgique. — 1^o *Annales* XLIX, 7-9, 1900. —

A. LAMEERE : Insectes nouveaux ou rares pour la Belgique. —

Contribution à l'étude de la faune entomologique de Sumatra.

A. GROUVELLE : Nitidulides, Colydiides, Rhysodides, Cucujides,

Monotomides, Cryptophagides, Tritomides, Dryopides. A. LÉ-

VEILLÉ : Trogositides. — H. CLAVAREAU : Catalogue de Lagriides.

— CH. KERREMANS : Buprestides nouveaux et remarques synonymi-

ques. — A. LAMEERE : Notes pour la classification des Colé-

optères. — 2^o *Mémoires*. — CH. KERREMANS : Buprestides de Sumatra.

— Buprestides Indo-malais. — M. JACOBY : Indian Phytophaga. —

E. BRENSKE : Melolonthiden.

South African Museum (Annals), II, 2, 1900. ○

Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie, VIII fasc. 70. — ERN.

ANDRÉ : Monographies des Mutillides, pp. 65-144; pl. IV-VI.

Spelunca. — *Bulletin de la Société de Spéléologie*, V, 17-20, 1899. —

A. VIRÉ : La faune souterraine de France.

Stavanger Museums (Aarsberetning), 1899-1900. — T. HELLIESEN :

Bidrag til Kundskaben om Norges coleopterfauna, VII.

Stettiner Entomologische Zeitung, LXI, 1-6, 1900. — R. LOHDE : Cle-

ridarum Catalogus. — Dr H. HORN : Ueber schädliche Insekten und

ein Sachverständiges Gutachten. — F. OHAUS : Bericht über eine

entomologische Reise nach Centralbrasilien.

Tufts College Studies, n^o 6, 1900. ○

Union Apicole (L'), 8-10, 1900. — Entomologie agricole (3 art.).

U. S. Departement of Agriculture, Division of Entomology. — 1^o *New*

Series, Bull. 24, 25, 1900. — N. BANKS : A List of Works on North

American Entomology. — L.-O. HOWARD : Notes on the Mosquitoes

of the United States (fig.). — 2^o *Technical Series*. — A.-L. QUAINANCE :

Contributions toward a Monograph of the American Aleurodidae

(pl.). — N. BANKS : The Red Spiders of the United States (fig.).

Wiener Entomologische Zeitung, XIX, 8, 1900 (2 exempl.). — H. KRAUS : Beitrag zur Kenntniss der Käfer-Untergattung *Hypera* Germ. i. sp. (Donus Jekel). — L. CZERNY : Eine neue *Scatophila* (Dipt.) aus Oesterreich. — G. STROBL : Spanisch Dipteren, XII. — E. REITTER : Neue von Herrn J. Sahlberg auf seinen Reisen in Corfu, Palästina und Centralasien gesammelte Coleopteren.

Zoological Society of London. — 1^o List of the Fellows, 1900. — 2^o Proceedings, 1900, II-III. — E.-M. SHARPE : On a Collection of Butterflies from the Bahamas (pl.). — M. JACOBY : On new Genera and Species of Phytophagous Coleoptera from South and Central Africa (pl.). — W. BATESON : On a Case of Homœosis in a Crustacean of the Genus *Asellus*; Antennule replaced by a Mandible (fig.). — C. WARBURTON : On a remarkable Attid Spider from Borneo, *Mantisultra trucidans* n. g. et sp. (fig.). — PH. CROWLEY : On the Butterflies collected by the late Mr. J. Whitehead in the Interior of the Island of Hainan (pl.). — TH. R. STEBBING : On some Crustaceans from the Falkland Islands collected by Mr. R. Vallentin (pl.). — L.-A. BORRADAILE : On some Crustaceans from the South Pacific, IV. The Crabs (pl.). — W.-F. LANCHESTER : On a collection of Crustaceans made at Singapore and Malacca, I, Crustacea Brachyura (pl.).

AULARD (A.) : Discours prononcé à la Séance générale du Congrès des Sociétés savantes de 1900. — Paris, 25 p.*

BERG (C.). — Nova Hemiptera faunarum Argentinae et Uruguayensis. (*Ann. Soc. cient. Arg.*), 1892, 112 p.*

BIOLLEY (P.) : Ortópteros de Costa Rica. (*Inf. Mus. nac.*), 1900, 17 p.*

BLANCHARD (R.) : Instructions à l'usage des médecins, des naturalistes et des voyageurs. (*Bull. Ac. méd.*), 1900, 59 p., fig.*

BOLIVAR (I.) : Catalogo sinóptico de los Ortópteros de la fauna ibérica. (*Ann. de Sc. nat.*), 1900, 70 p.*

ID : Les Orthoptères de St-Joseph's College à Trichinopoly (Sud de l'Inde). (*Ann. Soc. Ent. Fr.*), 1900, 2 pl.*

BORDAS (L.) : Recherches sur les organes reproducteurs mâles des Coléoptères. (*Ann. Sc. nat.*), 1900, 166 p. 11 pl. n.*

BRÖLEMANN (H.-W.) : Sur le travail du Dr Verhoeff intitulé : Ueber Doppelmännchen bei Diplopoden. (*Bull. Soc. zool. Fr.*), 1900, 6 p.*

CHEVREUX (Ed.) : Résultats des campagnes scientifiques accomplies sur

son yacht par Albert I^{er}, prince souverain de Monaco. XVI^e fasc. Amphipodes provenant des campagnes de l'*Hirondelle*. Monaco, 1900, 195 p., 18 pl.*

CHEVREUX (ED.) : Campagnes de la *Melita*, description d'un Amphipode nouveau appartenant au genre *Grubia* Czern. (*Bull. Soc. zool. Fr.*), 1900, 7 p., fig.*

CHOBART (D^r A.) : De la place à assigner parmi les Longicornes au genre *Tetropiopsis* Chob. — Description d'un Longicorne nouveau du nord de l'Algérie. (*Bull. Soc. Ent. Fr.*), 1900, 4 p., fig.*

Id : Espèces nouvelles d'Insectes Coléoptères trouvées en ces dernières années dans le département de Vaucluse et dans les départements limitrophes. (*Mém. Ac. Vaucl.*), 1900, 8 p.*

DUHOURCEAU (D^r E.) : Taenias et Taenifuges. Paris, 1900, 63 p., fig.*

GIARD (A.) : Sur les métamorphoses d'*Hyperaspis concolor* Suffr. — Le *Mutilla europaea* L. dans le nord de la France. (*Bull. Soc. Ent. Fr.*), 1897, 2 p.*

HAMPSON (G.-F.) : Catalogue of the *Arctiidae* (*Nolinae*, *Lithosianae*) in the Collection of the British Museum, II, av. atlas. (*Br. Mus.*), 1900.*

HOULBERT (C.) : Faune analytique illustrée des Orthoptères de France. (*F. Jeun. Nat.*), 1900, 55 p., pl. — Candidature au Prix Dollfus.

HUNTER (S. J.) : Coccidae of Kansas, III. (*Kans. Univ. Quart.*), 1900, 9 p., 7 pl.*

JOANNIS (J. DE) : Les Mangeuses de corne. (*Rev. Quest. Sc.*), 1897, 22 p. fig.*

Id : Note sur une Phycide vivant en parasite dans un nid de chenilles provenant de Mayomba (Congo). (*Bull. Mus. Hist. nat.*), 1900, 4 p., fig.*

LAMEERE (AUG.) : Notes pour la classification des Coléoptères. (*Ann. Soc. ent. Belg.*), 1900, 25 p.*

LAPOUGE (G. DE) : Phylogénie des *Carabus* (suite). (*Bull. Soc. Sc. méd. Ouest*), 1900, 9 p.*

LEFEUVRE (D^r CH.) : La contraction musculaire chez l'Insecte. Paris, 1900, 112 p., pl. et fig. — Don de M. A. Lèveillé.

A. L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 14 novembre 1900.

Présidence de M. A. GIARD.

Correspondance. — MM. W.-W. Froggatt, de Sydney, Potier de la Varde, de Granville, et M.-J. Rivera, de Chillan, remercient la Société de leur admission.

— M^{me} Camilla Mik, par lettre adressée au Président, remercie la Société pour les sentiments de condoléance exprimés à l'occasion de la mort du professeur Joseph Mik, son mari.

Distinctions honorifiques. — Le Président a le plaisir d'annoncer à la Société que sur la liste des nouveaux commandeurs du Mérite agricole promus à l'occasion de l'Exposition, par décret du 27 octobre, figurent les noms de nos collègues MM. F. Henneguy et P. Viala.

— Lors de la distribution des récompenses de l'Exposition, une médaille de bronze a été accordée à notre collègue E. Olivier pour l'intéressante *Revue du Bourbonnais* qu'il dirige depuis treize ans.

Nécrologie. — Le Président a le profond regret de signaler à la Société la mort de M. Armand David, missionnaire lazariste, chevalier de la Légion d'honneur, décédé à Paris le 10 novembre à l'âge de 74 ans.

A. David n'était pas membre de notre Société, mais son ardente passion pour les sciences naturelles l'avait poussé à étudier tous les groupes du règne animal, et les récoltes entomologiques qu'il fit en Chine et au Thibet sont d'une extrême richesse.

En 1860, après quelques années consacrées à l'enseignement, Armand David, alors âgé de 34 ans, fut envoyé par ses supérieurs dans la mission de Chine où il utilisa ses aptitudes spéciales en faisant connaître la géographie, la géologie et la botanique de régions à peine connues : l'Ourato en Mongolie, les environs du Kou-Kou-Noor et la chaîne des monts de Ts'in-Lin du côté du Chen-Si.

En même temps le zélé missionnaire enrichissait les collections na-

tionales du Muséum de nombreux échantillons zoologiques recueillis souvent au péril de sa vie.

La majeure partie des Mammifères ont été décrits par A. Milne-Edwards dans les *Nouvelles Archives du Muséum*. En 1877, M. David publia, en collaboration avec le Dr E. Oustalet, son splendide ouvrage *Les Oiseaux de la Chine* avec un atlas de 124 planches coloriées. Plus de 800 espèces d'Oiseaux y sont décrites.

Quant aux collections entomologiques, elles furent longtemps inutilisées et inabordables pour ceux qu'elles pouvaient intéresser⁽¹⁾. Depuis la mort d'E. Blanchard elles ont été en partie confiées à des spécialistes, et notre collègue M. Tschitschérine en a commencé la publication.

Dans les dernières années de sa vie Armand David, dont la santé était usée, mais dont la vive intelligence et la charmante bonté se sont conservées jusqu'à la fin, vivait retiré à la maison mère où il avait repris les fonctions modestes de professeur, cherchant à communiquer aux jeunes missionnaires le goût des sciences qu'il avait tant aimées.

Par une disposition dont se réjouiront tous les amis de l'Entomologie, A. David a légué à notre collègue M. René Oberthür tous les Coléoptères de sa collection personnelle comprenant des récoltes considérables faites par divers missionnaires à Madagascar, en Abyssinie, au Brésil, etc., et surtout la série la plus complète qui ait été réunie jusqu'ici des Coléoptères du Nord de la Chine et du Yunnan, avec les types de presque toutes les espèces qui ont été décrites dans les *Annales* des Sociétés entomologiques de France et de Belgique.

Entre les mains de M. R. Oberthür de pareils trésors serviront longtemps encore, nous en avons l'assurance, aux progrès de la science et à la gloire de celui qui les avait rassemblés.

— Le Président annonce également le décès de deux membres de la Société, M. Henri Delamain, de Jarnac, et M. le Dr H. Vallantin, de Paris.

Démissions. — MM. L. de Dembowski, de Varsovie, le professeur H. Osborn, de Columbus (Ohio), et le baron V. von Röder, de Hoyrn, ont envoyé leur démission de membres de la Société.

Présentations. — M. Rodolphe Homberg, 36, rue Blanche, Paris [*Lépidoptères européens*], présenté par M. l'abbé J. de Joannis. — Commissaires-rapporteurs MM. C. Dumont et P. Mabille.

(1) Quelques Papillons seulement furent décrits par nos collègues Ch. Oberthür et G.-A. Poujade.

— M. Cl. Houard, préparateur à la Faculté des Sciences, 42, rue Pouchet, Paris [*Entomologie générale, pr. Cécidies*], présenté par M. Ph. François. — Commissaires-rapporteurs MM. J. Künckel d'Herculais et P. Lesne.

— M. le Dr François Pommierol, conseiller général, à Gerzat (Puy-de-Dôme) [*Entomologie appliquée*], présenté par M. A. Giard. — Commissaires-rapporteurs MM. P. Marchal et A. Lécaillon.

Changements d'adresse. — M. R. Dejean, 14, rue de Puteaux, Paris.

— M. le marquis Giacomo Doria, Museo civico di Storia naturale, Genova (Italie).

— M. J. Duchaine, 25, rue de la Solidarité, Vincennes (Seine).

— M. P. Guilliou, 50, rue de Vanves, Paris (14^e arrond.).

— M. le capitaine Thouvenin, à Lalla-Marnia, province d'Oran (Algérie).

— M. J. Sainte-Claire Deville, 12, rue Penchienati, Nice (Alpes-Maritimes).

Concours pour l'étude des Insectes ou Vers des livres. — Le Président annonce qu'au cours du Congrès international des bibliothécaires, tenu à Paris les 20, 21, 22 et 23 août 1900, il a été institué, par un donateur qui désire garder l'incognito, deux prix : l'un de 1.000 francs, l'autre de 500 francs, destinés à récompenser les deux meilleurs mémoires relatifs aux vers et aux insectes qui détruisent les livres. Un second donateur, qui veut également conserver l'anonymat, a fondé un prix unique de 1.000 francs à décerner à l'étude la plus sérieuse présentée sur le même sujet, mais dans laquelle l'auteur se sera plus spécialement occupé des vers ou insectes qui s'attaquent aux reliures des volumes.

Après entente avec les fondateurs, la Commission du Congrès des bibliothécaires a arrêté, ainsi qu'il suit, les conditions du concours :

I. — Un premier prix de 1.000 fr. et un second prix de 500 fr. seront décernés aux deux meilleurs mémoires présentés sur ce sujet :

Étudier d'une façon scientifique les vers ou insectes qui s'attaquent aux livres; déterminer leurs genres et leurs espèces; décrire leurs modes de propagation, leurs mœurs, leurs ravages; définir les matières dont ils se nourrissent, celles qui les attirent, celles qui les font fuir ou les font périr; indiquer les meilleurs moyens à employer pour les détruire et les chasser quand ils ont envahi une bibliothèque, pour préserver de leur invasion les bibliothèques encore indemnes.

II. — Un prix unique de 1.000 fr. sera décerné, à la même époque et dans les mêmes conditions, à un autre mémoire sur le même sujet, mais avec cette différence toutefois que le mémoire qui pourra être récompensé par ce prix sera consacré à l'étude des vers et insectes qui s'attaquent plus particulièrement à la reliure des livres.

III. — Les mémoires devront être adressés, avant le 31 décembre 1901, au Secrétaire général du Congrès des bibliothécaires.

IV. — Si les mémoires présentés à la date du 31 décembre 1901 ne semblent pas au jury d'un mérite suffisant pour obtenir les récompenses offertes, le concours sera prorogé au 31 décembre 1902. Si à cette date encore aucun mémoire digne d'être récompensé n'avait été présenté, le concours serait prorogé une seconde fois jusqu'au 31 décembre 1903; mais après ces deux prorogations le concours serait annulé.

V. — Il est bien entendu que le désir des donateurs n'est pas de faire attribuer une récompense aux personnes qui enverraient simplement des formules et recettes, ou qui signaleraient des moyens empiriques généraux pour détruire les insectes et les vers ou les éloigner des livres.

VI. — Les manuscrits envoyés ne seront pas rendus.

Les mémoires, ainsi que les demandes de renseignements, doivent être adressés à M. Henri Martin, Secrétaire général du Congrès des bibliothécaires, à la bibliothèque de l'Arsenal, rue de Sully, 1, à Paris.

— Le Président ajoute que le programme du concours n'a pas encore été soumis à la Commission d'organisation du Congrès. Mais d'après les renseignements qu'il a obtenus il est probable qu'il n'y sera pas apporté de très grandes modifications. Les membres de la Société qui désireraient concourir peuvent donc dès à présent se mettre à l'œuvre, les questions posées exigeant de sérieuses et longues recherches.

Captures et observations biologiques. — M. le Dr Paul Marchal annonce la découverte d'un nouveau Proctotrypide aquatique qui est parasite des œufs de *Gerris*.

Cet Hyménoptère se sert de ses ailes pour nager, comme le *Polynema natans*, mais, contrairement à ce qui a lieu pour cette espèce, il peut également se servir de ses ailes pour voler.

La description complète et l'observation des mœurs de cet intéressant petit Insecte, auquel M. Marchal donne le nom de *Limnodytes gerriphagus* (n. gen. n. sp.), paraîtront dans le prochain fascicule des *Annales*.

Communications

Description d'une nouvelle espèce

du sous-genre *Pseudoderus* Seidl. (gen. *Platysma* Bon.) [COL.]

Par T. TSCHITSCHÉRINE.

Pseudoderus capito, sp. n. — Brun de poix, élytres ♂ luisants, ♀ assez ternes; pattes, antennes et palpes rouge ferrugineux, les tibias et les tarses parfois plus ou moins rembrunis. Tête très grosse pour la taille de l'insecte, beaucoup plus grande que chez les autres espèces de ce sous-genre, entièrement assez fortement ponctuée à l'exception d'un espace lisse entre le rebord antéoculaire et les impressions frontales; celles-ci assez marquées, dépassant plus ou moins le bord antérieur des yeux ⁽¹⁾; épistome légèrement échancré; yeux assez convexes et saillants (un peu moins chez la ♀ que chez le ♂), mais assez enchâssés, postérieurement dans les tempes qui ne sont qu'un peu moins longues que l'œil même et assez graduellement (non brusquement) convergentes vers les côtés du col; celui-ci épais; milieu du vertex tout à fait uni ou, du moins, sans dépression transversale distincte. Antennes assez grêles, les deux premiers articles glabres, le troisième garni, vers l'extrémité, de petits poils très courts mais distincts. Pronotum un peu plus large que la tête avec les yeux (env. d'un 1/2 mill.), à peu près d'un tiers plus large que long, à diamètre maximum vers le tiers antérieur de la longueur médiane, assez fortement rétréci vers la base qui est beaucoup plus étroite que le bord antérieur et *pas plus large que le pédoncule du mésothorax*, auquel elle s'adapte exactement et qui la sépare de la base des élytres; bord antérieur légèrement échancré; côtés modérément arqués (vers la base, leur courbe n'est qu'assez légère) et tombant obliquement en dedans sur le bord basal qui est légèrement échancré en arc; angles postérieurs ouverts, à sommet modérément arrondi; surface modérément convexe, base manifestement transversalement déprimée au milieu, entièrement ponctuée, la ponctuation assez marquée mais pas bien abondante et médiocrement serrée (notamment au milieu); sillons basilaires (1 de chaque côté) bien marqués, arqués par la base vers le sommet des angles postérieurs, plus ou moins pon-

(1) Chez l'un des deux individus que j'ai sous les yeux (une ♀), les impressions frontales deviennent plus faiblement marquées en arrière; ce doit être purement accidentel.

tués au fond et sur les bords; rigole latérale très étroite, cependant quelque peu ponctuée ⁽¹⁾, déterminant *parfois* un étroit et très petit aplatissement oblique contre le sommet des angles postérieurs; bourrelet latéral externe très fin partout. Élytres modérément convexes, en ovale oblong, un peu plus de moitié plus longs que larges (♂ 1, 7 fois aussi longs que larges, ♀ 1,6 fois) et environ de deux cinquièmes plus larges que le pronotum, très faiblement ou à peine sensiblement sinués de chaque côté devant l'extrémité; épaules extrêmement obtuses et presque effacées, cependant le sommet en est indiqué par l'extrémité du repli basilaire qui, *sans être saillante latéralement*, forme avec le rebord latéral un angle à sommet quelque peu relevé; stries bien marquées, plus ou moins ponctuées ou pointillées au fond; interstries ♂ quelque peu subconvexes, ♀ à peu près plans, le 3^e avec 4 ou 6 pores espacés sur toute sa longueur ⁽²⁾. En dessous, les côtés du corps sont plus ou moins fortement ponctués; sur les côtés des trois ou quatre derniers segments ventraux la ponctuation s'affaiblit graduellement et disparaît. Saillie prosternale rebordée ou non rebordée; épisternes métasternaux aussi larges, au bord antérieur, que longs, un peu rétrécis en arrière; dernier segment ventral ♂ simple, avec deux pores sétigères, ♀ avec quatre pores. Métatarse postérieur plus ou moins sillonné au côté externe, le sillon parfois plus ou moins oblitéré et visible alors seulement vers la base de l'article; onychium sétulé en dessous. — Long. 13 mill.

Émirat de Buchara, Hissar : sources de la riv. Karataga (E. Willberg! 1898). — Deux exemplaires (♂♀). Coll. Sémenow et coll. Tschitschérine.

Diffère à première vue de toutes les autres espèces de ce sous-genre par la grosseur de la tête et par le rétrécissement de la base du prothorax qui n'est pas plus large que le pédoncule mésothoracique.

Sur les mœurs et le rôle utile

de *Nabis lativentris* Boh. [HÉMIPT. HÉTÉROPT.]

Par le Dr P. MARCHAL.

On sait que deux *Pierides* très communes pondent leurs œufs pendant toute la belle saison à la face inférieure des feuilles du Chou. Ce sont *Pieris brassicae* et *Pieris rapae*.

(1) On s'en rend mieux compte en regardant l'insecte un peu obliquement.

(2) Chez l'un de mes exemplaires, il y a, en outre, un pore accidentel au 5^e interstrie.

Les œufs de la première espèce sont en forme de pains de sucre, de teinte jaune, et ornés à la fois de côtes longitudinales et d'une line striation transversale; fixés par leurs bases contre la feuille, ils sont réunis par groupes de 50 à 80 en moyenne, extrêmement voisins les uns des autres, mais pourtant ne se touchant pas. Les œufs de *Pieris rapae* ont une forme semblable à celle des premiers, mais sont de teinte plus blanche et sont pondus complètement isolés les uns des autres.

Au mois de juillet dernier je vis dans un carré de Choux de mon jardin un grand nombre de ces œufs qui présentaient un aspect particulier: ils étaient recroquevillés, et leur contenu paraissait avoir été vidé; ils différaient d'ailleurs des simples coques abandonnées par les jeunes chenilles au moment de leur éclosion, par leur forme irrégulière et leur transparence beaucoup moins grande, le contenu n'ayant pas été épuisé d'une façon complète. Je vis en même temps et sur les mêmes Choux courir et fureter un certain nombre d'Hémiptères dont les allures vives et la forme bizarre rappelaient celles d'une grande Fourmi.

Ces Hémiptères, qui étaient des nymphes de *Nabis lativentris*, exploraient en tous sens la face inférieure des feuilles de Choux; pensant que je pouvais me trouver en présence des Insectes qui vidaient les œufs de *Pieris*, j'en pris un et le mis sur une feuille de Chou dans le voisinage immédiat d'une ponte de *Pieris brassicae* comportant environ 75 œufs. L'Insecte resta alors immobile pendant quelques instants, palpa les œufs avec ses antennes, puis introduisit l'extrémité de son long rostre en forme de chalumeau dans la partie basilaire d'un œuf; en quelques secondes, sans que le *Nabis* semblât faire aucun mouvement ni aucun effort, l'œuf se vida et les parois revinrent sur elles-mêmes comme celles d'un ballon qui se dégonfle. Ensuite il passa à un autre et continua méthodiquement son œuvre jusqu'à ce que presque tous les œufs fussent gobés.

Il est vraisemblable que le *Nabis lativentris* procède de la façon que je viens de décrire non seulement à l'état de nymphe, mais encore à l'état d'adulte. Toutefois, au moment où je fis mon observation, je ne pus trouver que des nymphes, et lorsque, après une absence, je revins au mois de septembre, les *Nabis* avaient disparu.

Toujours est-il que, lorsque les *Nabis* se trouvent dans les cultures de Choux, ils doivent y jouer un rôle extrêmement utile. Il est en effet curieux de voir l'énorme quantité d'œufs qui est pondue dans un carré de Choux par les Papillons blancs, et, lorsque le temps est chaud, c'est à chaque moment que l'on voit la petite Piéride de la Rave se poser sur une feuille, le plus souvent à la face inférieure, puis, en l'espace de deux ou trois secondes, déposer un œuf, pour reprendre aussitôt son

vol en zigzags. Or, lorsque des circonstances semblables à celles où j'ai fait mon observation se trouvent réalisées, la quantité de chenilles qui éclosent est minime, et, en examinant avec attention les feuilles, on constate qu'un bon nombre d'œufs ont été sucés et vidés.

Le *Nabis* doit contribuer pour la plus grande part à cette œuvre de destruction et il est d'autant plus utile qu'il frappe l'Insecte dans l'œuf, c'est-à-dire avant qu'il ait pu commencer ses dégâts. C'est évidemment dans des cas analogues à celui-ci, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'auxiliaires exerçant leur influence d'une façon immédiate et non à échéance plus ou moins lointaine, que l'intervention de l'homme dans l'utilisation des parasites ou des prédateurs aurait le plus de chances de succès.

En récoltant des *Nabis* sur des plantes sauvages et en les répandant ensuite sur des cultures ayant à souffrir habituellement des chenilles de *Pieris*, on les protégerait certainement d'une façon fort efficace. Les Papillons en venant pondre fourniraient aux *Nabis* l'aliment nécessaire à leur entretien et les *Nabis* en mangeant les œufs empêcheraient l'Insecte nuisible d'apparaître en quantité excessive. Mais il y a loin de la théorie à la pratique, et ce qu'un entomologiste pourrait faire pour préserver les plantes de son jardin ne peut toujours être conseillé au jardinier ou à l'agriculteur.

Sur un cas singulier de ravages

causés par *Lyctus unipunctatus* Herbst (*L. canaliculatus* F.) [COL.]

Par Alfred GIARD.

M. le Dr Louis Bureau m'ayant prié de présenter à la Société l'intéressant mémoire qu'il vient de publier sur *Lyctus canaliculatus* Fabr., je profite de cette occasion pour signaler un cas assez curieux des ravages de cet insecte.

Il y a quelques années j'achetai en hiver un buffet neuf en chêne plaqué d'acajou. Dans le courant de l'été suivant la tablette supérieure de ce buffet fut perforée par une dizaine de *Lyctus canaliculatus* dont les larves avaient vécu évidemment dans le chêne sous-jacent non exempt d'aubier. L'insecte parfait avait dans ce cas traversé l'acajou plus résistant mais épais de quelques millimètres seulement comme les *Apate capucina*, les *Callidium sanguineum* et autres insectes xylophages ont pu, dans certaines circonstances, citées par divers auteurs transpercer des plaques de plomb, des clichés typographiques, etc. (cf. Desmarest, l. c. p. 255).

Un livre relié en peau avait été placé sur le buffet. La galerie verti-

cale d'un des *Lyctus* éclos aboutissait justement à un point de la tablette situé sous le livre. L'Insecte au lieu de continuer à forer verticalement creusa une galerie horizontale de quatre centimètres de longueur allant de son trou au bord le plus proche du livre par le plus court chemin. La galerie était formée de deux demi-cylindres, l'un creusé à la surface de l'acajou, l'autre dans la peau de la reliure du livre sus-jacent. Le *Lyctus* était ainsi accidentellement devenu un ennemi des reliures.

L. BUREAU. Le Lycte canaliculé et les ravages qu'il fait dans les parquets et autres bois ouvrés. *Bulletin de la Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France*, t. 40, fasc. III, sept. 1900.

E. DESMAREST. Encyclopédie d'Histoire naturelle de Chenu, Céleoptères, t. III. 1860, pp. 255-256.

Les tubes de Malpighi chez les Phasmes [ORTH.] (1)

PAR R. DE SINÉTY.

On doit, d'après tout un ensemble de caractères, distinguer chez les Phasmes deux sortes de tubes de Malpighi :

Les tubes **supérieurs**, insérés suivant une couronne circulaire, se dirigeant en haut, pour se boucler après un court trajet et redescendre le long de l'intestin. Ils reçoivent à divers niveaux un assez grand nombre de branches trachéennes, qui les abordent, les unes de haut en bas, les autres de bas en haut, celles-là en donnant un rameau ascendant, celles-ci en donnant un rameau descendant, de manière à desservir l'organe sur un assez long parcours en aval et en amont du point d'arrivée. L'extrémité est libre et en doigt de gant. Le développement est précoce; le contenu est variable, surtout en quantité, suivant les individus et les époques, mais on n'y trouve pas de calcaire.

Les tubes **inférieurs** sont insérés d'ordinaire deux par deux au-dessous des insertions des tubes supérieurs, chaque groupe pouvant être considéré comme les branches de bifurcation d'un tronc commun très court, parfois réduit à une saillie de la paroi intestinale (2); ils

(1) Principalement d'après *Leptynia attenuata* Pant. — Il n'est question dans la présente note que des tubes de Malpighi proprement dits, à l'exclusion des organes tubulaires qui débouchent par une dilatation piriforme dans l'intestin moyen des Phasmes.

(2) L. BORDAS (L'appareil digestif des Orthoptères. *Ann. Sc. nat.* 1898, V, p. 18) signale ce mode d'insertion, mais il ne fait pas de distinction entre tubes inférieurs et supérieurs dans les espèces de Phasmes qu'il a étudiées.

descendent directement sans se boucler. Une trachée unique, appliquée sur le tronc commun, se bifurque en branches d'égale importance, qui se jettent respectivement sur chaque tube et l'accompagnent à peu près jusqu'à son extrémité, décrivant à sa surface une spirale très lâche, et fournissant de distance en distance de courtes branches latérales, qui s'épuisent presque immédiatement en trachéoles. L'extrémité distale, au lieu d'être libre comme dans les tubes de la première espèce, est en rapport avec des trachéoles ou des trachées dépendant d'autres organes; lorsqu'on la prépare par extirpation, ou même en respectant le plus possible ses connexions, on la voit toujours entourée de cellules saillantes d'aspect vésiculeux, pareilles à celles qui ont été décrites et figurées par Sirodot chez les Grillons ⁽¹⁾. Le développement est plus tardif.

Des différences très marquées s'observent dans ces tubes inférieurs suivant qu'on les étudie chez la femelle où chez le mâle adultes. Très développés chez la première, où ils descendent bien au-dessous de l'extrémité libre des tubes supérieurs, toute leur partie moyenne y est distendue par une grande quantité de sphérules calcaires, qui lui donnent un aspect laiteux; le calcaire y coexiste avec les autres concrétions ordinaires, notamment avec des urates et abonde surtout dans les vieux sujets, sans jamais faire défaut chez l'adulte, où il est strictement localisé dans cette catégorie de tubes. Chez le mâle ces mêmes tubes se développent relativement peu et à aucune époque nous n'avons pu y constater la présence de calcaire ⁽²⁾.

L'élimination du carbonate de calcium par les tubes de Malpighi ne semble pas avoir été signalée jusqu'ici chez les Orthoptères. Pourtant l'existence d'un sel calcique à acide indéterminé a été remarquée chez *Gryllus* et *Gryllotalpa* par Sirodot ⁽³⁾ et confirmée chez ce dernier par Cuénot ⁽⁴⁾; le calcium pourrait s'y trouver sous forme de carbonate, surtout dans les tubes blancs, ou sous celle d'oxalate. Ce

(1) SIRODOT. Recherches sur les sécrétions chez les Insectes (*Ann. Sc. nat., Zool.* t. X, 1858, p. 261, pl. 15, fig. 5, 6, 7.)

(2) Cette distinction des tubes de Malpighi à carbonates et de tubes sans carbonates semble avoir une certaine généralité. Elle a été signalée par M. Valéry Mayet chez une larve de Coléoptère (*Cerambyx velutinus*) qui possède quatre tubes de Malpighi plus développés, contenant des carbonates et deux moins longs où les carbonates font défaut (*Bull. Soc. ent. Fr.* 1896, p. 123).

(3) SIRODOT, *loc. cit.*, p. 298.

(4) CUÉNOT. Études physiologiques sur les Orthoptères (*Arch. de Biologie*, 1895, t. XIV, p. 327).

dernier sel est assez répandu parmi les concrétions malpighiennes, ainsi que le remarque Schindler ⁽¹⁾, et chez les Phasmes en particulier, il est fréquent de le rencontrer à l'état d'octaèdres quadratiques, qui ne le cèdent pas pour la beauté et pour la dimension à ceux des pétioles de *Begonia*.

Après les caractères différentiels qui font l'objet principal de cette note, il convient de signaler un caractère commun aux deux sortes de tubes, relatif à la structure des parois. Il existe dans la couche conjonctive des auteurs une délicate musculature, du même type que celle qui a été décrite chez les Grillons par MM. Léger et Duboscq ⁽²⁾; les mouvements que ses contractions déterminent dans les tubes de Malpighi peuvent persister près de vingt-quatre heures dans la liqueur physiologique.

L'élément anatomique de cette musculature ne peut être qu'une cellule en lame mince, analogue à celle des couches musculaires de l'intestin, chez beaucoup de larves, et comme elle ayant incomplètement différencié son protoplasme en rubans contractiles.

Descriptions de deux Coléoptères nouveaux, du Nord de l'Afrique

Par L. BEDEL.

1. *Temnochila gemella*, n. sp. — *T. coeruleae* Ol. *simillima sed fronte subopaca, disperse subtiliusque punctata et inter puncta tenuissime punctillata, elytris lateribus parallelis coloreque saepius laete viridi vel coerulescente distinguenda*. — Long. 9-14 mill.

Algérie : forêts de Teniet-el-Had!, de l'Edough! et de La Calle (Lucas!); Tunisie : forêts de la Kroumirie (Sedillot!); Maroc : province de Tanger (Vaucher!). — Sous l'écorce de divers arbres non résineux (*Quercus*!, *Cerasus*!, etc.).

Cette espèce, confondue jusqu'ici avec le *T. coerulea* Ol. ⁽³⁾, s'en distingue à la fois par son front presque mat, garni de points notablement plus fins et plus épars, dont l'intervalle est couvert d'un pointillé très serré, et par ses élytres dont les côtés sont parallèles et sans trace

(1) SCHINDLER. Beitrage zur Kenntniss der Malpighi'schen gefassen der Insekten, Leipzig, 1878.

(2) LÉGER (L.) et DUBOSCQ (O). Sur les tubes de Malpighi des Grillons (C.R. Soc. Biol. 1899, p. 527).

(3) Le « *coerulea* » signalé d'Algérie par Lucas (Expl. Alg. II, 477) est précisément un *gemella*.

d'élargissement en arrière (cette différence ne peut s'apprécier exactement que si l'insecte est sur un plan bien horizontal et que ses élytres n'aient subi aucun écartement du fait de la préparation); en outre, la couleur, qui varie du vert au bleu, est généralement d'une teinte plus métallique et plus claire.

Il est à noter que les *T. coerulea* Ol. et *T. gemella* m. coexistent dans le Nord de l'Afrique où je les ai observés l'un et l'autre; mais, tandis que le *coerulea* habite exclusivement les Conifères du genre *Pinus*, le *gemella* ne se trouve que dans les arbres non résineux, tels que les Chênes, le Cerisier et même le Faux-Acacia d'Amérique.

2. Leptura (Stenura) Vaucheri, n. sp. — *Angustata, nigra, subnitida, leviter pubescens, antennis feminae, femoribus maris vel pedibus totis feminae rufis, abdomine rufo vel marginibus infuscato, elytrorum vitta fere scalaris aut maculis quatuor pallide flavis.*

Allongé, assez étroit, légèrement luisant et finement pubescent. Tête entièrement noire; tempes très courtes. Palpes noirs ou à dernier article roussâtre à l'extrémité. Antennes noires ♂, rousses ♀; articles 3-11 allongés et cylindriques, le 4^e notablement moins long que le 3^e et que le 5^e. Prothorax subcampanuliforme, un peu plus long sur sa ligne médiane que large à sa base, entièrement noir, à pubescence peu serrée, d'un gris jaunâtre; ponctuation dorsale assez grosse, très serrée. Élytres atténués en arrière ♂, presque parallèles ♀, tronqués obliquement à leur extrémité, noirs, ornés chacun, chez le mâle, d'une bande longitudinale jaune, commençant tout près de la base, découpée par échelons à son côté externe, terminée avant l'extrémité, ou, chez la femelle, de quatre taches jaunes (1^{re} près de la base, quadrangulaire, 2^e en fascie, obliquement ascendante vers les côtés, 3^e courte, irrégulière, se reliant presque à la 2^e par son angle supéro-interne, 4^e plus petite, arrondie et située avant l'extrémité). Dessous du corps noir; ventre roux, seulement un peu rembruni, chez le mâle, sur les bords. Hanches noires; fémurs roux; tibias et tarses noirs ♂, entièrement roux ♀. — Long. 7-8 mill.

Maroc: Djebel Kebir [mont Washington des Anglais] à deux lieues de Tanger, sur des Ombellifères (1 ♂, coll. de Vauloger; 1 ♀, coll. Bedel). — Cette jolie petite Lepture a été découverte par M. Henri Vaucher, à qui je suis heureux de la dédier.

Le *L. Vaucheri* a certaines analogies avec le *L. septempunctata* var. *suturata* Reiche; le dessin jaune de ses élytres rappelle davantage celui du *L. (Anoplodera) sexguttata* Fabr.

Obs. — Comme ce Longicorne a été capturé dans la propriété d'un Américain depuis longtemps fixé au Maroc, j'avais d'abord supposé qu'il pouvait provenir des États-Unis, mais je n'ai rien trouvé dans les ouvrages des auteurs américains qui se rapporte à cette espèce.

Description d'un Lampyride européen nouveau [COL.]

Par J. BOURGEOIS.

Phosphaenopterus Montandoni, sp. nov. — ♂ *Elongatus, fusco-niger, parce et subtilissime pubescens; prothorace nitidiusculo, latitudine basali haud longiore, antice fere regulariter rotundato, angulis posticis retusis, vix prolongatis; elytris subopacis, granulato-rugosis, alutaceis; pygidio postice incisura trapeziformi emarginato, lobis lateralibus apice retusis; genubus abdominisque segmento centrali ultimo pallide testaceis*. Long. 6-7 mill.; lat. 2 mill. — ♀ *Latet*.

♂ Allongé, très finement et peu densément pubescent, noir ou d'un noir brunâtre foncé en dessus, un peu plus clair en dessous. Antennes atteignant environ la moitié du corps, assez robustes, brunâtres : 1^{er} article obconique, 2^e très court et transverse, les suivants un peu comprimés, 3-6 pas plus longs que larges, subégaux, légèrement dilatés d'arrière en avant, 7-10 graduellement plus étroits et plus allongés, le dernier d'un tiers environ plus long que le précédent. Prothorax presque aussi long que large, arrondi antérieurement en courbe régulière, avec les côtés subparallèles dans leur moitié postérieure; finement rebordé et étroitement relevé sur tout son pourtour antéro-latéral où il est, en outre, grossièrement rugueux; base presque droite, à peine sinuée en arc rentrant, visiblement rebordée; angles postérieurs émoussés, à peine saillants; disque subconvexe, assez brillant, marqué d'une ponctuation râpeuse peu serrée, creusé au-devant de l'écusson d'une fossette triangulaire oblongue, limitée de chaque côté par un relief lisse plus ou moins marqué. Écusson en triangle émoussé au sommet, fortement mais peu densément ponctué. Élytres subparallèles, trois fois environ aussi longs que le prothorax, rugueux-granuleux, cette granulation assez dense, d'aspect râpeux, formée de petits tubercules isolés, lisses et saillants, un peu inclinés d'avant en arrière, intervalles des tubercules très finement alutacés; gouttière humérale bien marquée, prolongée jusque vers le tiers de la longueur; sur chaque élytre, un vestige de côte partant du calus huméral et se dirigeant vers l'angle sutural. Abdomen et pattes d'un brun plus ou moins foncé, avec les genoux et le dernier segment d'un testacé pâle. Pyg.

dium entaillé postérieurement en trapèze à côtés rectilignes, le fond de l'échancrure avec une petite coupure triangulaire médiane à peine marquée, les lobes latéraux émoussés au sommet. — Femelle inconnue.

Valachie : Comana (A.-C. Montandon). — Collections Puton, de Vauloger, L. von Heyden et la mienne.

Cette rare espèce, la deuxième du genre, ressemble beaucoup à sa congénère portugaise, *Ph. Metzneri* Schauf. (1). Elle en diffère notamment par son prothorax moins allongé, arrondi antérieurement en demi-cercle au lieu d'être atténué en ogive, par son pygidium entaillé en trapèze et non en accolade, et surtout par ses élytres granuleux, à aspect râpeux, tandis qu'ils sont simplement rugueux chez *Ph. Metzneri*.

Je me fais un plaisir de la dédier à l'habile entomologiste qui l'a découverte et qui a bien voulu en enrichir ma collection par l'entremise de mon ami M. le Dr Puton.

Note sur le genre *Pristaulacus* Kieff. [HYMÉN.]

Par J.-J. KIEFFER.

Dans une récente étude sur les Évaniides (*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 813), j'ai séparé du genre *Aulacus* les espèces qui ont les crochets des tarses pectinés, et j'ai établi pour elles le genre *Pristaulacus*. J'ai rangé dans ce nouveau genre les quatre espèces suivantes : *bimaculatus* Kieff., *Clapowskii* Kieff., *Morawitzi* Sem. et *Patruti* Serv.

M. Kohl, conservateur au Musée de Vienne (Autriche), a eu l'obligeance d'examiner les *Aulacus* de la collection de Schletterer confiés à ses soins et de m'en communiquer le résultat. D'après ses observations, les espèces qui suivent font encore partie du genre *Pristaulacus* : *Abbotii* Westw. (Amérique du Nord), *ambiguus* Schlett. (Brésil), *cingulatus* Westw. (Australie), *flavoguttatus* Westw. (Australie), *gloriantor* Fabr. (Europe), *magnificus* Schlett. (Ceylan), *melleus* Cress. (Amérique du Nord), *rubidus* Schlett. (Australie) et *stephanoides* Westw. (Brésil). Le genre *Aulacus* comprend : *striatus* Jur. qui en est le type, *fusiger* Schlett., *ruftarsis* Cr., auxquels j'ajoute *sibiricola* Sem.; ces deux dernières espèces diffèrent du type par les

(1) *Nunquam otiosus*, I, p. 61. — Voir aussi Ern. Olivier : Essai d'une révision des espèces européennes et circa-méditerranéennes de la famille des Lampyrides (*L'Abeille*, XXII, 1884, p. 37 et pl. I, fig. 8).

crochets des tarsi munis de deux petites dents et non point d'une dent unique.

Quant aux douze espèces qui suivent, et qui ne sont pas conservées au Musée de Vienne, j'ignore encore dans lequel des deux genres il faut les classer : *ater* Westw. (Brésil et Mexique), *bicornutus* Schlett. ⁽¹⁾ (Brésil, conservé au Musée de Budapest), *capitalis* Schlett. (Chili, conservé au Musée de Berlin), *concolor* Schlett. (Brésil), *cordatus* Schlett. (Australie, conservé dans la collection de M. de Saussure à Genève), *Esenbecki* Dahlb. (Europe), *formosus* Westw. (Australie), *haemorrhoidellus* Westw. (Brésil), *Kohli* Schlett. (Guyane, conservé au Musée de Genève), *maculatus* Schlett. (Brésil, collection de M. Wüstner, à Sonderburg, île d'Alsén), *pediculatus* Schlett. (Brésil, conservé au Musée de Dresde) et *spinifer* Westw. (conservé au Musée de Stuttgart).

M. Ashmead m'a écrit, que parmi les *Aulacus* conservés à Washington, plusieurs espèces rentrent dans le genre *Pristaulacus*.

Description d'un *Aulax* nouveau [HYMÉN.]

Par J.-J. KIEFFER.

Aulax Andrei, n. sp. — Noir; abdomen d'un brun marron, plus sombre sur le dessus; funicule d'un brun rouge; pattes d'un rouge brumâtre à cuisses plus sombres; hanches noires. Antennes de 13 articles; le second article presque deux fois aussi long que gros; le 3^e et le 4^e égaux, trois fois aussi longs que gros et un peu plus longs que le 5^e; le 12^e de moitié plus long que gros; le 13^e deux fois aussi long que l'avant-dernier. Mésonotum luisant, finement chagriné, avec deux sillons parapsidaux peu distincts et n'atteignant pas le bord antérieur. Ailes à bords ciliés; cellule radiale fermée, trois fois aussi longue que large. Œufs cylindriques, trois fois et demie aussi longs que gros et un peu plus longs que leur pédicule. Taille ♀ : 1,50 mill. — Mâle inconnu.

Patrie. Environs de la Main-du-Prince, non loin de Bitche.

Mœurs et parasites. Cet Insecte, que je dédie à M. Ern. André, de Gray, produit sur la nervure médiane des feuilles d'*Hypochoeris maculata* L. des renflements peu apparents, ordinairement au nombre de trois à huit, et contenant chacun une loge larvaire. L'insecte en sort

(1) M. le D^r C. von Kertész, conservateur au Musée de Budapest, vient de m'écrire que *A. bicornutus* Schlett. rentre également dans le genre *Pristaulacus*.

au printemps de la seconde année. J'en ai obtenu les parasites suivants : 1° *Mesopolobus fasciventris* ; avril-mai. 2° *Pteromalus* sp. ; mai. 3° un Chalcidite dont la femelle est aptère et le mâle ailé ; juin.

Description d'une *Phaleria* nouvelle d'Algérie [COL.]

Par le Dr A. CHABAUT.

Phaleria Bedeli, n. sp. — En ovale médiocrement allongé, assez brillant, convexe, glabre en dessus, d'un jaune pâle à l'état frais et d'un flave testacé un certain temps après la mort. Tête transverse, arrondie antérieurement, finement alutacée, parsemée de gros points peu serrés, impressionnée entre les yeux. Antennes et palpes testacés ; 3^e article antennaire d'un tiers plus long que le 2^e. Pronotum plus de deux fois plus large que long ; faiblement échancré en avant ; à côtés élargis en demi-cercle d'avant en arrière sur leur première moitié, parallèles sur leur seconde moitié ; tronqué à la base ; nettement rebordé sur tout son pourtour, sauf sur le milieu du bord antérieur ; plus finement alutacé que la tête ; plus finement aussi et encore moins densément ponctué qu'elle, avec une impression longitudinale de chaque côté, au devant du bord postérieur, entre le milieu et le bord externe ; d'un flave plus ou moins testacé, plus ou moins parsemé de taches vaguement brunâtres. Écusson en triangle plus large que long, ponctué à la base. Élytres trois fois environ plus longs que le prothorax, un peu plus larges en avant que cet organe, faiblement élargis jusque vers le milieu, puis en ogive allongée et obtuse postérieurement ; à neuf stries légères, y compris la strie qui longe le bord externe, formées de points allongés ; intervalles plans, alutacés bien plus finement encore que le pronotum, marqués de points irréguliers et clairsemés, immaculés ; épipleures à pubescence fine et rare. Dessous du corps testacé, pubescent. Pattes testacées, pubescentes. Fémurs peu renflés. Tibias antérieurs comprimés, fortement élargis de la base à l'extrémité, triangulaires, l'angle externe de l'extrémité inférieure formant une dent aiguë, l'angle interne muni de deux petites épines égales entre elles. Tarses courts, robustes ; premier article des postérieurs plus court que le dernier. — Long. 5,3-6 mill.

J'ai pris plusieurs exemplaires de cette espèce, le 3 mai 1896, sous le cadavre d'un petit Passereau qui reposait sur le sable, dans le chott ech Chergui, non loin d'El-Kreider, dans la province d'Oran. Je la dédie à M. L. Bedel qui a bien voulu l'examiner dans le temps et a reconnu qu'elle était nouvelle. Ce sera là un faible hommage de ma

reconnaissance envers ce savant dont les lumières et les conseils ne m'ont jamais fait défaut.

Ph. Bedeli se distinguera facilement de ses congénères par ses tibias antérieurs munis d'une dent aiguë à l'angle externe de leur extrémité inférieure. Sa forme ovale peu allongée, sa punctuation assez forte aideront aussi à la faire reconnaître.

Notes complémentaires

sur quelques types de Meigen du Muséum de Paris [DIPT.]

Par le Dr J. VILLENEUVE.

M. le Professeur Stein, de Genthin, vient de publier un travail : *Die Tachininen und Anthomyinen der Meigen'schen Sammlung* in Paris (*Entom. Nachr.* 1900, n° 9, p. 129-144; n° 10, p. 145-157) dans lequel quelques synonymies diffèrent de celles que j'ai indiquées dans le n° 7 (14 avril 1900) du *Bulletin* de la Société.

La contradiction n'est qu'apparente et due simplement à ce que l'examen n'a porté que sur un exemplaire, alors que plusieurs sujets différents étaient rangés sous le même nom.

Ainsi :

1. *Exorista angelicae* = *Dexodes spinuligerus* Rond. (Stein.). C'est vrai pour l'un des exemplaires, mais l'autre ♂ n'a que 2-3 soies à la base de la 3^e nervure longitudinale et une épine costale petite; c'est pourquoi je l'ai assimilé à *machairopsis* Br. Berg., bien qu'étant de plus grande taille que ceux de ma collection.

2. *Phorocera frontosa* = *Spongosiä obliquata* Fall. (Stein.). Le mâle, en effet, possède à l'extrémité de l'abdomen deux prolongements touffus comme chez les *Spongosiä* mâles; mais la femelle est bien *Bothria pascuorum* Rond. ♀ comme je l'ai indiqué.

C'est à tort que j'ai indentifié *Exorista ancilla* Meig. avec *polleniella* Rond. tout en faisant des réserves cependant. Il y a eu certainement une erreur de copie dans la liste des espèces que M. le Prof. Brauer avait eu l'obligeance de me déterminer, et la vraie *polleniella* est tout autre.

4. J'ai dit que le mâle d'*Exorista glauca* Meig. était une *Masicera*, mais ce n'est pas *sylvatica* Fall.; la chose n'a d'ailleurs aucune importance.

5. Je ne puis accepter la confusion établie par M. Stein entre *E. glauca*, *hortulana* et *lota* qui sont respectivement *grossa*, *blephari-*

poda et *lota* de M. le Prof. Brauer; à moins toutefois qu'on ne les considère comme trois variétés de la même espèce, *lota*, par exemple.

6. Quant à *Phorocera præcox*, que M. Stein identifie à *pantherina* Zett. (*schistacea* Rond.), je dois faire remarquer que le type de Meigen a des antennes très raccourcies et qui dépassent à peine la moitié de la face.

7. *Masicera rutila* Meig. type ne saurait se rapporter à la *rutila* de Schiner, car cette dernière n'est autre que *Ceromasia florum* Rond. (teste Prof. Brauer.)

C'est donc à tort que M. Stein et moi, à tort également que M. Pandellé, dans son ouvrage sur les Muscides de France, avons identifié l'espèce de Meigen avec *florum* de Rondani qui dit : *Setae frontales ultra radicem aristae descendentes...* (voy. *Cerom. florum* Rond. in Brauer, 1^{re} partie, pl. II, fig. 22).

M. rutila Meig. est assez commune dans les bois des environs de Paris. Elle s'accommoderait bien de la description de *ferruginea* de Rondani, mais non dans le sens où l'ont interprétée les auteurs qui identifient cette dernière avec l'espèce *properans* Rond. (= *fulva* Meig. ♂ = *festinans* Meig. ♀).

8. Enfin M. Stein a omis de citer l'*Exorista agilis* de Macquart (= *vetula* Meig.) dont les pattes sont entièrement jaunes.

Notes sur divers Hyménoptères

Par Robert DU BUYSSON.

1^o Dans une boîte de doubles de la collection entomologique de feu J. Fallou se trouvait un nid d'*Anthidium*, qui y avait été mis frais, sans aucun doute, car il en était éclos trois exemplaires d'un parasite, le *Stelis aterrima* Latr., lesquels gisaient morts au milieu des autres insectes. J'ai examiné les cocons d'où étaient sortis les *Stelis*, il n'y a aucune trace de coque soyeuse faite par la larve du parasite à l'intérieur du cocon de l'*Anthidium*. Il ne reste rien non plus de la provision de pâtée mielleuse. J'ai ouvert un cocon resté intact; il renfermait une femelle d'*Anthidium oblongatum* Latr. C'est ainsi que j'ai pu m'assurer de l'espèce qui avait construit le nid.

2^o Les larves du *Nematus septentrionalis* L. vivent par petites colonies sur les feuilles des Bouleaux. Une première génération éclot au printemps et les adultes volent en août. Une deuxième génération,

issue de la première, vit à l'état larvaire pendant l'été. Comme celles du printemps, les larves ayant atteint leur complet développement, après dix-huit jours au plus, descendent dans le sol et s'y filent une coque noire, résistante, allongée, subcylindrique, recouverte à l'extérieur d'une réticulation large, rappelant les mailles d'un filet. Le côté où se trouve la tête de la larve est arrondi, normal; l'autre extrémité est acuminée et garnie d'une série de grosses mailles irrégulières, séparées les unes des autres et laissant circuler l'air, mais ne donnant pas accès à l'intérieur du cocon qui est hermétiquement clos. La deuxième génération passe l'hiver à l'état de larves contractées enfermées dans leurs cocons.

J'ai pu faire ces remarques d'après des individus assez nombreux capturés sur les jeunes Bouleaux plantés dans le bois de Meudon, au lieu dit « la Patte-d'oie ».

3° Au Zanguebar, les enfants indigènes se servent de la *Scolia melanaria* Burm. comme jouet. De même que nos gamins de France s'amuse à passer un fil au travers du pygidium des Hanneçons et des Cétaines et à les maintenir suspendus pendant que ces insectes volent, le jeune négroillon noue un fil autour du 1^{er} segment abdominal de la Scolie, le bout passant en dessous, de sorte que l'Hyménoptère peut voler librement et faire miroiter au soleil les teintes bleu d'acier de ses ailes et de ses téguments noirs.

Le R. P. Sacleux a donné au Muséum de Paris un échantillon de ce jouet primitif.

4° Je puis signaler l'*Anomalon tenuicorne* Grav. comme parasite interne de la chrysalide de la *Thaïs polixena* W. V. — M. H. Lhotte avait un certain nombre de chrysalides de ce Papillon provenant de Hyères, et presque toutes renfermaient l'Ophionien. L'éclosion de celui-ci a eu lieu dès le 11 janvier, dans un appartement à température modérée. Les *Anomalon* ♂ sont éclos les premiers. La larve de l'Ichneumonide ne file pas de cocon à l'intérieur de la chrysalide de *Thaïs* et l'ouverture, que l'adulte pratique pour sortir, est toujours du côté de la tête de la chrysalide. Le même *Anomalon* attaque également la *Thaïs rumina* L. var. *Medesicaste* Ill.

Bulletin bibliographique.

Abeille (L'), XXX, fasc. 2. — A. CHAMPENOIS : Synopsis des espèces paléarctiques du genre *Clerus* Müll. (*Trichodes* Herbst), fin. —

T. TSCHITSCHÉRINE : Description de deux nouvelles espèces du genre *Platysma* (Bon.).

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1900, II, 17-19. —

E.-L. BOUVIER : Observations sur le développement des Onychophores. — C. VANOY : Contributions à l'étude des phénomènes de métamorphose chez les Diptères.

Académie Imp. des Sciences de St-Petersbourg. — 1^o *Annuaire du Musée zoologique*, V, 1-2, 1900. — A. SKORIKOW : Zoologische Ergebnisse der Russischen Expedition nach Spitzbergen im Jahre 1899, Collembola (pl. et carte). — G.-O. SANS : On *Epischura baicalensis*, a new Calanoid from the Lake Baikal (pl.). — A. BIRULA : Miscellanea Scorpologica, IV. — G. JACOBSON : De genere novo Calosomatino-rum (*Coleoptera*, *Carabidae*). — G.-W. OLSOUFIEW : Notes sur les Onthophagides, I. — G. JACOBSON : Localités des quelques Coléoptères présentant un certain intérêt, I (texte russe). — 2^o *Bulletin*, sér. V, t. VIII, 5, 1898. — B. SLOVINSKY : Résultats scientifiques de l'Expédition d' « Atmanaï ». *Crustacea malacostraca* de la mer d'Azof (pl.) (texte russe). — T. IX, 2-4 (1898). — F. OVSLANNIKOW : Sur la structure du système nerveux de l'Écrevisse (texte russe). — T. X, 1-5 (1899). ○ — T. XI, 1-5, (1899). ○ — T. XII, 1, (1900). ○

Agricultural Gazette of N. S. Wales, XI, 10, 1900. — The Bot Fly. — W. FROGGATT : The Reappearance of the Elephant Beetle. — *Phylloxera*.

Annals and Magazine of Natural History (The), sér. VII, vol. 6, 35, 1900. — L. WALSINGHAM : Asiatic Tortrices. — E. GREEN : Descriptions of some Species of *Coccidae* collected by M. J. Lidgett in Victoria, Australia (pl.). — W.-F. KIRBY : Notes on the Neuropterous Family *Nemopteridae*. — A.-F. MAC ARDLE : Natural History Notes from the R. Indian Marine Survey Ship « Investigator », sér. III, 4; Some Results of the Dredging Season 1899-1900. — R.-I. PO-COCK : Some new African Theraphosoid Spiders in the British Museum (fig.). — P. CAMERON : Descriptions of new Genera and Species of Hymenoptera.

Archives provinciales des Sciences, II, 12, 1900. — J. ROGER : Étude sur les Coléoptères Longicornes.

Entomologische Nachrichten, XXVI, 20-21, 1900. — P. STEIN : Einige neue Anthomyiden. — H. KOLBE : Ueber einige Arten der Dynastidengattung *Heteronychus*, II.

Entomologist (The), XXXIII, 450, 1900. — R. SOUTH : Two Aberrations of British Butterflies (fig.). — T.-A. CHAPMAN : Note on the Oviposition of *Parnassius Apollo*. — Dr M. STANDFUSS : Synopsis of Experiments in Hybridization and Temperature made with Lepidoptera up to the end of 1898 (pl.). — G.-W. KIRKALDY : Notes on some Sinhalense Rhynchota. — Rhynchota Miscellanea. — W.-J. LUCAS : British Dragonflies of the older English Authors. — W. DANNATT : Description of a new Species of *Dircenna* from Peru (fig.). — F.-W. FROHAWK : Description of the Egg of *Polyommatus Corydon*. — Notes diverses.

Entomologist's monthly Magazine (The), novembre 1900. — D. SHARP : *Drosophila maculata* Duf., a new British Dipteron. — P.-H. GRIMSHAW : A new Anthomyid (fig.). — D. SHARP : Coleoptera from Iceland and the Faroë Islands. — G.-C. CHAMPION : A Species of *Scaptocoris* Perty, found at the Roots of Sugar-Cane (fig.). — E. MEYRICK : New Hawaiian Lepidoptera. — A.-H. JONES : Butterflies in the Austrian Tyrol in July. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes (La), XXXI, 361, 1900. — CH. OBERTHÜR : Observations sur la faune anglaise comparée des Lépidoptères et leurs variations (pl.). — G. DE ROCQUIGNY-ADANSON : Géonémie de *Saturna pyri* (carte).

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, V, 20-21, 1900. — Dr CHR. SCHRÖDER : Die Untersuchung der männlichen Genitalanhänge als Kriterium für die Artberechtigung im Genus *Eupithecia* (Lep. Geom.). — F. LUDWIG : Ueber der Blumenbesuch der Apiden in Nordamerika nach dem Beobachtungen von Ch. Robertson. — H. VIEHMEYER : Beobachtungen über das Zurüchfinden von Ameisen (*Leptothorax unifasciatus* Lat.) zu ihrem Neste. — Dr L. KATHARINER : Versuche über die Ursachen des « partiellen Albinismus » bei Schmetterlingen. — Dr S. MATSUMURA : Die Schädliche Lepidopteren Japans. — Petites communications originales.

Instructor (El), XVII, 5-6, 1900.

K. *Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar (Bihang)*, XXV, 1899. — T. THORELL : Araneæ Camerunenses (Afr. occ.), quas anno 1894 colligerunt cel. Dr Y. Sjöstedt aliique. — Y. SJÖSTEDT : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kamerun, 6, Odonaten aus Kamerun. — S. BENGTSSON : Ueber sogen. Herzkörper bei Insectenlarven. Zugleich ein Beitrag zur Kenntniss der Blutgewebe (pl.). — Y. SJÖSTEDT : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kame-

run, VII; Mantodeen, Phasmodeen und Grylloden aus Kamerun und anderen Gegenden Westafrikas (pl.).

Ministère Roy. Hongr. de l'Agriculture, 1900. — Service des Stations agronomiques Hongroises (pl.). — Don de M. A. Léveillé.

Museo nacional de Montevideo (Anales), II, 15, 1900. ⊙

Naturaliste (Le), 1^{er} nov. 1900. — Le moyen de combattre la *Cochylis* de la Vigne par les traitements d'hiver. — C. HOULBERT : Genera analytique illustré des Coléoptères de France.

New-York Agricultural Experiment Station (Bulletin), septembre 1900. ⊙

Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire naturelle, sér. IV, t. I, 1-2 1899; t. II, 1, 1900. ⊙

Ohio State University, sér. V, n° 3, 1900. — H. OSBORN : The Genus *Scaphoideus* (pl.).

Psyche, IX, 295, 1900. — T.-D.-A. COCKERELL : Some Insects of the Hudsonian zone in New Mexico, I; Arachnida, Neuroptera, N. BANKS; Orthoptera, S.-H. SCUDDER; Lepidoptera, Noctuidae, J.-B. SMITH. — E.-D. BALL : Notes on the Species of *Macropsis* and *Agallia* of N. America. — H.-G. DYAR : Life Histories of N. American Geometridae, XVI.

R. Academia dei Lincei (Atti), 1900, II, 7-8. ⊙

Revista Chilena de Historia natural, août 1900. — E.-C. REED : Sinopsis de los Hemipteros de Chile.

Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, XIII, 152-154, 1900. ⊙

Rovartani Lapok, VII, 7-8, 1900. — Travaux en langue hongroise.

Royal Society (Proceedings), LXVII, 436-437, 1900. ⊙

Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft (Mittheilungen), X, 7, 1900. — Dr A. v. SCHULTESS RECHBERG : Der Malariaparasit und sein Generationswechsel. — A. FOREL : Fourmis du Japon. Nids en toile. *Strongylognathus Hüberi* et voisins. Fourmière triple. *Cyphomyrmex Wheeleri*. Fourmis importées. — A. WULLSCHLEGEL : Descriptions de quelques chenilles inconnues. — E. FREY-GESSNER : Hymenoptera Helvetiae, pp. 117-148.

Societas entomologica, XV, 15, 1900. — F. SCHILLE : Neue aberrative Schmetterlinge. — Dr PAULS : *Amphidasis v. Doubledayaria* in Harz.

— F. HIMSL : Prodrömus einer Macrolepidopteren-Fauna des Traun- und Mülhkreises in Oberösterreich.

Societas Entomologica Rossica (Horae), XXXII, 3-4, 1898. — N. KOUYEW : Fragments braconologiques, VI. — T. TSCHITSCHÉRINE : Diagnoses de quelques nouvelles espèces de la famille des Carabiques. — E.-E. JAKOWLEFF : Étude sur les espèces paléarctiques du genre *Sphenoptera* Sol., sous-genre *Deudora* Jak. — D^r J. SAHLBERG : Catalogus praecursorius Coleopterorum in valle fluminis Petschora collectorum. — N. KOUYEW : Symbolae ad cognitionem Braconidarum Imperii Rossici et Asiae centralis (texte russe et latin). — T. TSCHITSCHÉRINE : Drimostomides et Abacetides du Congo du Musée R. d'Histoire naturelle de Belgique. — T. TSCHITSCHÉRINE : Mémoire sur le genre *Trichocellus* Ganglb. (en collaboration avec E. REITTER et L. BEDEL. — A. SEMENOW : Recensio monographica specierum subgeneris *Aphaonus* Rtt. (Col. Carab.). — A. JAKOWLEW : Dytiscides nouveaux ou peu connus. — A. SEMENOW : Записка о морфологических особенностях *Agabus Kessleri* Hochh. (Col. Dytisc.). — T. TSCHITSCHÉRINE : Quelques observations sur le « Descriptive Catalogue of the Coleoptera of South Africa » de M. L. Péringuey, part II. — B.-E. JAKOWLEW : Descriptions d'espèces nouvelles du genre *Sphenoptera* Sol. — A. SEMENOW : *Callipogon (Eoxenus) relictus* n. sp. (Ceramby.) (texte russe et latin). — N. ZUBOWSKY : Ueber einige neue turkestanische Acridiideen. — T. TSCHITSCHÉRINE : Note sur un nouveau genre de la tribu des Harpaliens. — A. SEMENOW : Coleoptera nova Rossiae europeae Caucasique VI. — T. TSCHITSCHÉRINE : Note supplémentaire sur le genre *Eucamptognathus* Chaud. — A. SEMENOW : Coleoptera asiatica nova. VIII. — Carabiques nouveaux de Darjeeling rapportés par M. le capitaine B. Novitzky.

Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne (Bulletin), 1899-1900. ○

Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France (Bulletin), X, 3, 1900. — ABBÉ J. DOMINIQUE : Fourmis jardinières (fig.). — L. BUREAU : Le Lycte canaliculé (*Lyctus canaliculatus* Fab.) et les ravages qu'il fait dans les parquets et autres bois ouvrés. — ABBÉ J. DOMINIQUE : Trois Orthoptères nouveaux du Congo français (pl.).

Société des Sciences naturelles et d'enseignement populaire de Tarare (Bulletin), V, 9, 1900. ○

Société Entomologique de Belgique (Annales), XLIV, 10, 1900. — E. St-

- MON : Descriptions d'Arachnides nouveaux de la famille des Attidae.
Société Impériale des Naturalistes de Moscou (Bulletin), 1899, 23,
 1900. — D. KROULIKOVSKY : Опыт каталога чешуекрылыхъ Ка-
 занской губернии, V, Microlepidoptera.
South African Museum (Annals), II, 3, 1900. — G.-A. HAMPSON : The
 Moths of South Africa, I.
Spelunca. — *Bulletin de la Société de Spéléologie*, VI, 1-2, 1900. — Un
 nouvel animal des Cavernes.
Union apicole (L'), novembre 1900. — J.-B. LERICHE : Les Abeilles
 postales. — VALLÈS : Un nouvel ennemi de nos Abricotiers. —
 Dr HUGUES : La Sériciculture pratique et comparée.

Université de Toulouse, fasc. 12. — Divers travaux de Médecine. ☉

- Wiener Entomologische Zeitung*, XIX, 9, 1900 (2 exempl.). — E. REIT-
 TER : Beschreibung und Abbildung von neuen Coleopteren der
 paläarktischen Fauna (pl.). — A. FLEISCHER : *Neuraphes (Paraphes)*
puncticeps n. sp. m. — Bestimmungstabelle der Arten der Coleopte-
 ren-Gattung *Lionychus* Schmidt-Göbel. — Ueber die Coleopteren-
 Gattung *Scymnus* Kugel. — Uebersichtstabelle der Arten der Coleo-
 pteren-Gattung *Palorus*. — L. MELICHAR : Homopterologische
 Notizen, III. — H. KRAUSS : Coleopterologische Beiträge zur Fauna
 austriaca. — E. REITTER : Coleopterologische Notizen, LXX. — C.
 VON KERTÉSZ : Bemerkungen über Pipunculiden (Dipt.). — A. FLEIS-
 CHER : Coleopterologische Notiz. — P. STEIN : Einige Bemerkungen
 zu H. Prof. Mik's Kritik meiner Aufsätze ueber die Tachiniden
 und Anthomyiden der Meigen'schen Sammlung in Paris.

CHAMPENOIS (A.) : Synopsis des espèces paléarctiques du genre *Clerus*
 Müll. (*Trichodes* Herbst). (*L'Abeille*), 1900, 46 p.*

Id. : Description d'une espèce nouvelle d'*Amphicoma* Latr. (*Bull. Soc.*
Ent. Fr.), 1900, 2 p.*

COQUEREL (Dr CH.) : Nouveau cas de mort produit par la *Lucilia homi-
 nivorax* et description de la larve de ce Diptère. Note sur quelques
 Insectes de Madagascar et de Bourbon. (*Ann. Soc. Ent. Fr.*), 1889,
 26 p., 4 pl. — Don de M. L. Bedel.

A. L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 28 novembre 1900.

Presidence de M. E. SIMON, Vice-Président.

M. le Dr A. Fumouze s'étant rencontré cet été, à Paris, à l'occasion du Congrès des Chambres de commerce d'Angleterre, avec Lord Albury, plus connu dans le monde savant sous le nom de sir John Lubbock, lui a souhaité la bienvenue au nom de l'Entomologie française; il a été chargé par notre collègue de présenter à la Société ses compliments et vœux de prospérité.

La Société remercie vivement le Dr Fumouze d'avoir été son interprète auprès de l'éminent savant anglais.

Correspondance. — M. le Professeur A. Giard et M. H.-W. Brölemann s'excusent de ne pouvoir assister à la séance.

Distinctions honorifiques. — Le Président a le plaisir d'annoncer à la Société que notre collègue, M. le professeur F. Henneguy, vient d'être élu membre de la Société nationale d'Agriculture de France en remplacement d'A. Milne-Edwards.

— Sur la liste des nouveaux officiers du Mérite agricole, promus à l'occasion de l'exposition universelle, par décret du 15 novembre, figure le nom de notre collègue M. A.-L. Clément.

Démissions. — MM. E. Fridrici, de Metz, et M. de Narcillac, de Paris, ont envoyé leurs démissions de membres de la Société.

Admissions. — M. Rodolphe Homberg, 36, rue Blanche, Paris. *Lépidoptères d'Europe.*

— M. Cl. Houard, préparateur à la Faculté des Sciences, 48, rue Pouchet, Paris. *Entomologie générale, pr. Cécidies.*

— M. le Dr François Pommerol, conseiller général, Gerzat (Puy-de-Dôme). *Entomologie appliquée.*

Présentations. — M. le Dr Louis Bureau, professeur à l'École de Médecine, directeur du Muséum d'Histoire naturelle, 45, rue Gres-

set, Nantes (Loire-Inférieure) [*Entomologie générale*], présenté par M. A. Giard. — Commissaires-rapporteurs MM. E.-L. Bouvier et J. Künckel d'Herculais.

— M. L. Mathieu, directeur de la Station œnologique de Bourgogne, Beaune (Côte-d'Or) [*Entomologie appliquée, Coléoptères*], présenté par M. A. Giard. — Commissaires-rapporteurs MM. E. Dongé et Ph. Grouvelle.

— M. W.-J. Rainbow, F. L. S., entomologist, australian Museum, Sydney (N. S. W.) [*Entomologie générale*], présenté par MM. H.-W. Brölemann et E. Simon. — Commissaires-rapporteurs MM. G.-A. Poujade et A.-L. Clément.

Changements d'adresse. — M. Chardon, 5, impasse Nicole, Paris (8^e arrond.).

— M. le Dr Karl Daniel, 27, Schwind-Strasse, Munich (Bavière).

— M. C. Matthews, Stentaway, Plymstock, South Devon (Angleterre).

— M. le Dr H. Normand, médecin-major au 4^e tirailleurs, Fondouk-Djedid (Tunisie),

— M. F. Meunier, 92, avenue de la Couronne, Bruxelles.

Communications

Homologation du testicule chez les Phasmes [ORTHOPT.]

Par R. DE SINÉTY.

Les homologues du testicule et de l'ovaire chez les Phasmes, sommairement énoncées dans une précédente communication ⁽¹⁾, paraissent mieux exprimées dans ce groupe d'Insectes que dans la plupart des autres. Pour ce motif, il semble utile d'ajouter, dans le même ordre d'idées, quelques renseignements plus explicites fournis par des observations ultérieures.

Une coupe transversale très simplifiée (fig. 1), donnée ici d'après une larve de *Leptynia attenuata* Pant., permet de saisir la disposition générale de l'organe par rapport au vaisseau dorsal ainsi que les traits les plus caractéristiques de sa structure.

(1) *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 317.

La glande est méplate; son côté *A*, qui regarde le vaisseau dorsal *V.d.*, est celui qui a été appelé *interne*, le côté externe *B*, qui pourrait aussi bien être désigné comme *ventral*, est la région homologe de la trompe. Il existe là un tube épithélial qui parcourt à peu près toute la longueur de la glande génitale, depuis le bas où il n'est que la continuation du canal déférent, jusqu'au voisinage du haut, où il se ferme pour se transformer en un cordon fibrillaire qui vient, comme la partie supérieure de la trompe chez la femelle, prendre attache dans la région ventrale de l'animal. Ce tube est adossé à l'ensemble très massif des cellules sexuelles, *C*, qui évoluent progressivement de *A* en *B* et sont, par rapport au canal qui doit évacuer les produits définitifs, ce qu'est le système des gaines ovigères par rapport à la trompe qui doit recevoir les œufs.

La communication de la lumière du canal avec le massif *C* n'est point primitive, mais elle peut aisément s'établir, à la maturité des spermatozoïdes, grâce à l'étirement progressif et finalement à la désunion des cellules en coin *cc'* (fig. 2) qui

forment de ce côté toute la paroi. Ces cellules, qui ont chez la très jeune larve les caractères des autres, se modifient à mesure que l'organe se développe, et après avoir passé par l'état ci-dessus représenté, ne se montrent chez l'imago que rétractées et séparées. A ce stade, d'ailleurs, les cellules intermédiaires à *c c'*, qui constituent le fond de la paroi du canal du côté externe, sont très étalées en surface aux dépens de leur hauteur et laissent libre une cavité spacieuse.

Si l'on rapproche ces dispositions de celles de l'ovaire, on voit aisément que, chez les Phasmes, les deux glandes génitales sont construites sur un plan très uniforme : un tube épithélial dont la situation est morphologiquement ventrale, comme l'indiquent son attache supérieure et son orifice inférieur, est adossé à un massif de cellules sexuelles dont la région germinale conserve des relations de voisinage et d'atta-




Fig. 1




Fig. 2 (1)

(1) La figure 2 représente la partie *B* du testicule à un plus fort grossissement.

che avec le tissu péricardial, tandis que les produits différenciés, repoussés de proche en proche, arrivent à maturité dans le tube qui s'est ouvert latéralement. Ce tube a sa paroi propre essentiellement épithéliale, doublée d'une basale et d'éléments plats de nature conjonctive ou trachéolaire qui sont communs à tout l'ensemble.

Toute la différence entre les deux sortes de glandes se ramène à ce que dans l'une le massif des cellules sexuelles demeure indivis dans toute sa longueur, cette circonstance entraînant comme conséquence que le tube épithélial s'ouvre en gouttière sur toute la longueur correspondante, tandis que, dans l'autre, l'ensemble des cellules sexuelles est morcelé en colonnes transversales, les gaines ovigères, qui débouchent individuellement dans ce tube à des hauteurs différentes. Dans ce dernier cas, d'ailleurs, les parois du canal épithélial se développent autour des orifices latéraux et constituent les calyculs sur lesquels sont insérées les gaines.

**Observations sur *Cerastis intricata* Bdv.
et *Dasycampa Staudingeri* de Graslin [LÉPID. HÉTÉR.]**

Par Charles OBERTHÜR.

Depuis ces derniers temps, l'attention de plusieurs entomologistes s'est portée sur les espèces françaises du genre *Cerastis* Tr. (*Orrhodia* Hüb. n.) et peu de semaines avant la mort de l'éminent lépidoptériste Otto Staudinger, de Dresde, je discutais avec lui la question de savoir comment il convenait de déterminer et d'identifier quelques espèces critiques de ce groupe de Noctuelles automnales. J'avais, sur la demande de feu Staudinger, expédié à Dresde une série relativement considérable de documents, en vue d'obtenir des solutions synonymiques aussi exactes que possible pour la nouvelle édition du Catalogue que notre savant confrère espérait faire paraître avant la fin du siècle présent. Mais la santé du docteur Staudinger était ébranlée par l'âge et par un travail sans doute excessif, et l'implacable mort est venue le frapper, à Lucerne, le 13 octobre dernier.

Une voix des plus autorisées s'élèvera sans doute parmi nous pour rendre hommage à la science entomologique du docteur Otto Staudinger et payer à sa mémoire un légitime tribut de regrets et d'admiration.

En attendant, je crois intéresser plusieurs Lépidoptéristes, en faisant connaître comment feu Staudinger et moi, nous avons cru

devoir résoudre une des questions litigieuses se rapportant à la nomenclature des Noctuelles françaises du genre *Cerastis*.

Boisduval, dans l'errata et addenda à l'*Index methodicus* publié à Paris en 1829, décrit, page 6, dans les termes suivants le *Cerastis intricata* :

« Page 86, inter *Cerastes dolosa* et *glabra*, adde speciem novam :

« V. *Cerastis intricata* ... Galloprov. Statura *glabrae*; alis anticis griseis, atomis numerosis, fuscis undique conspersis, loco reniformis, macula nigra; alis posticis nigricantibus, fimbria rubricosa; thorace capiteque corticinis; antennis luteis. (Mus. com. Saprotae). »

Le *Gen. Index methodicus* de 1840 relate, sous le n° 1190, le *Cerastis intricata*, avec la mention : « Gall. merid. Hispania. Septembr. ».

L'espèce n'existait pas dans la collection Boisduval, lorsque j'en pris possession, et je crois que jamais elle n'y a figuré.

Quant à la collection du comte de Saprota, elle a été détruite, ainsi que l'apprit M. le R. P. de Joannis qui prit récemment soin de s'en informer.

Mais Duponchel a figuré dans le supplément à l'ouvrage de Godart (pl. LVIII, 2) la *Cerastis intricata* et l'a décrite dans les termes suivants (Suppl. 1842, p. 89) :

« CCXCIV. → *Cerastide entremêlée. Cerastis intricata* Boisd. (Ind. meth. pag. 6. — Gener. et Ind. method. p. 148, n° 1190). — Envergure, 16 lignes.

« Les premières ailes sont en dessus d'un gris cendré, chargé de nombreux atomes bruns, avec les nervures et le contour des deux taches orbiculaires d'un gris plus clair. On voit plusieurs taches brunes le long de la côte, dont celle du milieu se réunit à la réniforme; la partie inférieure de celle-ci est marquée d'un point noirâtre. Une série de lunules brunes, bordées de gris clair, traverse l'extrémité de l'aile à peu de distance du bord terminal. La frange est d'un brun roussâtre. Les secondes ailes sont en dessus d'un gris luisant uni, avec la frange plus claire. Le dessous des 4 ailes est d'un gris jaunâtre clair, sablé de brun avec un point discoïdal noirâtre sur les secondes seulement.

« Les antennes sont rousses. La tête et le corselet sont de la couleur des ailes supérieures, et l'abdomen participe de celle des inférieures. Les pattes et les palpes sont d'un gris brun.

« Cette description ne concerne que le mâle; la femelle nous est inconnue.

« Cette espèce se trouve en Provence, ainsi qu'en Espagne, et paraît en septembre. Elle est très voisine de la *dolosa*. »

Ce n'était point l'usage autrefois d'indiquer le nombre exact d'exemplaires d'après lesquels on écrivait sa description; pas plus que de désigner la collection à laquelle appartenait le (ou les) type.

Mais on peut croire que M. de Saporita possédait un très petit nombre d'individus recueillis en Provence, aux environs d'Aix ou du château de Montvert, près Saint-Maximin (Var). On reste sans renseignements sur les exemplaires de provenance espagnole.

En tout cas, nous avons dans le supplément de Duponchel une figure qui paraît bonne; cependant elle diffère absolument de celle que Guenée a fait paraître dans le *Spécies général* (pl. 8, fig. 13) et qu'il a accompagnée du commentaire suivant (p. 379) : « 633. *Cerastis intricata* Bd v.

« Bd v. Ind. add. p. 6. — Gen. 1190 — Gn. Ind. p. 242 — Dup. Sup. IV, p. 81 (1), pl. 58, fig. 2.

« Larv. ignot. Espagne, France méridionale, en septembre. Je n'ai vu de cette espèce qu'un dessin fait par Duponchel, sur la collection de M. de Saporita, et qui s'accorde parfaitement avec la première description de Boisduval. Plus tard, Duponchel a donné une figure qui s'en éloigne notablement, mais sur laquelle je ne puis rien dire, n'ayant pas vu l'original. »

Ce serait donc la figure publiée par Guenée qui serait celle de *intricata* Boisduval; mais comment concilier le terme « *alis anticis griseis* » de Boisduval avec la couleur brun-rouge presque uniforme de la figure publiée par Guenée? je cherche en vain sur la figure en question la tache noire au lieu de la réniforme.

Il y a évidemment un malentendu chez Guenée. Mais toutes ces contradictions sont plus apparentes que réelles. Les *Cerastis* sont des Papillons extrêmement variables et rien ne s'oppose à ce que la figure de Duponchel et celle de Guenée s'appliquent à deux formes d'une seule espèce.

Cependant il paraît qu'on est resté longtemps sans chasser les Noctuelles d'automne dans le midi de la France. Les Lépidoptéristes résidents y étaient d'ailleurs peu nombreux; et c'étaient surtout des voyageurs tels que Donzel et Bellier qui exploraient la Provence, pendant le milieu de ce siècle; mais ils rentraient dans leurs foyers, à Lyon et à Paris, lorsque finissait le mois d'août et ne prolongeaient pas davantage leur séjour dans le midi de la France.

(1) Il faut lire p. 89.

Il a fallu les chasses des entomologistes-marchands de Digne, au moyen des appâts de confitures de prunes, qui paraissent leur réussir le mieux, pour connaître la faune automnale des Papillons provençaux.

Pour ma part, j'ai reçu des milliers des Noctuelles récoltées à Digne, et c'est sur ces documents que Staudinger et moi, nous avons cherché et, croyons-nous, réussi, à trouver le *Cerastis intricata*.

Il nous semble que ce *Cerastis intricata* n'est pas autre chose qu'*erythrocephala*, et je copie textuellement l'étiquette que Staudinger a lui-même écrite et fixée à l'épingle d'un exemplaire que je lui avais communiqué et qu'il m'a retourné en septembre dernier : *Erythrocephala* var. ? *veronicae* Hübner = *dolosa* Hbn. = *intricata* B. J'avais de mon côté déterminé ce même Papillon comme suit : *intricata* Dup. (pl. 58, fig. 2) = *erythrocephala*.

Quant à l'insecte que j'avais déterminé : *intricata* Guenée (pl. 8, fig. 13) var. de *erythrocephala*?, Staudinger, très affirmatif, s'est borné à écrire sans le moindre point de doute : *erythrocephala*. Nous étions donc d'accord, Staudinger et moi, sur la question d'*intricata*.

En effet, si on a sous les yeux une série nombreuse de ces *Cerastis*, on constate que, très variables, ils offrent des spécimens appartenant à des formes extrêmes, parfaitement conformes aux figures dissimilables données par Duponchel et Guenée, mais reliées l'une à l'autre par une infinité de passages et de transitions.

D'ailleurs l'aspect robuste, la forme des ailes et la taille des *erythrocephala* de Digne, cadrent parfaitement avec les 2 figures d'*intricata*, données par Duponchel et Guenée. Maintenant qu'est-ce que *Dasy-campa Staudingeri* de Graslin?

Ici, les types mêmes de l'espèce existent; ils figuraient dans la collection de feu de Graslin, lorsque j'en pris livraison, et ils sont restés parfaitement intacts.

La description et la figure ont paru dans les *Ann. de la Soc. ent. de France* (1863, p. 314-319 et 347, pl. 8, fig. 4, 4 bis et 5).

De Graslin connaissait 2 formes, l'une typique, gris noirâtre, l'autre considérée comme variété et ayant les ailes supérieures d'un roux cannelle uni. De plus, la chenille avait été rencontrée par de Graslin. J'en possède un exemplaire; elle est couverte de poils roux doré. Or ce caractère est important; la chenille de *rubiginea* est également velue et, comme le dit Guenée (*Sp. gén.*, p. 387), c'est une exception unique dans cette famille et dans les familles voisines qu'une chenille velue. A cause de cela, *rubiginea* et *Staudingeri* ne peuvent être séparées génériquement. Peuvent-elles l'être spécifiquement?

J'avoue que j'ai quelque peine à admettre la réunion de *Staudingeri* et de *rubiginea* dans une seule et même espèce. Les formes typiques sont trop dissemblables; cependant il y a des variétés formant une liaison si intime et si étroite entre les deux formes extrêmes de *rubiginea* et *Staudingeri* que ces exemplaires de transition tout au moins ne peuvent pas être attribués plutôt à l'une qu'à l'autre des deux, *rubiginea* ou *Staudingeri*.

Staudinger est mort sans que cette question litigieuse ait été résolue entre nous.

Il m'a retourné, avec des noms qui devront figurer dans l'édition projetée de son Catalogue, les variétés essentielles que je lui avais communiquées; mais il attribue à *ligula* la variété « à ailes supérieures d'une couleur de cannelle rougeâtre, luisante, etc. », décrite par de Graslin (p. 348-349) et issue d'une chenille « velue à reflets », comme le dit de Graslin. Cette circonstance ne permet pas la réunion à *ligula*, ainsi que Staudinger, sur l'étiquette qu'il a fixée à l'épingle du Papillon de feu de Graslin, l'a écrit dans les termes suivants : « *ligula*, ab. *uniformis* Stgr. (pas *Staudingeri*) »; d'abord au dos de la même étiquette il avait écrit : « *rubiginea* var. *uniformis* Stgr. Catal. »; mais il avait effacé cette première détermination. De même il a étiqueté ab. *uniformis* Stgr., un second exemplaire pareil à celui de M. de Graslin, mais pris à Digne en 1897; cependant son hésitation est certaine, la nature de la première détermination en fait foi.

Laissant donc de côté l'opinion de Staudinger, qui d'ailleurs n'a pu résulter d'une délibération suffisamment discutée et mûrie, je résume mon impression personnelle comme suit :

Dasyampa Staudingeri, toujours plus petite, de forme plus étroite, ne peut être jointe à *intricata* Bd v. Dup. et Guenée (*erythrocephala* sec. Stgr. et Obthr.), ainsi que plusieurs entomologistes l'ont cependant proposé; tout au plus *Dasyampa Staudingeri* peut-elle être jointe à *rubiginea*, en classant les variétés dans l'ordre suivant :

- Staudingeri* de Graslin; types à ailes fond gris noirâtre, parsemé de dessins blancs et de lignes noirâtres plus foncées.
 ab. *polita* Stgr.; gris plus clair, avec dessins plus foncés.
 ab. *livina* Stgr.; gris blanc, frange rosée, dessins noirâtres plus ou moins accentués.
 ab. *scortina* Stgr.; brun jaunâtre, avec nombreux dessins noirs.
 ab. *uniformis* Stgr.; brun cannelle, sans dessins.
 ab. *unicolor* Stgr.; brun rouge, presque sans dessins, *rubiginea* Fabr. type.

ab. *Graslini* Stgr.; larges et nombreux dessins blancs.

ab. *completa* Stgr.; brun rouge vif uni et luisant.

Les formes *Staudingeri* et *uniformis* ont été trouvées dans les Pyrénées-Orientales.

Les mêmes formes et en outre celles appelées : *polita*, *livina*, *scortina*, *unicolor*, *rubiginea* et *Graslini*, ont été trouvées à Digne.

Graslini et *vaccinioides* se rencontrent surtout à Martigny (Valais).

Enfin le *Dasycampa fornax* Butler, du Japon, ne me semble être qu'une forme un peu plus grande de *rubiginea*, Noctuelle répandue dans l'Europe et le Japon, surtout variable dans le midi de la France et le Valais, et sans doute aussi en Espagne, d'où Staudinger avait rapporté la *Dasycampa Staudingeri* d'une forme analogue à la forme considérée par de Graslin comme type, des Pyrénées-Orientales.

La *Cerastis vaccinii* varie beaucoup aussi aux environs de Digne et présente dans cette localité de nombreuses et superbes aberrations.

Notes sur quelques Cynipides [HYMÉN.]

Par R. DU BUYSSON.

J'ai eu l'occasion, au mois de septembre dernier, de traverser les taillis de Chênes pubescents (*Quercus pubescens* Willd.) qui se trouvent entre Chinon et Loudun, sur la commune de Marçay (Indre-et-Loire). J'y ai rencontré plusieurs sortes de galles de Cynipides réputées rares. Ce sont celles de l'*Andricus solitarius* Boyer de F., remplaçant un ou deux bourgeons sur des rameaux de taillis âgés de douze ans environ. Celles de l'*Andricus urnaeformis* Mayr, fixées à la face inférieure de la nervure des feuilles des pousses vigoureuses de taillis de deux à trois ans. A l'aisselle des feuilles des mêmes jeunes taillis j'ai trouvé assez communément la galle, si curieuse, de l'*Andricus calidoma* Giraud. Enfin, dans la même localité, quelques gros Chênes isolés avaient nombre de leurs glands attaqués par l'*Andricus glandium* Giraud. Le fruit reste plus petit, tombe sur le sol ou reste fixé au calice.

Le *Cynips calicis* Burgs. est très commun dans la même région, ainsi que dans les environs de Bressuire et dans le département de Maine-et-Loire sur le Chêne pédonculé (*Quercus pedunculata* Ehrh.). Ce dernier *Cynips*, inconnu sur le plateau central, remonte dans l'Ouest jusqu'à l'île de Jersey.

Note sur quelques *Amara* des Basses-Alpes [COL.]

Par T. TSCHITSCHÉRINE.

M. Paul de Peyerimhoff ayant bien voulu me soumettre une série d'*Amara* capturées sur la montagne de Blayeul, près Digne, j'ai pu constater qu'elles appartenaient à 4 espèces différentes. Il y a d'abord quelques spécimens pris sous des pierres, vers 1800 mètres; c'est la vulgaire *Amara aenea* De G. Les autres exemplaires ont été pris à 2000 mètres environ, sur une flaque de neige fondante (4 juillet 1899); il y a là 2 *Am. (Celia) erratica* Duft. (♂ ♀), 1 *Amara lunicollis* Schiödt (♀) et 10 individus d'une forme voisine d'*Am. famelica* Zimm. qui méritent une mention spéciale.

C'est un insecte de 6 1/2 à 7 1/2 mill., à surface soit noire, soit bronzé clair⁽¹⁾; les pattes et les antennes sont noires, celles-ci à premier ou à deux premiers articles rouge ferrugineux, mais parfois maculés de noirâtre. La tête, les angles antérieurs du pronotum et le pore angulaire postérieur, les stries des élytres, les pores sétigères du dernier segment ventral ♂ ♀ et les tibias antérieurs et postérieurs ♂ ♀ ne diffèrent pas notablement; les bords latéraux du pronotum n'ont aucune trace de la dépression oblique qu'on voit toujours chez la *famelica*, et les élytres sont distinctement plus convexes en arrière, descendant, vers l'extrémité, en pente un peu plus accentuée. Sous ces deux rapports les dix individus communiqués par M. de Peyerimhoff sont absolument identiques les uns aux autres et diffèrent constamment de la *famelica* typique. — Les impressions basilaires du pronotum sont plus ou moins fortement marquées, quelquefois assez faibles; elles sont généralement lisses, mais parfois on y peut distinguer quelques petits points; les stries des élytres sont toujours plus ou moins ponctuées.

Notons que l'*Am. famelica* typique est un habitant de la plaine; on le trouve en Suède, dans le nord de l'Allemagne, en Russie; dans ce dernier pays, il descend même considérablement vers le Sud⁽²⁾, aucune barrière naturelle ne s'opposant à son extension au midi; mais il n'a pas été signalé des pays montagneux tels que le Caucase, par exemple, ou la Suisse, et il manque dans tout le Sud-Ouest de l'Europe.

Quoi qu'il en soit, l'*Amara* des Basses-Alpes constitue au moins une

(1) La coloration noire semble dominer; il n'y a que deux individus bronzé clair, sur les dix que j'ai sous les yeux.

(2) On le trouve par exemple dans le désert kirghise du gouv. d'Astrakhan.

race (alpine) de la *fametica*, et est suffisamment caractérisée pour être désignée par un nom spécial, **Amaranivium** m. — J'en ai un exemplaire du Caucase (1) qui ne diffère pas sensiblement de ceux de France; c'est une ♀ de 7 1/2 mill., à surface bronzé clair et à impressions basilaires du pronotum assez faiblement marquées.

**Sur un Hémiptère (*Atractotomus mali* Mey.) parasite
des chenilles d'*Hyponomeuta malinellus* Zeller et *H. padellus* L.**

Par Alfred GIARD.

Dans le n° du 15 septembre de la *Revue scientifique*, M. le Dr F. Pommerol signale et décrit brièvement un petit Hémiptère hétéroptère sauteur qui joue un rôle considérable pour la destruction de la chenille du Pommier (*Hyponomeuta malinellus* Z.) et que, pour cette raison, il propose d'appeler *Reduvius malinellus*.

Certains points de la description m'ayant inspiré des doutes sur la position systématique de l'Insecte, M. le Dr Pommerol voulut bien m'envoyer, à défaut de spécimens conservés, les croquis de l'antenne et du rostre et quelques renseignements complémentaires sur ses intéressantes observations.

De ces divers documents il me paraît résulter que l'Hémiptère prédateur de l'Hyponomeute n'est pas un Réduvide, mais un Capside et, selon toute probabilité, appartient à l'espèce décrite par Meyer sous le nom de *Capsus mali*. Fieber l'a placée depuis dans le genre *Atractotomus* caractérisé surtout par la forme si remarquable du second article des antennes.

Les auteurs disent qu'*Atractotomus mali* se trouve sur les Pommiers peu de temps après la floraison, mais Lethierry dans son excellent Catalogue des Hémiptères du Nord donne le renseignement suivant :

« *A. mali*. Vit, d'après de Norguet, dans les nids de la chenille d'*Hyponomeuta padella*, sur les haies d'Aubépine. N'est pas rare dans tout le département. »

Il n'est donc pas surprenant que, dans les régions où le Pommier est cultivé en grand, l'*Atractotomus* soit commun sur cet arbre où il attaque à la fois *H. malinellus* et *H. padellus*. Guérin-Méneville a signalé depuis longtemps la présence simultanée de ces deux Hyponomeutes sur le Pommier, et il est manifeste que le Dr Pommerol a également

(1) Malheureusement sans indication plus précise de la localité.

observé en Auvergne les chenilles des deux espèces vivant côte à côte sur le même arbre (Brochure, p. 8).

Il existe d'ailleurs, parmi les Hétéroptères de diverses familles, d'autres espèces que leur régime prédateur peut faire considérer comme Insectes utiles. J'ai vu *Picromerus bidens* L. sucer la chenille d'*Acronycta rumicis* L. sur les *Polygonum*. D'après Ed. André et F. Debray *Zicrona coerulea* L., rend de grands services aux viticulteurs de France et d'Algérie en détruisant les larves d'Altises. *Capsus capillaris* Fabr. attaque l'*Aphis rosae* L. (Verhoeff. l. c.); *Nabis brevipennis* Hahn vit aux dépens du Puceron qui roule les feuilles de l'Orme, *Aphis ulmi* De Geer. Récemment notre collègue P. Marchal nous a signalé le *Nabis lativentris* Boh. comme destructeur des œufs de *Pieris brassicae* L.

Un Réduvide américain, le *Prionidus cristatus* L., détruit les chenilles qui ravagent les Pêchers et autres arbres fruitiers (J.-B. Smith).

Enfin on sait le rôle utile que joue notre *Reduvius personatus* L. en attaquant les Insectes nuisibles de nos habitations.

F. POMMEROL. Un petit Hémiptère destructeur des larves de l'Hypomœute du Pommier. *Revue scientifique* (4), t. XIV, n° 11, 15 sept. 1900, p. 348. — Article reproduit dans une brochure du même auteur : *La chenille des Pommiers et ses ennemis naturels*, Clermont-Ferrand, 1900, pp. 20-23.

C. VERHOEFF. *Entomologische Nachrichten*, Jahrg. XVII, Heft 2.

L. LETHIERRY. Catalogue des Hémiptères du département du Nord, 2^e édition, 1874, p. 34.

Note sur les tubes de Malpighi des larves de *Stratiomys* [DIPT.]

Par C. VANEY.

Les tubes de Malpighi de la larve de *Stratiomys* sont au nombre de quatre, comme chez la plupart des Diptères; mais ici ils viennent aboutir à une ampoule commune débouchant sur l'intestin terminal. Cette disposition se retrouve chez l'adulte.

De ces quatre tubes, deux sont marginaux ou externes, comprenant entre eux les deux autres que nous désignerons sous le nom de tubes internes.

Les deux tubes externes ont l'allure générale des tubes de Malpighi des autres Insectes, avec leur couleur jaune verdâtre et leurs parois formées de cellules très nettes. Après injection d'une solution physiologique de bleu de méthylène, ils se colorent en bleu intense. Leur fonction est nettement rénale.

Les deux tubes internes sont bien différents, soit comme structure,

soit comme contenu. Celui-ci est blanchâtre, granuleux, et l'analyse microchimique montre qu'il est formé en grande partie de calcaire (effervescence avec les acides faibles, formation d'octaèdres par l'oxalate de potassium et d'aiguilles souvent groupées sous l'action de l'acide sulfurique). La paroi est constituée par une pellicule très mince, à cellules très aplaties, rappelant l'ampoule terminale des tubes de Malpighi antérieurs de la larve de *Thrixion* ⁽¹⁾; mais ici tout le tube a subi cette modification. Après injection de bleu de méthylène, ces tubes ne se colorant pas, se détachent en blanc.

Les quatre tubes de Malpighi s'insérant sur la même ampoule ont, sans nul doute, même origine; mais les deux tubes internes ne sont plus des organes d'excrétion chargés plus ou moins d'urates, et contiennent une réserve de calcaire.

Ainsi que l'a démontré Viallannes ⁽²⁾, le tégument de la larve de *Stratiomys* est plus ou moins chargé de calcaire, et il paraît admissible qu'il y ait une relation entre celui-ci et le calcaire déposé dans les tubes de Malpighi.

Les observations faites par Batelli ⁽³⁾, Valéry Mayet ⁽⁴⁾, Pantel ⁽⁵⁾ et les nôtres montrent que les tubes de Malpighi, dans certains cas, sont modifiés fonctionnellement, soit partiellement (larve d'*Eristalis* et de *Thrixion*), soit totalement (larve de *Cerambyx* et de *Stratiomys*) et deviennent des organes de réserve de calcaire.

Description d'une Luciole nouvelle de Madagascar et de sa larve [COL.]

Par L. FAIRMAIRE

Les larves des *Luciola* n'étant guère connues, je crois intéressant de signaler celle-ci.

Long. 9 mill. — Oblongue, s'élargissant à peine à l'extrémité qui est presque tronquée, d'un jaune d'ocre peu brillant avec 2 larges bandes transversales d'un noir un peu bleuâtre, la 1^{re}, plus grande, couvrant les deux segments méso- et métathoraciques, la 2^e couvrant

(1) PANTEL. Essai monographique sur *Thrixion Halidayanum* (La Cellule, 1898).

(2) VIALLANNES. Recherches sur l'Histologie des Insectes et sur les phén. histolog. qui accompagnent le développement postembr. des Insectes, 1883.

(3) BATELLI. Contribuzione all' anatomia ed alla fisiologia della larva dell' *Eristalix tenax* (Bullet. della Soc. entom. Ital. 1879).

(4) VALÉRY MAYET. Bulletin Soc. Entom. France, 1886.

(5) PANTEL. Loc. cit.

le 5^e segment abdominal et s'allongeant obliquement sur les côtés du 6^e, le dessous du corps et des pattes plus pâles, sans taches; la tête, cachée sous le corselet, est également d'un fauve pâle. Le corselet est presque ogival, très obtus en avant, caréné au milieu, un peu déprimé vers les bords latéraux qui sont relevés, le bord postérieur est largement sinué avec les angles saillants; tous les segments sont également carénés au milieu, les 2 premiers sont plus longs que les autres, le 1^{er} porte, à la base, deux petites taches rousses, les côtés sont à peine arqués, les angles postérieurs presque droits; les segments suivants sont bien plus courts, avec les angles postérieurs saillants en arrière; la carène dorsale, finement sillonnée comme chez les 2 premiers, est un peu brunâtre sur les côtés, s'élargissant à la base qui est pâle, ce sillon s'efface un peu sur les derniers segments qui sont plus fortement sinués au bord postérieur et fortement impressionnés de chaque côté; le dernier est moins large, mais moins court, presque tronqué avec les angles arrondis et largement impressionné; les 3 derniers segments ventraux sont seulement plus pâles; les côtés de la poitrine sont à peine enfumés.

La forme de cette larve rappelle bien celle de la *Luciola lusitanica* dont notre ami J. Bourgeois a donné une description dans les Malacodermes de la « Faune gallo-rhénane »; mais cette dernière est entièrement brune en dessus sauf les deux derniers segments, le corps n'a pas une fine carène médiane dans toute sa longueur, sauf une trace peu distincte sur le corselet, les segments abdominaux n'ont pas les angles postérieurs saillants en arrière et le corselet est largement tronqué en avant, la coloration du dessous du corps est aussi très différente.

L'insecte parfait est une espèce nouvelle qui paraît assez rare, car je n'en ai vu qu'un seul individu.

Luciola cavifrons, n. sp. — Long. 6 mill. — Ressemble beaucoup à la *L. semiventralis* Fairm.; la coloration est à peu près semblable, les élytres sont plus courtes et un peu élargies en arrière; mais le dessus du corps est finement pubescent; la tête est plus profondément et plus largement concave, plus brillante, les angles antérieurs du corselet sont moins arrondis, les deux impressions du bord postérieur sont plus profondes, l'écusson est roussâtre, plus largement tronqué, les côtes des élytres plus saillantes; en dessous le prosternum est roux-orangé comme le corselet, la poitrine est brune, l'abdomen d'un brun noir avec les 3 derniers segments d'un jaunâtre pâle, les pattes sont brunes avec la base des fémurs rousse.

Madagascar : Berkély.

C'est encore au zèle et à l'activité de mon ami, M. Perrier, que je dois cette insecte et sa larve.

**Observations sur quelques types de Meigen
du Muséum de Paris [DIPT.] (suite) ⁽¹⁾**

Par le Dr J. VILLENEUVE.

IV^e Genre. SARCOPHAGA.

Les exemplaires de la collection sont en bon état et j'ai pu compléter leur étude par l'examen des pièces génitales de quelques mâles. C'était du reste le seul moyen de fixer une fois pour toutes des espèces qui seraient demeurées plus ou moins incertaines avec les seuls caractères spécifiques employés par Rondani, Meade, Strobl, etc.

Dès lors, je ne pouvais établir de meilleure synonymie qu'en rapportant les types de Meigen aux espèces si bien décrites par M. Pandellé dans son beau travail sur les Muscides de France (*Revue d'Entomologie*, Caen, 1896, p. 173) et j'ai l'intention de donner plus tard des figures explicatives en ce qui concerne l'hypopygium.

1. *S. mortuorum* (♂ ♀) = *Cynomyia* cod. nom. (auct.).

2. *S. ruralis* (♂ ♀).

Le mâle est *Angiometopa ruralis* Fall.

La femelle n'est autre que *Wohlfartia Meigeni* Schiner.

3. *S. muscaria* (♀) = *Theria* cod. nom. (auct.).

4. *S. intricaria* (♀) = *Theria muscaria* qui précède (n° 3).

5. *S. grisea* (♀).

Les palpes sont noirâtres et non testacés, comme le dit Meigen.

6. *S. carnaria* (♀).

A toute la physionomie de *melanura* Meig.; la tête manque.

7. *S. striata* (♂ ♀ sur la même épingle) = *incisilobata* Pand.

8. *S. albiceps* (♂ ♀ sur la même épingle) = *cyathissans* Pand.; elle ne répond pas à l'*albiceps* de Meade.

9. *S. sinuata* (♂) = *sinuata* (auct.).

10. *S. atropos* (♀).

Appartient à une autre espèce et n'est très vraisemblablement qu'une femelle de *carnaria* L.

11. *S. melanura* (♀).

(1) Voir page 157.

Les soies sont presque toutes brisées, mais il est fort douteux que ce soit la vraie femelle de *melanura* Meig.

12. *S. pumila* (♂ ♀).

Le mâle est identique à la *pumila* de M. Pandellé.

La femelle, qui porte la mention d'origine « Spanien », appartient à une autre espèce.

13. *S. arvorum* (♂ ♀ sur la même épingle).

Ils présentent l'un et l'autre une bande de poils dorés sur la face antérieure des cuisses intermédiaires; ils sont identiques à *sinuata* Meig. qui précède (n° 9).

14. *S. dissimilis* (♂ ♀ sur la même épingle) = *dissimilis* de Schiner. = *dissoluta* Pand.

Le mâle est facile à distinguer d'*offuscata* Schin. par la présence de deux fortes soies apicales entrecroisées au scutellum. Ces soies manquent ou sont très affaiblies et non entrecroisées chez *dissimilis* ♀.

15. *S. vagans* (♂ ♀).

Le mâle, sur la même épingle que la femelle, a disparu. Cette dernière a la première nervure de l'aile sétigère, — 3 soies post-sutur. ext. au thorax, — 2^e arc abdominal muni de 2 macrochètes médianes, — l'anus rouge, entaillé et bordé de macrochètes. Est-ce une femelle d'*haemorrhoea* Meig.?

16. *S. humilis* (♂) = *nigriventris* Meig. qui suit (n° 17).

17. *S. nigriventris* (♂) = eod. nom. (Pand.).

18. *S. haemorrhoidalis* (♂ ♀ sur la même épingle) = *nurus* Rond.

19. *S. cruentata* (♂ ♀) = *nurus* Rond. n° 18.

20. *S. haemorrhoea* (♂ ♀ sur la même épingle) et en plus un ♂ = eod. nom (Pand.).

21. *S. haematodes* (♂ ♀ sur la même épingle) = eod. nom. (Pand.).

22. *S. latifrons* (♀), et 23 *obsoleta* (♀).

Ne présentent rien de spécial.

Sur les *Mymaridae* de l'ambre et du copal [Hymén.]

Par Fernand MEUNIER.

En étudiant un millier de Diptères de l'ambre soumis à mon examen par M. le Prof. Dr Klebs, de Koenigsberg, et une belle série d'Hymé-

noptères du copal qui m'ont été communiqués par M. le Dr Schellwien, du Musée Provincial de cette ville, j'ai eu la bonne fortune de rencontrer trois *Mymaridae* non encore signalés par les paléontologistes. J'ai déjà laissé entrevoir, dans une note antérieure ⁽¹⁾, que l'étude des « atomes ailés » est souvent très laborieuse, car la fossilisation a fréquemment altéré la fine morphologie des antennes, des ailes et des articles tarsaux de ces *Oxyura*.

Malfatti ⁽²⁾ a assez bien figuré un *Mymaridae* de l'ambre sicilien (Simetiti). Cependant le dessin de l'antenne de ce Proctotrypide ne reproduit qu'imparfaitement le détail de la morphologie de ses divers articles.

L'éminent paléontologiste S.-H. Scudder ⁽³⁾ a tort de placer ce curieux fossile dans le genre *Mymar* (non *Myrmar*) ⁽⁴⁾.

Les Proctotrypides tertiaires seront mieux connus dès qu'il sera possible d'étudier les types inédits de Brischke conservés au Musée provincial de Dantzig.

Afin de satisfaire au vœu de feu v. Duisburg ⁽⁵⁾, je décrirai prochainement les 16 *Mymaridae* trouvés dans l'ambre par ce modeste et consciencieux observateur.

I. *Mymaridae* du succin.

Genre *Litus* Haliday.

Tête plus large que le thorax. Yeux composés grands, à facettes striées. Antennes de 9 articles : le premier cylindrique et à peu près deux fois plus long que le deuxième qui est plus gros que le premier, le 3^e article cylindrique, de diamètre moindre que les suivants. Les articles 4-7 sont d'égale longueur et deviennent graduellement plus

(1) *Bull. Soc. Ent. de France*, 1900, n° 9, pp. 192-195 et 6 figures.

(2) Due piccoli Imenotteri fossili dell' ambra siciliana. *Att. Accad. dei Lincei*, Roma, 1880-1881, t. V, 3^e série, pp. 80-81, fig. 1.

(3) A classed and annotated Bibliography of fossil Insects. *Bull. U. S. Geol. Survey*. Washington, 1890, n° 69, p. 97.

(4) Les ♂ et ♀ des vrais *Mymar* ont respectivement 13 et 9 articles aux antennes. Type : *M. pulchellus* Hal. Par ses antennes de 10 articles, le *Mymaride* ♂ de Malfatti ne peut se placer dans aucun genre connu.

(5) « Es wäre wünschenswerth dass, wenn die übrigen Hymenopteren von Kennerhand eine Bearbeitung erfahren diese « geflügelten Atome » nicht übergangen werden möchten. » *Schrift. d. Phys. Oek. Gesellsch. Koenigsberg*, 1868, Bd. IX, S. 27.

gros, le 8^e article arrondi, le bouton apical ovoïde et plus long que les trois articles précédents pris ensemble (fig. 1).




Fig. 1.

Thorax de même largeur que l'abdomen. Ce dernier entièrement sessile et orné d'une tarière à bout paraissant faiblement anguleux (à 358 d.).

Ailes antérieures spatuliformes et ornées de longs cils émergeant, sur le champ alaire, à peu de distance du bord [périphérique. « Nervus ulneus » épais, peu éloigné de la base.

Ailes inférieures linéaires, distinctement ciliées.

Pattes robustes, métatarses presque aussi longs que les 4 articles suivants réunis qui sont d'égale longueur. Crochets tarsaux unidentés.

Long. 1/7 mill.

Observation. — Par ses antennes de 9 articles et ses tarses pentamères ce fossile est une ♀ appartenant au genre *Litus* Hal.

II. Mymaridae du copal.

1. Genre *Limacis* Förster.

1. Tête plus large que le thorax. Yeux composés à facettes en relief très nettement striées. Antennes de 8 articles : le premier deux fois aussi long que le deuxième, le diamètre de ces articles plus gros que celui des suivants, les articles 3-5 cylindriques et presque égaux entre eux, les 6^e et 7^e plus grands, oviformes; le bouton apical très saillant et de longueur égale à celle des articles 4-7 pris ensemble (fig. 2).

Thorax altéré par la fossilisation.

Addomen sessile, de même largeur que le thorax, tarière invisible.

Ailes antérieures spatuliformes, à cils moins denses mais disposés de la même manière que chez l'individu précédent. Ailes postérieures longues, linéaires, à périphérie éparsement ciliée.

Pattes robustes; tarses paraissant être composés de 5 articles (à 358 d.), le métatarse semble être d'une longueur égale à celle des 4 articles suivants réunis.

Long. 1/16 mill.




Fig. 2.

Observation. — Par la fossilisation, les articles tarsaux sont devenus trop pâles pour permettre de décrire rigoureusement leur délicate morphologie. Ce pygmée ne peut être comparé à aucune espèce actuelle du genre *Limacis* Förster.

2. Genre *Prestwichia*? Lubbock.

2. Tête plus large que le thorax. Antennes détruites par la fossilisation. Abdomen sessile, tarière vaguement indiquée. Ailes antérieures largement spatuliformes et arrondies à leur apex comme chez le *P. aquatica* Lubbock ⁽¹⁾.

Ce savant a raison de dire que les caractères des ailes postérieures, linéaires et pétiolées à la base, ne sont pas critères pour le démembrement de plusieurs genres de cette famille, car chez les *Anagrus*, *Anaphes* et *Ooctonus* Hal., elles sont construites sur le même plan morphologique. Fémurs dilatés et tibias longs. Il est impossible de constater si les articles tarsaux sont tétramères ou pentamères.

Long. 4/8 mill.

Conclusion

Les Mymaridae des genres *Mymar* et *Litus* Haliday et d'autres pygmées voisins des *Cosmocoma* et *Limacis* Förster ou appartenant aux genres *Limacis* et *Prestwichia* Lubbock ont été trouvés dans l'ambre de la Baltique et le copal.

Les « atomes ailés » étant encore très peu connus, il est prudent de se borner actuellement à des déterminations génériques et d'attendre, pour les décrire spécifiquement, que la comparaison de leurs types tertiaires, quaternaires et vivants puisse être faite d'après des matériaux d'études plus complets.

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1900, II, 20-21. ⊙

American Entomological Society (Transactions), XXVII, 1, 1900. —

J.-B. SMITH : Contributions toward a Monograph of the North Ame-

(1) On two aquatic Hymenoptera, one of which uses its wings in swimming. *Trans. of the Linn. Soc. London*, 1861, t. XXIV, p. 140, pl. 23, fig. 13.

rican Noctuidae. Revision of the Species of *Xylina* Ochs., 5 pl. n. — Contributions toward a Monograph of the Noctuidae of Boreal North America. Revision of the Species of *Acontia* Ochs. — J.-A. REHN : Notes on Mexican Orthoptera, with Descriptions of new Species.

Canadian Entomologist (The), XXXII, 44, 1900. — A. GIBSON : The Life-history of *Euprepia caja* L. var. *americana* Harr. — H.-G. DYAR : New Species of Anaphorinae. — S.-H. SCUDDER : New or little known Californian Orthoptera. — J.-B. SMITH : Notes on some Species of *Acronycta* in the British Museum. — E.-D. BALL : Additions to the western Jassid Fauna. — H.-G. DYAR : Change of preoccupied Names. — G.-A. EHRLMANN : Variations in some common Species of Butterflies. — W.-H. ASHMEAD : Description of a new Genus in the Apheleninae.

Entomological News XI, 7-8, 1900. — H.-G. DYAR : Life History of a South American Slug-Caterpillar *Sibine fusca* Stoll (pl.). — G.-D. HULST : Notes on some N. A. Geometrina and Pyralidina. — J.-M. ALDRICH : *Goniops* and other Synonyms (2 art.). — H. SKINNER : A Headlong Plunge into the Synonymy (pl.). — F.-L. HARVEY : New Maine Collembola (pl.). — N. BANKS : Two new Species of *Troctes*. — H.-G. GRIFFITH : Coleopterous Fauna of Phoenix, Arizona, and surrounding Regions.

Entomologist's Record and Journal of Variation (The), XII, 44, 1900. — F. NOAD CLARK : Photographing the eggs of Lepidoptera, (pl.). — L.-B. PROUT : Four Weeks' Collecting in Scotland. — T.-A. CHAPMAN : The pupa of *Libythea celtis*. — W.-J. KAYE : British Lepidoptera. — Mr. Bateson's review. — T. HUDSON BEARE : Coleoptera at Rannoch in June. — Notes diverses.

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 45 novembre 1900. — J.-J. KIEFFER : Ueber die Krallen und die Haftläppchen der Dipteren (4 pl.). — M. RUPERTSBERGER : Die Eier der *Gallerucella viburni* Payk. — Dr S. MATSUMURA : Die schädlichen Lepidopteren Japans. — Petites communications originales.

K. K. *zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (Verhandlungen)*, L, 8, 1900. — Dr MAX BERNHAUER : Die Staphyliniden-Gattung *Leptusa* Kraatz, nebst einer analytischen Bestimmungstabelle der paläarktischen Arten. — A. HANDLIERSCH : *Stizus Schmiedekneckii* n. sp. eine neue Grabwespe. — C.-R. v. OSTEN-SACKEN : Notiz über die Erstlingsarbeit von C. Duméril über entomologische Clas-

sification mit besonderer Rücksicht auf die Gattung *Tetanocera*. —
Dr H. REBEL : *Acidalia Metohiensis* nov. sp.

Legislative Assembly. N. S. Wales, 1900. — W. FROGGATT : Report of the Entomologist.

Linnean Society of N. S. Wales (Proceedings), 1900, part. II. — A. RAFFRAY : Australian Pselaphidae (1 pl.). — W. FROGGATT : Australian Psyllidae (4 pl.).

Naturaliste (Le), 15 novembre 1900. — P. NOEL : La Chematobie brumeuse (*Chematobia brumosa*).

R. Accademia dei Lincei (Atti), 1900, II, 9. ⊙

Rivista Chilena de Historia natural, IV, 9, 1900. — E.-C. REED : Sinopsis de los Hemipteros de Chile. — C.-E. PORTER : Resistencia vital de algunos Artrópodos Chilenos.

Royal Society (Proceedings), LXXII, 438, 1900. ⊙

Sociedad española de Historia natural (Actas), octubre 1900. — D.-J. LAUFFER : Observaciones acerca de la longevidad de los Tenebriónidos.

Società Entomologica Italiana (Bullettino), XXXII, 2-3, 1900. — Dr A. FOA : Esistono il polimorfismo e la partenogenesi nei Gamasidi? (fig.). — G. NOÉ : Una nuova specie di Zanzara (pl.). — P. STEFANELLI : Nuova Catalogo illustrativo dei Lepidotteri ropaloceri della Toscana (2 art.). — F. SUPINO : Osservazioni sopra fenomeni che avvengono durante lo sviluppo postembrionale della *Calliphora erythrocephala* (pl.). — C. DEL GUERCIO : Osservazioni intorno ad una nuova Cocciniglia nociva agli agrumi in Italia ed al modo di immunizzare la parte legnosa delle piante contro la puntura delle Cocciniglie in generale e di distruggerle (fig. et pl.). — A. BERLESE : Intorno alle modificazioni di alcuni tessuti durante la ninfosi della *Calliphora erythrocephala* (fig.). — E. CANNAVIELLO : Contributo alla Fauna entomologica della Colonia Eritrea. — A. COGGI : Nuovi Oribatidi italiani (fig.). — F. SUPINO : Lettera aperta al Prof. A. Berlese della Scuola superiore di Agricoltura in Portici.

Societas Entomologica, XV, 16, 1900. — A. VOELSCHOW : Beschreibung einiger Lepidopteren-Aberrationen. — H. SEEMANN : *Neuromia popularis* als Schädiger des Mais. — F. HIMSL : Prodrömus einer Macrolepidopteren-Fauna des Traun- und Mühlkreises in Oberösterreich.

Société des Naturalistes de l'Ain (Bulletin), 15 novembre 1900. —
CH. BLIND : Les Microlépidoptères.

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire (Bulletin), XXVI, 6,
1900. — CH. TRUCHOT : Note sur la *Cecidomyia oenophila*.

Société Linnéenne du Nord de la France (Bulletin), XV, 329, 1900. —
G. BREDDIN : Le Mimétisme chez les Hémiptères (Trad. de
H. Laurent).

BACHELIER (L.) : La Scolopendre et sa piqûre; des accidents qu'elle dé-
termine chez l'homme. Paris, 1887, 56 p. — Don de M. J. de
Gaulle.

BELON (R.-P.) : A propos des travaux récents sur les *Lathridiidae*.
Notes supplémentaires à l'Essai de Classification (*Rev. d'Ent.*), 1900,
50 p.*

BERG (C.) : Datos Sobre algunos Crustáceos nuevos para la fauna Argen-
tina (fig.). (*Com. Mus. Nac. B.-Ayres*), 1900, 13 p.*

ID. : Apuntes Sobre dos especies del género *Odynerus* de la Tierra del
Fuego (*loc. cit.*), 1900, 4 p.*

ID. : Notice sur les espèces du genre *Alurnus* F. appartenant à la faune
Argentine (*loc. cit.*), 1900, 5 p.*

ID. : *Pleminia argentina*, un nuevo Scudofilido (*loc. cit.*), 1900, 3 p.*

BUDDEBERG (Dr) : Die Käfer von Nassau und Frankfurt, VIII : Beitrag
zur Käfer-Fauna der unteren Lahn (*Jahrb. Nass. Ver. Nat.*), 1900,
9 p.*

BUREAU (Dr L.) : Le Lycte canaliculé (*Lyctus canaliculatus* F.) et les
ravages qu'il fait dans les parquets et autres bois ouvrés (*Soc. Sc.
nat. Ouest Fr.*), 1900, 33 p.*

DELEGORGUE (Ad.) : Voyage dans l'Afrique australe, II (comprenant
toute la partie zoologique). Paris, 1847, 622 p., 1 carte. — Don
de MM. L. Bedel et J. Magnin.

FAIRMAIRE (L.) : Descriptions de Coléoptères nouveaux recueillis en
Chine par M. de Latouche (*Ann. Soc. Ent. Fr.*), 1899, 28 p.*
(2 exempl.).

JANET (Ch.) : Essai sur la constitution morphologique de la tête de l'In-
secte. Paris, 1899, 74 p., fig., 7 pl.*

- LÉVEILLÉ (A.) : *Catalogus Temnochilidum (seu Trogositidum) inter annos 1738-1900 editorum* (*Ann. Soc. Ent. Fr.*), 1900, 26 p.*
- Id. : Contribution à l'étude de la Faune entomologique de Sumatra (voyage de M. J.-L. Weyers). Trogositides (*Ann. Soc. Ent. Belg.*), 1900, 2 p. (2 exempl.)*
- MARCHAL (Dr P.) : Le cycle évolutif de l'*Encyrtus fuscicollis* (*Bull. Soc. Ent. Fr.*), 1898, 3 p. (2 exempl.)*
- MARTIN (JOANNY) : Sur un genre nouveau d'Hémiptère de la tribu des Scutellerinae (*loc. cit.*), 1899, 2 p.*
- MEUNIER (F.) : Sur un Mycetophilide de l'Ambre tertiaire (*loc. cit.*), 1897, 1 p. (3 exempl.)*
- PIC (M.) : Ichneumonides capturés en Algérie et description d'une espèce nouvelle (*loc. cit.*), 1897, 2 p.*
- Id. : Sur les instincts carnassiers des Anthicides (*loc. cit.*), 1897, 2 p.*
- Id. : Description d'un nouveau genre d'Elmides, de Tunisie (*loc. cit.*), 1900, 2 p.*
- Id. : Notes et diagnoses (2^e art.) (*L'Échange*), 1900, 4 p.*
- REITTER (E.) : Bestimmungs-Tabelle der europäischen Coleopteren. XLI, Carabidae, Harpalini und Licinini (*Verh. naturf. Ver. Brunn.*), 1900, 125 p. — Acquis pour la Bibliothèque.
- REUTER (E.) : The Systematic position of *Pseudopontia* (*Ent. Rec. Journ. Var.*), 1899, 3 p.*
- REUTER (E.) : Ueber die Weissährickeit der Wiensengräser in Finland (*Act. Soc. Faun. Flor. Fenn.*), 1900, 136 p., 2 pl.*
- ROBERTSON (CH.) : North-American Bees. Descriptions and Synonyms (*Trans. Ac. Sc. St-Louis*), 1897, 42 p. — Don de M. L. Bedel.
- SCHULTZ (O.) : Sur le rôle de l'air dans la dernière mue des nymphes aquatiques par M. Causard (*Ill. Zeits. Ent.*), 1900, 1 p.*
- SIMON (E.) : Descriptions d'Arachnides nouveaux de la Famille des Atidae (*Ann. Soc. Ent. Belg.*), 1900, 29 p.*
- Id. : Liste des Arachnides recueillis par M. C.-E. Porter en 1898-99 et descriptions d'espèces nouvelles (*Rev. Chil. Hist. Nat.*), 1900, 7 p.*
- Id. : Fauna Hawaiensis. Arachnida. Cambridge, 1900, 77 p., 5 pl.*
- STRAND (E.) : Et lidet Bidrag Th. Norges Entomologiske Fauna (*Ent. Tids.*), 1900, 6 p.*

TROUËSSART (Dr E.) : Diagnoses préliminaires d'espèces nouvelles d'Acarieens plumicoles. Additions et corrections à la sous-famille des Analgésinés (*Bull. Et. Sc.*), Angers, 1899, 62 p., 1 pl. — Don de MM. L. Bedel et J. Magnin.

TRUCHET (M.) : Rapport fait à l'Académie du Gard sur le traité complet du Kermès (*Rec. Mém. Obs. Phys. etc.*), 1838, 10 p. — Suivi de : « Observations sur les Charançons ou Calendres et en particulier sur une Calendre observée dans le riz de la Cochinchine ». Sans nom d'auteur. — Don de M. L. Bedel.

TSCHITSCHÉRINE (T.) : Notes sur quelques *Platysmatini* de la région Malgache (*Hor. Soc. Ent. Ross.*), 1900, 7 p.*

Id. : Notes sur les *Platysmatini* du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, VII-X (*loc. cit.*), 1900.*

Id. : Descriptions de quelques nouvelles espèces de la tribu du *Platysmatini* (*loc. cit.*), 1900, 16 p.*

Id. : Revision du sous-genre *Bothriopterus* Chaud. (genre *Platysma* Bon. Tsch.) (*loc. cit.*), 1900, 8 p.*

TÜMPEL (Dr T.) : Die Geradflügler Mitteleuropas, livr. 7 (fin). Eisenach, 1900, texte et pl. — Acquis pour la Bibliothèque.

A. L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 12 décembre 1900.

Présidence de M. A. GIARD.

M. Ch. Lallemant, de l'Arba (Algérie), assiste à la séance.

Correspondance. — M. R. Homberg remercie la Société de son admission.

— L'« Union zoologique italienne » qui s'est constituée à Bologne dans le courant du mois d'avril 1900, dans sa première assemblée et congrès zoologique national à Bologne (24-27 septembre), a décidé par un vote unanime d'envoyer, en lui annonçant sa constitution, un salut cordial à la Société entomologique de France

L'Union zoologique italienne tiendra sa prochaine assemblée annuelle à Naples, au printemps de 1901, elle sera toujours heureuse d'accueillir les membres de la Société entomologique de France qui voudront assister à ses congrès.

Distinction honorifique. — Le Président a le plaisir d'annoncer à la Société qu'au dernier congrès de l'« Association of economic Entomologists », réuni à New-York (Columbia University) le 22 juin 1900, notre collègue, M. E. Bordage, a été élu membre étranger de cette importante association.

Nécrologie. — Le Président a le profond regret d'annoncer la mort de M. le sénateur baron M.-E. de Selys Longchamps, membre honoraire de notre Société, décédé à Liège le 11 décembre, à l'âge de 87 ans.

M. de Selys Longchamps s'était fait connaître, très jeune encore, par des travaux sur l'Ornithologie et la Mammalogie de la Belgique. Bientôt son activité scientifique se porta principalement sur les Insectes. On lui doit le premier Catalogue des Lépidoptères de la Belgique (1837 et 1844). Plus tard il publia également le Catalogue des Orthoptères et Névroptères de son pays natal; mais c'est surtout par ses longues et belles recherches sur les Odonates du monde entier que M. de Selys-Longchamps s'est fait dans la science un nom impérissable.

Jusque dans ces dernières années, le savant veillard avait gardé toute son activité. En 1875, je l'ai vu, plus que sexagénaire, chasser avec ardeur les Névroptères aux environs de Buda-Pest. D'un abord affable et d'une complaisance sans bornes, il encourageait les efforts des jeunes naturalistes, et les rapports qu'on avait avec lui étaient remplis de charmes.

La mort de cet homme éminent est un deuil pour les entomologistes de tous pays.

Admissions. — M. le Dr Louis Bureau, professeur à l'École de médecine et directeur du Muséum d'Histoire naturelle, 15, rue Gresset, Nantes (Loire-Inférieure). *Entomologie générale*.

— M. L. Mathieu, directeur de la Station œnologique de Bourgogne, Beaune (Côte-d'Or). *Entomologie appliquée, Coléoptères*.

— M. W.-J. Rainbow, F. L. S., entomologist, Australian Museum, Sydney (N. S. W.). *Entomologie générale*.

Présentations. — M. Louis Béguin, 21, route de Paris, Montluçon (Allier) [*Coléoptères*], présenté par M. Ern. Olivier. — Commissaires-rapporteurs MM. A. Champenois et J. de Gaulle.

— M. le Dr C. Phisalix, Assistant au Muséum d'Histoire naturelle, 26, boul. St-Germain, Paris [*Entomologie générale, Arthropodes venimeux*], présenté par M. A. Giard. — Commissaires-rapporteurs MM. E.-L. Bouvier et J. Künckel d'Herculais.

Élection de membres honoraires. — Conformément aux termes de l'article 14 de son Règlement et après avoir entendu lecture du rapport de la Commission spéciale chargée de présenter une liste de candidats (séance du 24 octobre (1900), la Société procède à l'élection de deux membres honoraires.

Quarante-huit membres prennent part au vote, soit directement, soit par correspondance; ce sont MM. :

F. de Beauchêne, — Bedel, — Boileau, — Bourgeois, — Brölemann, — H. du Buysson, — Chabanaud, — Champenois, — Chardon, — Delval, — Dongé, — Duchaine, — Dumont, — Estiot, — Fairmaire, — Ferton, — François, — Gadeau de Kerville, — de Gaulle, — Giard, — A. Grouvelle, — J. Grouvelle, — Ph. Grouvelle, — Heimbürger, — Homberg, — Kieffer, — Künckel d'Herculais, — Jeanson, — de Joannis, — Lahaussais, — Lallemant, — Lamy, — Lesne, — Lévillé, — Magnin, — V. Mayet, — Mesmin, — A. Olivier,

— d'Orbigny, — Peschet, — Pic, — de la Porte, — Poujade, — Puton, — Sérullaz, — M. de Vauloger, — Viard, — Xamheu.

La majorité absolue est de 25 voix; les suffrages sont ainsi répartis :

M. le baron C.-R. von Osten-Sacken, 34 voix.

MM. A. Fauvel, 22; — P. Mabilie, 14; — L. Bedel, 6; — S.-H. Scudder, 6; — Abeille de Perrin, 3; — F. Baudi de Selve, 1; — H. du Buysson, 1; — Ganglbauer, 1; — O.-M. Reuter, 1.

M. le baron C.-R. von Osten-Sacken, ayant seul réuni la majorité absolue des voix, est proclamé membre honoraire de la Société entomologique de France.

— La Société décide qu'un second tour de scrutin pour la nomination d'un membre honoraire (*membre français*) aura lieu le 23 janvier 1901; tous les membres français sont priés de prendre part au vote qui aura lieu dans les conditions habituelles prévues au Règlement.

Changements d'adresse. — M. l'abbé de Sinety, séminaire de Vals, près Le Puy (Haute-Loire).

— M. A. Olivier, St-Vallier, par Grasse (Alpes-Maritimes).

— M. l'abbé Lelong, ancien aumônier militaire, Rethel (Ardennes).

Communications.

**Sur un nouveau Tyroglyphide (*Trichotarsus manicati*, n. sp.) [ACAR.]
parasite d'*Anthidium manicatum* L., et sur le genre *Trichotarsus***

Par Alfred GIARD.

L'*Anthidium manicatum* L. est commun à Wimereux où il butine sur *Ballota foetida* Lam., aux bords de la rivière. Vers le milieu de septembre certains individus, d'apparence fatiguée, portent sur la région métathoracique dorsale de nombreuses nymphes d'Acariens d'une espèce nouvelle, du genre *Trichotarsus*, dont je donnerai la diagnose suivante :

***Trichotarsus manicati*, nov. sp.** — *Nympha hypopialis pallide lutea, statura minuta, subglabra, pilis sparsis vestita; facie dorsali bipartita, parte anteriore fere triangulari; tarsis omnibus ungulo debili*

armatis; his quartae paris setis inaequalibus tribus instructis. Cupulae ventrales sex, in duabus lineis dispositae : quatuor anteriores subaequales, duo posteriores paulo minores. — Long. 0,03 mill.; lat. 0,18 mill.

Habitat in regione metathoracica Anthidii manicati L. — Wimeux (P.-de-C.).

A cette description sommaire on peut ajouter que les plaques margino-anales sont largement ovalaires et que l'avant-dernier article des tarses de la quatrième paire porte une épine assez forte. Il est probable que le *T. manicati* adulte se rencontrera dans les nids d'*Anthidium manicatum*.

Par l'existence de crochets aux tarses de toutes les pattes, cette espèce diffère des espèces européennes connues du genre *Trichotarsus* et se rapproche au contraire du *T. trifilis* Canestrini, parasite de *Xylocopa combinata* Ritz., de la Nouvelle-Guinée. La nymphe de *T. trifilis* est plus petite, plus velue et présente une troisième rangée de deux ventouses ventrales antérieure aux deux rangées que nous avons indiquées chez *T. manicati*.

Parmi les espèces d'Europe, c'est de *T. osmiae* Duf. que le parasite d'*Anthidium manicatum* se rapproche le plus. J'ai observé plusieurs fois le *Trichotarsus osmiae* sur *Osmia rufa* (L.) Panzer (*bicornis* L.) au jardin du Luxembourg. Certaines Osmies sont tellement couvertes de nymphes de cet Acarien qu'elles tombent sur le sol, le vol devenant impossible.

Donnadieu a très justement corrigé la diagnose donnée par Dufour pour *T. osmiae* en deux points importants : 1° les tarses n'ont qu'un seul crochet et ne sont pas biongulés comme le disait Dufour; 2° les tarses des membres postérieurs, dépourvus de crochets, sont terminés par trois soies et non par un poil unique (*Ann. Sc. nat. Zoologie* (5), t. X, 1868, p. 71, pl. I).

Il est singulier que P. Kramer et G. Canestrini, dans le fascicule des *Acarina* du *Tierreich* (7 Lief., 1899, p. 149) récemment publié, n'aient pas tenu compte du mémoire de Donnadieu en ce qui concerne cette espèce. Le tableau dichotomique donné par ces auteurs pour la détermination des *Trichotarsus* est par suite inutilisable.

Donnadieu, qui décrit le *Trichotarsus xylocopae* (*l. c.*, p. 72 et suiv.), répète d'après P. Gervais que le parasite du Xylocope a été vu d'abord par Bigot (Gervais, *Hist. nat. des Aptères*, III, p. 266). C'est une erreur. Dès 1742 Réaumur a signalé et figuré d'une façon très reconnaissable ce qu'il appelait le *Pou de l'Abeille perce-bois* (*Mém. sur l'Hist. nat. des Insectes*, t. VI, p. 52, pl. V, fig. 8 et 9.)

Le *Trichotarsus* de l'Abeille perce-bois ne paraît pas avoir suivi *Xylocopa violacea* dans son extension vers le Nord. Du moins ne l'ai-je jamais rencontré aux environs de Valenciennes où *Xylocopa violacea* est devenu de plus en plus abondant depuis un certain nombre d'années.

Il existe un *Trichotarsus* parasite de l'Abeille domestique qui semble bien constituer une espèce distincte. Mais, chose étonnante, cette espèce a été très imparfaitement figurée et je n'en connais pas de bonne description. P. Kramer et Canestrini ne la citent guère dans le *Tierreich*, et J. Pérez n'y fait qu'une brève allusion dans son livre, *Les Abeilles*, 1889, p. 94 et p. 88, fig. 23 f.

Le tableau de détermination des *Trichotarsus*, d'après les nymphes hypopiales, peut être établi comme il suit :

- | | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
| 1 | { | Des crochets aux tarses de toutes les pattes..... | 2. |
| | { | Des crochets aux tarses des 3 premières paires seulement. | 3. |
| 2 | { | Trois rangées de ventouses ventrales..... | <i>T. triflis</i> Can. |
| | { | Deux rangées de ventouses ventrales.. | <i>T. manicati</i> Giard. |
| 3 | { | 3 soies inégales à l'extrémité des tarses de la 4 ^e paire de
pattes..... | <i>T. osmiae</i> Duf. |
| | { | 2 soies inégales..... | <i>T. biflis</i> Can. |
| | { | 1 seule soie..... | <i>T. xylocopae</i> Donnad. |

Lépidoptères capturés dans l'Hérault

Par P. CHRÉTIEN.

En terminant la notice qu'il consacre dans son *Iconographie* à la chenille et au Papillon de la *Lithocampa Millierei* Stgr., découverte à Barcelone par Himmighoffen, Millière souhaite que cette belle Noctuelle fasse un jour partie de la faune française. C'est un fait acquis maintenant. J'ai eu le plaisir de trouver plusieurs chenilles de cette *Lithocampa*, sur les Chèvrefeuilles des environs de Saint-Pons-de-Thomières (Hérault), en juin et juillet derniers, et j'ai obtenu le Papillon le mois d'après.

Comme Lépidoptères espagnols que l'on peut rencontrer aux environs de Saint-Pons, je citerai encore l'*Acidalia miserata* Stgr., que j'avais déjà prise à Vernet-les-Bains (Pyr.-Or.), en 1894, toujours très rare; la *Tortrix rigana* Sod. à fond blanc, telle que Mûschler la signale dans sa notice sur les Lépidoptères récoltés par Hoffmansegg en Andalousie.

Dans nos pays et dans les Alpes, la chenille de *Tortrix rigana* vit sur les Anémones, principalement *An. pulsatilla* L., *vernalis* L., et le Papillon n'est jamais d'un blanc pur, mais d'un blanchâtre plus ou moins assombri et enfumé. Dans l'Hérault, à Saint-Chinian par exemple, la chenille vit aux dépens des feuilles basses d'une espèce de Clématite que je n'ai pas déterminée sur place, mais que je crois être la *Clematis recta* L., et le papillon est d'un beau blanc, parfois légèrement teinté de rose. L'espèce y a deux générations : avril-mai et juillet-août.

Je citerai enfin la *Metasia ibericalis* Rag., dont j'ai pris un exemplaire très frais à Saint-Pons, en juillet.

**Description d'une nouvelle espèce française
du genre *Podistrina* [COL.] et notes d'habitat**

Par J. BOURGEOIS.

Podistrina Peyerimhoffi, sp. nov. — *A P. Villardi* Bourg., cui valde affinis, elytris apice concoloribus antennisque, praesertim in femina, brevioribus et crassioribus discedit.

♂ Ailé. D'un noir de poix assez luisant avec les élytres parfois un peu brunâtres; mandibules et joues rousses. Tête sensiblement rétrécie en arrière, très finement pointillée, longitudinalement déprimée entre les antennes; yeux assez saillants; antennes atteignant presque l'extrémité du corps, à articles un peu moins grêles et moins allongés que dans *P. Villardi*, le 1^{er} plus épaissi vers l'extrémité. Pronotum assez transverse, un peu élargi d'arrière en avant, rebordé sur tout son pourtour, non ou à peine transversalement déprimé dans son milieu, sans sillon longitudinal visible, creusé en avant de l'écusson d'une petite fossette assez vaguement limitée, bords antérieur et postérieur légèrement arqués, les latéraux subrectilignes antérieurement, puis légèrement sinués vers la base, ce qui fait paraître les angles postérieurs un peu saillants, angles antérieurs subtronqués et sensiblement relevés en bourrelet. Écusson transversal, subarrondi à son bord postérieur. Élytres un peu plus de trois fois aussi longs que le pronotum, sensiblement plus larges que lui, assez densément recouverts d'une très fine pubescence d'un gris jaunâtre, rugueux, avec des vestiges de côtes longitudinales plus ou moins distinctes, concolores à l'extrémité; ailes prolongées au delà de l'abdomen, dépassant les élytres d'un tiers au moins de leur longueur. Dessous du corps et pattes d'un noir brunâtre; arceaux ventraux de l'abdomen étroitement bordés de flave pâle; dernier arceau dorsal assez allongé, incliné presque à angle

droit sur le précédent, fourchu à l'extrémité; dernier arceau ventral figurant deux appendices lobiformes, divisés postérieurement chacun en deux branches subégales, rectilignes, l'externe un peu plus grêle que l'interne. — Long. 4-4 1/2 mill.

♀ Aptère. Tête à peine rétrécie en arrière; yeux très peu saillants; antennes pas plus longues que la moitié du corps, à articles beaucoup plus courts et plus épais que dans *P. Villardi*; élytres très courts, ne dépassant pas le double de la longueur du pronotum, déhiscents, à pubescence excessivement fine et courte, concolores à l'extrémité; abdomen épais, d'un noir brunâtre, simple à l'extrémité, avec les arceaux ventraux marginés postérieurement de jaune pâle; tibia et tarses plus courts que chez le ♂. — Long. 3 1/2 mill.

Obs. — Le pronotum est généralement concolore; cependant, chez quelques-uns des exemplaires qui m'ont été communiqués, le rebord basilaire est plus ou moins teinté de flave, surtout dans le voisinage des angles postérieurs.

P. Peyerimhoffi est voisin de *P. Villardi* Bourg., mais s'en distingue à première vue par ses élytres d'un noir brunâtre concolore, sans tache soufrée à l'extrémité. La conformation des antennes chez la ♀ est, en outre, très caractéristique. Dans *P. Villardi*, en effet, ces organes dépassent sensiblement la moitié du corps et sont composés d'articles relativement minces et allongés, tandis que, dans *P. Peyerimhoffi*, ils atteignent à peine le milieu et leurs articles sont sensiblement plus épais et plus courts. Cette différence dans la gracilité des antennes s'observe également chez le ♂, mais à un degré beaucoup moindre. Enfin les élytres de *Peyerimhoffi* ♀ sont d'un tiers au moins plus courts que ceux de *Villardi* ♀.

Je me fais un plaisir de dédier cette intéressante espèce à M. P. de Peyerimhoff, qui l'a découverte cet été, au cours d'une chasse faite en compagnie de M. J. Sainte-Claire Deville, près de l'observatoire du mont Mounier (Alpes-Maritimes), à environ 2.750 mètres d'altitude. Les mâles, beaucoup plus nombreux que les femelles, se prenaient sur les pierres ou sur le sol; les femelles, sous les pierres ou à l'abri des plantes rampantes, notamment du *Galium helveticum*.

D'obligeantes communications me permettent d'ajouter les localités suivantes à celles déjà signalées pour quelques-unes de nos *Podistrina* françaises :

P. VILLARDI Bourg. — Cette espèce a été reprise en juillet dernier par M. l'abbé Carret, en fauchant les herbes qui poussent parmi les

cailloux et les blocs de rochers, à la source inférieure de l'Arc, dans la Haute-Maurienne. Sur une cinquantaine d'exemplaires capturés, il ne s'est trouvé que 7 à 8 femelles. Celles-ci vivent de préférence sous les pierres.

P. CHABAUTI Bourg. ♀. — Le Monestier; Le Lautaret (M. Pic); Larche (Abeille de Perrin); mont Mounier, près de l'observatoire, 31 juillet-1^{er} août, avec *P. Peyerimhoffi* (P. de Peyerimhoff et J. Sainte-Claire Deville).

P. CONTINUA Bourg. ♀. — Forêt de Chourges, au Nord de Faillefeu (J. Sainte-Claire Deville).

P. APTERA Kiesw. ♀. — La Sainte-Baume (Abeille de Perrin).

ERRATUM. — Dans la diagnose latine de *Podistrina algerica*, (*Bull. Soc. ent. Fr.* 1900, p. 284), au lieu de « *Pronoto transversaliter immarginato..... antice lateraliter depresso* », lire : « *Pronoto lateraliter immarginato..... antice transversaliter depresso* ».

Observations sur quelques types de Meigen, du Muséum de Paris [Dipt.] (suite) (1)

Par le Dr J. VILLENEUVE.

V^e Genre. MILTOGRAMMA.

Les espèces rangées plus tard dans le genre *Macronychia* sont particulièrement intéressantes. M. Pandellé est le seul auteur qui les ait nettement séparées. La vraie *agrestis* de Rondani, que M. Pandellé nomme *ungulans*, n'est pas représentée dans la collection Meigen.

1. *M. polyodon* (♂) = eod. nom. (Pand.).

La nervure transversale externe de l'aile n'est pas droite, comme chez *agrestis* Rond., mais sinueuse et moins oblique; le 1^{er} arceau abdominal est entièrement noir.

2. *M. agrestis* (2 ♂).

Celui qui porte l'étiquette « *agrestis* » a l'espace interoculaire plus large que l'œil et les côtés du front égaux ou plus larges que la bande frontale. L'abdomen est court et très convexe; l'aile est comme chez *polyodon*, qui précède (n° 1). Il répond à *dumosum* Pand.

L'autre mâle est identique à *polyodon* (n° 1). Je ferai remarquer que la femelle de *polyodon* (2 ex. dans ma collection) ne possède

(1) Voir pp. 157 et 363.

pas le long aiguillon abdominal qui existe chez la femelle d'*agrestis* Rond. (nec Meig.). De plus, chez *agrestis* Rond. la 3^e section costale de l'aile est notablement plus grande que la 5^e — elle est égale ou plus petite chez *polyodon* Meig. et *dumosum* Pand.

3. *M. signata* (♂) = *Pachyophthalmus signatus* (auct.).

4. *M. stictica* (♂) = *Hilarella italica* Rond.

5. *M. grisea* = *Metopodia grisea* B. B.

La petite nervure transversale est placée en dedans de l'abouchement de la 1^{re} nervure longitudinale à la côte.

6. *M. intricata* = *grisea*, qui précède (n° 5).

7. *M. melanura* = *Metopodia melanura* B. B.

Ici, la petite transversale est opposée à l'abouchement de la première longitudinale. Le dernier segment abdominal avec une large impression latérale noire couverte d'abondants poils couchés.

8. *M. taeniata* = *pilimana* Rond. ♀.

9. *M. murina* = *ruficorne* (Meig.) Pand.

10. *M. tessellata* = *oestracea* Zett. Schin. ♀.

11. *M. oestracea*.

Un exemplaire plus ou moins usé, que je crois être un mâle, mais dont les tarses antérieurs sont totalement dépourvus de soies. Il vérifie cependant la description de Meigen.

12. *M. fasciata*. Voyez Meig., t. IV, planche 40, fig. 26.

13. *M. tricuspis* et 14, *incompta*.

La tête manque.

15. *M. conica*, 3 ex. -- *Sphixapata* eod. nom. (auct.).

16. *M. rutilans*. Voy. Stein, Ent. Nachrichten. 1900, n° 9 et n° 10.

17. *M. heteroneura* est la même espèce que celle de Schiner.

VI^e Genre. CLISTA.

Groupe tout à fait hétérogène. Les *foeda* et *moerens*, seules, paraissent à leur place.

1. *C. lentis* (♀). Voy. Stein, loc. cit.

Est une *Scopolia*.

Identique à un exemplaire de ma collection, capturé dans le bois de l'Hautil (S.-et-O.) et que j'avais étiqueté, avec raison, je crois, *tricincta* Rond.

2. *C. obsoleta* (♂) = *Onesia clausa* Macq. Le chète antennaire qui subsiste est plumeux à la base.
3. *C. provida*. Voy. Stein, loc. cit.
4. *C. iners* (♀).

Chète antennaire court, cilié. Abdomen large, ovale, avec des macrochètes discales et marginales. Quelques cils sous les soies frontales. C'est une *Dexiaire* (sens. lat.).

5. *C. moerens* (♂) = *Phyto* eod. nom. (Pand.). Espèce commune en France dès le mois de mars.
6. *C. foeda* (♀). Voy. Stein, loc. cit.

C'est certainement une *Laewia*.

Elle répond à plusieurs exemplaires de ma collection, des environs de Paris, mais dont la taille est plus petite. Les mâles ont les antennes noires et les yeux villex. Cette espèce doit être identique à *Silbermannia petiolata* (Desv.) Pand.

A propos de *Gaenoptera Marmottani* Bris [Col.]

Par Albert FAUVEL.

M. Maurice Pic, très documenté sur les Cérambycides, je le reconnais, consacre une page du *Bulletin* (p. 300) à la synonymie et aux localités de *C. Marmottani* omises par M. V. Mayet (Ibid., p. 226).

Or, si M. Pic veut bien ouvrir le *Catalogue des Longicornes gallo-rhéniens* (*Revue d'Ent.*, 1884, p. 189 et 346; 1887, p. 228), il y trouvera les mêmes indications de synonymie et de répartition géographique, à part Samara, dont je n'avais pas à m'occuper.

Je notais même les montagnes du Beaujolais, localité certaine (malgré les doutes de M. Pic) et que m'avait signalée notre regretté collègue Cl. Rey.

A ces indications — suffisantes en deux lignes, — que notre excellent collègue pouvait rappeler simplement à M. Mayet, j'ajouterai les observations suivantes :

1^o Conformément au Catalogue de von Heyden (p. 332), j'ai cité dans ladite *Revue* (p. 336), parmi les localités de *Marmottani*, Eichberg, qui se trouve dans le Rheingau, près Johannisberg. M. Pic traduit cela par Rheingen, qui est un barbarisme géographique. Von Heyden dit textuellement : « *im Rheingau* », province du Nassau, au sud des monts Taunus et du Niederwald,

2° Malgré l'extension de sa note, M. Pic a omis une localité de *Marmottani* indiquée également par von Heyden (même Catalogue, *Sechst Nachtr.*, 1892, p. 81) : c'est Budenheim, près Mayence, où M. Mühl en a pris deux exemplaires dans des bourrées de branches sèches de Pin, en mai. M. Schultze en a retrouvé un ♂ à Mombach, le 30 juin, dans des bourrées de branches sèches de Peuplier.

Enfin M. v. Heyden m'a écrit qu'il en a capturé plus récemment encore un exemplaire à Echzell en Wetteravie (Hesse supérieure). C'est le point le plus septentrional où on ait rencontré l'espèce.

Malgré l'indication de M. Schultze, il est probable, d'après les observations de MM. Marmottan, Mühl et Mayet, que le *Marmottani* vit exclusivement sur les Conifères.

Remarque sur deux Cécidomyies [DIPT.]

Par J.-J. KIEFFER.

La Cécidomyie que H. Loew a décrite, en 1850, sous le nom de *Asphondylia sarothamni*, n. sp., a été observée et décrite bien auparavant par Bosc d'Antic. Le naturaliste français écrit en effet au sujet de ce Diptère, dans le Nouveau Cours complet d'Agriculture (Paris, Roret, 1838, t. III, p. 526) : « Je suis le premier qui ai étudié, décrit et dessiné cet insecte qui, certaines années, nuit beaucoup à la fructification du Genêt (*Spartium scoparium* L.) ». Comme il dit, au même endroit, qu'il a publié plus tard, en 1817, la description d'une Cécidomyie vivant sur *Poa nemoralis*, il en faut conclure que l'Insecte du Genêt a été décrit en 1817 ou avant cette date. J'ai cherché vainement à découvrir cette publication.

Une autre Cécidomyie signalée par Hartig, en 1839, sous le nom de *Cecidomyia fagi*, n. sp., aurait de même été décrite antérieurement sous le nom de *Tipula rubra*, par un professeur de Strasbourg, Hermann, dans « Opusculs posthumes ». C'est du moins ce que m'a écrit autrefois le docteur Fr. Löw. Il m'a été impossible de vérifier le fait.

Note complémentaire sur *Malthinus maritimus* Pic [COL.]

Par Maurice Pic.

M. J. Bourgeois ayant récemment jugé insuffisante la diagnose primitive de *Malthinus maritimus* Pic (*L'Échange*, n° 171), j'ai cru utile de publier une description très longue, dans l'espérance que

celle-ci permettra à mon savant critique de nous dire que *M. delicatulus* Bourg., postérieurement décrit (*Bull. Fr.*, 1899, p. 370, séance de décembre) peut être réuni à *maritimus* Pic, antérieurement publié (*L'Échange*, mars 1899).

M. MARITIMUS PIC. — *Elongatus, parallelus, parum nitidus, pallidus vel pallido-testaceus; capite postice plus minusve nigro aut infuscato, antice albido ♂, vel albido-testaceo aut rufescente ♀; antennis obscuris, articulo primo (interdum secundo) pallido; thorace plus minusve subtransverso, antice angustato, macula antica nigra notato ♂, aut disco plus minusve obscure lineato ♀; scutello testaceo vel brunnescente; elytris plus minusve obscuris, his ad latera aut medio variabiliter pallidioribus et apice sulphureo guttatis; pedibus pallidis, tibiis posticis simplicibus ♀, aut ad apicem distincte dilatatis ♂.* — Long. 3,6-4,2 mill.

Forme allongée, assez étroite, parallèle, aspect peu brillant, tête large surtout chez le ♂ et fortement rétrécie derrière les yeux qui sont bien saillants, blanchâtre en avant (♂), ou d'un blanc testacé passant quelquefois au roussâtre (♀), variablement foncée en arrière. Antennes grêles, dépassant la moitié du corps, obscures avec le premier ou les deux premiers articles pâles, le 3^e presque égal au 2^e. Prothorax modérément transversal, distinctement rétréci en avant, plus ou moins déprimé sur le disque, peu brillant, d'un testacé variable, orné soit d'une macule antérieure foncée variable (♂), soit d'une bande longitudinale un peu étranglée sur son milieu et très élargie en avant (♀), cette bande est noire ou d'un brun obscur. Écusson testacé ou rembruni. Élytres longs, parallèles, un peu plus larges que le prothorax à la base, trois fois environ aussi longs que larges, marqués de lignes de points forts; ils sont foncés, soit sur toute la longueur de la suture, soit en avant de la tache apicale et au pourtour de l'écusson, avec les côtés et quelquefois tout le milieu d'un testacé pâle; une tache apicale jaune soufre. Pattes pâles, longues, les tibias postérieurs simples ou droits (♀), ou plus ou moins brusquement dilatés avant leur extrémité (♂). Dessous du corps testacé. Avant-dernier segment ventral du ♂ échancré à son bord postérieur, le dernier fendu au sommet.

Basses-Alpes : Seynes; Alpes-Maritimes : Saint-Martin-Vésubie et Saint-Sauveur (Pic).

Très voisin du *seriepunctatus* Kiesw. (1) avec la coloration foncée

(1) Je ne compare pas *maritimus* à *balteatus* Suffr. plus éloigné, selon moi, malgré la conformation tibiale; les ♂ de *maritimus* Pic et *balteatus*

élytrale disposée d'une façon spéciale, la forme générale d'ordinaire un peu plus allongée, etc. Si les ♂♂ de *maritimus* Pic, par la structure de leurs tibias postérieurs nettement dilatés vers l'extrémité (et non simples ou seulement un peu épaissis au sommet) se distinguent facilement de *seriepunctatus* Kiesw. ♂, les ♀♀ sont plus difficiles à séparer, cependant d'ordinaire les ♀♀ de *seriepunctatus* ont une forme élytrale moins longue et une coloration générale plus largement testacée, la coloration foncée n'étant pas ou étroitement marquée dans le pourtour de l'écusson, tandis que chez *maritimus* cette dernière coloration forme une sorte de macule préscutellaire plus ou moins large, sans couvrir les épaules.

Nota. — M. J. Bourgeois m'a reproché, en termes qui m'ont semblé un peu vifs (*Bull. Fr.*, 1900, p. 303), de n'avoir pas signalé dès le début le caractère si important de la forme des tibias postérieurs du ♂. Malgré toute ma bonne volonté j'avoue qu'il m'a été impossible tout d'abord de parler de la structure de ces membres, et en voici la raison : le type primitif de cette espèce est défectueux, sans tibias postérieurs. Je dirai en passant qu'il ne faut pas rendre ce caractère sexuel des tibias postérieurs du ♂ indispensable dans une description, car ce serait exclure par avance le sexe ♀ ; d'un autre côté, comme les ♂♂ n'ont pas pour chaque espèce une structure tibiale spéciale, il ne faut pas exagérer l'importance de ce caractère.

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1900, II, 22-23. —

F. HENNEGUY : Le corps adipeux des Muscides pendant l'histolyse.

— C. PHISALIX : Un venin volatil. Sécrétion cutanée de *Julus terrestris* — J. KÜNCKEL D'HERCULAI : Les grands Acridiens migrateurs

de l'ancien et du nouveau monde, du genre *Schistocerca*, et leurs changements de coloration suivant les âges et les saisons : rôle physiologique des pigments.

Annals and Magazine of Natural History, sér. VII, vol. VI, 36, 1900.

— P. CAMERON : Description of new Genera and Species of Hymenoptera. — Tables.

Suffr. ont une conformation analogue des tibias postérieurs ; mais, chez cette première espèce, la dilatation est tout autre, plus rapprochée de l'extrémité ou moins marquée.

Bulletin de l'AFAS, novembre 1900. ☉

Chambre de commerce de Paris (Bulletin), 29 septembre 1900. — Discours de M. le Dr A. Fumouze et réponse de Sir John Lubbock (Lord Avebury).

Entomologische Nachrichten, 1900, 22 et 23. — M. BARTEL : Ueber zwei neue paläarktische Lepidopteren-Formen. — KRIECHBAUMER : Ueber den *Cryptus 4-guttatus* Gr. — F. KARSCH : *Pirga Weisei*, eine neue Lepidoptere (*Lymantriidae*) aus Ostafrika. — T. PIC : Zwei Varietäten von *Dorcadion equestre* Laxm. — F. KARSCH : Drei neue Lepidopteren aus Ostafrika gesammelt von H. Stabsarzt Dr Fülleborg. — KRIECHBAUMER : Offenbare Unrichtigkeiten in Thomson's Erklärung des Hinterflügels der Cryptiden. — *Notices nécrologiques* de O. Staudinger et J. Mik.

Entomologist (The), décembre 1900. — J. JAGER : Lepidoptera in South Devonshire. — W.-F. DE VISMES KANE : Catalogue of the Lepidoptera of Ireland : Supplementary List. — Dr H.-J. HANSEN : On the Morphology and Classification of the Auchenorrhynchous Homoptera. — W.-J. LUCAS : British Dragonflies of the older English Authors. — Prof. M. STANDFUSS : Synopsis of Experiments in Hybridization and Temperature made with Lepidoptera up to the end of 1898. — Notes diverses.

Entomologist's monthly Magazine (The), décembre 1900. — Mrs. E.-C. BARRETT : Notes on rearing *Stauropus fagi*. — J. EDWARDS : Two Species of *Typhlocyba* not hitherto recorded as British. — C.-R. v. D. OSTEN SACKEN : Notice on the Synonymy of *Anopheles maculipennis* Meigen. — Outline of Course in Entomology at the Massachusetts Agricultural College. — W. FOWLER : *Orochares angustatus* Er., a Genus and Species new to the British List. — Notes diverses. — Tables.

Feuille des Jeunes Naturaliste (La), 1^{er} décembre 1900. — E.-R. DUBOIS : Note sur l'habitat des Pseudo-Névroptères et Névroptères de la Gironde. — Notes spéciales et locales.

Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 1^{er} décembre 1900. — Dr L. KATHARINER : Versuche über den Einfluss der verschiedenen Strahlen des Spektrums auf Puppe und Falter von *V. urticae* L. und *V. io* L. (pl. col.). — E. WÖHL : Befall durch *Psilura monacha* L. — Dr S. MATSUMURA : Die schädlichen Lepidopteren Japans.

Linnean Society of London. — 1^o Journal, novembre 1900. —

CH. CHILTON : The Subterranean Amphipoda of the British Isles (2 pl.). — 2^o *Proceedings*, octobre 1900.

Naturaliste (Le), 1^{er} décembre 1900. — P. NOËL : La conservation des chenilles en collection.

N. Zealand Institute (*Transactions and Proceedings*), 1899. — PR. BENHAM : Zoological Results of Trawling Trials of the Coast of Otago. — Note on *Cordyceps Sinclairii* (pl.). — G.-V. HUDSON : Notes on Macro-Lepidoptera observed during the Summer of 1898-99. — CH. CHILTON : Note on the Fresh-water Crayfishes of N. Zealand. — P. CAMERON : Description of a New Species of *Halictus* (Andrenidae) from Christchurch, N. Zealand. — F.-W. HUTTON : Notes on N. Zealand Orthoptera. — The *Tipulidae*, or Crane-Flies of N. Zealand. — E. TREGGAR : A name for a Spider. — T. WHITE : A Hunting Spider. — Arachnids : the Small Pond in the Forest.

Novitates zoologicae, VII, 3, 1900. — W. ROTHSCILD et K. JORDAN : A Monograph of *Charaxes* and the allied Prionopterous Genera (5 pl.). — N.-C. ROTHSCILD : Notes on *Pulex avium* Taschb. (pl.). — H. GROSE-SMITH : Descriptions of new African Species of Acraeinae. — W.-J. HOLLAND : The Lepidoptera of Buru.

Psyche, IX, 296, 1900. — S.-H. SCUDDER : The Species of *Circotettix*, a North American genus of Oedipodinae. — H.-G. DYAR : Life Histories of North American Geometridae, XVII. — Supplementary Notes on *Orgyia*. — Jordan and Kellogg's Animal Life. — V.-L. KELLOGG : Stanford University's collection of Japanese Scale Insects.

R. Accademia dei Lincei (Atti), 1900, II, 10. ☉

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, 155-156, 1900. — DE ROCQUIGNY-ADANSON : Le petit Paon de nuit. — M. PIC : Coléoptères des inondations de la Loire.

Societas entomologica, 1^{er} décembre 1900. — B. SLEVOGT : Die Feinde unserer Lieblinge. — F. HIMSL : Prodrömus einer Macrolepidopteren-Fauna des Traun- und Mühlkreises in Oberösterreich. — P. BORN : Meine Excursion von 1900.

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire (Bulletin), octobre 1900. ☉

Société des Sciences naturelles et d'Enseignement populaire de Tarare (Bulletin), 15 octobre 1900. ☉

Société Entomologique de Belgique (Annales), XLVI, 11, 1900. — Dr E. ROUSSEAU : Contribution à l'étude des Carabides de l'Afrique cen-

trale. — Diagnoses d'Insectes du Congo : A. GROUVELLE : Clavicornes. — P. LESNE : Bostrychides. — M. PIC : Anthicidés : — G. KIRKALDY : Hémiptères (Hydrocorises). — P. DOGNIN : Hétérocères nouveaux de l'Amérique du Sud.

Société scientifique de Chili (Actes), IX, 4, et 5; X, 1, 1899-1900. ⊙

Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie, fasc. 71, 1900. — MARSHALL : Monographie des Braconides, pp. 337-376 et 1*-24.*

U. S. *Department of Agriculture, Division of Entomology*, 1^o Bulletin n° 26. New Series, 1900. — Proceedings of the twelfth annual Meeting of the Association of Economic Entomologists par DIVERS, (2 pl.). — 2^o *Farmers Bulletin*, n° 120. Washington 1900. — L.-O. HOWARD : The principal Insects affecting the Tobacco Plant (fig.).

BEDEL (L.) : Description d'une espèce nouvelle de *Nanophyes*, parasite du *Sedum telephium* L. (*Bull. Soc. Ent. Fr.*), 1900, 2 p.*

BORDAS (L.) : Étude comparée des organes reproducteurs mâles des Coléoptères (*C. R. Ass. fr. Av. Sc.*), 1899, 4 p.*

ID. : Contribution à l'Étude des Organes reproducteurs des Coléoptères. Glandes génitales mâles des Cleridae (*Ann. Soc. Ent. Fr.*), 1898, 9 p. 1 pl.*

ID. : Recherches sur les glandes anales des Carabidae (*C. R. Ac. Sc.*), 1899, 2 p.*

ID. : Considérations générales sur les organes reproducteurs mâles des Coléoptères à testicules composés et disposés en grappes (*loc. cit.*), 1899, 4 p.*

ID. : Appareil digestif d'un Orthoptère de la famille des *Grillidae*, le *Brachytrypes membranaceus* (*loc. cit.*), 1896, 4 p.*

ID. : Sur l'appareil génital mâle des Hyménoptères (*loc. cit.*), 1893, 3 p.*

FROGGATT (W.) : Australian *Psyllidae* (*Proc. Linn. Soc. N. S. W.*), 1900, 54 p., 4 pl.*

ID. : Insects and Birds (*Dep. Agr. N. S. W.*), 1900, 11 p.*

A. L.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 26 décembre 1900.

Présidence de M. A. GIARD

Correspondance. — Le Président donne lecture à la Société de la lettre suivante qu'il a reçue de M. le baron C.-R. v. Osten-Sacken, élu Membre honoraire dans la dernière séance :

Très honoré et cher Collègue,

Je viens de recevoir, par votre bienveillante entremise, la nouvelle de la distinction flatteuse dont la Société entomologique de France a bien voulu m'honorer, et je m'empresse d'en exprimer ma profonde et sincère reconnaissance. Je me sens heureux de pouvoir y ajouter l'expression de ma gratitude personnelle pour la part que vous y avez eue et pour la forme aimable que vous avez su donner à votre communication.

Il y aurait fausse modestie de ma part à ne pas reconnaître que j'ai *quelque* mérite. Mais, simple *dilettante* en matière scientifique, je ne me fais aucune illusion que ce mérite n'est dû qu'à la modeste vertu de la *persévérance*. Quelqu'un a très bien dit que la modestie n'est que de l'esprit de comparaison, et je me sens bien humble, lorsque je me compare à d'autres !

Ainsi, mon ami le Professeur Miall, à Leeds, vient de publier son ouvrage : *The Structure and Life-History of the Harlequin-Fly (Chironomus)* Oxford, 1900; résultat de dix ans, au moins, de recherches, et qui sera, pour longtemps, l'une des pierres angulaires de la science des Diptères. A côté d'un pareil mérite, le mien se réduit à très peu de choses.

Ma santé, dont vous avez bien voulu me demander des nouvelles, s'est beaucoup améliorée. J'ai pu me remettre à mon travail habituel, et j'espère encore passer quelques années à être âgé, sans être vieux.

Veuillez bien agréer, etc.

C. V. OSTEN-SACKEN
(né en 1828).

Distinction honorifique. — Le Président a le plaisir d'annoncer à la Société que notre collègue M. F. Henneguy, professeur au Collège de France, rapporteur du jury de la classe 42 à l'Exposition universelle de 1900, vient d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Nécrologie. — Le Président a le profond regret de signaler le décès de M. L. Huet, maître de conférences à la Faculté des Sciences de Caen. — Depuis 10 ans L. Huet faisait partie de notre Société; il avait publié d'intéressantes recherches sur les Crustacés Isopodes.

Démissions. — MM. Liautaud, de Clermont-Ferrand, et J. Passet, de Paris, ont donné leur démission de membres de la Société.

Admissions. — M. Louis Béguin, 21, route de Paris, Montluçon (Allier). *Coléoptères*.

— M. le Dr C. Phisalix, assistant au Muséum d'Histoire naturelle, 26, boul. Saint-Germain, Paris, 5^e. *Entomologie générale, Arthropodes venimeux*.

Voyage. — Nos collègues MM. J. Bonnier et Ch. Pérez, chargés d'une mission scientifique aux Iles Kerguelen, se sont embarqués le 15 décembre, à Anvers, sur le steam-yacht « Séluka » commandé par le capitaine de Gerlache. — Les membres de la Société qui désiraient leur écrire peuvent le faire, jusqu'au 25 janvier 1901, en adressant leurs lettres à Port-Louis (île Maurice) % Blyth broth. and Co.

Changements d'adresse. — M. M. Royer, 55 bis, rue de Villiers, Neuilly-sur-Seine (Seine).

— M. le capitaine Gruardet, 29, rue Guérin, Fontainebleau (Seine-et-Marne).

Collections. — M. A. Grouvelle annonce que Madame Croissandeau lui a envoyé la collection de Scydménides d'Europe de feu notre collègue J. Croissandeau dont elle fait don à la Société, et il dépose sur le bureau trois cartons de cette collection remarquable par le grand nombre d'espèces qu'elle renferme et par le soin de leur préparation.

La Société prie M. A. Grouvelle de vouloir bien se charger de transmettre, à Madame Croissandeau, l'expression de sa vive gratitude pour cet important et précieux cadeau.

Captures. — M. A. Giard signale l'existence en grand nombre, dans les serres du Muséum de Paris, de *Periplaneta australasiae*

Fabr. — Cet Orthoptère est originaire des régions australes du Pacifique, mais il est devenu cosmopolite. Il a été trouvé en Suède (J.-B. v. Borck, Skand. Raetv. Ins. 1848, p. 37). Il est naturalisé en Floride et dans plusieurs États du Sud des États-Unis. En Pennsylvanie on l'a rencontré à Philadelphie, dans des serres, où il attaqua surtout les Fougères du genre *Lastrea* (Insect Life, III, 1891, p. 406).

Communications.

Description d'une nouvelle espèce de Microlépidoptère de France, *Zelleria ribesiella*

Par l'abbé J. DE JOANNIS.

A la fin du mois de juillet 1895, je recueillis à La Louvesc (Ardèche), 1.150^m d'altitude, de petites chenilles vertes sur le *Ribes uva-crispa*; deux d'entre elles donnèrent, le 30 août suivant, des Papillons grisâtres, avec quelques points noirs, appartenant au genre *Zelleria*. L'année suivante, de nouvelles chenilles me donnèrent des Papillons rouge brun clair, à peine marqués de noir. Depuis lors, chaque année j'ai pu répéter ces élevages et, actuellement, je possède 65 exemplaires, 29 ♂ et 36 ♀, *e. l.*, se groupant comme il suit :

rouges, 19 ♂ et 23 ♀;

gris, 10 ♂ et 13 ♀.

La forme rouge figure donc environ pour les deux tiers.

Cette espèce est certainement distincte de *Z. phillyrella* Mill., dont la chenille vit sur la *Phillyrea angustifolia*, beaucoup plus petite d'envergure, à ailes plus étroites et possédant souvent un point noirâtre isolé sur le pli dorsal qui ne se trouve sur aucun de mes 65 exemplaires.

Z. hepariella Stt. est également beaucoup plus petit, le bord antérieur est brun rouge foncé et le bord interne clair. L'espèce du *Ribes* n'a, au contraire, jamais le bord antérieur plus foncé que le bord interne.

Z. insignipennella est l'espèce qui se rapproche le plus de celle de l'Ardèche, mais outre qu'il est possible qu'*insignipennella* soit seulement la ♀ de *hepariella*, *insignipennella* possède une teinte brun rouge beaucoup plus foncée que l'espèce de La Louvesc, avec le bord interne

plus clair et une ombre noirâtre traversant l'aile vers l'extrémité de la cellule.

Ajoutons que *Z. insignipennella* a été élevé sur le Genévrier, et *hepariella* sur le Frêne et l'*Artemisia vulgaris*.

La description de *Z. fusca* Stt. est bien sommaire, mais elle n'a point l'air de s'appliquer à l'insecte de l'Ardèche qui n'a jamais la teinte « dark fuscous » mentionnée par l'auteur.

Je crois donc pouvoir considérer l'espèce élevée sur le *Ribes* comme inédite et je propose de la nommer :

***Zelleria ribesiella*, n. sp.**

♂, moyenne : 17,4 mill. ; ♀, moyenne : 16 mill.

Ailes supérieures susceptibles de deux teintes principales :

1^o) forme rouge, la plus fréquente; en général rouge brun clair, tournant parfois au jaune brun rougeâtre, d'autres fois au rouge rosé, très rarement au jaune ocracé rosé;

2^o) forme grise; en général gris rosé ou gris jaunâtre passant parfois au jaunâtre pâle. Dans ces deux formes, le bord antérieur n'est jamais plus foncé que le bord interne.

De la base, près du bord antérieur, part une ligne droite, claire, blanchâtre ou blanc rosé, qui suit la médiane sans atteindre le bord; cette ligne est limitée de chaque côté par des bordures d'écailles plus foncées, souvent jaune d'ocre ou grises, le liséré supérieur se prolongeant jusque vers l'apex où se trouve, en général, un groupe d'écailles noires ou brun noirâtre. De plus, l'aile supérieure porte des écailles noires plus ou moins nombreuses, abondantes surtout chez la forme grise, parfois presque totalement absentes, et qui, lorsqu'elles sont présentes, forment, en tout ou en partie, les dessins suivants : un liséré sur la côte elle-même, à la base, suivi de quelques écailles noires en ligne sur la région costale; deux séries longitudinales d'écailles, l'une sur le bord antérieur de la cellule, l'autre sur la région dorsale; deux points superposés, parfois réunis, à l'extrémité de la cellule; enfin une petite traînée d'écailles allant de ces deux points discoïdaux à l'apex, et parfois une autre, beaucoup moins dense, dans la cellule, aboutissant à ces mêmes points. Frange concolore dans la région apicale, parfois un peu roussâtre à l'apex dans la forme grise; en deçà la frange est grise. *Ailes inférieures* grises, frange concolore. En dessous, gris, la frange des ailes supérieures un peu teintée de rougeâtre à l'extrémité, vers l'apex.

Tête variable du rouge brun clair au blanc plus ou moins jaunâtre, pas toujours concolore avec les ailes supérieures. Thorax de mêmes teintes, plus souvent concolore, mais pas d'une façon absolue. Abdomen gris en dessus, rougeâtre en dessous ainsi que la poitrine. Antennes annelées de noir en dessus, blanches en dessous. Première paire de pattes : cuisses blanches à l'intérieur, rose et noir à l'extérieur, tibias et tarses noirâtres. Deuxième paire : cuisses et tibias gris, blanc et noir, tarses blancs, tachetés de noir à l'extrémité. Troisième paire blanc grisâtre, blanches intérieurement.

La chenille a été recueillie depuis les premiers jours de juillet jusqu'au commencement de septembre; les éclosions ont eu lieu du 14 août au 21 septembre, avec un maximum du 27 août au 2 septembre.

J'ai prié M. P. Chrétien d'examiner et de décrire la chenille de cette espèce.

Description de la chenille

de *Zelleria ribesiella* de Joann. [MICROLÉP.].

Par P. CHRÉTIEN.

Adulte, cette chenille mesure environ 14 mill., est fusiforme comme les chenilles des autres *Zelleria*, me paraissant toutefois moins atténuée aux extrémités et ayant une tête plus forte; elle est de couleur verte, plus foncée sur le dos, plus claire sous le ventre, ces deux teintes bien tranchées et d'aspect un peu velouté; lignes dorsale et sous-dorsale vert très foncé, cette dernière plus large; verruqueux indistincts, poils châtain clair, légèrement roussâtre; stigmates indistincts; tête vert clair, présentant des nébulosités brunâtres disposées en lignes épaisses sur le bord interne des calottes et, au milieu, esquissant vaguement une longue tache cunéiforme, ocelles noirs, épistome ayant de chaque côté, au milieu, un point noirâtre, bouche teintée de carné; écusson, clapet et pattes écailleuses de la couleur du fond.

Quoique vive et frétilante, elle m'a paru l'être beaucoup moins que la chenille de *Zell. phyllyrella* Mill.

Le cocon est fusiforme, un peu naviculaire, fait de soie blanchâtre peu fournie et laissant voir la chrysalide à travers le tissu. Il est en outre entouré de nombreux fils de soie tendus dans toutes les directions pour le maintenir aux objets environnants, ce qui le rend assez volumineux.

La chrysalide est assez allongée, d'un brun jaunâtre, plus foncé sur les ptérothèques, ces dernières striées transversalement; les extrémités

des enveloppes des ailes, des antennes et des pattes postérieures sont libres à partir du cinquième segment abdominal, et les enveloppes des ailes sensiblement dépassées par celles des antennes et des pattes postérieures; abdomen à derniers segments assez épais, le pénultième même un peu renflé; mucron arrondi et armé de quatre soies fortes, raides, assez longues et disposées en ligne : les deux du milieu très proches, se touchant même, leurs pointes divergentes ou recourbées du côté dorsal, les deux extrêmes écartées à la base, droites et plus longues.

Le Papillon éclôt trois semaines environ après la formation du cocon.

Observations nouvelles sur les *Peripatus* [ONYCH.]

Par E.-L. BOUVIER.

Ayant pu étudier récemment les importantes collections d'Onychophores des Musées de Berlin, et de Cambridge (Mass.), je crois utile de relever ici quelques-unes des observations principales que cette étude m'a permis de faire.

Je signalerai en premier lieu la vaste extension géographique, jusqu'ici insoupçonnée, que présentent certaines espèces. Le *P. Edwardsi* Bl., de la Guyane, se trouve à Caracas (Mus. de Berlin) où il coudoie le *P. Sedgwicki* Bouv., en Colombie, à côté du *P. Brölemanni* (Mus. de Berlin), et se retrouve dans la presqu'île de Panama (Mus. de Cambridge). Le *P. brasiliensis* Bouv. paraît jouir du même privilège; signalé d'abord à Santarem, sur l'Amazonc, on le retrouve à San-Pablo sur Panama, où M. Mac Neil l'a capturé (Mus. de Cambridge).

Par contre certaines espèces paraissent localisées dans des régions restreintes où elles sont d'ailleurs assez largement répandues. C'est le cas notamment du *P. Sedgwicki* Bouv. qui semble confiné dans la zone de Caracas, du *P. inthurmi* Sclat. qu'on n'a pas signalé jusqu'ici en dehors des Guyanes, et du *P. Brölemanni* qu'on retrouve depuis la colonie Tovar jusqu'au littoral de Puerto Cabello (Mus. de Berlin).

Ces espèces à aire réduite rappellent, par leur distribution géographique, les *Peripatus* insulaires; chaque île des Antilles paraît avoir ses espèces ou ses variétés particulières. La Trinité possède pour sa part le *P. trinidadensis* Sedgw. et le *P. torquatus* Kennel, St-Vincent le *P. juliformis* Guild., la Dominique le *P. dominicae*, Antigua la var. *antiguensis* de cette dernière espèce et Porto-Rico sa var. *juanensis*, nov. var.; St-Thomas est occupée par le *P. juliformis* G. et par sa var.

danicus Bouv., la Jamaïque par le *P. jamaicensis* Gr. et Cock. et par le *P. juliformis* var. *Gossei* Bouv.

La var. **juanensis** représente à Porto-Rico le *P. dominicae*; elle en diffère par ses papilles principales plus serrées, par ses papilles accessoires moins saillantes, par le nombre un peu plus élevé de ses pattes (31 ou 32 paires chez les ♀, 27 paires chez les ♂), enfin par la présence d'un seul tubercule sexuel au lieu de deux sur les deux paires de pattes prégénitales des mâles. Les exemplaires typiques de cette nouvelle variété appartiennent au Musée de Berlin, ils avaient été décrits par Peters sous le nom de *P. juliformis*.

La collection berlinoise renferme un très remarquable *Peripatus* qui fut recueilli à Matagalpa (Nicaragua), par le Dr Rothschule. Cet exemplaire est une femelle de grande taille, d'un brun noir assez uniforme et munie de 32 paires de pattes. Par ses plis tégumentaires et l'arrangement de ses papilles, cet Onychophore rappelle surtout les *P. Edwardsi* les plus normaux, encore que ses papilles principales soient moins inégales et que les papilles accessoires y fassent en grande partie défaut. Mais le caractère le plus frappant de ce spécimen est la réduction extrême des soles pédieuses qui sont fort peu allongées et qui se réduisent presque à trois arceaux, le quatrième étant toujours limité à une très faible surface. Sur les pattes IV et V, cet arceau est rejeté en avant du très gros tubercule urinaire, et des papilles principales viennent se grouper vers le bas et en arrière, pour former, avec l'arceau rudimentaire, un demi-cercle autour du tubercule. Cette disposition est des plus caractéristiques.

Ce spécimen appartient évidemment à une espèce nouvelle pour laquelle je proposerai le nom de **P. nicaraguensis**. Par la réduction extrême de son quatrième arceau pédieux, cette espèce tend à se rapprocher, plus que toute autre, du *Peripatus Tholloni* et des autres Onychophores africains, espèces qui ne présentent, comme on sait, que des soles à trois arceaux.

Sur un type oublié de la famille des Monstrillidae
(*Thaumatoessa armoricana* Hesse) et sur un cas nouveau
de parasitisme chez les *Monstrilla* [CRUST. COP.]

Par Alfred GIARD.

En 1868, dans la seizième partie de ses *Observations sur des Crustacés rares ou nouveaux des côtes de France*, Hesse a décrit et figuré,

d'après un exemplaire unique provenant de la rade de Brest, un Crustacé Copépode qu'il a classé dans le genre *Thaumatoessa* (= *Thaumaleus* Kroeyer) sous le nom de *Th. armoricana*. Ce Crustacé avait été recueilli, en mars 1849, dans des touffes de *Griffithsia corallina*.

Depuis, aucun des auteurs qui se sont occupés des *Monstrillidae* (Kriczagin, G.-C. Bourne, Giesbrecht, Poppe, Timm, etc.) n'a reparlé de cet animal remarquable cependant à plus d'un titre.

La taille (5 mill.) dépasse celle de toutes les autres espèces du groupe.

La couleur rouille brillant indique un type dont la vie non parasitaire doit être assez longue et, en fait, Hesse l'a conservé vivant pendant plusieurs mois.

La réticulation de la partie antérieure, figurée par Hesse (*l. c.*, fig. 20), rapproche cette espèce de *Thaumaleus reticulatus* Giesbr.; mais, comme il y a trois segments entre le segment génital et la furca, ce serait plutôt un *Monstrilla* au sens de Giesbrecht, si d'autres caractères ne lui assignaient une place à part dans la famille. Hesse croyait que le Crustacé étudié par lui était du sexe mâle (*l. c.*, p. 368). Il est évident, d'après les dessins et d'après la description, qu'il s'agissait au contraire d'une femelle n'ayant pas encore pondue. La coloration vert pomme foncé du milieu du corps, coloration conservée malgré un long séjour dans l'alcool, était due sans doute aux ovaires qui présentent une teinte verte chez toutes les espèces de *Monstrillidae* observées. Hesse avait pris pour des pinces destinées à saisir la femelle les tiges minces abdominales qui servent à la fixation des œufs.

La particularité la plus curieuse de *Th. armoricana* serait l'existence de pièces buccales inconnues chez les autres *Monstrillidae* où, par suite de la vie parasitaire, l'appareil trophique est entièrement avorté. Malgré ce que les dessins de Hesse ont généralement de très fantaisiste, on ne peut supposer qu'il ait inventé complètement les trois paires d'appendices qu'il a figurées sous le nom de mandibules et pattes-mâchoires (1^{re} et 2^e paires).

L'existence d'une bouche, rendue probable d'ailleurs par la longue vie libre de *Th. armoricana*, serait un caractère suffisant pour la création d'un genre nouveau, et si on ne veut pas reprendre pour ce genre le vieux nom de *Thaumatoessa*, devenu libre par l'abandon qu'en a fait Kroeyer lui-même, on pourrait le modifier un peu et désigner sous le nom de **Thaumatohessia** le Copépode étudié par Hesse.

Ed. Graeffe a publié récemment une observation qui me paraît devoir être interprétée comme un nouveau cas de parasitisme d'un

Monstrilla dans une Annélide. Voici en effet ce qu'écrit Graeffe au sujet d'une espèce qu'il rattache à *M. rigida* :

« *Monstrilla rigida* Bourne (syn. *Cymbasoma rigidum* Thomson, *Thaumaleus Claparedii*? Giesbrecht) — Habitat et époque d'apparition : Cette forme de Copépode si remarquable et encore si imparfaitement connue se rencontre isolément entre les Algues, plus rarement dans le plankton; j'ai trouvé une fois le *Monstrilla* encore vivant dans l'estomac d'un *Syllis*. »

Il me paraît évident, d'après le passage souligné, que le *Monstrilla* vivant était parasite du Syllidien. L'organisation des *Syllis* ne leur permet pas, en effet, d'engloutir vivante une proie du volume d'un *Monstrilla*. Le cas observé par E. Graeffe serait donc à rapprocher de ceux que j'ai fait connaître antérieurement.

*
* *

HESSE. Observations sur des Crustacés rares ou nouveaux des côtes de France (*Ann. Sc. nat. Zoolog.* (5), t. X, 1868, p. 362-371, pl. 19, fig. 20-34).

GIARD (A.). Sur l'éthologie du genre *Thaumaleus* Kr. (*C. R. Acad. Sc.*, 29 avril 1895).

— Sur le parasitisme des *Monstrillidae* (*C. R. Acad. Sc.*, 16 nov. 1896.)

— Sur le parasitisme placentaire des *Monstrillidae* (*C. R. de la Soc. de Biologie*, 6 février 1897).

GRAEFFE (Edward). Uebersicht der Fauna des Golfes von Triest (*Arbeiten aus d. Zoolog. Instit. Wien*, t. XIII, 1900, Heft I, p. 8 [40]).

Notes pour servir à la faune entomologique de l'Auvergne

Par C. BRUYANT et A. EUSÉBIO.

Les travaux déjà anciens de Baudet-Lafarge, Bayle, Guillemot; d'autre part les contributions plus récentes de MM. H. du Buysson, Desbrochers des Loges, Fauvel, Flammery, Ern. Olivier et de bien d'autres de nos collègues, ont permis de fixer dans ses grands traits la faune entomologique de nos massifs montagneux du centre (Cantal, mont Dore, monts Dômes, Forez). Néanmoins, les entomologistes sédentaires ont encore d'amples moissons à faire. Aussi nous proposons-nous de signaler, au hasard de nos captures, les espèces qui ont échappé aux recherches de nos devanciers.

JAPYX SOLIFUGUS Haliday. — Cette intéressante espèce a été découverte par l'un de nous, en avril, au Puy Crouel, près de Clermont-Ferrand, et retrouvée à Courpière (vallée de la Dore) par M. L. Duchasseint. Depuis ces premières captures, nous avons constaté sa présence dans de nombreuses localités : vallée de Ceyrat, Puy de Marmant, Vic-le-Comte, Puy de Corent, vallée de Chanat. C'est en automne et au printemps qu'il faut rechercher les *Japyx* sous les pierres, aux pentes des collines bien exposées, à des altitudes inférieures à 700 mètres. — Nous n'avons pu réussir à maintenir cette espèce en observation, toutes nos tentatives d'élevage ayant échoué.

DREPANOPTERIX PHALENOIDES L. — Deux exemplaires, en battant les taillis, près de Durtol, mai (Dufour).

CERASCOPUS DOMESTICUS Scop. — Dans les maisons. Clermont, 5 exemplaires ; Lezoux (Duchasseint).

GERRIS ODONTOGASTER Zett. — Lac des Sauvages (Cantal), avril 1900 ; lac d'Estivadoux (Puy-de-Dôme), septembre 1899.

CARABUS VARIOLOSUS F. — M. le Dr Bonnard a bien voulu nous signaler la capture (1899) de deux exemplaires de cette espèce aux environs des bains du Mont-Dore. Un exemplaire de *C. variolosus* avait été pris pendant l'excursion de la Société entomologique de France, en 1859 (Martin, *l. c.*, p. 32) et M. l'abbé Viturat en avait retrouvé un second, en août 1883, à 1 kilomètre au-dessus de la ville, sous une pierre (Fauvel, *l. c.*, p. 315).

Faune halophile. — La présence d'un très grand nombre de sources minérales est un des traits caractéristiques de l'Auvergne. Lorsque ces eaux ont été libres de s'épancher à la surface du sol, elles l'ont recouverte, parfois sur une étendue considérable, d'un travertin caractéristique qui constitue un substratum particulier pour le développement de la flore et de la faune.

La florule minérale est depuis longtemps connue en Auvergne, et notre collègue M. H. du Buysson (1885) a décrit celle de l'Allier. Restait à découvrir la faunule correspondante. Nos recherches ont porté sur les régions de St-Nectaire (alt. 780 m.), Ste-Marguerite (alt. 345 m.), Mirefleurs et Médagues (alt. 300 m.), dont les sources renferment une assez forte proportion de chlorure de sodium. Nous avons été ainsi amenés à considérer comme particulières à nos champs salés les espèces suivantes :

Amara erythrocnemis Zim., — *Pogonus halophilus* Nic., — *Phily-*

drus halophilus Bed., — *Bledius spectabilis* Kr., — *Bledius* sp. — *Cyclonotum hispanicum* Kust.

Nous devons la détermination de ces espèces à l'extrême obligeance de notre savant collègue M. L. Bedel, auprès de qui notre ami M. R. du Buysson a bien voulu nous servir d'intermédiaire. Toutes sont nouvelles pour la faune du Centre, sauf *Cyclonotum hispanicum* déjà signalé par M. des Gozis (E. Olivier, 1890, l. c., p. 367).

Cette faunule caractéristique peut paraître assez pauvre; mais il faut remarquer que le champ de développement des espèces halophiles est en réalité très restreint. Il y a lieu, d'autre part, d'établir une distinction entre la *faune* et la *population animale*. Il ne s'agit point ici, sauf pour *Amara erythrocnemis*, de captures isolées; *Pogonus halophilus* est commun à Ste-Marguerite et à Mirefleurs; *Cyclonotum hispanicum* abonde sous les détritiques à demi-incrustés au bord des eaux de Médagues et de St-Nectaire. Enfin *Philydrus halophilus* n'est rare ni à Médagues ni à St-Nectaire. Nous nous tenons d'ailleurs à l'entière disposition de nos collègues qui désireraient posséder des échantillons de ces diverses espèces.

Bibliographie.

- BAUDET-LAFARGE. — Essai sur l'Ent. du Dép. du P.-de-D. Monogr. des Lamelli-antennes. Clermont..... 1809
- Catalogue des Insectes coléoptères trouvés dans le dép. du P.-d.-D. *Ann. sc. litt. et ind. de l'Auvergne*. Clermont..... 1835
- Essai sur l'Ent. du Dép. du P.-d.-D. M. des Carabiques. Clermont. 1836
- BÉGUIN. — Coléoptères nouveaux pour l'Allier. *Rev. sc. du Bourbonnais*. Moulins..... 1899
- BELLIER DE LA CHAVIGNERIE. — Obs. sur les Lépidoptères de l'Auvergne. A..... 1850
- BRUYANT. — Les Fourmis des environs de Clermont. *Rev. d'Auvergne*. Clermont..... 1890
- Intr. à la faune d'Auvergne. *Rev. Sc. du Bourbonnais*. Moulins.. 1898
- Contr. à la Géogr. ent. de l'Auvergne. *Bull. Soc. Ent. Fr.*.... 1899
- La faune des eaux minérales. *Bull. hist. scient. de l'Auvergne*. Clermont..... 1900
- BRUYANT et EUSEBIO. — Faune de l'Auvergne. Carabides et Cicindélides. *Rev. d'Auvergne*. En cours de publ.
- Sur la faune halophile de l'Auvergne, *C. R. Ac. Sc.*..... 1900
- H. DU BUYSSON. — Flore des marais salés de l'Allier. *Ann. Soc. hort. de l'Allier*..... 1885

- H. DU BUYSSON. — Promenade d'un naturaliste au Mont-Dore. *Le Naturaliste*..... 1886
- DAUDE. — Le touriste au Cantal. St-Flour (sans date).
- DESBROCHERS DES LOGES. — Notes diverses. *Bull. Soc. Ent. Fr.*
..... 1865, 1866, 1872, 1874
- N. sur l'Entom. du Bourbonnais *Ass. sc. du Bourb.* Moulins.. 1866
- N. entom. en zig-zag. *L'Échange*..... 1891
- Quelques jours de chasse aux Insectes au Mont-Dore. *Le Frelon*. 1891
- Extr. du catalogue de Bayle. Tours..... 1895
- FAUVEL. — Essai sur l'Ent. de la Haute-Auvergne. *Rev. d'Entom.*.. 1887
- FLAMMARY. — Hymén. nouveaux ou encore n. signalés en Auvergne.
Rev. d'Auvergne..... 1898
- GIVOIS. — Les Erebies du Mont-Dore. *Rev. sc. du Bourbonnais*... 1889
- GUÉNÉE. — Une promenade dans les mont. du Cantal. *Bull. Soc. Ent. Fr.*..... 1874
- GUILLEMOT. — Cat. des Lép. du P.-d.-D. *Ann. sc. litt. ind. de l'Auvergne* 1854
- Premier suppl. au Cat. du P.-d.-D. *Ibid*..... 1858
- MARTIN. — R. sur le Congrès de la Soc. Ent. de France tenu à Clermont-Ferrand et en Auvergne, en 1859. A..... 1859
- MAYET (VALÉRY). — S. les Insectes dits des terrains salés. *Bull. Soc. Ent. Fr.*..... 1897
- NOËL. — Le naturaliste au Cantal. *Feuille des jeunes naturalistes* 1878-79
- OLIVIER. — Excursion en Auvergne. *Rev. sc. du Bourbonnais*..... 1888
- Faune de l'Allier. Vol. II, 1^{re} partie. Coléoptères. Moulins..... 1890
- Faune de l'Allier. Vol. II, 2^e partie. Orthoptères. Moulins..... 1891
- Les Hémiptères de l'Allier. *Rev. sc. du Bourbonnais*..... 1899
- PRADIER. — Ins. coléoptères du P.-d.-D. *Ann. Soc. agr. sc. et arts du Puy*..... 1855-1856
- ROUCHY. — Le naturaliste au Mont-Dore. *F. des Jeunes naturalistes*..... 1876
- SAND. — Cat. raisonné des Lépid. du Berry et de l'Auvergne. Paris.. 1879
- SIMON. — Notice sur quelques Coléoptères rec. au Cantal. *Bull. Soc. Ent. Fr.*..... 1875
- XAMBEU. — N. et obs. s. les Anthicides de France. *F. des jeunes naturalistes*..... 1879-1880

Sur *Tachina civilis* Rond. [DIPT.]

Par le Dr J. VILLENEUVE.

J'ai eu la bonne fortune de rencontrer cette espèce dans deux envois importants de Tachinaires que j'ai reçus d'Autriche à peu près simultanément, l'un du R. P. Thalhammer, de Kalocsa (Hongrie), l'autre de M. le Dr A. Langhoffer, de Zagreb-Agram (Croatie). Parmi les espèces de Hongrie se trouvaient aussi quatre exemplaires d'*Eutachina Winnerzti* B. B. dont le quatrième segment abdominal est rougeâtre. Cette dernière, qui ressemble beaucoup à *T. civilis* Rond., existe aussi dans le midi de la France, et M. Pandellé, dans son « Étude sur les Muscides de France », les a confondues.

De son côté, le regretté Prof. Mik, de Vienne, a cru reconnaître *T. civilis* Rond. dans une espèce dont les gènes sont revêtues de soies fines et qui, de ce fait, a nécessité la création d'un nouveau sous-genre, *Ptilotachina* B. B.

Il était inadmissible, a priori, qu'un observateur aussi attentif et aussi sagace que Rondani n'eût pas remarqué la coloration rougeâtre du dernier segment abdominal ou la présence de cils sur les gènes, d'autant plus que ce dernier caractère est fréquemment employé par Rondani pour la formation de ses genres.

Chez *Eut. Winnertzi*, la taille est plus grande et le 4^e segment abdominal rougeâtre à l'extrémité dans les 2 sexes; les soies frontales (4-5) descendent à peu près jusqu'au milieu de la face chez le ♂, jusqu'à la soie antennaire chez la ♀. Les antennes sont entièrement noires (♂ ♀) et le troisième article égale 3 fois le 2^e.

Chez *Eut. civilis*, le dernier segment abdominal est noir à son extrémité; les soies frontales (3-4) dépassent à peine le chète antennaire chez le ♂ et ne dépassent pas le 2^e article de l'antenne chez la ♀.

Chez le ♂, le 3^e art. ant. = 1 f. 1/2 le 2^e.

Chez la ♀, — = 2 f. le 2^e.

Chez cette dernière, les 2 premiers articles sont rougeâtres. Les pattes sont noires.

Il en est ainsi chez les 2 femelles que je possède. Cependant Rondani dit de la femelle (sur un exemplaire unique) : « *Sat diversa a mare, femoribus et medio tibiis rufis* ». Est-ce la vraie? il est permis d'en douter.

**Notes synonymiques sur quelques espèces de Muscides [DIPT.]
créées par M. Pandellé**

Par le Dr J. VILLENEUVE.

Un certain nombre de Tachinaires n'ont pas été reconnues par l'auteur des « Études sur les Muscides de France », et je crois utile de rapporter ces espèces nouvelles aux descriptions des devanciers dont la priorité est acquise. Telles sont :

1. *Oppia ciligera* (Rob.) Pand. = *Brachycoma devia* Meig. type.
2. *Bonannia monticola* Rond. et Pand. doit être aussi *Tryphera lugubris* (Meig.) B. B.
3. *Zenillia pumicata* (Meig.) Pand. = *Phorocera pavidus* Meig. type.
= *Phorocera cilipeda* Rond. et non *P. pumicata* Meig.
4. *Exorista patellipalpis* Pand. types (♂ ♀) = *E. phalenaria* Rond.
5. *Exorista temera* (Meig.) Pand. = *E. mitis* Meig. type.
6. *Erigone barbicultrix* Pand. = *Megalochaeta ambulans* Meig.
7. *Roeselia convexifrons* (Zett.) Pand. = *Ptychomyia selecta* Meig.
8. *Tachina ignota* (Perris) Pand. est probablement *Dexodes machniropsis* B. B.
9. *Tachina agrestis* (Rob.) Pand. = *Paraphorocera senilis* Rond.
10. *Tachina rutila* (Meig.) Pand. = *Ceromasia florum* Rond. = *Masicera rutila* Schiner (nec Meigen).
11. *Tachina induta* Pand. = *Pexomyia rubrifrons* Perris = *Roeselia aberrans* Egg. (teste Brauer).
12. *Tachina incedens* (Rond.) Pand. = *Argyrophylax pelmatoprocta* B. B.
13. *Tachina discrepanda* Pand. = *Argyrophylax pupiphaga* Rond.
14. *Tachina civilis* (Rond.) Pand. = *Eutachina Winnertzi* B. B.
15. *Etheria grisea* (Rob.) Pand. = *E. pedicellata* Rob. nec *grisea* = *Tamiclea cinerea* Macq. 1837 = *Androphana grandis* B. B.
16. *Phyto tessellata* (Rob.) Pand. = *Clista aenescens* Zett. = *Clista ignota* B. B.
17. *Sarcophila hirticornis* (Zett.) Pand. = *Frauenfeldia rubricosa* Meig. ♂ = *Fr. trilineata* Meig. ♀.

18. *Sarcophaga cruentata* (Meig.) Pand. n'est pas *S. cruentata* Meig., type qui est identique à *S. nurus* Rond.
19. *Sarcophaga cyathisans* Pand. = *S. albiceps* Meig., type (nec Meade).
20. *Sarcophaga incisilobata* Pand. = *S. striata* Meig. type.
21. *Sarcophaga dissoluta* Pand. = *S. dissimilis* Meig. type.
22. *Sarcophaga arvorum* (Meig.) Pand. n'est pas *S. arvorum* Meig., type qui est le même que *S. sinuata* Meig.

**Notes sur les *Bythinus* Leach, de Tunisie [COL.]
et description d'une espèce nouvelle**

Par Maurice Pic.

Les *Bythinus* de Tunisie n'ont jamais été l'objet d'une étude spéciale et même, je crois, aucune espèce n'a été particulièrement citée de ce pays. Ce très court article est destiné, en attendant mieux, à signaler la présence en Tunisie de trois espèces de ce genre, dont une nouvelle, toutes trois rapportées de mon récent voyage dans le Nord de l'Afrique.

J'ai recueilli ces espèces dans les conditions suivantes :

B. algericus Raffr. En tamisant des débris de jonc dans le marais de Bulla-Reghia, près de Souk-el-Arba, lors d'une chasse entreprise en compagnie de notre collègue le Dr Normand.

B. tunisus m. En tamisant des feuilles de Chêne, à Aïn-Draham (Kroumirie).

B. diversicornis Raffr. var. *pallidior* m. Avec le précédent, en nombre.

La var. *pallidior*, var. nov., outre sa coloration générale testacée, paraît différer de *B. diversicornis* Raffr. (*Rev. et mag. de Zool.* 1873, p. 367) par le premier article des antennes (♂ ♀) subcylindrique, assez long, cet article chez le ♂ est presque droit et à peine épaissi en son milieu.

Ces trois espèces pourront se reconnaître à l'aide du tableau suivant :

- | | |
|---|----|
| 1. Premier article des antennes plus ou moins allongé (♂). | |
| Deuxième article aussi large que le premier. Tête et prothorax paraissant plus larges ou plus courts..... | 2. |
| 1' Premier article des antennes un peu épaissi (♂). Deuxième | |

article un peu plus étroit que le premier. Tête et prothorax paraissant plus étroits ou plus longs.....

..... *diversicornis* Raffr. v. *pallidior* Pic.

2. Premier article des antennes plus long, relativement mince.

Coloration générale testacée..... *algericus* Raffr.

- 2' Premier article des antennes moins long, un peu épaissi. Co-

loration générale rembrunie ou noire, avec les palpes, an-

tennes, pattes et élytres d'un testacé rougeâtre. *tuniseus*, n. sp.

On reconnaîtra en outre *B. tuniseus* m. à l'aide de la diagnose qui suit :

Bythinus tuniseus, n. sp. — *Satis minutus, convexus, crassus, pallide setosus, plus minusve obscurus vel rufo-brunneus, elytris rufo-testaceis, palpis, antennis pedibusque testaceis; capite rufo-brunneo, breve, transverso, modice sculpturato; oculis mediocribus; antennis testaceis, validis, articulo primo cylindrico, satis elongato, 2° spherico, 3°-6° plus minusve subtransversis, ultimo maximo; thorace rufo-brunneo, breve, crasso, nitido, indistincte punctato, ad basin transverse sulcato; elytris rufo-testaceis, satis brevibus, lateribus subrotundatis, humeris prominulis, basi leviter sulcatis, fortiter sat sparse punctatis; pedibus testaceis, gracilibus, tibiis plus minusve arcuatis; corpore subtus rufo-brunneo.* — Long. 4 mill.

D'après la classification de la Monographie de Reitter ⁽¹⁾, *B. tuniseus* doit être placé dans le groupe des *Machaerites* Miller et près de *algericus* Raffr.; il rappelle tout à fait, par sa forme, cette dernière espèce et s'en distingue par le premier article des antennes moins long et un peu épaissi, la coloration plus foncée de la majeure partie du corps, etc.

Synonymies de quelques espèces et variétés de *Dorcadion* [COL.]

Par Maurice Pic.

Dorcadion Laufferi Escal. (*Actas Soc. Esp. de Hist. Natur.*, sept. 1900, p. 236), préoccupé par *D. Bolivari* var. *Laufferi* Pic (*Mat. Long.* III, févr. 1900, p. 7), pourra prendre le nom de *cercedillanum*; et *D. grisescens* Escal. (*l. c.*, p. 240), préoccupé par *D. Bolivari* var.

(1) Traduction parue dans *L'Abeille*, t. XXV, 1888.

grisescens Pic (*l.c.*, p. 7), celui de *Escaleraï*. Le nom de var. *rufipes* Escal. ⁽¹⁾, attribué à une variété de *D. Bolivari* Lauffer, devra être changé en celui de var. *Rodriguesi*. Le nom de *rufipes* a été donné par Fabricius (*Ent. Syst.* I, 2, 288), c'est par conséquent un des premiers publiés.

NOMINATIONS ANNUELLES

La Société entomologique de France, aux termes de ses Statuts et de son Règlement, et pour la soixante-neuvième fois depuis sa fondation, procède au renouvellement annuel de son Bureau, de son Conseil et de ses Commissions spéciales.

Sont élus pour 1901 :

MEMBRES DU BUREAU

<i>Président</i>	MM. E. SIMON,
<i>Vice-Président</i>	H.-W. BRÖLEMANN,
<i>Secrétaire</i>	PH. FRANÇOIS,
<i>1^{er} Secrétaire adjoint</i>	J. DE GAULLE,
<i>2^e Secrétaire adjoint</i>	P. LESNE,
<i>Trésorier</i>	CH. LAHAUSOIS,
<i>Archiviste-Bibliothécaire</i>	A. LÉVEILLÉ,
<i>Archiviste-Bibliothécaire adjoint</i>	J. MAGNIN.

CONSEIL

MM. CH. ALLUAUD, — H. DESBORDES, — P. ESTIOT (*Membres restants*); — A. GIARD, — A. GROUVELLE, — L. VIARD (*Membres nouveaux*) — et les Membres titulaires du Bureau.

COMMISSION DE PUBLICATION

MM. J. DE GUERNE, — l'abbé J. DE JOANNIS, — A. LÉCAILLON, — P. LESNE, — H. D'ORBIGNY — et les Membres titulaires de Bureau.

COMMISSION DE LA BIBLIOTHÈQUE

MM. L. BEDEL, — l'abbé J. DE JOANNIS, — P. MABILLE — et les Membres titulaires du Bureau.

(1) *Actas*, 1900, p. 238.

COMMISSION DU PRIX DOLLFUS

MM. E.-L. BOUVIER, — E. DONGÉ, — PH. FRANÇOIS, — J. DE GAULLE,
— A. GIARD, — A. LÉVEILLÉ, — P. MABILLE, — G.-A. POUJADE, —
E. SIMON.

COMMISSION DES COLLECTIONS ⁽¹⁾

MM. L. BEDEL, — E. DONGÉ, — J. DE GAULLE, — l'abbé J. DE
JOANNIS, — PH. GROUVELLE, — J. MAGNIN, — G.-A. POUJADE.

Bulletin bibliographique.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 1900, II, 24-25. —

BÉHAL et PHISALIX : La quinone, principe actif du *Iulus terrestris*.

— S. JOURDAIN : Le venin des Scolopendres. — *Tables*, 1^{er} semestre, 1900.

Académie des Sciences de Cracovie (Bulletin international), octobre 1900. ⊙

Académie Impériale des Sciences de St-Petersbourg. — Annuaire du Musée zoologique, V, 3, 1900. — A. SKORIKOW : Eine neue *Japyx*-Art (*Thysanura*) aus der östlichen Bucharei (pl.).

Berliner Entomologische Zeitschrift, 1900, III-IV. — H. STICHEL : Sitzungsberichte des Entomologischen Vereins in Berlin für das Jahr 1899 (fig.). — C.-W. VERHOEFF : Beiträge zur Kenntniss paläarktischer Myriopoden, XV; Lithobiiden aus Bosnien, Herzogovina und Dalmatien. — Ein beachtenswerther Feind der Blutlaus. — H. RIFFARTH : Die Gattung *Heliconius* Latr. Neu bearbeitet und Beschreibung neuer Formen. — TH. BECKER : Dipterologische Studien V, Pipunculidae. — PRINZESSIN THERESE VON BAYERN : Auf einer Reise in Südamerika gesammelte Insekten, II : Orthopteren (pl. et fig.). — PR. D^r RUDOW : Die Wohnungen der Haflügl er Europas mit Berücksichtigung der wichtigen Ausländer. — H.-J. KOLBE : Ueber einige Cerambyciden aus Mhonda in Deutsch-Ost-Afrika (pl.). — O. THIEME : D^r Otto Staudinger†.

Canadian Entomologist (The), décembre 1900. — L.-O. HOWARD : Remarks on *Psorophora ciliata*, with Notes on its early Stages

(1) Commission élue pour trois ans (ART. 32 du Règlement).

(fig.). — O.-C. POLING : Notes on *Neophasia Terlooti* Bhr., from Arizona, with Description of a new Variety. — A.-R. GROTE : Classification of the Butterflies. — G.-B. KING : A new *Pulvinaria* from New Mexico. — T.-D.-A. COCKERELL : Notes on New Mexico Bees. — A.-W. HANHAM : Additions to the List of Manitoba Butterflies with Notes on other Species. — A.-R. GROTE : Corrections. — W.-H. ASHMEAD : Some changes in generic Names in the Hymenoptera. — A. GIBSON : The Life-History of *Arctia phalerata* Harr.

Carnegie Museum (The), 1899-1900. — Publications n° 6-7. ⊙

Entomological News, XI, 9-10, 1900. — G.-W. BROWNING : A Tiger Hunt in the West. — H.-N. CAUDELL : Description of Larvae of *Azelina peplaria* Hübn. — E.-A. SMYTH : Identity of *Hemaris tenuis* Grt. and *H. diffinis* Bsd. — C.-L. MARLATT : The European Pear Scale. *Diaspis piricola* (Del Guercio) Saccard. — T.-D.-A. COCKERELL : A new *Eriococcus*, with Remarks on other Species. — N. BANKS : A new Species of Myrmeleon from Texas. — H.-F. WICKHAM : Recollections of Old Collecting Grounds. — O.-W. BARRETT : Some Strange Habits. — Notice nécrologique sur G.-D. Hulst (portrait). — W.-H. ASHMEAD : Some Hymenopterous Parasites from Dragonfly Eggs. — H.-G. DYAR : Life History of a *Callidryas Agarithe*. — G.-A. EHLMANN : Notes on Coleoptera. — C. ADAMS : Odonata from Arkansas. — P. WILMATT et T.-D.-A. COCKERELL : A new Variety of *Argynnis Nitocris*. — W.-H. ASHMEAD : Some new Exotic Parasitic Hymenoptera. — J.-A. REHN : Notes on the Distribution of *Podisma variegata* Scd. — C.-G. SOULE : *Cecropia* Cocoons. — Notes diverses.

Entomologist's Record and Journal of Variation (The), XII, 12, 1900. — H.-R. BROWN : Over three Passes, the Splügen, the Stelvio and the Brenner, with Some Notes on the Butterflies by the way. — W.-J. KAYE : Some Diary Notes on the Season's Collecting. — J.-W. TUTT : On the generic name *Micropterix* (*Micropteryx*) Hb. — E.-B. POULTON : *Hypolimnas misippus* captured at Sea. — F.-E. LOWE : *Tortrix pronubana* in Guernsey. — T.-A. CHAPMAN : The egg of *Cossus ore* Streck., with some Notes on the egg of *C. ligniperda*. — H. et W. TUTT : Lepidoptera in the Hautes-Alpes : Abries. — F. MERRIFIELD : Larvae of *Deilephila euphorbiae*. — J.-C. DOLLMAN : Lepidoptera at Burgess Hill, Sussex. — F.-E. LOWE : Lepidopterological notes from Orta in Piedmont and neighbourhood. — Notes diverses. — Tables.

K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (*Verhandlungen*), L,

9, 1900. — A. HANDLIRSCH : Neue Arten der Hymenopteren-Gattung *Stizus*, gesammelt von Dr H. Brauns in Südafrika (fig.). — G. LUZE : Revision der europäischen und sibirischen Arten der Staphyliniden-Gattung *Tachinus* Grav. nebst zwei Bestimmungstabellen. — A. HANDLIRSCH : Ein neuer *Nysson* aus Nordafrika (fig.). — Ein neuer äthiopischer *Nysson* (fig.). — Ueber die Sogenannten « Localfaunen » und Speciell über G. Strobl's « Steirische Hemipteren ».

R. *Accademia dei Lincei (Atti)*, 1900, II, 11. ⊙

R. *Istituto di Studi superiori pratici e di Perfezionamento in Firenze (Pubblicazioni)*, 1896-97. — Divers travaux de Médecine et de Physiologie. ⊙

Sociedad científica « Antonio Alzate » (Memorias y Revista), XIV, 7-8, 1900. — Dr F. ALTAMIRANO : Quelques observations physiologiques sur les effets du venin du Scorpion de Jojutla (texte espagnol).

Societas Entomologica, 15 décembre 1900. — Dr K. DANIEL : Vorläufige Diagnosen. — F. HIMSL : Prodromus einer Macrolepidopteren-Fauna des Traun- und Mühlkreises in Oberösterreich. — P. BORN : Meine Excursion von 1900.

Société d'Études Scientifiques d'Angers (Bulletin), XXIX, 1900. — Dr TROUSSERT : Description d'espèces nouvelles d'*Halacaridae* et description d'un genre nouveau. — Note préliminaire sur les Acariens marins (*Halacaridae*) recueillis aux Açores par S. A. le Prince de Monaco (campagnes de 1886-88).

Société Entomologique de Belgique (Annales), XLIV, 12, 1900. — H. SCHOUTEDEN : Note sur les Hémiptères de Belgique. — O.-E. JANSON : Species of *Gnathocera*.

Société scientifique du Chili (Actes), X, 2, 1900. ⊙

Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie, VII, fasc. 72, 1900. — J.-J. KIEFFER : Monographie des Cynipides, p. 513-592, pl. XXI-XXIV.

A. L.

BIENFAITEURS

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

BRISOUT DE BARNEVILLE (Charles).

BRISOUT DE BARNEVILLE (Henri).

CROISSANDEAU (Joseph).

DOLLFUS (Jean).

MARSEUL (S. de).

NOUALHIER (Maurice).

PEYERIMHOFF (H. de).

PIERRET (Alexandre).

PISSOT (Émile).

SÉNAC (D^r Hippolite).

MEMBRES DONATEURS
DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

MM. FAUVEL (Albert), à Caen.

GIARD (Alfred), à Paris.


GROUVELLE (Philippe), à Paris.

LISTE DES MEMBRES

DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

ANNÉE 1900.




Président d'honneur.

1842-1882-1892. FAIRMAIRE (Léon),  A., anc. directeur de l'hôpital St-Louis, 21, rue du Dragon, Paris, 6^e. *Col.*, *Hymén.* et *Hém.*




Membres honoraires.

1894. AVEBURY (LORD) [SIR JOHN LUBBOCK], St-James, 2, Londres S.W. (Angleterre). *Ent. gén.*
1894. FABRE (J.-H.), correspondant de l'Institut, Sérignan (Vaucluse). *Ent. gén.*
- 1861-1901. MABILLE (Paul), agrégé de l'Université, 75, rue du Cardinal-Lemoine, Paris, 5^e. *Lépidoptères*, *Coléoptères* et *Névroptères*.
1899. MEINERT (V.-A.-Frederik), professeur à l'Université et conservateur du Muséum de Copenhague, Kong Georgs Vej, 19 F. *Entomologie générale*, *Myriapodes*.
- 1881-1900 * OSTEN-SACKEN (baron C. von), 8, Bunsen-Strasse, Heidelberg (Allemagne). *Diptères*.
1894. PACKARD (A.-S.), Providence, R. I. (États-Unis d'Amérique). *Ent. gén.*
- 1862-1894. PÉREZ (J.), *, prof. à la Faculté des Sciences, 21, rue Saubat, Bordeaux (Gironde). *Ent. gén.*; *anat.*; *Hymén.*





NOTA. — L'astérisque (*) désigne les membres libérés ou à vie.





- 1856-1885. * PUTON (Dr Auguste),  A., Remiremont (Vosges). *Col.; Hymén. et pr. Hémipt. de France.*
- 1877-1899. * ROMANOFF (Son Altesse Impériale le grand-duc NICOLAS MICHAÏLOVITCH), St-Petersbourg (Russie). *Lép.*
- 1851-1894. SAUSSURE (Henri DE),  24, Cité, Genève (Suisse). *Ent. gén.; Orthoptères.*
- 1863-1899. SIMON (Eugène),  A., 16, villa Saïd (70, rue Pergolèse), Paris, 16^e. *Arach., Crust.*

Membres à vie et Membres ordinaires.

1864. * ABEILLE DE PERRIN (Elzéar), 10, rue Émeric-David, Aix (Bouches-du-Rhône). *Ent. paléarctique générale, sauf Lép.*
1863. ALLARD (Gaston), route des Ponts-de-Cé, à la Maulevrie, près Angers (Maine-et-Loire). *Col. eur.*
1885. * ALLUAUD (Charles),  A., 3, rue du Dragon, Paris, 6^e. *Col. afr. et malgaches.*
1887. ALPHERAKY (Serge), au palais de S. A. I. le grand-duc Michel, St-Petersbourg (Russie). *Lép. d'Eur. et d'Asie.*
1900. AMANS (Dr Paul), 37, avenue de Lodève, Montpellier (Hérault). *Mécanique des Arthropodes, vol des Insectes.*
1853. AMBLARD (Dr Louis), 14 bis, rue Paulin, Agen (Lot-et-Garonne). *Hymen*
1857. * ANDRÉ (Ernest),  A., notaire honoraire, 17, rue des Promenades, Gray (H^e-Saône). *Ent. gén.; Hém. et Hymén. du globe, pr. Mutillides et Formicides.*
1900. ANGLAS (Jules), préparateur de zoologie à la Faculté des Sciences, 62, boulevard de Port-Royal. Paris, 5^e, *Entomologie générale, Hyménoptères.*
1869. ANTESSANTY (l'abbé Gabriel D'),  A., aumônier du Lycée, Troyes (Aube). *Col. de France.*
1896. APOLLINAIRE-MARIE (frère), professeur d'Histoire naturelle au pensionnat des Frères, à Longuyon (Meurthe-et-Moselle). *Col. et entomologie appliquée.*

1880. * ARGOD (Albert), Crest (Drôme). *Col. de l'Ancien Monde, Longicornes et Col. cavernicoles du globe.*
1892. ASTIC (M.-E.-Auguste), notaire, à Feurs (Loiret). *Ent. gén.*
1891. AZAM (Joseph), architecte, 14, rue de Trans, Draguignan (Var). *Orth., Hémipt. et Dipt.*
1859. * BAER (G.-Adolphe), 8, rue des Messageries, Paris, 10^e. *Ins. du Pérou et des îles Philippines.*
1892. BAILLIOT (Dr Marcel), 114, boul^d Hourteloup, Tours (Indre-et-Loire). *Col.*
1899. * BANGE (l'abbé V. DE), 4, montée de Fourvière, Lyon (Rhône). *Coléoptères.*
1899. BARBEY (Auguste), expert forestier, Moncherand-sur-Orbe, canton de Vaud (Suisse). *Entomologie forestière; Coléoptères.*
1877. * BARGAGLI (marchese cav. Piero), piazza S^{ta}-Maria, Florence (Italie). *Col. et Hymén.*
1899. BATAILLON (E.), chargé de cours de Zoologie à la Faculté des Sciences de Dijon (Côte-d'Or). *Entomologie générale. Physiologie des insectes.*
1846. BAUDI DE SELVE (chevalier Flaminio), ✠, 18, via Baretti, Turin (Italie). *Col.*
1888. BEAUCHÈNE (Fernand DE), capitaine au 70^e régiment d'infanterie de ligne, 25, boul^d de Laval, Vitré (Ille-et-Vilaine). *Ent. gén., pr. Col. gallo.-rhén.*
1888. BECKER (Theodor), Stadtbaurath, Liegnitz, prov. Schlesien (Allemagne). *Dipt.*
1866. * BEDEL (Louis), ✠ A., ✠ M. A., 20, rue de l'Odéon, Paris, 6^e. *Col. paléarctiques.*
1900. BÉGUIN (Louis), 21, route de Paris, Montluçon (Allier). *Coléoptères.*
1899. BÉGUIN (V.), pharmacien de 1^{re} classe, 43, avenue de la République, Paris, 11^e. *Coléoptères, pr. vésicants.*
1889. BEGUIN-BILLECOQ (Louis), ✠ A., ✠, attaché au ministère des Affaires étrangères, 4, rue des Bauges, Paris, 16^e. *Ent. gén., pr. Col. eur.*






1857. BELLEVOYE, graveur, 27, rue de Talleyrand, Reims (Marne). *Col. europ. et algér.*
1873. * BELON (Rév. P. Marie-Joseph), professeur de Théologie, 8, quai de Tilsitt, Lyon (Rhône), *Col. eur.*
1897. BENOIT (Charles), 12, rue Princesse, Paris, 6^e. *Coléoptères.*
1877. BERG (Dr C.), directeur du Musée national de Buenos-Ayres (Rép. Argentine), 470, Casilla del Correo. *Ent. gén., pr. Lép.*
1885. BERGROTH (Dr E.), Tammerfors (Finlande). *Ent. gén., pr. Hém.*
1893. * BERTHOUMIEU (l'abbé G.-V.), 5, rue Bertin, Moulins (Allier). *Ichneumonides d'Europe.*
1899. BÉZAGU (L.), 5, rue de Sèze, Bordeaux (Gironde). *Entomologie générale et appliquée, Lépidoptères.*
1890. BIBLIOTHÈQUE DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS (J. Deniker, bibliothécaire), 8, rue de Buffon, Paris, 5^e.
1894. BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE DE L'UNIVERSITÉ, Strasbourg (Alsace) (Barach, bibliothécaire).
1883. * BINOT (Jean), 22, rue Cassette, Paris, 6^e; l'hiver : villa Bonnet, route d'Antibes, Cannes (Alpes-Maritimes). *Col.*
1877. * BLANC (Édouard),  A., C. , 52, rue de Varenne, Paris, 7^e. *Ent. gén., pr. Col.*
1889. * BLANCHARD (Dr Raphaël), , prof. à la Faculté de Médecine, membre de l'Académie de Médecine, 226, boulevard St-Germain, Paris, 7^e. *Ent. gén.*
1885. * BLAVY (Alfred),  I. P., avocat à la Cour d'appel, 4, rue Barraderie, Montpellier (Hérault). *Mœurs, métam.; étude des larves, pr. aquatiques.*
1896. BLEUSE (Léon), 11, rue Marceau, Rennes (Ille-et-Vilaine). *Col.*
1881. BLONAY (Roger de), 23, rue de Larochefoucauld, Paris, 9^e. *Ent. gén., pr. Col.*
1886. BOBEUF (Henry), banquier, 54, rue Lafayette, Paris, 9^e. *Col. eur.*
1895. BOILEAU (Henri), ingénieur des Arts et Manufactures, 60, rue de la Victoire, Paris, 9^e. *Carabides et Lucanides du globe.*
1872. BOLIVAR (Ignacio), professeur d'Entomologie à l'Université, Museo de Historia natural, 7, calle Moreto, Madrid (Espagne). *Col. et Orth. eur.*

1891. * BONAPARTE (prince Roland), 10, avenue d'Iéna, Paris, 16^e. *Ent. gén.*
1883. * BONHOURS (Alphonse), *, gouverneur de la Côte française des Somalis, à Djibouti et 2, rue Chaptal, Paris, 9^e. *Col. eur.*
1899. BONNET-EYMARD (Geoffroy), 2, rue de France, Grenoble (Isère). *Entomologie générale, Coléoptères.*
1894. BONNIER (Jules),  I. P., directeur adjoint de la station biologique de Wimereux, 75, rue Madame, Paris, 6^e. *Ent. gén., Crust.*
1859. * BONVOULOIR (comte Henry DE), 6, rue Yvon-Villarceau, Paris ; et Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). *Col.*
1879. BONY (vicomte Gaston DE), 36, rue Vaneau, Paris, 7^e. *Cicindérides et Carabides du globe, pr. Carabus, Calosoma et Nebria.*
1898. BORDAGE (Édouard), conservateur du Muséum d'Histoire naturelle de St-Denis, île de la Réunion. *Entomologie générale.*
1898. BORDAS (Dr L.), chef des travaux pratiques de Zoologie à la Faculté des Sciences de Marseille (Bouches-du-Rhône). *Entomologie générale.*
1892. BOSSION (Jacques), Birtouta (département d'Alger). *Col.*
1897. BOSVIEL (Dr Paul DE), Suberbieville (Madagascar).
1896. BOUCHARD (M.), Paggar Alam, Palembang (Sumatra) ; à Paris, chez M. A. Grouvelle, 63, quai d'Orsay (7^e). *Col. des Indes orientales.*
1893. * BOUCOMONT (Antoine), avocat, 30, rue Steffen, Asnières (Seine). *Col.*
1857. BOUDIER (Émile),  I. P., anc. pharmacien, Montmorency (Seine-et-Oise). *Col. eur.*
1878. BOULLET (Eugène), banquier, Corbie (Somme). *Lép.; Chenilles.*
1872. * BOURGEOIS (Jules),  A., St^e-Marie-aux-Mines (Alsace). *Col. eur. et médit., Malacodermes exot.*
1899. BOURGOIN, instituteur, 11, rue d'Ulm, Paris, 5^e. *Coléoptères.*
1891. BOUTAN (Louis),  I. P., maître de conférences à la Faculté des Sciences de Paris, 5^e. *Ent. gén.*
1896. * BOUTAREL (Dr), 47, rue des Tournelles, Paris, 3^e. *Col., pr. ceux du Chili.*



1896. * BOUVIER (E.-L.), ~~et~~ I. P., professeur de Zoologie (Animaux articulés) au Muséum d'Histoire naturelle, 39, rue Claude-Bernard, Paris, 5^e. *Ent. gén.*
1874. BOYENVAL, *, directeur de la Manufacture nationale des Tabacs, 1, place St-Jean, Dijon (Côte-d'Or). *Col. eur.*
1884. BRAPANT (Édouard), au château de Morenchies, par Cambrai (Nord). *Lép., pr. Microlép.*
1883. BRAMSON (K.-L.), conseiller d'État, Elisabethgrad, gouvernement de Kherson (Russie méridionale). *Col. et Lép. rus. et exot.*
1887. BRENSKE (Ernest), président de la Soc. entom. de Potsdam, Cappenberg-Str., 9, Postdam, prov. de Brandebourg (Prusse). *Col. eur., Mélolonthides exot.*
1894. * BRÖLEMANN (Henry-W.), 22, rue de Marignan, Paris, 8^e. *Ent. gén., pr. Myriapodes.*
1887. BROWN (Robert), 99, avenue de la République, Caudéran, près Bordeaux (Gironde), *Ent. gén., pr. Lép., Hémipt., Névr. et Orth.*
1898. * BRUYANT (Dr Charles), professeur suppléant à l'École de Médecine, 26, rue Gaultier-de-Biauzat, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). *Géographie entomologique.*
1900. BUCHET (Gaston), rue de l'Écu, Romorantin (Loir-et-Cher). *Entomologie générale, Arthropodes du plankton.*
1888. BUCKTON (G.-Bowdler), membre de la Société royale de Londres, Weycombe, Haslemere, Surrey (Angleterre). *Aphidiens et Cécidides.*
1898. BUGNION (Dr Édouard), professeur d'Anatomie et d'Embryologie à l'Université, Mont-Olivet, près Lausanne (Suisse). *Anatomie et mœurs des insectes; Coléoptères.*
1900. BUREAU (Dr Louis), professeur à l'École de Médecine, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle, 15, rue Gresset, Nantes (Loire-Inférieure). *Entomologie générale.*
1897. BUSIGNY (Émile), naturaliste, 46, rue du Bac, Paris, 7^e. *Entomologie générale.*
1882. * BUYSSON (Henri du), au chât. du Vernet, par Brout-Vernet (Allier). *Col., pr. Elatérides; Orth., Hém., Hymén. et Dipt. eur.* [Gare : St-Pourcain-s.-Sioule].
1896. BUYSSON (Robert du), 70 boul^d Saint-Marcel, Paris, 5^e. *Hymén.*







1894. CARRERA Y DIAZ (Don Anatael), Ténériffe (îles Canaries). *Ent. gén., Hymén.*
1887. CAILLOL (Henri), notaire, 18, rue Traverse-du-Chapitre, Marseille (Bouches-du-Rhône). *Col. gallo-rhén.; Mylabrides (Bruches) paléarctiques.*
1880. CAMERON (Peters), The Rookery, Bridgemont (Angleterre). *Hymén., pr. ceux d'Écosse.*
1898. CANDÈZE (L.), 64, rue de l'Ouest, Liège (Belgique). *Lépidoptères pr. Sphingides.*
1899. CANU (Eugène), directeur de la Station aquicole de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). *Entomologie générale, Crustacés Copépodes.*
1899. CARIÉ (Paul), comptable de la maison Blyth brothers and Co, Port-Louis (île Maurice). *Coléoptères.*
1893. CARPENTIER (Léon), 172, rue Laurendeau, Amiens (Somme). *Col. et Hymén. du nord de la France.*
1893. * CARRET (l'abbé A.), aumônier aux Chartreux, Lyon (Rhône). *Col.*
1878. CARVALHO MONTEIRO (Antonio Augusto de), 70, rua do Alecrim, Lisbonne (Portugal). *Entomologie générale; pr. Lépidoptères.*
1883. CASEY (Thomas-L.), major, 1419, K. street N. W., Washington, D. C. (É.-U. d'Amérique). *Col. Amér. du Nord.*
1898. * CAUSARD (Marcel), professeur au Lycée, 32, rue du Lieutenant, Laval (Mayenne). *Entomologie générale.*
1879. * CAYOL (Marius), *, † A., † M. A., chef de bureau au ministère de l'Agriculture, 6 bis, rue Lucien-Jeannin, La Garenne-Colombe (Seine). *Col. eur.*
1888. * CEPERO (Adolfo-L.), membre de la Société espagnole d'Histoire naturelle, 20, calle Orilla-del-Rio, Chiclana, prov. de Cadix (Espagne). *Col. et Orth. eur.*
1899. CHABANAUD (Paul), étudiant en droit, 43, rue Monge, Paris, 5^e. *Coléoptères.*
1892. CHAMPENOIS (Amédée), conservateur des Forêts, en retraite, 9 bis, rue Michel-Ange, Paris, 16^e. *Col. paléarctiques.*

1869. CHARDON (Gabriel), commis principal des Postes et Télégraphes, 5, impasse Nicole, Paris, 5^e. *Col. de France*.
1896. CHARPENTIER (Ernest), Amboise (Indre-et-Loire). *Col. et Lép.*
1886. * CHAVIN (Dr Joannès), *, membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne, 174, boul^d St-Germain, Paris, 6^e. *Ent. gén.*; *anat. des Insectes*.
1883. * CHEUX (Albert), naturaliste, 47, rue Delaage, Angers (Maine-et-Loire). *Lép.*
1893. CHEVALIER (L.), 2, rue de La Baume, Paris, 8^e. *Lép.*
1891. CHEVREUX (Ed.), A., route du Cap, Bône (Algérie). *Crust.*
1889. CHOBAUT (Dr Alfred), 4, rue Dorée, Avignon (Vaucluse). *Col. eur. et médit.*; *Hymén. de France*.
1893. CHOLODKOWSKY (Dr Nicolas-Alexandrovitch), prof. à l'Institut forestier de St-Petersbourg (Russie). *Ent. gén.*; *Ins. nuis. à la sylviculture*.
1883. CHRÉTIEN (Pierre), 84 bis, rue des Bois-Colombes, la Garenne-Colombes (Seine). *Lép. eur.*, *pr. étude des chenilles et des œufs*.
1889. CLAYBROOKE (Jean de) *, A., M. A., 5, rue de Sontay, Paris, 16^e. *Ent. gén.*
1872. * CLÉMENT (A.-L.), I. P., O. M. A., dessinateur, 34, rue Lacépède, Paris 5^e. *Ent. gén.*
1900. CLERMONT (Joseph), employé à l'administration des Postes, 10, rue des Fontaines, Paris, 3^e. *Entomologie générale*, *pr. Coléoptères*.
1892. CLOUËT DES PESRUCHES (Louis), poste restante à Barcelone (Espagne). *Coprophages du globe*, *pr. Aphodiides*.
1888. COMSTOCK (J.-Henry), prof. of Entom. and general Invertebrate in Cornell University, Ithaca, New-York (É.-U. d'Amérique). *Ent. gén.*, *pr. Coccides*.
1894. CONCILIUM BIBLIOGRAPHICUM, Zurich-Oberstrass (Suisse). *Bibliogr. ent.*
1854. CONSTANT (A.), naturaliste, villa Niobé, golfe Juan (Alpes-Maritimes). *Lép. eur.*
1899. CORDEMOY (Jacob de), chef des travaux pratiques de Botanique à la Faculté des Sciences de Marseille (Bouches-du-Rhône). *Entomologie appliquée aux cultures coloniales*.






1900. COSMOVICI (Léon C.), professeur de Zoologie et de Physiologie à l'Université, 11, Strada Codrescu, Jassy (Roumanie). *Entomologie générale, Lépidoptères.*
1881. COULON (Dr),  A., O.  St-Ch., C.  d'Isab.-la-Cath., Monaco (Principauté). *Lép. eur.; étude des Chenilles.*
1899. COUTAGNE (Georges), ingénieur des Poudres et Salpêtres, Le Def-fends-Rousset (Bouches du-Rhône). *Entomologie générale et appliquée.*
1898. COUTIÈRE (Dr Henry), prof. agrège à l'École supérieure de Phar-macie, 21 bis, boul. Port-Royal, Paris, 13^e. *Crustacés.*
1888. DAGUIN (Paul), 49, avenue d'Orléans, Paris, 14^e. *Ent. gén., pr. Col.*
1890. DAMES (L.-Félix), libraire, 12, Landgrafen-Strasse, Berlin W. 62 (Prusse). *Bibliographie scientifique.*
1892. DANIEL (Dr Karl), chimiste, 27, Schwind-Strasse, Munich (Ba-vière). *Col.*
1898. * DARBOUX (Gaston),  A., maître de conférences de Zoologie à la Faculté des Sciences, 24, quai Claude-Bernard, Lyon (Rhône). *Ent. gén., ins. gallic.*
1882. * DATTIN (E.), , officier d'ordonnance de M. le général com-mandant le génie de la 2^e région, Nancy (Meurthe-et-Moselle). *Lép. eur., pr. Microlép.*
1897. * DECKERT (Henri), au Val Chézine, rue du Bocage, Nantes (Loire-Inf^{re}). *Lépidoptères du globe.*
1887. DEGORS (Alfred), receveur de l'Enregistrement, Pont-Audemer (Eure). *Col. de France.*
1896. DEJEAN (Raymond), 14, rue de Puteaux Paris, 17^e. *Col. d'Europe.*
1900. DELLA TORRE (Dr Carlo-E.), assistant à la chaire de Matière mé-dicale de l'Université de Florence, Fattoria di S. Donato, S. Gi-mignano, Siena (Italie). *Entomologie appliquée à l'apiculture, Anatomie comparée.*
1895. DELSUC (René), 47, rue Talleyrand, Reims (Marne). *Ent. gén.*
1884. * DÉLUGIN (A.), anc. pharmacien de 1^{re} classe, l'hiver : 26, rue de La Boétie, Périgueux; l'été : au château de Marouatte, par Montagnier (Dordogne). *Col. et Lép. eur.*
1899. DELVAL (Charles), 3, rue Le Goff, Paris, 5^e. *Coléoptères.*
1889. DEMAISON (Charles), anc. élève de l'Éc. polytechnique, 7, rue Ro-gier, Reims (Marne). *Ent. appliquée à l'agriculture, pr. Col.*

1874. DEMAISON (Louis), licencié en droit, 21, rue Nicolas-Perseval, Reims (Marne). *Col. et Lép. eur.*
1888. DENFER (J.), *, ingénieur civil, prof. d'architecture à l'Éc. centrale des Arts et Manufactures, à Champigny (Seine), *Ent. gén., pr. Lép. eur.*
1882. * DESBORDES (Henri), *, ~~et~~ A., chef de bureau au minist. des Travaux publics, 93, rue du Bac, Paris, 7^e. *Col. franç.*
1898. DEVILLE (Jean SAINTE-CLAIRE-), lieutenant d'artillerie (13^e bataillon à pied), 12, rue Penchienatti, Nice (Alpes-Maritimes). *Coléoptères d'Europe.*
1869. DIECK (Dr G.), Zöschen, près Mersebourg (Prusse). *Col. eur.*
1889. DIMMOCK (George), Ph. D., 38, Grant Str., Springfield, Mass. (É.-U. d'Amérique). *Ent. gén., anat. et physiol.*
1868. * DISTANT (W.-L.), Highfield, Upper Warlingham, Surrey (Angleterre). *Hém. et Lép.*
1891. * DODERO (Agostino), 9, via Torre-del-Amore, Sturla-Gênes (Italie). *Col. de Ligurie; Psélaphides.*
1881. * DOGNIN (Paul), négociant, 16, villa de la Réunion, Paris, 16^e. *Lép. eur.*
1873. DOLLFUS (Jean), membre à titre honorifique, fondateur du Prix Dollfus, 33, rue Pierre-Charron, Paris, 16^e.
1894. DONCKIER DE DONCEEL (Henri), naturaliste, 40, avenue d'Orléans, Paris, 14^e. *Ent. gén., Col. et Lép. exotiques.*
1890. DONGÉ (Ernest), employé de la Banque de France, 36, avenue de Châtillon, Paris, 14^e. *Col. gal.-rhén.*
1859. DORIA (marquis Giacomo), Museo civico di Storia naturale, Gênes (Italie). *Col.*
1887. * DORMER (lord), 3, Spring Gardens, Londres (Angleterre), *Col., pr. Cicindélides.*
1889. * DRIANCOURT (V.-Jules), distillateur, 119, rue de Paris, St-Denis (Seine). *Ent. gén., pr. Col.*
1896. DUBOIS (Albert), 63, boul^d de la Reine, Versailles (Seine-et-Oise). *Col. de France.*
1897. DUCHAINE (Jules), 25, rue de la Solidarité, Vincennes (Seine). *Coléoptères.*

1892. DUMANS (Jules), ancien magistrat, 66, rue Saint-Loup, Bayeux (Calvados). *Lép., pr. Microlep.*
1890. DUMONT (Constantin), horloger-bijoutier, 126, boul^d St-Germain, Paris, 6^e. *Lép. et Col. eur.*
1893. * DUPONT (Louis), prof. au Lycée, 3, rue de l'Orangerie, le Havre (Seine-Inférieure). *Lép.; géographie entom.*
1894. DUPUY (Gabriel), négociant, 55, rue St-Martin, Angoulême (Charente). *Lép.*
1888. DURRANT (John Hartley), secrétaire de lord Walsingham, Merton Hall, Thetford, Norfolk (Angleterre). *Microlep.*
1900. ÉCOLE NATIONALE D'AGRICULTURE DE MONTPELLIER (Hérault).
1894. ÉCOLE ROYALE SUPÉRIEURE D'AGRICULTURE DE MILAN (Italie), Direzione, 47.
1894. * EMERY (Charles), professeur de Zoologie à l'Université de Bologne (Italie). *Anat. et biol.; Formicides du globe.*
1897. EMMEREZ DE CHARMOY (Donald d'), assistant-naturaliste au Muséum Desjardins, Port-Louis (Ile Maurice). *Coléoptères.*
1892. ESCHERICH (Charles), Regensburg (Bavière). *Anat. entom.; Col., pr. Méloïdes et Clérides.*
1897. ESTIOT (Paul), 17, rue d'Oncy, Vitry (Seine). *Col. gallo-rhén., Ins. nuisibles.*
1899. EUSEBIO, professeur au lycée de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). *Coléoptères.*
1879. FAUCONNET (M.-Louis), membre du Conseil d'hygiène, rue Carion, Autun (Saône-et-Loire). *Col. eur.*
1899. * FAURE-BIGUET (Paul-Vincent), C. *, général commandant le 46^e Corps d'armée, Montpellier (Hérault). *Col.*
1861. * FAUVEL (Albert),  A., , avocat, 3, rue Choron, Caen (Calvados). *Ent. gén. de la Basse-Normandie; Col., Lép. gallo-rhén.; Staphylinides exotiques.*
1886. FELSCHÉ (Carl), 27, Dresdener Strasse, Leipzig (Saxe). *Col., pr. Pectinicornes et Lamellicornes.*
1899. FELT (Ephraim Porter), State entomologist, Room 27, Capitol, Albany, N. Y. (États-Unis d'Amérique). *Entomologie appliquée.*
1882. * FERDINAND I^{er}, DUC DE SAXE-COBOURG ET GOTHA (Son Altesse

- Royale), Prince régnant de Bulgarie, Sofia (Bulgarie). *Lép. européens.*
1890. * FERTON (Charles), capitaine d'artillerie, commandant l'artillerie de la place de Bonifacio (Corse). *Hymén.*
1876. * FINOT (P.-A.-Prosper), *, capitaine d'état-major, en retraite, 27, rue St-Honoré, Fontainebleau (Seine-et-Marne). *Orth.*
1880. FITCH (E.-A.), Brick house, Maldon, Essex (Angleterre). *Ent. gén.*
1882. * FLEUTIAUX (Edmond),  A., 6, avenue Suzanne, Nogent-sur-Marne (Seine). *Col. eur., de la Guadeloupe et de l'Indo-Chine, Cicindélides et Elatérides du globe.*
1900. FORBES (Stephen-A.), State Entomologist, Urbana, Illinois (États-Unis d'Amérique). *Entomologie générale et appliquée.*
1898. FOULQUIER (Gédéon), , 5, rue Canebière, Marseille (Bouches-du-Rhône). *Lépidoptères.*
1891. FRANÇOIS (Ph.), Dr ès sc. naturelles, chef des travaux pratiques à la Sorbonne, 20, rue Monsieur-le-Prince, Paris, 6^e. *Ent. gén.; Anat.; Coléoptères paléarctiques et mélanésiens.*
1898. * FRÉMINVILLE (Paul DE), 7, Champ-de-Mars, Bourg (Ain). *Coléoptères.*
1888. FRENCH (G.-H.), assistant State Entom. of Illinois, S. Illinois Normal University, Carbondale, Illinois (E.-U. d'Amérique). *Ent. gén., pr. Lép.*
1898. FROBERVILLE (Pierre DE), château des Brosses, Chailles (Loir-et-Cher). *Coléoptères.*
1900. FROGGATT (Walter-Wilson), government Entomologist, Department of Agriculture, Sydney (N. S. W.). *Entomologie appliquée, Hémiptères.*
1867. * FUMOZE (Dr Armand), O. *,  A., Trésorier honoraire de la Société entomologique de France, 78, rue du Faub.-St-Denis, Paris, 10^e. *Entomologie appliquée à la médecine et à la pharmacie.*
1896. FUENTE (D. José-Maria DE LA), Pozuelo de Calatrava, provincia de Ciudad Real (Espagne). *Coléoptères.*
1880. * GADEAU DE KERVILLE (Henri),  I. P.,  M. A., 7, rue Dupont, Rouen (Seine-Inf^{re}). *Ent. de la Normandie.*
1867. * GAGE (Dr Léon),  A., 9, rue de Grenelle, Paris. *Ent. appliquée à la médecine et à la pharmacie.*

1870. * GAULLE (Jules DE), 41, rue de Vaugirard, Paris, 6°. *Hyménoptères*.
1898. GAUTIER (Maurice), 16, rue de l'Odéon, Paris, 6°. *Coléoptères gallo-rhén.*
1886. GAZAGNAIRE (Joseph), 29, rue Félix Faure, Cannes (Alpes-Maritimes). *Ent. gén.; Anat.; Dipt.; Hymén.*
1896. GÉLIN (H.), conservateur du Musée d'Histoire naturelle, Niort (Deux-Sèvres).
1880. GENNADIUS (P.), inspecteur de l'agriculture, Nicosie (Chypre). *Ent. gén., pr. Cochenilles.*
1885. GIANELLI (Giacinto), 52, via Nizza, Torino (Italie). *Lép.*
1891. * GIARD (Alfred), *, ~~§~~ I. P., membre de l'Institut, professeur à la Sorbonne, 14, rue Stanislas, Paris, 6°. *Ent. gén.*
1894. GIGLIO-TOS (Dr Ermanno), assistant au Musée royal d'Anatomie comparée, Turin (Italie). *Dipt.*
1868. GOBERT (Dr Émile), *, ~~§~~ I. P., C. ✕, 51, rue Victor-Hugo, Mont-de-Marsan (Landes). *Ent. gén.*
1880. GODMAN (Dr F. DU CANE), 10, Chandos street, Cavendish square, London W. (Angleterre). *Ent. gén., pr. Lép. amér.*
1887. GORHAM (révèrend H.-S.), The Chestnuts, Shirley Warren, Southampton (Angleterre). *Ent. gén., pr. Col.*
1879. GOSS (Herbert), F. G. S., 39, the Avenue, Surbiton hill, Surrey (Angleterre). *Ins. foss.*
1878. * GOUNELLE (Émile), ~~§~~ A., 30, rue du Cherche-Midi, Paris, 6°. *Col. de l'Amérique du Sud, pr. du Brésil.*
1899. GOURRET (Paul), professeur de Zoologie à l'École de Médecine et sous-directeur du Laboratoire d'Endoume, 24, rue de Lodi, Marseille (Bouches-du-Rhône). *Entomologie générale, Crustacés.*
1873. GOZIS (Maurice DES), ✕, avocat, place de l'Hôtel-de-Ville, Montluçon (Allier). *Col. et Orth. de France.*
1899. GRATIOLET (Ludovic), attaché au Secrétariat du Muséum d'Histoire naturelle, 8, rue Guy-de-La-Brosse, Paris, 5°. *Entomologie générale.*
1889. GRISON (V.-E.-Hyacinthe), sous-inspecteur de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre, Saïgon (Cochinchine). *Col.*
1866. GRONIER, 19, rue S^{te}-Catherine, S^t-Quentin (Aisne). *Lép. eur.; Chenilles.*




1897. GROULT (Paul), naturaliste, maison E. Deyrolle, 46, rue du Bac, Paris, 7^e. *Entomologie générale*.
1870. * GROUVELLE (Antoine), *,  directeur de la manufacture nationale des Tabacs du Gros-Caillou, 63, quai d'Orsay, Paris, 7^e. *Col. eur.*; *Clavicornes exotiques*.
1869. * GROUVELLE (Jules), *,  A., ingénieur civil, prof. à l'Éc. centrale des Arts et Manuf., 18, avenue de l'Observatoire, Paris, 6^e. *Col. eur.*
1873. GROUVELLE (Philippe), 69, rue de Gergovie, Paris, 14^e. *Col. gallo-rhén.*
1891. GROUZELLE (C.-Alexandre), ingénieur des manufactures de l'État, 1, rue Jean-Nicot, Paris, 7^e. *Ent. gén.*
1899. GRUARDET (F.), capitaine d'artillerie, 29, rue Guérin, Fontainebleau (Seine-et-Marne). *Coléoptères*.
1899. GRUVEL (A.), maître conférences à la Faculté des Sciences de Bordeaux (Gironde). *Cirrhépèdes*.
1889. * GUERNE (baron Jules DE), *,  I. P., 6, rue de Tournon, Paris, 6^e. *Ent. gén.*; *Crust. Copepodes*.
1894. GUERRY (Paul), Roanne (Loire). *Col.*, pr. *Cétonides*, *Buprestides* et *Longicornes*.
1898. GUIART (Dr Jules), chef des travaux pratiques de Parasitologie à la Faculté de Médecine, 19, rue Gay-Lussac, Paris, 5^e. *Entomologie générale*.
1886. GUILLIOU (Paul), 50, rue de Vanves, Paris, 14^e. *Col. eur.*
1895. GUIMOND,  A., pharmacien de 1^{re} classe, place de la Mairie, au Parc St-Maur (Seine). *Col.*
1891. GUYON (Henri), naturaliste, 13, rue Bertin-Poirée, Paris, 1^{er}. *Ent. gén.*
1897. HAMAL (Joseph), 1, rue Méan, Liège (Belgique). *Cerambycides*.
1899. HANSEN (H.-J.), professeur à l'Université, assistant au Muséum de Copenhague, Jakob Dannelsørd's Vei, 1. V. *Entomologie générale*, *Diptères*, *Crustacés*.
1894. HARDY (Gabriel), 156, rue de Courcelles, Paris, 17^e. *Col. de France*.
1891. HEIM (Dr Frédéric), 34, rue Hamelin, Paris, 16^e. *Ent. gén.*
1893. HEIMBURGER (Ph.-A.), O. *,  I. P., général de brigade, 23, rue des Rouillies, Blois (Loir-et-Cher). *Lépidoptères*.



1891. HENNEGUY (Dr Louis-F.), *, C. 卐 M. A., professeur au Collège de France et à l'École nat. d'Horticult. de Versailles, 9, rue Thénard, Paris, 5^e. *Anat. et embryol.; Ent. appliquée.*
1899. HENNETON (Dr), Mortagne-du-Nord (Nord). *Coléoptères.*
1878. HERVÉ (Ernest), notaire, rampe St-Melaine, Morlaix (Finistère). *Col. et Hém. eur.*
1888. HESS (Dr Wilhelm), professeur de Zoologie à l'Université technique, Hanovre (Allemagne). *Ent. gén., pr. Col.*
1866. HEYDEN (Lucas von), 卐, Dr en philosophie, major en retraite, 54, Schlossstrasse, Bockenheim (Francfort-s.-le-Mein) (Allemagne). *Ent. gén., pr. Col.*
1885. * HOLLAND (W.-J.), LL. D., Director of the Carnegie Museum, 3th and Bellefield avenues, Pittsburgh, Pensylvanie (Ét.-Un. Am.). *Lépidoptères.*
1900. * HOMBERG (Rodolphe), 36, rue Blanche, Paris, 9^e. *Lépidoptères d'Europe.*
1874. HOPFFGARTEN (baron Max von), Mülverstedt, près Langensalza, Thuringe (Prusse). *Col. eur.*
1900. HOUARD (Cl.), préparateur à la Faculté des Sciences, 40, rue Balagny, Paris, 17^e. *Ent. gén., pr. Cécidies.*
1898. HOULBERT (Constant), professeur au Lycée, 50, rue Carnot, Sens (Yonne). *Coléoptères.*
1892. * HUBBARD (Henri-G.), New Jersey Ave, 230, Washington, D. C.; l'hiver : Crescent City, Floride (États-Unis d'Amérique). *Col.*
1899. HUCHERARD (Jules), 10, rue de Crussol, Paris, 11^e. *Lépidoptères.*
1894. INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE, 16, rue Claude-Bernard, Paris, 5^e.
1889. JAKOWLEFF (W.-E.), reviseur en chef du contrôle de l'État, Eupatoria (Crimée). *Ent. gén., pr. Hém. et Col.*
1890. * JANET (Armand), *, ancien ingénieur des Constructions navales, 29, rue des Volontaires, Paris, 15^e. *Lép.*
1891. JANET (Charles), *, 卐 A., ingénieur des Arts et Manuf., Dr ès sciences, anc. Prés. de la Soc. Zool. de Fr., manufacturier, Beauvais (Oise). *Anatomie.*
1899. JANINI (Raphaël), ingénieur, calle de Colon, 25, 1, Valencia (Espagne). *Entomologie appliquée.*









1892. JANSON (O.-E.), 44, Great-Russell street, Londres, W. C. (Angleterre). *Col.*, *pr. Cétonides*.
1900. JAQUET (D^r Marie), conservateur au Musée national, 71, Strada Coltei, Bucarest (Roumanie). *Entomologie générale, Tératologie*.
1899. JEANSON (M.-A.), 74, avenue Victor-Hugo, Rueil (Seine-et-Oise). *Coléoptères de France*.
1889. JOANIN (D^r Albert), 272, boulevard Raspail, Paris, 14^e. *Ent. gén. ; mœurs et anat.*
1892. JOANNIS (l'abbé J. DE), 15, rue Monsieur, Paris, 7^e. *Lép.*
1886. JOANNIS (Léon DE), prof. de mathématiques à l'Éc. libre de St-François, Vannes (Morbihan). *Lép. eur.*, *pr. Chenilles*.
1899. JOURDAIN (D^r S.), ancien professeur de Faculté, villa Bellevue, Portbail (Manche). *Entomologie générale, Acariens*.
1858. JOURDHEUILLE (Camille), juge honoraire, l'hiver : 101, rue de Rennes, Paris, 6^e ; l'été : Lusigny (Aube). *Lép. eur.*
1891. KERREMANS (Ch.), capitaine pensionné, 404, rue du Magistrat, Bruxelles (Belgique). *Col.*, *pr. Buprestides*.
1893. * KIEFFER (l'abbé J.-Jacques), prof. au collège Saint-Augustin, Bitche (Lorraine). *Cécidies ; Cynipides, Cécidomyides*.
1869. KIRBY (W.-F.), Hilden, Sutton court road, Chiswick, London W. (Angleterre). *Lép.*
1888. KLINCKSIECK (Paul), libraire, membre de plusieurs Sociétés savantes, 3, rue Corneille, Paris, 6^e. *Bibliographie scientifique*.
1875. KOCH senior (D^r Ludwig), Auessere Cramer Klettstrasse, 3, Nuremberg (Bavière). *Arachn.*
1894. KÖNIGL. NATURALIEN-KABINET, Stuttgart, Württemberg (Prof. D^r Lampert, directeur).
1855. KRAATZ (Gustave), D^r en philosophie, président de la Soc. entom. allemande, 28, Linkstrasse, Berlin (Prusse). *Col.*
1885. KRAUSS (D^r Hermann), 3, Hafengasse, Tübingen (Wurtemberg). *Ent. gén.*, *pr. Orth.*
1863. * KÜNKEL D'HERCULAI (Jules), I. P., assistant d'Entomologie au Muséum, 1, rue d'Obligado, Paris, 16^e. *Ent. gén. ; Anat.*

- 1892. LABORATOIRE DE LUC-SUR-MER (Prof. Jean Joyeux-Laffue, directeur, Luc-sur-Mer, Calvados).
- 1899. LABORATOIRE D'ÉTUDES DE LA SOIE (directeur M. Levrat), 7, rue Saint-Polycarpe, Lyon (Rhône).
- 1900. LABORATOIRE DE ZOOLOGIE de la Faculté des Sciences de Rennes (Ille-et-Vilaine), (Professeur L. Joubin, directeur).
- 1858. LAFAURY (Clément), Saignac-et-Cambran, près Dax (Landes). *Lép. eur.*
- 1887. * LAGLAIZE (Léon), ~~§~~ A., natur.-voyageur, 52, rue de Paradis, Paris, 10^e. *Ent. gén.*
- 1893. LAHAUSOIS (Ch.), avocat, 2, rue de La Planche, Paris, 7^e. *Col.*
- 1873. LAJOYE (L.-Abel), 9, rue Ruinart-de-Brimont, Reims (Marne). *Col. eur.*
- 1864. LALLEMANT (Charles), pharmacien, L'Arba, près Alger (Algérie). *Col. eur. et du nord de l'Afr.*
- 1898. * LAMBERTIE (Maurice), 42 bis, cours du Chapeau-Rouge, Bordeaux (Gironde). *Hémiptères.*
- 1885. LAMEERE (Auguste), prof. à l'Univ. de Bruxelles, 119, chaussée de Charleroi, St-Gilles-les-Bruxelles (Belgique). *Ent. gén.*
- 1876. LAMEY (Adolphe), *, O. ~~§~~ M. A., conservateur des Forêts, en retraite, 22, cité des Fleurs, Paris, 17^e. *Col. médit.*
- 1900. LAMOUREUX (Edmond), architecte, 44, villa Chaptal, Levallois-Perret (Seine). *Lépidoptères.*
- 1900. LAMY (Ed.), préparateur de Zoologie à la Faculté des Sciences, 16, avenue de Montsouris, Paris, 14^e. *Arachnides.*
- 1861. * LANSBERGE (J.-G. VAN), anc. gouverneur général des Indes néerlandaises, Brummen, province de Gueldre (Pays-Bas). *Col.*
- 1874. * LAPLANCHE (Maurice DE), au château de Laplanche, par Luzy (Nièvre). *Col. eur.; anat.*
- 1899. LARMINAT (L. DE), ingénieur des Ponts et Chaussées, Granville (Manche). *Coléoptères, Insectes marins.*
- 1855. LARRALDE D'ARENCETTE (Martin), anc. percepteur des Contributions directes, quartier St-Léon, Bayonne (Basses-Pyrénées). *Lép.*
- 1899. * LAURENT, professeur d'Histoire naturelle à l'École de Méde-

cine, 87, rue Libergier, Reims (Marne). *Entomologie générale et appliquée*.

1900. LAVALLÉE (Alphonse), licencié ès Sciences naturelles, 47, rue de Naples, Paris, 8^e; l'été, château de Segrez, par Boissy-sous-S'-Yon (Seine-et-Oise). *Entomologie générale, Lépidoptères*.
1895. LAVERGNE DE LABARRIÈRE, villa S'-Louis, à La Crau d'Hyères (Alpes-Mar.). *Col., Lép.*
1899. LÉCAILLON (A.), Dr ès sciences, préparateur de la chaire d'Embryologie comparée, au Collège de France, Paris, 5^e. *Embryologie des insectes*.
1899. LE DANTEC (Félix),  I. P., chargé d'un cours d'Embryologie générale à la Sorbonne, 3, rue d'Ulm, Paris, 5^e. *Entomologie générale*.
1899. LÉGER (Louis), chargé du cours de Zoologie à la Faculté des Sciences de Grenoble (Isère). *Ent. gén., Sporozoaires parasites des Arthropodes*.
1877. LELONG (l'abbé Arthur), ancien aumônier militaire, Rethel (Ardennes). *Col. eur.*
1874. LELOUP (Dr Charles), Mennetou-sur-Cher (Loir-et-Cher). *Ent. gén., pr. Lép. eur.*
1889. LENAIN (René), La Capelle-en-Thiérache (Aisne). *Lép. et Col. eur.*
1884. LEPRÉVOST (Charles), peintre-verrier, 80, rue S'-Louis-en-l'Île, Paris, 4^e. *Col. et Lép. eur.*
1887. * LESNE (Pierre),  A., assistant d'Entomologie au Muséum d'Histoire naturelle, 10, avenue Jeanne, Asnières (Seine). *Ent. gén.*
1894. LÉTIENNE (Dr A.), 2, rue de Penthièvre, Paris, 8^e. *Ent. gén.*
1861. * LÉVEILLÉ (Albert),  A., 19, avenue d'Orléans, Paris, 14^e. *Col. paléarctiques; Temnochilides exot.; Hémipt.*
1895. * LOMBARD (Félicien), rue Roquebrune, 6 sud, Marseille (Bouches-du-Rhône). *Ent. gén., pr. Col. de France*.
1898. LUMEAU (DE), chef de bataillon au 78^e régiment d'infanterie, Limoges (Haute-Vienne). *Hémiptères, Coléoptères*.
1887. LYNCH ARRIBALZAGA (Félix), membre de l'Académie nationale de la République argentine, Chacabuco (prov. de Buenos-Ayres). *Diptères*.

1899. LYSHOLM (Dr), Trondhjem (Norvège). *Coléoptères, pr. Stahylinides.*
1884. * MACÉ (Émile), 81, rue du Champ-de-Foire, Le Havre (Seine-Inférieure). *Col. et Orth.*
1896. MACHIAVELLO (Joseph), École d'Agriculture de Montpellier (Hérault). *Ent. gén.*
1864. MAC LACHLAN (Robert), Westview, 23, Clarendon road, Lewisham, London S. E. (Angleterre). *Névr.*
1893. MAGNIN (Jules-A.-M.), libraire-éditeur, 7, rue Honoré-Chevalier, Paris, 6^e. *Col.*
1881. MAGRETTI (Dr Paul), 7, via Dante, Milan (Italie). *Hymén.*
1878. MAINDRON (Maurice), *,  A,  31, quai de Bourbon, Paris, 4^e. *Cincidélides et Carabiques.*
1892. MARCHAL (Dr Paul), professeur de Zoologie à l'Institut agronomique, 126, rue Boucicaut, Fontenay-aux-Roses (Seine). *Ent. gén., biol.; Ent. appliquée; Hymén.*
1858. MARMOTTAN (Dr Henri), *, ancien député, maire du 16^e arrond., 31, rue Desbordes-Valmore, Paris, 16^e. *Col. et Hém. paléarct.*
1899. MARQUINEZ (Louis), Blidah (Algérie). *Lépidoptères, pr. Sériciculture.*
1891. MARSHALL (Thomas Ansell), Tavera, canton de Bocognano (Corse), *Ent. gén., pr. Hymén.*
1861. MARTIN (Dr Charles HENRI-), *, 4, rue Faustin-Hélie, Paris, 16^e. *Col.*
1897. MARTIN (Joanny), préparateur-adjoint au laboratoire d'Entomologie du Muséum d'Histoire naturelle, 6, rue de la Folie, Montgeron (Seine-et-Oise). *Hémiptères.*
1891. MARTIN (René), avoué, au Blanc (Indre). *Névr.*
1898. MARTINEZ (Padre Vicente), colegio de PP. Escolapios, Sevilla (Espagne).
1892. MARTINEZ DE LA ESCALERA (Manuel), Goya, 33, 2^o, Madrid, et au Musée d'Histoire naturelle de Madrid (Espagne). *Col.*
1860. MARTINEZ Y SAEZ (Francisco), prof. au Musée d'Hist. natur., 6, calle de San Quintin, principal izquierda, Madrid (Espagne). *Col.*
1884. * MASON (Philip Brookes), membre de la Soc. linnéenne de Lon-

- dres, etc., Horninglow street, Burton-upon-Trent (Angleterre). *Ent. gén., pr. Col.*
1870. MASSON (Edmond), percepteur en retraite, 5, rue Denis-Simon, Beauvais (Oise). *Col. de France.*
1900. MATHIEU (L.), directeur de la Station œnologique de Bourgogne, Beaune (Côte-d'Or). *Entomologie appliquée, Coléoptères.*
1888. MATTHEWS (Coryndon), Stentaway, Plymstock, South Devon (Angleterre). *Dipt.*
1861. * MAYET (Valéry),  A.,  M. A., prof. de Zoologie à l'Éc. d'Agriculture, 35, rue de l'Université, Montpellier (Hérault). *Ent. gén.; mœurs; Col. eur.*
1899. MAYEUL GRISOL, naturaliste, San Fernando de Apure (Venezuela). *Entomologie générale.*
1881. * MAZARREDO (Carlos de), ingénieur forestier, 22, calle de Claudio-Coello, Madrid (Espagne). *Ent. gén., pr. Arach. et Myr.*
1873. MÉGNIN (Pierre), ,  I. P., rédacteur en chef du journal *L'Éleveur*, 6, avenue Aubert, Vincennes (Seine). *Parasites épi-zoïques, pr. Acariens; Helminthes.*
1893. MERCADO Y GONZALEZ (Dr Matias), Nava del Rey, Valladolid (Espagne). *Ent. gén.*
1894. MESMIN (Louis), propriétaire, à Gabillaud, par Bussière-Poitevine (Haute-Vienne). *Col. d'Europe et de la Guadeloupe, Cyrinides du globe.*
1890. MEUNIER (Fernand), assistant au Service géologique de Belgique, 92, avenue de la Couronne, Bruxelles. *Hymén. (Aculeata); Dipt.*
1882. MEYER-DARCIS (Georges), Wohlen (Suisse). *Col., pr. genres Carabus et Julodis.*
1888. MILLETES (M^{me} veuve), née BELLIER DE LA CHAVIGNERIE, membre à titre honorifique, 35, rue St-Louis, Évreux (Eure).
1883. * MILLOT (Charles),  I. P., anc. officier de marine, 7, place St-Jean, Nancy (Meurthe-et-Moselle). *Ent. gén., pr. Col. et Lep.*
1892. MINSMER (Jean-Joseph), , capitaine en retraite, 3, avenue Denfort-Rochercau, Saint-Étienne (Loire). *Col. de France.*
1873. * MIOT (Henri),  I. P., O.  M. A., juge d'instruction, Beaune (Côte-d'Or). *Ent. appliquée; Ins. utiles et nuisibles du globe.*



1844. MOCQUERYS (Émile), 24, rue Chartraine, Évreux (Eure). *Col. eur.; Hymén. de France.*
1898. MOLLANDIN DE BOISSY (Robert), au Bausset (Var). *Coléoptères paléarctiques.*
1880. MONNOT (Eugène), économe du Lycée de Coutances (Manche). *Col. eur.*
1893. MONTANDON (A.-L.), Filarète, Bucarest (Roumanie). *Hém., pr. Hétéroptères.*
1870. MONTILLOT (Louis), *, ~~§~~ A., inspecteur des Postes et Télégraphes, 75, avenue de la République, Montrouge (Seine). *Col. eur.*
1894. MONTLEZUN (comte Armand de), 106, quai de Tounis, Toulouse (Haute-Garonne). *Col.*
1889. MORAGUES É IBARRA (Ignacio), 18, calle de San-Francisco, Palma de Mallorca (Baléares). *Col.; Malacologie.*
1900. MOREL (Camille), 1, rue Bosio, Paris, 16^e. *Coléoptères d'Europe et circa.*
1888. * MORGAN (A.-C.-Frédéric), membre des Soc. linnéenne et entomologique de Londres, Villa-Nova de Gaya, Oporto (Portugal). *Homoptères, pr. Coccides.*
1900. * MOSER, capitaine, 60, Bülow-Str., Berlin W. (Allemagne). *Coléoptères, pr. Cétonides.*
1900. MOTTAZ (Charles), conservateur à la collection locale du Palais Eynard, Genève (Suisse). *Entomologie générale, Coléoptères.*
1899. MOUCHOTTE (J.), interne à l'hôpital de la Pitié, Paris, 5^e. *Entomologie générale.*
1896. * MÜLLER (J.-W.), prof. à l'Université, 25, Fischstrasse, Greifswald (Allemagne). *Ent. gén.*
1859. MULLER (T.-A.-Clemens), königlicher Commerzienrath, 12, Holtz-hofgasse, Dresde Neustadt (Saxe). *Col.*
1900. MUSÉE ZOOLOGIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE NAPLES (Italie), (Prof. Monticelli, directeur).
1900. NAÇONOW (Nicolas-Victor), professeur et directeur du Musée de Zoologie à l'Université impériale de Varsovie (Russie). *Entomologie générale, anatomie des Articulés.*
1891. * NADAR (Paul), *, ~~✱~~, 51, rue d'Anjou, Paris, 8^e. *Col.*


1886. * NEERVORT VAN DE POLL (J.-R.-H.), Benkeinstein Museum, Rijnsenburg, province d'Utrecht (Hollande). *Ent. gén., pr. Col.*
1886. NEREN (D^r C.-Harold), chevalier de l'ordre roy. de Wasa, méd.-major dans la réserve du corps des méd. milit. suédois, Skeninge (Suède). *Hymén.*
1871. NEVINSON (George-Basil), 3, Tetworth square, Chelsea, London, S. W. (Angleterre). *Col.*
1897. * NIBELLE (Maurice), 9, rue des Arsins, Rouen (Seine-Inf^{re}). *Hémipt., Hymén.*
1873. NICKERL (D^r Ottokar), 16, Wenzelsplatz, Prague (Bohême). *Ent. gén., pr. Col. et Lép.*
1876. NICOLAS (André), ancien magistrat, 23, rue S^t-Malo, Valognes (Manche). *Carabiques, Cérambycides eur., pr. Carabus et Dacnion.*
1881. * NODIER (Charles), *, médecin de la marine, rue Saint-Huel Kerentrech, Lorient (Morbihan). *Col.*
1889. NONFRIED (A.-P.), membre de plusieurs Soc. entom., Rakonitz (Bohême). *Col., pr. Lamellicornes, Buprestides et Cérambycides.*
1895. NORMAND (Henry), médecin-major au 4^e tirailleurs, Fondouk-Djedid (Tunisie). *Col.*
1887. * NUGUE (l'abbé A.-Augustin), Couptrain (Mayenne). *Col. de France.*
1885. OBERRIETH (Maurice), négociant, 1, rue Laffitte, Paris. *Col. eur.*
1861. * OBERTHÜR (Charles), 36, faubourg de Paris, Rennes (Ille-et-Vilaine). *Lépidoptères.*
1871. * OBERTHÜR (René), Rennes (Ille-et-Vilaine). *Coléoptères.*
1880. ODIER (Georges), 39, rue de l'Université, Paris, 7^e. *Col. eur.*
1891. ODIER (James), banquier, 23, rue Corratierie, Genève (Suisse). *Col.*
1892. OLIVIER (Al.), à Saint-Vallier, par Grasse (Alpes-Maritimes). *Lépidoptères et Microlépidoptères.*
1873. * OLIVIER (Ernest), Les Ramillons, près Moulins (Allier). *Col. eur.; Hém. et Hymén. eur.*
1873. ORBIGNY (Henri D'), architecte, 21, rue S^t-Guillaume, Paris, 7^e. *Col. eur. et méditerr., Onthophagides d'Afrique.*
1871. OUSTALET (Émile), *, I. P., professeur au Muséum d'Histoire

naturelle, 121, rue Notre-Dame-des-Champs, Paris, 6^e.
Ent. gén.

1896. PANTEL (le P. J.), Vals, près Le Puy (H^{te}-Loire).

1899. PÉREZ (Charles), agrégé préparateur à l'École normale supérieure, rue d'Ulm, Paris, 5^e. *Entomologie générale.*

1883. * PÉRINGUY (Louis),  I. P.,  M. A., sous-directeur du Musée d'Hist. natur. de Cape-Town (Cap de Bonne-Espérance). *Ent. gén., pr. Col.*


1875. * PERRAUDIÈRE (René DE LA), , au château de la Perraudière, par Jarzé (Maine-et-Loire). *Col. de l'Ancien Monde.*

1900. PESCHET (Raymond), commis-stagiaire à la Préfecture de la Seine, 11, rue Delouvain, Paris, 19^e. *Coléoptères.*

1896. PETIT (A.), instituteur à La Ferme, par Orléansville (Algérie).
Ent. gén.

1893. PEYERIMHOFF DE FONTENELLE (Paul DE), garde général des Forêts, à Digne (Basses-Alpes). *Col.*

1890. * PHILIPPI (Federico), prof. à l'Université de Santiago (Chili). *Col.*

1900. * PHISALIX (Dr C.), , assistant au Muséum d'Histoire naturelle, 26, boul^d St-Germain, Paris, 5^e. *Entomologie générale, Arthropodes venimeux.*


1889. * PIC (Maurice), Digoin (Saône-et-Loire). *Ent. gén. d'Algérie; Col. et Hymén. paléarct.; Mélyrides, Ptinides, Anthicides, Pédilides, Bruchides et Nanophyes du globe.*

1899. PICARD (François), élève à l'Institut agronomique, 29, faubourg St-Jacques, Paris, 14^e. *Coléoptères, Hyménoptères.*

1883. PIERSON (Henri), à Brunoy (Seine-et-Oise). *Orth. et Név.*






1893. PIGEOT (Nicolas-P.), prof. à l'école d'Agriculture de Rethel (Ardennes). *Ent. gén., pr. Hymén.*




1899. PIGNOL (Dr Jules), 34, rue Pigalle, Paris, 9^e. *Coléoptères.*

1890. PLANET (Louis),  A., avenue des Lilas, Croissy (Seine-et-Oise).
Col.

1892. PLANET (Victor), notaire, Entre-Deux-Guiers (Isère). *Col.*






1873. POLLE DE VIERMES, 53 bis, rue St-Jean, Pontoise (Seine-et-Oise).
Col. eur.

1900. POMMEROL (Dr François), conseiller général, Gerzat (Puy-de-Dôme). *Entomologie appliquée.*
1899. PORTE (L. DE LA), 11, rue Casimir-Périer, Paris, 7^e. *Coléoptères, Lépidoptères.*
1896. PORTER (Ch.-E.), directeur du Musée d'Histoire naturelle, Casilla, 1108, Valparaiso (Chili). *Col. et Hém., pr. Pentatomides.*
1890. PORTEVIN (F.-A.-Gaston), 12, rue Dubais, Évreux (Eure). *Ent. gén., Col.*
1899. PORTEVIN (Henri), 12, rue de l'Horloge, Évreux (Eure).
1888. * PORTIER (Paul), 24, rue Nicole, Paris, 5^e. *Lép. eur., pr. Microlep.*
1896. POTTIER (Lucien), calculateur au Bureau des longitudes, 3, rue Lecuirot, Paris, 14^e. *Coléoptères.*
1900. POTTIER DE LA VARDE, Lèz-Eaux, par Saint-Pair (Manche). *Coléoptères.*
1869. * POUJADE (G.-Arthur),  I.P., préparateur d'Entom. au Muséum, 103, rue Monge, Paris, 5^e. *Col. et Lép.; Iconographie entom.*
1894. * POULOT (Émile), 50, avenue Philippe-Auguste, Paris, 11^e. *Lép.*
1867. PREUDHOMME DE BORRE (Alfred), , anc. conservateur-secrétaire du Musée royal d'Hist. natur. de Bruxelles, villa la Fauvette, Petit-Saconnex, Genève (Suisse). *Ent. gén., pr. Hétiromères.*
1888. RADOT (Émile), , industriel, Essonnes (Seine-et-Oise). *Lép. eur.; étude des Chenilles.*
1867. RAFFRAY (Achille), ,  I. P., consul général de France à Cape-Town (Cap de Bonne-Espérance). *Col. afr.; Psélaphiens et Scydmaniens du globe.*
1872. * RAGUSA (Enrico), hôtel des Palmes, Palerme (Sicile). *Col. eur.*
1895. RAILLIET, professeur d'Histoire naturelle à l'Ecole d'Alfort (Seine). *Ent. gén.*
1900. RAINBOW (W.-J.), F. L. S., entomologist, Australian Museum, Sydney (N. S. W.). *Entomologie générale.*
1895. * RAOULT (Charles), Raon-l'Étape (Vosges). *Ent. gén., pr. Col. de France.*
1890. * REED (C.-Edwin), Baños de Cauquenes, Santiago (Chili). *Ent. gén.*
1875. RÉGIMBART (Dr Maurice), 11, rue du Meilet, Évreux (Eure). *Col. eur., Dytiscides, Gyrinides et Hydrophilides du globe.*

1895. RÉGNIER (Raymond),  A.,  M. A., O.  N., ancien greffier en chef, juge de paix suppléant, Fréjus (Var). *Ent. gén., pr. Col. Lépidoptères du globe.*
1876. REITTER (Edmund), entomologiste, Paskau (Moravie). *Ent. gén., pr. Col.*
1896. REUTER (Enzio), Privat-Docent à l'Université d'Helsingfors (Finlande). *Entom. gén., Lépidoptères, Entom. économique.*
1874. REUTER (O.-M.), prof. à l'Université, 9, Mariegatan, Helsingfors, pendant les vacances, Abo (Finlande). *Ent. gén., pr. Hém.*
1899. RITSEMA Bos (J.), professeur, directeur du Phytopathologisch Laboratorium, Roemer Visscherstraat, 3, Amsterdam (Hollande). *Entomologie appliquée.*
1900. * RIVERA (Manuel-J.), professeur de Sciences naturelles à l'École normale de Chillan (Chili). *Entomologie du Chili.*
1899. ROCQUIGNY-ADANSON (G. DE), rue Voltaire, Moulins (Allier). *Lépidoptères, géonémie et phœnogénie entomologiques.*
1899. ROULE (Louis), professeur de Zoologie à la Faculté des Sciences de Toulouse (H^e-Garonne). *Entomologie générale, Crustacés.*
1894. * ROTHSCHILD (the Hon. Lionel Walter), Zoological Museum (M. E. Hartert), Tring, Herts (Angleterre). *Lép.*
1894. ROSELLE (Dr Fernand DU), 21, rue Lamarck, Amiens (Somme). *Arach. et Dipt.*
1900. ROUZAUD (Henri), receveur des finances, Narbonne (Aude). *Entomologie générale et appliquée.*
1899. ROYER (Maurice), 55 bis, rue de Villiers, Neuilly-sur-Seine (Seine). *Coléoptères.*
1880. * SAHLBERG (Dr John), prof. à l'Université, 18, Brunnsparken, Helsingfors (Finlande). *Col. et Hém.*
1889. SANDIN (Emil), directeur de la Banque de Crédit scandinave, Göteborg (Suède). *Ent. gén., pr. Col. paléarctiques.*
1851. SAULCY (Félicien CAIGNART DE), 3, rue Châtillon, Metz (Lorraine). *Col. eur.*
1887. SAVIN DE LARCLAUZE (René), au château de Mont-Louis, par St-Julien-l'Ars (Vienne). *Col., Hém. et Lép. de France.*

1891. SCHAUFUSS (Camillo), directeur du Museum Ludwig, Salvator, Meissen (Saxe). *Col.*
1894. * SCHAUS (William), Ormonde Lodge, Twickenam (Angleterre). *Lép.*
1893. SCHAWROFF (Nicolas-N.), directeur de la Station séricicole du Caucase, Tiflis (Russie). *Lép.*
1869. SCHLUMBERGER-DOLLFUS (Jean), Guebwiller (Alsace). *Col. et Lép.*
1869. * SEDILLOT (Maurice), 43 A., 20, rue de l'Odéon, Paris, 6^e. *Col.*
1885. SEEBOLD (Théodore-Lothaire-François), C. ✕, O. ✕, ✕, ✕, ingénieur civil, 2, square du Roule, Paris, 8^e. *Lép.*
1892. SEGUY (Jude), agent du syndicat des Viticulteurs, rue Clauzel, Alger (Algérie). *Coléoptères.*
1864. * SEIDLITZ (Dr Georges von), 27, Schwind Strasse, Munich (Bavière). *Col.*
1900. SEMICHON (L.), licencié ès Sciences naturelles, élève à l'Institut agronomique, 27, rue Cassette, Paris, 6^e. *Entomologie générale.*
1860. * SENNEVILLE (Gaston de), conseiller référendaire à la Cour des Comptes, 30, rue de Lille, Paris, 7^e. *Col. de France.*
1898. * SÉRULLAZ (Georges), Dr en droit, avocat à la Cour d'appel, 18, place Bellecour, Lyon (Rhône); l'été : château d'Yvours, Irigny (Rhône). *Coléoptères et Lépidoptères paléarctiques.*
1865. SHARP (Dr David), Hawthorndene Hills Road, Cambridge (Angleterre). *Col.*
1889. * SICARD (Dr A.), médecin major de 2^e classe, au 2^e bataillon de marche de la Légion étrangère, Diego-Suarez (Madagascar). *Col., Coccinellides du globe.*
1900. * SINÉTY (l'abbé Robert de), au séminaire de Vals, près Le Puy (H^{te}-Loire). *Anatomie, embryologie et biologie des insectes.*
1896. SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE L'AUDE, Carcassonne (Aude). *Ent. gén.*
1898. SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE BORDEAUX (Gironde).
1896. STANDFUSS (Prof. Dr Max), Direktor des entomologischen Museums am eidgenössischen Polytechnikum, Zürich (Suisse).

1888. STANLEY (Edwards), membre de la Société entomologique de Londres, Hidbrooch Lodge, Blackheath, London (Angleterre). *Lép.*
1894. STARCK (Alexandre DE), Ala-Mellola, Finlande, Perkjaroi (Russie). *Col.*
1897. STATION ENTOMOLOGIQUE DE L'ÉTAT (D^r G. Horvath, directeur), 28, Nador-utza, Budapest (Hongrie).
1868. STEFANELLI (Pietro), prof. au lycée royal Dante, 57, via Pinti, Florence (Italie). *Lép. eur.*
1862. STIERLIN (D^r G.), Schaffhausen (Suisse). *Col.*
1883. * SÜLGER (Hans), conservateur du Musée de l'Institut, Bâle (Suisse). *Ent. gén.*
1891. SWINHOE (général Charles), avenue House, Cowley-road, Oxford (Angleterre). *Lép.*
1886. TARGIONI-TOZZETTI (Adolfo), prof. de Zoologie à l'Institut royal, etc., 19, via Romana, Florence (Italie). *Ent. gén., pr. Hém.*
1899. TERRE (Louis-Léon-Benjamin), licencié ès sciences physiques et naturelles, préparateur à l'Université de Dijon (Côte-d'Or). *Entomologie générale.*
1890. * THÉRY (André), propriétaire, St-Charles, département de Constantine, (Algérie). *Col.*
1900. THOUVENIN (Louis), capitaine au 2^e zouaves, à Lalla-Marnia, province d'Oran (Algérie). *Coléoptères.*
1858. * TOURNIER (Henri), villa Tournier, Pency, près Genève (Suisse). *Col. eur.*
1898. TOUZALIN (Henri DE), inspecteur adjoint des Forêts, Guéret (Creuse). *Coléoptères.*
1899. TRABUT (D^r Louis), professeur à l'École de Médecine, botaniste du Gouvernement, 7, rue Desfontaines, Alger-Mustapha. *Entomologie appliquée, Coléoptères.*
1892. * TRAISET (Émile), membre de la Soc. espagnole d'Hist. nat., 42, rue Notre-Dame-de-Nazareth, Paris, 3^e. *Col. eur.*
1888. TRAPET (Louis), *, pharmacien-major de 1^{re} classe à l'hôpital militaire du Dey, Alger. *Ent. gén., pr. Col.*
1895. TRONYO, lieutenant au 2^e zouaves, rapporteur au 2^e conseil de guerre, Oran (Algérie). *Orth.*

1899. TROTTER (Dr Alessandro), assistant à l'Institut botanique de l'Université de Padova (Italie). *Étude des galles*.
1898. TSHITSCHÉRINE (Tischon DE), Olgino, par Sima, gouvernement de Wladimir (Russie). *Féroniens du globe et Harpalides paléarctiques*.
1886. TURATI (Gianfranco), 7, via Marovigli, Milan, Lombardie (Italie). *Lép.*
1888. TYLER TOWNSEND (C.-H.), Mesilla, près Los Angeles, Californie, (U. S. A.). *Ent. gén.; Col., Hém., Dipt.*
1867. UHAGON (Serafin DE), 38, calle Juan de Mena, 1^o, 11, Madrid (Espagne). *Col. eur.*
1882. VACHAL (Joseph), ancien député, etc, Argentat (Corrèze). *Hymén.*
1887. * VAULOGER DE BEAUPRÉ (Marcel),  A., O , capitaine au Service géographique de l'armée, 119, rue de Grenelle, Paris, 7^e. *Coléoptères paléarctiques*.
1895. VAYSSIÈRE (A.), professeur à la Faculté des Sciences et conservateur du Musée d'Histoire naturelle, 22, rue Croix, Régnier, Marseille (Bouches-du-Rhône). *Ent. gén.*
1897. * VERMOREL (Victor), , directeur de la station viticole à Villefranche (Rhône). *Ent. appliquée, insectes nuisibles du globe*.
1888. * VERRALL (G.-Henry), comptable, Sussex Lodge, Newmarket, Cambridgeshire (Angleterre). *Dipt.*
1899. VIALA (Pierre), . Com. M. A., professeur à l'Institut national agronomique, directeur de la *Revue de Viticulture*, 5, rue Gay-Lussac, Paris, 5^e. *Entomologie appliquée, Coléoptères*.
1893. * VIARD (Lucien), , Dr en droit, secrétaire honoraire du Conseil d'administration du Crédit foncier de France, 180, boul. St-Germain, Paris, 6^e; l'été, 19, route de la Plaine, au Vésinet (Seine-et-Oise). *Lép.*
1891. VIGAND (Charles), sous-chef à la Société générale, 7, rue de la Galté, Le Perreux (Seine). *Ent. gén.*
1900. VIGNON (Paul), licencié ès Sciences physiques et naturelles, préparateur de Zoologie à la Sorbonne, 9, boul. de Latour-Maubourg, Paris, 7^e. *Anatomie et histologie des Articulés*.
1874. VILLARD (Louis), 9, rue du Griffon, Lyon (Rhône). *Col. eur.*

1896. VILLENEUVE (Dr Joseph), 17 bis, place de la Foire, Rambouillet (Seine-et-Oise). *Diptères de France et d'Algérie*.
1899. VIRÉ (Armand), Dr ès sciences naturelles, 26, rue Vauquelin, Paris, 5^e. *Arthropodes cavernicoles*.
1899. VOLLON (Alexis), *, artiste-peintre, 15, rue Treilhard, Paris, 8^e. *Entomologie générale, Lépidoptères*.
1894. VOSSELER (Dr Julius), Privat Docent an der k. techn. Hochschule, assistent am königl. Naturalien Cabinet, Stuttgart (Allemagne). *Crust. Copépodes*.
1892. VUILLEFROY-CASSINI (F. DE), *, 3, rue Andrieux, Paris, 8^e. *Ent. gén.; Col.*
1890. * VUILLOT (Paul), membre de plus. Soc. sav., 23, rue J.-J.-Rousseau, Paris, 1^{er}. *Lép.*
1882. * WALSINGHAM (the right Honourable lord Thomas), Merton Hall, Thetford, Norfolk (Angleterre). *Ent. gén., pr. Microlép.*
1884. * WARNIER (Adolphe), 8, rue des Templiers, Reims (Marne). *Col. de France*.
1898. WILCOX (E.-V.), Boseman, Montana (É.-U. d'Amér.). *Entomologie générale, Anatomie, Embryogénie*.
1899. WYTSMAN (Philogène), archéologue, 108, boul. du Nord, Bruxelles (Belgique). *Lépidoptères, iconographie*.
1893. XAMBEU (Vincent), capitaine adj.-major en retraite, Ria, par Prades (Pyrénées-Orientales). *Col., étude des larves*.
- (472 membres, dont 24 membres à vie.)

Assistants.

1899. BOEGNER (Henri), 102, boulevard Arago, Paris, 14^e. *Coléoptères*.
1899. DUCOURTIOUX (Georges), villa des Églantiers, avenue Louvois, Chaville (Seine-et-Oise). *Ent. gén.*
1897. FLEURY (Pierre DE), 74, rue de la Tour, Paris, 16^e.
1897. FLEURY (Raymond DE), 74, rue de la Tour, Paris, 16^e.
1899. VANDERMARQ (Pierre), 14, rue de Bagneux, Paris, 6^e. *Coléoptères*.
1897. VIOLLE (Bernard), 89, boul^d St-Michel, Paris, 5^e. *Col.*
1898. VIOLLE (Louis), 89, boul^d St-Michel, Paris, 5^e. *Col.*

Abonnés.

En 1900, 32 abonnements aux *Annales* et au *Bulletin* ont été servis, à des établissements publics ou à des bibliothèques, en France et à l'étranger, par l'entremise des libraires.

Membres décédés en 1900.

- 1853. ALLARD (Ernest), Paris.
- 1884. BEAUREGARD (Henri), Paris.
- 1837. BLANCHARD (Émile), Paris.
- 1892. FAVARCO (Louis), Saint-Étienne.
- 1891. HUET (L.), Caen.
- 1888. LEECH (John-Henry), Lewes (Angleterre).
- 1899. LHOTTE (H.), Paris.
- 1892. MARQUET (Charles), Toulouse.
- 1862. MILNE-EDWARDS (Alphonse), Paris.
- 1834-1885. SÉLYS-LONGCHAMPS (BARON E. DE), Liège (Belgique).
- 1858. STAUDINGER (Otto), Dresde (Saxe).
- 1894. VALLANTIN (H.), Paris.

Membres démissionnaires en 1900.

- 1895. BONJOUR (Samuel), Nantes.
- 1893. DANYSZ (Jean), Paris.
- 1889. DEHARLE (l'abbé), Laon.
- 1880. DEMBOWSKY (Louis DE), Nowo-Minsk (Pologne).
- 1859. DESBROCHERS DES LOGES (Jules), Tours.
- 1899. FORAY (Eugène), Roanne.
- 1873. FRIDRICI (Edmond), Metz.
- 1875. LE PILEUR (Louis), Paris.
- 1898. LIAUTAUD, Clermont-Ferrand.
- 1898. LUCET (Émile), Rouen.
- 1852. NARCILLAC (comte DE), Paris.
- 1888. OSBORN (Herbert), Ames (Ét.-Un. d'Amérique),
- 1894. PASSET (Jules), Paris.
- 1888. RÖDER (baron V. VON), Hoym (Allemagne).

Assistant démissionnaire en 1900.

1894. BROUANT (René), Paris.

Membres rayés

(Décision du 13 février 1901).

1895. APFELBECK (V.), Sarajevo.

1896. BEPMALE, Saint-Gaudens.

1889. CARACCILOLO, Port of Spain (Trinidad).

1888. COSSO (C.), Alger.

1890. DELORME (P.), Alger.

1894. GUTTIEREZ Y ARANGO (D.), Manizales (Colombie).

1889. MOISSON (L.), au Tonkin.

1890. POUILLON (A.), Fruges.

1891. RINONAPOLI (L.-V.), Licata (Sicile).

1888. SHAW (A.-E.), Londres.

1893. VARENTZOW (P.), Aschabad (Russie).

TABLE ALPHABÉTIQUE PAR NOMS D'AUTEURS

- ABEILLE DE PERRIN (E.). Description de deux Staphylinides nouveaux circumméditerranéens [COL.], 203.
- ABEILLE DE PERRIN (E.) et GROUVELLE (A.). Description de deux Elmi-
des nouveaux de France [COL.], 137.
- ALLUAUD (Ch.). Allocution en quittant le fauteuil de la Présidence, 2.
— Contributions à la faune entomologique de la Région malga-
che (8^e note) (fig.), 18.
- AZAM (J.). Description d'un Orthoptère nouveau de France, 82.
- BATAILLON (E.). Théorie des Métamorphoses de M. Ch. Pérez, 58.
- BEDÉL (L.). Diagnose de deux nouveaux *Dromius* de Barbarie [COL.],
12. — Description d'un *Platyderus* nouveau de la Tunisie méri-
dionale [COL.], 170. — Diagnose d'un Harpalide nouveau de Tu-
nisie [COL.], 247. — Notes sur les *Paussus* du Nord de l'Afrique et
sur les espèces du groupe de *P. cornutus* Chevr. [COL.], 278. —
Description d'une espèce nouvelle de *Nanophyes*, parasite du *Se-
dum telephium* L. [COL.], 304. — Description de deux Coléoptères
du Nord de l'Afrique, 335.
- BÉGUIN-BILLECOCQ (L.). Note sur la nymphe de *Coelostoma hispanicum*
Küst. [COL.], 138.
- BERTHOUMIEU (V.). 5^e supplément aux Ichneumonides d'Europe
[HYMÉN.], 249.
- BLEUSE (L.). Anomalies observées chez deux Lépidoptères, 52.
- BORDAGE (E.). Sur les différentes colorations des chrysalides de *Papilio*
Machaon et de *Danaïs Chrysippus* [LÉP.], 234.
- BORDAS (L.). Sur le revêtement épithélial cilié de l'intestin moyen et
des cœcums intestinaux chez les insectes [HYMÉN. et ORTH.], 25.
- BOURGEOIS (J.). Notes sur quelques *Malthinus* paléarctiques (suite) et
description d'une espèce nouvelle [COL.], 91. — Description de
deux Malacodermes nouveaux de l'Amérique méridionale [COL.],
118. — Description d'une variété nouvelle de *Cantharis discoidea*
et notes sur l'habitat de quelques autres Malacodermes [COL.],

181. — Sur l'habitat de trois Coléoptères algériens, 246. — Sur un mode particulier de progression souterraine chez quelques larves d'insectes, 261. — Sur quelques *Podistrina* et description d'une espèce nouvelle d'Algérie [COL.], 283. — Sur quelques *Malthinus* paléarctiques [COL.] (suite), 301. — Description d'un Lampyride européen nouveau [COL.], 337. — Description d'une nouvelle espèce française du genre *Podistrina* et note d'habitat [COL.], 378.
- BOUVIER (E.-L.). Nouveau Péripate des environs de Rio de Janeiro [ONYCH.], 66. — Observations sur le *Peripatopsis Moseleyi* [ONYCH.], 119. — Observations nouvelle sur les *Peripatus* [ONYCH.], 394.
- BRÜLEMANN (H.-W.). Myriapodes recueillis en Espagne par le P. J. Pantel (fig.), 131.
- BROWN (R.). Sur les antennes anormales des Hémiptères, 306.
- BRUYANT (C.) et EUSEBIO (A.). Notes pour servir à la faune entomologique de l'Auvergne, 397.
- BUYSSON (H. DU). Dégâts du *Forficula auricularia* L. dans les ruches d'Abeilles, 183. — Description d'une espèce et d'une variété nouvelles d'Élatérides [COL.], 231.
- BUYSSON (R. DU). Sur le *Pimpla flavipes* Grav. [HYMÉN.], 164. — Notes sur divers Hyménoptères, 342. — Notes sur quelques Cynipides [HYMÉN.], 357.
- CHABANAUD (P.) et ROYER (M.). Sur un phénomène tératologique observé chez *Enoplops scapha* Fabr. [HÉMIPT.], 252.
- CHAMPENOIS (A.). Description d'une espèce nouvelle d'*Amphicoma* Latr. [COL.], 248.
- CHOBOUT (A.). Description d'un Opatride nouveau, de la Tunisie méridionale [COL.], 31. — De la place à assigner, parmi les Longicornes, au genre *Tetropiopsis* Chob. [COL.], 263. — Description d'un Longicorne nouveau du Nord de l'Algérie [COL.], 265. — Description d'une *Phaleria* nouvelle d'Algérie [COL.], 340.
- CHRÉTIEN (P.). Description d'une espèce nouvelle de Microlépidoptères de France (*Phrealcia brevialpella*), 90. — Description d'une espèce nouvelle de Microlépidoptère de France (*Lita mucronatella*), 138. — Description d'une espèce nouvelle de Microlépidoptère de France (*Butalis penicillata*), 162. — Description d'une espèce nouvelle de Microlépidoptère de France (*Brachmia medjella*), 191. — Description d'une espèce nouvelle de Microlépidoptère de France

- (*Lita capsophilella*), 223. — Lépidoptères capturés dans l'Hérault, 377. — Description de la chenille de *Zelleria ribesiella* de Joannis [MICROLÉP.], 393.
- CLOUËT DES PESRUCHES (L.). Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle d'Aphodiide et note sur le genre *Epilissus* [COL.], 422.
- DEMAISON (L.). Observations sur la nourriture de quelques chenilles de Bombycites, 22.
- FAIRMAIRE (L.). Description d'un nouveau genre de Coléoptères du groupe des Rhysopaussides (fig.), 45. — Description d'une espèce nouvelle du genre *Strongylium* [COL.], 45. — Description de Coléoptères recueillis par M. Perrier de la Bathie à Madagascar, 85. — Description de quelques Coléoptères malgaches, 134. — Description d'une Luciole nouvelle de Madagascar et de sa larve [COL.], 361.
- FAUVEL (A.). A propos de deux Staphylinides décrits par M. E. Abeille de Perrin [COL.], 282. — A propos de *Caenoptera Marmottani* Bris. [COL.], 382.
- GADEAU DE KERVILLE (H.). Observation relative à une note de S. Jourdain, intitulée : « Apparition tardive des Lampyres en 1889 » [COL.], 29. — L'accouplement des Coléoptères (fig.), 101.
- GIARD (A.). Allocution en prenant le fauteuil de la Présidence, 4. — Cils vibratiles et prolongements ciliformes chez les Arthropodes, 27. — Observation à propos des notes de MM. L. Bleuze et Ch. Oberthür (anomalies chez les Lépidoptères), 53. — La métamorphose est-elle une crise de maturité génitale, 54. — Discours d'ouverture du Congrès annuel, 73. — Description d'une nouvelle espèce d'Hyménoptère (*Eupelmus Xambeui*), 81. — Un nouvel ennemi des Abeilles (*Phyllotocus Macleayi* Fischer) [COL.], 182. — Sur l'existence probable de *Rhopalomyia Giralddii* dans le Sud Oranais [DIPT.], 260. — Sur la biologie de *Chyliza vittata* Meig. [DIPT.], 316. — Sur un cas singulier de ravages causés par *Lycetus unipunctatus* Herbst (*L. canaliculatus* Fabr.) [COL.], 332. — Sur un Hémiptère (*Atractotomus mali* Mey.) parasite des chenilles d'*Hyponomeuta malinellus* Zeller et *H. padellus* L., 359. — Sur un nouveau Tyroglyphide (*Trichotarsus manicati*) parasite d'*Anthridinus manicatum* L. et sur le genre *Trichotarsus* [ACAR.], 375. — Sur un type oublié de la famille des *Monstrillidae* (*Thaumatoessa*

- armoricana* Hesse) et sur un cas nouveau de parasitisme chez les *Monstrilla* [CRUST. COP.], 395.
- GOUNELLE (E.). Sur des bruits produits par deux espèces américaines de Fourmis et de Termites, 168.
- JOANNIS (J. DE). Note sur *Enconista miniosaria* Dup. [LÉP.] (fig.), 189.
— Description d'un Microlépidoptère nouveau, nuisible au vanillier et provenant de l'île de la Réunion, 262. — Description de trois Lépidoptères de Cao-Bang (Tonkin), 280. — Note sur quelques Lépidoptères observés par H. Lhotte aux environs de Paris, 298. — Description d'une nouvelle espèce de Microlépidoptère de France *Zelleria ribesiella*, 391.
- JOURDAIN (S.). A propos de l'apparition tardive des Lampyres, en 1899, réponse à M. Gadeau de Kerville, 101.
- KIEFFER (J.-J.). Note sur le genre *Pristaulacus* Kieff. [HYMÉN.], 338. — Description d'un *Aulax* nouveau [HYMÉN.], 339. — Remarque sur deux Cécidomyies [DIPT.], 383.
- KIEFFER (J.-J.) et TROTTER (A.). Description d'une Cécidomyie nouvelle, de Chine [DIPT.] (fig.), 233.
- LAMY (E.). Sur l'appareil respiratoire trachéen des Aranéides, 267.
- LÉCAILLON (A.). Recherches sur la structure et le développement post-embryonnaire de l'ovaire des insectes. I. *Culex pipiens* L., 96. — II. *Campodea staphylinus* Westw. (fig.), 152. — III. *Machilis maritima* Latr., 205.
- LESNE (P.). Sur les *Xylopertha pustulata* Fabr. et *Chevrieri* Villa [COL.], 10. — Notes synonymiques et rectificatives sur quelques Bostrychides [COL.], 46.
- MABILLE (P.). Description d'une Hespéride nouvelle [LÉP.], 230.
- MARCHAL (P.). Sur le rôle utile de *Nabis lativentris* Boh. [HÉMIPT.], 330.
- MAYET (Valéry). Note sur le *Caenoptera (Molorchus) Marmottani* Brissout et description du mâle de cette espèce [COL.], 226. — Note sur l'*Aurigena unicolor* [COL.], 229.
- MEUNIER (F.). Études sur quelques Diptères de l'ambre tertiaire (4^e note) (fig.), 111. — Sur les élytres des Coléoptères de la tourbe préglaciaire de Lauenburg (Elbe), 166. — Sur quelques *Mymaridae* du copal fossile [HYMÉN.] (fig.), 192. — Sur les *Mymaridae* de l'ambre et du copal [HYMÉN.] (fig.), 364.

- OBERTHÜR (CH.). Anomalies de *Doleschalia amboinensis* Stgr. [LÉP.], 53. — Note sur le *Biston Hunü* Ch. Oberth., Lépidoptère hybride appartenant à la tribu des Phalénites (planche), 274. — Aberration de *Melitaea didyma* Ochs. et *Melitaea Parthenie* Bks. [LÉP.] (pl.) 276. — Observations sur *Cerastis intricata* Bdv. et *Dasyampa Staudingeri* de Graslin [LÉP. HÉTÉR.], 352.
- OLIVIER (E.). Description de deux nouvelles espèces de Lampyrides [COL.], 47. — Sur une larve de Lycide [COL.], 112. — Description d'un Lampyride nouveau de Bornéo [COL.], 285.
- PANTEL (J.). Sur le vaisseau dorsal des larves de Tachinaires [DIPT.], 258.
- PEYERIMHOFF (P. DE). Description de deux nouveaux *Staphylinidae* de la Haute Provence [COL.], 8. — Description d'un nouvel Histiéride fouisseur, de Biskra [COL.] (fig.), 202. — Sur l'application de la loi phylogénique de Brauer, 219. — Sur la valeur phylogénique et le nombre primitif des tubes de Malpighi chez les Coléoptères, 295.
- PIC (M.). Description du *Bruchus scapularis* Reiche, du Brésil [COL.], 29. — Quelques mots sur le genre *Tetropiopsis* Chob. [COL.], 30. — Description de trois *Ptinus* d'Orient [COL.], 48. — Description d'un *Ocladius* nouveau d'Abyssinie [COL.], 108. — Quelques notes Coléoptériques, 108. — Descriptions et habitats nouveaux de divers Coléoptères d'Algérie et d'Orient, 123. — Notes sur les *Phytoecia* du sous-genre *Helladia* [COL.], 139. — Contribution à l'étude des Coléoptères de la Tripolitaine et de la Tunisie, 164. — Captures de Coléoptères myrmécophiles, en Orient, 170. — Notes synonymiques [COL.], 230. — Description d'un nouveau genre d'Elmides, de Tunisie [COL.], 266. — Notes sur le genre *Malthinus* [COL.], 287. — Notes synonymiques [COL.], 289. — Note complémentaire sur *Caenoptera (Molorchus) Marmottani* Ch. Bris. [COL.], 300. — Description d'un *Otiorrhynchus* nouveau du Nord de l'Afrique [COL.], 316. — Note complémentaire sur *Malthinus maritimus* Pic [COL.], 383. — Note sur les *Bythinus* de Tunisie et description d'une espèce nouvelle [COL.], 403. — Synonymies de quelques espèces et variétés de *Dorcudion* [COL.], 404.
- POUJADE (G.-A.). Mœurs des Anthrènes [COL.], 169.
- RAFFRAY (A.). Description de deux Psélaphides nouveaux [COL.], 305.
- RÉGIMBART (M.). Coléoptères aquatiques capturés dans l'île d'Aldabra, près des Comores, par le Dr Woeltzkow, de Strasbourg, et com-

- muniqués par le Dr Bergroth, 49. — Description d'un Dytiscide nouveau, de Perse [COL.], 121.
- REUTER (O.-M.). Description d'une espèce et d'une variété nouvelles du genre *Acanthia* Latr. [HÉM. HÉTÉR.], 156. — Quelques Hémiptères du Maroc, 186.
- SEEBOLD (T.). Sur les aberrations de l'*Agilia Tau* L. [LÉP.], 100.
- SIMON (E.). Liste des Arachnides recueillis à Uclès (Espagne) par le P. J. Pantel, 44. — Note sur *Conothele birmanica* Thorell [ARACHN.], 151. — Note complémentaire sur *Conothele birmanica* Thorell [ARACHN.], 219.
- SINÉTY (R. DE). Sur la parthénogénèse des Phasmes [ORTHOPT.], 194. — La mue chez les Phasmes du genre *Leptynia* [ORTHOPT.], 228. — Les tubes de Malpighi chez les Phasmes [ORTHOPT.], 333. — Homologation du testicule chez les Phasmes [ORTHOPT.], 350.
- TERRE (L.). Sur l'histolyse musculaire des Hyménoptères, 23. — Contribution à l'étude de l'histolyse du corps adipeux chez l'Abeille, 62.
- THÉRY (A.). Description de deux Coléoptères nouveaux du Sud-Est Algérien, 32.
- TROTTER (A.). Description de deux espèces d'*Eriophyes* de Chine [ACAR.], 179. — Description d'une espèce nouvelle d'*Eriophyes* de l'Amérique du Sud [ACAR.] (fig.), 224. — Description d'une espèce nouvelle de *Rhopalomyia* d'Italie [DIPT.], 285. — et KIEFFER (J.-J.). Description d'une Cécidomyie nouvelle de Chine [DIPT.] (fig.), 233.
- TSCHITSCHÉRINE (T.). Description d'une nouvelle espèce du sous-genre *Pseudoderus* Seidl. (gen. *Platysma* Bon.) [COL.], 329. — Notes sur quelques *Amara* de la Montagne de Blayeul (Basses-Alpes) [COL.], 358.
- VACHAL (J.). Rectification d'un nom de genre préoccupé [HYMÉN.], 233.
- VANEY (C.). Note sur les tubes de Malpighi des larves de *Stratiomys* [DIPT.], 360.
- VIARD (L.). Note sur *Phrealcia brevipalpella* Chr. [MICROLÉP.], 270.
- VILLENEUVE (J.). Observations sur quelques types de Meigen [DIPT.], 157, 363, 380. — Notes complémentaires sur quelques types de Meigen du Muséum de Paris [DIPT.], 341. — Sur *Tachina civilis* Rond [DIPT.], 401. — Notes synonymiques sur quelques espèces de Muscides créées par M. Pandellé [DIPT.], 402.

II

CAPTURES ET OBSERVATIONS BIOLOGIQUES

COLÉOPTÈRES

Bruchus (Cyphoderes) japonicus (par L. Bleuse), 81.

Cassida thoracica, *C. ferruginea* (par L. Bedel), 117.

Coléoptères divers de Saône-et-Loire (par M. Pic), 258.

Cryptocephalus bidens (par L. Bedel), 258.

Luciola lusitanica (par Ph. Grouvelle), 315.

Malachius bipustulatus (par R. de la Perraudière), 258.

Phytobius muricatus (par L. Bedel), 295.

Platysma angustatum (par L. Bedel), 130.

Stenus Kiesenwetteri, *S. lustrator* (par L. Bedel), 295.

HYMÉNOPTÈRES

Andrena nyctemera (par P. Pigeot), 186.

Limnodytes Gerriphagus (n. gen. n. sp.) (par P. Marchal), 328.

Prestwichia aquatica (par Ch. Pérez), 7.

LÉPIDOPTÈRES

Charaxes Jasius (par P. Crouzet), 214.

Lépidoptères divers du Nord de la France (par A. Giard), 130.

Nannodia Eppelsheimi (par R. Brown), 295.

Paranarsia Joannisiella (par J. de Joannis), 186.

Thais Cassandra (par A. Giard), 214.

Tinea infuscatella, *T. pellionella* (par J. de Joannis), 179.

Thichophaga tapetzella (par J. de Joannis), 179.

ORTHOPTÈRES

Embia Solieri (par A. Giard), 186.

Periplaneta australasiae (par A. Giard), 390.

III

TABLE

DES

GENRES, SOUS-GENRES, ESPÈCES ET VARIÉTÉS DÉCRITS DANS CE BULLETIN

NOTA. — Les noms en caractères égyptiens désignent les genres et sous-genres nouveaux. — Les noms en italiques désignent les espèces, sous-espèces et variétés [nouvelles. — Signes spéciaux : || Nom pré-occupé; ‡ Nom pris dans un sens autre que le sens déterminé par la description originale de l'auteur auquel on se réfère; = Synonyme de...

ACARIENS

- | | |
|--|--|
| Eriophyes <i>bicornis</i> Trott., 224. | <i>Giraldii</i> Trott., 179. |
| <i>chinensis</i> Trott., 180. | Trichotarsus <i>manicati</i> Giard, 375. |

COLÉOPTÈRES

- | | |
|---|---|
| Acmaeodera <i>Perrieri</i> Fairm., 87. | Bembidium <i>Berendti</i> (fossile) F. Meun., 167. |
| Acupalpus (Egadroma) <i>Vaulogerii</i> Bed., 247. | Berosus <i>Bergrothi</i> Rég., 51. |
| Agraecus Fairm., 21. | Bruchus <i>scapularis</i> (Reiche) Pic, 29. |
| <i>chalcoides</i> Fairm., 22. | Bythinus <i>tuniseus</i> Pic, 404. |
| Agrilus <i>atriplicis</i> Théry, 33. | Cantharis discoidea Ahr. var. <i>Carreti</i> Bourg., 181. |
| Amphicoma (Eulasia) <i>speciosa</i> Champ., 248. | Cassidopsis <i>Perrieri</i> Fairm., 89. |
| Anthicus insignis Luc. var. <i>tripolitanus</i> Pic, 165. | Centrophthalmus <i>monilicornis</i> Raffr., 305. |
| Aspergus Fairm., 136. | Chalcas <i>Fairmairei</i> Bourg., 118. |
| <i>cinerarius</i> Fairm., 136. | Chauliognathus <i>scabripennis</i> Bourg., 118. |
| Atheta (Geostiba) <i>incisa</i> Peyer., 9. | Cicindela (Chaetostyla) <i>andriana</i> Alluaud (fig.), 18. |
| Athous <i>Mesmini</i> H. du Buyss., 231. | <i>Horni</i> Fairm., 134. |
| <i>villosus</i> Fourcr. var. <i>caucasicus</i> H. du Buyss., 232. | Clytus lama Muls. var. <i>vesubiensis</i> Pic, 110. |
| Bariacus Fairm., 45. | |
| <i>costulatus</i> Fairm., 45. | |

Coenocara boleti Alluaud, 21.

Damiria Fairm., 89.

Perrieri Fairm., 89.

Diaphanes seminudus E. Oliv., 47.

Wroughtoni E. Oliv., 47.

Dromius dendrobates Bed., 13.

pilifer Bed., 12.

Esolus galloprovincialis Ab., 137.

Gaurambe minor Fairm., 135.

Haplocnemus Alluaudi Pic, 165.

Helladia scapulata Muls. var. *merisinensis* Pic, 140.

Lathrobium (Glyptomus) *Doderoi* Ab., 204.

Leptura suberis Chobaut (fig.), 265.

Vaucheri Bed., 336.

Leptusa (Sipalia) *Helitasi* Peyer., 8.

Luciola cavifrons Fairm., 361.

Mallosia graeca Sturm var. *cardo-riensis* Pic, 109.

Mathieui Pic, 124.

Malthinus varius Bourg., 94.

Melanimon sabulorum Chob., 31.

Mordellistena oranensis Pic, 124.

Myodola Fairm., 87.

muscaria Fairm., 88.

Perrieri Fairm., 88.

Nanophyes telephii Bed., 304.

Normandia Pic, 267.

Ocladius abyssinicus Pic, 108.

Alluaudi Fairm., 21.

Ocypus integer Ab., 203.

Otiorrhynchus (Arrhammichnus)

Vaulogeri Pic, 316.

Ototreta gravida E. Oliv., 285.

Paussus saharae Bed., nom. nov. (*cornutus* Fairm. nec Chevr.), 278.

Phaleria Bedeli Chob., 340.

Phosphaenopterus Montandoni Bourg., 337.

Platambus Escalerai Rég., 121.

Platyderus elegans Bed., 170.

Pogonostoma Perrieri Fairm., 135. *vestitum* Fairm., 134.

Podistrina algerica Bourg., 284.

Peyerimhoffi Bourg., 378.

Pselaptus [err. *Pselaphus*] *formicarius* Raffr., 305.

Pseudoderus capito Tschitsch., 329.

Ptinus anatolicus Pic, 48.

circassicus Pic, 48.

Krügeri Pic nom. nov. (*lepidus* Péring. nec Villa), 289.

Leuthneri Pic, 49.

Pygora chamaeleon Fairm., 86.

Rhyssomorphus Clouët, 122.

Mocquerysi Clouët, 122.

Riolus meridionalis Grouv., 137.

Siagona hovana Fairm., 85.

Strongylium forcipicolle Fairm., 45.

Temnochila gemella Bed., 335.

Tetragonoderus Perrieri Fairm., 86.

Theca limnichoides Alluaud, 20.

Volvulus cupreus Rég., 51.

Xenonychus bidens Peyer. (fig.), 202.

Chobauti Théry, 32.

Xyletinus suturatus Alluaud, 20.

CRUSTACÉS

Thaumatohessia Giard nom. nov. (*Thaumatoessa* Kroyer), 396.

DIPTÈRES

Palaeosynapha Meunier, 112.

Trotter, 233.

Rhopalomyia *Giraldii* Kieff. et

Kiefferi Trotter, 286.

HÉMIPTÈRES

Acanthia *niveolimbata* Reuter, 156.

(*Chiloxanthus*) *pygmaea* Reuter,
188.

Ploiaroides *brevispina* Put. var.

Chobauti Reuter, 187.

HYMÉNOPTÈRES

Amblyteles *Gaullei* Berthoumieu,
249.

solymus Berthoumieu, 249.

Aulax *Andrei* Kieffer, 339.

Diadromus *palliditarsis* Berthou-
mieu, 251.

Theresae Berthoumieu, 251.

Dicoelotus *alboscutatus* Berthou-
mieu, 250.

rufatorius Berthoumieu, 250.

Eupelmus *Xambeui* Giard, 81.

Herpestomus *annulipes* Berthou-
mieu, 251.

trilineatus Berthoumieu, 250.

Ischnus *Gaullei* Berthoumieu, 252.

Phaeogenes *acicularius* Berthou-
mieu, 251.

Platylobus *judaeicus* Berthoumieu,
249.

maurus Berthoumieu, 250.

Scotomphales Vachal (nom. nov.)

= *Omphalius* || Vachal nec
Philippi, 233.

Stenedon *Pici* Berthoumieu, 252.

LÉPIDOPTÈRES

Billetia Joannis, 281.

rubripuncta Joannis, 281.

Brachmia *medjella* Chrétien, 191.

Butalis *penicillata* Chrétien, 163.

Conchylis *vanillaria* Joannis, 263.

Eudamus *Biolleyi* Mabille, 230.

Eusemia *Vulcania* Butl. var. *Me-
lania* de Joannis, 280.

Lita *capsophilella* Chrétien, 223.

mucronatella Chrétien, 138.

Oxyodes *Billeti* Joannis, 280.

Phrealcia Chrétien, 90.

brevipalpella Chrétien, 91.

Rectipalpula Joannis (n. subj.),
280.

MYRIAPODES

Polydesmus Panteli Brölemann (fig.), 131.

ONYCHOPHORES

Peripatus nicaraguensis Bouvier, | *Ohausi* Bouvier, 67.
395.

ORTHOPTÈRES

Arcyptera Kheili Azam, 82.

J. DE GAULLE.

IV

ACTES, DÉCISIONS ET PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ

Annales de la Société Entomologique de France. — Dépôt sur le bureau du 3^e trimestre 1899, 77; — du 4^e trimestre 1899, 213; — du 1^{er} trimestre 1900, 273.

Budget. — Rapport sur les comptes du Trésorier par M. H. Desbordes, 78.

Congrès annuel et banquet de 1900, 73 et supplément au Bulletin n^o 4.

Nécrologie. — Richard-Henry Meade, 17. — A.-F. Marion, 17. — Émile Blanchard, 41. — Dr Henri Beauregard, 129. — Alphonse Milne-Edwards, 177. — Ch. Marquet, 201. — Victor Lopez Seoane, 293. — H. J. Lhotte, 293. — Dr Otto Staudinger, 313. — Joseph Mik, 313. — Armand David, 325. — E. de Sélys-Longchamps, 373. — L. Huet, 390.

Nominations annuelles, 405.

Prix Dollfus. — Non décerné en 1900, 18.

Revision du règlement. — Proposition, 80. — Rapport par M. Ph. François, 145. — Vote, 214.

Nomination de membres honoraires. — Élection d'une commission, 294. — Rapport, 314. — Élection, 374.

J. DE GAULLE. .

TABLE DU BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

NOTA. — Il n'y a pas de travaux entomologiques dans les pages placées entre parenthèses.

Abeille (L'), 208, 253, 343.

Académie des Sciences (C. R. hebdom. des Séances), 13, (34, 68), 112, (125), 140 (171, 183, 197), 208, 238, 253, 270, (289), 307, 317, 344, (367), 385, 406.

Académie des Sciences de Cracovie (Bulletin international), (34, 112, 140, 171, 208, 307, 406).

Académie d'Hippone, 183.

Académie Imp. des Sciences de St-Petersbourg. — 1^o Annuaire du Musée zoologique, 13, 208, 344, 406. — 2^o Bulletin, 344.

Academy of Natural Sciences of Philadelphia (Proceedings), 112, 253, 307.

Agricultural Gazette of N. S. Wales, 34, 113, 140, 184, 208, 253, 289, 307, 317, 344.

Akademia umiejtnosci w Krakowie. — 1^o Rozprawy, 208. — 2^o Sprawozdanie Komisji fizjograficznej, 208.

American Academy of Arts and Science (Proceedings), 171.

American Association for the Advancement of Science (Proceedings), (307).

American Entomological Society (Transactions), 113, 307, 367.

American Museum of Natural History (Bulletin), (113), 270, 307.

Annaes de Sciencias naturaes, 317.

Annales des Sciences naturelles, 68.

Annals and Magazine of Natural History, 34, 68, 125, 171, 197, 239, 270, 307, 344, 385.

Archives provinciales des Sciences, (69, 113, 125, 197, 208), 254, (289), 308, 317, 344.

Association française pour l'avancement des Sciences, (69), 126, (197, 254), 289, 386.

Berliner Entomologische Zeitschrift, 308, 406.

Biologia Centrali-Americana, 141, 318.

Boston Society of Natural History (Proceedings), 126.

Buffalo Society of Natural Sciences (Bulletin), (141).

- Canadian Entomologist (The), 13, 69, 113, 141, 184, 208, 239, 289, 308, 318, 368, 406.
- Carnegie Museum (The), (407).
- Chambre de commerce de Paris (Bulletin), 386.
- Chicago Academy of Science. — 1^o Bulletin (318).
- Chicago Entomological Society (Occasional Memoirs), 172.
- Cincinnati Society of Natural History (Journal), 172, 309.
- Comptes rendus des Congrès des Sociétés savantes de Paris et des départements, 14.
- Deutsche Entomologische Zeitschrift, 113, 289.
- Entomological News, 35, 114, 197, 254, 368, 407.
- Entomological Society of London (Transactions), 198.
- Entomological Society of Ontario (40th Annual Report), 172.
- Entomologische Nachrichten, 14, 35, 70, 114, 126, 172, 198, 209, 239, 254, 271, 309, 318, 344, 386.
- Entomologisk Tidskrift, 69.
- Entomologist (The), 14, 70, 126, 172, 198, 239, 254, 309, 345, 386.
- Entomologist's monthly Magazine (The), 14, 70, 114, 173, 198, 240, 254, 309, 345, 386.
- Entomologist's Record and Journal of Variation, 35, 115, 141, 184, 209, 240, 255, 310, 318, 368, 407.
- Essex Institute (Bulletin), 271.
- Evkönyv. Jahresheft des naturwissenschaftlichen Vereines des Trencsiner comitates, 141.
- Exploration scientifique de la Tunisie (70).
- « Fauna », Société des Naturalistes Luxembourgeois, 290.
- Feuille des Jeunes Naturalistes (La), 14, 70, 126, 173, 199, 240, 255, 311, 345, 386.
- Fourth International Congress of Zoology, 70.
- Frelon (Le), 71, 199, 255, 271, 311.
- Geological Survey of Canada, 209.
- Illustrierte Zeitschrift für Entomologie, 14, 35, 71, 115, 126, 141, 173, 184, 199, 240, 255, 271, 290, 311, 318, 345, 368, 386.
- Instructor (El) (14, 127, 184, 271, 311, 345).
- K. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (Verhandlungen d.), 36, 71, 115, 184, 240, 290, 311, 368, 407.
- Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. — 1^o Bihang, 240, 345. — 2^o Ofversigt, 199.
- Legislative Assembly of N. S. Wales (Report), 369.
- Linnean Society of London. — 1^o Journal, 36, (311), 386. — 2^o List, (36). — 3^o Proceedings, 387. — 4^o Transactions, (311).

- Linnean Society of N. S. Wales (Proceedings), 36, 199, 209, 311, 369.
 Ministère Roy. Hongr. de l'Agriculture, 346.
 Musée du Congo (Annales), (36, 197).
 Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique (Annales), 36.
 Museo civico di Storia naturale di Genova (Annali), 36.
 Museo nacional de Costa-Rica (Informe), 318.
 Museo nacional de Montevideo (Anales), 37, 241, 311, (346).
 Museu paraense de Historia natural e Ethnographia (Boletín), 209.
 Naturaliste (Le), 14, 37, 71, 115, 127, 142, (173), 199, 209, 241, 255, 271, 291, 311, 346, 369, 387.
 Naturforschenden Gesellschaft in Bern (Mittheilungen), 318.
 Naturgeschichte der Insekten Deutschlands, 38.
 Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark (Mittheilungen d.), 14.
 New-York Academy of Sciences. — 1° Annals, 142. — 2° Memoirs, (255).
 New-York Agricultural Experiment Station (Bulletin), 38, 127, 209, (346).
 New-York Entomological Society (Journal), 199, 311, 319.
 New-York State Museum (Bulletin), 311.
 New Zealand Institute (Transactions and Proceedings), 71, 387.
 Nouvelles Archives du Muséum d'Histoire naturelle, (346).
 Nova Scotian Institute of Science (Proceedings and Transactions), (255).
 Novitates zoologicae, 38, 142, 311, 387.
 Ohio State University (Bulletin), 346.
 Préparateur (Le), 199.
 Psyche, 15, 38, 71, 127, 200, 209, 241, 291, 319, 346, 387.
 R. Accademia dei Lincei (Atti), (15, 38, 72, 115, 127), 173, (200, 210, 241, 255), 319, (346, 369, 387, 408).
 R. Istituto di Studi superiori e di Perfezionamento in Firenze (Pubblicazioni), (408).
 Revista Chilena de Historia natural, 72, 127, 142, 200, (210), 255, 319, 346, 369.
 Revue agricole, horticole et de culture maraichère de l'Algérie, (200).
 Revue des Revues d'Histoire naturelle, 142.
 Revue éclectique d'Apiculture, 15, 72, 127, 173.
 Revue horticole, (319).
 Revue Scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, (38, 115), 142, 200, 210, (255), 319, (346), 387.
 Rochester Academy of Science (Proceedings), (271).
 Rovartani Lapok, 72, 319, 346.
 Royal Dublin Society. — 1° Scientific Proceedings, (320). — 2° Scientific Transactions, (320).

- Royal Society of Canada (Proceedings and Transactions), 38.
- Royal Society of London. — 1^o Proceedings, 38, (72, 127, 142, 173, 200, 210, 241, 291), 320, (346, 369). — 2^o Report to the Malaria Committee, 271, 320. — 3^o Philosophical Transactions, (320).
- Royal Society of N. S. Wales (Journal and Proceedings), (320).
- Royal Society of South Australia. — 1^o Memoirs (72, 320). — 2^o Transactions, 72, 320.
- Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft (Mittheilungen), 200, 346.
- Smithsonian Institution (Annual Report of the Board of Regents), 142.
- Sociedad científica « Antonio Alzate » (Memorias y Revista), (38), 127, (241, 291, 320), 408.
- Sociedad española de Historia natural. — 1^o Actas, 38, 127, 210, 241, 320, 369. — 2^o Anales, 115, 210.
- Società Entomologica Italiana (Bullettino), 72, 241, 369.
- Società romana per gli Studi zoologici (Bollettino), 11, (38).
- Società Veneto-Trentina de Scienze naturali (Atti), 38.
- Societas Entomologica, 15, 38, 72, 116, 142, 173, 200, 210, 241, 255, 271, 291, 320, 346, 369, 387, 408.
- Societas Entomologica Rossica (Horae), 321, 347.
- Societas pro Fauna et Flora Fennica (Acta), 210.
- Società zoologica Italiana (Bollettino), 321.
- Société d'Agriculture, Sciences et Industrie de Lyon (Annales), (210).
- Société des Naturalistes de l'Ain (Bulletin), 370.
- Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne (Bulletin), 241, (347).
- Société des Sciences historiques et naturelles de Semur (Bulletin), 72.
- Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France (Bulletin), 142, 321, 347.
- Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire (Bulletin), 15, 38, 127, 174, 211, (321), 370, (387).
- Société des Sciences naturelles et d'enseignement populaire de Tarare (Bulletin), (39, 142, 210, 241), 271, (321, 347, 387).
- Société d'étude des Sciences naturelles d'Elbeuf (Bulletin), 116.
- Société d'étude des Sciences naturelles de Nîmes (Bulletin), 321.
- Société d'étude des Sciences naturelles de Reims (Bulletin), 211, (322).
- Société d'études scientifiques d'Angers (Bulletin), 408.
- Société d'études scientifiques de l'Aude (Bulletin), 116.
- Société d'Histoire naturelle de Mâcon (Bulletin), 127.
- Société d'Histoire naturelle des Ardennes (Bulletin), 116.
- Société d'Histoire naturelle de Toulouse (Bulletin), 211.

- Société Entomologique de Belgique. — 1^o Annales, 116, 142, 174, 211, 242, 271, 322, 344, 387, 408. — 2^o Mémoires, 322.
- Société Impériale des Naturalistes de Moscou (Bulletin), 256, 348.
- Société Linnéenne de Lyon (Annales), 210.
- Société Linnéenne du Nord de la France (Bulletin), (116, 143, 242), 322, 370.
- Société scientifique du Chili (Actes), 388, (408).
- South African Museum (Annals), 127, 211, 242, 322, 348.
- South London Entomological and Natural History Society (Proceedings), 242.
- Spèces des Hyménoptères de France et d'Algérie, 211, 322, 388.
- Spelunca. — Bulletin de la Société de Spéléologie, 322, 348.
- Stavanger Museum (Aarsberetning), 322.
- Stettiner Entomologische Zeitung, 15, 39, 116, 211, 322.
- Tijdschrift voor Entomologie, 127, 143.
- Tuft's College Studies, (322).
- Union apicole, 128, 143, 212, 256, 291, 322, 348.
- Université de Toulouse (Bulletin), 128, 348.
- University of Tennessee. — 1^o Agricultural Experiment Station (Bulletin), (15). — Record, 15.
- U. S. Department of Agriculture : Division of Entomology (Bulletin), 39, 143, 212, 322, 388.
- U. S. Geological Survey (Annual Reports), 212.
- U. S. National Museum (Proceedings), 128.
- Wiener Entomologische Zeitung, 15, 128, 143, 212, 291, 323, 348.
- Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina, 15.
- Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters (Transactions), (39).
- Zoological Society of London. — 1^o Proceedings, 212, 256, 323. — 2^o Transactions, (39).

Allnaud, 16, 144, 174. — Aulard, 323. — Bachelier, 370. — Bargagli, 272. — Becker, 212. — Bedel, 144, 242, 388. — Belon, 242, 370. — Berg, 144, 272, 323, 370. — Biolley, 323. — Blanchard (R.), 323. — Bolivar, 39, 323. — Bonnier, 16. — Bordas, 242, 323, 388. — Bourgeois, 39, 40, 242. — Brölemann, 291, 323. — Buchet, 242. — Büddeberg, 370. — Bureau, 370. — Buysson (H. du), 243. — Carpentier, 144. — Champenois, 348. — Chevreux, 323, 324. — Chobaut, 40, 324. — Coquerel, 348. — Coquillett, 243. — Courchet, 40. — Delegorgue, 370. — Denny, 272. — Dollfus, 144. — Donc-

kier de Donceel, 174. — Dubois (E. R.), 174. — Dupont, 256. — Duhourceau, 324. — Fairmaire, 174, 370. — Felt, 243. — Fleudaux, 174. — Froggatt, 388. — Gal, 243. — Gervais, 243. — Giard, 324. — Hampson, 324. — Héer, 174. — Holmgren, 243. — Houard, 16. — Houlbert, 324. — Hunter, 324. — Janet (Ch.), 370. — Jaquet, 174. — Joannis (J. de), 324. — Jousset de Bellosme, 16. — Lameere, 324. — Lapouge (de), 175, 324. — Lécaillon, 175, 272. — Lefeuvre, 324. — Le Mesle, 175. — Léveillé, 272, 371. — Maindron, 243. — Malapert, 243. — Marchal, 371. — Marcotte, 175. — Martin (J.), 371. — Mognin, 16. — Meunier, 175, 371. — Milne-Edwards (H.), 16. — Mingaud, 243. — Minjard, 40. — Naçonow, 243. — Needham, 16. — Oberthür (Ch.), 175. — Olivier (E.), 40. — Orbigny (H. d'), 243. — Packard, 256. — Philippi, 16. — Phipps, 256. — Pic, 175, 176, 244, 292, 371. — Plateau (F.), 244. — Preudhomme de Borre, 40. — Raspail (X.), 16. — Régimbart, 16. — Reitter, 371. — Reuter (E.), 371. — Rey Pailhade (de), 16. — Röber, 244. — Robertson, 371. — Saussure (H. de), 244. — Schultess-Schindler (de), 175. — Schultz, 371. — Simon (E.), 371. — Slingerland, 175. — Stefani (de), 175, 244. — Strand, 371. — Trabut, 175. — Truchet, 372. — Trouessart, 372. — Tschitschérine, 40, 244, 372. — Tümpel, 16, 372. — Tutt, 244. — Vayssière, 256. — Viura y Carreras, 256. — Xamheu, 175.

A. LÉVEILLÉ.

ERRATA.

Page 8, 10^e ligne; au lieu de : *pronoti*, lire : *pronotum*.

Page 179, 25^e ligne; au lieu de : soies latérales dépassant l'insertion ventrale, lire : soies latérales dépassant l'insertion des soies ventrales.

Page 202, 16^e ligne, au lieu de : *maxima e*, lire : *maximae*.


Page 221, 12^e ligne; au lieu de : comme celui des tarses, lire : comme celui des larves.

Page 284, lignes 12-14; au lieu de : *Pronoto... transversaliter immarginato... antice lateraliter depresso*, lire : *Pronoto... lateraliter immarginato..... antice transversaliter depresso*.

Page 296, 28^e ligne; au lieu de : dem Protentomon nahe stehen, lire : dem Protentomon nahe stellen.


Page 305, 13^e ligne; au lieu de : *Pselaphus formicarius*, n. sp., lire : *Pselaptus formicarius*, n. sp.

Page 349, 2^e ligne; au lieu de : lord Albury, lire : lord Avebury.






J.-B. Obernatter phot.

Variations de Lépidoptères.



J.-B. Obernetter phot.

Variations de Lépidoptères.



J.-B. Oßarnetter phot.

Variations de Lépidoptères.











Caudin del. J. Groussandeau dir.

E. Lartaud sc.

Monogr. Pl. XXXVIII








Scydmaenidae
genre *Scymaenus*



Gaudin, det. J. Croissandeau dir.

K. Lortaud co.







Scydmaenidae



Caudin del. J. Croissandeau dir.

F. Lartaud sc.







Strydmenidae








Gaudin del. J. Croissandeau dir.

F. Lartaud sc.

Cerambycidae.










Grandes del. J. Gressin et al. de

E. Lardant. s

Scydmaenidae

Monogr. PLXLIII

genre *Eudoxis* *Leptomastix*







Gaudin del J. Crouzambou del.

Monogr. PLATE

Scydmaenidae

genre *Leptomastax*




Gaudin del. J. A. Crozier sculp. de

Scydmaenidae


Monogr. Pl. XIV



444



445



447



449








448



* Carthus. s.

Seydmanidae

genre *Leptomastix* Ableton




donnée de J. Crossland au dit

Scydmaenidae

Monogr. Pl. XIII

genre *Machys*





Donné par J. Croissandeau de.

Monogr. Pl. XLVIII

Scydmaenidae

genre Mastigus






Kieffer et Lamberton, del.

Imp^{re} Lemercier, Paris.

A. Binard, l.

Cécidomyies.





Kieffer et Lambertson, del.

imp. Lemercier, Paris.

A. Benard, lith.

Cecidomyies.






Kieffer et Lambertson, del.

Imp^{re} Lemerle, Paris.

A. Bénard, lit.

Cécidomyiidae.





Kieffer et Lambertson, del.

Imp^{re} Lemeris, Paris.

A. Bonard, lith.

Cécidomyies.






Kieffer et Lambertson, del.

imp^{re} Lemercier, Paris.

A. Bonnard, lith.


Cécidomyies.



Kieffer et Lambertson, del.

Imp^{re} Lemercier, Paris.

Cécidomyies.




Kieffer et Lambertson, del.

Imp. Lemeroy, Paris.

A. Bernard, lith.

Cécidomyies.




Kieffer et Lambertson, del.

Imp. Lemerain, Paris.


A. Benard, lith.

Cécidomyies.



Imprimé par J. LAMX

Cécidomyies.





Kieffer et Lamberton, del.

Imp^m Lemerle, Paris.


A. Bénard, lith.

Cécidomyies.





A. Berni





Kieffer et Lamberton, del.

Imp. J. Lemerle, Paris.

A. Benard, lit.


Cécidomyies.





offer et Lamberton.

Cicadomyia.




Kieffer et Lambertson, del.

Imp^{re} Lemercier, Paris.

A. Bena

Cecidomyiids.




non Lambertoni del

Imp. Lemerait, Paris.


A. Benard lith.

Cécidomyies.



En Lambert del.


Cecidomyiæ.



Imp^{re} Lemercier, Paris.

A. Bénard, int.

Cécidomyies.




Ern Lambertson, del.

Imp^{re} Lemoine, Paris.


Cécidomyies.






A. Perrier

Cécidomyces.








E. Lambertson, del.

Imp. Lemercier, Paris.

A. Bénard, lith.


Cécidomyies.



Ernest Lambertson, del.

Imp. Lemercier, Paris.

Cécidomyies.




Imp. L. Lemerier, Paris

A. Bénard, 701

Cécidomyies.



Biston Hünii ♀



Phototyp. Oberthür.

Melitaea Didyma
(hermaphrodite et aberrations).

Melitaea Parthenie.
(aberrations).

